

HIPPOCRATIS MAGNICOACÆ PRÆNOTIONES.

Opus admirabile, in tres libros tributum.

Interprete & enarratore LVDOVICO DVRETO, Segusiano.

*Ad HENRICVM III. Gallia & Polonia
Regem Christianissimum.*

Cum rerum commemorabilium Indice amplissimo.




PARISIIS,
Apud Baptistam DV-PVYS, via Iacobæa.

M. D. LXXXVIII.

Cum priuilegiis Cæsareæ Majestatis, & Regis Christianissimi.

1/88



THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE

THE PROGRESS MAGAZINE



HENRICO III.

GALLORVM ET POLONORVM

REGI CHRISTIANISSIMO,

Triumphum.



OFFERO ac dedico tibi librum, Christianissime Rex, qui, quibus nominibus ut esset majestati tua gratus acceptusque efficere potuit, sibi illa suisque paginis vniuersa præscripsit. Nam & profitetur se docere Medicina scientiam; & Hippocratem auctorem laudat; interpretem refert, qui fortunatus natus principe te vixit, parentem meum Ludouicum Duretum. Hominum tutori tibi legitimo atque pastori, patri patriæ, nulla est ars ex omnibus quæ possit esse commendatior quàm ea, quæ tibi tuos, teque tuis populis præstare nouit diu incolumem. Hippocrates autem, magnus seruator dictus Thessaliæ, Macedoniæ, Thraciæ; toti olim Græciæ præluxit, quæ gentium reliquarum famam, splendore nominis obscurauerat; fælix gloriæ suæ spectator & beatus, maiores, quàm ulli vnquam mortali, honores sibi à suis delatos vidit; Regum ipse nepos, Asiæ & Aphricæ latè dominantes Reges, quasi tam insigni & illustri nomine tyrannos indignos, ad illius se amicitiam applicantes, repudiando neglexit: nunc gratiam à te non paruam init, quòd thronum tuum venerans suspicit; augustam tuæ majestatis, id est, iustitiæ ac pietatis, sedem; quòd terram tuam, ne hoc illi vnum ad fælicitatem deesset, iam per annos ferme quadraginta, post habitis aliis, maxime vnâ coluit, utque inibi ipse vicissim coleretur, sapientiæ in ea suæ domicilium constituit. Iam verò parentem meum & fouebat dum vir esset, & sustentabat iam senescentem, conscientia suæ erga te integritatis & fidei: cuius ne immemor sæculorum posteritas esset; quod in suis optimum maximumque duxit, hoc sapientiæ arca-

num, thesaurum sanitatis, Asclepiadis quondam pretiosissimum, diu
 ceteris opertum, sub auspiciis professionis à te demandata, longo usu,
 assiduâ vigiliis, sibi tandem, si amicis credimus, patefactum & aper-
 tam, tibi moriens testamento legauit; sceptri si quod esse posset orna-
 mentum tui. Quem tu igitur, Henrice, vinum, opinione probitatis
 magna, industria nonnulla dilexisti; eius vita sancti nomen, fauoris
 & beneuolentia significatione illustra: ipsius munus accipe, medico-
 rum signiferi ac ducis auctoritate maximum, utilitate amplissimum:
 cumque dolorum cruciatus & morbos, in tuam tuorumque vitam
 coniuratos hostes esse noueris; reliquorum iam partim factus, partim
 etiam designatus, precibus Ecclesia, victor; de his tu quoque interim
 ex hoc presidio, libenter, hilare, & magnifice triumphas.

Majestati tuæ humiliter subiectus seruus fidissimus.

Ioannes Durerus, Ludouici Fil.

Ioannes





Ioannes Duretus, Ludouici Fil. Doctissimo Medico Petro Droëto S.



ME MIN I, Droëte doctiss. ante annos quinque visitatum abs te, amicitiae causa, parentem meum, Coacis prognosibus operam nauantem serio, deprehensum fuisse. Tum autem illum, honorificè locutum multa de Hollerio, quem doctentem virum audiuerat adolescens; conqueri apud te vehementer de Iacorio cœpisse. Quam enim, aiebat, gratiam, pro superata libri omnium utiliss. difficultate, à bonis omnibus referre potui ac debui; eius ingratiissimus homo ita fuit cupidus, vt eam mihi subreptam velit. Nouerint saltem qui eius commentaria, hoc eodem conscripta proposito, viderint; hæc mea dictata ocyus, chartis impressa serius & vulgata extitisse. Ad quæ tu, in me intuens, optimo seni, ab homine malè nato & educato, secus esse non potuisse, quàm Hollerio fuit; cuius in medendi praxim meditationes longè præclarissimas, correptas furto, suo olim nomini inscripsit. Non dubitare te quin ea quæ parens ipse meus, anno supra mille & quingentos septuagesimo, in hoc idem opus palam & publicè edifferebat, vt cætera quæ Luteriæ. Monspefuli, cæteris florentibus Medicinæ laude academiis enarrabantur, conductitiis ammanuensium operis comparauerit. At enimvero cum ante annos plus minus triginta, studia vestra, Ludouico Dureto hunc librum explicanti data, socij medicinæ impertiretis, comuni tecum hospitio vsum fuisse si negauerit; mortalium impudentissimum futurum. Horum igitur Droëte nisi iam oblitus es, eorum publicò testimonio, parentis causam probatam, remque assertam esse, quæ me vt optem pietas adducit, eadem te vt velis hortatur.



Petrus Droëtus, Ioanni Dureto, Ludouici Fil. S. P. D.

M EMINI, doctiss. Durete, me felicis memoria parentem tuum, olim præceptorem meum, visitasse cum doctiss. Curtino nostro: neque etiam sum oblitus, te legistum commentarios in pranotiones Coacas à parente conscriptos: quoniam institueramus sermonem de aegritudine honestiss. uxoris D. de Sansi, de cuius salute spem omnem sine causa D. Magnus, medicus, amiserat. Sat scio præterea quàm honorifice sapius parens tuus, mentionem de spectatissimo Hollerio fecerit, & quam de illo Hollerius opinionem suscepisset. Factus est aliquando Hollerius obuiam tuo parenti, cum è schola domum repeteret; & tu, mi Durete, inquit ille, salebrosas pranotiones Coacas habes in manibus: sequor vestigia tua respondit: At ille, Tu meliorem viam es ingressus, eam persequere. Magnum est laudari à laudato viro. Nunc ad Iacotium. Ille est certè acuti ingenij, & indefessi laboris: sed bona fide possum affirmare quod petis; me scilicet illum habuisse comitem & socium studiorum, unaque rara eruditionis parentem auduisse prælegentem pranotiones Coacas: quod, meo periculo, fatebitur Iacotius: nisi velit infamiae & ingratitude notam nomini suo inuri. Superest ut tibi gratias agam: quoniam ex media senectate me in eam ætatem reduxisti, in qua tam præclara artis medica lumina, suo splendore adolescentum animos illustrabant. Bene vale, è Bibliotheca nostra 4. idus Aprilis.

Ioannes



Ioannes Duretus, Ludonici Fil. Lectori.



V O D harum expectationem lucubrationum, quam, ante annos decem, sponte sua fecit ac dedit, explere viuis non potuit, vix vereor vt parenti meo illudat quisquam: saltem eorum qui viderint, aut percunctâdo audiuerint, vt vix bene vnquam ex incommoda valetudine emerferit, ex quo prædictionum Coacarum explicationem in se recepit: vtque morbo, quoad potuit, confictantis, & ænigmatum, quibus plena sunt Coacarum omnia, difficultati decertantis; plurimus labor in vſu medendi fuerit, & profitendi, quotidiano verſatus. Equidem hîc, omni vanitate, credo, & inuidia procul, affirmare poſſum; operam ab inualido iam ſene in munera tria ſimul fuiſſe collatam, quorû vnum aliquod ipſum per ſe, vel robuſtiſſimum iuuenem, in ipſo ætatis flore, contriuiſſet; docendi, inquam, ſcribendi, & ægrotos omnibus horis ſollicitandi. Itaque concidit ſub onere tandem, vt neceſſe fuit, qui nunquam animo ſuccumbere potuit: nec tam diu optatum, qui iam inſtare videbatur, videre ei contigit, finem meditationum commentationumque in has prognôſes ſuarum. Quinquaginta octo in calce, aliquot etiam in progreſſu intactas ſiuit; puta 82. 83. 164. 165. 166. lib. 1. 6. cap. 5. lib. 2. 31. cap. 16. lib. 2. 55. 56. tract. 3. & 5. tract. 4. lib. 3. Credo quod longioris diſputationis aliquando pertæſus, cum nouo propoſito animum, tanquam ferculo palatum, oblectare cuperet; relictis aliis, alias ſumebat in manus: plurimum deceptus ea ſpe qua ducebatur explendi lacunas omnes, antequam finem ſcribendi facere cogeretur. Enimuero, quod eo dictum duntaxat velim, ne qui à me promanauit error, fortè in immeritum redundet; feci vt cum interprete locutæ prognôſes, iſtiusmodi omnes, ab omnibus iam, vt ſpero, intelligentur: quin & ſententias Græcas, quæ in propoſitarum obſcurarum aut dubiarum intelligentiam & fidem citatæ erant & productæ, paucis exceptis, quibus proſpectum erat, in ſtudioſorum gratiam, latinæ feci; paternam hic phraſim ita ex profeſſo imitatus; illic dictatas olim publicè, quarum copiam habui, huius eiſdem operis explicationes ita ſequutus; vt per me quidem minimè ſteterit, quominus hoc monumentum ſui, à ſe eodem inceptum, elaboratum, perfectum, inuida inuita morte, poſteritati reliquerit. Nunc vtinam quantum ſtudit, tantum & placeat & iuuet: tum demum perueniſſe ad exitum ſibi in omni vita propoſitum videbitur.

IN COMMENDATIONEM OPERIS.

Exit opus tandem, multos quod pressit in annos.

Duretus, Coi lux & imago senis.

Fallor. Non operis, non libri nomina quadrant:

At melius dici bibliotheca potest.

Cunctarum hic seges est medicarum uberrima legum:

Et modica medicas mole coërcet opes.

Morborum causas, & signa, & horum,

Legibus & cautè, queis medeare, docet.

Vanalis medicinæ hac ilias unica proster:

Frustra alios cudes bibliopola libros.

Guill. de Baillou Med. Parisiensis.

Quòd iunior patris vestigia clara sequatur

Duretus, proles digna parente suo.

Illi hæc cum multis communis gloria floret:

Nec quicquam laudis res habet ista nova.

Sed quòd Duretus senior, pars maxima nostra,

Atque ornamentum præsidiumque scholæ:

Duretus princeps Medicorum, à principe Coo

Tam multis annis disçitus atque locis.

Diuinum Hippocratem tam bellè exscripserit, ut non

Hippocrates similis sit magis ipse sibi.

Laus demum hæc rara est, à nullo audita, nec ullis,

Quod meminisse queam, concelebrata libris.

Nicolaus Ellain, Parisiensis Medicus.

L. Dureti prosopopœia.

Multiplices linguas, multas scrutatus & artes,

Præcolui cunctis Hippocratem Medicum.

Vnus in ore fuit, studiis præfectus & unus.

Ille mihi solus cura labôrque fuit.

Regia, me, lustris plus quinque, docente cathedra:

Illum Parisiis audiit & didicit.

Doctrinæ & cathedræ, nostris ex ossibus, vno

Successore dato, mens adiit superos.

Hæc fuerit seris quæ & quanta nepotibus, ecce;

Æternum Coacæ proferet artis opus.

H. Monantholius medicus & professor Regius.

Macte animi

*Maeste animi iuuenis, multos vigilata per annos,
Qui patris monumenta tui das luce potiri.
Et facis ut fati, Parcarum & lege solutus,
Ora hominum videat: scriptis, depellat ab agris
Corporibus morbos; vna quibus ante superstes
Voce medebatur. Duo iam clarissima sacli
Lumina praesentis, primo vestire nitore,
Et, tenebris pulsus, in apertam educere lucem
Hippocratem voluere diu: non attamen ante
Prodiit is cultu patrio, veroque colore
Agnosendus; cum donec solertia magni
Dureti eripuit mendis, variisque lituris:
Ora repurgatum, germana & voce loquentem
Exhibuit. Qua ne venturos scripta nepotes
Effugiant, nostris iaceant ve incognita saclis.
Tu, solo genitore minor, puer optime, fidis
Commendas foliis, titulisque illustribus ornas:
Et facis Hippocratem, rediuiua ut voce loquentem,
Posteritas habeat, comitem Hippocratisque parentem:
Ambobus vitæ filam, seriemque retexens:
Et reduces patriis decorans natalibus ambos.*

Henricus Blacuodæus Scotus, Doctor Medicus Parisiensis.

In tumultum Ludouici Dureti.

**Ludouicus Duretius.
De cuius ludo virtus.**

*Ne tumultum magni per terras quere Dureti.
Vlla potest tantum condere terra virum?
Nominis ille satur, medio se inuoluit Olympo:
Immensi sobolem se memor esse Poli.
Sed monumenta sua virtutis multa reliquit,
Nomini & erexit mille trophæa suo.
Mille trophæa, modum saclis factura futuris,
Digna vel Asclepio terque quaterque Deo.
Nempe erat Asclepia princeps Duretius artis,
Quem coluit facili doctus Apollo manu.
Quem cultum ætheriæ gremio demisit ab arcis,
Atque suas terras inſit obire vices.
Auspiciis Phæbum felix æquauit ab ipsis,
Hunc unum & potuit Phæbus habere parem.
Attamen auriloqui cœlestia labra Dureti
(Ambrosia & Coa pasta labella fano)
Mille Deo medico medicos peperere secundos:
Et prolem, ingenij pignora certa sui.
Nominis omen erant Duretio nomina, CVIVS
.DE LVDO VIRTVS prodiit eximia.*

Ioannes Dacier, Medicus Parisiensis.

Creditur isse lubens pridem Duretus ad astra.

Cycladas emensum sistit amœna Coos.

Hoc, ait, Hippocratis conduntur marmore gazæ:

Impiger, haud parcas, prome viator, opes.

Exerit; Argolia, Ausoniâque regressus in urbem:

Cernit, eheu, vitæ stamina secta sua.

Ornare exuviis humanos ditibus, inquit,

Quis vetat? inuita hæc edita sorte dabo.

Eruta, nate, Coos, nostro simul eruta busto;

Æternes inbeo, quæ peritura tuli.

Ioannes Cornurius, Parisiensis Doctor Medicus.



OSTHVMA progenies, magni post fata parentis,
Nascitur, & superas, felicitibus exit in anras
Auspiciis, Durete, tibi: sed nescia mortis
Progenies, & quæ durando plurima vincet
Sæcula. Namque illi hoc medices inuentor, & idem,
Nascenti, pater annorum promittit. Apollo.

Fortunate senex, maneis cui fama sub ipsos

Ista venit, tantorum operum iustissima merces.

Nos quoque felices, moriens quibus ista relinquis

Virtutis monumenta tuæ, diuinæque mentis

Semina, venturos quibus & cognoscere morbos

Sit facile, & certis cunctos prædiscere signis

Ante suos ortus: docuit quæ maximus olim

Hippocrates, Cois mandans arcana tabellis.

Iam nulli tacitæ venient in corpora pestes.

Et pater ipse Deum, vocem qui sustulit illis,

Abstulerit frustra sonitus, & murmura lingua.

Ergo eris o nobis semper Deus, & tua viuet

Æternum soboles, nullo mutabilis ævo.

R. Callierius.

Vt lacus

*Ut lacus Arcadibus, Pheneum quem patria dixit,
 Ambiguas suspectus aquas effundit in agros:
 Quarum, dum seram pepulere crepuscula lucem,
 Exuccis minimum si quisquam faucibus hausit,
 Fescera turbari, & fluidos pendere lacertos
 Agnoscit, vitæ demolirique prioris
 Robora, nec firmo consistere poplite corpus.
 At contra quicumque sitim orta luce lenarit,
 Illis, & medium cum sol conscenderit orbem:
 Inde valet, fit multo etiam robustior ætas.
 Sic quis ubi abstrusas Græco desiderat artes
 Hippocrate, attonitus, melius nil pectoris haurit
 Quicquam oculis, voluens animo maiora capaci.
 Ni quodcunque latet, Diis acceptissimus aut
 Duretus nostri, sublimi more recludat,
 Augustæ hanc in rem referans oracula mentis.
 Ille etenim vigili perspexit singula cura,
 Vnde nec ingeniis inuestigata priorum,
 Quæque diu latuere, docet, Phæbo, & Ioue digna.
 Quo duce, Diuinam, diui, scrutabitur artem
 Hippocratis, toti fietque salutifer orbi.*

A. de Guinant.

L'honneur qu'auoit acquis ta science profonde,
 Qui te faisoit regner dessus tous les sçauans,
 Souuerain Hippocrat, & qui, depuis tant d'ans,
 Esclairoit de ses rais, tous les coins de ce monde.
 Sans ton docte DURET, qui de pres te seconde,
 Ia ne voleroit plus és bouches des viuans:
 Mais luy plus que ialoux de tes honneurs si grans,
 Les espond de rechef par ceste terre ronde.
 Or vous qui ne voulez ces illustres enfans
 De ce grand HIPPOCRAT auoir pris leur naissance;
 Ores recognoissez quelle est vostre ignorance,
 Et de combien estoient deceus vos iugemens.
 Ia ne vous craindront plus les diuines COAQUES,
 Ny les malins efforts des enuieuses parques.

P. Cousséau.

Εἰς τὸν Λοδωϊκὸν Δούρετον, ἰατρῶν λαμπροτάτον.

ΜΗΚΕΤΙ ἤδη δὲ αἴθερος ἄλλο ἐρήμας,
 Ἄστροι θελοπτότερόν τις βλέπειεν δυνάταϊ·
 Οὕτως Ἱπποκράτεις ἔδει ἐβλεψέ φαιδόν.
 Ἐξ ὄρχης ἰατρὸν λαμπροτέρου μεγάλῃ.
 Ἡλιος αἰεθλὸς λάμπει, καὶ ἀγλαίζεται ἔτις
 Ἐν δρόμῳ ὥς ὥκει μὴ σκοπτεῖν τὸ δέμας.
 Ἡ δὲ ἐπὶ κυρτέον τέφος ἤκαυ' ἐς αἰθέρα εὐρυῶ
 Πτοίη, ἔαυτ' ὥς καὶ πάλιν λαμμένη·
 Ἐνδύξ' ὥς ἐπὶ πολυδρόμῳ ἔκαστα,
 Δογματὰ Ἱπποκράτεις σὺντομία καὶ αὐτοπλή.
 Τίς μὴ ὄντι δρεπόμεν κυρφαῖς δυνάταϊ ἀφοεισμένην,
 Δουρέτην εἰ ψυχῆς μὴ τὸ σκίασμα ἔχῃ.

A. Γηίναιδος.

Primus liber, de febrium symptomatis, paroxysmis, & crisi-
 Secundus, de morbis cum febre aut sine febre exortis intus, partium singularum
 propriis, utriusque sexus communibus. Continet capita xxvi.

De Cephalalgia.	87
De Caro & Comate.	99
De Aurium affectibus.	106
De Parotidibus.	114
De Facie.	120
De oculorum affectibus.	123
De Lingua & reliquis oris partibus.	133
De Voce.	142
De Respiratione.	146
De Cervice.	153
De Hypochondriis.	162
De Dorsi & lumborum affectibus.	187
De Hemorrhagia.	201
De Palpitatione, tremore, convulsione.	219
De Angina.	233
De Pleuritide & peripneumonia.	243
De Phthisi.	308
De Hepaticis.	321
De Hydrope.	327
De Dysenteria.	343
De Lienteria.	351
De morbis Vesicae.	356
De Apoplexia.	365
De Melancholia.	374
De frigore lumborum.	387
De Phymatis.	382
Corollarium. Cautio phlebotomia.	

Tertij libri sunt tractatus quatuor:

1	Pronosticum corporis, omnibus morbis, maximeque superioribus, commune.	406
2	De Tromatis: qui sunt morbi utriusque sexui communes, extrinsecus exorti.	417
	Hunc excipit appendix, quibus morbis quae aetates affecta.	
3	De morbis mulierum propriis.	449
4	De communibus excrementis,	
	{ Vomitu.	
	{ Sudore.	
	{ Urinis.	
	{ Deiectionibus.	

COACARVM



COACARVM HIPPOCRATIS

MAGNI PROGNΩSEΩN

LIBER PRIMVS.

INTERPRETE ET ENAR-

ratore LVDOVICO DVRETO, Segusiano.

*Ad HENRICVM III. Christianissimum,
Gallia & Polonia. Regem.*



*Ἰν ἡρίχειος περφυρόμενοι, κεφαλαλγείες, πρᾶχλον
ὀδυωδέες, ἀφωνοί, ἐφιδρουῶντες, ἐπανελέγκοντες, θνήσκουσι.*

*I Qui ex rigore perfrigent, & unā dolore tum capitis,
tum cervicis impliciti, mox voce capti, paruo sudore ma-
dent, ut se collegerint; moriuntur.*

FVIT illud consilium Hippocratis, vel potius discipulorum eius, qui præceptoris diuitias atque
ornamenta quamplurima posuerunt in hoc amplissimo & augustissimo Medicinæ theatro; pri-
mum symptomata febrium, omniāque quæ in iis apparent & sunt bonis aut malis ægrotantium rebus,
orta de motu & more ipsarum; *ἐπιφασιόμενα & ἐπιφρόμενα* vocant, omnia, inquam, febrium *ἐκρηνα*, the-
rematis explicare; partim definitis, quæ vel catholica, vel hypothetica sunt; partim etiam quæ sitis: quia
febres occupant *πῶς ἐλαμείλω*, i. *ὑπινερίσταιν*. Mox aliorum quoque morborum qui tam intra & in-
tus, quàm foris & extrinsecus, idque cum febre, vel sine febre, in partibus singulis sexus vtriusque ena-
scuntur & stabulantur: omniūq; adeo quæ cernuntur in habitu corporis, in actionibus, ac denique
in excrementis. Magnum certè opus, vel diuinum, credo, cum excellentia præstantiāque operum quæ
docta posteritas de Medicina fecit.

Inter symptomata febrium atque signa quæ vel ex motu veniūt, vel ex more febrium; primus occur-
rit Rigor, omnium, penè dixerim, comes indiuiduus, vel in periodo typica, vel in crisi, vel in erratico pa-
roxysmo typi experte. Ac nullus feracior locus est in Medicina ad incundam *ἀγχωσιν* febrium, quàm de
Rigore. Sed ea rigoris varietas, & quæ cuiusque natura sit atque conditio; siue is periodicè, siue criticè,
siue etiam symptomaticè moueatur, tam scilicet natura duce, quàm dominatu morbi; dicetur in singulis
rerum earū decisionibus quæ in tractatu hoc primo huius diuini operis continentur. Primum hîc rigor
occurrit symptomaticus, omnium, qui sic oriuntur, calamitosa vi pessimus, qui tantum periculo adiicit
periculosi iam morbi, ut cita inde mors veniat. Ratio autem causāque cur ira sit, palam erit in examine.

QVI EX RIGORE] Id est, concussionem totius compaginis, maximè autem partium posticarum
quæ adiacent lumbis, metaphreno, ceruici ad caput; dum scilicet proritantur appulsu cacochymia il-
luc è vasis expressæ, & viam ad exitum affectantis: quem quia tam citò non habet, partes exacti sensus,
ubi subsistit, vellicando lacescit, cum incredibili afflictione caloris viuifici qui est in corde: tum enim
viuificus ille calor intro recurrit, dum cacochymia foras excurrens, & primo appulsu passā repulsā,
concussionem mouet cum frigore partium calore viuifico defraudatarum. Non enim caloris affli-
ctio concussionem infert; sed ipsa concussio afflictionem. Declarat illud, frigus, sine concussionem, par-
tium extimarum, totiusque compaginis, dum prope abest caloris vitalis extinctio; vel est contumax
interceptio. Quinetiam lipyticarum febrium ardentiumque comes est frigus partium extimarum, in-

candefcentibus æstu costis vel hypochondriis : tum enim caloris retractio est foris intro concussio-
 pers. Nam illa rigoris concussio febris ardentis critica , ipsam exoluit, sudore vel hæmorrhagia ; spe-
 rabili antè crisi de signis pèpasmī. Periodicus item rigor intermittentium febrium , discessionem af-
 fert paroxysmi diurni, quem ipse commouit. Scitum est illud , *Quibuscunque per febres , rigor quotidie in-*
cidit, ipsarum quoque diurna discessio est. Quoniam enim bile commota per totam compaginem rigor cie-
 tur, ob eamque causam singulis paroxysmis vacuatur & expurgatur ; consentaneum est vt paroxysmi
 diurni vacuatio sit & intermissio cum febris vacuitate.

Sed tamen rigoris hic positi, alia ratio est atq; conditio : non enim criticus aut periodicus esse po-
 test, qui frustra cietur, & quem frigus excipit partium extimarum, totiusve compaginis; cum incale-
 re potius debuissent, vt in periodo typica tertianarum, & critica continuarum ardentium. De hoc scri-
 pta sententia est : *Si crebro rigor incidit, nec ulla febris discessio est, fractus iam viribus ægri, lethale.*

Ortum porro hic tamen habet è vasis, nō ab vlceribus, quæ altera rigoris occasio numeratur; qua-
 lem ciere profecto solet empyema pleuritidis aut peripneumoniz, qui antè non erat, dum cruda mane-
 bant costarum phymata, aut pulmonum, aliarumve partium : quæ phymata & vlcera nomi-
 nantur, & quorum hic nulla suspicio esse potest : at magna est biliosæ cacochymiz. *Rigores*, inquit
 Galenus, *qui sine ulla parte afflicta sunt ; è lumbis & dorso causas & principia ducunt.*

6. Epid. & 5.
aph.

Hist. 1. 1. Epid.

PERFRIGENT] Non quidem amabili frigore aliosī, qualis exacto paroxysmo ; vel in discessio-
 ne febris critica ; aut etiam læti, mitigato ardore febrili, vt Philisco contigit , qui tertio die diluculo ad
 meridiem visus est fieri ἀνίπρετος, febris expers. Quod sanè πρὸ τοῦ ἀνιπρετέως, quam πῶσθαι potius dici,
 Galenus obseruat in prorrhético; vbi eiusmodi perfrigeratio, cum ardoris reliquæ sub hypochondriis
 latent, insidiosa iudicatur.

protr. 3. 4. 5. 1.

protr. 3. 1. 5. 1.

Sed perfrigent, inquam, frigore pene dixerim glaciali, marmore frigidiores, eò planè adducti, quò
 spectat illa sententia ; Cum ex rigoribus exudante paruo sudore, perfrigeratio est, graue malum. Et si
 Galenus à lectione ἐκ πινός, i. è naribus, loco eius quæ est, ἐκ πρῶν, i. ex rigoribus, adiungendam putauit hæ-
 morrhagiam ; vnde sudores exigui perfrigerationem denunciant : vetus nihilominus huius operis le-
 ctio ἐκ πρῶν habet, auctoritatem quarens ab illo prorrhético, *Αὐτὸ ἐκ πρῶν ἀνιπρετέως μὴ ἀνιπρετέως, κα-*
κόν, i. Quoties à rigore perfrigeratur quis, nec denno incalescit, malo est loco. Sed ista sitne firmiter fixa perfri-

geratio, an verò caloris vicissitudinem habeat ; tum, sitne totius corporis extimarumve partium ; per-
 magni refert intelligere. Epimuerò firmiter fixa perfrigeratio, vbi non denno incalescit qui semel
 perfrigit ; emortui est caloris vtriusque, viuifici & vitalis, ob eamque causam funesta. Sic Galenus ad
 prorrheticum modò adductum *καὶ δὲ τὰς καὶ τὴν πρῶν δυνάμιν.* Altera illa, quæ cum cita caloris vicissitudine
 est ; similiter vt prior, accidit labefactata virtute caloris natiui partium solidarum, quæ non amplius re-
 creantur affluxu è corde viuifici nectaris suauis calentis : sed mox à frigore incandescunt æstu fugaci, de
 conflagrantium viscerum flammæ impulsu ; quæ citò euanescens, partes, vt prius, relinquit marmore
 frigidiores. Talem animaduertit primùm in Pario, mox in puerpera ; Περὶ τῆς, inquit, καὶ τῆς πάλαι ἀνι-
 πρετέως, i. Perfixit, mox rursus incaluit. In prorrhético, *Οὗτοι ἐκ πρῶν ἐκ σφύων, denno incande-*
scunt, malo sunt loco. Vbi Galenus ; ἀνιπρετέως, ἀνιπρετέως ; interpretatur. Sed ista quidem vicissitu-
 do cuiusmodi sit, vnde veniat, & quorsum appareat ; planum faciet enarratio prognōseως, ab hac, trice-
 simæ secundæ. Sed frigoris vel in extremis artubus oborti, vel toto corpore, calamitosior vis est eius
 quod per totum corpus. Nam huius quidem noxa cernitur in emortuo calore natiuo ; illius non semper.
 Atque imprimis distinctio esse debet extremorum : si quidem cum manus & caput propius absint
 à fonte caloris natiui, quàm pedes ; credibile est minùs & seriùs refrigerari, cum adest paupertas vel in-
 terceptio viuifici nectaris : contrà in caloris retractione, quam viscerum inflammatio facit.

Hist. 1. & 2.
sec. 3. 3. Epid.

protr. 3. 1. 5. 1.

ET VNA DOLÒRE TVM CAPITIS, TVM CERVICIS, IMPLICITI] Ponuntur in-
 commoda concussiois irritæ & frustra obortæ à rigore ; tum enim μεταστροφή, i. translationem habet ri-
 gōsifera ipsa bilis, ad diaphragma & caput.

Et quia μεταστροφή quocunque appulerit, morbifica illic est, vbi subsistit ; sanè translatio bilis ad caput,
 vnde non habet exitum, symptōmata illic mouet partis obsessæ propria, morbificique humoris : sunt
 autem cephalalgia & delirium. Est enim ratum illud, quòd humor calidus, qui sursum fertur ad caput,
 vel hæmorrhagiam ciet, vel paraphorica edit symptōmata, & cephalalgica.

Porro autem cum ea sit ratio τῆς ἀρχῆς καὶ τῶν προκινῶν, i. principatū & propaginū ; vt mutuo se affi-
 ciant, mutuasque trādant operas ; valitudine quidem aduersa, in ægri perniciem, vel, vt præceptor lo-
 quitur, συνυπαρξίαν ἐς τὸ κακόν ; capitis quidem sic à bile distenti & proritati sympathia propagatur ad
 partem vicinam & sociam, quæ est medulla ceruicis, & eius membranæ, quarum afflictio acerbissimum
 mouet dolorem, cum pari cephalalgia coniunctum ; quando hic nulla vis incidit in musculosum genus.
 Atque in hoc ceruicis dolore similiter fit vt in illo : *Cervicis afflictio, mala est quidem in omni febre, pessima*
verò is qui sunt in mety insanie.

lib. 1. acut.

protr. 4. 1.
2. lib.

MOX VOCE CAPTI] Hoc fatiscens cerebri multum oppressi proritatique signum est syllogi-
 sticum, ipsiusque adeo spinalis medullæ : sicut substillum sanguinis in comate contumaci, effæto iam
 cerebro, cum scilicet magna oppressio cerebri transit in exolutionem ipsius, & alteratio in alienatio-
 nem. Quod certè funestum est, vniūm docebitur in aphonia hic posita. Enimuerò vt omittam cæ-
 teras aphonia causas ; quæ multæ sunt, & alio loco aphonia dicato à nobis conscrip-
 tas ; certum est hic aphoniam notari, quàm impotentia facit efflandi, marerizque vocalis inopia & paupertas. Impoten-
 tiam parit efflandi, vocalium musculorum exolutio, non autem contractio, qualis in ebriis cernitur vo-
 ce captis atque conuulsis. Exolutio accidit musculorum vocalium, non impertita ipsis facultate, ac spi-
 ritu

aph. 5. lib. 5.

ritu animali, quantum sufficit ad efflandum. Materiz autem vocalis inopia & paupertas sequitur paucitatem spiritus, hoc est aeris inspiratione parua & rara; cuius molitio sic est de cordis calore exiguo, & cuius extinctio est in propinquo: unde spirandi vsu pene collapsio, vt parua & rara est inspiratio, quæ parca manu spiritum ad cor ducit; ita vaporis fumidi, materizque vocalis minima expiratio. Ex quibus efficitur, vt in aphonia descripta nulla sperabilis sit vite salus, defixa firmiter infirmitatis causa, tam in cerebro, quam corde. Et qui cum tali aphonia conualuerit, Hippocrates vidit neminem. Exemplum est in historia de Pythione, cuius quidem breuiario expressa fuit decisio hæc à Scholæ Coæ magistris, vt mox dicetur.

PARVO SVDORE MADENT] *Ἐπιδρωῖς*, i. quibus exudar crebrò sudor exiguus, qui morbum subesse ibi testatur, vbi exudar. Hic autem exudar in capite & ceruice, vnà dolentibus. Primum quidem expressus ab oppressione, postmodum ab effectis partibus sponte sua exudans de succo alibili, quem exolutæ partes nequeunt retinere. Nam *ἰσχυρότης*, i. *sudatiuncula* altera significatio, quæ in madore est totius compaginis, visa est in Pythione, cum ille animam exhalaret.

VT SE COLLEGERINT] i. Cum videantur morbo leuati, & rediisse ad se iterum atque iterum. Quod Pythioni legimus contigisse, quem audiuius, cum ei quo die primum decubuit, ingens rigor obortus esset, cum febre acuta, & idem secundo die factus esset *ἡσυχός, ἄφρων, βεβήχων*, i. *voce pariter atque sermone capius*, *ἢ vnà spiraret parè ἢ rarò*, cum frigore partium extimarum, maximè autem manuum atque capitis, quæ paruo sudore pòst maduerunt; eundem tertio die quietem habuisse, tum quarto etiam, dum sub meridiem iterum factus est sermonis expers & vocis, cum frigore partium extimarum, quæ mox in peius incaluerunt: sed quinto die rursus eundem fecisse opinionem leuationis; vel, vt præceptor scripsit, *ἰσχυρὸν ἀποφθάνειν*. Atque ita cum morbus vires acquireret eundo, & vnà vicissim alternis diebus insidiosa esset leuatio; tandem ad vltima ventum esse vitium collapsarum, & ipsum decimo petiisse perfrigidum, *ἄφρων*, ac diffluentem sudore. Est igitur *ἰπναφίρην*, iterum atque iterum velut resurgere, quod illud *ὅτι* ostendit; sicut in illo *ἐνπρίην*, quod est crebrò rigere. Nam *ἀναφίρην* verbum reperio vsurpatum de iis qui periculo defunguntur, & restituti viuunt. Testis est illa sententia præceptoris, *Τὸν ἀπαγχόμενον, καὶ κατὰ λυγρότητα, μή ποτε πύθεται, ἢ ἀναφίρῃσι, οἳ δὲ ἀφρὸς ἢ ὅτε σῶμα*, i. *Eorum qui strangulando exoluiuntur, nec dum mortui sunt; illi demum ad vitam non redeunt; quibus fuerit circa os spuma. Sed hæc leuatio non est fida, quin potius insidiosa, pestifera; quemadmodum illa etiam Pythionis, quam facit humoris morbifici huc illuc μεταστάσις*. Qualem pleuritici experiuntur, cum in difficili & biliosa anacatharsi, lateris dolor quiescit; non quidem falsò, sed insidiosè, & loco pleuritidis, mortiferam infert peripneumoniam, aut sæuam phrenitidem, cœptis immanibus efferam. Talis angina ratio est, quando relictis faucibus, libertatem adferens deglutiendi, migrat in guttur, siue laryngem, facitque anginam cum orthopnoea & sæui doloris cruciatu, cita morte funestam. Insidiosæ huius leuationis multa exēpla thesaurate illo catholico continentur. Non est fidendum ijs quorum leuatio est sine signis *ἢ causis*; vel, vt loqui solet præceptor, *ἀσήμερος καὶ ἀκρίτως*.

MORIVNTVR] Atque id meritò, si verum est illud Hippocratis, vt certè omnino est, *Τὰ ἐλίσθια ἀσήμερος παρὰ γνήσιον, ἀνίστανται σημάϊν*, i. *Perniciofa, quorum sine signis leuatio est, mortem subesse ostendunt*. Perniciofa enim sine signis mirescunt, vel ob translationem, vel propter effectam vim partium solidarum, ac sensus amissionem, pene emortuo calore nativo. Et cum ad vltima ventum est, natura sui diligens pugnam instaurat, Priami more cum Pyrrho; actum victa concidit atque iacet, collapsis iam omnibus sui præsidiiis. Nec verò id nouum est, naturam tum decertare, cum in propinquo mors est, quando iam verus est illud Galeni, *Αἱ διακίσται τὸ σῶμα δυνάμεις, ἀνίσχουσιν ὑπὸς κατὰ λυγρότητα, σφοδρὰ πρὸς ἐξέρχουσι*. Loquitur autem de pulsu, qui desperatis, animam penè agentibus, non rarò fallit imperitos medendi, quia tum editur maiore appulsu venæ micantis.

aph. 6. lib. 1.

proth. 17. lib. 1.

lib. de prædicendo ex pulsib.

2 Αἱ μετὰ κατὰ ψύξιός δυσφορίαι, κακίσται.

10 Quæ vnà cum frigore sunt dysphoria, pessima.

SYMPTOMATICVM est hoc frigus, vt omnis tollatur critici aut periodici excusatio. De causa eius aliter statuendum quàm fuit in citimo. Est enim retracti caloris viuifici, vel intercepti symptoma. Vt enim partes extimæ tantum habent caloris, quantum viuifici nectaris cuius appulsu calent: sic eo defraudatæ frigent. Defraudantur autem, cum eius caloris retractio est, vel à systrophica viscerum phlegmone; vel à causis; vel etiam à lypyria febre. Ac tum illius frigoris comes est ἡ δυσφορία, i. molestia incredibilis, & anxirudo, quæ cernitur in iacendi habitu inquieto cum ægra difficilique admodum tolerantia symptomatum omnium quæ ab illis febribus, vel à viscerum phlegmone inferuntur. Nam tum efferuntur fastidio & contumacia in eos qui præsto sunt, intus incendio conflagrantes, cum inextinguibili siti, iactatione varia sursum deorsum, dextrorsum & contrà; omnis figuræ, & loci, & situs impatientes: more illorum quos in secunda valetudine tædet subinde rerum earum quæ prius placuerant: quod apud Hippocratem est *ἀνύψιν*, unde & ipsum venit nomen *ἀνύψιν*. Atque hic *ἀνύψιν* propriè est ægrorum, qui sic in omnem partem iactantur, nec vllò consistunt loco: sicut & *ἀσπ*, quam facit Hippocrates duplicem; vnā cum nausea, *ὅταν τὸ σῶμα τῆς γαστρὸς ὑπὸ μυχθρῶν δύνῃται χυμῶν*, i. *cum os ventriculi malè habet à morsu prauorum humorum*; alteram verò, *ὅταν ἡ δυνάμεις ὑπὸ τῷ στόματι βαρύνῃται, ὅτι μηδὲν φέρει*.

aph. 34. lib. 7.

4

ἡμαρ πρῶτος, i. quando facultas à corpore sic grauiatur, vt nullam facillè ferat figuram. De hac prorrheticum illud est, *Οἱ ἀσπιδεῖς ἀνιμέτους παροξυνόμενοι, καὶ ὄνι*. Quoties sine nausea, exacerbatio est cum fastidio, malè res eunt. Vbi Galenus author est, huiusmodi *ἄσπις*, i. fastidium mortiferè ipsos habere quos occupat. Altera autem *ἄσπις*, qua ægri sunt *ταυλιώδεις*, i. *nauseabundi*, legitur in vxore Dromeadi, separatim ab ea quæ dicta est modò fieri *ἀνιμέτους*, quam *ἄσπις* propriè nominauit. Erat enim Dromeadi vxor *ἀσπιδὸς ἡγεύσα*, i. fastidio inquiete afflicta. Hic non est dubium quin illa mulier fastidio esset morosa, siue *ἀσπιδὸς*, de cordis morfu, quam alibi vocat præceptor *ἄσπις πρὸς τὴν καρδίαν*: eandemque *ἄσπις* exerceret, crebra huc illuc corporis artuumque iactatione, omnis figuræ & loci pertasam. De virium oppressione, apud eundem ibidem est, *Περί ῥιπασμῶς, καὶ ὄνι τὰ δεξιὰ, καὶ ὄνι τὰ ἀριστερά*, i. frequens iactatio quæ fit, subinde vertendo se in dextrum & in sinistrum. Omnia autem nomina quibus fastidia cordis & corporis explicantur; *ἄσπις, ἄσπις, ἀσπιδία, ῥιπασμῶς, ἀσπιδιόμοια, βλησισμῶς, μετώρουμος*; omnia, inquam, sub nomine continetur *τῆς δυσφορίας*, non solum in idea symptomatum prædictorum, sed in ipsorum causa; vt siti, dolore, cordis morfu, ardore, dyspnœa, oppressione viscerum, corporis grauitate, & cæteris, quæ molestiam ægris pariunt intolerabilem. Est igitur graue malum *ἡ δυσφορία*, quæ cernitur in acerbissima vi symptomatum prædictorum, ex causis illis, quas posui, enatorum. Sed multò grauior est *ἡ δυσφορία*, quæ illos habet mortiferè, quos inuasit & occupat: vnde sunt etiam *ἡ δυσφορία*: ob eam sanè causam, quòd morbo iam fracti, calamitatem illam fastidii, quo tenentur, parentem, dignè pro merito nequeunt ostentare. Ac tales casus ægrotum siue calamitates verè sunt.

lib. 7. Epidem. in Carade.

10

P E S S I M E, *καύσαι*, i. quibus ad ægri mala vix peius aliquid potest accedere: vel etiam quæ sunt eiusmodi, vt nulla bonorum oppositione vinci se patiantur. Sunt enim quædam *καύσαι*, i. mala in ægris, quæ à bonis vincuntur. Sed illa demum *καύσαι* meritò nominantur, in quibus, *ὅτι μὴ ὑπαρξάντων κακῶν, & ἀσυμβεβηκότων καλῶν*, i. omnia quæ adfunt mala & ab iis absunt bona. Eorum contraria sunt *ἀρίστα*, cum scilicet, *καλὰ ὑπαρξάντων & ἀσυμβεβηκότων κακῶν*; sicut in optimo hypochondrio annotauit Galenus. Æqui bonique consulunt æquales mei Medicinæ studiofi, nomen hic nouè usurparum Latine, analogia dysenterix & cæterorum nominū quæ transferunt in coloniā Latinitatis: quia sunt Latina voce inexplicabilia.

lib. 1. Prog. Nomen scilicet dysphorix.

10

3 Κατὰ ψυχῆς μετὰ σκληρυσμῶ, ὀλέθριον.

Frigus cum rigida cute artubusque, funestum.

10

E S T quoque frigus hoc symptomaticum, signo extincti caloris viuacis, ab exhausto humidi primigenij partium solidarū, quod intulit febris tabifica & *μαρμαρώδης*. Tale est illud frigus iam positum, ex prorrh. *Frigus quod denno non calefcit, pessimè habet ægrum*. Vbi Galenus author est, eo frigore denunciari eximiam paupertatem, & *ἐνύρησις* caloris natiui, quæ ita manet, de non excepto, vel non percepto affluxu viuifici nectaris, quod est in corde iam perexiguum. Est igitur frigus hoc pessimum atque funestum: quando caloris firmiter fixa extinctio, nullam relinquit spem fore vt renouiscat. Extinctionis firmiter fixæ opinionem facit frigoris assiduitas vnà tractabilis cum rigida cute & artubus, quam *σκληρυσμῶν* nominauit. Sic autem videtur examen hac de re conuenienter suscipi.

προτ. 31. C. 1.

C U M R I G I D A C U T E Cum scilicet defraudata succo venarum alibili primū, mox humido primigenio prorsus exhausta, siccitate collapsa obrigit; durior facta & aspera, quæ antea molliter erat solida, succi plena, & læuis. Sic enim ratio comparata est partium, totiusque compaginis; vt cum ma- crescere cœperint, laxa sit cutis, & pallida, de dissipato spiritu, & humore, quibus antea recreabatur, & humescebant. Sed cum ad vltima ventum est *τὴν λεπυσμῶδιν*, i. *habitus imminuti*, tum cutis collapsa tensaque obrigeat, mollitudine omni, læuitatēque sublata, per siccitatem partium solidarum, primigenij sui humidi, iam exhausti, fructu carentium. Atque hic *λεπυσμῶς*, i. *extenuatio*, siue macies ad extremum perducta, nō inchoata, nec pressa leuiter, sed fixa firmiter (vt nulla sit excusatio diarrhææ fugacis, vigiliarum, inedia; quibus exactis, redintegratio facilis esse solet) hæc, inquam, posita extenuatio, causam habet in morbis quidem acutis; febrem tabificam, cuius ardore & *κακὸν δὲ* sanguis, & *ἀδεψ*, & vnà teneræ carnes liquuntur; in cæteris autem qui transierunt in vetustatem *ἐν μέσῳ πώσεως*; cæcum ignem, qui facit *μαρμαρῶν ἀπειργνη*; vnde cum homines plurimū emacuerint, postridie moriuntur eius diei quo nigra deiecerint. Similis quoque ratio est phthysicorum macie confectorum, quam intulit vlcus pulmonis ferinum, siue *πνεύμα*, depascendo quicquid in corde est sanguinis, & aërem inficiendo quem ducimus, cum assidua febre, *μαρμαρώδης*, horrifera. De rigida cute in phthysi & empyemate, multa sunt ex præptore, suo quæque loco à nobis conscripta. Est igitur cutis, vt siccitate dura, sic inæqualitate aspera; cum scilicet cachexia transit in extremum marcorem. Ac sanè cutis huiusmodi nominatur à præptore, *δέρμα σκληρὸν, ὡς πέτρα μένος, καὶ καρφοῖον*, i. *dura, intenta, & arida*.

40

A R T U B V S Q V E Artuum meminisse hic visum est, similiter vt fecit præceptor in illo, *Αἱ συνῆσται τῷ σώματι, καὶ οἱ σκληρυσμοὶ τῶν ἁρτῶν, καὶ αὐτὸς θηλελυμνός, καὶ αἱ κατὰ κράτος τῶν ἁρτῶν, κακὰ*, i. *Cutis intenta, corporis artuumque durities, tam si exolutus sit æger ipse, artuumve distorsio; graue malum*. Sed illa sententia non est solius qualitatis, in corpore frigido, atque duro, tractabilis; quemadmodum hæc prognosis: verumeriam actionis deprauatæ, aut perditæ, in decumbendi, vel in iacendi habitu, aspeçtabilis. Est enim decumbendi actio deprauata, *ὅτι τῇ κατὰ κράτος τῶν ἁρτῶν*, i. *in artuum distorsione*: cum scilicet decumbendo in dorsum, vt refert præceptor, artuum est indecora compositio; vel contractorum; vel implexorum; vel etiam

lib. 1. Prog. & lib. 5. Aphor. lib. 6. Epid. p. 1.

60

lib. 1. Prog.

vel etiam, præ fastidio, huc illuc proiecitur: atque id contra consuetudinem decumbentis. In hoc iacendi habitu, nulla vis lacer animalitatis, propter eaque iacendi nulla est actio: quæ tamen non tollitur de gravitate *ἀνεπιμένει*, i. portati corporis, verum de summa infirmitate, ac, pene dixerim, *ἀδυναμία* *τῆς φέρουσας*, i. impotentia facultatis portantis. Ac tantum interest inter naturalem habitum decumbendi, & hunc iacendi; quantum inter anem glan de traiectam, quæ ruit; & eam quæ sua sponte deuolat è sublimi, præteritis pennis præcepit in terram. Decumbendi habitus naturaliter constitutus apparet, dum quis decumbit molliter in latus alterutrum, modicæque sunt illi artus reflexi. Iacendi autem miserrima eius conditio est, qui & supinus iacet membris collapsis, ac sine potentia se conuertendi; & qui subinde ad pedes delabatur. Nota sunt verba; *καθότις, καίτοις, ἐπὶ πρὸς*.

FVN ESTVM.] Quia tum nulla salus vitæ sperabilis esse potest quando collapsa sunt animalitatis & vitæ præsidia, tum in cerebro, tum in corde: quorum efficta vis deprehenditur; illius quidem, in motus amissione; huius verò in extinctione vtriusque caloris, viuifici, & viuacis: cum fixa firmiter infirmitatis causa iam explicata.

*Mira Latinitas, de
pohis Spetari poh
2, Spetabilis, 12*

4 *Ἐκ κατὰ φύξιος, φόβος καὶ ἀθυμία ἀλγος, ἐς ἀπασμὸν ὑποτελθίᾳ.*

Ex frigore, cum adest metus et mæror immerito, conuulsione finis fit.

SYMPTOMATA frigoris hic ponuntur in principatu animi: quemadmodum modò vidimus in deprauato corporis artuumque motu à cerebro. Etenim metus infractio est animi propter expectationem mali futuri. Mæror autem, fatalis quædam & inexpugnabilis tristitia. Vtrumque fit contractione spirituum, vel potiùs *συδονευμῶν* ad sua principia; aut ipsorum principiorum infectione, vt laniæ albæ venenò fucatæ Assyriò. Sed ea contractio spirituum, fit à re non conuenienti, quo iure quaque iniuria, animo representata. Infectio autem, ab intemperie primùm concepra, quæ malignam continenter gignit cacochymiam; vel à translatione symptomatologica humoris morbifici, exitum non habentis. Ergo si ex frigore, per caloris natiui collectionem, aut interceptionem; non autem per illius *ἐκκρῶσιν* (nam tale frigus esset funestum) Si igitur ex illo frigore, metus & mæror abs re incidit, quæ duo sym-

promata, melancholiæ sunt propria; palam est ipsa per conuulsionem exitum habitura: nisi hæmorrhoidibus, varicibus, aut etiam menstruali profluuiò, conuulsione causa tollatur. Quod accidisse legimus Thasiæ, quam, naturâ, *δυσάσιν*, i. morosâ, fuisse narrat Hippocrates. Sed ad naturæ illius habitum, tristitiæ adiuncta confirmatio, ipsam planè reddidit melancholicam. Et cum iam aliquot menses, in ea tristitia *ὀρθοσάδων*, i. *susque deque exegisset*; post diurnam morbificæ causæ generationem, statim oborta febre à φόβῳ καὶ ἀδυνμίᾳ, i. metu & infractio animi, crebrò conuulsa est, fuitque symptomatum cataphoricorū & conuulsionum crebra vicissitudo. Sed tamen eo morbo defuncta est, liberali sudore, & menstruorum profluuiò. Quod autem conuulsio sit melancholiæ foboles, declarat aphorismus ille, *melancholici sunt epileptici*: tum ille qui scriptus legitur 56. lib. 6. *En qui sunt melancholicus metuendi abscessus; aut enim apoplexiam corporis (i. paraplegiam) aut conuulsionem, aut maniam, aut cecitatem minantur.* At si principiorum infectio, tum à translatione symptomatologica, tum à primigenia intemperie post diurnam alterationem, ipsis alienationem induxerit; conuulsio quæ inde venit, neque liberali excretionem, vt in muliere Thasia, neque *ἀντὶρρόπῳ*, i. *rependente abscessu*, vt in Herophôte, ullam curationem recipit: quod à priuatione habitus denuo comparari non possit. Scitum est illud, *Qui à melancholia è potestate mentis exeunt, illi si superueniat tremor; proculdubio moriuntur.* Et, Phrenitici, sputatores, fanatici, etiâ tremeuli?

*Hist. n. scd. 3,
lib. 3. Epid.*

*aphor. 44.
scd. 3. lib. 6.
Epidem.*

5 *Ἐκ κατὰ φύξιος, ἔργον ὑπολήψεις, κάκιστον.*

Ex frigore pestifera est urina suppressio.

VRINÆ suppressio, vesicæ propria est. Quia non antè serum illud eorum qui sunt in venis humorum, urinae nomen habet; quàm ad vesicam venerit, in eaque stabulari cœperit. Sed *κατὰ χεστήν* tamen pertinet etiam ad partes vnde manat, per quas secernitur, & in vesicam illabatur. Ac talis urinae suppressio vesicæ vacua, vt sæpenumero partes illas in vitio esse denunciat; ita non rarò spem adfert secundi iudicij in morbis acutis. Notissima est peritis medicis illa sententia, *Ante rigorem suppressio est urina, si quidem è bonis ducatur.* Hic autem commemorata urinae suppressio in bonis duci non potest, quia ex bonis nō venit. Bona autem dicuntur symptomata perturbationis criticæ, iam antè significata signis quæ apparent ad tempus: vt illa ad speciem crisis. Atqui perfrigeratio symptomatologica non potest, bonis ægri rebus, ischuriæ prænuncia esse: sicut ischuria, rigoris, indeque sudoris. Non enim signa critica, & causæ criticæ retro commeant ad significandum. Ac ne longum faciam, quemadmodum ischuria, quæ loco venit, præclare apparet ad salutiferum rigorem, atque sudorem: sic è conuerso, quæ à rigore & sudore incidit ischuria, salutaria esse non potest. Ergo pestifera est omnis, quæ à frigore incidit, urinae suppressio. Et verò frigoris huius noxa, potissimum vesicæ, quia est *ἀναιμος καὶ ἀσάρκος*, i. sanguinis & carnis expers, calamitosa est: vnde efficitur vt labefactata vi expultrice, non possit urina excerni, vel stu-

*p. 10. l. 1. 6.
Epidem.*

pefacto sensu, rei molestæ, hoc est vrinæ, sensus non exciteretur. Iam verò cum ipsa suppressio refluente & anadrome malefica sit, ad illam maleficentiam illud accedit etiam, quòd ipsa vesica, tum interceptione officij, tum sympathia partium quarum potentia corpus administratur, homini necando satis sit. Adde quòd illa perfrigeratio veniat à febris ardore, maximèque in vesica, omnium partium frigidissima, percipiat; proptereaque sit insanabilis, ob eam sanè causam, quòd omnis intemperies frigida, caloris vi nata, salutis desperationem adferat.

6 Μετὰ ρίγος ἀγνοία κακὸν· κακὸν δὲ καὶ λήθη.

Quæ à rigore incidit ignoratio mala est: obliuio item mala.

IGNORATIO, phantasia est abolitio: vt ἀγνοία, ipsius iudicij. Sed ipsum iudicium, ὅς τὸ ἡγεμονικόν, i. velut princeps & prætor quidam, audiri non potest ἐν τῇ ἀγνοίᾳ, quæ nihil aliud est, quàm agnitionis priuatio. Quemadmodum & obliuio, rerum gestarum abolita recordatio. Vtrumque symptoma fit ab intemperie frigida cerebri, quam rigor inuexit. Ex quo efficitur alienum esse malum: vtrumque verò pessimum, si leuiter pressum nō fuerit ad exigui prædicationem temporis: sed firmiter fixum ad diuturnitatem. Etenim, quòd plures cerebri mansiones labefactantur, eò res ægri peiore sunt loco. Sic obliuiosus fuit Apollonius, qui ex quo decubuit, rerum omnium fuit immemor. Ac talem obliuionem funestam Hippocrates obseruauit in tempestate pestifera. Sic enim ait; ὡς τὸ παροξυσμὸν ἐν τῇ ἐκκρίσει παύσεται, καὶ ἀφροσύνη, καὶ ἀφασία, i. obliuio, exolutio, vocis carentia. Iam verò, in excretionē iniussa, quæ antea sponte ægri fiebat, miseranda cernitur vis horum symptomatum. Etenim duplex omnis iniussa excretio est, vna quidem sine sensu, altera sine voluntate: ἢ ὅτι τὸ αἰσθητικὸν ἢ τὸ μυστικὸν ὡς ἐκκρισις γίνεται· ἢ ὅτι τὸ πρὸς τὸν ἡγεμονικὸν νοσεῖν. In Dealcis vxore, quæ toto morbi tempore αἰσθητικῶς εἶχε παύσεται: sine voluntate fuit. Quæ de re legimus aphor. 28. p. 1. prioris prorrh. Τὰ ὑρῆματα μὴ ὑπομνησάτων, ὀλέθρια, ὡς ἐκκρίσεις ἀμνηστίας, funduntur ὑρῆματα, pestifera. Ad eam autem quæ sine sensu, pertinet prorrh. 46. p. 2. 1. prorrh. Ἀπὸ κοιλίας λεγὶται διέναι μὴ αἰσθητικῶς, καὶ ἐόντι παρ' ἐαυτοῦ, καὶ ὅτι ἡπατικῶς, i. Liquida ferri ex aluo non sentienti, quamuis apud se sit, pestiferum: vt Hepatico.

7 Τὰ καυματώδεια ρίγεια ὑπὸ π ὀλέθρια, καὶ τὸ φλογῶδες ἐν πρῶτῳ μετ' ἰδρώτος ἐν τέτοις κακὸν· ὅτι τέτοις ἡ ψύξις τῶν ὀπίσθεν, αἰσθητικὸν ὅτι καλεῖται.

Causorum rigores stata quadamtenus lege fiunt funesti, tum rutila cum sudore facies, in his malum: quinetiam posteriorum frigus est conuulsificum.

SEQUITUR vt patefacta iniuria rigoris symptomati, qui translatione humoris morbifici, naturæ auxilia labefactat per intemperiem hecticam, & complexionis effertam vim (quorum διαταραχή spectauit Coacarum primæ & sextæ, quæ spem salutis præcidebant.) Sequitur, inquam, vt de illo rigore dicendum sit, qui pro varia temporum in quæ incidit, ratione; tum etiam pro crisi ipsius quam molitur, conditione; in modò secundi, modò sinistri iudicij est: vel ad interitum, vel ad salutem. Enimverò, rigor proprium est causi κρίσις, i. indicatorium; ac sanè secundi existit iudicij, si iure & loco appareat: iure quidem, si causus venerit ἐκ τῆς κόπης, i. à lassitudine. Quæ de re illud scripsit Hippocrates, Febres, quæ iure ad fortes rigores, non mitescent: sed ante vigorem, suppressio venit vrinæ, ducta ex bonis. Atque hæc ferè in eas cadunt, quas labor accendit. Ac si diceret. Qui à lassitudine causi nascuntur, ferè illi sudore quiescunt, quem rigor denunciat: quoniam tales causi gignuntur quando venulæ exhaustæ, biliosos ad se rapiunt & acres ichæres. Est igitur consentaneum, vt in sanabili causo, bilis quæ stabulatur in venis, exitum habeat intus foras; quæ dum celeriter fertur, sensationem excitet suæ feritatis & acrimonie in partibus exquisito sensu præditis; eaque sensio rigorem excitet, concussionem scilicet partium stimularum ad exclusionem rei molestæ. Relatum iam est illud, ὅτι occupatur febre ardente, superueniente rigore, exoluitur. Sed quoniam quæ iure fiunt ex morbi ipsius idea & ἔργου, conuenienter non fiunt, nec ad salutem apparent, si loco non veniant; ad eam sanè πέρας, i. rationis conclusionem, præsentem hanc prognosin examinandam proponit. Tamen, inquit, febrium ardentium, quæ à lassitudine exarserunt, rigor est indicatorius bonus, proptereaque spei ac salutis plenus: tamen nisi loco appareat, ex illo ruit spes medici, ac sublapsa retro refertur. Sunt enim rigores febrium ardentium, siue causorum, ὑπὸ π, hoc est, certa quadam lege, funesti. Sed explicandum quale sit illud ὑπὸ π. Est igitur tale. Primum, si rigor ἐμπέσῃ, hoc est crebro incidat, cum semel tantum incidere debeat: deinde si febris finem non adferat; cuiusmodi est rigor, qui antè significatus non fuit vrinæ pepasmo, ad tempus; & vrinæ suppressione, ad speciem ipsam crisis: tum si vires effertæ langueant, quæ sunt eiusmodi, vt neque ipsius rigoris frustra oborti concussionem

X lionem perferte possint, neque ad vacationem liberalem sufficere. Nulla enim vacuatio, quantumvis critica, potest esse salutaris, ubi vires effertur languent. Hinc aphorismus, si crebro rigor cietur, nulla speabili discessione febris, et fractus iam viribus agri, funestum. Ergo rigores febrium ardentium *χρῆσις* non indicabunt, si frustra ciantur. Quia prestat naturam feriari, quam aliquid moliri frustra. Et, quicquid cietur, quod non excluditur, accessionem adiungit oppressionis. Quinetiam in omni rigore frustra citato, translatio fieri solet materię ad diaphragma & caput. Cuius translationis signum est, rutila cum sudore facies, quę hęc magnopere molestā est: quoniam pars obsessa totius materię non est capax, metumque adfert delirij, convulsionis, aut ipsarum parotidum. Deinde illa *ἐπίδροσις*, i. sudatiumcula terzifica est; quia ubi sudor, ibi morbus: & nihil paucum est criticum: sed & ipsam morbi malignam ca-
cochymiam ostendit. Quinetiam posteriorum frigus est convulsificum, per aphorismum 65. lib. 5.

8 Αἱ ἐν ὥτῃ φρένας πικναι, καὶ ὀξείως μεταπίπτουσι, δύσφοροι· ὅ-
τε γὰρ ἀπὸ λήθης ἐπὶ δυνον σημαίνονται· καὶ ἐφιδροῦν τέ τοις κακίον.

Crebri ex lumbis horrores cum cita calor vicissitudine, calamitosi.
Nam acerbissima urina suppressio denunciatur. Atque his exudare
pestiferum.

Præterea disadasse pessimum

RIGORIFERÆ omnis causę sensio primū excitatur in lumbis, indeque per dorsum ad caput viam affectat. Etenim rigor omnis cum frigore manifesto cietur. Atqui posteriora sunt non solum ad excipiendum frigus, ut frigeant, sed etiam ad sentiendum, aptiora. Est enim ratum & persuasum omni-
bus, quod omnis pars intemperata similem intemperiem facilius excipit atque percipit; quā tempe-
rata contrariā. Posteriora autem nervosiora sunt anterioribus, idēque frigidiora. Quod sanē si verum de omni rigore est; de eo præsertim cuius materia intra dorsum continetur; cuiusmodi hęc proponi-
tur: & qualem ut indicaret, *ἐν ὥτῃ*, dicere maluit, quā, *ἐν ὥτῃ*: primum sic indicans motionis initium, quę aliunde non reperatur. Est igitur consentaneum, ut crebri ex lumbis horrores, ideo symptomati-
ci esse putentur, quod partis ipsius vitio enascantur, ubi & unde ciantur. Est enim horror symptomaticus empyematis. Ac prava quidem affectio, cuius symptomata sunt crebri isti ex lumbis horrores, est inflā-
matio spinalis medullę & membranarum eius; authore Galeno, comment. ad prorrh. 45. p. 2. lib. 2. prorrh. Atque ideo cita calor & frigoris vicissitudine, sunt calamitosi: quoniam calor vi contra na-
turam exardet; natiui autem calor paupertate refrigerantur: quemadmodum fit in repentina & ci-
ta partium extimarum in vtrumque mutatione. Quod autem cita hæc vicissitudo pariat urina suppressi-
onem, perspicuum fit ex aphor. 5. huius libri: ubi de illius maleficientia iam diximus.

HIS EXUDARE PESSIMUM. Nam illa *ἐπίδροσις* signum est empyematis, cum summā virium infirmitate coniuncti: ex eo quod deductum alimentum elabatur. Quibuscunque diaphragmate interiūs enascitur gibber, hęc renum & vesicę morbi contingunt multi. Quę omnia per sympathiam fiunt, per quam
afficiuntur omnium prima, quę vicina sunt, & quę generis eiusdem.

9 Ρίγος ἐν σίῳ χειρῶν, τῶ σώματος ἀδενέος ἢ δὴ ἐόντος, θανάσιμος.

Frequēs, in febris assiduitate, rigor fractis iā viribus agri; pestiferus.

mortem perhndet

HUNC aphorismum ita vertendum duxi, ex perspicientia τῆς ἀδενείας, potius quā ex verborum aucupio. Quod enim hoc loco scripsit *ρίγος ἐν σίῳ χειρῶν*, idem mihi omnino complecti videtur, quod pluribus annotavit aphorismo 46. lib. 4. cum ait, *Ἡ ρίγος ἐμπίπῃ ποτε μὴ ἀγλαίῳ*; i. Rigor in febrem minime intermittentem si incidit. Nam sanē illud, *ἐμπίπῃ*, frequentem rigoris insultum significat: quemad-
modum & aphorif. 75. lib. 4. verbum, *Οὐδέτις πῶς ἢ αἷμα*, i. sanguinem aut pus meiat, certam quandam affe-
ctionem denunciat, qua quis aut sanguinem, aut pus meicendi finem non facit. Enimvero multum in-
terest, dicāsne rigorem incidere, an incidisse: quemadmodum, & pus meiere, an minxisse. Illa perpetuū, aut frequentem rigendi & meicendi actum designant: hæc cessationem indicant. Pertinet igitur ad ini-
micam vim rigoris, ipsa rigendi frequentia: cuius iniuria augetur, si non quiescat febris. Itaque talis ri-
gor in malis ducendus, quod pessimi signi opinionem faciat: cuiusmodi esse solent τὰ *κρίσιμα* μὴ *κρίσιμα*, i. indicatoria non indicantia. Quod si ad symptomatis acerbiteriam hæc accesserit summa virium infirmitas; pessimæ ibi causę rationem habebit. Nam siue excretio rigorem sequatur, hæc sanē in febris assiduita-
te & virium infirmitate laudari non potest. Quemadmodum enim quibus intercepta aliis tantum
aggrē ducitur parvis & nigris, velut caprarum, globulis; hi neque hæmorrhagiam, neque aliam excre-
tionem, abscessumve criticum toleranter ferunt, quod ab exhausto laborent, superstitē illius exhausti
causā, quod globuli nigri declarant: sic neque ij quibus in febris assiduitate vires effertur languent, suo
commodo vllum excretionis genus, quamvis alioqui criticum, excipere possunt. Sin autem rigor fru-
stra fit, nec vllam excretionem promouet; quassationem illius diu vires, iam fractę non perferant. Erit

igitur hic rigor planè symptomaticus, ut signum & causa, propterea; lethalis. Quoties enim ad morbum instantem & symptoma, adiungit se virium infirmitas; nulla salus viræ videri potest sperabilis.

10. Οἱ πυκνὰ ἑφιδρουῦντες, καὶ ὑπὲρ ῥιζόντες, ὀλέθριον· καὶ ἐπὶ τε λῆθῳ ἀναφαίνονται ἐμπύματα ἐχοντες, καὶ κοιλίας τετραχῶδεις.

Sudatiuncula & rigoris crebra vicissitudo, funesta. Sic enim tandem conceptum empyema ostendent cum alio turbata.

QuANDO sudatiuncula & rigor, vel horror, crebro se mutuo excipiunt; sic malo res aegroti sunt loco, ut in angusto spes sit. Etenim post sudatiunculam perhorrescere nemo potest, è valis; siquidem cita sit illius sudoris; atque horrois, vel rigoris vicissitudo: quoniam vanescit materia rigorifera per eum sudorem, quo vel in capite & thorace, vel toto corpore, subrosidus fuit æger. Id enim significat ἡ ἐπίδρωσις. Ex quo efficitur, illa duo, subsudare & perhorrescere, planè videri αὐτῶν, si ex vasorum cacochymia, horrois causa duci putetur. Ergo talis horror, aut rigor, neutiquam periodicus, aut criticus potest haberi. Atque empyemata quidem cum internarum partium omnium, tum verò maxime thoracis atque pulmonum, primum rigore & noua febre oborta denunciantur: quoniam puris acrimonia vellicantur & eroduntur partes, quæ sunt vicinæ atque communes obsessæ. Sequitur & ipsum rigorem sudatiuncula vicissim, & crebro exudans, facultatis infirmitate, ob quam succi alibilis dissipatio fit. Et quoniam crebra est illa sudatiuncula, vel potius assidua, scripsit ἰδρώτας πολλοὺς, i. sudores multos, in Prognostico: quemadmodum in Epidemiis, ὕδατα πολλὰ, i. pluuias minutulas, quæ continenter descendunt. Nam tale profluvium omnino funestum est, ut signum & causa; si alui adsit turbatio. Quoniam cum à summa virium infirmitate nascatur; eius quoque infirmitatis accessione adiungit. At quod plures facultates labefactantur; eò res ægri peiorè sunt loco. Vide aphorismos 12 & 14, lib. 5.

11. Τὰ ἐκ νώτου ῥίγητα δυσφορέτερα· ὅς δ' αὖ ἐπὶ τῇ δεκάτῃ ῥιζῶσας, τετάρτῃ καὶ εἰκοστῇ ὑπὲρ ῥιζοῖ, δύσκολον.

Rigorum ex dorso vis, quàm aliorum grauior. Quòd si quis decimo-septimo, itémque vicesimoquarto ita riguerit, contumaciam morbi denunciat.

Hoc spectat ista prognosis, ut intelligamus pestiferos quidem esse dorso rigores, ductos ab empyemate; ex mente octauæ quæ præcessit: sed eorum lethaliorem vim esse, si, cum decimoseptimo die uierint, vicesimoquarto affligant. Etenim illis temporibus, diuturnitate & vehementia morbi, vires effortæ languent, ut neque rigoris acerbiter, si frustra fiat; neque excretionem, si consequatur, suo commodo ferre possint. Adde quòd omnis mutatio, omnisque adeo πωτίσιμος, qui cadit in vicesimum quartum diem, potius à putredinis diffusionem, quàm à conflictu nature & morbi accidere videatur. Ceterum illud δύσκολον, ἡπιότερον hoc loco scriptum est. Detrimentum enim leue significat, quod sanè hic magnum est.

12. Οἱ φρενώδεις, κεφαλαλγικοὶ, ἑφιδρουῦντες, κακοηδέες.

Qui una cum morbo horrifero, cephalalgia torquentur; his pessimè caput exudat.

Hoc loco designari videntur qui hemitritæ febre laborant: quemadmodum & febres ipsæ dicuntur φρενώδεις. Quoniam iis qui sic affecti sunt, rigores erratici, & incerti contingunt, & alteram partem periodici paroxysmi in horrois molestia exigunt, αἱ φρεναὶ ἀέκτως καὶ κελευσθέντως γέγονται. Nec desunt aliz rationes, quæ huius sententiæ opinionem faciant. Primum, quòd hæc morborum acutorum prognostica sunt; deinde quòd hanc sudatiunculam acutis accommodauit. Huc accedit quòd proximo aphorismo, οἱ φρενώδεις nominat eosdè, quos prom. 23. p. 2. i. morbo acuto correptos esse scribit.

13 Οἱ φεικώδεις ἐφιδροῦντες πολλῶ, δύσκολοι.

In febre horrida, qui saepe & multum, sudore diffluunt, miserandi.

EANDEM sententiam his verbis expressit prorrh. 23. p. 2. r. Sudoris frequentia & vberitas, quæ cum acutis febribus commouetur, periculi locum subesse ostendit. Quod autem πολλῶ, vel illic πολλῇ legitur; consultò verti, sæpe & multum. Nam, ut rectè annotauit Galenus, sæpenumero qui in morbis acutis continenter sudant, sed modicè, diu ægrotant illi quidem, sed non propterea moriuntur. At si crebrò magnam sudoris copiam illi profundant, palam est non multò post, eorum virtutem resolutum iri. Quæ cum ita sint, perspicuum est, illud φεικώδεις, ad morbos acutos potissimum pertinere. Notanda est etiam huius loci πεπρωσις, i. demissio, in illo δύσκολοι: quemadmodum & superioris Coacæ in illo, κακώδεις.

14 Τὰ πολλὰ νωθρόδεα ρίγη, κακώδεα.

Qui crebrò cientur veternosi rigores, funesti.

P I R E A νωθρόδεα sunt, qui coniunctam habent τὴν νωθρότητα, quæ cernitur ἐν τῇ ἀφύσῃ καὶ λήθῃ, i. in torpore & plumbea affectione corporis atque mentis: unde ægroti delabuntur ad pedes; nec vllò modo sunt alacres, sed contrà pigri in assurgendo: nec eos, quibus olim familiaritèr vtebantur, agnoscunt: quibus accedit inexpugnabilis κατὰφοσις, i. inclinatio veternosa, ut vigilare non possint. Quales fuisse legimus eos, qui in tempestare pestifera, ardentè febricitabant; quibus, ineunte paroxysmo, aderat cōmemorata ἀφύσις, λήθη, καὶ ἀφωνία. Ex quorū obseruatione scripta est iam explicata perceptio Coacæ. Ignoratio cum rigore, mala; obliuio item mala. Verum istius νωθρότης siue torporis veternosi, cum vna sit eademque ἐστὶ seu domicilium, nempe cerebri vis effræta, vel impedita; vtriusque causæ ratio sic ineunda. Nam ineunte morbo, impeditur cerebrum ex nimia morbifici humoris abundantia, quæ vel in crebrò localem habuit generationem; vel eò cursum inflexit: unde, madefacto neruorum principio, toti corpori lentitudo & segnicies quædam accidit. Qualem agnouit summus præceptor, quæ venit à tempestate Austrina; quando scilicet diu multumque illius dominatu cœlum tenetur. *Austri sunt graues auditui, caliginosi, caput grauantes, cum vniuersi corporis artuumque segnicie & exolutione.* Νότοι βαρυκοί, ἀχλυνώδεις, καρβεαεκοί, δαλυτικοί, νωθροί, &c. Sed languor cerebri venit ab exhausto, per alienationem ipsius cerebri, quam alteratio diuturna inuexit. Atque illius causæ documentum extat notabile prorrh. 13. p. 1. r. Phreniticis alba deiectio, græue malum: An verò iisdem segnicies incidit? Sed ei periculo multum, rigoris accessione, adiicitur. Quem locum enarrans Galenus; Commune, inquit, est segniciei cuiusque, nasci à crassis, frigidis, & glutinosis humoribus. Non autem tenuibus, calidis, & acrioribus: cuiusmodi est flaua bilis. Nisi forte incidat cum in propinquo mors est; ut iam emortua facultate quiescere videantur. Tum enim per emortuam facultatem, non autem vitio humoris contingit. Ac tales qui ea segnicie occupantur, non potest vllò modo seruari. Est autem commune symptoma eorum omnium qui ex immodica intemperie moriuntur. Iam verò siue ab oppressione glutinosi & crudi humoris atque frigidi & contumacis, torpor veternosus existat, palam est à rigore symptomatice excuti non posse (quia in crudo humore nulla crisis sperabilis) sed contrà, rigoris crebra concussione, malis cumulari: quoniam ad oppressionem nobilissimæ partis, accedit perennis morbifici humoris translatio. Sin autem per νέκρωσιν, i. morticinium facultatis animalis, torpor adsit; mortem in propinquo esse denunciat. Sed & celeritè opinione moriuntur, quibus cum tali torpore, crebrò rigores cientur: quoniam ea concussione vires deiectæ ad exitum præcipitantur. Quod superest ad explicationem; repetenda sunt ea, quæ scripsit Galenus ad sententiam illam penultimā, p. 1. prioris prorrh. Quæ ex rigore venit segnicies, hominem apud se non esse ostendit.

15 Οἷσιν ἐκπαύοισι ρίγη γίνεται, δύσκειλον.

Qui sextum morbi diem agentibus sunt rigores, iudicij sunt plane sinistri.

PER MAGNI interest quo die, quæve periodo, quid fiat in ægris, atque appareat. Ut enim quæ sunt omnia, quæque apparent diebus criticis, firmiora sunt quàm quæ in alia incidunt morbi tempora: sic ea quæ speciem boni præ se ferunt, debent haberi suspecta, si loco non fiant: quemadmodum & ea quæ mala esse putantur, mirificos adferunt sanitatis fructus, si antè significata, criscens lege, veniant illis diebus quibus certamen naturæ & morbi est in procinctu. Quoniam autem rigor omnis criticus excitatur repentina & citata bilis flauæ exclusione è vasis in partes exquisito sensu præditas; consentaneum est ut virtute naturæ suscipiatur illa tam cita exclusio. Atque ut conuenienter id fiat, victricis naturæ, triumphatiquè morbi per ipsum παρασμόν, i. mitigationem, signa ut prius appareant, necesse est: quoniam neque in cruditate vlla crisis bona sperabilis, neque salutariter fieri quicquam potest, quod antè

significatum non fuerit signis, quæ apparent ad tempus, & ad speciem ipsam crisis. Quæ cum ita sint, perspicuum est, neque icterum, neque rigorem, bonis ægri rebus incidere posse ante septimum diem: propterea quodd, vt ante quartum diem, nulla pepasini significatio: sic ante septimum, nulla bilis flauæ exclusio salutaris. Scitum est illud Galeni, *Bilem effundi, celerius die septimo, ad crism non potis est*. Itaque rigor Diomeadæ vxori, icterus Hermocrati, sexto die fuit funestus. Attamen virgo Larissæa morbo defuncta est, cum sexto die perhorruisset. Sed illud beneficio apponi debet quodd menstrualis tum fuerit: sicut Hermogeni, qui sexto die ictericus, liberali profluuiio alui, ab interitu vindicatus fuit.

16 Οκόσοις Φείχαι πυκνὰ ὑγαινολοι, οὔτοι δὲ αἱμαλὸς ῥύσιος ἐκπυή-
σκονται.

*Quibuscumque morbo defunctis horrores crebrò cientur, iis pro hæ-
morrhagia sit empyema.*

ΤΡΙΑΙΝΟΝΤΑΣ hoc loco significari arbitror eos qui morbo defuncti sunt, quorum antea spes in angusto erat; vt esse solet in abscessibus earum partium quarum potentia corpus administratur. Solenne est illud, *Οἱ ὑγινῶς ἔχοντες τὰ σώματα, ἐν τῇσι φαρμακείῃσι καθαρόμενοι, ἐκλύονται*, i. *Quibus salubre est corpus, morbo defunctis, si purgentur, facile exoluitur*. Vbi τῶς ὑγινῶς ἔχοντες intelligit, eos qui nuper à morbo conualuerunt, & qui restituta vtuntur valetudine, non primitiua. Primitiua verò vtuntur, de quibus proximè ita scripsit; *Οἱ εὖ τὰ σώματα ἔχοντες, φαρμακεύεσθαι ἐργάζεσθαι*, i. *Qui bene valent corpore, laboriosa est illis purgatio*. Cuius aphorismi veritas, cum sensu communi facillimè percipiat, pertinet ad superioris demonstrationem: argumento ducto à maiori, vt vocant, ad minus.

Hoc spectat igitur hæc prognosis, vt animo complectamur eos qui abscessus periculo sine sanguinis profusione defuncti sunt, pro ea empyema experiri. Etenim, verbi gratia, si cui sit hypochondrium tumore dolorifico ac duro obsessum, pessimè habebit; tum propter ipsius doloris acerbiteriam, quæ maximè facit corpus infirmum; tum propter obsidionem partis cuius officio vita carere nequit: vt interim vicinarum partium contagionem præteream, quæ vt communes & propinquæ, primum, & maximè affici solent. Ergo non est dubiū quin deterrimè affectus sit talis æger; ac magis metu nos terreat, quàm spe salutis confoletur. Quodd si quæ salus vitæ expectanda esse videatur; hæc sanè in primæ periodi hæmorrhagia debet esse, maximè verò in iuuenibus. Sin autem nulla medici votis hæmorrhagia responderit, nec tamen doloris acerbitas, actionumque ad vitam tuendam necessariarum interceptio, ægrum iuuenem morti dederit; reliquum erit, vt si, exactis viginti diebus, tumor non cessarit, neque quieuerit, in empyema mutetur & conuertatur. Ac empyematis quidem certissima sunt, horrores, πυκνίαι; quorum scilicet partes vbi fiunt, causæ existunt: quemadmodum Coaca II. demonstratum est.

17 Τὸ Φεικῶδες ἐν τῷ δύσπνοῳ ἐν τοῖσι πόνοις, σημεῖα φθινώδεια.

Dolores horriferi, cum suspirioso anhelitu, signa sunt tabis.

ΣΗΜΕΙΑ φθινώδεια hoc loco dicuntur, quæ sunt φθίνουσας propria. Est autem φθίνουσας, vlcus pulmonum, quo emacrescunt homines, tum à consumptione sanguinis; tum ab aëris, quem spirando ducimus, tabifica qualitate, quam in pulmonibus exulceratis acquirit, dum illac ducitur ad cor, temperandi causa calorem natium qui in sinistro cordis ventriculo continetur. Hæc cum duplex sit apud Hippocratem, vna quidem primitiua, altera superueniens (atque primitiua quidem per ἀπὸ πύρεος καὶ ῥήξεως, i. *erosionem & ruptionem*, vt accidat; tractatu ei rei dicato explicabitur) superuenientem hîc designat: de qua scriptum illud est, *Qui ex pleuritide facti sunt purulenti; si quidem à vomica rupta, pus liberaliter expurgarint ad quadragessimam diem, periculo defunguntur; sin minus, tandem euadunt phthisici*. Hæc igitur πόνους parit ab empyemate, quod πλέως & ὠπτίως non expurgatur. Sunt autem πόνους, febris assiduitas cum paroxysmis nocturnis, tussendi & extussendi irrita cupiditas, sudores multi, oculi concaui, ruboris per genas suffusio, vngues adunci, extremorū digitorū calor, cibi fastidia, pedū tumores, pustularū per vniuersum corpus eruptio.

18 Εξ ἐμπυήσιος πλῶμονος, καὶ ἐν κοιλίῳ ἐνὶ δὲ ἀλγήματι, καὶ ἐς κλίδα καὶ τὸ ὑπὸ ῥέχην ἀσπώδεια σημαίνει πύελος πληθὺς ἐν τῷ πλῶμονι.

Vbi est empyema pulmonis, si ad ventrem nonnunquam, sæpe ad iugulum, dolor irrepserit, & cum anxitudine stertor adsit; expectorabilis materia vis magna ostenditur.

EMPYEMA pulmonis fit, cum eius phlegmone puris mutationem suscepit: neque sputo, neque sanguinis detractione, neque diæta, neque aliis remediis conuenienter præscriptis, curationem recipit. Solenne est illud. *Quicumque harum partium dolores non quiescant, nec sputi expurgatione, nec deiectione alui, nec sanguinis detractione, diæta, aut pharmacia, scire licet in empyema transuros.* Atque illud. *Empyema est planè funestum, si cum sputo bilioso appareat: maximè verò si die septimo primùm prodire cæperit.* Nam cæterorum empyematum signa eduntur vigesimo, trigésimo, quadragesimo die: nonnunquam etiam sexagesimū expectant. Atque empyematis quidem à phlegmone signa sunt qui in thorace crebrius cidentur horrores, & pondus obsessæ partis quæ antè dolebat. Huius maximè expectenda crisis, est *ἀνακαθαρσις*, quæ si liberalis fuerit cum febris vacuitate, ciborum appetentia, sine siti; alius autem facibus figuratis feratur, & modicis; ipsumque adeo spurum purulentum, suo candore, læuitate, & æqualitate, partis vnde manat integritatem, caloris innati vim, & materiæ bonitatem ostendat, bene est ægro, & confestim seruetur. Sin autem *ἀνακαθαρσις* nulla est; reliquum erit vt æger ab interitū vindicetur vrinæ purulentæ, stranguisæ, & abradentis profluuii: nisi fortassis eadem materiâ alius feratur. Quod si ne hæc quidem medici votis respondeant, aut frustra expectentur; postremum illud erit, vnde aliquid speretur; vt vel parotidas; vel in cruribus natura liberale molietur abscessum. Ac si quidem ad parotidas materiâ viam affecerit; difficultas spirandi maior aliquantisper nascetur; mox autem cessabit, sine alia manifesta illius vacuitatis causa: hypochondrium verò, cum mollitudine, omni dolore carebit. Sin autem ad inferiora cursum instituat, hypochondrium æstu incandescet, & intumescet: spiritus verò ducetur ex facili. Quod si cum hypochondrij tumore, & æstu, summa difficultas spirandi coniuncta sit, tanta profectò expectorabilis materiæ copia denunciatur, vt pariter æqualiterque superiora & inferiora obsideat.

19 Οἱ Φρενῶδες, ἀσπῶδες, κοπιῶδες, ὀσφυαλγέες κοιλίας κα-
ταρρεῖνται.

Horriduli, anxij, membris perfracti, lumbos dolentes; profusione tandem sunt aluo.

30 QVÆ sunt hoc loco *καθολικῆς*, i. in vniuersum enunciata, dubitanter quæ sita videntur prorrh. 53. l. 2. prioris, his verbis, *Ἀεὶ γὰρ εἴσιν ἀσπῶδες αἰμῆτος, ὀσφυαλγίαι, καὶ σπασμὸς καθάρσεσσι· ἐλπίς δὲ βαρὺ δεινὴν*; i. An in fastidio sine nausea, lumborum dolore; si feritas adsit delirij, spes est nigra duci ex aluo?

Hoc spectat igitur, vt animo complectamur, vacationum inclinationes fieri, vt natura, & humores cursum inflectunt. Estque perceptio planè huiusmodi, *Quibus cum horrore, fastidio, lassitudine, lumbi dolent; iis fere liquidis excrementis alui feruntur.* Vtrum verò hæc *καθολικῆς* sit vera, & verè *κατὰ φύσιν* enunciata; illud profectò est de quo quærendum. Enimuero qui sunt horriduli, opinionem faciunt citati humoris exitum non habentis: proptereaque oppressionis multum adiicientis. Atque illius oppressionis symptomata sunt, anxietas, *κόπης*, atque lumborum dolor. Sed illam anxietatem fieri scripsit *ἀναιμία*, i. sine nausea; vt accusari stomachus iure non possit: sed virium à corpore oppressarum iniuria, qua illæ sunt omnis figuræ, & loci impatientes. Inde etiam nascitur ipse *κόπης*; indeque sic affecti, nominantur *κοπιῶδες*. Est autem *κόπης*, illa corporis affectio; qua si vel minimum quis moueatur, lassitudinis vlcerosæ, vel tenuis sensio excitatur. Ac ne plura quæ *κατὰ φύσιν* dici possunt confectioner, comprehendam breui: sic enim statuo; *κόπης* hîc videri *βίαιος*, i. *tensiuus*, qui nunquam metum adfert delirij per anadromen ad caput: quemadmodum adferre solet *κόπης* *ἐκλυῶδης*, καὶ *φλεγμονώδης*, i. *vlcerosus* & *inflammatorius*. Nisi quis fortè obiiciat, quod initio scripsi ex prorrh. 53. l. 2. prioris prorrh. *Qui lumbos dolent, atque etiam fastidiosos, tandem fieri profusione aluo, cum è potestate mentis exierint: ac nigra deicere.* Quod sanè verum est, si validæ vires *ἀντὶρρόπως* moliantur excretionem, vel abscessum, versus eam partem vnde manauit morbifica vis ad superiores. Est enim ratū illud, & persuasum omnibus Asclepiadis; quod semper humoris morbifici *παλινδρομή*, i. *recursus*, eò fit, vnde primùm *αἰαδρομῶν*, i. *excursum* habuit, aphor. 2. sect. 1. lib. 6. Epid. At verò hîc nos profusoris alui causas *ὁμογενεῖς*, i. *congeneres* omnes agnoscimus, in motu humoris, naturæ impulsu, & partium obsessarum conditione. Nam cum ab irritō motu horroris ex venis ducti nulla sit excursio, quæ opinionem faciat hæmorrhagiæ; nulla exclusio quæ sudorem promoueat; reliquum est, vt sperabile sit alui profluuium. Vt enim *ἀναρροή*, i. *ascensus* significatur cardio-gmo, fastidio cibi, oris amaritudine, & tenebrosa vertigine: sic & *καταρροή*, i. *descensus*, torminibus alui, lumborum dolore, & genuum grauitate. Dolent autem interiores lumbi, per *μεσocola*, quæ veniunt à neruis qui ex spina oriuntur.

Hist. 5. p. 2.
lib. 3. Epid.

20 Τὰ ὑπὲρ ῥιζόνια καὶ ἐς νύκλια μαλλον ἢ ὑπὸ ῥιζόνια, ἀρρε-
πνα, φλεβονώδεα ὄντα, ἐν τοῖσιν ὑπνοῖσιν ὅστιν ὅτε οὐρα ὑφ' ἐαυτοῖς χα-
λῶνται: ἐς ἀπεισμόν ἀποτελῶνται.

Quibus incidente rigore, nocturna exacerbatio somni vacuitatem adfert, cum fatuitate coniunctam; si nonnunquam in somnis vrina excidit, conuulsione finis fit.

SYMPTOMATA rigoris frustra aborti, per anadromen ad cerebrum, explicantur: mox ea, quæ per successionem, & propagationem causæ morbificæ, à cerebro, & in cerebro excitantur. Ac primum symptomata quæ per anadromen à rigore frustra citato nasci solent, sunt, cephalalgia, somni vacuitas, delirium quoque ipsum. Sed cum cephalalgia nomen, hoc loco, non scripserit; reliqua duo, vigilia, & noctes insomnes, tum ipsa fatuitas; ab eodem fonte principia, causasque ducunt. Etenim vigilia, & noctes insomnes, effectum sui causam agnoscunt cerebri intemperiem calidissimam, & vaporis somniferi prauitatem. Fatuitas verò, siue nugarum garrulitas, phrenitidem planè denunciat, auctore Galeno comment. ad hist. 15. f. 3. 3. Epid. Verba Galeni sunt hæc: loquitur autem de vxore Dealcis, quæ modò garriebat, modò silebat. Τὸ μὲν γὰρ, λόγους πολλοὺς, φρενιτικὸν τὸ δὲ, σιγῶσα, μελαγχολικὸν τὸ δὲ, ἀφαισώμενον, κατὰ ἀμφοτέρω: εἰ μὴ πού τις, καὶ διὰ τὴν κατὰ φύσιν ἀφαισώμενον, i. Nam garrulitas ipsa erat phrenitica: silentium autem melancholicum: contractio ipsa, vtriusque est communis. Nisi forè à perfrigeratione fuisse putandum est. Ergo vigilia, somni vacuitas, nugarum garrulitas, siue fatuitas; primitiua sunt mala cerebri, quæ primo itatim bilis appulsu nascuntur. Sed hæc tolerabilia, & sanabilia videri possent, nisi per translationem & propagationem, grauiorum malorum consecutio adferretur. Cernitur autem successio mala, vigiliarum, in somno; delirij ὁπλῆς in vrina quæ redditur ἀποερίτης, i. sine voluntate, iniussa; vtriusque verò infesta potestas, in conuulsione funesta. Quæ quomodo fiant omnia, paucis aperiam. Sed illa somni hoc loco necessaria distinctio est, vt pro sopore, seu pro comate vsurpetur: quemadmodum in Hermocrate annotauit; de quo illud scripsit, καὶ κοιμῶν κωματώδης, i. quiescebat vternosus. Non enim ille somnum iniuit naturaliter conciliatum; vt conciliari solet, quando ad dormiendi necessitatem accedunt tres illæ somni naturales causæ; vaporis somniferi suauitas; cerebri temperies; & mentis tranquillitas. Ergo ne longius abeam, non iniuit somnum Hermocrates naturaliter conciliatum: sed fuit soporatus, conuiuendo scilicet palpebris, quas aperire nō poterat, propter facultatis ipsius infirmitatem ab exhausto cerebri, & frigida intemperie per consumptionem retorridam. Sed satis iam multa de hoc sopore, commentario ad illam perceptionem: Τὰ πολλά τοσούτοις ῥίγη, κακώθη, i. Frequens cum segnitie rigor, malus.

Sequitur fatuitas, siue nugarum garrulitas, quam diximus esse phreniticam, quæ in principalium cerebri actionum deprauatione consistit: estque delirium intermissionis expertem, cum vigiliis, & febre coniunctum. De cuius delirij natura, deque omnium quæ in eo sunt, atque apparent causis; plura suo loco dicentur. Pertinet autem ad rē illud, τοσούτοις quod in phrenitidem sæpe cadit, à cerebri alienatione, cuius consecutionem attulit diuturna & vehemens cerebri alteratio. Atque inter cætera; tum ipsius phrenitidis, dum viget; tum eius, quæ ipsi succedit, τοσούτοις, symptomata; potissimum obseruatur illa voluntatis amissio, quæ cernitur in deiectionibus & vrinis iniussis; quas sponte nostra excernimus, & cohibemus, quando valemus. Nam si in somnis, comatosis, iniussa laxatur vrina; non solum resolutione partium, i. vesicæ & sphincteris musculi; sed etiam vitio rectricis potentie; palam est, illud malum conuulsionis successionem habiturum. Sicut ex perfrigeratione, metus & mæror, quæ sunt melancholiz propria. Visum est illud, Quæ immemoribus & sine voluntate funduntur vrina, pestifera. Quæ omnia iam pluribus sunt explicata, comment. ad Coacam 14. huius diuini operis.

21 Τὰ ξυνεχέα ῥίγη ἐν ὀξείσι, πονηρά.

Qui crebrò cientur in acutis rigores, pestiferi.

EXPLICATIO repetenda ex commentario ad nonam. Tantum illud commemorabile, quod ξυνεχέα ῥίγη dicuntur, αὐτὰ τὴν συνεχῆ καὶ διὰ πλείους, i. qui crebrò exactum ad morbum cientur. Nam propriè, τὸ συνεχές, assiduitatem significat omnis intermissionis expertem, quæ in rigore locum non habet; cuiusmodi tandem is fuerit; criticus, symptomaticus, aut etiam periodicus. Nam periodicus est, exempli causa, tertiana, quæ accessionem habet tertio quoque die rigoriferam, intermissione distinctam. Symptomatici assiduitas esse non potest: quoniam omnis rigor symptomaticus, vel translationem facit materiz rigoriferæ; vel illius momentaneam exclusionem. At critici comes est absoluta morbi depulsio, atque sanatio. Ex quo efficitur, legendum συνεχῆ, αὐτὰ τὴν ξυνεχέα: vel explicandum τὸ ξυνεχέα, per συνεχῆ καὶ διὰ πλείους, i. vt dixi, qui crebrò cientur rigores exactum ad morbum. Vide historiam vniuersalem lib. 3. Epidem. & particulares multas eiusdem libri; maximè verò 13. & 15.

22 Αἱ ἐκ ῥίγους, μὲν κεφαλαλγίας, ἐκλύσεις ὀλέθριον.

Si à rigore, cum cephalalgia, vires prosternuntur; funestum.

Si morborum magnitudine, symptomatumque vehementia, non raro aegroti cum integritate vi-
rium ad exitum precipitatur, quid fiet illis, quibus effere vires summam morbi violentiam experiuntur?
Etenim cum neque pepasmo ipse per se sufficiat; tum vero nullam excretionem quantūvis criticam, sua cō-
modo, perficere possint propterea; nec ullam evacuationem quā artificio siue medici ad imitationē naturę
comparato. Quę cum ita sint, perspicuū est; cephalalgia a rigore natam, & educatā, perenni morbosicę
causę affluxu; cum summa viriū infirmitate coniunctā, esse finestā. Est enim cephalalgia primū ipsa
per se terrificā. Sed cum habetur pestifera, si & prægrandis; & cōtinxit febres acutę, prauitque alicuius
signi coniunctionem habuerit. Qualem hæc loco descripsi. Primū ex rigore nascitur hæc cephalal-
gia. Ergo per translationem humoris morbosici; qui corruptione proprię substantię in vitio est. O-
mnes autem morbi, qui aliorum successione veniunt, per translationem; aut per metastasim, i.
translationem; sunt prioribus molestiores. Deinde verō, hæc cephalalgia coniunctam habet febrem a-
cutam. Non enim aliter fit symptomatiens rigor. Ergo materię cephalalgicę perennis generatio est,
& perennis affluxus, unde vires acquirit eundo. Iam verō quod ad vires languidas attinet, quas vocat
ἐκρύσις; ne nodum in scirpo queram, dictionis ipsius aucupio; sit illud firmitissimum, ἐκρύσις hoc loco
dici, quas alibi μετὰ ἀδυναμίας nominauit, Αἰ μετὰ ἀδυναμίας τῶν ὀστέων, ἡ ἀρρώστια, ἡ ἀσθενεία, i. Fractis viribus super-
ueniens delirium, pessimum. Vbi Galenus vim huius dictionis μετὰ ἀδυναμίας, animaduertit; nempe ex
ea summam imbecillitatem significari. Adiecta enim præpositio ἐξ, verbi vim augeat: vt infirmitatis
summa sint omnia, quę nō alioquin exigua essent, neque obscura; si detracta particula ἐξ, μετὰ ἀδυναμίας
grauissimū legeretur. Quod autem ἐκρύσις hīc commemorat, idē planē sint, quod illud μετὰ ἀδυναμίας τῶν ὀστέων
grauissimū author Galenus restatur commentario ad illam aphorismum, Αἰ μετὰ ἐκρύσεως καὶ ὀστέων, ἀσθενεία, προπ. 4. c. 3. c.
ἐκρύσις, i. Quę cum exolutione firmiter fixa, veniunt apoplexia, sanest.

23. Τὰ αἵματώδεια οὐχ ἐν τοῦτοις, πονηρόν.

Cruenta in his urina, praua.

VRINÆ cruentę, sic enim vertimus, ὕδα αἵματώδη, sunt illę quas Hippocrates ὕδα ἐρυθρά, i. Urinę
prærubras nominauit, prorrh. 3. c. 1. 1. Tales nephritici multi excernunt. Ac, mea quidē sentētia, scriptum
hoc de urinis cruentis, seu impensē rubris, conuenienter cōgruentēque illi responder, quod idem scri-
psit prorrh. 2. sect. 1. 1. Κοινὴς τῶν ἐκ τῆς ἐρυθρῆς κακὸν ἐν πᾶσι τοῦτοισι, &c. i. Alię proluuies rubra, mala in omni-
bus morbis est. Vt enim ex impensē rubra ventris proluuie, quę scilicet cārnium recens mactatarum lo-
turam refert; malē affecti per infirmitatem iecōris significatio fit: ita ex prærubra urina, renum malē
officio suo fungentium certissima signa percutiunt. In iis igitur quorum a rigore, in cephalalgia, vires lan-
guescunt, hoc perniciosior erit prærubra urina; quod plures potentię labefactę sunt: quemadmodum
in tabe alui profluuium, lib. 5. aphor. in comate prærubra ventris proluuies, prorrh. 2. c. 1. 1.

24. Ρίγος ὀπισθοτονῶδες κτείνει.

Cum opisthotono rigor necat.

OPISTHOTONOS Græcis dicitur, cervicis posticę conuulsio, cum scilicet caput ad scapulas in-
uitō contrahitur, comment. in aphor. 51. lib. 4. Est autem ὀπισθοτονῶδες rigor, cum distillationem impediēs
in neruosis corporibus, sit causa, vt ipsa repleantur, comment. in aph. 13. lib. 6. quemadmodum & frigus,
de quo dictum est Coac. 7. ὕψις τῶν ὀπισθῶν, ἀπαμύδης, i. Posticarum partium frigus conuulsificum. Hac autem
ratione interficit; quod cum respirationis vsum augeat, respirandi commoditatem adimit, instrumen-
tis motu prohibitis.

25. Τὰ φεικώσπνια, καὶ ἰδρώσπνια κλειόμεως, ἐς δὲ πλεῖον αὐχρον
φείζονται παρὰ λόγους, ἀρτυπνέοντα, μὴ πεπαυμένον, αἱμορραγή-
σιν οἶομαι.

*Si cui cum perhorruerit atque sudarit criticę, rursus postridie horror
sine causa ingruerit, ac tum a pepasmo somni sit expers; huic venturam
arbitror hemorrhagiam.*

ΤΑ ΦΡΙΚΩΣΑΝΤΑ καὶ ἰδρώσαντα consilio exposui in ea significatione, in qua legi solent, Οἱ
φρικώσαντες καὶ ἰδρώσαντες, i. qui perhorruerunt atque sudarunt. Sæpe enim affectionum nomina transeunt in

agros. Sed illud in his rebus etiam putari debet: quoniam ex non esse nihil certum significari aut fieri posse arbitror. Itaque legendum id est: *αγροί, οὐκ ἔστιν ἄλλοι*; ex prorr. 37. *ἡ δὲ ἰσχυρία* hęc legitur sententia, his verbis, *ἡ δὲ ἰσχυρία αὐτῶν ἰσχυρία ἐστὶν*; &c. Iam vero quod repetitionem horris ait fieri *ἡ δὲ ἰσχυρία*, idem plane significat, necnon eodem spectat; quod illud solenne in aphorismis: *Τὸ οὐ μὴ ἔχει λόγον καὶ ἐστὶν ἰσχυρία* v. e. *οὐδὲ φέρει δυνάμει* *ἡ δὲ ἰσχυρία ἐστὶν ἰσχυρία* *ἡ δὲ ἰσχυρία ἐστὶν ἰσχυρία* in *Leuatiōni* quia accidit sine signis, non est fidendum: quoniam admodum nec. *Leuatiōni* de multis quia merito morbi non veniunt. Vt enim suspecta est morbi cuiusque, hęc signis & causis, leuatiō: sic exteri non ita debemus nisi quæ *ἡ δὲ ἰσχυρία* apparent & fiunt, quamuis praua sint ipsa specie atque terrificata. In quo difficilis est *ἡ δὲ ἰσχυρία*, *ἡ δὲ ἰσχυρία* explicatio. Galenus interpretatur *ἡ δὲ ἰσχυρία* sed ne id quidem satis, nisi exemplis illustretur; quemadmodum idem fecit commentario ad illum aph. 26. lib. 2. Quod superest, nos etiā cōsultō legimus *ἡ δὲ ἰσχυρία*, vel *ἡ δὲ ἰσχυρία* illamque particulam, *ἡ δὲ ἰσχυρία*, deleuimus; tum ex prorr. 37. *ἡ δὲ ἰσχυρία* ex aph. 10. p. 2. lib. 6. Epid. Nam *ἡ δὲ ἰσχυρία*, ferē esse solet symptōma perturbationis criticę; ad sudorem, vel hæmorrhagiā. Quinetiā illud, *ἡ δὲ ἰσχυρία*, 10 *ἡ δὲ ἰσχυρία*, emēdauimus *ἡ δὲ ἰσχυρία* quoniam in cruditate, quandiu ipsa manet, nulla crisis bona fieri potest. Hoc spectat igitur hęc difficillima prognōsis, vt intelligamus; non raro varias esse morborum crises, quæ ad salutem variē suscipiuntur, pro vario humoris motu, naturę impulsu, & partium oblectatō conditione. Docemur etiā varietatem illarum crisis sapienter denūciari vna eadēque concussione, cuiusmodi in rigore cernitur. Est enim rigor idem tñctus, & sudoris; & hæmorrhagię prænunciū, aliumque ciet deorsum & sursum. Quod autem varietatē crisis agnōi morbis acutis feliciter defungantur, vt cetera omittam theorematā & exempla, quę multa sunt apud Hippocratem; hęc duo instar omnium fidem nobis facient propositę percēptionis. Ac primū obseruationē ascribam quæ legitur in historia vniuersali: deinde historiam particularem subiiciam. Est autem hęc obseruatio. Per id tempus seruabantur illi potissimum, quibus horum quatuor signum aliquod apparebat. Qui scilicet vel sanguinem ē naribus abundē profudissent, vel urinas multas, multa et laudabili hypostasi præditas; vel deiectionum copiam biliosarum tempestiuē commotarum, vel dysentericarum etiam. Ac nonnullis quidem cū istorum vnum satis non esset, simul omnia fiebant. Ab illisque omnes superfuere. Fuit Larissæa virgo matura virgo, quæ ardentē febricitauit ex repletionē menstrualis materię, quæ nondum habuerat exitum. Hęc repletio fuit omnis malignę cacochymię & inflammationis expers. Itaque omnis spes medici & cœptę curationis fiducia in sola vacuationē semper stetit. Sed quoniam vteri, venarum, & capitis repletio, gravissimorum symptōmatum consecutionem attulit; sic natura triumphauit de morbo, vt primū sexto die, liberali hæmorrhagiā, capitis plethorā sustulerit: quæ quidem plethora non erat fixa, nec contumax; sed pressa leuiter ad exigui prædicationem temporis. Inde virgo illa cū perhorruisset, sudore diffudit calido, idque toto corpore. Quod nisi fuisset, & menstrualis tum primū esse cœpisset exactum ad morbum, & multo pōst etiā; liberalem hæmorrhagiam, sexto die, non habuisset sine relapsu. Est enim consentaneum vt sua cuiusque foci sit propria euacuatio; capitis, per hæmorrhagiam; venarum, per liberalem sudorem; vteri, per menstruale profluuium.

constit. 3.
lib. 3. Epid.

hist. 12. p. 3.
lib. 3. Epid.

26 Τὰ μὲν ἀρίστους ἰσχυρότερα οὖρα, ποικίλα, καὶ σπασμώδεια· ἀλλὰ καὶ περὶ αὐτῶν ἐλπίς δὲ καὶ ἐπὶ τοῖσι, τὰ ὅσα τὰ ὅσα.

Quæ cum rigore sistuntur urina, sunt praua, & conuulsifica: idque cū alijs, tum si cui iam soporato sistantur. Ac tum præterea paratidas fore, sperabile.

V R I N E suppressæ calamitatem iam explicauimus progn. 5. & 9, tum etiam suppressionis illius causas aperuimus: vt ex earum perspicentia, prædicendi ratio comparatur. Vt enim diuersitate causarum distincta est illa suppressio: ita spē adfert secūdi iudicij; aut merū sinistri. Enimvero salutare est vrinam sisti ante rigorem criticum: siquidem illud ex bonis profectum fuerit, & ante pepasmo significatum; sitque illa suppressio *ἡ δὲ ἰσχυρία* vesicę, aquæ ductuum, atque renū. Sed quemadmodum salutare est id fieri *ἡ δὲ ἰσχυρία* instrumentorum, & *ἡ δὲ ἰσχυρία* victricis naturę: ita pestiferum esse arbitror, si idem fiat *ἡ δὲ ἰσχυρία* naturę, & *ἡ δὲ ἰσχυρία* febris acutę, vel partium afflictarum. Omnis autem quæ cum rigore inhibetur vrina, eam intermissę excretionis causam habere non potest, quæ cernitur ante rigorem: quando materia intus foras cūsum inflectit. Ergo ex ascensu symptomatico, partiumve obsessarum vitio, sistitur. Et quoniam hic nunquam fieri potest salutaris vacuatio, cū aliō quā ad cutim vrinę materia vesica non excepta fertur; reliquum erit vt repletionē maligna partes obsessę corrumpantur. Atque id locum habet vbi rigor cietur symptomaticę, i. e. cacochymia vasorum. Sin ab inflammatione purulenta, veniat; partes ipsas rigoriferas afficiet: vt qui in lumbis malē habitis, per phlegmonem spinalis medullę, & membranarum eius crebrō cidentur, cum citā caloris vicissitudine, acerbissimam vrinę suppressionem adferunt, ob sympathiam partium nephriticarum, quæ sunt propinquę atque communes, proptereaque primū, & maximē vitiantur, lib. 3. *ἡ δὲ ἰσχυρία*. Sunt etiam conuulsificę tales vrinę, quoniam ad præparationem suscipientis causę, accedit vis efficientis. Etenim rigor frustra citatus est 20 *ἡ δὲ ἰσχυρία*, morbi materię ad neruos, exitum non habentis: tum frigus ipsum rigoris comes, diffilationem prohibendo neruorum, est conuulsificum.

24. Coac.
7. Coac.

10 IDQUE CVM ALIAS, TVM SI CVI IAM SOPORATO SISTANTVR] Ac si diceret; quando repletionis æque atque vacuationis malum est ipsa conuulsio: planè efficitur vt si oppresso cerebro causis plethoricis, rigor incidat; ex ea concussione conuulsio superueniat, quæ in totius corporis iniussu motu consistit, non partium aliquarum: id enim significat ἡ ἀσυνεχὴς, quod à sopore aut carochæ venit, prorrh. 68. f. 3. 1. Nec verò impedimenta principij neruorum nisi explicentur solenni abscessu, aliter quàm vniuersali conuulsione tolluntur. Quòd si ad illud vitium oppressi neruorum principij, venenata vis vrinæ eò translata accesserit, necesse est, vt magnarum causarum complexio magnum symptoma toti corpori pariat: qualem ipsi vidimus non rarò epilepsiam ex vrinarum anadrome natam: nisi ἀνὰ πρὸς ὀφθαλμὸν, ac liberalem natura molietur abscessum, quo tantis periculis defungatur. Quæ salutaris abscessus conditio in parotidibus sperari non potest: quòd illæ non fiant ἀξίως τῆς ἀπελευθέρου τῆς φύσεως, i. comprehendendo morbo pares: sed contrà, μικροτέρῃ τῇ πύθου εἴσι, καὶ ἐκείνῃ, i. sed minoris morbi sunt, nec deorsum sunt, comment. ad prorrh. 68. f. 3. 1. Sperabiles autem sunt ideo parotides, repleto cerebro humore crasso & frigido. Qua de re extant multæ prognoses ad finem 3. prorrh. De parotidum autem natura, causis, periodis, paroxysmis, & crifibus, plura suo loco dicentur.

27 Τριταμοφύεα ῥίγηα λὺν ἐν μέσῳ παροξυνόμῳ, πυρετῶ ἀτέκτῳ·
πάνυ κακοήδεα. παναντία δὲ παροξυνόμῳ τῇ ἀσυνεχίᾳ, τῇ μείλῃ ῥίγους,
20 καὶ πυρετῶ· ὀλέθριον.

Tritaphyarum febrium incerti rigores qui medio febris cursu exacerbantur; valde maligni. Contrà verò, quæ conuulsis cum rigore & febre exacerbantur; funesta.

30 TRITAPHYÆ, febres sunt intermissionis expertes, quæ tertio quoque die ingrauescunt sine rigore periodico, vel horrore potiùs: qualis esse solet earum quæ semitertianæ dicuntur. Habent enim hæ febres, exacerbationes horriferas atque stas: tritaphyæ verò nullas, aut certè incertas. Propterea rectè Hippocrates scripsit eas fieri ἀτέκτως, καὶ παραλημμένως; i. inordinatè & erraticè, i. quarum rigores non vnà semper cum paroxysmis inuadunt, vt ait Galenus. Et ibidem idem Galenus, Rigores autem erraticos fieri, ait, qui singulis paroxysmis non adsunt, sed rarò: atque illi quidem admodum parui & breues. Sed præstat ipsius Hippocratis verba audire de natura tritaphyæ febris. His erant febres continuæ omnes, quæ nullo modo remitti videbantur: sed omnibus exacerbari potiùs tertiano quodam more & modo, cum altera die leuiiores, grauiiores altera sentirentur. Atque erant eiusmodi quidem febres omnium pessimæ quæ tumoriebantur, mansuetiores quidem per initia; sed continenter in peius versæ & auctæ: quæ si quando remissiores essent, at paulò post vehementius excandescerent; criticis præsertim diebus. Harum rigores inordinati erant atque erratici, quanquam istis omnia minimè. Nascuntur hæ febres ex diuersorum humorum maligna cacochymia, quorū calidior
40 quidè acutam febrem accendit; frigidiore interim putrescente: vnde fit vt remissa priore, altera rursus accendatur; quia perseverat, quæ prior inuasit, iterum exardescit: vt per huius febris importunitatem quicquid esse natura non possit. Hic autem incerti rigores sunt valde maligni, propter molestos humorū motus, qui oppressionem adferunt, vnde crises funestæ: symptomata maligna stomachi, modò cum lethargo, modò cum vigiliis & delirio coniuncta: vt prætermittam infirmitatis accessionem.

28 Αἱ ἐκ ῥίγους ἀφωνίαι, τρόμῳ λύνονται· καὶ τοῖς ἐπιρρίγροντας, ἑμώδεα γινόμενα κρίνεται.

50 *Quæ ex rigore incidunt aphonia, tremore excutiuntur: sed & superuenientes crebrò rigores, tremore oborto quiescunt.*

QVÆ ex rigore veniunt aphoniae sunt insanabiles, si cum exolutione huiusmodi sint: quoniam ex iis significatio fit collapsæ potentiae animalis, cum extinctione caloris natui, qui in sinistro cordis ventriculo stabulatur: ex quibus efficitur vt propter summam potentiae infirmitatem & materiae vocalis inopiam, voce capiantur qui sic laborant. Notum illud. Quæ cum exolutione & veterano sunt aphoniae, pessimæ. Sed & reuocanda in memoriam harum prognosis prima. At si per oppressionem cerebri, vis efficiendi denegetur musculis intercostalibus, quorum socia collectione, fit ἀσύνεσις ipsa ad vocem edendam; non video quid opis à tremore possit adferri: nisi quis verbum, τὸ λῦν, accipiat qua in significatione scriptum legitur aphorif. 26. 6. Οἷον αὖ ἐν τοῖσι καύουσιν ἑμῶς γίνονται, ἀσύνεσις λύνει, i. Quibus in causa rigores adsunt, delirio finiunt. Sed neque rigores crebrò citatos, superueniente tremore finiri verisimile est, nisi fortasse ineunte morbo: ad cuius tremoris curationem venæ sectio necessaria est, vt in Pythione annotauit Galenus, cum is primo die manibus contremuisset.

Quemadmodum & ipsa convulsio febris nonnunquam finem imponit, quæ aut eodem febris die; aut postdie; aut ad summum perendie, incidit. Sed tamen qui ab oppressione fit tremor per translationem à genere venoso ad nervos, semper delirii consecutionem adfert, per aph. 26. lib. 6. Nam qui ab exhausto fit, in propinquo mortem esse denunciat. Huc accedit, quod à rigore in tremorem mutatio, fit in peius. Etenim in rigoris concussione, dominatu naturæ morbificus humor tenetur. Contrà in convulsione, humor naturæ potens est: non autem natura, humoris.

29 Οἱ ἐκ ρίγους μὲν κεφαλαλγίας ἐκλυόμενοι, σφαλερόν. Τὸ αἷμα-
τῶδες οὖρον ἐν τούτοις, κακόν.

Qui à rigore cum cephalalgia exoluntur, pleni sunt periculi. Cruenta his urina, prava.

H V I V S prognoscos explicatio repetenda est ex 22. huius. Sed illud tantum notabile, quod illic ὀλέσθιον; hîc σφαλερόν esse dixerit: non rectè tamen, sed ἐπιπρότερον. Nam illud, σφαλερόν, ancipitis iudicii est, cuiusmodi solet oriri ex causis. At verò, τὸ ὀλέσθιον, firmissimum est ad prædictionem mortis; cuiusmodi iudicium stabile comparatur ex signis funestis, qualia hîc describuntur. Vide comment. ad progn. 22. huius libri. Urina cruenta; siue sit eiusmodi substantia; siue colore, pessima est. Illic enim vitia nephritica planè apparent: hîc verò incendium seri mixtione bilis saturati. Illinc ex plurium partium offensione, maior calamitas significatur: hinc verò perpetua morbificæ causæ accessio, quæ adiungitur ad nobilissimæ partis oppressionem, & instrumenti ad vitam tuendam necessarij, interceptionem.

30 Οἷσι ρίγους, οὖρου Ἰπίσαις.

Quibus rigor, urina subsistit.

VRINA subsistit à rigore, & antè rigorem. Quæ à rigore subsistit, prava est, convulsifica, quo iure quaque iniuria partium urinæ dicatarum: denique citam mortem adducit. Ante rigorem criticum, feliciter & commodo ægri subsistit, ut dictum est. Sed satis iam multa de diorsimis urinæ suppressæ. Quamobrem ἀδιόριστος pronunciari non debet prognoscos.

31 Σπασμὸς ἐν πυρετῶ, χερῶν καὶ ποδῶν πόνοι, κακοηδές· κακοη-
δές δὲ καὶ ἐκ μηροῦ ὀρμὴ ἀλγέματος· ἀλλὰ οὐδὲ ζουάτων πόνος κρήγων
ἀπὲρ καὶ γαστροκημίων πόνοι κακοηδές, καὶ γνώμης παράφοροι· ἄλλως
τε καὶ οὖρον ὡς ἐναμωρηθῇ.

Convulsio in febre, manuum ac pedum labores terrifici; terrifica est etiam doloris à femore sursum irruptio. Nec verò à genium dolore levatio ulla sperabilis. Quinetiam surarum dolores mentem precipitant: idque cum aliàs; tum si in urina pendulum sit encephema.

ΤΟ ΚΑΚΟΗΘΕΣ consultò verti terrificum, ex propria dictionis illius significatione, quam exposuit Galenus comment. ad promthesim 14. c. 1. i. his verbis, Κακοὴν νοσήματα καλοῦμεν, ὅσα κίνδυνον ἀπὸ λουῶνται τοῖς κάμνουσιν, ἐκ ἀπορίσσει τινὲς τῆς σωτηρίας ἐλπίδα, i. Morbos appellamus malignos, quicumque periculum agrotantibus ita inferunt, ut non omnem tamen adimant salutis spem. Atque id locum habet in cōvulsione, cum febre, cōiuncta; si indefinite enuncietur. Omnis enim cōvulsio in febre terrificæ est: quoniā merù semper adfert sinistri iudicii: sed tamen non semper desperata. Nā & puerorū convulsio formidabilis est: quamvis non rarò pueri convulsione periculo defungatur; quod ea sequatur potiùs naturā suscipientis causæ; i. puerilè neruorū infirmitatē; quàm efficientis, i. febris ipsius & malignæ cacochymix. In morbis minùs periclitantur, &c. Huius convulsione diorsimi leguntur in progn. Pueri, convulsionibus corripiuntur si febris acuta est; si alius nihil reddidit; si vigilanti; si expauescunt; eiulat; si color pallidus, lividus, aut ruber enadit. His quidè facillimè obnoxii sunt pueruli, ad annos septē. Grādiore autē pueros atq; viros non itè cōvulsiones in febribus prehen-

prehendunt; nisi signum aliquod valentissimum deterrimumque accesserit: qualia pleraque in phrenitide exoriantur. Quinetiam metuenda est illa convulsio quæ principio febris superuenit. De qua scriptum illud reliquit summus præceptor, *febris, convulsio finem adfert, quæ aut eodem die, aut postidie, aut ad summum perendie incidit. Sed si eam, quæ inuit, horam excesserit, neque cessarit; prava est.* Mulier vultuosa & melancholica crebris convulsionibus inuente acuta febre correpta est, cum vicissitudine garrulitatis, obscenorum verborum, & comatis. Ac tum desperationi propinqua erant omnia, cum liberali menstruum profusio per *ἀνίσταται* & liberalem abscessum, illud periculum euasit quod imminebat. Excipio mulierum hystericarum convulsiones, quod sunt fugaces & febris expertes. Iam verò tam infesta est convulsio, ut etiam in febre remedium non inueniat nisi superuenerit febris quæ antè non fuit, aut si antè fuerit, magis exardescat, quod sit *ἀνάλωτος* materiz convulsificæ, partibusq; ipsis convulsis: tamen si convulsioni febre superuenire melius est, quàm convulsionem febre. Ergo nulla convulsio, cuiusmodi ea fuerit, bonis sit ægri rebus. Ac nulla vis maior naturæ quàm convulsione potest inferri. Iam verò cum illud, *κακὸν δὲ*, accommodatè sit convulsioni tributum, quam peperit repletio, fecitque ut *ἀπεσπρίται*, i. in iussu nostro moueantur partes illæ, quæ olim *ἀπεσπρίται*, i. nostro iussu mouebantur: ut nihil aliud sit convulsio, quàm iniussus earum partium motus, quæ naturaliter sponte nostra mouentur. Cum igitur nomen illud, *κακὸν δὲ*, conuenienter dicatur de illa convulsione quam peperit repletio: tamen si quid sentio, *κακὸν δὲ* periculum illius explicat, quæ ab exhausto nascitur, quæque nunquam incidit nisi signum aliquod valentissimum deterrimumque accesserit: qualia in phrenitide exoriantur. Est enim talis planè funesta, ac desperatæ salutis; qualem agnoscimus in stridore dentium à delirio; in oculorum fixo intuitu, vago motu, quando huc illuc voluuntur illi; in peruersione oris; singultu; manuum quoque subsultu. Quid verò commemorem convulsiones *πρωματω*, & hypercatharticos? hæc nota sunt omnibus. Denique cum exaruerint nerui à febre tanquam ab igne; quæ inde convulsiones veniunt per iniussam collectionem earum partium quæ naturaliter sponte nostra mouentur; omnes, inquam, illæ mortem venturam denunciant; & ipsam celerius opinione adferunt. Omnis enim convulsio ab exhausto nata semper idem facit atque significat, quod ea sit violentæ febris & malignæ propria, *καὶ πάθος ἐδυνάστη*, i. & dolorifica affectio. Nam cætera quæ ad crîsim apparent, aut quæ sunt ipsa causæ criticæ; non semper idem facere aut indicare apta sunt: sed ut sunt morbi tempora; sic illa commodo aut incommodo ægri apparent & fiunt. Ac de convulsione hæcenus.

in Coac.
hist. 21. p. 3.
lib. 3. Epid.

aph. 49. lib. 5.

Gal. cap. 4.
3. de crîsib.

MANVM AC PEDVM DOLORS TERRIFICI] Enimvero manuum ac pedum labores, si progressu veniunt febris malignæ, *κατὰ* sunt *ἐλπίδες ἢ φλεγματώδεις*, i. lassitudines ulceroſe vel inflammatoriz, quæ metum adferre solent delirij. Sin autem transitu oriantur; perspicuum est abscessum fieri qui morbo non sufficiat comprehendendo. Nam quod obiicitur, Abderitam virginem superſtite pedum dolore, febrem acutissimam depulisse; id verum profectò, sed ea liberalem habuit hæmorrhagiam 17. & liberali sudore tota defluxit 27. vnde conuuluit.

protrah. 3. c. 3.

TERRIFICA EST ETIAM DOLORIS A FEMORE SVRSVM IRRVPTIO] Huius theorematiz ratio & explicatio petenda, primùm ex historia Calui cuiusdam Larissæ, quem dolor huiusmodi per refluxum sustulit: cum nullis remediis conuenienter præscriptis, quiescere potuisset. Deinde verò examinada prorrheſis 1. c. 2. 1. *Ἦν ἀσπαρτάδης π τὴν ἔρω, τὴν καὶ τὸν μὲν δὲν μαλὸς, ἀπαιδὶς, ἀδελφὸς, ἰ. si quid per vrinā deferatur, posteaquæ femoris dolor emanuerit: delirij est augmento.* Ergo terribilis est omnium tumorum, omniumque abscessuum refluxus; ulcerum tumidorum; parotidum; partiumque capacium & incapacium: ut ex pleuritide, tumorum poplitis: à femore, dolor Calui: à pollice dextri pedis, dolor Critonis: à minimo digito, Temeni neptis tumor. Sed in Herophonte & Heropyto salutaris fuit femoris & ischijs dolor, qui cum per iustum transitum obortus fuisset, refluxum nullum habuit.

hist. 5. p. 3.
lib. 3. Epid.

NEC VERO A GENVM DOLORE LEVATIO VLLA SPERABILIS] Quod ita comparata sit partium illarum natura; ut neque sint crîsis capaces; neque materiam illapsam mitigare, propter intemperiem frigidam, & substantiz glutinosam complexionem, possint: ut interim omittam doloris acerbicatem, materizque illapsæ denegatam exclusionem, quam vel natura, vel artificium chirurgi, ferro & pyrotico moliri possit. Sed tamen Galenus commoda genuum dolentium & tibiærum, haud prætermisit ad illud Hippocratis, quod legitur in eo qui in Dealcis hortu iacebat, *Γόνατ' ἐκ τῆς ἐπιδυώος ἐλάττω*, i. Genua & tibiæ indoluit. Genuum, inquit Galenus, dolores atque tibiærum, cum humoris morbifici deorsum inclinantis, *τῆς κατὰ ῥοτῆς*, signa sint; in bonis censere oportet. Atqui in eo sic notabilis est genuum vnâ & tibiærum dolor, ut nihil inæquale continendo morbo accidisse videatur in liberali abscessu partium inferiorum: deinde cum illi balano medicatum fuisset, nigris excrementis ducta est aluus.

QVINETIAM SVRARVM DOLORS MENTEM PRÆCIPITANT] Iisdem verbis hanc prognosin expressit ad finem sect. 1. 1. prorrh.

Eò spectat igitur ut intelligamus, tantam esse surarum præstantiam; communicatione officii cum partibus nobilissimis; ut quemadmodum in calcis fractura per *ἐκχρίματα*, i. expressionem succi accidit *πρὸς τὴν ἀσπὴν, ζυμῆς, θυμῶος, λυγρῶος, καὶ μὲν ἀνίσταται, καὶ ἐλπίματα, κρινόντες π*; i. febres peracute, continua, tremule, singultuose, paucorum dierum, mortifera denique: ita quoque in surarum doloribus, à caco-chymia maligna per excursum secundum arterias, febris exardescat in corde; secundum nervos, delirium in cerebro excitetur: ipsa verò pars obfessa, convulsione dolorifica prehēdatur.

IDQVE CVM ALIAS, TVM SI IN VRINA PRAVVM SIT ENΘΟΡΙΜΑ] Ac si diceret, cum in surarum doloribus à maligna caco-chymia magnæ sint causæ delirij, per cōmunicationem materiz secundum nervos cum cerebro; tum verò maior erit certiorque delirij expectatio, si transla-

tionis vniuersalis à genere venoso ad cerebrum, signa appareant. Ac talis translatio potissimum ostenditur per enzorema prauum, quod in vrina est pendulum. Quæ observatio literis iam ex Hippocrate notata est. Cuius in explicatione Galenus negat ex vinarum signis quippiam certò ad delirium apparere; quòd ea vrina duntaxat iecinoris, renum, vesicæ, ac venarum ipsarum; quæ sanguinis conceptacula sunt; tum facultatis ipsius humorum opificis robur, vel infirmitatem, ostendar. Sed idem Galenus in Larissæa virgine ita scripsit, *Επιδή και κατ' αἰσθησιν εἰς τὴν ἐν τῷ σπλάγχνῳ μὲν πύλον, ἐπὶ τῷ γαστρὶ παρ' ἐκρούσιν, ἐμφανὲς τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐν τῷ σπλάγχνῳ ἐπιδεικνύμενον, i. Sane aliis in ægrotis, notato enzoremate pendulo subiunxit, delirasse; vt inde constet, ad eiusmodi enzoremata phrenitidem sequi.*

32 Οἱ δὲ ὑποχονδρίων ἀλγήμενος πυρετοὶ κακοὶ καὶ τὸ παρώδες
ἐν τούτοις, κακίστον.

Ex hypochondriorum dolore febres malignæ: quòd si & sopor accesserit, pestiferum.

OPERÆPRETIUM est complecti animo quæ scripsit Galenus in suo præmio ad sectionem secundam tertij *ἡ δὲ διδασκαλία*. Id enim propositi habet vt doceat, nunquam adduci potuisse vt cogitationes & disputationes suas mandaret literis, nisi amicorum rogatu peregrè proficiscentium. Quibus vt morem gereret; primum quæ illi attentissimis animis se docente audierant, de re anatomica, deque valerudinis cura, & morborum curatione, scripta reliquisset. Deinde verò cum omnia quæ scripserat, lumen verborum & sententiarum ab vno Hippocrate accepissent; eorundem amicorum precibus victum, commentarios exarasse *ἐκ τῶν συγγραμμάτων* ipsius Hippocratis: quorum catalogum recensuit, in eodem præmio. Ceterum ne quid intentatum relinquere, animum etiam ad scribendum appulisse, in eos libros qui nomine Hippocratis circumferuntur, merito an immerito: vt scilicet in iis definiendo ac disceptando ad veri & falsi distinctionem, ostenderet lumen ingenij sui, quo maioribus suis præluxit. Inter eos libros qui falsò Hippocratis esse dicuntur, & *ὑποχονδρίων* numerantur: in quorum explicatione Galeni se extulit eruditio singularis. Sed beatissimum illud iudicium, quo admirabile est quantum excelluit, fixum hæreret ad memoriam sempiternam, si ille diutius animo vigilasset, lingua & calamo dormiisset in censura prorrheticorum. Ac ne plura confectet quæ sunt in prorrheticis plurima, censore Galeno, explosa: quorsum tam multa eo loco scripsit in hanc prognosin, vt eius auctoritatem conuelleret planèque labefactaret. Hanc vnā præ cæteris omnibus elegit ad confutandum, iisdem ferè verbis quibus eandem exagitauit comment. ad 29. prorrh. l. 2. r. Verba Galeni non adscribam, sed viri mentem explicabo, quæ est huiusmodi.

Neq; ex partiu, quæ sunt propriæ hypochondrij, dolore; febres nascuntur malignæ; sed ne acutæ quidem: neque ex partium nobilium quæ iacent in hypochondriis, vt hepatis, alui, & diaphragmatis, inflammatione febres exardescunt terrificæ, nisi inflammatio magna sit. Nam febrium magnitudo inflammationis vi proportionē responder. Nec verò sunt audiendi, inquit, qui huic sententiæ indefinitè pronuntiatæ fidem & auctoritatem comparare student, eorum exemplis qui à febre hypochondriaca interierunt, cum illi prætereant silentio eos qui inde conualuerunt. Est enim sophistica hæc persuasio: vt verè illud videatur esse dicturus, *Febres ex hypochondriorum dolore natas, æquæ mites esse, atque malignas.* Hæc disputatio est Galeni, ex qua efficitur, nihil indefinitè pronuntiarī posse, quod faciat ad *πικρὸν* bene medendi, in cognoscendo, præuidendo atque curando. Deinde quando exemplis certatur, firmissimum nihil adferri ad faciendam fidem auditoribus, & medicinam ægrotis. Est enim legibus non exemplis docendum atque incedendum. Quæ vt concedam omnia, quia sunt vera: tamen non efficitur, hanc prognosin eiusmodi esse, vt nota censoria castigetur. Quin germana erit eius hæc explicatio.

Ac primum *ὑποχονδρίων* nomen, dolorificum morbum significat, non ipsum dolorem, prog. proximè explicanda, & multis aliis quæ sunt in Coac. quemadmodum & ipsa *ὀδυνή* pro affectione, causa doloris. Sic enim vocat *ὀδυνήν πλευρίαν*, i. *dolorem laterum*, ipsam pleuritidem. 2. acut. *ὀδυνήν ὀφθαλμικήν*, i. *dolorem oculorum*, ipsum tumorem qui ophthalmia dicitur. Sic aphor. 8. sect. 1. lib. 6. Epidem. *Ἐν Κρανίῳ, αἱ μὲν ὀδυνῶν νεαρῶν, θερμαί*, i. *Cranione dolores recentes calidi*, &c. quem locum Galenus exponit comment. ad aph. 6. lib. 2. non ipsos quidem dolores calidos aut frigidos vocat, sed eos affectus quos sequuntur ipsi. Nam in hypochondrio, quod naturaliter esse debet *λαπαρόν, εὐσκόλον, καὶ ἀνώδυνον*, i. *molle, solidum, ac doloris expers*; nihil est quod magis inflammatorum viscerum opinionem faciat, quàm si *ἐπώδυνον* fiat καὶ σκληρόν, i. *dolorificum atque durum*. Est enim dolor præcipuum symptoma inflammationis, quo nomine ipsa sæpe notatur, vt in pleuritide annotauimus. Hic si distinctio hypochondrij necessaria est; vt eo nomine non eius quod ambit, sed partium circumdatarum, earumque nobilium vitia intelligantur; omni tamen culpa vacat Hippocrates; aut ipse castigator eodem crimine condemnandus, qui illud similiter vt hoc non castigauit, *Αἱ δὲ ὑποχονδρίων ἐξ οἷαν ἐκ οἷαν*, i. *Successiones hypochondriorum, ex qualibus in qualia*, &c. Quo loco, hypochondriorum nomine, per metonymiam, viscera intelligit, quæ in hypochondriis continentur. Ergo in hac distinctione hypochondrij atque doloris, quæ facillima est; Galenus debuit enarratorem præstare se potius, quàm ita seuerum censorem & castigatorem. Nam quòd in dolore acerbiterat requirit, planè curiosum apparet, quòd febrem doloris symptomaticam esse, illud, *ἐξ ὑποχονδρίων*

aperitissimè planissimèque ostendar. Non enim febris nascitur symptomatice, nisi pars ipsa, ubi focum habet, inflammatione sit obfessa. Quòd autem requirit etiam ut febris inde nata celeriter, continenter, & acriter moneatur; quòd inflammationi magnæ febris ipsa pariter æqualitèrque respondeat; facilis depulsio erit, si aphoristicà breuitatem excusamus. Nam quæ dicuntur *ἀπλῆς*, intensio-
 10 rum & remissionum diorismos intra se cōplectuntur. Sit igitur enarrator, non censor, qui febres hoc loco explicabit acutas: quemadmodum & is qui febrem conuulsioni superuenientem in aphorismis *ἀπλῆς* scrip-
 tam, ex Coacis perceptionibus, legit acutam, si superuenierit; aut, si antè fuerit, exardescentem. Sed
 leuiora sunt hæc quàm ut diuinum Galeni ingenium exciterent. Ergo ut modificationem huius pro-
 gnoscos paucis complectar, *Febres acutæ ex doloris acerbitate viscerum hypochondriacorum natæ; sunt terri-*
fice atque malignæ. Est enim ratum & persuasum omnibus, quòd huiusmodi febres non minùs acerbæ
 sunt, quàm spei plenæ, de quibus ita scripsit aphor. 40. 6. *Quibuscumque dolorifica sine inflammatione hypo-*
chondria sunt; his superueniens febris dolorem exoluit. Sed tempus est ut febris acutæ hypochondriaci dolo-
 ris symptomatice, miseriam exponamus.

Enimuero febris & inflammatio viscerum hypochondriacorum, mutuas tradunt operas in perni-
 ciam ægri. Ac febris quidem ipsa per se funesta est; incendio, & dissipatione nectaris viuifici cordis;
 exhausto & marasmo *τῆς ἀρχῆς ζωικῆς*, i. vitalis principii, & humoris primigenij partium solidarum; tum
 etiam cacochymia maligna, & eius translatione symptomatice ad partes quarum potentia corpus ad-
 ministratur. Ipsa autem viscerum inflammatio; doloris acerbitate; partiūque vicinarum atque com-
 20 munium sympathia; tum etiam muneris & officij ad vitam tuendam necessarij interceptione; postre-
 mo difficultate curandi atque peiorum malorum successione; funesta ut plurimum esse solet. Qua de
 re theorematata sunt accuratè scripta, parèntque oculis ad legendum & intelligendum, sub finem primi
 libri prognost. & in hoc libro. Exempla verò leguntur in historiis Philisci, Sileni, Adolescentis, Her-
 mocratis, Philistæ, & Apollonij. Philisco *αὐτὸς ἐπὶ τῇ κυρτῇ μαλὶ πᾶσι φερεῖ*, i. extuberauit lien tumore rotun-
 do; obiit sexto die. Silenus exactum ad morbum habuit *παλμὸν συνεχὴ τῷ ὑποχονδρίῳ*, i. palpitationem hypo-
 chondrii indefinentem; interiit vndecimo, quia iuuenis erat annos natus viginti. Hermocrati fuit tracta-
 bilis hypochondrij dextri tensio; inde sexto die ictericus, vitæ prorogationem habuit ad 27. morbi di-
 em. Philistæ hypochondrij dextri percepta est tensio; quintum morbi diem agens interiit. Adoles-
 cens qui in mendacium foro iacebat, vtriusque hypochondrij tractabilem habuit tensionem *σπλά-*
γαντον: ex qua tensione Galenus air, nullum significari vitium abdominis & musculorum; sed inflamma-
 30 tionem vel hepatis, vel lienis, vel diaphragmatis periculofam.

33 Οἱ μὴ διαλείποντες, ἐφιδρουῦντες πυκνὰ, μὲν ὑποχονδρίου ἐντά-
 σεως, ὡς ὀπίσσω πολὺ κακοήδεις· καὶ τὰ ἐς ἀκρώμιον, καὶ κληρίδα σπεί-
 ζοντα ἀλγήμελα ἐν τούτοις πονηρὰ.

40 Si cui sine febris discessione, sudatiuncula crebra cum hypochondrij
 tensione coniuncta sit; res eius malo sunt loco: sed multò peiore, si ei dolo-
 res ad iugulum & acromium se obsirment.

QVONIAM familiaris est apud Hippocratem affectionis & rei affectæ mutua vsurpatio, ut quæ
 alterutrius propria sunt, de altero improprie non rarò dicantur; nos consideratè, clarioris doctrinæ
 causa, istam verborum confusionem sustulimus, totamque sententiam ad res ægri conuertimus: quam
 vis de morbo enuncietur. Ergo si cui in febris assiduitate, crebra sudatiuncula cum hypochondrij ten-
 sione coniuncta sit; idem planè exprimit, quod febres intermissionis expertes, subsudantes, &c. Nam
 illud *ἐφιδρουῦντες* propriè cadit in ægros, non autem in febres: quemadmodum & illud, *μὴ διαλείποντες*, ad
 50 febres refertur, non autem ad ægros. Verumenimvero febres *μὴ διαλείποντες* hoc loco dicuntur; non
 quæ huiusmodi sunt tota historia, & intermissione carent: sed quæ incidente aliqua quietis causa,
 non tamen quiescunt: cuiusmodi esse legitur in aphorismis, *Febrienti superueniente sudore, si febris non quie-*
scat, malum. &c. Itaque multò melius explicasse videmur, *μὴ διαλείποντες, sine febris discessione*, quàm si
 continuae vertissemus.

ST. CV. ITG. IV. R. SINE FEBRIS DISCESSIONE CREBRA SIT SUDATIUNCULA].
 Ex sudatiuncula, nulla crisis bona sperabilis: quia nihil paucum est criticum. Est autem sudatiuncula,
 capitis & ceruicis; aut sudor exiguus quo fit subroscidum totum corpus: vnde vel oppressio partium,
 vel suummainfirmas significatur, per quam exudat succus alibilis, & assimilatione priuatur.

CVM HYPOCHONDRII TENSIONE CONIUNCTA] Sanè hypochondrii tēsis horrenda est;
 60 quæ nullam spem adfert hæmorrhagiæ, aut futuri abscessus in crure, ad leuationē purulētæ peripneu-
 moniæ. Hic ergo tensionem non agnosco musculorum abdominis ex eorum tumore tractabilem &
 aspectabilem: sed eam quæ viscerum inflammatorum comes est. Atque illa quidem intrò & sursum;
 aut foras conuersa percipitur. Ac tensionis intrò & sursum conuersæ causa est inflammatio diaphra-
 gmatidis; aut nimia siccitas: quando scilicet à febrili ardore exaruit. Qua de re extat illa prognostis,
Φωνὴ ὄξεια· τούτοις τὸ ὑποχόνδριον εἰσὶν εἰρηναῖα, i. Acuta vox: his hypochondria retrahuntur intrò. Vbi Galenus

PROPT. 10. §. 2. 1.

εἰρήναι, interpretatur *εἰρήναι*: quoniam hypochondria in vitio non sunt affectione propria: sed eius à quo trahuntur, nempe diaphragmatis. Nam illud, *εἰρήναι*, collapsum habitum semper significat: ut in illo, *Καταρρέουσιν σημεῖον πλὴν αὐτῶν ὅτε τῆς ἡμέρας φυλάσσειν ἐξ ἀπίτης ὃ εἰρήναι*, i. Extenuationis signum inde est, si eandem inuadendi horam seruat febris: nam repente illi concidunt. Quam hypochondrij tensionem obseruauit in Sileno. *Υποχονδρίαι ἐμώσας ἐξ ἀμφοτέρων ὡς ἐμμήνης πρὸς ὁμφήν, ὑπολαπαρὸς*, i. Hypochondrij tensio vtriusque extensa ad umbilicum, & submollis. Vbi Galenus, Distensio hypochondrij absque tumore, id enim significat *ὑπολαπαρὸς*, hypochondriacatum partium inflammationem denunciat; quæ si diaphragma obsideat æqualiter, vtrumque hypochondrium sursum versus reuulsum, sine tumore distenditur. Tensionis autem foras conuersæ duplex ratio est; vna quidem cum mollitudine hypochondrij, ut in Hermocrate & Adolescente; altera verò cum duritate, quando conuexa pars hepatis, tumore insigni obsessa est: de qua in prognost. Atque tensionem huiusmodi, duram scilicet & dolorificam, declarat illud quod sequitur.

SI DOLOR AD IUGVLVM ET ACRQMVM SE OBFI RMET] Nam iuguli fixus dolor symptoma est inflammatae partis conuexæ: eaque inflammatio citam mortem adfert; nisi hæmorrhagia liberali periculum depellatur.

34 Οἱ τριταμοφυέες, ἀσπώδεες, πυρελοὶ κακοήδεες.

Tritaphya febres, fastidiosa, terrifica.

QUE sint & cuiusmodi febres tritaphyæ, iam diximus ad 27. Sunt autem natura malignæ, tum specie & idea; tum magnitudine, more & motu; periodico, vniuersali, & particulari. Est enim febrium tritaphyarum cacoehymia maligna & multiplex; vires acquirunt cundo, diebus criticis exardescunt, grauissimisque symptomatibus ægros cumulant. Denique nihil sit, nihil apparet in eiusmodi febribus, quod metu non terreat magis ægros & medicos, quam spe boni consoletur. Tam inimicarum febrium descriptio & historia legitur sectione 2.1. *ἢ ὁπδημῶν*; ad quam referre & examinare oportet aph. 43. lib. 4. Iam verò si ad imperum tritaphyarum accesserit *ἀσπῆ*, ut sint *ἀσπώδεες*; pessimè est ægro: non ob eam sanè causam quòd adferant cibi fastidium & *ἀποσίαν πύτων γυνάτων*, i. auersione omnis edulij, (id enim symptoma talium febrium esse solet *ἀσπῆ*) sed quòd iactatione illa sint importunæ, quæ omnis figuræ & loci impatientissimos reddit ægros.

35 Αἱ ἐν πυρετῶ ἀναυδίαί, κακόν.

Si quis in febre fandi sit impotens, malo est loco.

comment. in
hist. 3. p. 3. lib.
3. Epidem.

Gal. ibidem.

hist. 15. p. 3. 3.
Epidem.

ANAYΔΙΑ, i. fandi seu loquendi impotentia, nomen est nondum Galeno vsitatum, nec tritum. Illud enim præfatione quadam emollit, cum ait *πλὴν ἀφωνίας* grauiorem esse *τῆς, ὡς αὐτὸς πρὸς ἀναυδίας*. Quid autem intersit inter *ἀναυδίας* καὶ *ἀφωνίας*, declarat illud Hippocratis in historia de Pythione, quem scripsit fuisse *ἀναυδὸν καὶ ἀφώνον*, i. non sermone solum, sed etiam voce captum. Sic enim Galenus, *ἀναυδὸν*, inquit, Hippocrates Pythionē dixit, ex eo quòd loqui non poterat; *ἀφώνον* verò, quòd faucibus vox hæretet, nec audiretur. Iam verò cum alia sint vocalia instrumenta, alia dialectica; atque inter dialectica principem locum teneat lingua; erit sanè *ἀναυδία* paralytica; linguæ symptoma: aphonia verò *ἐλάτης νεκρῶσας ὅτι γὰρ ἐλάτης ἢ ὅπως ἐρότων*, i. Caloris penè extincti indicium est in iis qui sic afficiuntur. Hinc enim significatio fit collapsæ potentiz animalis, penèque extincti caloris vitalis, vnde vocalia instrumenta motu priuantur, materiæque vocalis non sufficit ad vocem edendam. Ut enim vegeto calore vitali magna vox editur, quòd multus aer spirando ducatur, accedente etiam thoracis virtute; quoniam ex duobus magnis ut magnum quippiam fiat necesse est: sic in paupertate caloris, & thoracis infirmitate; exiles & obscuræ voces magis minùsve audiuntur. Ex quo fit, *πλὴν ἀφωνίας ἐν ἀκυσίᾳ thoracis* & materiæ vocalis inopia; denunciare; illinc, facultatis animalis vires effectas; hinc verò, natiui & viuifici caloris extinctionem. Ergo nisi quis *πλὴν ἀναυδίας* contenderit esse *πλὴν σιγῆς*, i. silentium (quod in ægris melancholicum est, quem admodum garrulitas phrenitica) perspicuum est *πλὴν ἀναυδίας*, paralyticæ linguæ symptoma, non tam suopte vitio abhorrendam videri, quàm metu grauioris mali, i. paralyticos aut paraplegiæ: oppresso, nempe cerebro nimia crudi humoris abundantia, qui vel in eo localem habuit generationem, vel translationem illuc. Quemadmodum autem, nervi septimæ coniugationis oppilatione; rigis que musculis linguæ per ingressum currentem, incidit *ἀναυδία*: sic paraplegia aut etiam paralytis, ab eadem causa prope adest, quòd ipsa medulla dorsalis propius ablit à nervo septimæ coniugationis, quàm ab aliis omnibus qui cerebrales dicuntur.

36 Οἱ κοπιώδεες, ἀχλυνώδεες, ἀγρευπνοὶ, κωματώδεες, ἐφιδροῦντες, ἀναδερμαινόμοροι κακόν.

Qui cum lassitudine, caligine, vigilijs, comate, sudatiuncula, aestu incandescent; pessimè agrotant.

IN HAC prognosi complexio est gravissimorum symptomatum, quorum vnumquodque metum adferre debet infelicitis exitus, quando cum febre coniunctum est: ut nihil necesse sit ea simul existere ad exterrendum. Ac primum scire licet *ὅτι ἀσθενησάντων*, hoc loco, dici eos qui febris ardore incandescent. Nam in prorrhico *πυρετι κακότητες* vsurpantur pro eo quod hic legitur, *ἀσθενησάντων κακόν*. Sed & *ἀσθενησάντων* planè idem significare leguntur, quod *ἀσθενέστερες*, comment. ad prognosin illam, *Οἱ ἐκ κατὰ φύσιν ἰδρώδεις ἀσθενησάντων, κακόν*, i. *Qui ex perfrigeratione sudantes incandescent aestu, periclitantur:* *10* *quamvis ἀσθενησάντων* verbum sexceteris apud Hippocratem legatur, & intelligatur pro calore partium quæ perfrixerunt. Ratum illud, *Αἱ ἐκ ῥίγος κατὰ φύσιν μὴ ἀσθενησάντων, κακόν*, i. *Qui ex rigore perfrigerati denuo non incalescent; male sunt.* His ita constitutis, superest demonstrandum, febres continuas sine vlla expectatione discessionis & crisis, quæ coniunctum habent κόπος, aut caliginem, aut vigilijs, aut comate, aut sudatiunculam, omnino videri & esse detestandas.

Enimvero febres *κοπιώδεις*, nomen habent ἀπὸ τοῦ κόπου: & qui lassitudine fracti sunt, *κοπιώδεις* etiam, ut ipsæ febres, nominantur. Est autem κόπος totius corporis omniumque artuum quassatorum molestia, per quam neque ipsi quiescere, neque moveri possunt vel minimùm, sine lassitudinis sensatione. Sed ut illius τὸ κόπου duæ sunt causæ, labor & ocium: ita febrium, quæ inde *κοπιώδεις* dicuntur, duo genera quoque existunt. Sunt enim quædam à labore ardentes, ab acribus & biliosis ichoribus intro in venas, ut dictum est, attractis. Sunt etiam sic nominatæ, quas parit suppressio excrementorum, quæ in peculiari cuiusque natura redundare consueverunt: ac ferè in vetustatem incidunt febres huiusmodi *κοπιώδεις*, per aphor. 44. lib. 4. & 1. lib. 6. Epid. Præterea ut erit distinctio specierum laboris, vlcerosi, phlegmonosi, tensivi; & temporum quibus prænuncius, coniunctis & successivus existit; ita quoque varia morborum idea statueretur. Sunt igitur febres *κοπιώδεις* his de causis horrendæ. Namque ardentes specie ipsa nos terrent; quæ si coniunctam habent vlcerosi aut phlegmonosi laboris sensationem, delirij & insanix metum adferre solent, prorrh. 3. lib. 2. Sin autem prænuncius labor fuerit *ἐλκώδης ἢ φλεγμονώδης*, deterior multò videbitur morbificæ causæ conditio, quæ rapta in venas corruptione, in vitio est. Quod si idem labor successerit, damnum adferet ei parti, neque abscessus quantumvis critici certa crisis perficietur: ut in parotide, in huiusmodi febribus sæpe oborta, ex inchoata hæmorrhagia. Restat febris *κοπιώδης*, cuius esse solet prænuncius, comes, & successivus κόπος: non is quidem qui ἀπλῶς dicitur, qui venit ἐκ πόνου, & musculo generi πόνον inducit: sed is quem αὐτόματον, i. sponte sua abortum veteres nominarunt. Eius quidem febris difficillima curatio est. Quoniam quò diuturnior est causarum morbificarum impressio, eò morborum periculosior generatio. Difficultas pepasmi propter materiæ contumaciam, diuturnitatis causam adfert. Naturæ diu multumque oppressæ sopita virtus, meatuum angustia, desperatam faciunt excretionem. Solo abscessu crisis futura speratur: nisi abscessus materiam & occasionem præcipiat vrina crassa multa & alba; qualis Archigenis seruo profluxit.

Sequitur explicatio febrium *ἀχλυνώδων*, quæ ob eam causam sunt formidabiles, & *ἀχλυνώδεις* febres, quæ vaporibus caput replent & sensuum instrumenta: unde efficitur ut mixtione infectus humor oculorum aqueus, qui naturaliter lucet splendetque; *θάλασσι*, i. perturbationem, exhibeat crystallino humori sensuique communi: tum etiam spectantibus ægri pupillam. Quæ causa est cur visa occurrant fallacia & turbulenta, qualia descripsit Hippocrates in Dealcis vxore, *ἐψλάφα, ἐπλην, ἐγλυφεν, ἐπερροῖα*, i. palpabat, auellebat, sculpebat, festucas carpebat. Ac talia sanè symptomata funesta esse dixit in prognostico, si non sint κρίσιμα. Sic in prorrh. scripsit, *ὄμμα ἀχλυνώδες κακόν*. De comate, vigilijs, & sudatiuncula, non est quòd magnopere laborem. Iam enim multa dicta sunt: & plura suis quæque locis dicuntur.

37 *Οἱ κοπιώδεις μὲν φέουσιν ἐφιδρώσαντες κρίσιμῳ, ἀσθενησάντων θέντες ἐν ὀξεί, κακόν· ἄλλως τὴν αἷμα ἱππιάζωσι πρὸς ταῦτα.*

Si quis in febre laboriosa cum perhorruerit, nonnihil criticè exudarit, indeque febris acuta exarserit, funestum: idque cum aliàs; tum si in hoc negotio sanguis stillarit.

Huius difficillimæ prognoseos mens potissimùm eò spectat, ut intelligamus; calamitatem & exitum ægrotis denunciari, quando frustra crisi tentata quæ morbi erat propria; morbus ipse vires acquirit, deque natura triumphat: cuius triumphatæ signum est, cum ipsa per translationem multum oppressa, rursus aliam studet inire crisin, ex qua leuatio nulla expectabilis: ut nulla esse solet ex sanguinis stillicidio, nisi hæmorrhagiæ liberalioris opinionem faciat: ut sæpe facit quando cum vrina pepasmo in quartum diem incidit, apparétque ad hæmorrhagiam septimo die futuram. Nec verò huius mei theorematidis fidem derogare videtur 25. Coac. si cui cum perhorruerit atque sudarit criticè, rursus postmodum horror sine causa ingruerit; tum à pepasmo somni sit expertus; huic venturam hæmorrhagiam arbitror. Illic

enim docemur varias esse morborum eundem criseis, illamque varietatem criseon sæpenumero denunciarī vna eadēque concussione, quæ à rigore suscipitur. Sed id locum habet in diuersorum focorum plethora, quæ neque ipsa per se maligna est, neque coniunctam habet viscerum inflammationem: deinde in liberali excretionē, vt in sudore & hæmorrhagia. Hic autem febris laboriosa est, ergo malignæ & multiplicis cacochymię particeps. Deinde hic pro rigore horror ciētur criticus, propterque irritus & inefficax: quoniam talis horror denunciat naturam morbificis causis oprimi, summamque esse humorum cruditatē; vt nihil tum salutariter possit excerni. Quod si quis obiiciat, rigorem etiam moderatum, ciere liberalem hæmorrhagiam: sanè quidem, sed in plethora corporis. Præterea illic sudor legitur; hic sudatiuncula, quæ simpliciter adducta, fatiscētis naturæ est argumentum. Quinetiam hic febris exardescit à sudatiuncula; illic à sudore mitescit. Atqui multum interest inter prauam & inchoatam crisin; sudor est κρίσις κρίνων, i. indicatorius indicans: ἐπίδρωσις verò ἀκρίσια δύσκρισις, i. priuatio crisis sinistra. Quod enim à sudatiuncula hic febris exarsit, & ἐπίδρωσις arguit cacochymię effera, tum symptomatice translationis ad diaphragma & caput. Accedit huc, quod vndecunque humor ciētur, si exitum non habet, oppressionis damna adiungit. Postremò hic sanguinis stillicidium video; illic hæmorrhagiam expecto. Atqui nullum stillicidium in bono ducendum. Contrà δύσκριτον ἢ πανατώδες, i. aut prauum iudicij, aut omnino mortiferum existit. Ac δύσκριτον quidem in qualitate bona sanguinis: πανατώδες verò in mala; qualis esse solet sanguinis meracioris & nigri.

38 Ικτεριώδεις, κατακορέες, θνήσκοισι. λευκὸν διαχώρημα τοῦ ἵεοις
περὶ δ' ἐρχεται.

Ictericī multum fœdati pereunt. Alba deiectio iis vnà secedit.

ICTERICI qui sint, & vnde nomen habeant, nihil necesse est scribere: quod neminem scripta mea lecturum existimem, quem ista nescire persuasum habeam. Sed ex ictericis qui moriantur, qui contrà eo morbo defungantur, operæ precium est propalam explicare. Sanè moriuntur icterici, nec vnquam fœdum colorem eluere possunt, qui vel à motu morbi; vel ab hepatis inflammatione; aut scirrho; vel à veneno, potione aut morsu immisso, ita colorantur. Sic Hermocrates sexto morbi die factus ictericus, tandem obiit. Quod Heraclidæ etiam contigisset ab ictero sexti diei, nisi triplicis variationis beneficio, diarrhœæ, perirrheæ, & hæmorrhagiæ, morbum depulisset. Nam Phanagareoni talis icterus fuit lethalis; cui neque ducta est aluus, neque vrina profluxit, neque sanguis erupit. Ex quibus aphorismi illius veritas elucescit, Quibuscumque in febribus icteri ante septimum superueniunt; malo sunt loco. Moriuntur etiam quorum icterus symptoma est κακὸν ἔργον τοῦ ἥπατος, i. scirrhus, ἢ φλεγμονή, ἢ ἔμφορξις, i. Malè officium facientis hepatis à scirrho, inflammatione, vel obstructione. Quæ vitia illo aphorismo continentur. Hepar ictericis indurescere, malum. Nam quod cuitari non possit icterus venenatus à morsu aut potione; id verò meridiana luce clarius esse arbitror. Atque hi omnes symptomatice facti icterici, saturato colore flauent: cuiusmodi colorem ita depinxit Hipp. Ικτερός πῖος δὲ ὅτιν οὐδεὶς, καὶ δὲ πῖος δὲ ἀποκτείνων ἢ χροὶ ὅλη σιδωιδής, σπῆδρα ὅτι χλωρότερη, ὅτι οἱ σπύροι οἱ χλωροὶ, παρόμοιος δὲ καὶ ὁ χροὶς καὶ τὰ ἔργα ὑφίσταται ὅτι ὁρόσιον πυρρόν, i. Icterus acutus est qui celeriter necat, est eiusmodi. Color vniuersus similis cortici mali granati, lacertis virore similis; sanè est cutis tota eiusmodi. Vrina hypostasis est orobea ruffa.

ALBA DEIECTIO IIS VNA SECEDIT] Alba dicuntur biliosæ tincturæ expertia, quæque huiusmodi non sunt à colore cibi quo vescimur (etenim à pulicula siliginea, nihil mirum si aluus excrementis albis feratur; vt neque à pulicula leporina, si nigris.) Huiusmodi autem fiunt, teste Galeno, cum bilis non amplius in ventrem confluit: sed vnà cum sanguine per habitum corporis diffunditur; idque aut propter obstructionem canaliculi felleis; aut propter ardorem conuectarum hepatis partium. Sed tamen Apollonij icterici talia leguntur fuisse excrementa. Deiectiones erant variae. Aut enim nigrae fuerunt, pauca, æruginosæ, aut pingues, cruda, mordaces. Nonnunquam et lactea visus est emississe.

Supereſt vt de ictero vnde conualeſcunt icterici, hoc loco dicamus. Eiusmodi criticus esse solet, peſſimo indicatus, qui & febris finem adfert die critico; sine hypochondrij durezza; & cum vrinis atque deiectionibus naturaliter coloratis existit. Vide aphor. 64. lib. 4.

39 Οἱ τριταμοφυέες, πλανώδεις, ἐς ὀφθαλμοῦς μετεπεσόντες δύσκολοι.

Tritæophyæ febres erratica, in pares mutata; sunt contumaces.

QUÆ sint & cuiusmodi febres tritæophyæ, iam explicauimus 27. & 34. Tum etiam quid inter ipsas & hemitritæas intersit, 12. Sequitur, vt quomodo tritæophyæ sint erratica, & quemadmodum ex eo motu incerto, certos habeant dierum parium paroxysmos; tum autem quid causæ sit quam obrem ille τριταμοφυὴς contumaciam morbi & ancipitem crisin ac sæpe funestam adferat; hoc loco dicendum esse videatur. Enimuerò tritæophyæ febres naturæ sunt ἀεὶ ἰσχυρῆς, i. quæ impari dierum numero exardescunt; vel quæ symptomatum accessione diebus imparibus, sunt eximie & excellentes. Id enim facit bilis, quæ

tertio quoque die cumplata & putris mouetur. Sed quoniam non vnus tantum bilis dominari hæc febres tenentur: sed cacochymiz multiplici corruptione & vitio accenduntur; ferè fit vt corruptionis incremento & irritamento, lacessitarum partium complexio alteretur & immutetur; ipsaque, vt ita dicam, *αἰματώδης* vertatur in *σπασμῶδης*, i. dierum imparitas in paritatem. Ita enim comparata est natura vniuersitatis & partium singularum, totiusque adeo naturalis œconomiz; vt æqualia & similia quæ ab eadem facultate alterantur, prorsus æqualia faciant excrementa. Quinetiam tempus collectionis eorum excrementorum vt sit æquale necesse est. Nam partes quæ aluntur, quoad naturaliter constitutæ fuerint, ab eodem nutritæ alimento, æqualia quantitate, similia qualitate, eodemque temporis tractu colligent excrementa, eademque periodo expellent. Atque ex illa similitudine & æqualitate, pariter æqualiterque collectorum & exclusorum, inoffensa perennitate, morbi existunt benèque constituti, ac ferè secundi iudicii: quos *ἐντενὺς καὶ ἐκριντὺς*, vocant. Quales regnare dicuntur quando anni tempora sua quæque exhibent *ὡς αἱ ὁρμαὶ*, i. tempestiua temporibus aph. 8. lib. 3. At si tempestiua non sint tempestates annorum, ipsaque defectio temporum in tempestatum alienatione consistat; vel etiam diata in vitio fit; ex illa multiplici & maligna cacochymia inde nata, labefactatur valde naturalis œconomia; & æqualitas partium gignentium, mittentium, trahentium; aut suscipientium excrementa. Hinc morbi nascuntur & exacerbantur *ἀγέλητοι καὶ δύσκριτοι*, i. inconstantes ac difficiles iudicari. Quales fuisse legimus tritæphyas febres, quarum explicatæ iam causæ præter cætera negotia quæ facessiebant agrotis, eam quodque molestiam adferebant, quod *ῥέπαι, δυσχερεῖα, καὶ πᾶσι ἀπᾶντος, καὶ πεπλημμένως, καὶ ἀκρίτως πᾶσι, τῶν διὰ τὴν γυνόμενα*, i. morbi longi, difficiles, inordinati; erratici, iudicii difficilius. Sed nondum hic video tritæphyas videri erraticas incerto ordine particularium paroxysmorum, vt reuera dicuntur erraticæ: sed insperata vel inexpectata symptomatum accessione, exempli causa, rigoris quem scripsit Hippocrates; illic cieri consueuisse *ἀπᾶντος καὶ πεπλημμένως*. Itaque sic erunt tritæphya febres erraticæ. Sed quomodo accessiones illarum febrium quæ olim fiebant *ἐν ταῖς αἰματώδεις*, nunc fiunt *ἐν ταῖς σπασμῶδεις*; vel quomodo ipsa *αἰματώδης* mutatur in *σπασμῶδης*?

lib. 2. de feb. 16.

12

13

14

aph. 17. p. 3. lib. 1. Epid.

Enimuero quantum complector animo, huius mutationis causam repento, incertos rigores, qui medio febris cursu exacerbantur, i. cum prior biliosa febris mitescere incipit; exardesciente altera, pari die rigor cietur; cuius irrita concussione & maiore incendio conflagent agroti, & per translationem miserius tractantur. Quæ de re illud extat iam demonstratum. Tritæphyarum febrium incerti rigores, qui medio febris cursu exacerbantur, valde maligni. Medium autem cursum vocat, medium iter periodi particularis, quæ horis 48. absoluitur. Ergo cum exacto priore paroxysmo biliosæ febris, & inchoata alterius exacerbatione, rigor incipit; palam est multò maiorem fore afflictionem dici paris, i. secundi; quàm fuerit imparis, i. primi. Est autem ille *σπασμῶδης* qui paria exhibet, difficilis ac sinistri exitus; primum quod rigor ille *τῷ ἀρπασμῷ* causa, fit, *τῷ κρίσει μὴ κρίνον*, quia non cietur *καὶ λόγον*, i. merito naturæ, nec *κατὰ λόγον*, i. immerito cacochymiz malignæ. Itaque loco non cietur, proptereaque malè. Quæ paribus diebus exacerbantur, paribus et iudicantur: quæ verò imparibus, imparibus. Atqui tritæphya febres periodorum particularium, paroxysmos habet diebus imparibus. Ergo feliciter paribus iudicari non possunt: quoniam bona crisis ferè fit in ordinario paroxysmo. Hic autem dierum parium paroxysmi sunt extraordinarii, qui nullum certamen naturæ & morbi in procinctu esse denunciant: sed contra irritatæ frustra naturæ oppressionem cum infirmitate coniunctam; ex priore paroxysmo, tum verò ex horum importuna vi, quæ cernitur in ardore, maligna cacochymia, & obsidione nobilium partium quarum officio vitæ carere non potest. Consideratè autem ipsas nominauit *δυσκόλους*, quamuis *παπενόπερον*; quoniam difficultatum illarum myriadem sic obseruauit. Similiter illa contingebant iis qui seruabantur, et qui non. Sunt autem *δυσκόλοι* contumaces quidem morbi: sed ramen *ἀμύνδωτοι*, quod hic locum non habet. Plurimos enim tritæphya febres interimunt. Nec solum hæc febres tritæphya, quæ ex euentu paribus exacerbantur: sed illæ etiam quæ sunt eiusmodi proprio motu periodico, sunt *δυσχερεῖα τῶν πρῶτων*; vt quæ per initia imparibus paroxysmos habent, aut diurnitatem morbi indicent, aut pessimam crisin sexto die venturam. Nam cum vehementer primo die agrotant, & quarto prauum experiuntur paroxysmum; sexto moriuntur.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

40 Οἱ δὲ κρίσιμοι σιν ἀλυσμοὶ ἀνδρῶντες, ψευδόμενοι, κακὸν καὶ ἀπαντες δὲ οἱ ἀνδρῶντες ψευδόμενοι ἀκρίτως, κακὸν.

Quæ diebus criticis una cum frigore iactatio incidit, expers sudoris, mala. Atque in uniuersum, omnes qui sine sudore in iudicato perfixerint; malè vexantur.

60 Satis iam de alysmo aut etiam nimium multa 2. 19. 34. sed illic quatenus in vitio est semper, eius causam quaesiuimus. Hic autem boni & mali alysmi distinctio continetur. Enimuero symptomatice omnes qui nullam spem adferunt crisis, cuiusmodi cernuntur in iis quos scripsit *ἀσυνδίας αἰματώδεις ὀππὸρρο-ζυωμένοις*, i. iactabundos sine vomitu, insuper vexatos; omnes, inquam, toto genere pestiferi sunt. Mali sunt etiam atque terrifici, qui malè gestæ rei ob intentatam crisin merito accusantur: idque diebus criticis,

prouh. 27. l. 2. 1.

quibus quæ sunt omnia quæque apparent, firmiora sunt, quàm quæ in alia incidunt morbi tempora. At sanè huiusmodi sunt, de quibus sermonem instituit.

Ergo. *QVAE DIEBV: CRITICIS*] I. Periodis quaternariis, ante vigesimum diem; septenariis, ante quadragesimum; vicensariis, ante centesimum.

VNA CVM FRIGORE] Non quidem periodico paroxysmi particularis; sed critico: vt sit *ἐν κρίσει*, i. significatio certaminis naturæ & morbi quod in procipectu est, eoque frigoris nomine significetur rigor.

LACTATIO INORDIT] Non illa quidem *ναυγάδης* nauseans, quæ morfu bilis excitatur in stomacho: sed altera longè peior, quæ sit oppressione vitium cum viscerum æstu coniuncta; per quam omnis loci & omnis figuræ impatientissimi sunt ægri.

EXPERTS SVDO RIS] Ex quo efficitur eam iactationem, anxitudinem, siue alysmum, incidisse in morbo, cuius symptoma est: non autem ipsius naturæ decertantis pro sua salute. Omnia enim quæ sunt quæque apparent in morbis, eiusmodi sunt vt spem adferant prosperi exitus, aut metum infelicitis, quatenus cveniunt illi *ἐν κρίσει* naturæ & *ἐν κρίσει* morbi; hic verò *ἐν κρίσει* morbi & *ἐν κρίσει* naturæ.

MALA] Quoniam iudicatoria non iudicantia aut sunt lethalia, aut difficilis iudicii. Sed illud leuius quam si grauiorum symptomatum accessione, diebus criticis, deuicta natura, accidere videatur.

ATQVE IN VNIVERSVM OMNES QVI SINE SVDORE INVICATO PERFRIXERINT, MALE VEXANTVR] Damna rigoris, frigoris, & horroris cum frustra sunt motu malignæ cacochymix, aut virio purulenti abscessus; omnia sunt *ἀδυσπλόως* explicata. Superest illud dicendum, quod non solum desiderato sudore; sed etiam vomitu & deiectione, malum est frigus; ac multo peius irritum frigus, quàm *ἀδυσπλόως* *καὶ κρύος*.

41 *Καὶ οἱ Πιπρίζωσαντες, ἐκ τούτων, ἐμέσαντες ἀκρητα, ἀσπώδεις, ὀσμώδεις ἐν πυρετῶ, κακὸν καὶ ἀφωνίᾳ δὲ ἐκ πύρεος.*

Quinetiam qui riguerunt, indeque syncera vomuerunt, fastidiosi, tremuli in febre, miseri: quemadmodum à rigore aponia grauis.

CAPVT est ad horum explicationem, illico adferre quod probatum esse debet omnibus; omnem perturbationem criticam, non solum in virio esse cum frustra suscipitur, vt esse solet signo & causa: sed multo magis si excretionem cieat materiæ ex qua plus incommodi denunciatur atque percipitur, quàm adiuuenti. Sed quid adiuuenti posse adferri putem ex eo quod toto genere contra naturam gignitur atque ciatur? Vetus illud; *si talia purgentur qualia purgari oportet, conferi; & leuiter ferunt.* Ergo rigores qui superueniunt, cuiusmodi sunt, critici aut symptomatici, non autem periodici; haud solum eo nomine molestiam exhibent atque negotium naturæ facessunt; quod frustra ciuntur: sed quod eorum concussione materia excutitur vomendo atque deiciendo, vnde spes salutis proiecta.

A perturbatione critica omnis incommoda excretio mala est. Sic prorrh. 29. C. 2. R. *Vomitum cum iactatione synceri; mali.* Nec solum vomitiones: sed etiam deiectiones, hæmorrhagix, spura syncera sunt praua, ex ea sinceritate, vt ita dicam; incommoda; & quæ cum exprimuntur, præsentem mortem intendant: vt Philisco quintum morbi diem agenti, stillicidio sanguinis nigri & pauci, mortem citam attollet sexto die: Philista interiit quinto die à vomitu bilis, primum flauæ, mox æruginosæ. Sed hæc morborum acutorum propria sunt & cum lethalibus signis coniuncta. Sunt autem *ἀκρητα* idem quod *ἀμύετα*, in sua quæque complexione & consistentia, i. sui quæque feri naturalis expertia: cuiusmodi cernitur sanguis niger, bilis æruginosa & nigra. Nam quæ vnà pariter & qualiterque aut vomuntur aut deiciuntur, aut etiam extrussuntur æruginosa & nigra; & quæ sunt illa sua quæque specie *ἀκρητα*, quamuis mixta, atque si per se singula exprimerentur. Sic præceptor, *Deiectiones varix & variegata ad diuturnitatem sunt morbi. Ac mortifera sunt nihilominus. Ac si colores omnes idem vomat, valde est mortiferum.*

Quid verò, nonne huc spectat in aphorismis; Et quod *varij colores illi deteriores fuerint; maius ostenditur malum.* Sed in vomitionibus, deiectionibus & sputis, laudantur excrementa bilis & pituitæ *ἰσχυρὰς ἐν μίξεσιν*, i. accuratè permixta. Quæ accurata permixtio existere nequit, nisi & mitia sint excrementa, & virtute caloris nativi in vnum coacta. Ergo vt vomitio vtilissima est, si pituita ac bile permixta est quàm exactissimè: ita syncerior siue meracior, pessima. Verum nimirum synceritatis illius malignitas medicum terret, ex perspicuitate efficientis causæ. Quoniam pituita syncerior, ab intemperie frigida eam concretionem accepit. Sanguis autem niger, bilis item æruginosa & fusca, huiusmodi cernitur cum exudarit tenuis humor ab incendio, quo sanguis aut bilis primigenia conflagrauit. Atque de crassiorum & meraciorum excrementorum causis ita conclusit Galenus; *Crassescunt omnia duabus ex causis contrariis, calore & frigore; euaporante quidem calore, cogente autem frigore.*

QUEMADMODVM A RIGORE APHONIA] Sic legendum putamus, emendando Græcum exemplar, vbi legitur *φωνή*; ex illo, *Quæ rigore incidunt aponia*, &c. Nam partium postularum frigus est conuulsificum, 7. Coac. Et, *cum opisthorono rigor necat.* 23. Coac.

42 *Τὰ δὲ ἐκ πύρεος, μικροῖσιν ἰσπῶσι, ὡς ἐν κρίσει, κακόν.*

Si quis autem à crebris rigoribus cum parvis sudoribus perfrigeretur; gravissimum habet malum.

AD VERBUM sic verti, Græcum exemplar secutus. Sed in prorrhethico *αὐτὸς δὲ, ἐκ πύθων*, legitur *ἐκ* 34. f. 3. 20
πύθων. Quæ lectio huic sententiæ accommodata, illic à Galeno recipitur & explicatur: sed hîc mea quidem sententia, probari non potest, quia de rigore symptomatico triplicem prognosin instituit; quarum prima fuit de rigore frustra citato, 40; altera de rigore qui pravam ciet excretionem, 41; tertia de frigorigifero cum ephidrosi. Ergo si à rigoribus symptomaticis (nam critici aut periodici esse non possunt, quos calor & sudor, vel alia quavis bona & salutaris vacuatio non exceperit) si igitur quis à rigore, exiguo sudore maceat & perfrigescat: vel si cui à rigore exiguus & frigidus sudor artus occupet; palam est paruum sudorem non posse videri criticum. Ergo non facultatis expultricis virtute, sed retentricis potius infirmitate manat is sudor; qui quia gelidus est; caloris nariui extinctionem denunciat. Sed huius prognoseos analytica explicatio requirenda ex commentario ad primam.

43 Οἱ ἐφιδρῶντες, ἀχρεῖνοι, ἀναδερμαγόμενοι κακόν.

Qui cum sudatiuncula & somni vacuitate crebro exardescunt; malo sunt loco.

IN PRORRHETHICO leguntur *ιδρώδεις ἀναδερμαγόμενοι*, i. authore Galeno, *ἀναπυρέσθοντες*; gravissimum habere malum. Quod sanè cernitur in iis, qui cum repenti à sudore perfrixerint, rursus calore febrili incandescunt: quod non fit *ἀκινδυνώς*, ut ex causarum perspicientia doctissimè Galenus annotavit. Sed huius prognoseos demonstratio in commentario ad illam prognosin continetur. Οἱ κατωδῶδες, 32. 2.
ἀχρεῖνοι, κατωδῶδες, ἐφιδρῶντες ἀναδερμαγόμενοι κακόν. i. Qui cum dolorifica artuum lassitudine, caligine oculorum, vigiliis, comate, à sudatiuncula exardescunt; habent periculosè. Est enim hæc prognosis reuera 36. Coac. & prorrh. 42. f. 2. 1.
pars catalogi pravorum symptomatum; quæ nihil necesse est simul existere, cum singula per se ipsa sufficiant ad exterrendum.

44 Οἱ ἐφιδρῶντες ἐν πυρετῷ, κακοήδεις.

Qui exiguo sudore madent cum febre, in metu sunt mortis.

HACTENUS de malis sudatiuncula, quæ cernitur cum è thorace & capite miliaris sudor exudat; aut cum eo exiguo subroscidum est totum corpus. Hæc enim metum adfert sinistri iudicii; aut conclamationem vitæ, prout exudat ille sudor per oppressionem partium; aut per infirmitatem potentie retentricis, qua defluit succus alibilis, cuius optanda erat assimilatio. Huc spectat inter alias, 42. huius.

45 Οἷσι χολώδεις διαχωρήσιος ἐξσης, πρὸς σῆθος δῆξις καὶ πικρότης κακόν.

Quibus cum biliosa deiectione premitur morsu pectus, amarescitq; os; malum.

BILIOSARVM deiectionum duplex omnino, in qualitate & excretionem, ratio est; vna quidem *καλὴ καὶ χρησίμη*, i. bene felicitèque ductarum, cuiusmodi sunt bilis subruffæ crassefcæris, qua multum & rarò sine stridore fertur aluus, solida, mollis, & succi plena: altera verò est *πρὸς κατὰ καρετέρων μᾶλλον τὸ χερρῶ, καὶ ἀφροδισίων*, i. saturata nimium bilis atque spumantis, quæ non minus excernendo infesta est, quàm stabulando. Neque enim dum excernitur, hypochondriorum ardor extinguitur: sed exardescit magis; neque iactatio ipsa quiescit, sed maior inde molestia excitatur: quinetiam intestinorum & sedis sua feritate ulcerifica esse solet. Denique non minùs calamitarem arguit visceris unde venit; quàm partibus ipsis 60 quæ fertur molesta est. Gignitur autem potissimum hæc ram effera tamque indomita bilis, *ποῖσι χολώδεις πικρὴ καὶ μυχλοσπαστικοί*, i. iis qui naturà atque diætā sunt biliosi & viscerosi. Huiusmodi autem bilis deiectionem, hoc loco agnoscimus, in qua, quemadmodum morsu premitur pectus, & amarescat os: tum vero quorsum hæc fiant, clarissimè explicandum. Ut igitur *πρὸς σῆθος* propriè anteriorem thoracis partem significat, iuxta illud, *Πόνος στήθων καὶ πλευρῶν*, i. Dolores pectoris laterisque: ita nonnunquam etiam medium 2ph. 14. lib. 3.

lib. r. me
siglar,

illud os quicum dearticulantur costæ, quod à recentioribus error dicitur: vt in illo, Μικρὸς δὲ κεντρικὸς τῷ
 ὀφρὸς τῷ ἐν τῷ στήθεϊ, i. Nam *gingivæ exiguæ* est dearticulationis quæ in pectore. Quod si ita est vt τῷ στήθεϊ pro
 sterno vsurpetur, non erit absurdum eo nomine per synecdochen intelligere eam sterni partem, quæ
 τῷ ἐπιφρεδῆς nominatur, & per metonymian, id quod sub illa eniformi cartilagine continetur, orificium
 nempe ventriculi, quod veteres τὴν καρδίαν nominarunt, à cuius afflictione & morfu καρδιωγμὸς etiam
 nomen habet: vt nihil planè aliud esse videatur commemorata δὴ τῷ στήθεϊ, quam καρδιωγμὸς, aphor.
 65. lib. 4. Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τοῦ τῷ κοιλίῳ καύματος ἰσχυροῦ, καὶ καρδιωγμὸς, κακόν, i. In febribus ardor ventris ingens,
 cum *cardiogenio*, malus. Ergo si bilis effusa sursum deorsumque fluentis feritate, pariter vnà stomachus
 morfu prematur, vnâque pariter alius feratur; perspicuum est perenni generatione bilis, partium affli-
 ctarum præstantia; vicinarum atque communium sympathia, vt cordis viuifici; doloris acerbitate; &
 partium excipientium molestia; conditionem ægri esse miserissimam. Hic autem quoniam bilis acemi-
 næ abundantia per ἀναρρίπνῳ, i. *ascensum*, narat alius & incandescit æstu; efficitur vt continuatè in-
 terioris tunica quæ stomacho & ori communis est, os ipsum amarescat, per aph. 11. lib. 4. & alibi pas-
 sim. Porro autem cùm symptomata omnia sint partium obfessarum & humoris morbifici propria; hinc
 sanè καρδιωγμὸς, erit symptoma stomachi: oris amaritudo, bilis ipsius. Nam amaritudo percipitur hinc
 tum ex bile, vt καρδιωγμὸς symptoma est proprium τῆς καρδίας, lib. 3. progn. Atqui perrarò accidit vt pa-
 riter æqualitèrque sursum deorsumque natura sponte sua cursum inflectat, nisi dominatu morbifici
 humoris & efferi teneatur, vt in cholera morbo. Quinetiam perrarò accidit vt duæ partes tam sibi sint
 impares, vt æqualiter afficiantur, part. 2. lib. 6. Epid. Est igitur, cum biliosa deiectione cardiogenus planè
 malignus.

46 Ἐν πυρετοῖσι, κοιλίῃς ἐμφυσομένης, πνεῦμα μὴ διεκπίπλον κα-
κόν.

In febris, aluo inflata, si flatus liberum exitum non habeat, malum.

33 V T NIHIL est in vniuersi corporis qualitate & habitu, quod magis medici votis respondeat,
33 quàm triplex hypochondriorum æqualitas, quæ cernitur quando illa sunt mollia, solida, & succi plena,
2. progn. εὐνοχα καὶ παρὰ πρὸς: ita nihil apparet quod ad minuendam medici alacritatem procacius faciat,
aph. 4. lib. quàm sponte natus hypochondriorum meteorismus. Est autem meteorismus hoc loco dictus, hypo-
4. aph. chondriorum tumor tractabilis & aspectabilis. Sed cum illius meteorismi multe sint causæ; inflam-
matio; scirrhus; inflatio: atque inflatio quidem vel pressa leuiter ad breuitatem, vel fixa firmiter ad
diuturnitatem; hæc vna est quæ in quæstionem vocatur, ad intelligendum quæ tanta sit inflationis
contumacia. Principio ventris inflatio cum febre coniuncta, inde sanè adest vnde abesse debuit. Nam
talis inflatio quam vel oppilatio; vel spiritus flatulentus; vel ipsa denique intemperies peperit, super-
ueniente febre discutitur, incidendo, tenuando, & ad temperamenti æqualitatem reducendo. *Quicum-*
3. lib. 6. aph. *que ex hypochondrio laborant sine febre, iis superueniens febris laborem exoluit.* Quod si quis dictionum au-
ceps, ventris inflationem, malè ad hypochondriorum meteorismum transferri existimet; sciat is velim,
nomen τῆς κοιλίας hoc loco complecti, non solum cibi & potionis promptuarium, sed amplitudinem il-
lam abdominis quæ subiacet ipsi thoraci: in qua significatione homines prominulo abdomine, dicun-
tur *megastymes*; & ipsæ mulieres grauidæ gestare foetum aluo. Quæ cum ita sint, superest vt causam in-
ueniamus, & explicemus tam contumacis inflationis. Enimvero ventris *μετρωσιμος* cum plurimas ha-
beat causas, tum certè *πνῦμα φουδῶδες*, i. spiritum flatulentum, qui facit inflationem. Sed cum illius inflatio-
nis duplex omnino causa sit; vna quidem in contumaci quadam affectione partium quæ sub abdomi-
ne iacent; altera verò in fugaci occasione rerum extrinsecus petitarum & incidentium; vtriusque ta-
lem attulit diorismum. Nam ea quæ nascitur à contumaci partium affectione, borborygmon non ha-
bet: sed distenta semper & inflata exhibet hypochondria. Altera cum borborygmo coniuncta, paulò
post tandem residit. Nam borborygmus ille, signum est naturæ materiam ad lumbos & ilia depellentis,
supernè deorsum; vnde vel deiectione liberalis; vel spiritus flatulenti cumulara & repentina eruptio.

Ergo ventris inflatio contumax flatulenti spiritus exitum non habentis, signo quidem pessima est, ab intemperie hectica tenuium intestinorum; eorumque peristaltico motu naturali contrario. Sed causa ipsa peior est: quoniam ex ea inflatione constante & contumaci, sexcenta symptomata naturæ præsidia labefactant, corpus infirmum faciunt, virēque morbo adiungunt. Quæ omnia sunt in promptu parēntque omnibus ad cognoscendum, suis quæque locis distincta & explicata.

Symptomata
καταρχῇ non
solum dicun-
tur, τὰ τῶν κα-
λυσθῆναι κατα-
ρχῇ ἐπιφαινοῦσα
ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν-
δυνάμει, καὶ οὕτως καταρχῇ
καταρχῇ καὶ ἐν-
δυνάμει
ut Galeno vi-
sum est, ad
§ 0, 1. promb.

47 Κοπῳδες, λυγῳδες, κῆποχοι κακοί.

Si quis in laboriosa febre singultiat, vel obstupescat; morbo laborat pessimo.

ET LABORIOSÆ febres, & singultuosæ, & quæ cōiunctam habent carochen; omnes ad vnum
 10 videri debent malignæ. Quoniam autem quæ sint, & cuiusmodi laboriosæ febres; analyticè iam expli-
 camus, 36. superest vt de singultuosis primùm, deinde verò de iis quæ κατὰ κράτος existunt, hoc loco di-
 camus. Sunt igitur singultuosæ febres, singultibus crebræ molestis. Atque singultuum illorum natura
 in deprauato ventriculi motu consistit, quando concurritur ad excutiendū id quod sibi molestum
 est. Rerum autem vētriculo molestarum, non quidem in capacitate & aluo, sed in membranis ipsis, tria
 omnino genera veteres statuerunt; flatulenti spiritus insinuationem; bilis acrimoniam & feritatem;
 tum glutinosi humoris pituitosi, aut melancholici contumaciam qua ad ventriculi tunicas contuma-
 20 citer adhærescit. Nam qui ab exhausto fiunt singultus, cū exaruerint ventriculi tunicæ; conuulsionis
 potiùs naturam retinent, quàm concussionis. At multū interest inter cōuulsionem & concussionem:
 quamuis vtræque in deprauati motus genere collocetur. Etenim in cōuulsione natura morbificis cau-
 sis denicta quiescit. In concussionem autem erigit se ad vincendum id quod se lædit. Sed tamen religio
 fuit Hippocrati & Galeno, singultum ab exhausto, nominare conuulsionem; quod ea musculorum
 propria sit, non membranarum. Nascitur conuulsio à repletionem vel inanitionem: ita et singultus. Sit ita sanè,
 singultum ab exhausto conuulsionem esse quandam ventriculi, non propriè dictam; cū propriè dicta
 30 cernatur tantū in partibus quæ naturaliter sponte nostra mouentur: vt in musculis, quando sua
 sponte, non nostra colliguntur. Sed in confesso est, parem vtriusque, & conuulsionis & singultus no-
 xam videri, quando ab æquali siccitate nascuntur. Ac ne plura conseret, quæ plurima leguntur apud
 Hippocratem; sit illud instar omnium, A perurgatione conuulsio vel singultus, malum. Certum est igitur
 ab huiusmodi febribus, quæ singultibus crebræ sunt, exitum certum manere. Etenim illas huiusmodi
 esse diximus; vel à flatulento spiritu; vel à bilis feritate; vel à glutinosi humoris contumacia. Quæ cau-
 40 sa est cur diuinus Plato ex earum causarum perspicientia quam ab Hippocrate hauerat; spirationem
 cohiberi iusserit primū, ad flatuum dissipationem; mox aquam bibere, ad infringendam bilis effere
 acrimoniam; postremò sternutamentum ciere, ad euellendum glutinosum humorem qui contumaci-
 ter ad ventriculi tunicas adhærescit. Fecimus idem ex hiera picra permultis, qui cū continenter sin-
 gultiendo frangerentur, ducta aluo per quinque dies, glutinosi & nigris humoribus; tandem singul-
 tiendi finem fecerunt. Sed ex illis, inquam, omnibus, quantum istæ mali febres foueant; vt ea quæ ocu-
 lis ipsis videntur, planè appareat in omni concussionis causa. Nam πρῶτον illud φυσικόν, vel oppressionem
 50 caloris natiui à dextra intemperanter instituta; vel ῥέπειν à febrili ardore; vel ἀνελόντες κακότητες, i. reuo-
 lutiones sursum molestas accusat. Bilis effere feritate, qui ciuntur, hepatis visio accepti feruntur: per sym-
 pathiam quam facit vicinitas, vel communicatio duorum neruulorum sextæ coniugationis. Quod
 quoties incidit, grauissimum esse malum denunciat. Etenim præceptoris scopus est in his febrium &
 aliorum morborum decisionibus, quemadmodum in aphorismis libri septimi; docere symptomata
 διαφύματα, i. propagata morborum qui vires acquirunt eundo: sed eorum maximè qui cæteros eiusdem
 generis, prauitate præcedunt. Ergo singultus hepaticæ inflammationis symptoma erit, non leuis cuius-
 60 dam, sed insignis & pessimæ, in cuius feruentis sympathiam stomachus trahi solet: partim communi-
 catione neruorum, quos Hippocrates breuissimos esse dixit; ac tum sanè stomachus, illius maximæ &
 pessimæ inflammationis sit particeps: partim etiam bilis multū æstu incandescentis copia, quam in-
 flammatum viscus, continenter gignendo & cumulando, eructat in caput & originem intestinorum:
 cuius inde affluxus & feritate, contigit vellicari stomacho & singultire. Nec desunt etiam qui putant
 singultum ab hepate inflammato sic nasci, quod aluo compressa atque constricta, spiritus exitum ha-
 bere non possit. Erat ex illis quæ proposita sunt de singultu, quem facit conuulsio, illud extremum, vt
 40 diceremus de glutinoso & acri humore qui contumaciter adhærescendo & irritando molestiam exhi-
 bet stomacho, ciētque sine intermissione singultus. Enimuero si ea materia tantū stabularum in tuni-
 cis alui, sine affluxus perennitate, sternutamento excutitur, vel hiera picra excluditur radicitus extirpa-
 ta. Atque sternutamenti auxiliares vires in Aristophane legimus, qui cū singultiendo rumpetur, ne-
 que spiritum cohibendo, neque bibendo leuaretur; tandem ex præscripto Erisymachi Medici, citata
 sternutatione, singultuendi finem fecit. Sed illud artificium medēdi, primus aperuit summus præceptor.
 Laboriosè et indefinenter singulienti, superueniens sternutatio; morbum exoluit. Quod si affluxus perennitate
 50 id fiat cum febre, proculdubio eadem prognoscens incundæ ratio erit, quæ fuit illius, non ita multis an-
 tè literis, explicati.

De carochæ autem cum febre coniuncta, idem profectò theorema ad examinandum demonst-
 60 dūmque in promptu erit, quod antè posuimus, nempe; symptomata hæc grauissimorum esse morbo-
 rum διαφύματα; quæ scilicet superueniunt inualecente morbo, vnde propagatio sit perennis affluxus,
 tanquam ex fontis cuiusdam vberissimi perennitate. Vt igitur carochæ febres malæ: ita quæ κατὰ κράτος in-
 grauescunt. Sed inter coma & carochen hoc interest, quod in illo continent palpebræ; in hac superci-
 liosæ sunt: quod illius causa sit nimia humoris abundantia, neruorum vim exoluentis; huius verò sic-
 citas quæ tensionem parit: qua affectione qui laborant, eodem statu manent. Vide comment. Galeni
 ad 36. prorrh. l. 2. i. Pessimo autem loco sunt carochi: quoniam huiusmodi ferè sunt in febre, à transla-
 60 tione materię sicæ, quæ ipsos & αἰσχροί, i. rubicundos reddit, & cephalalgicos: deinde à suppressione
 alui quæ cephalalgiam auget, peiorémque facit. Huc accedit quod talis carochæ, non ita multò post,
 conuulsionis successionem habet.

In Sympos.

38. aph. 5. lib. 1.

17. aph. 7. 2.

lib. 1. Epid.

aph. 13. lib. 6.

comment. ad
aph. 11. lib. 7.

48 49 Εκνώτε πυκνήσι καὶ λεπτήσι φεύκῃσιν Ταχέως ἀναδερμαί-
νοντες· δύσφοροι. Οὕρε δ' ὑπόληψιν ἐπώδυν (ω) σημαίνουσι· ὃ ἐφι-
δρῆν Τυτέοισι κακόν.

Crebri ex lumbis horrores, cum cita calor vicissitudine, permolesti. Nam ex gravissimam urina suppressionem denunciant.

EXPLICATIO & emendatio quærenda comment. ad 8.

50 Τὸ ὧρ' αὖ τὸ ἔδος ποίειν ἡ, οἷς περὶ θυμὲν εἰσὶ π' ὥρ' αὖ (ω) μὴ εἰ-
δις μὲν (ω), ἢ πουναντή (ω)· πονηρόν, καὶ πλησί (ω) παρακοπῆς.

*Si quis ea faciat quorum sit insolens, ut si appellat animum ad in-
suetam, aut contra; certè gravissimum habet malum: actum delirium
adeft.*

MAGNA vis est ad habitum mentis in iis quæ gignuntur in corpore, non quòd essentiam mentis mutari alterarive posse existimem, (est enim αἰσθητικὴ καὶ ἀφαιρετικὴ, i. alterationis & corruptionis expert) sed quòd in vitio sint meatus per quos ipsa permeat, quibus allabatur, tum ea quibus miscetur. Sic enim diuinus vir, diuinè. Δι' ἑκείνῃ γὰρ ἀγγέλει ἡ ψυχὴ ἀπολαύει, καὶ πρὸς οὐκ αἰσθητικὴν, καὶ οὐκ αἰσθητικὴν πρὸς κατὰ μέγεθος πρὸς αὐτὰ φρονέουσιν. Δι' τὸν γὰρ διωκτὴν τὸ πρὸς αὐτὰ ἐκ διαίτης μετατρέχεται· φύσιν γὰρ μετατρέχει ἀφαιρέσει οὐκ ἔστι, i. Ut enim sunt affecti meatus per quos decurrit, & ad quos allabatur, quibusque miscetur anima; sapiunt ita vel desipiunt. Itaque hac diæta possunt emendari. At natura commutari inaspectabilis non potest. Cuius admirandi theorema-
tis demonstratio in aliarum prognosin enarratione continetur. Ad præsentis prognosin explicatio-
nem veniamus. Quantum ex omni doctrinâ Hippocratis, animo complecti possum, quatuor omnino signa reperio superuenientium deliriorum; quibus scæta sunt febres quæ incrementis auctæ sunt pessimis. Ac primum quidem cernitur in nugarum garrulitate & verborum obscœnitate, silentio quoque ipso. Alterum in dissimilitudine morum institutorum. Tertium in sensationis vacuitate, sensuum irritatorum, actionumque quiescentium in summa necessitate. Quartum in collocatione corporis indecora. Ergo nugarum garrulitas phrenitidis propria est: silentium melancholiz: dictorum factorumque proteruitas & insolentia in Socrate, etiam fugax, insaniz: moderatio & temperantia in Thrasone; αἰσθητικὴ in Dealcis vxore, lethargi: supini aut proni corporis, brachiorum & crurum indecora collocatio, delirij cuiuscunque opinionem facit. Quæ omnia cur ita sint, & ad quem morbi finem appareant; suis quæque locis ἀδύνατος, per Dei gratiam, explicabuntur. Nunc autem dixisse sufficiat; omnium deliriorum superuenientium argumenta, quæ in actionum insolentium nouo splendore, aut solitarum omissione constituit Hippocrates; omnium, inquam, notas & argumenta ex illis quatuor locis, tanquam ex fontibus, duci posse.

Ergo. SI QVIS EA FACIAT QUORVM SIT INSOLENS.] Ut si sapientissimus Hippocrates nugæ garriat, obscœna loquatur: Socrates verò sileat, vel irarum fluctuet æstu, coëptisve immanibus efferum se ostendat: iuuenis Melibœæ, sitis videatur expertus in febre sitifera, idemque spiritum rarò ducat in summa spirandi necessitate: Dealcis vxor modò garriat, modò sileat: postremò qui iacet, manibus cruribusque huc illuc non negligenter solùm, sed fastidiosè & indecorè, sit proiectis.

SI QVIS, inquam, HÆC FACIAT QUORVM SIT INSOLENS.] Natura & educatione, diæta & vitæ instituto: ut nulla consuetudinis & mollis effœminatique animi excusatio possit adferri.

UT SI APPELLAT ANIMVM AD INSVETA.] i. Si appetat animo quæ antè non concupuit: ut si suam sortem non fortè sed ratione datam, qua olim contentus vixit, non prober, sed laudet diuersa sequentes; vel si quis efferatur fastidio in suos æquales, contumacia in maiores, qui antea comitatem & obseruantiam coluit, in eoque cultu bonam ætatis partem consumpsit; aut contrà, si sui negligens à vitæ cursu fœliciter sapienterque instituto reuocetur, pulcherrimisque incœptis desistat: quod in melancholicos ferè cadit.

CERTÈ GRAVISSIMVM HABET MALVM.] Quoniam significatio sit ægri multum febribus causis oppressi, quarum propagatione labefactantur animi instrumenta, quæ illustrat vel permeando, vel appellando, vel etiam permiscendo. De paracope autem cuiusmodi sit in delirio, quæque illius differentiz; quoniam scriptæ sunt prognoses; in illas commentarium differam.

51 Τα ἐν πομπροῖσι σημείοισι καφίζοντα, καὶ τὰ ἐν χησοῖσι μὴ ἐνδιδόντα δύσκολα.

Quæ pravis cum signis mitescunt, aut cum salutaribus nihil concedunt; contumacia sunt.

10 ADOLESCENTES fuere duo, quorum alter febre defunctus videbatur, cum vrinis tenuibus atque nigris: alter cum præputra ventris prolunice & vrinis aqueis, curationem febris lentæ feliciter recepit: uterque tamen interiit, quoniam utriusque in vitio insanabili partes erant, quarum potentia corpus administratur: quod vitium autem non proditur, quàm effortæ langueant, ex diuturna morbosarum causarum impressione, qualis esse solet in hydrophobia ex morfu canis rabiosi; qualis in leuce & venenata lue venerea; qualis etiam in diabete, in quo renum sitis inexplibilis non antè percipitur, quàm insanabile malum sensationem sitiferæ causæ in stomacho excitavit. Quemadmodum igitur non minùs sua debet habere bona suspecta qui repente factus est coloratior & speciosior; quàm mala vereri qui contra consuetudinem multum emacuit & colorem decorumque amisit: ita nemo est omnium qui de se ipso possit videri securus, si antè vigil, nunc soporetur: si antè sitibundus, nunc ~~καλὸς~~ superflite causa sitifera, sitis sit expers. De eius quoque bonis vereri decet, si dolore careat sine causa; si garrulus sileat, cum pravis vrinis; si ab effreni delirio & insaniam tremulus conquiescat; si mutationem accipiat magnæ & crebræ spirationis in raram: & quæ sunt eiusmodi. Sic Philiscus tertio morbi die visus est ~~ἀπύρετος~~ cum nigris vrinis; sexto interiit. Sic Pythion visus est leuari quinto die; decimo tamen obiit. Ne longum faciam, sed legibus, non exemplis complectar omnia quæ ex historiis adferri possunt ad fidem faciendam; hæc prima lex sancitur. Τῶσι μὴ καὶ λόγῳ καφίζαν, ἢ δὲ πσιύεν: ἐδὲ φοβέσθαι λίαν τὰ μολέσθαι γινόμενα καὶ λόγῳ, ἢ ἡ quæ immeritò leuant, non est fidendum; nec vereri valde oportet, quæ sine causa mala innadunt. Altera. Τὰ δὲ βία ἀσήμεως φασισιήσαντα, δύνανται σημαίνει, i. Mortifera, quorum sine signis leuatio est, mortem subesse ostendunt. Tertia. Δὲ καὶ καλὸς καὶ οὐ καλὸς ἐν οὐχέσι, κακόν, i. Situs sedata immeritò in acutus, malo est. Quod pertinet etiam scriptum ad finem primæ, ἐπανοίματα θήσκοισι. Nam febrium ipsarum insidiosa leuatio est ~~ἀπὸ λυπηλῶν σημείων~~, i. sine signis leuationis. Sed causæ illius criticæ, atque signi, veritas conspicitur in angina faucium, quæ sine rubore ceruicis & sterni, aut sine purulenta secretionem residit: proptereaque illic ἀσήμεως; hic verò ἀκρίτως, euauisse dicitur; ad generationem anginae gutturalis funestæ. Pars altera mihi restat, de signis vtilibus quæ frustra apparent.

30 A V T C V M S A L V T A R I B V S N I H I L C O N C E D V N T. Quid enim? An cum pepasmo nihil concedit febris? Immo sanè frangitur. Nonne etiam phlegmone cum pepasmo puris mitescit, sine palindrome ac sine relapsu? An non pepasmo cuiusque morbosici humoris & citam crisin, & securam salutem denunciat? Dicam audaciùs, qui cum pepasmo interierit, Hippocrates vidit neminem. Quid verò somni benignitas, cibi suauitas, æconomia naturalis integritas, spirandi libertas; ad hæc, sudorum, 40 vrinarum, sputorum bene habita, benèque constituta excretio; nonne hæc omnia, pro cuiusque morbi natura, conuenienter apparentia, spem certam adferunt secundæ crisis? Quid igitur obstat quo minus verè fiant, ægròque proficiant? Dicam paucis quod sentio: pluri esse debet vnum prauum signum morbi alicuius, aut partis obsessæ proprium, quàm decem bona còmunia. Vt si pleuritico prospera res fluant naturalis æconomia, vitalis, & animalis: tamen nisi satisfaciatur expurgatio materiae bonæ, non putris, nec fædi odoris; opinionem faciet futuri interitus. Idem, si cætera medicorum votis respondeant, sola expectorabilis materia in vitio sit, periculo defungi vix poterit: quoniam tale sputum corruptione partis denunciat, cuius officio vita carere nequit. Quod si expurgatio quantitate omni expetenda, doloris vacuitatè non adferat; hic etià spes in angusto erit: quonià ad nobilissimæ partis oppressio- 50 nem, accedit perennis morbosicæ materiae generatio, & perennis affluxus: quod ipsum vrinæ seu inflammatione multum rubentes, aut nimia bile saturatæ, ostendunt. Quinetiam in parotidibus cum pepasmo vrinæ coniunctis; exigua curationis fiducia, si maneant suppurati expertes: propter sympathiam cerebri per progressum, aut transitum ad pulmones. Quod si participes suppurati fiant, nec dum etiam periculo carent, si adsit cruditas: ut in pictoris ancilla; quoniam frustra materia in parte aliqua suscipitur concoctio, si vniuersitatis excrementa sint cruda. Ergo, cum parotidum concoctione, signo utili, nulla sit ~~ἐνδοσις~~, i. remissio, in cruditate vniuersitatis: nec in pepasmo huius vniuersitatis, vlla remissio, in parotidum cruditate & feritate.

Ergo. QVÆ PRAVIS CVM SIGNIS MITESCUNT, A V T C V M S A L V T A R I B V S N I H I L C O N C E D V N T, C O N T V M A C I A S V N T. Contumacia autem vocat, ex ancipiti alea vtriusque iudicij: quamuis ~~τὸ δύσκολόν~~, ~~τὸ ἀντιπρότερον~~ vsurpentur.

60 52 Οἱ ἐφιδρωῦντες, καὶ μάλιστα κεφαλῇ ἐν οὐχέσιν ὑποδύσφοροι, κακὸν ἄλλως τε, καὶ ἐπ' ἔροισι μέλασι. καὶ τὸ πολέρον ὅτι τὰ ποισι πνεῦμα, κακόν.

In acuta febre, quibus cum anxitudine, miliari sudore potissimum caput exudat; gravissimum habent malum: idque cum aliis, tum ab urinis nigris. Quod si accesserit caliginosa exspiratio; damnis augentur.

FUIT semper illud Hippocratis institutum, ut Medicinæ theorematum καὶ ὅλα percepta; legibus & exemplis καὶ ἑκαστῇ, quasi ea quæ oculis cernuntur, visenda & examinanda propalam exhiberet, ad omnem τέχνην comparandam; cognitionis, iudicii & curationis. Quod idem in libris καὶ ἑκαστῇ potissimum factitavit. Illud institutum in hoc diuino opere potissimum cernitur, fidemque faciet proposita prognostis, cuius explicatio ineunda ad normam illius, quæ in commentario Galeni continetur ad locum illum primi lib. καὶ ἑκαστῇ, ubi febrium ardentium funesta symptomata recensentur: 10

Ergo IN FEBRE ACUTA] Ex ardore febrili concepto in bile, quæ substantia est tenuis, temperamento calida, qualitate acris: eaque febris inualefcentio symptomatum propagatorum adiunctionem habet, & malignæ cacochymia.

QVIBVS CVM ANXITVDINE] Quæ ineunte morbo accidit à virium oppressione, per quam nec ægri vlllo consistunt libenter loco, nec alacriter: sed admodum difficulter, locum mutant, omnisque figuræ impatientissimi, coguntur inuiti quiescere, ob virium oppressarum infirmitatem: propterea καὶ ἀνὸς ὕπερος nominantur.

SVDORE MILIARI POTISSIMUM CAPVT EXVDAT] i. Exiguo sudore caput mader. Sic enim capitis sudatiunculam nominavit; ἰδρώτα κατὰ τὸν 2. prognost. Idemque eos qui tam exiguo & miliari sudore subroscidum caput habent. Συμπρά ἐφ' ἰδρώτας καὶ μέτωπον καὶ κνήδας, i. Paululum circa frontem & claviculas exudant, &c. dixit 1. Epid. 20

lib. 1. Epid.

GRAVISSIMUM HABENT MALVM] Quoniam acuta febris specie ipsa prægrandis, tria hinc secum habet coniuncta, quæ putantur esse gravissima; inflammationem, propagationem ac translationem, & malignam cacochymiam. Quæ tria eiusmodi sunt; ut singula per se ipsa videri possint funesta, inflammatio scilicet vel potius ardor febrilis, per μαεζωμόν καὶ σφύγγην, i. consumptionem retorridam; maligna cacochymia, per dissipationem spiritus, & caloris viuifici: translatio denique, per interceptionem officij ad vitam tuendam necessarij. Quod si omnium syndrome sit in febre acuta; quidnam spei reliquum esse potest? Iam verò quemadmodum existere indicentur cum febre acuta, paucis aperiam. Ac primum febris acuta prægrandis, quæ vires acquirit cundo; celeritate, vehementia & assiduitate, citam crisin adfert interitus aut salutis: prout cacochymia est malignitatis experta, aut particeps: ipsaque nobilium partium complexio, propius aut longius abest à naturali statu: Sed difficillimum est in ea celeritate, vehementia, & assiduitate, viscera ipsa mutationem non accipere temperamenti, & complexionis, τῆς κρείσσεως καὶ οὐσιότητος. Hinc peruersio viscerum œconomia, & æquabilitatis gignentium, inritentium, trahentium aut suscipientium excrementa. Hinc etiam retorrida consumptio, vel exolutio viscerum, vnde cacochymia malignæ symptomatumque inde nascentium, fœtura & ilias.

Declarant illud incendium, nigræ vrinæ, paucæ, ac rehues quæ sunt huiusmodi: nigræ quidem, perusto iam bilioso humore: paucæ, tum ab exhausta omni sanguinis rorulenta humiditate, à febris æstu quo multum incanduit; tum vrinæ ductibus iam emortuis. Sed cacochymia malignæ feritas elucescit in anxitudine, qualem descripsimus, quæ non nisi cum oppressione virium esse potest. Eadem spectatur etiam in sudatiuncula, potissimum capitis, & clauicularum: ex qua significatio sit exolutarum partium solidarum, dissipatique necæris viuifici, i. spiritus & caloris vitalis. Sequitur translatio, vel potius transitus & propagatio morbigicæ causæ, superstiti priore foco. Ea cernitur primum in afflictione capitis; deinde in spiratione caliginosa. 40

Galenus negat vsquam legi πύμα γαστρὸν apud Hippocratem: sed errat longissimè; quod pace tanti viri dixerim. Legitur enim lib. καὶ χυμῶν. Idem quoque negat ærem dici γαστρὸν: sed illius animo excidit quod scripsit commentario ad prognosin 48.2. prognost. ubi de spumæ generatione philosophatur.

53 Ακρεα ταχὺ ἐπ' ἀμφοτέρω μελαμπρόντα, καὶ δὲ φα δὴ τοιαύτη πονηρόν. 50

Extimarum partium cita in utrunque mutatio, ac sitis huiusmodi; praua est.

ERAT ex illis etiam quæ inter febrium acutarum mala symptomata numerantur, partium extimarum frigus; quod ipse non prætermisit, ubi ex causarum trium lethaliū perspicentia, singularum signa recenset. Hoc autem signum mortiferæ inflammationis est proprium, quod his verbis expressit, Extimi artus perfrigidi; magisque manus quàm pedes. Nec verò pedum vlla mentio fit in Pythione, Artuum extimorum frigida; sed manuum maximè atque capitis. Enimvero manus & caput propius absunt à fonte necæris viuifici, quàm pedes: ut credibile sit eas partes, & seriùs & minùs perfrigerari quàm pedes. Sed id locum habet in paupertate & interceptione spiritus & caloris natiui, quam vocat ἀπληψία καὶ πνεύματος ἀνατολῆς.

hist. 3. vniuers.
lib. 1. Epid.

aph. 12. 2.

prof. 22. lib. 2.

lib. 3. & 6.
Epidem.
prior. 22. lib. 2.

Moderati hominis proterua responsa, mali sunt ominis.

4 Total

proj.25.lib.k

55 Φωνὴ ὀξεῖα, ὑποχόνδρια τυλέοισιν εἰσω εἰρύεται.

Quibus acuta vox, hypochondria intro sursum ijs reuulsa sunt.

QVEMADMODVM moderati hominis dicta proterua sunt planè phrenitica: sic etiam vox acuta quæ fuerat antè grauis, aliam phrenitidis causam aperit, quæ non in cerebro, vt illa priòr iam explicata; sed in diaphragmate focum habet. Ac talem phrenitidem describens, Ex aliis quoque morbis, inquit, nascuntur phrenitides. Atque hæc quidem sunt quæ pati illis contigit. De dolore queruntur diaphragmatis, ita vt se contingi non sinant. Ergo ne longius excurram in vocis acutæ, grauis, raucæ, canoræ distinctiones & causas; quæ in vocaliũ instrumentorum, mouentium, deducentium, modulantium, & excipientium; i. thoracis, arteriæ, laryngis, atque palati & gargareonis, pulmonũque, varia affectione: tum etiam in materiæ vocalis substantia, qualitate, copia, & exsufflatione considerari solent: pertinet illud propriè ad huius prognosæ explanationem, scire & intelligere, diaphragmatis inflammari vitio phrenitidem quoque fieri, propter eaque partem illam passim τὰς ὀφείας nominari. Sed diaphragmatis inflammari aut resiccati à febrili ardore, quo multum incanduit; aut etiam contracti atque quodammodo reuulsi à tunica succingente costas, ipsum etiam per siccitatem & incendium distendente; certissima signa sunt; hypochondriorum intro sursum reuulsio, & vox acuta quæ fuerat antè grauis. Nam omne symptoma propagatum nouum est quod cernitur in mutatione qualitarum corporearum, caractere, colore, & mole; tum vero actionum ipsarum naturalium, vitalium, & animalium. Ergo vox acuta quæ fuerat antè grauis; expressionem violentam arguit materiæ vocalis, ab instrumentorum oppressione: qualis in sibilo auditur, quando spiritus per angusta viarum, qua data porta, sponte intrumpit; vel à luculento foco attrahitur ad vacuitatem replendam. Hypochondriorum autem reuulsio fit sursum intro; non proprio vitio, sed alieno: diaphragmate scilicet obliquo situ collocato, per societatem peritonæi tunicæ quæ adiacet hypochondriis, ipsa in suæ contractionis sympathiam attrahente, paribus lineis, velut manibus quibusdam obliquis. Quid autem sit illud, εἰρύεται, Galenus explicat comment. ad 10. prorrh. lib. 2. & ad sententiam 3. part. 3. lib. 3. ὅτι δὲ. Atque hæc satis sunt.

56 Τὰ ἐκ κατὰ ψύξης ἰδρώδεος ταχὺ διάσπρμανόμῃνα, κακόν.

Vel melius sic,

Οἱ ἐκ κατὰ ψύξης ἰδρώδες, καὶ ταχὺ διάσπρμανόμῃνοι, κακόν.

Si quis à frigore cum sudarit, citò rursus ardeat; grauissimum habet malum.

EX TAT in hanc decisionem talis Galeni enarratio. Si quis à sudore frigidior statim reddatur, quàm è natura; ac rursus febrili aestu incandescat; periculose laborat. Atqui legitur in textu, frigus sudorificum, non horifer sudor. Sed loci obscuritas in prorrhético, difficultatè hoc modo expediet. Etenim cum superiore aphorismo scripsisset refrigerationem partium extimarum, vel vniuersi corporis, quæ à rigore fixa manet firmiter, sine vlla caloris successione; infirmitatem vel νέκρωσιν, i. extinctionem caloris natiui palam ostendere; subiicit, eam quoque refrigerationem videri mortiferam, quæ à sudore citam adfert siue adducit febrilis ardoris vicissitudinem. Est enim monstro simile flammā sudore accendi, quæ potius extingui debebat: quemadmodum paroxysmi febrium intermittentium sudore mitescunt; & vis febrium ardentium. Sed id locum habet in sudore qui per excretionem fit, expultricis facultatis virtute. At commemoratus hic, causam habet retentricis infirmitatem, cum paupertate caloris natiui, quam declarat κατὰ ψύξιν. Iam verò cita illa febrilis ardoris vicissitudo, inde adeo fieri, mea quidem sententia, videtur, unde & cita partium extimarum in vtrumque mutatio. Quemadmodum igitur frigus 31. prorrh. est fixum & stabile: sic 32. & huius 56. est fugax; non quidem reapse, sed impulsu frequenti flammæ in visceribus; primū quidem, vt iam dixi, accensæ; mox toto corporis habitu ἐκταμῖν facientis, seu clarèscents.

57 Οἱ ἐν ὀξείῳ ἐφιδρωῖντες, ὑποδύσφοροι, κακόν.

In acuta febre, quibus cum anxitudine miliaris sudor exudat; agrotant cum periculo.

EXPLICATIO continetur comment. ad 52.

Οἱ ὀξεί-

58 Οἱ ἀδυνάμως κενεαγείνης ἐκ ἐξουσίας ἀδυνάτοι, κακόν.

Qui abs re, nec ulla exhausti ratione, languent infirmi; mortifere laborant.

IN PROTHETICO decisio hæc ita legitur; Αἱ ἀδυνάμως κενεαγείνης ἀδυνάτοι, κακὰ γίγνεται ἐκ ἐξουσίας, i. *Quæ nullam vacationis causam habent vires inualide, in omni exhausti vacuitate; malam denunciant.*

Cuius prognosens magnum est certè nomen, magna auctoritas, magna quoque species ad incun-
dam ἀκμήν bene convenienterque medendi: quam primus Hippocrates ita constituit; Quorsum na-
tura magis opem requirit, illorum etiam ferre oportet. Ergo si vires sint validæ cum securitate, prius in
curam morbi est incumbendum, quàm refectioi studendum. Contrà, si vires infirmæ sint ineute mor-
bo, ita se comparabit medicus; ut locum & opportunitatem habeat deducendi alimentum, potius quàm
necessitatem exhibendi, cùm minimè est opus, minimèque decet: quando scilicet instat crisis. At vires
multis de causis sunt infirmæ, ut non tam infirmitate commoueri debeamus, quàm infirmitatis causa.

Ac non minùs in vitio est, nec minùs peccat in cōmoda ægri, qui falsò credita infirmitate, cibum præ-
scribit; quàm qui deducit ubi reuera est. Tenenda est igitur infirmitatis causa, ut ex perspicentia illius,
remedia præscribamur, aut morbum oppugnando; aut vires reficiendo: prout natura est opis alteru-
trius indigens. Etenim qui morborum initii contremiscunt, sanguinis detractioe non rarò curan-
tur: tamen si omnis tremoris natura in virum imbecillitate consistit: sed imbecillitatis causa tum iudi-
catur oppressio à suppressione nata, cuius proprium est remedium vacuatio: sicut annotavit Galenus

in Pythione, qui febris inirio manibus contremiscebat. Idem qui faciet aduersus tremorem affecto iam
morbo coortum, fractisque iam viribus; ægrum profectò exitio dabit. Ergo tenenda est imbecilli-
tatis causa, priusquam de alterutra ope naturæ ferenda statuatur: nec temerè vsurpandum verus illud,
quod in peruagato medicorum sermone versatur; Quæ à viribus indicatio sumitur, cæteris omnibus
anteponenda. Etenim vires imbecillæ cernuntur in actionibus quæ tum sponte nostra περιεργίως sus-
cipiuntur; tum sua sponte ἀπεργίως fiunt. Ac sponte nostra περιεργίως suscipiuntur principes, sensiti-
uæ atque morrices in musculis: ἀπεργίως autem, i. sua sponte non nostra, motus cordis, & historia
naturalis œconomiz in coquendo, distribuendo, & excernendo; tum etiam quæ in singulis partibus

absoluitur attrahendo, retinendo, &c. Ergo si corpus est plumbeum, ac ταυρόν; cuiusmodi esse solet eo-
rum qui decumbendo deopluntur ad pedes; si respiratio minutula; si pulsus exilis; nares acutæ; o-
culi concaui; collapsa tempora; deiectiones item lientericæ, hepaticæ; urinæ tennes, crudæ: denique
si crebra sit virium ἐκλύσις, quæ vulgo syncope nominatur; nec vlla vigiliatum, ieiunij, hæmorrhagiæ,
purgationis excusatio possit adferri; palam est, talem ἀδυνάμως quæ cernitur in officio, causam habere
exolutionem τῆς ἰσχύος, quæ in temperamento partium & complexione consistit. Est enim ἰσχύς in sub-
stantia, δυνάμεις in officio. Sic tempestas pestifera vel pestilentia ipsa, crebra syncopis esse solet; primùm
quidem per imbecillitatem cordis; deinde verò per impotentiam micandi. Nam dissipato nectare cor-
dis viuifico, i. vitali spiritu & calore; neque diastole sufficit ad hauriendum sanguinem è vena cava, &
spiritum è pulmonibus; neque systole votis respondet in exprimenda fuligine à syrroë nectaris illius

viuifici per arterias, tanquam per aquaductus, in vniuersum corpus. Eòdem pertinet aphorismus ille:
Qui crebrò ἐν μὲν, sine manifesta causa, exoluntur; inopinatò moriuntur. Melius autem hîc ἀδυνάμως, i.
præter rationem legitur, quàm in prothetico, Περὶ λόγον κενεαγείνης, κενεαγείνης ἐκ ἐξουσίας, i. præter vacationis
modum: immo ubi vacuatio nulla est. Vbi vitium est τῆς ταυτολογίας, quæ fuit insolens præceptorι φιλοσωµῶν;
i. dicendi compendia amanti. Nisi quis fortè distinctionem adferat τῆς κενεαγείνης, vsurpat & pro vacuatio-
ne aspectabili, ut hæmorrhagia, purgatione; tum pro inaspectabili, ut ieiunio, vigiliis, contentione ani-
mi. Ac de aspectabili solennis extat aphorismus. In alui ductionibus ἐν vomitionibus iniuβυ, &c. Sic &
quæ artificio fit medici, purgationi operam dando, si talis fiat, &c. De inaspectabili & occulta scriptum
illud in curatione costarum fractarum. Enimvero inquit, Ἡ μὴ πυρετὸς ὁππότε μὲν αὐτὸς ἐκινῆται, κακὰ γίγνεται
ἐκείνους τῆς ἐξουσίας, ἢ μὴ κακὰ γίγνεται, i. Nisi fortè ipso acuta corripueris febris, peius est inanes esse, quàm cibi plenos.

Itaque non temerè quis illud, ἀδυνάμως κενεαγείνης, refert ad τὴν κενεαγείνην 2. aphorismi lib. 1. hoc autem
κενεαγείνης ἐκ ἐξουσίας, ad illud κενεαγείνην lib. 3. περὶ ὁρίων. Iam ἀδυνάμως hoc loco scribi & legi, ἀπὸ τῆς ἐκλύ-
σεως, i. pro exolutione, demonstrandum. Sanè Galenus nihil inter ἀδυνάμως & ἐκλύσις interelle putat, cōm.
ad prorrh. 4. f. 3. 1. Αἱ μὲν ἐκλύσεις κατὰ τὴν ἀφονίαν, ὁλέθριαι, i. quæ cum exolutione firmiter fixæ sunt sandi impo-
tentie, mortifera. Ut idem doceri vellet quod illo, Αἱ περὶ ἀδυναμίας αὐτῶν τῶν ἀφροσύων, κακὰ γίγνεται. Quod etiam

commentariis nostris mandauimus ad 22. huius. Quæ à rigore cum cephalalgia sunt exolutiones, mortifera.
Postremò commemorabile illud est quòd pluraliter scripserit, ἀδυνάμως, qui pluralis numerus idem
significat quod, Οἱ ἐκλύονται πολλὰς καὶ ἱσχυρὰς, & Αἱ μὲν ἐκλύσεις κατὰ τὴν ἀφονίαν: quemadmodum & λυγρόν, i. incessanter singulinosi, 47. huius ex comment. ad 60. prorrh. f. 2. 1.

59 Ἐν πυρετῷ ἑλξίς οἷς ἀπὸ ἐμέτου ἐς ἀνάχρεμιν τελευτῶσα, κακόν.

60

61

62

63

64

65

66

Diuturna in febre nauseabunda proritatio, screatu finiens; malum denunciat atque facit.

ITA VERTENDUM duxi, magis ex mente doctoris, quàm ex verborum aucupio. Sic enim ille clariùs in hanc sententiam. Τα ἐξέσι ἐμπυώδως ἐκτόματα, φλαύεα, i. *Quæ vomitorio modo in acutis morbus nequicquam trahuntur, sunt funesta.* Hoc igitur spectat ut intelligamus; ægros malè affici, quando ventriculi irrita proritatio coniuncta est cum febre acuta: quemadmodum & καύμα, & cardiognus à feritate bilis æstu in ventriculo incandescentis, & orificium eius morfu lædentis. Qua de re solennis est aphorismus 65. 4. *Εν τοῖσι πυρετοῖσι πρὸς τὴν κοιλίαν καύμα ἰσχυρόν, καὶ καρδιόγνος, κακόν, i. In febribus malum quod circa ventrem est: incendium cardiognus item malus.* Et 45. huius, *Quibus cum biliosa deiectione premitur morfu peccus, amarescitque os; grauißimum habent malum.* Sed illud ἐκτόματα ἐμπυώδως, pertinet ad proritationem alui, quæ propria sponte fit alui in nausea: sicut & nostra etiam, cum scilicet vomituriæntes & nauseabundi, penna vel digito in fauces immisso, vomitionem ciere studemus, sed frustra atque nequicquam. Cæterum ea proritatio quæ frustra fit, non minùs incommoda est, quàm irrita concussio quæ facit singultum, aut quæ est ipsa singultus: de qua iam disseruimus comment. ad illam, *Qui cum laboriosa febre crebro singuliuunt, malè sunt.* Ut enim febris crebra singultibus, adiungit mala: ita quoque proritatio frequens; inflammationis metum adfert in stomacho: aut si fortè sit inflammatio iam inchoata; ipsam perducit ad summum suæ naturæ gradû. Sed eius proritationis causa est nausea contumacissima, quam parit humor efferus, qui contumaciter ad stomachi tunicas adherescit; aut qui à visceribus continenter influit, facitque ut vomituriendo non nihil quis difficulter vomat, nec tamen nausæ vacationem habeat, sed potius incrementum percipiat. Ac sanè inter concussionem λυσιδίη, & nausæam quæ facit ἐξέσι ἐμπυώδως, hoc interest; quòd illa sit ventriculi tunicarum propria: hæc verò stomachi ipsius, qui vulgo cor dicitur: quamuis vtrunque symptoma sæpenumero simul existat.

Iam verò quòd ait, SCREATV FINIENS, nihil aliud planè innuit quàm proritationem irritam, quæ tantum screatus, non vomitus consecutionem adfert: tum propter humoris contumaciam; tum propter partis obfesse infirmitatem. Quo sanè in vitio legimus fuisse mulierem cardialgicam: cui medicinam fecit Hippocrates, prissana & succo mali punici: cuius remedij rationem docet Galenus lib. 2. de alimentis.

60. *Νάρκη ἐς ἀμφοτέρω μετέπιπτεται, κακόν.*

Stuporis utrobique cita mutatio, mala est.

STUPORIS natura in δυσαισθησία, i. *sensione obscura rei molestæ, consistit.* De ea scriptum reperio. Νάρκη ἢ μετερίη, ὀδυώδης λυγρὴ, i. *modicus stupor dolorem lenis.* Quod cernitur in iis qui perfusione frigida articulorum doloribus & inflammationibus vlcere carentibus, exoluuntur. Etenim perfusio frigida, causa antecedentis perennem affluxum inhibet, coniunctæ feritatem infringit: quin etiam stupefaciendo partem affectam, impedit sensionem & perceptionem rei molestæ: in qua sensione & perceptione dolor existit: vel ipsa perceptio est atque sensio. Sed hebetudo sensus causam præterea habet, spiritus animalis paupertatem, ut in amblyopia, & vrinæ quadam suppressione; vel interceptionem, eamque duplicem, nempe; compressiorum nerui, ut in nephritide, *stupor femoris quod edirecto*; aut inchoatam oppilationem paralysicos vel paraplegiæ prænunciam: quia spiritus animalis libertatem non habet permeandi ad eam partem à qua suscipitur actio.

Quæ cum ita sint de natura stuporis, quæ causa videri potest citæ utroque mutationis; ut quiescente sensu, veniat δυσαισθησία, & contrà; aut si fiat ille transitus, quorsum & quamobrem mala est?

Quid enim? nonne terrifica magis est δυσαισθησία, firmiter fixa, quàm quæ pressa est leuiter, quæque etiam habet vicissitudinem sensus? Non enim hic locum habet iam explicata prognosis de extimarum partium cita utroque mutatione: quoniam illa mutatio est rei pessimæ in peiorem: hic rei minùs bonæ, vel etiam prauæ, in bonam. Est enim reapse semper in bonis sensus: δυσαισθησία verò semper omnino mala quæ sponte fit, vti iam dixi. Iam iam erumper ex me vera vox, & dicam quod sentio; τὴν γὰρ λέω μετέπιπτεται, significare τὴν τῆς γνῶμης citam utroque τάρκωσιν: qua voce, utitur summus præceptor aphorismo 10. 5. Ac cita quidem fit utroque mutatio sensionis, & falsò creditæ vacationis causæ molestæ, ἀπὸ τῆς ἀμεινωσῆς τῆς αἰσθητικῆς δυνάμεως, καὶ ἰσχύος τῆς ἀσθενείας, i. *obscuritatem sentiendi facultatis, & vim affectionis ipsius.* Vnde efficitur, ut non priùs exciterur sensio in sensu communi, quàm acrior fuerit in sentiendi: ipsaque affectio summa omnia contineat suæ naturæ.

61. *Σπᾶξινες αἱ ἐλάχιστα, κακὰί.*

Pereuxigua stillicidia, mala.

PEREGRINA sanguinis stillicidia sunt, copia & excernendi modo: cum scilicet paucus stillatim e naribus manat sanguis. Omnia verò sunt difficilia, periculosa, atque terrifica: nisi hæmorrhagiæ liberalioris opinionem faciant: ut sæpe faciunt, quando cum urina peptismo in quartum diem incidunt, apparentque ad hæmorrhagiam septimo die futuram. Secus enim malignos vel multos humores, naturæ dominari regi non posse, aut infirmitatem summā ipsius naturæ, denunciant. Sed ea sunt eatenus difficilia, quarens sinistre iudicantia, aut mortifera. Ac sinistri quidem iudicii, in qualitate bona sanguinis: mortifera verò in mala: cuiusmodi cernitur in sanguine meraciore & nigro; qualis in Philisco stillatim manavit. Cuius distinctionis theoremata sunt 2. τῶν ἐπιδημ. Commemorabile est autem quod scripsit Galenus ad 56. prorrh. f. 3. 1. stillicidia undecimo die difficilia. Cum est, inquit, malum omne stillicidium e naribus; tum verò mortiferum quod crasse est ac nigri sanguinis: quod quidem si in indicem vel iudicarium diem cadat; de eo prædicendum est certius. Cæterum de stillicidij prauitate, per multa literis mandata leguntur apud Hippocratem: sed illa duo solennia sunt. Si quis cum in febre laboriosa perhorruerit, nonnihil criticè exudarit, indeque ardentè febricitarit, malum: idque cum aliis, tum si in hoc negotio sanguis stillarit. Cuius difficillimæ prognoscæ explicatio petenda ex comment. ad 37. huius. Item. Qui morbo ineunte sunt comatosi, vigiles, &c. μὴ τῶν ἐν τῷ πνεύματι ἀποκρίνεται, ἀλλ' ἐξ ὧν πρὸς τὸ πνεύματι ἀποκρίνεται, &c. i. His stillantes nares sunt mortis signo, primis præsertim quaternariis. Exempla sunt in Philisco & Pario, quorum uterque interit; & historia vniuersali tempestatis pestiferæ in causo.

hist. 1. 1. Epid.
hist. 1. part. 3.
3. Epidem.

62 Κακὸν δὲ πάντως ἐν ὀξείᾳ, δὲ ψα ὁραδὸς λυθεῖσα.

Omnino autem malum denunciat, quæ in acuta febre immeritò sitis extincta est.

PERTINET ad perceptionem & explicationem illius, in qua docetur; stuporis citam vel repentinam utroque mutationem, malis omnino fieri rebus ægri. Quoniam non minùs perichitatur is qui stupet hebetudine facultatis sensificæ; quàm cui sensio repentè excitatur per amplificationem dolorificæ causæ. Illud enim, δὲ aperit mentem authoris: ut hæc sententia illi iam explicatæ citima esse debeat. Iam verò nihil necesse est iterum cogitationes meas mandare literis, quas paulò antè propalam explicavi ad 51. & 53. Superest tantùm ut quid & cuiusmodi sit illud, ὁραδὸς, ostendam.

Enimvero ὁραδὸς & ὁραδὸς idem significant: contraria autem sunt, πρὸς λόγον, aphor. 26. 2. Τῶν μὴ πρὸς λόγον κομφίζουσι, μὴ πιστεύειν, &c. i. Lenationi quæ immeritò datur, non est fidendum. Significat igitur, πρὸς λόγον, abs re, immeritò, sine causa: quemadmodum πρὸς λόγον, iure, conuenienter, & meritò. Sed illud ὁραδὸς, i. immeritò, cuiusmodi esse cernitur quando in sitifera causa nulla est potionis cupiditas, ut in linguæ scabricie & rubris urinis: aut quando in vacuitate omnium quæ sitim sedant, peptismi, sudoris, somni, diarthræ, purgationis, vomitus, epithematum; falsò creditur sitis extinctio: aut quia laborat mens; aut quia concidit emortua facultas potum concupiscendi.

63 Οἱ πρὸς χεῖρα ἀναίσθητοι, κακόν.

Qui ad manum exiliunt, malo sunt loco.

FUIT mulier quædam Thasia morosa, quæ à mēstruorum suppressione febrem habuit conuulsionibus crebraz: quibus quiescentibus, nugarum garrulitate & verborum obscenitate insigniter delirauit: ad postremum vacatione conuulsionum; κόμα ipsam subiit, & κατὰ φρενὰ καὶ πάλιν ἐκρηκτο, ἀνίστατο, κατὰ χεῖρας ἠδυνάτο, &c. i. sopor, & veternum, rursusque vigilia, exiliit, neque contineri potuit. Quæ historia, quid sit & cuiusmodi, πρὸς ἀνάγνωσιν, apertissimè planissimèque ostendit. Ac sanè hæc prognosis eò spectat, quemadmodum & huic citima, ut intelligamus quid illud sit, Ναρκὴ ἐς ἀμόφορον ἔχει μετὰ πᾶσι, κακόν, i. Stuporis cita utroque mutatio mala.

64 Οἷσιν ἄμα πυρετῶ καυσώδῃ, οἰδήματι ὑπνώδῃ, νενοσφιδυμένα ἐς πλῆθρον ὀδυνή ἐπελθοῦσα, ὁραπληκτικῶς κτείνει.

Quibus una cum febre ardente soporiferi tumores ac veternosi accidunt; dolor si latus occupet, paraplectico modo necat.

EXISTUNT febres ardentes, quæ principiis, crebræ sunt comate, obliuione, tum etiam vniuersi corporis exolutione, quam ἀφροσιν vocat. καὶ ὅτι ἐκκλινῶν καὶ παρῶν, &c. i. Neglectum ac veluti exolutionem, & seque gnam omnium corporis partium, cūm proiciuntur paralyticorum instat. Atq; huiusmodi febres in hominam

3. Epid. in pte
stillicidia

viram inuadunt à diuturna tempestate pestifera: qualis esse solet austrina flatu sonoro, placida, pluuiosa, & mollis exactum ad annum. Enimvero talis tempestat capita replet hominum nimia humoris abundantia: proptereaque symptomata facit *καματώδεις*: quamuis ea perraro incidant in febres ardentes, quæ potius repleti solent symptomatis phreniticis, quàm comatosis.

Ergo. **QVIBVS VNA CVM FEBRE ARDENTE**] i. Simulatque ex tempestatis austrina, pluuiosa, & mollis dominatu in hominum biliosorum naturam inuasit febris ardēs, per suppressionem & attractionem feri biliosi in venas, quod in peculiari natura gigni & redundare consuevit in tali tempestate austrina, quæ ad præparationem suscipientis causæ adiungit vim efficientis.

SOMNICULOSI TUMORES] Parotides, quarum opinionem facit, vel potius fidem, *πὸ καμα*, quemadmodum philosophatur Galenus ad illud, in *cephalalgia, coma & surditas, ad aurem quippiam euomit*. Reapse, inquit Galenus, *signa sunt hæc parotidum, si ante sperauerimus talem fore abscessum*. Etenim qui ad caput humores cursum inflectunt, siquidem calidi sint atque tenues, deliria & hæmorrhagias adferunt: sin autem crassi & frigidi, comata & parotidas. Ac sanè cephalalgia signum est vtriusque commune; sicut & surditas: sed calidiorum magis humorum conspectanea est cephalalgia; frigidiorum surditas; ipsum verò coma proprium, quod pro lethargo sæpenumero usurpatur. Sunt igitur somniculosi tumores qui prænuncium habent somnum; aut qui cum eo coniuncti sunt. Hic autem somnus pro comate locum habebit, vt annotauimus ad 20.

AC VETERNOSI] i. Cum exolutione vniuersarum partium, in qua, velut in paralyti, membra cernuntur collapsa: vt in iis qui deuoluuntur ad pedes: quæ affectio dicitur *ἀρεσις, καθρότης, καὶ πάρεσις*.

DOLOR SI LATVS OCCUPET] i. Si parotis pepasmo & suppurato curationem recipiat: sed intrò ad thoracem transitum habeat, vnde per ptyelismum non expurgetur; eoque ptyelismo parotis *καὶ λάρυγξ* & meritò non residat; quemadmodum annotauit Hippocrates. *Βήχας μετὰ πτυελισμῷ ὄντα, πὸ παρ' ἐς ἀπαλλάσσειν*, vel *λαπάσσειν*, i. Tusses cum ptyelismo parotidas adequant.

PARAPLECTICO MODO NECAT] Non quòd paraplegia ipsa per se funesta sit; sed frigida nimium cerebri intemperies: vnde parotis & paraplegia veniunt. Sic enim philosophatur Galenus ad locum illum, *Per illam constitutionem hyeme cæperunt paraplegiæ, quæ inuasunt plurimos quorum citò interire nonnulli; vt morbo admodum populari*. Consuetudinem enim paraplegia in alicuius membri exolutione & paralyti quadam apparet: vt eadem sit paraplegia in quibusdam partibus, quæ apoplexia in corporis vniuersitate. Mæa quidem sententia, idem expressisse videtur hoc loco, quod in prorrhethico, vbi ait: *Parotides prauæ sũnt paraplecticis*. Cæterum vt dicam quod sentio; cum paraplegia propriè usurpata, sit eiusmodi qualem descripsi, proptereaque non possit haberi funesta, nisi partis vitio vnde manat; credibile est paraplegiam hic dici pro apoplexia: quemadmodum & *σκέλος ἀποπληκτικόν*, i. *crus apoplecticum*, pro paraplegia. Nam & Hippocrates narrat eos qui cum symptomatis iam commemoratis ardentem febri citabant, omnes fere *ἀφ' ὧντος* interiisse.

65 Πνιγμός ἐν ὀξείῳ ἐλδοῦσιν ἰσχυοῖσιν, ὀλέθριον.

Quæ dominatu febris accidit strangulatio, in faucium equalitate, funesta.

GRAVITER febricitanti, quanquam faucibus non tumentibus, si strangulatio derepenè superveniat, mortiferum. Itaque nos consideratè fecisse videmur, explicando *πνὺς ἰσχύος* faucium, æqualitatem: qualis apparet in vacatione omnis tumoris atque ruboris. Nam in prorrhethico idem legimus iisdem pene literis exaratum, *Ἐν παρυσίῳ ἰσχυῇ ἀγκύματα πνιγόμενα, ἐχει π' ἀποσπόμενες*, i. Dolores strangulatorii, in faucium equalitate, conuulsionem afferunt.

Hoc autem spectat, vt intelligamus, interceptionem respirationis ex insanabili causa, esse funestam, in summa spirandi necessitate. Summa autem spirandi necessitas cernitur in febre acuta: respirationis autem interceptio, in angina primæ speciei, quæ insanabilem habet causam, i. tumorem musculorum propriorum laryngis. Sed de angina loco dicetur pluribus: hic autem sufficiat scopū authoris aperuisse.

66 Ἐν τοῖσιν ἤδη ὀλεθρίοισι τὰ συμκρὰ τρυμάδεα, καὶ ἰώδης ἐμείλιος δανόσιμα.

Quibus iam desperatis, levis tremor incidit, & vomitio æruginosa; mors prope est.

QVIBVS IAM DESPERATIS] Quibus tota morbi historia cum symptomatum vehementia, signorum prauitas semper coniuncta fuit: vt si cum fastidio, vigiliis, cephalalgia, difficultate spirandi, delirio, siti inexplibili, apparuerint vrina prærubræ perturbata. Denique si & incendio; & maligna cacochymia; & nobilium partium oppressione; terrificus iam inde ab initio fuerit morbus.

LEVIS TREMOR INCIDIT] Qui cernitur in subsultu & gesticulacione manuum, lingua tremula, dentium etiam collisione à delirio. Præstat enim delirium superuenisse tremori, quàm tremorem delirio. Et phrenitici sputatores, indeque fanatici, tandem tremuli moriuntur.

MORS PROPE EST] Collapsus omnibus naturæ præfidiis, cum antè in angusto spes esset, hinc desperata omnia.

Est autem levis hic tremor, symptoma cerebri post alterationem magnam, ut in phrenitide & infania, alienati: proptereaque insanabile. Talem tremorem annotauit in Theodori vxore. Tremula facta sunt manus, quæ moriuntur, conuulsa sunt. Sic & Dealcis vxor contrectabar, auellebar, radebar, legebat festucas.

7. Epid.

hist. 15. part. 3.
lib. 3. Epid.

67 Οἱ ἐν τοῖς πόσι τοῖς ὑποφορέοντες, καὶ ὑποβορβορίζοντες ξηροῖσι, καὶ οἱ χαλεπῶς καὶ ἀβροχίζοντες πνέματα βηχῶδες· ὁλέθριοι ἐν ὁξέσι καὶ ψυγμένοι.

Quinetiam qui cum strepitu & murmure quodam bibunt in siccis, difficulter item deglutiunt cum spiratione tussiculosa; sunt desperati: præsertim si acuta febris accesserit perfrigeratio.

SUNT etiam symptomata hæc planè funesta, quæ cernuntur in studiis ægri, quando illis actio non responderet: ut certè fit in summa difficultate bibendi, ac cibi capiendi. Ac talis difficultas visa est in Theodori vxore. Οἱ φοβοὶ δὲ πνέου μεγάλοι ἐξήντο, ἀπενήνχε, καὶ αὖθις ἐς ῥίνα ἐφόρει, ἵ. Sonitus bibenti magni, sputando potum reiciebat naribus quæ. Quales etiam dicuntur esse phrenitici. Οἱ φρένιχοι βραχυπύται, φόβος καὶ πνέου, ἐξυμώδες, ἵ. Phrenitici bibentes raro sonitum edentes. Quo loco, pace Galeni dixerim, illud, φόβος καὶ πνέου, spectat ad ipsum bibendi modum. De perimolesta autem perque difficili deglutione, solennis est aphorismus. Ἡνὶ ὑπὸ πυρετῷ ἐχόμενῳ ὁ πρᾶξιμος ἐξείσθης, ὁπρὸς ἀφῆται, καὶ μὴ καὶ ἀπὸ πνέου διώσεται, οἰδήματος μὴ ἰόντος θανάσιμον, ἵ. Si febre correpto collū derepente peruertatur, ac vix deglutire possit, cum nullus adsit tumor; lethale.

PROP. 16. C. 1. 2.

68 Τὰ ἐν χερσὶ καὶ ποσὶν ἐρυθρήματα, ὁλέθρια.

Manuum ac pedum in febre acuta rubores, funesti.

ERYTHMA dicitur hoc loco rudi & crassa Minerua, signum inflammationis aspectabile, non autem symptoma κατ' ἐξοχῶν, quod principatum obtinet, nempe dolorem. Sed ut rubor locum habet in aspectabili phlegmone: sic etiam dolor in occulta. Est igitur ἐρύθημα, phlegmone, erysipelas, carbunculus quoque & herpes: ut eo nomine inflammationis omnia genera contineantur. Ergo si rubent manus & pedes in febre acuta, certum est, illum ruborem venisse per ὁπρὸς ἥσθην aut per μετέπλησιν. Si per ὁπρὸς ἥσθην accidit, semper in vitio esse solet: quemadmodum πρὸς ὁπρὸς εὐχρῶς καὶ τὸ λεῖψον πρὸς ὁπρὸς, ἵ. Facies aut coloratio, aut pallidior: & angina faucium, quæ, per ὁπρὸς ἥσθην, coniunctum habet ruborem cernicis & sterni, cum amplificatione tumoris ipsarum faucium. Sin autem per μετέπλησιν rubore suffundantur, palam est fluxione inchoata, nec morbo pari, id fieri.

69 Οἱ ἐκφυστῶνες, καὶ ἀνακεκλασμένοι, καὶ ὑποβλέποντες ἐν τοῖσιν ὕπνοις, κακόν.

Qui dormiendo efflant, atque proiectos artus aut etiam retractos ostendunt, conuientque oculis; malo sunt loco.

MAENA sunt argumenta prognostica, quæ ex decubitu, somni que capiendi ratione & modo petuntur. Ut enim naturaliter quis decumbit firmis naturæ præfidiis, & mitiore morbo, in alterutrum latus; ex eoque decubitu maior libertas spirandi comparatur: ita si pronus iaceat, aut etiam supinus, cum extraordinaria artuum collocazione, opinionem facit grauioris morbi, effcetatum virium, ac delirij quoque ipsius. Idem qui suauiter somnum inuit, cum libertate spirandi, committit molliter utrinque palpebris, ac modicè reflexis cunibus & manibus, ex animi sententia naturæ dormiendo satisfacit.

QUI DORMIENDO EFFLANT] ἵ. Qui dormiendo edunt ἐκφυστῶν, non ἀναπνέων naturaliter constitutam; propterata musculorum intercostalium contentione ad excretionem fuliginosi excrementi, quod suffocationis metum adfert nimia abundantia quam impuritas cordis æstu incandescentis pa-

rit: unde non ita multò pòst minutula respiratio, cum in propinquo mors est. In ea autem efflante dormiunt hianti ore, cum strepitu, & stertore efflantes πνεύμα θορόν, i. spiritum crassum & perturbatum.

ATQUE PROIECTOS ARTVS, AVT ETIAM CONTRACTOS OSTENDVNT] Dī-
stentio corporis artuumque rigor, omninoque exolutio, infractioque membrorum; malum. Et in prognostico.
Quòd si pedes ostentans nudos à medico deprehendatur, manus & crura callumque sine more & modo iactans;
malum.

70 Ικτερώδεις, καί ακορές, θνήσκοισι· λευκὸν διαχώρημα τούτοις
πρὸςδιέρχεται.

*Ictericum multum fœdatis, vel saturata bile perfusi, pereunt: alba deie-
ctio iis una secedit.*

EXPLICATIO commentario ad 38.

71 Αἱ ἐν πυρέλοις ἐκτάσιες ὀγῶσαι, μὴ ἀφώνω, ὀλέθρια.

*Qui cum silentio è potestate mentis exeunt; nec voce sunt capti,
mortiferum habent malum.*

QUEMADMODUM aphonia cum exolutione coniuncta, mortem denunciat: sic etiam insania
taciturna, superstitie vocis libertate. Est enim ἡ ἐκτασις, delirium in quo summa sunt omnia mentis per-
cussæ aut alienatæ, unde fanatici homines nominantur. Sed eius insaniæ progressus huiusmodi esse so-
lent, ut lacessito primùm cerebro à bile perusta, exoritur insania melancholica, quæ cernitur in cœptis
immanibus fanaticorum, qui paulò antè phrenitici fuerant: quoniam bilis atræ sunt aciores morfus
quàm flauæ. Quo fit ut illa ἐκτασις μελαγχολικὴ, i. excessus melancholicus appareat μελώδης, i. ferinus. At verò
quemadmodum feritate bilis atræ, fit ἐκτασις illa μελαγχολικὴ: sic alienatione cerebri à diuturna & vehe-
menti alteratione, cum scilicet exaruerit, aut inebriatum fuerit, ut lanæ inficiuntur veneno fucatæ Assy-
rio; tum pro clamore, silentium; pro iactatione, quies; pro artuum euibratione, lenis tremor; pro vi-
giliis, coma & cataphora veteriosa. Quales fuisse narrat phreniticos in pestilentia. Quò spectat
illud, Αἱ ὀγῶδεις ἀσφαδείς, ἡλαφῶδεις ἀδρεκρίσιες· πᾶν φρενικαί, &c. Quæ omnia symptomata con-
spexit & annotavit in Dealcis vxore, quam scripsit, exactum ad morbum fuisse αὐτὴν ὀγῶσαι; nec tamen
voce captam, quòd vicissim fieret atque rideret, tum etiam, quòd nugas garreret. Ex quo efficitur, cō-
memoratum hinc insaniam cum silentio, symptoma esse deprauati animi, potius quàm cerebri sicci.

72 Τὰ πελιδνὰ γνόμματα ἐν πυρέτῳ, σὺντομον θανάτου σημαίνει.

Quæ liuent in febre, mortem significant breui venturam.

BENE ac fœliciter ad salutem ægri res eunt, quando æqualiter & molliter calet corpus. Et verò talis
constitutio principatum obrinet inter eas quæ in bonis ducuntur: propterea quæ ἀρίστη διάθεσις, i. optima
dispositio nominatur: sed ea lege ut par sit æqualitati caloris, partium ipsarum mollitudo. Nam febrium
ἀκραιψίων, i. ardentissimarum, æquabiliter calor diffusum percipitur: sed in vitio est acrimonia & qualitate
mordaci, tum etiam partium calentium siccitate. Quòd si ad eam caloris æqualitatem, & partium mol-
litudinem, accesserit ægri alacritas in assurgendo & conuertendo; nihil optari potest à medico quod ipse
malit: quoniam ex ea constitutione quæ omnium est optima, significatio fit trium facultatum in suo
cuiusque officio vegetarum; & principiorum cuiusque facultatis propriorum, bene & firmiter consti-
tutorum, cerebri, cordis, & hepatis. Contrà si plumbeus homo sit qui ægrotat; neque in assurgendo &
conuertendo alacer; opinionem facit pigræ nimium facultatis morticis, exolutique nervorum princi-
pij. Ad hæc si eidem liueant digiti atque ungues, ex illo tum decidit omnis spes medici; immò πρὸς θάνατον
μὸς ὁ θάνατος αὐτῆς, i. citò mors venit expectanda; ut ait 2. progn. Quoniam liuor ille partium extremarum, ni-
hil superesse arguit reliquiarum nectaris viuifici in corde ipso. Ac sanè liuor tam malè audit, ut semper
extinctionem vel interceptionem spiritus & caloris vitalis denunciet: idem verò de nigrore semper su-
spicari non liceat: quia sæpenumero talis apparet in extremis partibus, prolapsa materiz morbificæ per
abscessum, qui lenationem si adferat; superstites manent ægri, sola pars excidit: quæ nigrorem concepe-
rat. Itaque verissimum illud est. Nigri omnino digiti minus sunt mortiferi liuidis: ut verè illud videar esse di-
cturus; partes extimas non rarò nigrescere per transitum; semper autem liuescere per progressum; nec
vnquam abscessus opinionem adferri.

10 *Quibus in febre, lateris dolor incidit, si quidem perliquidis & bilio-
sis profusè aluus feratur, mitescit: sin autem collapsa maneat appeten-
tia, ac tum sudores cum saturato faciei rubore prorumpant, fluente aluo,
& superstite cardialgia; hi cum diutius egrotarint, peripneumonico
modo intereunt.*

IN FEBRE] Magna tum specie, vt acuta; tum indiuiduo, vt quæ vires cundo acquirir: quia nihil concedit, sed contrà propagationem habet causæ morbificæ, quo ipsa viam affectat.

SI QUIDEM LIQUIDIS ET BILIOSIS CUMVLATE ALVVS FERATVR] Si quidem morbosificis excrementis ducatur aluus, naturæ imperio, nec dominatu morbi symptomatica sit illa excretio. Atqui naturæ imperio vacuatione suscipi, declarat effectiois ipse modus; quæ cernitur in qualitate, copia, & excretionis humoris prorupti; deinde in consecutione, quia dolor mitescit. Mitescit, inquam, ut in Larissa virgine: *Tertio die proruperunt biliosa liquida, indeque sequentibus, quod totum alacriter suli.* Sed non mitesceret in cacochymia maligna, cuius perennis generatio est in partium vitio & collisione; quæ causa est, cur alui profluvium in pestilentia sit funestum.

40 SIN AVTEM COLLAPSA MANEAT APPETENTIA] i. Sialui ductio atque profluuium, consecutione adferat *τῆς ἀνορέας*, quale symptoma obseruauit in iis qui, saeuiente pestilentia, profusiore aluo fuerunt, *A cibo omnes alieni*. Est autem *ἀνορέας* species *τῆς ἀνορέας*: quemadmodum & *ἀσῖνα*. Sed inter *ἀσῖνα* & *ἀνορέας* hoc interest, quod *ἀνορέας* sint, qui cibos non capiunt; *ἀσῖνα* uero, qui cibos auerlantur, & quasi quodam fastidio contra eos efferuntur: quod genus agnorum notauit. *Quae deieci-*
bantur dolores minime sedabant; ad ea quae offerebantur, non nisi cum difficultate ueniebant. Purgationes profecto
lesere permultos. Et in puerpera. *Πρὸς δὲ τὰ γάλακτα ἀπορροήεντες ἔχοντες, i. In cibos omnes auerso erat animo.* Tan-
tae autem molestiae causam ad morticinium naturalis facultatis referendam putantur Galenus, atque il-
lius signum posuit *τῆς ἀνορέας*.

COLLAPSA APPETENTIA] Vt in Pario, cui profusior fuit alius crudis humoribus; vel quod ad propriam huius loci explicationem pertinet. Patet hoc cibi non appetit symptoma phthisice aduente; illa-
bente in stomachum eius catarrhi parte, qui in pulmones & laryngem decidebat.

74. Πυρέασοντι, ἐν δρεχὶ μέλιαντα χολή· δυνάη καποδὶηδουσαι, δανα-
 Αμον.

Si cui febris initio, bilis atra sursum deorsum de exeat, mortiferè agrotat.

EXCRETIONVM quæ in vitio sunt, quæque dominari morbi lascipiuntur & sunt, nulla est omnino tam mortifera, quam bilis atra. Est enim bilis atra pessimum excrementum, quod feritate indomabili cæteris omnibus antecellit, tria que illi secum habet coniuncta quæ vim naturæ adferunt, quæque illius præsidia maximè labefactant, τὸ ἀπυρρὸν, καὶ τὸ διασπαστικόν, καὶ τὸ ἐξωστικόν, i. acre, erodens, acidum. **Quæ** causa est, cur dysenteria inde nata sit insanabilis: quemadmodum & cancer exulceratus. Atque

inter bilem atram & melancholicum humorem tantum interest, quantum inter ferrum candēs, & igne intactum. Nam lienosi qui sunt eiusmodi lienis duritate quam peperit diuturna humoris melancholici infarctura, dysenteria superueniente sanescunt; secessu, translatione, & vacatione infarctus lienis humorū melancholicorum, crassiorūque. Et verō maniam ab humore melancholico gigni posse negat Galenus, nisi is perustione aut corruptione singulari, acrimoniam compararit malignam. Nam quod idem author alibi scriptum reliquit, hamorrhoidas & varices insanix vacationem adferre; Galenus commentario differtē scripsit, maniam illo loco vocari, melancholiam propriē dictam, quæ tamen à bile non venit. Sic autem philosophatur. Varix est hiatus aperta in coxendicibus & tibis venæ à sanguine melancholico, quem natura in partes repellit ignobiliores, qui humor furorē committebat: tum verō maxime cū crassus fuerit & melancholicus, horum est consecutio symptomatum, & illius solutio.

Quæ cū ita sint, ne longius excurrām, planē efficitur, atram bilem quæ febrium initiis diu paulatim exit, & maligna cacochymia, & tempore morbi, & excernēdi modo; denunciare & facere mortiferum malum. Ac primū qualitate ipsa, quæ omnium pessima est, maliciam arguit partium vnde manat, nec non humoris utriusque vnde gignitur, biliosi & melancholici, perustionem, aut corruptionem. Temporis verō distinctione noxia est. Etenim per morborum initia excretio nulla suscipitur imperio nature: sed huiusmodi omnia symptomata sunt contra naturam affectionum. Quo tempore natura morbificis causis opprimitur, estque humorum cruditas, ut incunte morbo; tum certē nō potis est salutariter quicquam excerni. Quod autem attinet ad ipsum excretionis modum; palam est fieri per anxiā, i. laxitatem, qualis esse solet dysenteria diuturna cruenta, non autem quæ citō prorumpit & liberaliter: quæ quia non est multorū dierū; propterea nec mortifera, nec auersionē cibi parit. Sed huius humoris effera vis non minū incommodat partibus per quas repit, quā earum vnde manat, labem & noxā arguit. aph. 22. 4.

75 Οἱ μὲν κατὰ ψύξιν οὐκ ἀπύρων ἐφιδρουῶντες δῶα, δὺσφοροι, φρενίκοι ἔτι καὶ ὀλέθριοι ἐν ὀξεί.

Quibus cum crebra perfrigeratione febris adiuncta, sudor miliaris sursum exudat, unaque iactantur, phrenitici ac desperati, in acuta febre, redduntur.

EXISTIT Symptomatum omnium complexio atque concursus, quæ in acutis febribus funesta esse dicuntur: qualia ipse recensuit primo ἐν ὀξεί. Statim namque ab initio acuta febris cum rigore exiguo, vigiliis, anxietate, sui, iactatione, sudatiuncula circa frontem & claviculas, delirio multo, timore, metu, frigidis extimis, pedibus manibusque; sed manibus præsertim. Symptomatum porro illa, principia causasque ducunt ab inflammatione, venenata cacochymia, & translatione symptomata: quæ sunt omnino tres causæ funestæ in omnibus morbis acutis.

Ergo. QVIBVS CVM CREBRA PERFRIGERATIONE] Quæ mortiferum maxime est febrium acutarum symptoma, & signum: quia cū illud præter cætera sit proprium καὶ οὐκ αἰών, ut in acutis febribus extimæ partes incandescent æstu; si fortē perfrixerint, opinionem faciunt, visceribus incendio conflagrantibus, sanguinem in præcordiis & interioribus hypochondriis coactum subsistere: proptereaque partes extimas suo necitare viuifico defraudatas perfrigerari, & emori, ranquā à natura defertas. Ac ne plura adferam quæ sunt hac de re plurimā apud Hippocratem; commemorabo illud quod huius symptomatis causam disertē exprimit: Caput & manus ac pedes perfrigerari, malum, ventre costisque incalcescentibus.

FEBRI ADIVNCTA] Ut nulla sit excusatio frigoris periodici, aut refrigerationis critica, febre exacta: sed culpa viscerum incendio conflagrantium, quod sine febre non fit: qualis perfrigeratio symptomata docetur illa prognosi. Æstus, extincta febre, in hypochondrio superstes, malus.

SUDOR MILIARIS SURSUM EXUDAT] Vnde vel oppressio, vel exoluta vis partium significatur: quod sæpenumero iam demonstrauimus.

VNAQVE IACTANTVR] Αλυσία symptomatice, qui sperabilem crisin non facit, qualem descripsit 40. huius. Quæ diebus criticis iactatio incidit, cum frigore, ac sine sudore; mala. Et 52. In acuta febre, quibus cum anxietudine, miliaris sudore subroscidum caput est; grauissimum habent malum.

PHRENITICI AC DESPERATI IN ACUTA FEBRE REDDUNTVR] Enimvero phrenitici sunt propter febris calorem quo caput conflagrat. Desperati verō, quoniam ad nobilissimæ partis oppressionem, accedit perennis morbificæ materiæ generatio, & perennis translatio.

76 Τα ἐπ' ὀλίγον ὀξεία ἀλγήματα, ἐς κληίδα, καὶ τὰ δῶα πίπτοντα ὀλέθρια.

Doloris

Doloris acerbitas paulisper in iugulo fixa, si ad superiora vertatur, mortiferum adfert malum.

QVEMADMODUM qui circa coxas, i. lumbos & inferiores partes oborti dolores, si ad viscera transferantur coxis relictis, mortem denunciant: sic etiam acerbis claviculæ dolores, quorum falsò cre-
dita levatio est. Notum est illud. Καλον δὲ καὶ ἐκ μέρους ὁρμητικὸν, i. Terrifica est etiam, doloris a femore
sursum irruptio. Cuius prognosticæ ratio & explicatio petenda primum ex historia Calvi cuiusdam Laris-
sæ, quem dolor huiusmodi per excursum ad exitum præcipitavit. Hippocratis verba sunt hæc, Τertia
die coxendici quieuit dolor, mentis autem inuasit percussio atque iactatio; plurimum murmur; quarto sub meridi-
em crudelissimè interit. Repetenda est etiam ex commentario Galeni ad prorrh. 1. c. 2. 1. Quinciam lum-
borum anadrome quid faciat, docetur 35. & 51. prorrh. Εξ ὁπρὸς αἰσθητικῆς ὀφθαλμοῦ εἰσαγωγῆς, καὶ ὁ, i. Ex lum-
borum ascensu, oculi perversio mala. Quem locum enarrans Galenus ait, ex hac sententia nihil aliud com-
plecti animo quempiam posse, quàm, quod lumbarium dolorum ad superiora translatorum fere sit par-
ticeps nervorum origo; cuius quidem symptoma proprium est, inter cetera, oculorum perversio. Quid
verbis opus est? hoc unum spectat hæc prognosticis, omnem translationem, omnemque excursum; qui
αἰσθητικῶν non habet, i. exitum; terrificum iure videri, atque non rarò funestum; siue mortiferum esse.
Quod cuiusmodi sit, videamus. Sanè iuguli dolor commune symptoma est pleuritidis, & hepatis in-
flammati: sed illic per ἐστὶν καὶ ἡσυχία, i. foco & generatione; hic verò per ὀδυνήσκειν, illic ὑψηλότης, i. pun-
ctorius; hic verò πῶδες, i. tensius. Nam de symptomatico iuguli dolore ab hepatis phlegmone, antea
iam scripsit ad hunc modum. Si cui sine febris vacuitate, sudatiuncula crebra, cum hypochondrij tensione con-
iuncta sit, malè illi est: sed multò prius, si ei dolores ad iugulum ex acramium se obfirmant. De pleuritico autem
iuguli dolore scriptum illud habemus. Quando ad claviculam sese extendit cum gravitate dolor, indeque ad
brachium; secare iuvat venam internam cubiti. Quò loco Galenus annotavit, τὸ βαρὺ, propriam signifi-
care sedem affectam: qui autem per sympathiam veniunt dolores, facere tensionem, non gravitatem.

Celsus cap. 6.
lib. 2. ex 31.
huius operis,
sed maximè
ex prognost.
vbi de lumbi-
barium dolo-
rum μετασ-
τασεως agitur,
quos vocat
coxas.
hist. 5. part. 3.
lib. 3. Epid.

33. Coac.

2. de acut.
diata.

25. prorrh. 1.

Quæ cum ita sint, perspicuum est, hanc doloris acerbitem in iugulo; potius ad pleuritidem refe-
rendam esse, quàm ad symptoma hepatis inflammati. Quoniam hepatis inflammatio tensionem facit
pleuritidis verò dolorem puncturium & gravantem: quæ duo planè sunt acerbiora quàm tensio.

PAVLISPER IN IUGULO FIXA] i. Pressa leviter ad exigui prædicationem temporis, non
fixa firmiter ad diurnitatem: quia ὀρμητικὸν habet, quod significat ἐν ὀλῳν: vt in eo. Αἱ ἐν ὀλῳν διασφα-
λίζονται, μεταίτεροι οἶον, i. Proterua paulisper responsa, effera. Et alibi, τὰ ἐν ὀλῳν διασφα-
λίζονται, i. Proterua paulisper dicta, melancholica.

SI AD SUPERIORA VERTATUR] i. Si transitum habeat ad caput (id enim significat με-
ταπίνωσις, pro μεταπίνωσις.) Est autem μεταπίνωσις, quando quiescente eo quod prius exitit, alterum sympto-
ma succedit. Quod autem μεταπίνωσις fiat ad caput, declarat illud vel maximè. Καὶ τὰ αὐτὰ πίνωσις, vbi le-
gendum videtur, καὶ ἐς τὰ ὑψηλότερα πίνωσις: vt idem hoc loco significetur, quod in prorrh. 5. c. 1. Lateris do-
lor qui cum spūto bilioso sine causa evanuit, excessum affert mentis.

MORTIFERUM ADVERT MALVM] Propter translationem pessimam infernè sursum ad
nobilissimam partem, materiam indomabilem, symptomatum vehementiam, & officij ad vitam tuen-
dam necessarij, vacationem.

77 Εν μακροῖσιν (ἤδη) ὀλεθρίοισιν, ἔδρης ἀλγημα. θανάσιμον.

In diuturnis morbis (iam) exitialibus, dolor ani; mortiferus.

MORBI diuturni exitiales sunt phthisis, tritæophiæ febres, hydrops: qui sunt eiusmodi partium ob-
fessorum vitio, generationis perennitatem habentium: vt phthisis, ab ulcere maligno pulmonum; hy-
drops à μύρασμο περιττωρῶν, i. consumptione reitorrida hepatis, unde alienatio facultatis sanguificæ. Nam tri-
tæophiarum febrium calamitatem in his tribus annotavit Hippocrates, in diuturnitate, laboribus
multis, & colliquatione: Γενομένων δὲ χρόνων μακρῶν, καὶ πότων, καὶ κακῆς συντηξέως, i. Post longum tempus, multos-
que labores, & colliquationem assiduam. Quæ autem illis contingere hæc sunt; dysenteria ac tenesmi, hydrops.

IN DIUTURNIS MORBIS] Quorum diuturnitas in pepasmi difficultate ob materiæ contra-
maciam; in maligna cacochymia; vel in vitio partis consistit: vt tritæophia febris epidemica, & phthi-
sis etiam sporadica.

IAM EXITIALIBVS] Diuturnitate; symptomatis gravissimis, quibus sunt crebri; & colliqua-
tione maligna: unde naturæ infirmitas dominatu morbi tenetur.

DOLOR ANI CITISSIMAM MORTEM ADDUCIT] i. Superueniente dysenteria, siue
tenesmo, celerius moriuntur, quàm quis putasset. Quoniam tales abscessus naturæ iam effertæ sunt in-
tolerabiles; tum vacatione symptomatica; tum ipsa doloris acerbitate, quæ nihil est quod magis fa-
ciat corpus infirmum. Ac vacuatio quidem symptomatica est per diarrhæam in phthisi, & in affecta
pleuritide. Namque vt silêtio præteream quæ Galenus annotavit ad aph. 14. lib. 5. vbi docet, diarrhæam
non tam citò in phthisi funestam esse ipsam per se, quàm si cum pilorum defluuio coniuncta esset; pro-
feram illud quod idem scripsit ad illum aphorismum. A pleuritide aut peripneumonia malè habito; diarrhæa
superueniens, mala. Partium, inquit Galenus, affectiones aliarum alie non continuo suscipiunt, nisi cum adest ve-
hemens affectio. Deinde propositis exemplis quæ à pulmonibus petuntur, & hepate, subiicit. Sic igitur

aph. 17. lib. 6.

partibus respirationi dicatis multum grauiusque affectis, male officium suum facientibus; hepar contagione afficitur: quod ipsum apertissime declarat, dum ait, si cui in dominatu pleuritidis diarrhoea superueniat. Etenim qui pleuritidis aut peripneumoniz dominatu tenentur, iis diarrhoea tandem accidit, quod alimentum hepar, nec ad sese trahere; nec in sanguinem possit conuertere. Ipsum vero alimentum saepe corrumpit venter. Sed auctoritatem maximè illud facit. Quibuscunque acuto vel diuturno morbo, aut vlcere, aut alio quouis modo extenuatis, bilis atra sanguini persimilis deiecitur; postmodum moriuntur. Iam verò quod attinet ad dolorem aut palam est eo significari; humorum κατὰ κρῆτος, i. sincerorum & viridum deiectionem. Sunt autem illa excrementa acetifica sedis & intestinorum. Cuiusmodi autem sint & ἀκρητά; & quare huiusmodi, cum alibi passim docetur; cum verò disertè comment. ad illum aphor. Εν νύκτι πλεονέχοντες ἀκρητά, i. syncera in diuturno morbo deiectiones, mala. Et illum, Επὶ ἀκρητῶ κατὰ κρῆτος δύσεντε, i. syncera deiectioni dysenteria superuenit.

aph. 6. lib. 7.

aph. 23. lib. 7.

78 Τοῖσιν ἀθενέως ἤδη διακειμένοισι, μὴ βλέπεν, ἢ μὴ ἀκκεῖν, ἢ διασπρέφειν χεῖλ, ἢ ὀφθαλμόν, ἢ ῥίνα. θάνατος.

Quibus iam morbo fractis, videndi vis audiendive perit; aut etiam labiorum, palpebrarum, vel narium perversio cernitur; mors instat.

IN HAC prognosi continentur signa iam iam futurae mortis, cum antea spes in angusto esset. Ea verò cernuntur in qualitate & actionibus corporis multum à se murati: quemadmodum superioris aphorismi, in excrementis.

58. Coac.

QUIBUS IAM MORBO FRACTIS] Diuturnitate, symptomatum vehementia, & colligatione maligna: siue illa debilitas & virium exolutio sit καὶ λόγον κατεργασμένην, ἢ ὡς λόγον, i. per inanitionem aut citrà: ac si diceret. Si cui collapsa facultate vitali, & naturali, ac sine vlla spe crisis (quod significatur illo, καὶ μὴ διαλείπειν πυρετῶν;) ubi sententia hæc legitur, & à Galeno explicatur.

aph. 49. lib. 4.

VIDENDI VIS AUDIENDIVE PERIT] Labefactata parte alterutra, vel utraque cerebri, vnde videndi vis, audiendive manat. Sunt enim multæ mansiones in cerebro, quarum integritas variæque virtutes, propriis cuiusque nervis in sensuum instrumentis apparent. Quò plures autem labefactantur, eo deterius est ægro. Nam sola surditas morbi acuti & turbulenti consequens, ipsa per se terrificata est: quod ea partis illius cerebri exolutionem denunciet, in qua facultas audiendi locum habet. Nam de mortiferis oculorum signis, permulta sunt accuratè scripta in hoc diuino opere: tum in prognostico & promethico.

AUT ETIAM LABIORUM, PALPEBRARUM, VEL NARIVM PERVERSIO CERNITUR] Conuulsis à siccitate musculis qui moventur à nervis tertiæ coniugationis: quæ partes conuulsæ, quia sunt propinquæ atque communes, primum & maximè afficiunt.

MORS INSTAT] Sublato respirationis vñ & motu: quia mors ipsa in extinctione caloris natui consistit.

79 Εν πυρετοῖσι βυβῶν ἀλγῆμα, νόσον χρονίω σημαίνει.

In febribus dolor bubonis, ad diuturnitatem morbi apparet.

EODEM spectat hæc prognosis, quod aphorismus ille. In febre abscessus qui diebus primis non exoluuntur, diuturnitatem ostendunt morbi. Ac mea quidem sententia, quod illic scribitur de abscessibus irritis, quibus scilicet morbi non exoluuntur, idem quoque hoc loco de bubonis dolore subaudiendum videtur: nisi fortè quis dicat, neque iniuria, nullum bubonis abscessum iure videri criticum: vt proposito familiari exëplo huius prognoseos, de bubonis frustra oborto abscessu, vt fere frustra oboritur; doceat nos theorema catholicum semper verum, & consequens abscessuum irritorum, qui per decubitum apparet & fiunt. Etenim de bubonibus accommodatè etiam dici potest, quod de paratidibus verè scripsit Galenus. Ipsos videlicet esse minores morbo. Nam Herophonti doluit quidem bubo, sed illius doloris fugacis materia deriuationem perfacilem habuit ad crura, totius morbificæ cacoehymiz capacia. Doluit autem bubo κατ' ἔξιν lienis tumore obsessi, qui cum deponeret tumoris materiam, eaque per bubonem ad crura cursum inflecteret; ipsum bubonem dolore contigit: quoad fluxus materiz quieuisset: vnde συνέλαε ἐπὶ δώμα, i. crura dolere; cætera omnis molestiz leuationem habuerunt. Neque immerito: quoniam par morbo & infra abscessus contigit. Secus est de bubonis dolore firmiter fixo, qui neque ἐξῆς neque κατὰ, nec sine recursum aut sympathia partium nasci solet. Iam verò quod ad bubonis philologiam attinet, scire licet, Bubonem sæpenumero usurpari pro inflammatione glandularum quæ sunt pone aures, in axillis, & inguinibus. Qua de re in promptu sunt illa. Οἱ ἐπὶ βυβῶσι πυρετοὶ πάντες κακοὶ, καὶ ἐφημέριοι, i. Febres quæ superueniunt bubonibus omnes, præter ephemeras, sunt prauæ. Vbi Galenus sic ait. Qui sine causa manifesta nascuntur bubones, cum viscerum inflammationibus vnà inuadunt; ob eamque causam febris cum illis

comment. ad
proth. 68.
l. 3. r.
hiff. 3. Epid.

aph. 55. lib. 4.

cum his conuicta, pessime esse solent. Huc etiam pertinet illud. Male sunt bubones, qui statim initio febriam acutissimam efflorescunt. Præstat in peste ac lue venerea, febrem superuenire buboni, quam febri bubonem.

Nec verò prætereundum illud quod maxime ad rem facit, Αἱ ἀποστήσεις ἐξ ἐνδοχρῆτος, σημεῖον μὲν τῆς βλαπτικῆς ἐργασίας, ἀπὸ τοῦ ὅθεν ἡ μάλιστ' ὁ πῦρ ἐκ ἀσπύχας· κακοῦ γὰρ ὅτι. Commemorarem etiam dictiones humorum qui in glandulis oriuntur: ex Galenō lib. 2. ad Glauconem: sed nihil necesse est. Cæterum hic, & in Herophontis historia, nomen bubonis significat ipsum inguen: quemadmodum commemor. Gal. ad 31. aphor. lib. 4. & lib. 10. therapeut. vbi docet febris ardentis focum esse in maioribus venis, quæ sunt inter axillas & bubones.

lib. 2. Epid.
part. 3.

lib. 6. Epid.
part. 2.

80 Εἰς πυρελοῖσιν ἀκροῖαι, χρόνους μὲν ἐμπολέστοιν, ἀπερὸν δὲ οὐ λείδρια.

In febribus acrisia, diuturnitatis quidem sunt causa, non tamen funesta.

FEBRES quæ carent pepasmo & ἐρεθισμῷ, i. prurititione, crises non habent.

IN FEBRIBVS ACRISE] i. Si cruda febris materia, nec in abscessus malos conuersa, ipsam faciat crisis expertem.

Id enim significat ἀκροῖαι
1. Epid. 1.2.
aph. 4.4.

DIUTURNITATIS QUIDEM SVNT CAUSA, NON TAMEN FVNESTA] Cuiusmodi fere sunt acrisiæ sinistri iudicii ab irritō crethismo, cum pessimis signis: tum enim præstat naturam quiescere, quàm aliquid frustra moliri. Ac tales acrisiæ per oppressionem & malam translationem, acerbissimi doloris; & sæpe interitus consecutionem adferunt. Cruda nec cocta, atque in malos abscessus conuersa; carentiam crisis, dolores, mortemque inferunt: aut reditum morbi eiusdem.

81 Οἱ δὲ ἀλγυμῶτων ἰσχυρὸν πυρελοῖ, πολυχρόνιοι.

30 *Ex acerbis doloribus nata febres, diuturnæ.*

AD PARTIVM omnium dolores extendit, quod 33. proprium fecit hypochondriacorum. Nec aliud hic est πολυχρόνιον, quàm κακοῦ γὰρ illic. Plurimos breui necant febres istæ: non pauciores, quod minus, post iactationem longissimam. Euadit nemo, nisi diu multumque exercitus. Hoc de iis intelligitur quæ symptomaticæ essentiales se prodant vrinis & motu: causas in memoriam reuocans ex illo, quem designauit, superiore commentario.

40 82 Αἱ ἐμώδεις, ψιλαφώδεις, ἀσπυρῶσιν, φρενιτικῇ.

Contremiscere simul ac stulte palpare manibus; phreniticum.

Sic est profectò, quàm leuiter vtrumque fiat; etiam quiescere credito: vt ad eos maior medici attentio sit, ne se celari ab obscurioribus patiat: quod Galeno accidisse nescirem, nisi ipse fateretur commentario ad prorrh. 33. f. 1. 1. cætera huic persimile, si hoc exceperis, de quo insuper admonet, adiecto ἀσπυρῶσιν verbo. Vnde fit vt eò breuior esse interpretando debeam, quod Galenus longior extitit atque doctior.

Phrenitidi arguenda, quæ delirium est insigne, mentis excessum habens; deliram actionem, palpationem scilicet, lintea & operimenta indecorè, nec necessariò colligentis; coniungendam putauit cum tremore, qui magni, secus, delirij non esset. Delirium superuenire tremori satius, quàm tremorem delirio. Alteratio cerebri simplex, per translationem symptomaticam tremoris frustra oborti, contracta; delirium inferret leue. Tremor delirio superuenire nequit, nisi magno; quod cerebri robur exoluerit à se prorsus alienati. Atqui, inquam, delirio hic superuenit, actionis, vt dixi, iam deliræ comes. Pere à Galeno reliqua.

83 Οσοι ἐν ξυεχει, ἀφῶνοι καὶ μῦνοι, σκαρδαμύσσοι: ὡς, ἀμῶτος ῥυεῦτος ἐχ' ῥινῶν, ἐμέσαντες φθέρωνται, καὶ ὡς αὐτοῖσι γῆλωνται· σῶζονται. μὴ γῆλομῶν δὲ τῶτων, δύσπνοοι γῆλομῶν, ἀνήσχοι σῶζονται.

In febre continua, qui voce capti iacent atque nictantur; siquidem prorupto è naribus sanguine, cum euomuerint, vocem receperint, et apud se fuerint, periculo defunguntur. Sin autem secus acciderit; cum difficultate spirandi cita mors venit.

PRIMUM hinc symptomata proponuntur cerebri repletionem, per humoris excursum, laborantis. Sunt autem, nictatio, & aphonia: quamvis illa semper affectionis huius propria non sint: sed hinc eiusmodi esse declarat euentus. Quoniam superueniente liberali hæmorrhagia, quiescunt. Deinde compa-
rara libertatis, inoffensivæ cerebri in temperamento & complexione signa produntur; ratiocinatio, vox hominem sonans, & sermo: quæ omnia naturæ commoda, profusæ vacuationi accepta feruntur: quemadmodum exigua vel denegata; grauiissima debentur mala, quæ cernuntur in suspitio & repentina morte.

IN FEBRIS ASSIDUITATE] i. Vbi nulla est crisis expectatio, quæ adferat febris vacuationem atque quietem. Id enim significat, *ἐξωχέει*; quod idem valere, eodemque spectat, quod illud. *Ἐξωχέει τὸ σῶμα τοῦ ἀδυνάτου ἢ δὴ ἐόντος, πρὸς τὴν ἀσθενείαν*, i. Rigor corpori iam à febre continua fracto superueniens, lethalis. Vbi τὸ ἐξωχέει, non aliorum spectare videtur, quàm illud. *Ἐξωχέει μὴ ἀσθενείαν*: quo loco hæc prognostis legitur. *Ἐν πρὸς ἐμνήσει, πρὸς μὴ ἀσθενείαν, ἀδυνάτου ἢ δὴ ἐόντος*, i. Si non desinenti febre rigor superueniat, mortiferus. Hinc igitur febris assiduitas significetur, nec vlla per crisis significatam, remissio futura ostendatur *ἐπιμήκει*: quamvis sperari possit.

VOCE CAPTI IACENT] Quemadmodum qui ab ebrietate sunt *ἀφρονες*: quamvis hinc *ἀφρονία* non, ut illic, vniuersi corporis exolutionem denunciet: sed vocis amissionem, per oppressionem cerebri, denegata musculis facultate mouendi, à spiritus animalis interceptione; non autem neruorum laryngis paralyti; aut vocalis materiæ paupertate.

IACENT] Sicut iidem ebrii voce capti: non autem sicut veterinosi *πενεθρευμένοι*, qui subinde ad pedes dilabuntur ab exhausto.

SIQUIDEM PRORUPTO SANGVINE] i. Larga profusione sanguinis, qualitate, copia, tempore, & excernendi modo laudandi.

VOMITVQVE INIVSSO] i. Sponte citato, propter ventriculi & cerebri sympathiam; quæ tollitur natura duce: non autem sit ut symptoma earum quæ sunt in visceribus affectionum: ut ea vomitio sit bilis pituitæ multum permixtæ; eaque rara & multa.

VOCEM RECEPERINT] i. *τὴν φωνὴν καὶ τὴν ἀφρονίαν* exuerint: restituta libertate instrumentorum sermonis & vocis, per intercipientis & opprimentis materiæ vacuationem.

ET APUD SE FVERINT] Bene habita cerebri complexione & temperamento, quæ inoffensa manserunt in repletionem humoris cacochymia malignæ expertis. Alioqui vacuatio non profuisset, superstitie offensione firmiter fixa.

PERICULO DEFVNGVNTVR] Nulla superstitie materia, nec empyreumate: vnde relapsus & interitus consecutio adferri solet.

SIN AVTEM SECVS ACCIDERIT] Vt scilicet iusta non sit vacuatio; aut ea indignè coarctata, libertatem non habeant interceptæ ratiocinationis atque sermonis.

CVM SVSPIRIO CITA MORS VENIT] Quoniam prolapsu materiæ ad pulmones, atque sublato respirationis vsu & motu; vita produci nequit in longum tempus.

84 Οἱ λαβόντες, ἐς τὴν αὐρεὴν ᾠροξωδέτες, κακόν. τεῖτε μὲν πρὸντες, τετάρτῳ ᾠροξωδέτες, κακόν. ἀεὶ γὰρ καὶ φρενιτικοὶ ἐπὶ τοῖς ᾠροξωσμοῖς;

Quibus postridie quàm inuasit, exacerbatio febris est; malè res eunt. Ac si perendie mitius, quarto iniquius exerceantur; grauiissimum habent malum. An verò tales paroxysmi sunt etiam phrenitici?

1. Epid. comment. 2.

comment. 3. 3. Epid.

hist. 1. 1. Epid. hist. 3. part. 3. 3. Epidem.

MORBI cuiusque historiam, κατὰ τὴν Græci dicunt, si parium dierum exacerbationem habeat, scripsit Hippocrates esse difficilius iudicij. Exemplum sunt in promptu, patētque omnibus ad visendum, in particularibus historiis & vniuersalibus *ἢ ἐνδημῶν*. In tempestate pestifera & febrium ardentium pestilentia, scriptum illud reperio. Plurisque parium dierum fuere paroxysmi. Vbi Galenus. Rarò contingant hæc. Nam observatione constat, causas, omnesque similes his, morbos acutos, imparibus diebus paroxysmos habere. In Philisco ad finem historiarum adiecit. Paribus paroxysmi: obiit autem sexto. Idem quoque in Pythione, qui interiit decimo. Ac ne plura, quæ sunt penè innumerabilia recenscam, complectar breui. Omnium febrium acutarum paroxysmos, qui paribus diebus cientur, huiusmodi planè videri, καὶ τὴν ἀσθενείαν

αἰσιν φαίνεται, ὡς καὶ πάλιν, ἰ. alteratione violenta, non naturali: nec fieri debet naturae decedentis pro sua salute, nec proprio & infuso humoris motu, & ipsius naturae impulsu: sed tanquam symptomata earum quae contra naturam sunt affectionum. Hinc spectat illa prognostis iam explicata, Truāophya febres erraticae; in partes mutatae sunt consumaces. Cuius explicatio mirifice confert ad intelligentiam huius scilicet capiendam. Hoc unum interest, quod trizophyarum febrium naturalis, ut ita dicam, αὐτονομία, ἰ. imparitas, vertatur in ἀπαρτίαν, ἰ. paritatem, propter incertos rigores, unde & illae dicuntur erraticae. At vero dierum parium exacerbatio, quae hic proponitur examinanda; primigenium habet eiusmodi typum, ut prima & secunda periodo, diebus paribus febris exacerbari videantur; imparibus autem mitescere, sed non exolui, neque in totum quiescere:

10 Quod illud ipsum declarat, QVIBVS POSTRIDIE QVAM INVASIT, EXACERBATIO FEBRIS EST] Ac si diceret, quos febris exercet gravius secundo die, quam primo, quo primum invasit. Exercet autem gravior, symptomatum graviorum adiunctione; quae cernuntur in febrili ardore, doloris acerbitate, iactatione, vigiliis, siti, &c.

MAIORES EVNT] Quia quaecunque apparent & fiunt, contra naturam morbi & aegri, pessima sunt. Ut enim biliosis, tum aegris, tum morbis, familiaris esse solet excrementorum biliosorum 92: curatio, propterea quae minus stupenda; contra ἀγέλας καὶ λυγρὰς, ἰ. non biliosorum alborumque, prava; quoniam & morbi & aegri naturae dissimilitudo est: sic paroxysmorum artiasmi, omnino cidentur contra naturam febris acutae, cuius materia, videlicet bilis, tertio quoque die cumulat, & putris movetur. Quae causa est, cur in ardentium febrium pestilentia, Galenus annotat, petrarum ceteri diebus paribus paroxysmos, quos illic fuisse narrat Hippocrates. Quoniam omnes causae, omnesque adeo morbi, similiter ut illi, valde acuti; diebus imparibus exacerbari solent. Sed illa exacerbatio contra naturam morbi, causam habere videtur, efficientem quidem, humoris morbifici malignam cacochymiam; suscipientem vero, partium gignentium, mittentium, trahentium, & excipientium excrementa, vitiatam oconomiam, ab innervatione causarum morbificarum, priusquam generatio morbi patefacta fuerit: ex quo vitio labefactari atque perverti contigit constantem illam similitudinem & aequalium, similiter & aequaliter collectorum, eademque periodo excludi solitorum, perennitatem. Ceterum, quemadmodum in vicissitudine litris, iam demonstratum est, eius falsae ledatae sensationem de integro non excitari priusquam anima sui memor facta sit, incremento causae litiferae: sic etiam mirum videri non debet, si fatiscente natura, imparibus diebus mitescant; ac rursus crescentem causam, gravissimorum laborum perceptio fiat. &c.

30 AC SI PERINDE MITIVS] Fatiscente natura, laborum quos pertulit, gravitate: cum ante repentinam generationem morbi, ex innervatione causarum, iam propemodum labasceret.

QVARTO INIQVIVS EXERCENTVR] Collectione, putredine, & motu cacochymiae malignae; excitata sensus acrimonia, ad gravissimorum laborum perceptionem.

GRAVISSIMUM HABENT MALVM] Praesertim ij quorum paroxysmi artiasmum habent initio statim febris. Sunt autem huiusmodi paroxysmorum artiasmi morborum initiis; ut si quarto die symptomatum summa sint omnia; sexto die, cum sudore frigido moriantur: alioqui in longius producuntur.

40 85 Οὐόσοισιν ἐκλείποισιν οἱ πυρετοὶ, μὴ καὶ χειρόμοις ἐπὶ ὀξυπνοῦ.

Quibuscumque non critico die febres quiescunt; iis reuertuntur.

QVAE pravis cum signis mitescunt, aut cum salutaribus nihil concedunt, maligna sunt, inquit Hippocrates. Sed inter prava signa continetur ἡ ἀκρίσια, quae & crisis propriae cuiusque morbi vacationem habet, estque dierum & periodorum criticarum anormis. Nam & ipsae crises, dierum anormes, faciunt dyscritisiam. Sic quartanae haemorrhagiae sinistri sunt iudicii, perque difficilis. Icterus quoque ante septimum diem, lethalis. Omnino igitur, nihil sit ad salutem, neque apparet, nihil denique medico satisfaci, quod diebus & periodis criticis non appareat, atque fiat. Quemadmodum autem superiore prognosi, paroxysmorum parium in acutis febribus, dyscritisiam iam patefacta est: sic in hac, criseon pericula anormium; quae scilicet critica lege non suscipiuntur & fiunt. Atque ut mala signa & symptomata dierum criticorum, firmiora sunt quam aliorum: sic ea quae specie bona sunt in crisi anormi, spem certam salutis adferre non possunt. Itaque bona loco in bonis ducenda: saepe etiam quae specie mala videntur, si ἀγέλας ac loco appareant, non exterrant medicum medendi singularem magistrum: sed potius consolantur & recteant. Denique omnis morborum defunctio quae accidit per crisis anormem, causam habet, quam ex Aristotele supra retulimus. Erit enim morborum diebus non criticis exolutio, καὶ πάλιν 1. Physis.

60 QVIBVS CVNOVE NON CRITICO DIE] Constat in inoffenso cursu dierum criticorum, indicantium, iudicantium, & intercalarium: cuiusmodi sunt quaternarii sex, ante vigesimum febris diem; septenarii tres, à vigesimo ad quadragesimum; vicenarii tres, à quadragesimo ad centesimum: ut indicantium significatio certa sit; iudicantium perfecta ἀποκρίσις καὶ ἀπαλῶς καὶ ἀπὸ τοῦ σώματος, ἰ. abscessus effusio vel decubitus.

REVERTVNTVR] Superstite morbi materia, & empyredimate. Ac si diceret. Qui morbi aegros dimittunt diebus non criticis, ideo reuertuntur, quod non videantur κρημνίζονται καὶ κρημνίζονται ἀπὸ τοῦ σώματος, ἰ. iudi-

86

Melius sic 4. $\alpha \epsilon \delta \iota \alpha \gamma \tau \eta \varsigma \theta \xi \epsilon \omega \nu$.

Quibuscumque autem initiis februm vertigo est, unaque capitis vena micant, cum tenui & cruda urina; his proculdubio febris exacerbationem in crisi expectare oportet: nec mirum videri si non sint apud se.

VENAQUE CAPITIS VENA MICANT] i. Micantium arteriarum pulsus aspectabiles medico-
vel agro tractabiles; etiam non admota manu. Quod symptoma est magni ardoris, unde non raro de
liria excitantur: eoque magis atque facilius, quod quæ cernuntur micantes arteriæ proximè absint à ce-
rebro: quando & illæ quæ procul aspectabili pulsu capiuntur, infantiam quoque denuncient. Sic accipi-
mus. Cui vena in cubito micat, iracundus & phreniticus. Existunt tamen huiusmodi pulsus, qui opinionem
faciunt abscessus materiæ in articulos dilapsuræ. Quæ de re testimonium illud extat. Temporum vena non
stabilis, sine faciei rubore, cum anhelitu & tussi non admodum ferina; decubitus expectare faciunt in articulos
directo, &c. Verùm hæc dicta sunt non nisi in non assumptis: vi rectè annotavit Galenus.

CUM VRINA TENUI] Non quidem rite colorata, quæ ipso quidem colore spem boni faciat; tenuitate verò, crasse salutaris tarditatem, & morbi ipsius diuturnitatem: sed quæ omnino cruda sit & aquosa; cruditate scilicet morbi; necnon ipsius bilis sursum translatione ad caput. Quemadmodum enim vrina tenuis cruditatem morbi; sic vertigo cum aspectabili temporum pulsu coniuncta, capitis repletionem ostendit. Sed ea repletio capitis, temporum distinctione, critica aut symptomatice esse solet: quemadmodum vrina tenuis, ut sunt illius causæ diuersæ, quibusdam ad phrenitidem & insaniam; aliis ad hæmorrhagiam; senibus ad dysenteriam apparet: sæpe etiam prænumcia esse solet *ὑποσίτιστος*, per decubitus in diuturnis morbis.

1. Epid.
aph. 7. 1. 4.
3. progn.

HIS PROCVLVBIO FEBRIS EXACERBATIONEM IN CRISIBVS EXPECTARE OPORTET] Ac si diceret. Quamvis ineunte febre, lenia esse videantur quæ propria sunt eius symptomata: tamen si cum vrina tenui, cruditatis nuncia, vertigo & micantium in temporibus arteriarum pulsus aspectabilis, negotium ægro facessat; diebus criticis non concedet: sed contrà vires acquirat: ob eam sanè causam, quòd illa symptomata quæ in capite excitantur, per anathymiasin aut perustionem accidant eorum qui in alui corpore continentur, humorum: propterea quæ diebus criticis, feritate domita, non mansuescant; sed magis ægrescant: unde & ipsa febris exacerbatio ex euentu, quotiescunque certamen in prociectu esse debet.

NEC VERO MIRARI SI NON SINT APVD SE] Quoniam ad præparationem suscipientis causæ, i. cerebri, à spiritu fluctuato multum vexati; accedit vis efficientis, per anathymiasin & perustionem bilis in aluo stabulantis: tum etiam per ipsam illius translationem, quæ cum cruditate ingens delirium adferre solet; cum pepasmo hæmorrhagiam. Itaque symptomata illa repleti capitis, si perturbationis criticæ excusationem non habeant, neque ad crisin appareant; erunt profectò signa phrenitidis. Sed febrium initiis, ut iam dixi, nulla crisis, propterea quæ nec vlla perturbatio sperabilem eam facit.

2. de diagn.
acut.

87 Εν ὀξείῃσι, κίνησις, ῥιπλάσις, ὕπνος τεραχώδης ἀσπασμὸν ἐνίοισι σημαίνει.

30 Commotio in acutis, iactatio, tumultuosi somni, nonnullis conuulsionem denunciant.

PERTINET etiam hæc prognosis ad comparandam præensionem rerum in morbis eneturarum, ex perspicientia eorum quæ apparent & fiunt, tum etiam ex distinctione temporum quibus illa regnare videntur. Ut enim commotio, iactatio, tumultuosi somni; si loco fiant editis pepasmi signis; perturbationis criticæ sunt argumenta, iamiam futuram crisin denunciantia: sic etiam conuulsionis metum adferunt, si comitem habeant cruditatem: ut semper morborum initiis habere solent. Iam verò cuiusmodi sint commemorata illa symptomata; tum autem quare sint conuulsionis prænumcia; sequentis demonstratio edocbit.

88 Αἱ τεραχώδεις δρασύτητι ἐγέρσεις, ὡραφοροὶ πονηρόν, & ἀσπασμώδεις ἄλλως τε καὶ μὲν ἰδρώτων. ἀσπασμώδεις δὲ καὶ τραχήλῃ, καὶ μεταφρένῃ δοκέουσι ψύξεις ἄταρ καὶ ὅλα τὰ σώματα ἐν τούτοις ἀφροδεις ἐρήσεις.

40 Qui cum feroci perturbatione, somno excussi, è potestate sui exeunt; grauissimum habent malum, & conuulsificum: idque cum aliàs, tum si prorumpant sudores. Conuulsifica sunt etiam cervicis & dorsi perfrisiones: cuiusmodi planè videntur corporis uniuersi: ac tum vrina spumantes.

60 VITÆ RERVM omnium quæ naturæ ad perfrundum tributa sunt, nihil est melius, nihil amicis, nihil denique magis consociabile, quàm illa quies quæ dono diuinum gratissima scripit: ita nihil æquè pestiferum, quàm molesta. Quemadmodum enim somnus ægrotum reficit atque recreat spirituum instauratione; ciborum coctione; & morbificorum humorum pepasmo, unde phrenitis mansuescit: sic admirabile est quantam principiis trium facultatum labem adferat, quantum naturæ præsidia labefacter, quantisque damnis ipsos ægrotos oneret; si quid vel in causis somniferis, vel in somni ipsius neces-

sitate peccetur. De hoc theoremate, sunt quidem permultæ apud Hippocratem eximie sententiæ atque illustres, quas nihil necesse est hoc loco scribere & explicare.

QVI CVM FEROCI PERTVRBATIONE SOMNO EXCVSSI] i. Qui perturbatione mentis agitantur cum exciti somno fuerint, eaque perturbatio coniunctam habet ferocitatem in viris, morum institutorum cultu, antea mansueris. Nam *περὶ χόλης*, propriè nominatur, qui mente sine causa percelluntur, quod phrenitidis est breui futura. At verò non nisi cum adiectione dicuntur *περὶ χόλης καὶ καὶ περὶ χόλης ὕδατος*, i. perturbata alui, perturbata vrina. Sed illa *περὶ χόλης*, quæ cadit in mentem; non eodem, in omnibus, modo apparet: quemadmodum nec eadem sunt, pluribus eodem vino inebriatis, ebrietatis symptomata. Alia enim perturbatio cernitur cum mœrore & metu; alia cum exultatione & risu; alia cum silentio; alia cum garrulitate; alia cum ferocitate. Est autem ferocitas, temeraria propensio ad excessum.

SOMNO EXCVSSI] Ac si diceret. Si turbulenti somni symptoma sit ferocitas in homine moderato, cuius moderationem fouere debuerat somni suauitas, si vlla fuisset; omnemque ferocitatis causam depellere ac propulsare, si quæ ventura videretur: proptereaque symptoma illud terrificum magis: quia inde venit, vnde arceri debuit.

E POTESTATE SVI EXEVT] Quoniam ita comparata est ratio omnis perturbationis, vt cum ex leui mentis offensione, immeritò homines dicantur *περὶ χόλης*; si ea levis offensio incrementum quoque accipiat, tum illi non sint amplius *περὶ χόλης ἀπλῶς*: sed iam *ἀσθονοῦντες* meritò nominentur, quales ipsi reuera existunt. Sed inter omnia perturbationum genera; illa quæ ferocitatis est, consecutionem citam adfert, non cuiusvis delirij, sed effert cuiusdam phrenitidis & insanix: vt ipsa *φρενιτικῆς*, i. audacia breui reddatur & appareat *φρενιτικῆς*, i. ferina: id quod præceptor annotauit in proteruo paulisper responso.

GRAVISSIMUM HABENT MALVM] Sic enim vertimus *τὸ πικρὸν*: quia idem significat quod *χάλεπν*, i. periculosum: quod idem vocat *θανάσιμον*, aph. I. 2. Quo in morbo somnus laetis, lethale. Grauiissimum igitur habent malum, ne dicam funestum: quia ferocitas principatum obtinet inter omnia perturbationum genera; ob eam sanè causam, quòd febrium acutarum deliria propagata non habeant ferocitatem coniunctam: vt sanè in nullum aliud delirij genus cadere videatur, quàm in phrenitidem.

ET CONVULSIFICVM] Quasi velit. Quando sit tanta ferocis delirij atrocitas, vt si etiam paulisper appareat; indeque statim quiescat; tamen immanitatis & insanix summa omnia tandem ostendat (quòd ea ferocitas non sit sola offensione mentis à febre, sed à phrenitica affectione iam diu in cerebro concepta nascatur) si eius phreniticæ affectionis inueteratio, accessionem causæ à turbulento somno accipiat; verissimum illud erit quod summus præceptor his literis exarauit. *τὰ φρενιτικὰ νευρῶδες, ἐμυδά κλυτὰ*, i. vehementes phrenitides, in tremorem desinunt.

IDQVE CVM ALIAS, TVM SI PRORVPANT SVDORES] E capite scilicet persudatiunculam, à cerebri oppressione: qualem agnouit in illo. Tum rutila cum sudore facies in his, mala: & alio loco, vbi sic ait. Turbulentis in febribus, vrina decoloris, nigra, encephalate prædita, cum sudoribus, phrenitica. Est verò mens viri vt doceat; actionem læsam partis obsecræ firmissimum esse signum: læsionis verò speciem, denunciare cuiusmodi sit ipsa affectio. Itaque cum ipsa perturbatio, mentis affectæ sit argumentum; ipsius perturbationis idea, nempe ferocitas, phreniticam affectionem denunciat. Est autem morbificæ causæ tanta vis, vt oppressiōnem cerebri, quæ cernitur in ephidrosi; cæterarum quoque actionum cerebri deprauatio consequatur; tum per se, tum ex euentu.

CONVULSIFICÆ ETIAM VIDENTVR CERVICIS ET DORSI PERFRIXIONES] Hæc pertinent ad rigores cauforum, qui non cident loco: propterea frustra citati, translationem faciunt cum refrigeratione posteriorum coniunctam: quæ refrigeratio conuulsifica est, iuxta illud, Quinetiam posteriorum frigus, est conuulsificum. Sed hæc nihil ad conuulsionem phreniticam in hac prognosi propositam; vt melius diuisa in prorrhethico, quàm hîc coniuncta legatur prognosis.

ACTVM VRINÆ SPVMANTES] Sic in prorrh. melius quàm hîc, *ὀψιθες ὑμνωδες*, i. vrinae membranose. Sunt autem spumantes hypostasi, vel ipso liquore; eaque spuma quòd propius ab æqualitate abest, eò peiorem vim flatulenti spiritus, aut colliquationis denunciat: quæ duæ conuulsionis iustæ sunt causæ.

89 Αἰὲν κώματι ὀψιθροῦντες, ἀποσπώδες.

Deliria cum sopore, conuulsifica sunt.

PHRENITICI etiam sunt comatosi, non quidem inueteratione phrenitidis, quæ adferat *κώματι*, i. inclinationem soporifam, per exolutionem cerebri; vt sæpe adfert: sed soporiferæ causæ cum phrenitica, pari, vt ita dicam, adiunctione. Sic enim Hippocrates. Soporiferi erant phrenitici, maxime dum febris erant in astu. Ad quem locum ita scripsit Galenus. Materie crassitudo faciebat comā, potissimum in quibus in vitio erat caput. Atque phreniticis quidem primario caput afficitur: iis verò qui ardentem febricitant, ex euentu. Nam ardor febrilis pranos humores sursum ad caput effert, qui sanè tum erant frigidi atque crudi. Est enim cōma phrenitidis & causo *ἀσύνετον*: sed illis temporibus ideo fuit illis consociale, quòd hominum capita erant repleta crudo humore, ex annua tempestate austrina, flatu sonoro placida,

placida, pluuioſa, & molli, Exiſtunt alia comata phrenitidis conſectanea: quemadmodum & comatis, lib. 1. prorrh.

ipſa phrenitis.

DELIRIA CVM SOPORE] Vel potiùs cum lethargo. Nuſquam enim lethargi nomen legitur in prorrhético: ſed in Coacis paſſim. De comatis autem & lethargi natura, loco dicitur & pluribus.

CONVULSIFICA SUNT] Siue coma phrenitidis conſectaneum ſit ab exhausto; ſiue primigenia affectione cum phrenitide ipſa coniunctum: ex tumultuoſa crudi humoris commotione, quam ciet in capite & cerebro phreniticus ardor. Nam & febris ardens non raro in cerebro focum habet. Sic enim Galenus commentario ad illam prorrh. Acuta febris ſuperueniens echo, cum viſu tenebricoſo, & gravitate qua deſcendit ad naves, ad exceſſum mentis apparet melancholicum. Gignitur, inquit, ardens febris tum ex cauſis aliis multis, tum ex cerebro inflammato: hinc namque eſt delirium continuum, teſtatum ſignis phrenitidis verae. Porro autem ex eo qui in capite redundat humido ſpiritus flatulentius gignitur: unde echo & obſcuratio viſus ex craſſo humore, aut ſpiritu, qui in oculos decumbit.

90 Αἰεὶ π' ὀλίγον δραστήϊα φρακρούσιες, θηρώδεις καὶ ἀπαισιμαῖοι δὲ θεωρημαῖνοι.

20 Deliria pauliſſer ferocia, mox erunt immaniſſima; atque futuras convulſiones prænunciant.

H VIVS diuinæ prognōſeos explicatio repetenda ex commentario Galeni ad prorrh. 25. lib. 1. & ex noſtra diſputatione ad illam prognōſin, Moderati hominis proterua reſponſa, mali ſunt ominis. Vt nihil neceſſe ſit plura ſcribere, quæ ad demonſtrationem pertineant.

Ergo. DELIRIA PAULISPER FEROCIA] i. Moderati hominis proterua quaſita atque reſponſa, præſertim à ſomno & immerito. Eſt autem ferocitas, habitus animi, quò ex profeſſo aduerſamur conſiliis, & officiis ciuilibus; vel, temeraria propenſio ad exceſſum ferinum, quo truculenti ſunt homines & efferati.

30 PAULISPER] Sic enim vertendum duximus illud, ἐπ' ὀλίγον, quod etiam Galeno placere video, cuius ad hunc locum hæc enarratio eſt. Qui exiguum ad tempus exiſtunt feroces, mox quieſcunt; ſuſpectos haberi iubet. &c. Et verò Hippocrates, ad perſpicuitatem maiorem adiecit in prorrh. Καὶ ἐὰν ἐπ' ὀλίγον χρόνον ᾤονται, i. Quamquam exigui ſint temporis. Quinetiam non ita pridem, π' ἐπ' ὀλίγον, pauliſſer eſſe diximus, in illo. Τὰ ἐπ' ὀλίγον ὀξία δόχηματα ἐς κληίδα καὶ αἰσώπρια πύκνωται, ὀλέθρια, i. Acuti tantiſſer dolores, qui ad claviculam aut ſupra perſtingunt, lethales ſunt.

40 MOX ERUNT IMMANISSIMA] Quoniam, vti iam dixi, ferocitas illa moderati hominis, quæ ὀλίγον repente ſe prodidit; ex inueteratione affectionis phreniticæ in cerebro conceptæ; temeraria propenſio eſt ad exceſſum θηρώδης: per facilem ὁδοποιεῖαν, i. tranſitum bilis flauæ in atram, cuius acriores ſunt morſus quàm flauæ: propterea que phrenitici fiunt fanatici, & efferati. Cernitur autem illa ſumma immanitas in iis, mordendo, percutendo, ſæuiendo in eos qui præſto ſunt: vt etiam ſibi ipſis manus adferant. Quod accidiſſe vidimus nobiliſſimo, fortiſſimo & optimo cuidam viro, cuius ego pietatem & ſingularem vitæ ac morum integritatem & manſuetudinem, per quindecim annos expertus fuëram. Is autem cum in febrem acutam incidiſſet, tertium agens diem, homo omnium modèſtiſſimus, cœpit eſſe ferox in quaſitis atque reſponſis; poſtridie, hoc eſt die quarto, cœptis immanibus ſic efferus fuit, vt è ſecundo cœnaculo ſeſe per fenestram præcipitaret.

ATQUE FUTURAS CONVULSIONES PRÆNUNCIANT] Quoniam, vt ait ille. Τὰ φρενικά κεννύουσιν, i. ῥυττάς, ἢ σποδράς, ἢ ἰχυράς, Ἐμώδεα πλευντῶν, i. Vehementes phrenitides in tremorem deſinunt. Quod paulò ante iam demonſtrauiſmus ad 88. Quod autem ferocitas veniat à forti affectione phrenitica in cerebro iam diu concepta; docet Galenus, qui conſtanter ſuſtinet, nullum delirium ferocitate editum fieri cauſa febris: ſed eſſe ſymptoma phrenitidis natæ & procreatæ in cerebro.

anno 1574.
menſe Iulio.

91 Εν τοῖσι μακροῖσι, κοιλίης ἀλγος ἐπάρσιες ἀπαισιμαῖες.

In diuturnis, ſine cauſa aſſurgens moles alui, convulſifica eſt.

30 HANC prognōſin Galenus negat eſſe Hippocratis, comment. ad prorrh. 7. l. 3. cui aſſentior facile: quoniam moles alui convulſifica eſſe nequit: tamen in Aſpaſij filio, tale ſymptoma author prorrhético annorat, his verbis. Κοιλίης ἀδείκναις πρὸς ἀνέγκλυμα χαλῶσα, καὶ ὀγκουμένη ἐκ τῆς ἀπαισιμαῖας, καὶ τῆς ἀσπασίας, i. Ventris circumtenſio, non niſi coactè deicientis humida, repente intumeſcens; habet quid convulſificum, &c. Doctiſſima autem eſt Galeni enarratio in eam prognōſin.

92 Τὰ δὲ πρὸ παραχρῆμα, ἀγρυπνα, ἐπιστάζοντα ἐν ῥινῶν, ἐκταῖα
κουφιδέντα, νυκτὶ πονήσαντα, ἐς δὲ τὸ αὐριον ἐφιδρώσαντα, κατενεχθέν-
τα, ὡς ἀκρὸς αἵμα ἀιμορροεῖ λαύερος, καὶ λυεῖ τὰ πάδια. τὸ ὑδατῶδες
ἔργον τοιαῦτα σημαίνει.

*Qui februm initis perturbantur somni expertes; siquidem stillarit
sanguis, indeque sextum diem agentes sunt alacriores; sed noctem exi-
gant molestiorem; postridie autem cum sudatiuncula soporati, non sue
mentis, sanguinem liberaliter fundant; malis omnibus defunguntur.
Ac talia denunciat aquosa urina.*

lib. 1. Epid.

61. Coac.
proth. 56.
lib. 1.
61. Coac.

83. Coac.
& proth. 4. 1.

proth. 40.
lib. 1.

N V L L A animi perturbatio, februm initis bonam crisin promittit: proptereaque merito formi-
dabilis existit: quoniam bene præceptum illud est. *Ut critica ne statim appareant.* Quinetiam, *Exigua san-
guinis stillicidia, sinistra sunt crisis, ne dicam funesta:* ut ceteræ omnes iudicatoriæ causæ exiguæ, quæ sunt
reuera iudicatoria non iudicantia, proptereaque mortifera aut crisis funestæ. Sed quatenus ea sint ma-
læ crisis, quatenus item mortifera, iam explicauimus. Ergo illa duo theorematata eiusmodi sunt, ut con-
tra nihil adferri posse videatur: non tamen ita catholica, ut non recipiant diorismum, nec indefinite
pronuncianda. Diorismi sunt in hac prognosi propositi ad explicandum.

Q V I F E B R I V M I N I T I S P E R T U R B A N T U R] Mente scilicet atque animo. Februm au-
tem initis vertendum putavi, τὸ ἐνδὸν, quod melius exprimit mentem nostri authoris, meliusque cohæ-
ret cum omnibus membris huius prognoseos; quàm illud, τὸ ὑδατῶδες: quod in hanc sententiam scriptum
legitur in prothetico.

S O M N I E X P E R T E S] Quod eum impediatur excursus sanguinis biliosi educatione copiosam non
habentis.

158. Coac.

aph. 71. lib. 4.

lib. 1. Epid.

30

30

S I Q V I D E M S A N G V I S S T I L L A R I T] Exempli causa, quarto die: ac tum reddatur vrina
laudabili præditâ hypostasi, iuxta illam prognosin. *Quibus incunte febre, sternutamento excusso, è naribus
stillat sanguis; siquidem vrina quarto die hypostasim habeat albam, febrem exolutam iri per hæmorrhagiam septimo
die, ostendit.* Ut enim laudabilis vrina tempus crisis prænunciat: sic etiam stillicidium sanguinis ad spe-
ciem ipsam crisis, i. ad hæmorrhagiam liberalem apparet: qualis prorupit Metoni, qui etiam cum signis
pauis à stillicidio, per hæmorrhagiam liberalem iussam & iniussam, morbo lethali defunctus est: quod
miraculo apponendum duxit Galenus, adferens illud. *Perceptum vniuersale confirmat hic æger. Quod larga
hæmorrhagia à magnis morbis vindicat.* Reuera autem quod natura & humor cursum inflectunt, eò criscum
inclinationes fiunt.

progn. 25.
1. prognost.

hist. 10. part. 3.
lib. 3. Epid.

I N D E Q V E S E X T O D I E A L A C R I O R E S F A C T I] Optima est quidem omnis euacuatio,
qua morbus in totum exoluitur. Bona est etiam, quæ facit ut ægri alacrius ferant morbum: quemadmo-
dum de sudoribus præcepit. Hic autem commemorabile est, quod sexti diei leuationem prædicarit: tum
quia dies ille tyrannus est: tum quia dierum imparium meliores sunt paroxysmi, quàm parium. Est igitur
consentaneum, ut quæ diebus imparibus exacerbantur, paribus illa mitescant, & contra: quemad-
modum in Abderita Nicodemo annotauit, qui in eius historia bis terve scripsit, *παύσην, i. leuatio*, diebus
imparibus, cum ille paroxysmorum artiafms vexaretur.

sent. 10. part.
1. 6. Epid. &
aph. 13. 1. &
25. Coac.

S E D N O C T E M E X E G E R A I N T M O L E S T I O R E M] Quia noctis molestia esse solet, pa-
roxysmum criticum præcedentis, atque symptoma est perturbationis criticæ; quod quidem accidit
præter vim morbi, & naturæ merito. Commemorabilis est autem noctis molestia. Quoniam in ea per-
turbatione critica, quæ vi naturæ suscipitur, secernendo, & ad excretionem præparando; ægrorum dv-
αροεῖα, i. iactatio de nocte magis, quàm interdiu esse solet: quoniam ipsa sola somni vacuitas, instar gra-
uissimi morbi, molesta est.

82. Coac.

P O S T R I D I E A U T E M] Quando certamen naturæ & morbi est in procinctu; septimo scilicet die.
C V M S V D A T I V N C V L A] Ab oppressione fugaci, sine vlla cerebri offensione, quæ fixa sit fir-
miter, quæque ab hæmorrhagia superstes maneat.

S O P O R A T I] Ab eadem causa, per translationem humoris mitigati.

N O N S V E M E N T I S] Per sympathiam febris fugacem, non autem per idiopathiam, proto-
pathiamque, ut in feroci delirio.

S A N G V I N E M L I B E R A L I T E R F U N D A N T] Virtute naturæ; meatuum libertate; & ma-
teriaz comparato meabili exitu.

M A L I S O M N I B V S D E F U N G V N T U R] Perturbatione, sopore, delirio, febre quoque ipsa:
quoniam omnis repletionis vacuatio propria affectionem inde natam tollit, quæ & inflammationis &
malignæ expers est cacochymiz: maxime verò si illa vacuatio significata fuerit pepasmo ad tempus; &
critica perturbatione, ad speciem ipsam crisis, quæ sit diebus criticis, non alienis.

86. Coac.

A C T A L I A D E N U N C I A T A Q V O S A V R I N A] i. Tinctura biliosa expers, cuius antea
fuit parti-

fuit particeps, atque pepasmi: de quibus ita philosophatur. Recordabor quibus à crisi, post multatum hypofaseon urinas, aquose contigerunt multe sincere, tenues. Bioni qui apud Silenum decumbebat; Kratie qui apud Xenophanem; Aretonis seruo; uxori Mnesistrati.

93 Τῶν ἐξισταμένων μελαγχολικῶς, οἱ τρομώδεις χυόρμοι, κακοή-
δεις.

10 *Qui cum immanitate fanatici contremiscunt; proximè absunt à morte.*

ΕΚΣΤΑΣΙΣ μελαγχολική, infania est vehemens & plena immanitatis, quæ Græcis dicitur *μελαγχολία*. Μελαγχολική autem dicitur, ab atra bile, cuius ex flaua multum facilis generatio est. Tum ab accerrimo bilis atra morfu omnia summa sunt immanitatis exempla. Non enim hoc loco melancholia describitur primigenia; quæ nihil aliud est, quàm delirium febris expers, cum metu & mærore coniunctum: sed infania, ut ita dicam, atrabilaria, phrenitidis conspectanea.

20 *QUI CUM IMMANITATE FANATICI CONTRÉMISCUNT, PROXIME ABSUNT A MORTE*] Exhausto cerebro atque nervis: unde accidit, ut labefactata virtute in substantia, facultas ipsa laboret, ac tandem fatiscat in officio: ut hic tremor symptoma sit alienati cerebri; sicut infania, fortiter alterati.

Gal. comm.
Proph. 14. 1. 1.
1. & Coac. 8. 2.

94 Παρεφροσιών ἐν πνύματι μινυδῶδες, καὶ ἐφιδρώσι, θανατώ-
δης θανατώδης δὲ καὶ ἐν πνύματι, καὶ λυγμῶ.

30 *Delirium in spiratione minutula, & sudatiuncula, citam mortem denunciat. Mortiferum est etiam, in difficultate spirandi, cum singul-
tu coniuncta.*

40 *HORVM* verborum difficilior explicatio est, quàm perceptio. Ut enim facile complector animo quid velint; ita difficile sententiam interpretor, propter ancipitem verborum significationem & usum, quò illa conuerti debent, ad ineundam prognoseos rationem, quæ ducitur è signis & causis eorum quæ apparent & fiunt. Iam primum omnium, constat in spiratione cerni delirium, quando in necessario spirandi usu, & libertate instrumentorum mouentium, deducuntium, & excipientium; sola voluntas motum non gerit. Sed tamen illa difficultas spirandi, magna & rara; mortifera non est: qualem esse dicit hoc loco. Ea enim tantum delirii opinionem facit; quia voluntatis deprauationem ostendit. Atque illud delirii signum, versatur in sensu doloris amisso: quemadmodum & sitis immerito sedata. Et quamuis pestifera sint illa symptomata, ut signa & causæ: tamen illa citam mortem non adferunt. Itaque non inconsideratè, nec temerè, breui mortiferum esse putavi sine vlla exceptione τὸ πνύμα μινυδῶδες, i. respirationem minutulam, breui finem habituram: id enim significat τὸ μινυδῶδες. Nam quod attinet ad ipsum πνύμα, nemini dubium est, quin pro respiratione usurpetur.

aph. 6. lib. 2.

50 *DELIRIUM IN SPIRATIONE MINUTULA*] Non quidem ab ea spiratione indicatum, sicut à magna & rara denunciari solet in morbis acutis: sed cum ea spiratione coniunctum, ab inueteratione causæ phreniticæ in cerebro conceptæ. Est autem spiratio minutula, parua & rara; certissimum exiguique, penèque extincti caloris argumentum: eamque spirationem ex euentu frigidam expirationem nominauit, de qua talem prognosin instituit. *Frigidus qui ex ore & naribus spiritus expirat; iam lethalis est valde.*

1. prognost.

1. prognost.
& comment.
ad hist. 32
Epid.
De ephidrosi
vide 32. Coac.

ET SUDATIUNCULA] In qua miliaris sudor è capite tantum exodat, qui partis ipsius, unde manat, exolutionem ostendit.

CITAM MORTEM DENUNCIAT] Quod in propinquo est caloris natui extinctio, & respirationis priuatio, quam tollit usus amissio, & languor effert facultatis motricis.

60 *MORTIFERUM EST ETIAM IN DIFFICULTATE SPIRANDI*] Duplex omnino est difficultas spirandi quæ cum delirio desperationem adfert salutis, aut in angusto spem esse denunciat; magna, rara tardaque; parua & rara. Quoniam voluntas in vitio est, nec antè se erigit ad functionem, quàm acrior sensio excitata fuerit, per incrementum necessitatis: quod cernere est in rusticis qui stupent artoni visu tabulæ politissima arte depictæ, quam dum hiant ore magna contentione animi intuentur; non antè respirant, quàm nimia oppressione pene suffocati, ad se redierint. Quod si ad raritatem accesserit quoque tarditas, palam est cum deprauatione voluntatis, cerebrum laborare, vitio complexionis suæ: proptereaque facultatem in officio pigram esse. Nam de rara & parua spiratione, cuiusmodi sit, iam aperuimus.

CUM SINGULTU CONIUNCTA] In quo vel alui tunica exaruerint; vel ipsum iecur magna

47. Corp. inflammatione sit obsessum: eoque peius, quò plures partes laborant. Nam de singultus periculo alio loco iam diximus.

95. *Ενύπνια τὰ ἐν Φρενίτιδι ἐναργῆ, ἀγαθόν.*

Quæ in phrenitide memorantur insomnia, bonum denunciant.

Nihil optari potest à medico quod ipse malit, quàm ut phreniticus somnum inear, suauiterque dormiat. Ac suauitatis quidem argumeta ponit, insomnia, quæ cum exacta fuerint incundè & alacriter, 10
memorantur ab eo cui visa occurrerunt tranquilla. Sunt autem insomnia rerum quæ intelliguntur, &
sensu percipiuntur, in somnis quasi visa quædam, & spectra. In effingendi virtutem à sensu communi,
rerum sensibus extimis perceptarum representatio incidit: qui sensus communis nunquam ut extimi
quiescat, & feriat: sicut nec animus bonarum cogitationum epulis saturatus. Hinc philosophicæ dis-
putationes grauissimæ, & poëticæ exercitationes diuinæ.

QVÆ IN PHRENITIDE MEMORANTVR IN SOMNIA] Non turbulenta quidem, &
tumultuosa: sed placida atque tranquilla; siue illa sint *ὕπναι*; siue diuinum *ὕπναι*: quoniam omnia sunt
insomnia per eas species quæ in animam receptæ sunt, aut per principia diuinitatis, eiusque cœlestes co-
gnationes: qualia fuisse credimus Iacobi Patriarchæ, Iosephi, & Danielis, qui & ipsi coniectores veri
fuerunt.

MEMORANTVR] Sic illud *ἐναργῆ*, non propriè quidem *ἐν τῇ φιλοσοφίᾳ*; sed appositè *ἐν τῇ δια-
γοίᾳ* nostri authoris: ut ea *ἐναργῆ* vel euidentia, referatur ad eum qui somniat, quique insomnia mente
percepta commemorat: non autem ad eos qui somniantem, loquentem audiuerint; aut etiam tumultu-
uantem & progredientem viderint.

BONVM DENVNCIANT] Primum quidem, quia comatis metum adimunt. Nam comatosis,
helluonibus, remulentis, & iis qui satagunt rerum multarum, aut nulla somnia, aut confusa referuntur:
propterea quòd rerum imagines perplexæ inter se, non aliter corrumpuntur, quàm radij rotæ citissimis
rotationibus circumactæ. Ad hæc tranquilla & memorata phreniticorum somnia, præclare ad salutem
faciunt & apparent: quia phrenitidis crudæ & effræ syncramatica non sunt: iuxta illud, *ubi somnus deli-
rium sedat, bonus est*, i. salutaris & signo & causa.

96. *Εν Φρενίτιδι λευκαὶ διαχωρήσεις, καὶ νωδρότης, κακὸν ῥίγος ὅτι
τύτοις καίουσιν.*

*In phrenitide albæ deiectiones & corporis exolutio, graue malum:
sed longè grauissimum, si rigor accesserit.*

QVOTIESCVQVE ad nobilissimæ partis oppressionem & erethismum, accedit perennis mor-
bificæ materiæ generatio; & excursus symptomaticus; agro pessimè est; & propensione morbi, infæ-
liciter eunt ad desperationem salutis. Ergo cum phrenitis, ipsa per se terrificata sit, vehementia sympto-
matum, & dignitate partis obsessæ; cui commoda omnia quibus vimur, lucem qua fruimur, spiritum
quem ducimus, rationis exercitationem, disputationem; accepta referre debemus: tum si ad eam mise-
riam accesserit causæ morbificæ maligna vis, per concussionem eò excussa, vnde pars ipsa tandem fatis-
cat; iam est desperandum de vita.

Quamobrem. IN PHRENITIDE] i. In delirio perpetuo, cum vigiliis & ferocitate coniuncto,
quod in cerebro sedem habet, bile perfuso.

ALBÆ DEIECTIONES] Tincturæ biliosæ expertes, quæ non sunt eiusmodi colore ciborum
qui capiuntur, ut lactis; quales in Apollonio visæ sunt, qui lacte victitabat in febre; sed quæ ex euentu
tales apparent, vacuitate scilicet bilis, translata in cerebrum: cuius translationis causæ est, incendium su-
perioris hepatis. Atque ea translatio citra, præcipit attrahendi occasionem vesiculæ fellis: sicut in ictero
vis attrahendi impeditur, propter canaliculi obstructionem. Sed hoc interest inter albas deiectiones
ictericorum, & phreniticorum; quòd cum in vtrisque albæ ferantur; ex euentu tamen, illorum sint
eiusmodi à suppressione bilis; horum verò à citra & symptomatica translatione.

ET CORPORIS EXOLVTIO] *Αφροίς, νωδρότης, ἔρρηξ*: non à cerebri oppressionem, madefacto
nervorum principio, ut in diuturna tempestate austrina; vnde phrenitici comatosi: sed emortua facul-
tate. Nam à bilioso humore fieri nequit.

GRAVE MALVM DENVNCIANT] Vel mortiferum potius. Quoniam tales *νωδρότες* seruari
non potis est: collapsio principio vnde omnia naturæ, sensus & motus commoda suppetebant: itaque
ergo ipsa perit & corrumpit animalitas, ut ita dicam.

SED LONGE GRAVISSIMVM, SI RIGOR ACCESSERIT] Ac si diceret. In ea despe-
ratione salutis quam phrenitica *νωδρότης* ostendit; si rigor superueniat frustra citatus è venis; & acces-
sione cau-

fione caufarum, quia translationem facit ad caput; & adiuncta corporis infirmitate, quia mortiferum est, fractis iam viribus rigorem incidere; non dubium est quin citam mortem adferat, & agrum ad exitum præcipitet.

97 Εν τῷσι φρενιτικοῖσιν, ἐν δὲ χῆσι τὰ ὀπιεικῶς τε ἔχοντα, πικρὰ τε μεταπίνοντα κακόν.

10 In phreniticis, quæ ab initio deprehenduntur symptomata, & crebro huc illuc cientur; mala.

ΤΟ ΟΠΙΕΙΚΩΣ, authore Galeno, dicitur id quod medium obrinet locum; inter symptomata spei plena, & illa quæ in spe exigua, metu nos terrent. Itaque phreniticorum symptomata, sic sanè hoc loco sint constituta, ut neque τὴν ἐκπασι μελαγχολικὴν, i. excessum melancholicum, neque τὴν λήρησιν, i. delirium præ se ferant: sed τὴν ἀπορροιαίναν luculentam & commemorabilem ostendant in omnibus, aut certè quibusdam deliriorum notis: quæ cernuntur in negligentia sui, dissimilitudine morum, & verborum obscenitate, aut etiam nugarum garrulitate. Ne longum faciam, erit sanè τὸ ὀπιεικῶς inter τὸ σφοδρῶς, i. aph. 27. 2. proth. 9. 1. aph. 27. 2. proth. 50. 1. 2. 1.

20 IN PHRENITICIS] Qui cum vigiliis & ferocitate, per sympathiam febris, continenter delirant.

QUÆ AB INITIO SYMPTOMATA DEPREHENDUNTUR] Ac si diceret. Si phreniticorum symptomata, phrenitidis initio sese prodant; quo tempore, ut in omnibus morbis acutis bene constitutis, omnia debent esse ἀδύναστα. Nam febrium acutarum initiis remissiores sunt paroxysmi, vigiliæ, dolores, fastidia, sitis. Si igitur symptomata fiant abundè, & sufficienter appareant; unde significatio sit repetitæ generationis ex inueteratione causæ phreniticæ: quemadmodum in phrenitico Thasio annotavit Galenus.

ET CREBRO HVC ILLVC CIENTUR] I. Si feritas causæ phreniticæ peragret omnes cerebri mansiones, ut in cæteris morbis acutis orgasmus materiæ effert mutationibus creber est, crebrumque facit transcursum ab vna parte in aliam. Atque talis orgasmus materiæ, substantia tenuis, qualitate acris, temperamento calidæ; tantum fit morborum initiis: non autem cum iam processerint. Si igitur phrenitidis initio, symptomata iam terrificata, crebro huc illuc moueantur; & variarum cerebri mansionum, & humoris phrenitici propria erumpant; unde varietas deliriorum in videndo, audiendo, ratiocinando, imaginando, & memorando: tum etiam phrenitidis incrementum, quod cernitur in actionibus ad summum deprauatis, τὴν ἡγμονικὴν, καὶ τὴν θυμοειδοῦς, καὶ τὴν ὀπιθυμητικὴν, i. principis, irascibilis, concupiscentis; quæque ἐκ τῆς ὀπιεικῆς, iam factæ sunt μελῶδεις.

40 MALA] Quoniam symptomata hæc, sunt repentinæ phrenitidis ex inueteratione causæ phreniticæ; ob eamque causam peiora: sicut fera rabies à morsu rabiosi canis immisæ. Tum enim victa iacet facultas, quæ dominatu morbi tenetur. Huc accedit, quod plurium partium labefactatio, peiorem morbum ostendit. Hæc autem prognosis iisdem pene literis expressa legitur in prothetico.

98 Τῶν ἐξισταμένων μελαγχολικῶς, οἷσι τρόμοι ὀπίνονται, κακόν.

Inter eos qui è potestate mentis per melancholiam exeunt; quibus tremores incidunt, proximè absunt à morte.

10 99 Οἱ ἐξιστάμενοι μελαγχολικῶς, τρομάδες γινόμενοι, καὶ πικρὰ λίζοντες. ἥρα γε φρενιτικοί;

60 HUIUS prognoscos τὸ ὕστερον πρῶτον in verbis, sententiæ absurditatem parit, & ab omni philosophica ratiocinatione excludit. Etenim nemo est omnium rei medicæ philosophorum qui dixerit, tremulos fieri sputatores; inde fanaticos; ad extremum phreniticos: sed contrà, phreniticos primum; inde sputatores; mox autem fanaticos; nouissimè tremulos: qui sunt progressus ad interitum per consecrationem cerebri alterationem, & alienationem.

Ergo sic melius,

Οἱ φρενιτικοὶ πικρὰ λίζοντες, ἐξισταμένοι μελαγχολικῶς, ἥρα γε τρομάδες γινόμενοι;

Phrenitici, sputatores, fanatici, etiámne tremuli?

QVI sint phrenitici, inde fanatici, nouissimè autem tremuli; quæque sint eorum symptomatum causæ, & quorsum illa fiant atque appareant; satis superque iam demonstrauimus, & *et non dissuas* nostri authoris examinauimus. Superest; vt de sputatoribus, qui sint, & cuiusmodi: tum autem quæ sint illius pryalismi causæ, & notæ, dicendum sit.

Enimuerò sputatores dicuntur, qui aut familiares suos conspuunt; aut qui sine conspuendo, sputandi finem non faciunt. Id autem faciunt vel necessariò, vel indecorè. Ac necessariò quidem, propter stomachum alui, nimia humoris abundantia laborantem; per feri phrenitici in eas partes prolapsi: aut quoniam idem serum à cerebro in palatum & fauces exudar: quemadmodum fauciatò capite, cum *tr*ma exaruerit, pustulæ biliosæ pullulant in palato & lingua. Sic exudante sero ab inflammatione, ophthalmia fit lacrymosa; pleuritis tussiculosa; hepatis magna inflammatio, singultuosa. Quamobrem mirum videri non debet, si phrenitidis eximix pryalismo succedit insania *μελάνθης*, vnde postremò & nouissimè tremor, cum est moriendum. Hi sunt gradus quibus à phrenitide itur in requiem sempiternam. Iam quòd idem faciant indecorè, vt cætera omnia, demonstratione opus esse non arbitror. Satis enim constat, phreniticos nihil facere conuenienter, neque intelligere quid opus sit factò.

100 Οἱ ἐκείντες ὁξέως, πυρεπὲς αὐτὲς φρενιτικοὶ γίνονται.

Quibus excussa insania, febris acuta superuenit; phrenitici rursus fiunt.

PHRENITICORVM relapsus accepti feruntur insanix reliquiis, quæ ea exacta supersunt in cerebro: quia insanix tanta est feritas, tantæque cerebri alteratio; vt, superstitè empyreumate, vix videatur posse depelli. Quòd si ad eam suscipientis causæ affectionem, atque, vt ita dicam, præparationem; vis efficiens aliquunde ingruerit; in proximo erit relapsus. Est enim natura sic comparatum, vt si pars aliqua in vitio sit; in ea se morbi acuti, primario & secundario foco obfirmant. Quinetiam ab omni transitu & progressu, facilis sit ad eas partes recursus atque reuersio, vnde morbifica vis primum manant: si quidem in illis partibus impressa manent veteris mali vestigia.

QVIBVS EXCVSSA INSANIA] Per transiurum humoris fanatici, i. bilis atræ, abscessum liberalem habentis & *αὐτὴν*: vt in Herophonte. Vt enim melancholicis & nephriticis bonæ sunt hæmorrhoides: sic insanientibus, alterutro vel utroque abscessu hæmorrhoidum & varicum, insania solet excuti.

FEBRIS ACUTA SUPERVENIT] Minimè per progressum & sympathiam alterius morbi, quod propriè significat illud *ἐν*: sed quæ sit ipsa per se morbus *παλινκός* καὶ *ὑποστρεπτός*, i. recidens ac reuertens; aut propter reliquias prioris exactæ; aut propter nouam generationem ab internis vitiis, externisve.

PHRENITICI RVRSVS FIUNT] Quoniam insanix depulsio nequit esse tam exquisita, quàm repletionis, per propriam vacuationem. Nam insanix cacochymia, malignitate cæteris omnibus antecellit. Phrenitici autem fiunt, quoniam febris translatio ad cerebrum symptoma facit humoris morbifici proprium, & quòd naturam magis sequitur efficiens causæ, quàm suscipientis. Est autem morbificus humor & causa efficiens, bilis: cuius proprium symptoma in cerebro, est ipsa phrenitis: quemadmodum bilis atræ, excessus melancholicus. Quoties igitur ad præparationem suscipientis causæ, accedit vis efficiens, repentina inde est malorum generatio.

101 Οἱ φρενιτικοὶ βραχύπῳται, ψόφῃ καὶ ἀπτόμῳ. Τριώδεις ἢ πρῶτος ὁξέως.

Phrenitici parum & rarò bibentes, idque cum strepitu, tandem contremiscunt, aut conuelluntur.

hiff. 3. & 9.
i. Epid.
aph. 9. 6.
aph. 11. 6.

ΒΡΑΧΥΠΟΤΑΙ dicuntur, auctore Galeno, *οἱ καὶ βραχὺ καὶ ὀλίγῳ πίνουσιν*, i. qui parum & rarò bibunt. Nam qui parum & continenter bibunt, non illi quidem *βραχύπῳται*, sed *μετὰ βραχὺ πίνοντες* nominantur: quemadmodum Pythion, secundo die fuit *βραχύπῳτος*, cui postea octauo die apparuit spiratio minutula, breui finem habitura. Sunt enim *βραχύπῳτοι* qui parua vtuntur & rara spiratione: non autem parua & crebra, doloris & impediti thoracis symptomatica: quamuis aliter illud *βραχύπῳτος* vsurpatum videatur in illo. *Ἰσμέλιον ἔμειλεν χαρμῖον μακροπῳτὸν ἐν πένθι δαπνῶν καὶ μέγας πίνοντα, βραχύπῳτος*, i. Oscitationis cura continens, spiritus ex longo intervallo ductus: eorum qui non bibunt aut rarò, crebrò repetitus. Sed de his aliàs.

Ergo. PHRENITICI PARVM ET RARÒ BIBENTES] Quia sunt *ἀδύσῳτοι*, i. minime sitibundi:

subundi: non quidem humore in fauces exudante, ut in sputatoribus fieri diximus; aut tussi leuiter irritante quæ sitim causi sedat: sed deprauato sensu communi: unde rei molestæ sensio non excitatur nisi raro, cum per accessionem causæ sitiferæ phantasia redditur *αἰσθητικώτερον*; aut etiam propter *νέκρωση* aluiinæ facultatis *ὀρεκτικῆς* *ἢ* *πρωταίης*. Propterea quæ non leuiter peccant in sua commoda, defraudando suum genium pernecessario potionis usu. Id autem cernere est in fera hominum rabie à morfu canis rabiosi immissa, qui quæ eam causam *ὀδυσσέας* nominantur.

10 **102** **IN QVÆ CVM STREPITV] Arcfacta** scilicet tunica œsophagi, musculisque faucium in deglutiendi officio laborantibus: quæ affectio iam expressa fuit in illo. *Quibus bibendo strepitus exauditur.* Et in vxore Theodori, de qua illud scriptum reliquit. *Sonitus bibendo magni.*

CONTEMISCVNT AVT CONVELLVNTVR] Contremiscunt quidem, quando id quod mouet, & quod mouetur, mutuis certant imperiis: conuelluntur autem, motu iniussu musculorum ad sua principia, per nimiam siccitatem & marasimum viuacitatis. Vtrumque symptoma, est alienationis à vehementi alteratione, propterea quæ mortis iamiam futuræ certissimum argumentum.

102 Τὰ ἐν φρενιτικοῖσι νεανικῶς, Τριώδεια, θανάσιμα.

Egregiè phreniticorum tremores, citam mortem denunciant.

20 **ET TREMVLI** fiunt, omnes egregiè phrenitici, iuxta illud. *Τὰ φρενιτικὰ νεανικῶς, ἢ θανάσιμα, σποδράς, ἢ ἰσχυρῶς, Τριώδεια πλεονῶν, ἢ.* Insigniter phrenitici, tremore finem faciunt. Et tremuli facti paulò post moriuntur: quoniam tremor, cerebri iam alienati symptoma, desperationem salutis ostendit. Quod à priuatione habitus denuo comparari non possit.

103 Αἱ δὲ ἀναγκῆα ὄψα φροσιῶται, κέμισται· αἱ ἐκ τούτων ὄψο-
ξινόμυραι, ὀλέθριαι.

30 **Quæ circa res necessarias versantur deliria; pessima: indèque si ingrauescant, mortifera.**

NECESSARIA sunt illa, quibus vita hominum sustentatur: unde scilicet viuifica vis manat, atque deducitur ad viuacitatem tuendam. Est autem viuifica vis ἡ συνήθως ἐν τοῖς σποδοῖς τῇ ἀρχῇ ζώοντι, i. nectar illud sanguinis & spiritus, consociate virali principio, siue humido primigenio, spiritu & calore perfuso. Ad comparandum nectar illud viuificum, necessaria sunt hæc: cibus, potio, & aer quem ducimus: quorum usus liber esse debet, in secunda valetudine, & in aduersa: qui æquè studeat naturæ, ac pugnet cum morbo.

40 **QVÆ CIRCA RES NECESSARIAS CERNVNTVR DELIRIA]** *Qui πῶς ἀποσπερομένοι, ἢ δυσκόλως ὑπακούουσι; vel qui πρὸς τὰ γύμνασιον ἔχουσιν ἀπενεργημένους, ἢ.* fastidio & contumacia efferuntur contra cibos & medicos; qui parum & raro bibunt, in causa prægradi sitifera; qui magna & rara spiratione vtuntur, in febre ardente.

PESSIMA] Quia cum ineptè id faciunt, sui admodum negligentes atque immemores, quæ sunt apertissima signa mentis in officio laborantis; ad hoc malum illud accedit etiam, quod defraudando se illis rebus, quæ præter cæteras sanitatis fructus mirificos adferunt, etiam grauiora mala incurrunt.

INDEQVE SI INGRAVESCANT] Accessione causarum morbificarum, unde symptomatum perniciofa vis: ut si phreniticis fiant fanatici.

MORTIFERA] Quoniam inde aduentat alienatio atque *ταδράτης*, quam alteratio prægrandis induxit.

104 Αἱ ὄψα φρούσιες φωνῇ κλαγγώδεις, γλώσση σπασμώδεις, καὶ αὐτοὶ Τριώδεις γινόμενοι, ἔξισανται· σκληροσμός τῶν τῆσιν ὀλέθριον.

Qui in delirio vocem canoram edunt, lingua conuelluntur, idemque toto corpore contremiscunt; cæptis immanibus efferi sunt: his rigida cutis morticina.

QVI IN DELIRIO] Quando phrenitidi sicca & calida superuenit prægradis à febre deliratio. **VOCEM CANORAM EDVNT]** Communicata siccitate, & impertita arteriæ quæ dicitur aperta: quemadmodum ab humore fit rauca.

LINGVA CONVELLUNTUR] Quod in ficcione cerebri contagionem trahantur muscoli nem linguæ, neruûsque septimæ coningationis, qui ipsos musculos mouendi facultate dona t; ac lingua tunica prorsus exaruit, quæ ipsi arteriæ communis est.

IIDEMQVE TOTO CORPORE CONTREMISCUNT] Per transitum bilis ad genus neruofum, indeque per progressum ad cerebrum: vnde additio causæ phrenitica.

COEPTIS IMMANIBVS EFFERI SVNT] Mutatione bilis flauæ in atram: vnde ex phreniticis fiunt fanatici & *μεμώδες*.

HIS RIGIDA CVTIS MORTIFERA] Exhausto partium solidarum humido primigenio: id enim significat *ὁ σκληρυσμός*: de quo iam suprà diximus, ex lib. 6. Epidem. Vide comment. Galeni ad prorrh. 19. sect. 1. 1.

105 Αἰ ἀρεξάδυνα τῶν πῶν φραφροσύνη, κέκισται.

Deliria cum fixa virium exolutione, funesta.

DELIRIA] Quæ nascuntur ex affectione morbida eius partis quæ mentem in officio laborare facit.

CVM FIXA VIRIVM EXOLUTIONE] Quam peperit dolorum acerbitas, morbi assiduitas, aut colliquatio ipsa: accedente etiam vasorum inanitione; tum aspectabili; tum inaspectabili.

FVNESTA] Symptomatum vehementia partis obsessæ, vnde commoda omnia, quibus ad vitam tuendam vitmur, & ad bene viuendum; efficientis causæ contumacia; suscipientis infirmitate; curationis ἀδυναμία: quoniam nulla vacuatio quantumvis critica, potest esse salutaris, ubi vires effecerant languent: vt in perpetuum veritatis auctoritatem retineat illud. Quando ad funestum morbum accedit summa virium infirmitas, retinendæ vitæ est desperatio.

106 Τὰ ἐν φρενιτικοῖς πυκνὰ μετὰ πίπλοντα, ἀσασμώδεια, πονηρὰ.

Quæ in phreniticis, crebro huc illuc cientur conuulsifica, periculosa.

QVÆ SIT & cuiusmodi crebra illa symptomatum phreniticorum μετέπαισι, i. transitio, iam explicauimus. Sed & prognosens huius enarratio legitur in prorrhethico. Cernitur autem hic transitus, tum in crebra successione rei & priuationis, vt sitis; tum in symptomatum intensione & remissione, ex dominatu variorum & diuersorum humorum; tum in variarum cerebri mansionum irritatione, & alteratione prægrandi: vnde successiua opera φανταστικός, ἡγεμονικός, & μηχανονεύσιος, i. facultatum apprehendendi, iudicandi, & memorandi. Eius autem triplicis transitus exempla leguntur in Epidemiis passim. Ac prioris quidem in illo, Διδώδες, καὶ πάλιν ἀδύοι, i. sitiundi, rursumque sitis expertes. Alterius in muliere Thasia morosa, quam vocat δυσάβιον. Sic enim scripsit. Τῇ περὶ τῆς ἀρχομένης τῆς νυκτὸς φόβοι, λόγος πολλοί, δυσθυμία, i. 40. Prima diei ineunte nocte, timor, garrulitas, infractio animi. Tertiæ in Dealcis vxore, quæ depranatione τῆς φανταστικός, floccos carpebat, festucas legebat ἐπ' αὐτῇ, sculpebat. Eadem iudicii alteratione, modò flebat, modò ridebat.

107 Οἱ ἐν φρενιτικοῖς, μὲν κατὰ φύξιος, πτυαλίζοντες· μέλανα ἔμετον δηλοδοῖ.

Qui è phreniticis, cum perfrigeratione, sputatores fiunt; vomitum illi nigrum denunciant.

QVÆ SIT in phreniticis causa sputandi, & quorsum illi sputatores reddantur, alio loco est demonstratum. Sequitur vt quemadmodum pyralismus phreniticorum, cum perfrigeratione cōiunctus, vomitionem nigram denunciet; apertissimè, planissimèque ostendamus. Enimvero ἡ πυκνὴ ἀσάχεμις, i. sreatus frequens, nisi frustra & indecorè fiat, non est proprium phrenitidis argumentum pathognomicum: sed ferè sit illa phrenitidis egregiæ symptoma propagatū, quando à phrenitide itur ad insaniam. Talis igitur pyralismus, qui & indecorè & necessariò editur in phrenitide; si coniūctam habeat κατὰ φύξιος, non immeritò ad vomitionem nigram apparet, hac ratione.

QVI È PHRENITICIS] i. Egregiè, assiduè, vel crebro.

CVM PERFRIGERATIONE] Extimarum partium, non vniuersi corporis: sic enim docuit, ἡ ἀκρα δὲ ψυχρὰ, i. extrema perfrigerari, quando nimia bilis abundantia, parat aluus, in iis qui contra consuetudinem prandio abstinerunt: vnde ipsa cum stomacho grauiter molestèque affecta & stimolata, robur exoluit: proptereaque refrigerat extimas partes corporis. Est igitur perfrigeratio, symptoma commune

2ph.17.4.8c 3
prognost.

ptonh302i

hist., Epid.

1. prognost.
1. comment.
prol. i. e. i. i.

Quos variè peragrant morbi, crebròque soporati delirant; hos vomitum nigrum manere dicito.

Conclusions

proth. 3.5.42

80, Coas
90, Coas

90, Coast

prott.56.f.3.2.
 prott.30.1.
 prott.h.1.1.

101,6026

60 110 Τὰ ὅροις ἐπαρμαία, ἐν μακροῖσι, μικρὰ· αἱμορρώδεα καὶ
σκοπώδεα ἑπιφανόμυα, ὀλέθρια.

Parotides in diuturnis, parue. At vero prarubra, vertiginosa, & aliena spontis; pestifera.

HACTENVS de phrenitide, cuius historiam sic explicauit Hippocrates, in essentia, magnitudine, more, paroxysmis, periodis, partibus, causis, symptomatis, & crisis; vt nihil omnino desideretur; quod quisque summis ingenijs, acerrimis studiis, optima doctrina, cognosci ac percipi posse arbitretur. De parotidibus prognosin vnam instituit, quatenus illæ sunt febrium symptomata *ἐπιχρημένα*: plura ad miraculum vsque dicturus capite proprio de parotidibus, in examine morborum omnium particulatim: quod alteram partem constituit huius diuini operis Coacarum decisionum.

Ergo. PAROTIDES] Tumores contra naturam, qui nomen adoptant aurium quas infestant; ipsaque dignitate partium obsessarum & vicinarum sympathia; principatum obtinent inter omnes tumores, extimarum partium, qui sunt eiusdem generis.

IN DIUTURNIS] Scilicet morbis, quorum diuturnitas, non in praua colliuatione & maligna cacochymia; sed in pepasmi difficultate consistit, ob materiæ contumaciam, meatuum angustiam, & facultatis excreticis infirmitatem.

PARVÆ] Non quidem tumoris amplitudine, quæ sæpe talis cernitur, qualem descripsit; proptereaque ipsas nominauit *μεγας*: sed quod sint bene habitæ, molles, diffusæ, doloris & inflammationis expertes, neque palindromen facientes, sed paroxysmo mites; periodo æquales; iudicio faciles, per diaphoresin aut suppuratum.

AT VERO SANGVINEÆ] Quæ a sanguinis affluxu nascuntur, ex hæmorrhagia morbo impari; vel etiam ab excursu symptomatice sanguinis *ἀπαργυνή*, i. *expurgationem* non habentis.

ET VERTIGINOSÆ] Quæ per *συνθυμωσίαν*, i. *consensum*, cerebrum rursus afficiunt, quod ante parotidum eruptionem, signa iam ediderat suæ affectionis & vitij, cephalalgia, comate, & surditate: vnde parotidas iam nominauit *αἰδήματα ὑπὸ δακτύλου*, i. *tumores soporatos*.

PESTIFERÆ] Atque funestæ doloris acerbitate; recursum ad cerebrum; translatione ad pulmones. Huc accedit, quod illæ siue sint expertes, siue participes suppurati; mortem intentant. Expertes quidem, nisi homines liberali diarrhœa, & urinæ profundiis, periculo defungantur; vt Clazomenius: participes verò, si vniuersitatis excrementa sint cruda & praua; vt in pastoris ancilla. In vniuersum, parotidis sperabilem vitæ salutem non facit, quod sit abscessus *ἡμῖπρος* neque *ἀντίπρος*, i. *affluxus dimidiati, nec morbo parus*.

III Οἱ πυρετοὶ ἰλιγώδεις, καὶ ἀνθ' ἐιλέων, καὶ μὲν ἐιλέων ὀλέθριοι.

Febres cum vertigine tenebricosa coniunctæ, fuerint ve ilei, necne; mortifera.

IΛΙΓΓΟΣ proximè abest, inquit Galenus, ab epilepsia & apoplexia. Est enim, vt idem ait, *ἡ σκοτεινία*, i. *tenebricosa vertigo*: quam facit turbulenta spiritus in capite commotio, à flatu & crasso humore: proptereaque prænuncia esse solet apoplexiæ vel epilepsiæ: si quidem in cerebro localem habeat generationem.

Quæ cum ita sint. FEBRES CVM VERTIGINE TENEBRICOSA CONIUNCTÆ] In quibus falsò creditur circumagi caput, vnæque caligant oculi: maximè verò cum urinis tenuibus, & febrium initiis: vt nulla sit excusatio perturbationis criticæ, qualis à pepasmo sæpe fit ad vomitionem & hæmorrhagiam; micantibus venis in capite.

FVERINTVEILEI] i. Intestinorum tormina cum cardialgmo, sine vlla deiectione, per *ἀνω εἰς ἄνω*, i. *reuolutionem ad superiora*, vel chyli, vel ipsius facis aluinæ; ab inflammatione, aut contumaci oppilatione pituitosi crassi & glutinosi humoris. Est enim ilei symptoma proprium & inseparabile, *ὅθεν καὶ τὸ διερχόμεν*, i. *nihil infra transire*: vomitus autem symptoma productum, cum in propinquo mors est: vt in muliere quæ apud Tisamenum decumbebat. Ac si diceret: siue *ὁ ἄσθλος* veniat per contagionem & sympathiam stomachi malè affecti, vt sæpe accidit: καὶ τὸ ὀφθαλμώδες, i. *caligo*.

N E C N E] i. Si non à bile aluina perusta quæ fuliginem ad caput transmittat, vnde vertigo; indeque spiritum visoriū inficiat, vnde caligo: qualis in aëre purissimo cernitur, quando fumida aura nigraque suffunditur: sed à pulmonum impuritate & æstu, cuius dolorifica sensio non excitatur, vt in stomachi cardialgia, & alui torminibus ab eadem causa: aut etiam si causæ illius vertiginosæ & caliginosæ perennis in cerebro generatio sit, quæ metum adferat epilepsiæ vel apoplexiæ.

MORTIFERÆ] Quoniam vertiginosæ causæ, quæ vel in aluo; vel in pulmonibus; vel in cerebro stabulantur; febrium paroxysmis & crisis exacerbantur, & efferae magis fiunt: vt mirum videri non debeat si non sint apud se, qui vertiginosa & tenebricosa febre laborant. Quibus cumque febrium initij vertigo est; vnæque capitis venæ micant, cum tenui & cruda urina; his præcudubio febris exacerbationem in crisis expectare oportet: nec verò mirari si non sint apud se.

112 113 Τοῖσι πνέμαλιουσιν ἐξοί, πυρετὸς ὕστερον ὀξεί μὲν ὑποχονδρίῃ
ξυλόνε, κατὰ ψυχθεῖσι παρ' οἷς μέγα ἔσθμα.

*Si cui suspirioso febris acuta post incidit; unaque hypochondrii ten-
sio sit, perfrigerato; magna parotidis denunciatur.*

IN HAC prognosi verissimum illud esse reperio, quod vulgo dici solet. Brevis esse laboro, obscu-
10 rus fio. Sed omissionis potius vitium est, quam breuitatis. Omissio cernitur in diuidendo. Quæ cuius-
modi sit τὰ δὲ ὅτι & quæ τὰ ὅτι paucis aperiam & explicabo. Enimvero suspiriosi hoc loco dicuntur, ut
cæteras suspirij causas omittam quæ sunt notissimæ, quibus conceptum in pulmonibus suppuratum,
nec liberalem habet, nec liberam πνὴ ἀνακαθάρσιν: proptereaque ipsos in obsequendo contumaciores
reddit, adiuncta etiam necessitate spirandi. Nam suspiriorum causæ omnes ad ipsam pulmonum contu-
maciam referuntur. Huiusmodi enim sunt asthmatici: huiusmodi etiam οἱ πνευμαῖαι, quos fieri scripsit
Hippocrates in pleuritide, ex inconsiderato & præcipiti vsu ptisanæ; priusquam dolor quicquid, & os
humescere cœperit. De quibus ita: πρæceptor. Εὐδομαῖοι ἢ ὀλιγομερότεροι θνήσκουσιν; ὑπὸ τῆς ὀρθοπνοῖας, καὶ τῆς
πίπτουσης ἀποπνεύσεως. πᾶσι δὲ πνευμαῖαι γίνονται, ἰ. intra dies septem aut pauciores, moriuntur à difficultate spirandi,
20 & stertore suffocati. Cui namque finis suspiriosi. Deinde subiungit formam & ideam suspirij. Sputum nam-
que ipsam subsistens in via, spiritum ingressu impedit. Cogit autem ad celerem egressum: ut nihil aliud sint οἱ πνευ-
μαῖαι, quàm qui difficulter inspirant, & citò expirare coguntur. Et quia inter cæteras maximè conspi-
cua est illa difficultas spirandi, ideo nomen habet κατ' ἐξοχὴν τὸ πνύματος: ut ab eo difficili spiritu, οἱ πνευ-
μαῖαι nominentur, in quibus difficultas spirandi potissimum apparet magna.

SI CUI SUSPIRIOSO] Qui difficulter inspirat magna contentione musculorum, contumaciæ
thoracis imparium; propter pulmonis oppressionem: idemque citò expirat, coactus nimia fuliginis
abundantia, suffocationis metu; idque paulisper, dum ipsa materia, maioris suspirij causa effectrix, ad
aures cursum inflectit, ibique parotidas facit.

FEBRIS ACUTA POST INCIDIT] Quæ à peptismo mituerat, nunc recrudescit: denegato
30 exitu materiæ per anacatharsin, neque alio liberaliter ducta; nec prorumpente urina crassa cum hypo-
stasi plurima.

VNAQUE HYPOCHONDRII TENSIO SIT PERFRIGERATO] Hic maximum vitium
est, in diuidendo: sed longè maius in enunciatione. Namque ut concedam suspirio, & febris incre-
mèto, post suppuratum, parotidas denūciari; ac suspirio quidem, quod sine prophasi apparet paulisper;
& sine aspectabili causâ quiescit: tamen non efficitur ad ineundam prognosin parotidum, necessario
concurrere hypochondrii tensionem: sed contra ipsum videri debere & percipi molle, succi plenum,
& expers doloris. Enunciationis autem vitium cernitur in eo quod legitur, κατὰ ψυχθεῖσι; cùm in pro-
gnostico scriptum sit, Οἷον δὲ τὸ ἐν τῷ ὑποχόνδριῳ τὸ πνέματις ἡ ἐξέστηται: vbi Galenus τὸ πνέμα interpretatur, 2. πρὸς
θερμότητα ἐν τῷ ὑποχόνδριῳ ὄντα, ἰ. ardorem manifestum. Quæ cùm ita sint, hæc partitio & enunciatio lo-
cum habebit.

40 SI CUI SUSPIRIOSO [Qui & parumper sine prævidentiâ suspirat, & sine aspectabili causâ,
suspirij finem habet] FEBRIS ACUTA POST INCIDIT, MAGNA PAROTIS DENUN-
CIATUR. Deinde sic. AT VERO SI CUM HYPOCHONDRII PARVUMPER ÆSTVAN-
TIS TENSIONE, QUIESCIT SUSPIRIVM, SALVTE SPERABILI; ABSCESSVM
FORE INFRA EXPECTATO. Hæc igitur partitio & enunciatio legitima instituitur ex perspi-
cientia causarum & abscessuum criticorum: nisi fortè quis velit harum duarum prognoseon comple-
xionem eò spectare, quò illud iam explicarum. In suppurato pulmonis, si dolor ad ventrem & ad iugulum,
parumper huc illuc prorepit; & cùm anxitudine stertor adsit; expectorabilis materiæ vs magna ostenditur. Sanè
quidem: sed hypochondrii tensio in suspirio per prætopathiam, parotidas nunquam denunciat; nisi
ex euentu in causo; quando itur ad hæmorrhagiâ, quæ morbo sit impar, & in abscessum pone aures
50 conuertitur. Cæterum huius prognoseos mens potissimum eò spectat, ut intelligamus; parotidas,
quamuis dimidiato, nec rependente abscessu reuera nō sint criticæ & salutare in morbis acutis: tamen
in suppurato pulmonis, ancipitem salutem omnino facere certam; si & suppurent, & fistulentur.

aph. 37. 4. &
6. Epid. part. 2.

114 Οἷσιν δὲ ἐν πυρετῷ ὀδυῖναι γρόμματα πρὸς ὀσφυῶν, καὶ τὰ κάτω
χρεῖα, φρενῶν ἀπλώνται ἐκλίπεται τὰ κάτω, ὀλέθρια: ἄλλως ἤ, κ' ἐν
ἄλλῳ σημείῳ πρὸς χύηται πονηρὸν. Ἦν δὲ τ' ἄλλα σημεία μὴ χύηται
60 πονηρὰ ἐμπύον χύησθαι ἔλπις.

*Quibus in febre dolores circa lumbos & inferiores partes oborti, iis
relictis ad diaphragma transeunt, valde pestiferi: idque cùm aliàs;*

um si quod aliud prauum accesserit signum. Sin autem cetera signa non sint praua; suppuratum expectandum.

ENIMVERO omnis symptomaticæ translationis, omnis metuendus exitus; vnde cumque illa cûrsus ad superiores partes inflectit: sed ea demum salutis desperationem ostendit quæ firmiter fixa in parte nobili, ad vitam tuendam pernecessaria; praeiorum quoque signorum accessionem habet. Sic Larissæo Caluo femoris dolor primo die obortus, secundo concessit; inde maior febris, somni vacuitas, partium extimarum frigus: tertio die omnino femoris dolor quieuit; sed è potestate mentis exiuit cum iactatione multa & tædio: tandem quartum agens, sub meridiem acerbissima morte interiit. Critonem recursus tumoris in pede oborti, secundo die interemir. Ne longum faciam; omnes morbi symptomatici, excursus & recursus consecranci, sunt primigeniis peiores: quoniam materia quæ corruptione propriæ substantiæ, in vitio est, partium, in quas transfertur, complexionem omnino labefactat. Sed iuuat legere & intelligere diorismos quibus vitur ad incundam prædictionem futuri exitus, i. translationis symptomaticæ, quæ proreperit à lumbis ad diaphragma. Sunt autem huiusmodi.

QVIBVS IN FEBRE] Cuius vacationem expectare non licet ex vlllo præsentis materiæ decessu, qui nondum significatus fuit, neque ad tempus, neque ad speciem ipsam crisis.

DOLORES CIRCA LUMBOS ET INFERIORES PARTES OBORTI] Nulla incidente vi extrinsecus, nec vlllo prolapsu catarrhi in musculosum genus lumborum; partiumque inferiorum, vt ossis sacri, aut femoris: sed incandescente arteria quæ superiacet lumbis; vel inflammata rhachitide; vel etiam mesocolo quod à lumbis originem ducit. Atque is dolor sit eiusmodi vt cõiunctam habeat cum acerbitate grauitatem, quæ signum est affectionis propriæ, nõ autem sympachia; nec vllam opem percipiat ab iis quæ offeruntur: qualis Larissæi Calui. Sunt autem lumbi, pars illa spinæ quæ absolvitur quinque vertebis, à nobis costis ad os sacrum: qui numerus vertebrarum lumbarium nusquam alibi quàm in homine reperitur, ne in simia quidem. Ac lumborum nomine intelliguntur vertebræ ipsæ, rhachitis, muscoli *ψαλ*, arteria & vena lumbaris, renes quoque & mesocolum. Celsus vocat *coxas*, *πυλὸσφυον*, vbi Latine exposuit hanc prognosin.

SI IIS RELICTIS AD DIAPHRAGMA TRANSIERINT] i. Si dolorifica in lumbis causa, ad diaphragma, i. metaphrenon & partes quæ illic continentur, migrauerit; per ascensum symptomaticum materiæ temperamento calidæ, substantia tenuis, & qualitate acris; propterea que efferæ & crebræ orgasmæ: quemadmodum in illo. *Ἐξ ὀσφύος ἀναδραμὺς, ὀφθαλμοὶ ἰσχυροὶ, καὶ ὄν, i. Ex ascensu à lumbis ducto, peruersio oculorum mala.* Vbi Galenus scripsit. Lumborum ascensum ad caput, symptomata excitare partibus obesse propria, & vicinarum atque communium consecranea: sicut est palpebrarum peruersio: non secus atque in pulmonibus, quando illuc translatio fit, symptomata eduntur quæ in hac prognosi continentur.

VALDE PESTIFERI] Quoniã translatio materiæ fit infernè sursum, à partibus ignobilioribus ad nobiliores: quæ quia corruptione in vitio est; nec facile vincitur; nec ea, partes labefactatæ facile expediuntur: quarum officio vita carere nequit.

IDQVE CVM ALIAS] Proprio scilicet translationis vitio in orgasmo siue impetu, & parte obfessa, causisque orgasmæ; vnde, quod, quæ, & quamobrem.

TVM SI QVOD ALIVD PRAVVM ACCESSERIT SIGNVM] Vt si dolor iuguli paulisper fixus, ad cerebrum transeat; si malum sit intolerabile; si magna & frequens admodum respiratio; nulla doloris remissio; nulla aut perexigua expectoratio; sitis inextinguibilis; inæqualitas febrilis ardoris; alui & costatum conflagratio; partium extimarum frigus: denique vrinarum, deiectionum, somni, sudorum mala conditio.

SIN AVTEM CÆTERA NON SINT PRAVA] Vt si cætera naturaliter sint constituta, aut proximè ab sint à naturali statu, quæ cernuntur in triplici corporis qualitate, actionibus, & excrementis.

SUPPURATVM EXPECTANDVM] i. Vomica pulmonis ab inflammatione, quæ nec expurgatione, nec aluo prorupta, nec sanguinis detractione, nec etiam diaza quieuit. Atque ea vomica spei adhuc reliquum quidpiam facit; si vel expurgatione, vel alui ductione, vel vrinis proruptis vacuetur: aut etiam secessum habeat vel ad aures, vel ad partes inferiores tumoribus illic obortis, qui suppurent & fistulentur. Hic enim, *ὅτι ἐμπύου* agnoscimus, qui puris à phlegmone mutationem acceperunt: non eos quibus ipsum pus in spatium thoracis erupit: quamuis *πὲρ ἐμπύου* in vtraque significatione legatur.

πῆς Παιδίοισιν ὅξιν πυρετὸς, καὶ κοιλίης ὑπόστασις μὲν ἀρτυρήνῃς, καὶ πὲρ ἐκλαλίξειν, καὶ τὸ χρώμα μεταβάλλειν, καὶ ἰσχυρὸν ἐρῶδες· ἀσπασμῶδες.

Puerulis acuta febris, alius nihil reddens, vnâque somni vacuitas; tum calcitrandi vis crebra, coloris item mutatio, & ruboris suffusio; conuulsifica hæc sunt.

PVERVLIS] Præferim lactentibus, crassiore lacte victitantibus, tum etiam dentientibus, natura ^{aph. 23. 21} crassius & succi plenius, ad septimum vsque annum ætatis.

ACUTA FEBRIS] Quæ superuacuum humorem ciendo, nec excludendo, oppressionem facit; nervorumque imbellium & musculorum collectionem iniussam. Est autem monstri simile, febrem acutam convulsificam esse, quæ ipsam convulsionem sanat à repletionem natam: cur idem non faciat in puerulis; nisi in promptu adferamus excusationem infirmitatis molliissimorum nervorum.

ET ALVVS NIHIL REDDENS] Vnde sunt repleti multum & excrementitij pueruli: ob eamque causam convulsionibus obnoxij. Notanda *ἡγάλητος* Ionica, quæ astrictionem alui designat, per ^{ibidem} *ὑπόστασιν τῆς κοιλίας*, quam alibi nominavit *σκληρότητα*, *σπασμὸν*: sed ramen constat *ὑπόστασιν τῆς κοιλίας*, idem significare quod illud prognost. *ἢν γαστὴρ μὴ διαχωρεῖ*, i. nisi alvus secedat.

VNAQUE SOMNI VACUITAS] A tetralactis, & febris, & alui suppressæ anathymias quæ facit etiam ut pueruli expauescant & eiulent; quod est infirmi cerebri argumentum, & imbecillæ adeo effingendi virtutis.

CALCITRANDI VIS CREBRA] Ob doloris acerbiteriam, & membranarum stimulos & impotentiam.

COLORIS ITEM MUTATIO] Si color pallidus, lividus, aut ruber euadit: unde significatio fit prauorum qualitate humorum; sicut ex rubore, sanguinis abundantis.

CONVULSIFICA SVNT HÆC] Convulsionem denunciant atque faciunt vniuersi corporis; sed eam fugacem: proptereaque minus terrificam.

116. Τα βιὸν ταραχώδεια, ἀρεπνυμένα, μύχια δὲ οὐώδετα, αἱμορροεῖ ἐνια.

Qui febrium initijs perturbantur in turbulenta somni vacuitate, unaque nigra & figurata excernunt; ex ijs nonnulli sanguinem reddunt è naribus.

30 **IAM NOS** ad Momi lucernam examinavimus, & ad medendi vsum accommodavimus diuinam illam prognosin quæ sic habet. *Qui febrium initijs perturbantur somni expertes, siquidem stillat sanguis, indeque sextum morbi diem agentes sint alacriores, sed noctem exigant molestiorem; postridie autem cum sudasiuncula soporati, nec suæ mentis, sanguinem liberaliter fundant; malis omnibus liberantur.* Ac talia denunciat aquosa vrina. ^{91. Coac.}

At verò quæ nobis explicanda proponitur, tamen si in limine formam & speciem illius commemoratæ spectandam exhibeat; longissimè tamen abest à sensu & scopo. Illic enim diorismi sunt eorū quæ contra legem criticam, febrium initijs apparent & sunt: cuiusmodi sunt perturbatio mentis & stillicidium sanguinis: quæ tamen beneficio pepalsmi ad ægri salutem conuertuntur; & criticā legem ægroti seruant in signis & causis, à quarto ad septimum diem, quo per liberalem hæmorrhagiam mala omnia recedunt. Hic autem quæ febrium initijs verenda est perturbatio; ut neque tum sperabilem crisin facit: ita prauorum signorum copula, spem adimit conualescendi: sunt autem praua signa, deiectiones nigri stercoreis & figurati, vel potius in globulos tanquam in *σπυράθος* caprarum coacti, quod Græci vocant *ἀγχοίρμα* *σπυρῶδες*: quod est eiusmodi; *σπυράθος* quidem, propter longam in intestinis moram, ubi à febrili calore exaruit; nigrum verò, propter incendium quo interiora ægroti conflagent. Galenus

vocat *ἡγαστὴν καυστὴν*, i. dispositionem inflammatoriam: Hippocrates *τα καυστὰ*, quorum, ut ait Galenus, vis est, morbum indicare acutum & celeriter indicandum, *ταχέως*; ac periculosum profectò, si valde aduruntur. Atque in illo incendio & siccitate interiorum, unde *καυστὰ* sunt etiam excrementa; non potis est salutariter quicquam excerni, ubi vires defunt. Et qui ab exhausto laborant nimium resiccati, neque aluinam excretionem, neque rigorem, neque sudores, neque parotidas, nec alium quemvis abscissum, naturæ commodo, perficere possunt. Itaque præclare illud, ut cætera omnia, summus præceptor. *Κοιλίαι ἀπολεαμμέναι, σπικρεῖ δὲ μύχια, σπυρῶδες παρὸς ἀνάγκην χαλαροῖ· μικτὴν δὲ τυπτοῖσι ριγνύμενος, κακόν*, i. Alui interceptæ, quæ pauca nigra in globulos coacta, non nisi necessitate adacta laxant; his reserata nares, malum. ^{proth. 6. 2. proth. 60. 1. 2. 1. proth. 6. 2.}

117. Τα ἀρεπνύσασθαι ἑξάφνης ἀλυσμῶ, αἱμορροεῖ· ἄλλως τὴν βιὸν περὶ ἑρρήκη· ἢ ἢ καὶ μέλα φεῖξαι οἱ ἐπὶ ὀλίγον περὶ ψυχοντες;

Si quis repente fuerit somni expertis, idemque iactatus; sanguinem profundit è naribus: idque cum aliis; tum si quid antè reddiderit. An verò perhorrescat, qui antè paulisper refrixerit?

ENIMVERO symptomata perturbationis criticæ quæ ad speciem aliquam crisis apparent, ex incertis certa redduntur, quando natura & humor eò sponte cursum inflectunt, quod ipsius crisis incli-

nationem fieri *ἀμφιδόξα* symptomata non planè testantur. Sunt enim, fateor, obscura & varia hæmorrhagiæ signa; repentina somni vacuitas, & crebra loci atque figuræ mutatio in perturbatione critica: sed ea tamen ex obscuris clara; ex incertis certa efficiet naturæ ad hæmorrhagiam propensio, quæ cernitur in sanguinis iam inchoata exclusione. Atque huius theorematismis fundamentum præclare in illo iactum est. *Talia denunciat aquosa urina*, quæ ex incerto hæmorrhagiæ signo fit certum: quando à sanguinis stillicidio quarti diei cum urinæ pepasmo, cæteri dies morbi ad septimum usque, legem criticam seruauerunt, in signis & causis; tum in perturbatione critica; vel sola urina colore & consistentia prorsus aquosa, hæmorrhagiæ iamiam futuræ certissimum est argumentum: ad quam stillicidium quarti diei, tanquam ad fontes digitorum intendit. Huiusmodi illud est. *Quibus ineunte febre sternutamento excasso, è naribus it sanguis stillatim, siquidem quarto die urina hypostasim albam exhibeat; febrem per hæmorrhagiam septimo die sanatum iri ostendit.*

Ergo. SI QVIS REPENTE FVERIT SOMNI EXPERS] Quem antè iniuit ex facili: ut ea somni vacuitas tantum symptoma sit perturbationis criticæ, à naturæ contentione: non autem coacti morbi.

IDEMQVE IACTATVS] Alysmo fugaci.

SANGVINEM PROFVNDIT E NARIBVS] Per excursum criticum, qui citam eductionem habet.

IDOVE CVM ALIAS, TVM SI QVID SANGVINIS ANTE REDDIDERIT] Quia stillicidium illud denunciat naturæ & humoris propensionem; facitque ut illa duo signa *ἀμφιδόξα* efficiantur *πικνίεια*, i. syllogistica.

AN VERO PERHORRESCAT, QVI ANTE PAVLISPER PERFRIXERIT] Sanè quidem à frigore prodest horror: cuius concussione fit excussio rei molestæ, per aphor. 59.4.

118 Περὶ δὲ τοῦ ὀξυσμοῦ βήσαντες, καὶ ἐφιδρουῶντες μικρὸν κακὴνδεες.

Qui circa paroxysmos tussunt, ac leni sudore subroscidi sunt; gravissimum habent malum.

QVICQVID eiusmodi est, ut inde naturæ infirmitas, causæ morbificæ feritas, partiumque nobilium offensio denunciatur; ægroto pessimè esse idem quoque significat. Regnabant in Thasiis tuses, cum rauca voce coniunctæ & siccæ, quæ tandem miseros iacere *φθινώδεις* coegerunt. Ac tum horriduli, continenter & vehemèter hemitritæo laborarunt. Sudabāt illi assidue: sed non vniuersè, nec liberaliter. E quibus qui dominatu morbi omnino tenebantur; neque tantisper quidem pepasum in sputo ediderunt: sed in cruditate expectorabilis materiæ morbum exegerunt. Atque fauces eorum dolorificam vim catarrhi expertæ sunt, cum rubore & inflammatione exactum ad morbum. Erant autem tenues, effera, acres fluxiones, quæ citò miseros labefactabant.

Ergo. QVI CIRCA PAROXYSMOS TVSSIVNT] Catarrhi citatim in pulmones procumbentis feritate; nec tussiendo quicquam extussivnt in paroxysmi horrore: qualis esse solet hemitritæi & phthisis: ex quo duplicem concussionem experiuntur, quæ mutuò se fouet in perniciem ægri.

AC SVDATIVNCVLA] Capitis, cervicis, atque thoracis; primum quidem ab oppressione; deinde ab exolutione partium solidarum, & succi alibilis exudantis perenni delapsu.

GRAVISSIMUM HABENT MALVM] Duplici concussione: febris & catarrhi ferini conspiratione, causæ morbificæ vi effera, naturæ infirmitate, & partium nobilium offensione, faucium, laryngis, atque pulmonum. Consensus febris & catarrhi cernitur in eadem utriusque periodo, ab exolutione facultatis retentricis, repletionem cerebri, & commotionem catarrhi à febrilis ardoris intrò recurrentis anathymiasis terra & praua.

119 Ες πλευρὸν ὀδυῶνς καὶ πνιγμὸς πνευμονιδύς, ἔτοι ἐμπυουῶται.

Si cui ad lateris dolorem accesserit suffocatio, purulentus efficitur.

OFFICIVM est medici, tanquam è specula, prævidere futuras morborum successiones & transitus, quando eorum notitiam animo & mente complexus est, per actionum vitia, & vitiorum species aut differentias. Ut enim actio læsa partis affectæ certissimum est argumentum: sic læsionis species, affectionem ipsam cuiusmodi sit, apertissimè planissimèque ostendit. Prævidendi autem ratio continetur, proposito pleuritidis exemplo; quod perspicuitate & excellentia vincit res cæteras quæ sunt eiusdem generis.

SI CVI] Omnis ætatis, tēperamenti, cōplexionis, & sexus: maximè verò homini naturā, vitæ instituto, & victus ratione bilioso: vnde plures opportunitates & causæ *ὀρεταῖα*, i. humorū impetus, sæuq; doloris.

AD LATERIS DOLOREM] Acerbissimum, sanguinis biliosi affluxu, per inflammationem membranæ.

branz sensus acerrimi excitarum; continenter stimulis lacescentem: à quo symptomate omnium molestissimo, pleuritides nominantur, *ἐκ δὲ αὐτῆς τῆς πνεύματος*.

ACCESSERIT SVFFOCATIO] i. Difficilis respiratio, cita in expirando, perquam molesta in inspirando; & quæ paulò antè fuerat parua & frequens, nunc cernitur asthmaticorum similis, i. suspensiva quæ difficillimam habet inspirationem & citam necessario expirationem, suffocationis metu, à nimia fuliginis abundantia.

EFFICITVR PVRVLENTVS] i. Mutatio fit inflammationis in vomicam: quia dolor inflammatorius remedio nullo conuenienter adhibito concessit. Ac suppuratum illud, cum ex aliis signis perspicitur; tum verò maximè si eius initio difficilius spirabat æger cum rigore, cuius antea fuit expers; & cum dolore graui, qui antè fuit acutus. Funestum est autem suppuratū: si quidem sputum est biliosum & purulentum; maximèque si die septimo, critico potentissimo, vnde opinio fit futuri interitus decimoquarto: nisi affulgeat spes bona salutis ex optima conspiratione bonorum signorum quæ in ægrotò luceant splendèantque ab Hippocrate explicata. 2. prognos.

120 Οἷσιν ἐν σῶματι φλυζάνια καὶ πᾶν τὸ σῶμα ἐκφύει· θανάσιμον, μὴ γινώσκουσιν πῶς οὖν ἀποστήματιος· μάλιστα δὲ τούτοις ἐν εἰσόδῳ γινώσκουσιν οὖν.

Quibus in febris assiduitate pustula toto corpore suboriuntur; mortiferum illud est: nisi purulento abscessu, qui hic potissimum ad aures erumpit, periculo defungantur.

ILLÆ DEMVM pustulæ sunt pestiferæ quæ nutu morbi, non autem naturæ dominatu erumpunt: quamuis toto corpore efflorescant, nec ullam partem expertem sui relinquant: vt ea ratione spem faciant bonæ valetudinis: quod talis abscessus inferior non sit morbo: sed pro materiæ morbificæ abundantia dignè oriatur atque appareat. Sed longè aliter atque secus res habet, quando à gargalisimo hæc fiunt, nec febris finem adferunt, quin faciunt potius vt ea vires acquirat eundo; ipsa verò *φλυζάνια* non iudicare debent, propterea quæ sunt lethalia.

QVIBVS IN FEBRIS ASSIDVITATE PVSTVLÆ] In morem bullarum exurgentes. Id enim significant *τὰ φλυζάνια*. Galenus *φλυκταῖνας* interpretatur, earumque *φλυκταῖνων* hanc esse causam docet; collectionem ichorum corporis superficiem erodentium. Quarum generationem ex ichoribus venenatis diuinè Hippocrates explicauit. *Ἄστινι cranone carbunculi: densis pluebat nimbis, idque tempestate austrina. Ichores subnascebantur in cute, qui pruritus excitabant, inde pustulas ambrustus similes, φλυκταῖνας ὡς τὸν πυρεμῶντι.* Scrire autem licet nomen ichoris vsurpari pro virulento sero atque maligno. 4. acut. 2. prognos. 2. Epid.

TOTO CORPORE SVBORIVNTVR] Sic Hippocrates; Cum intumescerent vlcera omnia, tum in pudendus frequentissimè. Et paulò post, *ἐκ δὲ αὐτῶν τὰ μεγάλα*: vbi Galenus, Perspicuum est, inquit, *τὰ ἐκ δὲ αὐτῶν* nomen habere *ἐκ δὲ αὐτῶν*, quod est, *ἐξορμαῖ*, quando humores sponte sua in cutim prorumpunt & efflorescunt: vt *ἐκ δὲ αὐτῶν* 3. Epid. nihil aliud sint quàm *ἐξορμήματα* 1. Epid. sed illa à motu & incitatione; hæc verò à forma & impressione. Commemorabile est quod toto sparsa corpore nihil opis adferant: sed contrà magis ægros affligant: qua de re illud extat. Si cui *salisuginosi sputa vnâque tussis quiescunt; ijs totum corpus, velut exanthematis oblitum, rubet: ac tandem asperitate fit rigidum, iamiam futura morte.* Vt non ineptè hæc prognos ad proposita explanationem pertinere videatur.

MORTIFERVM ILLVD EST] Propter humoris efferi symptomaticum motum atque refluxum; aut propter sputi salisuginosi & tussis expectorantis suppressionem: vnde suppuratum, cuius argumenta sunt pustulæ.

NISI PVRVLENTO ABSCESSV, QVI POTISSIMVM AD AVRES ERVMPIT, PERICVLO DEFVNGANTVR] Vel abscessu crurali, qui, vt parotides, suppuratum habeat & fistuletur. Atque id locum habet in suppurato, non autem in febre acuta, nisi cum urinæ pepsismo: vt iam demonstrauimus. 112. & 113. Coac. 110. Coac.

121 Ἐν ὁξείᾳ τὰ μὲν ἔξωθεν ψύχεται, τὰ δὲ εἰσὼθεν καίεται, καὶ σφύζονται κακόν.

In acuta febre, exteriora perfrigerari, interiora verò sic vri, vt etiam sitim faciant; exitium portendit.

QVANDO febrilis calor molliter & æquabiliter, intus foras perpetuat suum cursum, & cum illius appulsu percipitur partium extimarum totiusque corporis mollitudo; ægro bene est: ac talis constitutio censenda est omnium optima; quæ in qualitate habitus considerari solent. Ar vero si ut excrementa, cuiusmodi sunt vrinae albæ, sic ea qualitas vniuersi tractabilis, sit contra naturam morbi, periodj, ægri, temporis, & tempestatis; opinionem facit res ægri pessum abire. Quod quomodo & cur fiat, sic explicandum.

comment. ad
43 aph. 4

IN ACUTA FEBRE] Quæ celeriter, vehementer, & continenter mouetur; estque natura omnis intermissionis expertis, nec ullam quietem promittit: proptereaque sola hæc frigoris symptomati conficia est.

proth. 34. 2.

EXTERIORA] Extimæ partes corporis; quæ sunt, frons, nares, auriculæ, manus, & pedes: vel etiam vniuersitatis superficies, excepto ventre & costis. Nam τὸ περιφύχου καὶ τὸ περιφύχου pariter simili- 10 tæque de vtroque dicuntur.

33. Coac.

PERFRIGERARI] Non quidem modicè, ut Pythion & Parius; qui modicè facti sunt alsioli, ut febris expertes viderentur, cum paulò antè febris ardore conflagrassent: sed paulò post rursus incanderunt. At quorum exteriora velut gelu obriguerunt: siue ea perfrigeratio sit firmiter fixa & stabilis; siue citam habeat caloris fugacis mutationem, de qua iam diximus. Ac citæ illius mutationis in alterutram qualitatem eximiam caloris & frigoris, causas propalam explicauimus.

INTERIORA VERO SIC VRI] Quorum tantum inflammatio est; ut faciat ἐπιπύκνωσιν καὶ ἀπο- 15 ληψιν, i. reuocationem & interceptionem ipsius sanguinis atque nectaris viuifici, ad reficiendam partium viuacitatem confluentis.

UT ETIAM SITIM FACIANT] Inde ducto humiditatis in partibus illis exhausto, in quibus visciditatis sensio, est ipsa sitis: linguam dico, palatum, stomachum: quo sese intemperies cordis, pulmonum, iecoris, æstu conflagrantium, extendit. Galenus in arte.

EXITIVM PORTENDIT] A consumptione viuifici nectaris in corde atque visceribus; quam faciet (nisi quàm citissimè extinguitur, sed vix, ac sæpe, ne vix quidem extinguitur) amplificatio febrilis caloris cum nativo retracti, quem ipse pariter accendit: ut sua sibi sint naturæ præsidia iam aduersa.

122 123 Οἱ σίωχεές διὰ τείτης Ἰππείνοντες· Ἰππίνδωοι. Οἱσι 20 δὲ δὴ πυρετὸς διαλύπη· ἀκίνδωον.

Febres continuæ tertio quoque die ingrauescentes; supra modum periculosa. Quod si quando febris discesserit; periculi vacatio est.

84. Coac.

39. Coac.

VERSATUR illud in hominum peruagato sermone, febrem intermissionis expertem omnino mortiferam esse: participem verò, spei plenam; atque iccirco in paroxysmis ipsis medicum consolari & ægrum, expectatione releuandi. Etenim febres continuæ sunt eiusmodi, quales descripsit Hippocrates. 40 Est autem acutissimus, maximus, difficillimus, ac denique lethalis, febris continua, morbus. At quæ intermissionis participes sunt; quartana quidem securissima est, atque libertatis vindex in epilepsia: tertiana verò exacta, citæ est crisis, nulliusque periculi. Sed continuarum febrium ut sunt periodicæ differentia: ita grauiorum aut leuiorum malorum signa & causæ existunt. Enimvero, quibus postmodum inuasit, exacerbatio febris est, malè res eunt. Et, τριζοφύα febres, erraticæ, in pares mutata; sunt contumaces. Etenim quæcunque apparent & fiunt contra naturam morbi, pro pessimis haberi debent: quoniam febris acutæ materia bilis est, quæ naturaliter imparibus diebus cumulata mouetur. Quid igitur facit continuas tertio quoque die ingrauescentes, videri periculosas; cum illæ naturaliter, proprio scilicet bilis motu, exacerbentur? In promptu causa est, quam sic ordine explicabo.

FEBRES CONTINUÆ] Omnis intermissionis expertes, proptereaque omnium acutissimorum, grauissimorum, & mortiferorum malorum capaces: ob eam sanè causam, quod vel in visceribus, vel in maioribus venis atque arteriis, tanquam in ergastulo, maligna caco-chymia prædita stabulentur.

comment. 2.
1. Epid.

TERTIO QVOQUE DIE INGRAUESCENTES] Non quidem simplici & periodico motu, qui sit secundum naturam acutæ & tertianæ: sed grauiorum malorum incremento, quæ cernuntur in febris ardore, doloris acerbitate; iactatione, cardiogmo, delirio, vigiliis, inexplibili siti. Denique in omnibus symptomatis translationis malignæ qualitatis, & inflammationis; cuiusmodi sunt τριζοφύα. Toto tempore reliquo remittentes, criticis diebus exacerbata trahentesque in peius. Parum cerè, inquam, remittentes: sed paulò post rursus vehementius exacerbata, criticisque versæ in deterius. Cuiusmodi sunt etiam hemitritæ, continenter in acutius ductæ. Nam febres omnes continuæ, quæ 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595 600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 975 980 985 990 995 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1060 1065 1070 1075 1080 1085 1090 1095 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1160 1165 1170 1175 1180 1185 1190 1195 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1260 1265 1270 1275 1280 1285 1290 1295 1300 1305 1310 1315 1320 1325 1330 1335 1340 1345 1350 1355 1360 1365 1370 1375 1380 1385 1390 1395 1400 1405 1410 1415 1420 1425 1430 1435 1440 1445 1450 1455 1460 1465 1470 1475 1480 1485 1490 1495 1500 1505 1510 1515 1520 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1560 1565 1570 1575 1580 1585 1590 1595 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1660 1665 1670 1675 1680 1685 1690 1695 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1760 1765 1770 1775 1780 1785 1790 1795 1800 1805 1810 1815 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 2105 2110 2115 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2160 2165 2170 2175 2180 2185 2190 2195 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2230 2235 2240 2245 2250 2255 2260 2265 2270 2275 2280 2285 2290 2295 2300 2305 2310 2315 2320 2325 2330 2335 2340 2345 2350 2355 2360 2365 2370 2375 2380 2385 2390 2395 2400 2405 2410 2415 2420 2425 2430 2435 2440 2445 2450 2455 2460 2465 2470 2475 2480 2485 2490 2495 2500 2505 2510 2515 2520 2525 2530 2535 2540 2545 2550 2555 2560 2565 2570 2575 2580 2585 2590 2595 2600 2605 2610 2615 2620 2625 2630 2635 2640 2645 2650 2655 2660 2665 2670 2675 2680 2685 2690 2695 2700 2705 2710 2715 2720 2725 2730 2735 2740 2745 2750 2755 2760 2765 2770 2775 2780 2785 2790 2795 2800 2805 2810 2815 2820 2825 2830 2835 2840 2845 2850 2855 2860 2865 2870 2875 2880 2885 2890 2895 2900 2905 2910 2915 2920 2925 2930 2935 2940 2945 2950 2955 2960 2965 2970 2975 2980 2985 2990 2995 3000 3005 3010 3015 3020 3025 3030 3035 3040 3045 3050 3055 3060 3065 3070 3075 3080 3085 3090 3095 3100 3105 3110 3115 3120 3125 3130 3135 3140 3145 3150 3155 3160 3165 3170 3175 3180 3185 3190 3195 3200 3205 3210 3215 3220 3225 3230 3235 3240 3245 3250 3255 3260 3265 3270 3275 3280 3285 3290 3295 3300 3305 3310 3315 3320 3325 3330 3335 3340 3345 3350 3355 3360 3365 3370 3375 3380 3385 3390 3395 3400 3405 3410 3415 3420 3425 3430 3435 3440 3445 3450 3455 3460 3465 3470 3475 3480 3485 3490 3495 3500 3505 3510 3515 3520 3525 3530 3535 3540 3545 3550 3555 3560 3565 3570 3575 3580 3585 3590 3595 3600 3605 3610 3615 3620 3625 3630 3635 3640 3645 3650 3655 3660 3665 3670 3675 3680 3685 3690 3695 3700 3705 3710 3715 3720 3725 3730 3735 3740 3745 3750 3755 3760 3765 3770 3775 3780 3785 3790 3795 3800 3805 3810 3815 3820 3825 3830 3835 3840 3845 3850 3855 3860 3865 3870 3875 3880 3885 3890 3895 3900 3905 3910 3915 3920 3925 3930 3935 3940 3945 3950 3955 3960 3965 3970 3975 3980 3985 3990 3995 4000 4005 4010 4015 4020 4025 4030 4035 4040 4045 4050 4055 4060 4065 4070 4075 4080 4085 4090 4095 4100 4105 4110 4115 4120 4125 4130 4135 4140 4145 4150 4155 4160 4165 4170 4175 4180 4185 4190 4195 4200 4205 4210 4215 4220 4225 4230 4235 4240 4245 4250 4255 4260 4265 4270 4275 4280 4285 4290 4295 4300 4305 4310 4315 4320 4325 4330 4335 4340 4345 4350 4355 4360 4365 4370 4375 4380 4385 4390 4395 4400 4405 4410 4415 4420 4425 4430 4435 4440 4445 4450 4455 4460 4465 4470 4475 4480 4485 4490 4495 4500 4505 4510 4515 4520 4525 4530 4535 4540 4545 4550 4555 4560 4565 4570 4575 4580 4585 4590 4595 4600 4605 4610 4615 4620 4625 4630 4635 4640 4645 4650 4655 4660 4665 4670 4675 4680 4685 4690 4695 4700 4705 4710 4715 4720 4725 4730 4735 4740 4745 4750 4755 4760 4765 4770 4775 4780 4785 4790 4795 4800 4805 4810 4815 4820 4825 4830 4835 4840 4845 4850 4855 4860 4865 4870 4875 4880 4885 4890 4895 4900 4905 4910 4915 4920 4925 4930 4935 4940 4945 4950 4955 4960 4965 4970 4975 4980 4985 4990 4995 5000 5005 5010 5015 5020 5025 5030 5035 5040 5045 5050 5055 5060 5065 5070 5075 5080 5085 5090 5095 5100 5105 5110 5115 5120 5125 5130 5135 5140 5145 5150 5155 5160 5165 5170 5175 5180 5185 5190 5195 5200 5205 5210 5215 5220 5225 5230 5235 5240 5245 5250 5255 5260 5265 5270 5275 5280 5285 5290 5295 5300 5305 5310 5315 5320 5325 5330 5335 5340 5345 5350 5355 5360 5365 5370 5375 5380 5385 5390 5395 5400 5405 5410 5415 5420 5425 5430 5435 5440 5445 5450 5455 5460 5465 5470 5475 5480 5485 5490 5495 5500 5505 5510 5515 5520 5525 5530 5535 5540 5545 5550 5555 5560 5565 5570 5575 5580 5585 5590 5595 5600 5605 5610 5615 5620 5625 5630 5635 5640 5645 5650 5655 5660 5665 5670 5675 5680 5685 5690 5695 5700 5705 5710 5715 5720 5725 5730 5735 5740 5745 5750 5755 5760 5765 5770 5775 5780 5785 5790 5795 5800 5805 5810 5815 5820 5825 5830 5835 5840 5845 5850 5855 5860 5865 5870 5875 5880 5885 5890 5895 5900 5905 5910 5915 5920 5925 5930 5935 5940 5945 5950 5955 5960 5965 5970 5975 5980 5985 5990 5995 6000 6005 6010 6015 6020 6025 6030 6035 6040 6045 6050 6055 6060 6065 6070 6075 6080 6085 6090 6095 6100 6105 6110 6115 6120 6125 6130 6135 6140 6145 6150 6155 6160 6165 6170 6175 6180 6185 6190 6195 6200 6205 6210 6215 6220 6225 6230 6235 6240 6245 6250 6255 6260 6265 6270 6275 6280 6285 6290 6295 6300 6305 6310 6315 6320 6325 6330 6335 6340 6345 6350 6355 6360 6365 6370 6375 6380 6385 6390 6395 6400 6405 6410 6415 6420 6425 6430 6435 6440 6445 6450 6455 6460 6465 6470 6475 6480 6485 6490 6495 6500 6505 6510 6515 6520 6525 6530 6535 6540 6545 6550 6555 6560 6565 6570 6575 6580 6585 6590 6595 6600 6605 6610 6615 6620 6625 6630 6635 6640 6645 6650 6655 6660 6665 6670 6675 6680 6685 6690 6695 6700 6705 6710 6715 6720 6725 6730 6735 6740 6745 6750 6755 6760 6765 6770 6775 6780 6785 6790 6795 6800 6805 6810 6815 6820 6825 6830 6835 6840 6845 6850 6855 6860 6865 6870 6875 6880 6885 6890 6895 6900 6905 6910 6915 6920 6925 6930 6935 6940 6945 6950 6955 6960 6965 6970 6975 6980 6985 6990 6995 7000 7005 7010 7015 7020 7025 7030 7035 7040 7045 7050 7055 7060 7065 7070 7075 7080 7085 7090 7095 7100 7105 7110 7115 7120 7125 7130 7135 7140 7145 7150 7155 7160 7165 7170 7175 7180 7185 7190 7195 7200 7205 7210 7215 7220 7225 7230 7235 7240 7245 7250 7255 7260 7265 7270 7275 7280 7285 7290 7295 7300 7305 7310 7315 7320 7325 7330 7335 7340 7345 7350 7355 7360 7365 7370 7375 7380 7385 7390 7395 7400 7405 7410 7415 7420 7425 7430 7435 7440 7445 7450 7455 7460 7465 7470 7475 7480 7485 7490 7495 7500 7505 7510 7515 7520 7525 7530 7535 7540 7545 7550 7555 7560 7565 7570 7575 7580 7585 7590 7595 7600 7605 7610 7615 7620 7625 7630 7635 7640 7645 7650 7655 7660 7665 7670 7675 7680 7685 7690 7695 7700 7705 7710 7715 7720 7725 7730 7735 7740 7745 7750 7755 7760 7765 7770 7775 7780 7785 7790 7795 7800 7805 7810 7815 7820 7825 7830 7835 7840 7845 7850 7855 7860 7865 7870 7875 7880 7885 7890 7895 7900 7905 7910 7915 7920 7925 7930 7935 7940 7945 7950 7955 7960 7965 7970 7975 7980 7985 7990 7995 8000 8005 8010 8015 8020 8025 8030 8035 8040 8045 8050 8055 8060 8065 8070 8075 8080 8085 8090 8095 8100 8105 8110 8115 8120 8125 8130 8135 8140 8145 8150 8155 8160 8165 8170 8175 8180 8185 8190 8195 8200 8205 8210 8215 8220 8225 8230 8235 8240 8245 8250 8255 8260 8265 8270 8275 8280 8285 8290 8295 8300 8305 8310 8315 8320 8325 8330 8335 8340 8345 8350 8355 8360 8365 8370 8375 8380 8385 8390 8395 8400 8405 8410 8415 8420 8425 8430 8435 8440 8445 8450 8455 8460 8465 8470 8475 8480 8485 8490 8495 8500 8505 8510 8515 8520 8525 8530 8535 8540 8545 8550 8555 8560 8565 8570 8575 8580 8585 8590 8595 8600 8605 8610 8615 8620 8625 8630 8635 8640 8645 8650 8655 8660 8665 8670 8675 8680 8685 8690 8695 8700 8705 8710 8715 8720 8725 8730 8735 8740 8745 8750 8755 8760 8765 8770 8775 8780 8785 8790 8795 8800 8805 8810 8815 8820 8825 8830 8835 8840 8845 8850 8855 8860 8865 8870 8875 8880 8885 8890 8895 8900 8905 8910 8915 8920 8925 8930 8935 8940 8945 8950 8955 8960 8965 8970 8975 8980 8985 8990 8995 9000 9005 9010 9015 9020 9025 9030 9035 9040 9045 9050 9055 9060 9065 9070 9075 9080 9085 9090 9095 9100 9105 9110 9115 9120 9125 9130 9135 9140 9145 9150 9155 9160 9165 9170 9175 9180 9185 9190 9195 9200 9205 9210 9215 9220 9225 9230 9235 9240 9245 9250 9255 9260 9265 9270 9275 9280 9285 9290 9295 9300 9305 9310 9315 9320 9325 9330 9335 9340 9345 9350 9355 9360 9365 9370 9375 9380 9385 9390 9395 9400 9405 9410 9415 9420 9425 9430 9435 9440 9445 9450 9455 9460 9465 9470 9475 9480 9485 9490 9495 9500 9505 9510 9515 9520 9525 9530 9535 9540 9545 9550 9555 9560 9565 9570 9575 9580 9585 9590 9595 9600 9605 9610 9615 9620 9625 9630 9635 9640 9645 9650 9655 9660 9665 9670 9675 9680 9685 9690 9695 9700 9705 9710 9715 9720 9725 9730 9735 9740 9745 9750 9755 9760 9765 9770 9775 9780 9785 9790 9795 9800 9805 9810 9815 9820 9825 9830 9835 9840 9845 9850 9855 9860 9865 9870 9875 9880 9885 9890 9895 9900 9905 9910 9915 9920 9925 9930 9935 9940 9945 9950 9955 9960 9965 9970 9975 9980 9985 9990 9995 10000 10005 10010 10015 10020 10025 10030 10035 10040 10045 10050 10055 10060 10065 10070 10075 10080 10085 10090 10095 10100 10105 10110 10115 10120 10125 10130 10135 10140 10145 10150 10155 10160 10165 10170 10175 10180 10185 10190 10195 10200 10205 10210 10215 10220 10225 10230 10235 10240 10245 10250 10255 10260 10265 10270 10275 10280 10285 10290 10295 10300

lorum accessionem habeant, & grauiorum propagationem faciant; vt lethargi: quia sunt *φειδότες*, i. horridi; propterea; ipsas dixit esse *ἡσυχίας φαντασιώδους*, i. inter omnes maxime mortiferas.

1. Epid. cōm. 3.

QVOD SI QVANDO] i. Quoniam modo; siue sit longa accessio, breuis intermissio; aut contrā.

FEBRIS DISCESSERIT] Videlicet tertiana quæ *ἀπὸ πάλιν* mouetur, sed intermissionem habet, quia. *Quibus in febribus rigor cietur, eodem ipso die febres exoluntur.* Cuius intermissionis causam Galenus comment. in illum aphorismum doctissime explicauit.

aph. 43. 4.

aph. 63. 4.

PERICVLI VACATIO EST] Quoniam febres intermissionis participes, malignæ & venenatæ qualitatibus, & inflammationis sunt expertes: quæ duæ sunt causæ funestæ in febribus, quas putris humor accendit.

10

124 *Εν μακροῖς πυρελοῖσιν, ἢ φύματα, ἢ ἐς δέθρα πόννοι ἐστίνονται καὶ ὡς ῥύωνται, καὶ ἀχρηστοί.*

In febribus diuturnis, aut phymata solent, aut in articulis dolores oriri: qui ita coorti, non sunt inutiles.

20

HIPPOCRATIS illud est. *Οἱ πάσαισι ἐξω, ἢ εἰσω πέποιον· ἢ δὲ ὅπῃ δύν, i. Omnino à pepasmo natura triplicem viam inuenit quæ deducitur ad conseruationem sui, morbumque depellit; aut enim foras excludit sudore laudabili, ictero critico, exanthematis quoque ipsis; aut introrsum excernit, deiectionibus, urinis, hæmorrhagia; postremo transitum facit materiæ morbificæ, per *ἀγδοχὴν*, i. traditionem supernè deorsum, è directo & procul, in partem capacem, vbi tumor nascitur, nec morbo impar, nec ipsius potens naturæ. Atque si in natura vegeta, validæ sint vires contra humorem biliosum & tenuem, cum libertate meatuum; sanè in eo meabili corpore, quod vocant *εὔρου*, sperabilis excretio est à pepasmo, introrsum, aut foras: quatenus natura & humor, huc, illucve cursum inflectunt. At verò si naturæ, humoris, meatuum quoque ipsorum sit impar conspiratio ad excretionem; vnus tantum, vitio, aut naturæ infirmioris, aut materiæ contumacioris, aut etiam quia meatuum libertas desideratur; morbi diuturnitas à pepasmo per abscessum excutitur: quem facit materiæ *ἀπόθεσις*, i. depositio intus foras, aut supernè deorsum; quò natura viam affectat, & vbi iam excipiendi præparatio est. Nam in affecta ætate, collapsis iam viribus, materiæ contumacia, meatuumque angustia; vt neque excretio, sic neque abscessus sit vllus, sed corruptionis successio est: vnde mira morborum subinde nascentium multitudo.*

30

Ergo. IN FEBRIBVS DIUTURNIS] Quæ ægri vtilitati productæ sunt à vigesimo ad quadragessimum diem, & vltra; neque doloris ab inflammatione nati; neque incidentis causæ extrinsecus, vel ab ægroti contumacia, vel à medici imperitia; diuturnitatis excusationem adferunt: sed vnus tantum pepasmi difficilis, cuius difficultas, vel in materiæ contumacia, vel in virium infirmitate consistit.

AVT PHYMATA] Ac si diceret. Si naturæ expellenti, morbifici humoris crassitudo, vel ipsa meatuum angustia morem non gerat; atque in excretionis ipsius conspiratione sit impar naturæ: phymata oriri solent, i. tubercula, furunculi, tophi, exanthemata, ecthymata, phlyctænæ, & quæ sunt eiusmodi. Nam phymata suo velut ambitu continent omnia mala cutis & carnis, quæ veniunt ab iis quæ sunt in habitu corporis inutilia: ne sim ambitiosus in diorismis *ἢ φύματων*, quæ *ἀπὸ τοῦ φύειν*, nomen habent, i. à fundendo; vnde dicitur fundus: *Fundit humo facilem victum iustissima tellus.*

2. Epid.

AVT IN ARTICVLIS DOLORES ORIRI] Quasi ita velit. Si non tam ipsius naturæ vitio, quam materiæ contumacia; excretionis ratio intus, aut introrsum foras, subsistit; dolores in articulis cooriuntur, prolapsu materiæ in eas partes infirmas, laxas, atque capaces. Atque ita comparata est febris continuarum historia, sicut intermittentium diuturnarum, vel erraticarum; vt febris quartanæ successionem habeant.

Hoc spectat igitur vt intelligamus; diuturnam febrem continuam secundi iudicij, siquidem ipsa diuturnitas in materiæ contumacia, nō in naturæ infirmitate consistit; abscessum habere intus foras ad cutim: si autem humoris dominatu tenetur naturæ imbecillior vis expultrix; abscessum fieri introrsum, supernè deorsum.

50

QVI ITA COORTI, NON SVNT INVILES] Vide 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3. prognost. Requenda etiam explicatio ex 44. aphor. 4.

60

125 *Κεφαλαλγίη ἐν ὀξεί, ὑποχόνδριον ἀνέσπασμα, μὴ πυνέλος αἱματός ἐκ πινέων· ἐς φρενιτικὸν περὶσταται.*

Cephalalgia in febre acuta, hypochondrium sursum intro reuulsus, sanguine non prorupto è naribus; phrenitidis habent euentum.

IN MORBIS acutis ad prædicendum *τέλμους* certa est, quæ ex hypochondriorum tractabili habitu & situ initur. Bona hypochondria vel potius optima, quæ vocat *εὐογκία καὶ λευκὸς* i. *solida, succi plena & mollis*; vel in distentionis, & contractionis mediocritate posita, opinionem faciunt bene constitutæ naturalis œconomix, ex bona complexione & temperamento viscerum quæ in hypochondriis continentur: propterea quæ bonæ valitudinis in morbis acutis futuræ, maximè verò in febribus. Contrà de hypochondriorum triplici inæqualitate, cuiusmodi ea fuerit, semper verendum: siue ea percipiatur in ardore; siue in contractione aut tumore, quem vel inflammatio dolorifica, vel inflatio, vel scirrhus expresserit; siue in duritate recens oborta, aut quæ iam in vetustatem inciderit. Sed inter ea genera inæqualitatis hypochondriacæ, contractio principatum obtinet, quæ fit intrò sursum diaphragmate inflammato: de qua hoc loco sermonem instituit.

CEPHALALGIA IN FEBRE ACUTA] Capitis dolor prægrandis & contumax, febris acuta consecutarius per propagationem causæ morbificæ, non autem per transitum, vnde expectetur hæmorrhagia critica: qualem cephalalgiam vtrinque superuenientem & utroque inclinam; scilicet ad scilicet exitum morbi, vel ad ægroti exitum; descriptam & expressam legimus in Epid. & in prognost.

HYPOCHONDRIUM SURSUM INTRO REVULSUM] i. Si ad cephalalgix acerbiteriam symptomaticam, prauum accesserit signum; quod cernere est in hypochondrii sursum intrò reuulsione, quæ nunquam accidit proprio hypochondriorum vitio, sed alieno; diaphragmate scilicet inflammatione obfesso, in cuius contagionem & sympathiam trahitur peritonæum, quod adiacet hypochondriis, ac veluti obliqui septi transuersi manibus, foris intrò & sursum versus, ipsum abripitur: ac tum hypochondria, suspensi tactus appulsus ferre vix possunt.

SANGVINE NON PRORVPTO E NARIBVS] Quia liberalis hæmorrhagia sæpenumero cephalalgix finem adfert, dolorésque sanat inflammatorios hypochondriorum; siue illa sint vacua, siue distenta. Ac sanè illa crisis hæmorrhagix, iuuenum propria est, intra septimum morbi diem: alioquin cità mors venit, nisi virtute naturæ, ad vigesimum producantur; ac tum suppurato sanescunt: perarò autem profluuium sanguinis.

PHRENITIDIS HABENT EVENTVM] i. Ad phrenitidem conuersio fit, denegata crisi propria cephalalgix febrilis, & hypochondriaci doloris inflammatorii. Phrenitis autem venit; tum à diaphragmate inflammato; tum à cephalalgia febris acutæ consecutaria. *ᾧ δὲ νέσται*, & i. Epid.

126. Τὰ λειπτεινὰ, μὴ χολέρας ὀπιθυμομένης, οὐ λύεται.

Lipyriz febres, non nisi superueniente cholera, exoluuntur.

QVEM AD MODVM cephalalgia, febris acutæ consecutaria; tum hypochondriacus dolor inflammatorius, vnde vtrinque de phrenitide vereri oportet, sanguinis liberali profluuiio exoluuntur: sic lipyriz febris, quæ malignâ cacochymiâ proximè ad pestilentem accedit, symptomatum est plena grauissimorum; propria humoris morbifici, & sola excretionem sanescit: neque aliter curationem recipit. Est enim consentaneum, ut quò natura & humor viâ affectant, eò conuenienter per loca lege naturæ còmoda, neq; ex euentu incòmoda moueantur. Estq; omnino triplex inclinatio vnde purgandi via tū iussa, tum iniussa initur; vna quidem naturæ; altera humoris morbifici; tertia partis obfessæ. Nam iuuenes per hæmorrhagiam, febribus ardentibus ut plurimum defunguntur; senes verò per dysenteriam. Sic æstate bilium gerimus, sursum mouendo: pituitæ verò hyeme, deorsum ducendo. Et quorum morborum curatione in sola purgatione consistit, si quidem illi diaphragmate superiorem locum teneant, vomitione: contrà si inferiorem, deiectione curandi sunt. Ac ne omnia consecuter quæ sunt innumerabilia, comprehendam breui. Sic enim statuo; purgationis modum, ut spòre sua ex impulsu naturæ, motu humoris, & meatuum conditione fuscipitur: ita ex tribus illis quæ modò recesui, à medico artificiosè captandū esse, artificium scilicet ad imitationem naturæ comparato.

Ergo. LIPYRIÆ FEBRES] Quæ sunt eiusmodi, vel à calore, quo extimas partes defraudat; vel à more & anxitudine inseparabili; qualis est *πύφος* primi generis; qualis etiam quarti. Ac sanè partiū extimarum frigus, lipyriz consecutarium esse solet; non quidem natiui caloris retractione, vel interceptione, ut ferè fit in ardentissimis febribus: sed facultatis vitalis exolutione, quam facit bilis morfu & stimulis fauissima stomacho qui sensus acerrimi est. Nā lipyriz materia biliosa focū habet in aluo, vnde prohibetur exitu à contumaci obstructione, partiūq; obfessarum lāguore, facitque homines *πικροὶ & πλεονεῖς*, i. *amarulentos & mæstos*, fastidio & contumacia insolentissimos, anxitudine miserabiles, omnis figuræ & loci impatiētissimos, somni expertes: cum spiratione in faucibus elisa; quam *πνέσμα πρὸς τὰς αἰσῆς* vocat *ἀπὸ τῆς αἰσῆς* *πνέον*, ἢ *μέγα λίτω*, i. *respirationem offensantē, ascensu crebram*, & valde magnam. Nonnunquam etiam labrum inferius cietur, vnaque manibus contremiscunt. Denique ita comparata est lipyriz febris ratio, ut eam iure optimo *κακοχολία* Galenus nominarit.

NON NISI CHOLERA SUPERVENIENTE] Prægrandi & cita perturbatione alui, sursum deorsumq; pariter æqualitèr; citatæ. Sic enim *χολέραν* Paulus descripsit, quantum fideliter conuertere potui. Pauli verba sunt. *Ἡ χολέρα, τῆς γαστρὸς ἐστὶν ἀμέλεις ἐκ τῆς αἰσῆς, κατὰ δὲ π & δὲ ἐμμένον γινόμενη*. Quā descriptionem ille Galeni sumia transtulit in suum librum, ex còment. ad 4. *ᾧ δὲ νέσται οὕτως*. Atq; talis cholera verè simpliciterq; dicitur, ut nihil necesse sit alteram ad huius loci explicationem adferre, quam vocat Hippocrates *χολέρην*.

procr. 10. c. 2. r.
55. Coac. hist.
2. r. Epid. & 5.
part. 2. 3. Epid.

3. prognost.

ᾧ δὲ νέσται & ὁ
τῆς πνέον.

2. de diarr.
acut.

comment. ad
48. aph. 4.

cap. 39. 3.

4. de acut.
diarr.

Ex quo ad cuius curationem vomitu interdiciendum; alius ducenda clystere pingui & calido; balneo dulcis aqua, & oleo corpus fouendum; somno indulgendum; vinoque tenui meraco & veteri; cibis abstinentendum; & lacte alimino utendum. Quæ omnia sicca cholera alexiteria, febris lipyria sunt deleteria. Est igitur hoc loco subaudienda cholera absolute dicta; quam paulò antè descripsimus; quæ quidem cum sicca communem habet excretionis modum; hoc vno excepto, quòd sicca cholera flatulenti spiritus acerrimi irritatio est; huius verò efferi indomique humoris sursum deorsumque excretio.

EXOLVUNTUR] Vacuatione propria humoris morbifici, i. bilis: & partium obsessarum neoterismo, i. temperamenti & complexionis inde comparata integritate.

Existit hoc loco difficilis quaestio, vtrum lipyria, quæ in erysipelate alui consistit, quæque maligna cacochoymia superat omnes febres, si pestilentem exceperis; vacuatione quiescat, cum illud sit in confesso omnibus; nullam eiusmodi febrem ita sanescere, quæ coniunctam habeat cum inflammatione cacochoymiam malignam. Sanè quidem si tantam naturam potentiam habeat, ut per se ipsa moliri possit exclusionem, unde nihil reliquiarum supersit. Atque id miraculo apponendum: quoniam difficillimus est morbus, quem effugiunt pauci: maximè verò quādo lipyria venit æstate, cum violento Sirius æstu, terras exurit: non autem autumno, à vini mustei bibacitate, & baccarum edacitate; quam diarrhoea funditus ex aluo tollit.

Sed illud maiorem iudicandi difficultatem parit, quod ait; lipyriam febrem non nisi superueniente cholera posse sanari; cum ipsa cholera sit peracuta, unde cita mors venit per σπασμὸν, i. contractionem maximè furarum. Eam difficultatem omnino tollit, quòd cholera hic superuenit; non exolutione virium, sed alui concussionem. Deinde quòd aluo molestiis omnibus lipyria febris defuncta, cessat ipsa cholera: ut verè illud videar esse dicturus; eam demum cholera in bonis ducendam, quæ contentione alui suscipitur contra vim febris lipyriae, in aluo stabulantis.

127 Ικτὺς, πρὸ μὲν τ' ἐβδόμης ἡμέρης Ἰππυρόμυθος, κακόν. ἐβδόμη δὲ, καὶ σινάτη, καὶ σινδεκάτη, καὶ τεσσαρεσκαδεκάτη· κρείσμον, μὴ σκληρῶν ὑποχόνδρια· λῶ δὲ μὴ, σινδιδιάσιν.

30 *Icterus ante septimum diem, insidiosus. At septimo, nono, undecimo, decimoquarto proruptus; salutaris, qui hypochondria non obdurat: sin autem, anceps.*

PERMAGNI naturæ interest quando quid fiat; quidve appareat in morbis acutis. Ut enim τὸ κρίσιμα non sunt eiusmodi, quæ apparent morborum initiis: ita nihil salutariter potest excerni, quando natura morbificis causis opprimitur, estque humoris cruditas & contumacia: idque cum aliàs, tum verò in phymate vniuersali, cōtinuo, quod in cutim effunditur intrus foras: cuiusmodi est morbus regius, quem 40 ἰκτὺς Græci vocant. Est enim phyma icterus: quemadmodum & phlyzacia, siue ecchymata, aut exanthemata: & funditur intus foras ad cutim loco sudoris in crisi acutorum morborum: quemadmodum icterus symptomaticus, introrsum per cutim, quando iecur in vitio est, oppilatione, inflammatione, aut scirrho: quæ triplex est omnis ἡ κρισιμαία, quam expressit Galenus. Sed icterus criticus acutorum morborum, eiusmodi esse nequit ante septimum diem: quoniam phyma est vniuersale atque continuum; quod, ut iam dixi, funditur intus foras ad cutim; non autem introrsum per cutim, quo multum scedati icterici esse solent. Atqui phymatum & abscessuum criticorum non tam facilis, nec tam cita explicatio est, quàm excretionis quæ intus & introrsum foras suscipitur liberali sudore & hæmorrhagia. Hic enim meabile corpus est, quod Græci vocant ὑγρὸν; naturæ virtute, meatuum libertate, & humoris morbifici 50 præparatione. At verò in phymate, aut vis expultrix imbecillior est; aut materia contumacior; aut ipsi denique meatus angustiores.

Quæ cum ita sint, planè efficitur quòd ICTERVS] i. Defœdatio cutis à bile flaua, intus foras ad cutim effusa.

ANTE SEPTIMUM DIEM] Quo alter quaternarius absolvitur, & cuius crisis à primo quaternario denunciari solet, prospicique tanquam è specula; & antè quem septenarium τὸ κρίσιμα non sunt verè κρίσιμα: propterea que funesta, aut certè sinistri iudicij.

INSIDIOSVS] Quoniam die quarto significatus non fuit, editis pepasmi signis, unde certamen naturæ & morbi septimo est in procinctu. At nihil optabilis iudicij esse potest, neque in perturbatione critica, neque in ipsa crisi, quod antè, sui certaminis significationem loco non habeat; non solum ad excretionem, sed etiam ad phymatum effusionem. Talem Hermocrates morbum regium expertus fuit, 60 qui tandem post crebros relapsus, 27. die interiit. Fuit item Phanagareoni, sexto die proruptus. Quod idem contigisset Heraclidæ ab ictero sexti diei, nisi triplicis vacuationis beneficio, hæmorrhagiæ, diarrhoeæ, & perirrheæ; calamitosam vim morbi depulisset.

AT SEPTIMO, NONO, VNDECIMO, DECIMOQUARTO PRORUPTVS] Diebus nempe criticis: ob eam sanè causam, quòd imperio & nutu naturæ res eant, & κατὰ λόγον suscipiantur,

in paroxysmis dierum imparium. Ex quo apparet, iſterum ſolius febris continuæ indicatum eſſe; quod hîc dierum meminerit, non periodorum; & inter cæteros, decimiquarti.

SALVTARIS] Id enim ſignificat τὸ κρίσιμον, abſolutè ſimpliciterque expreſſum: quemadmodum & ipſum nomen τῆς κρίσεως.

QVI HYPOCHONDRIA NON OBDVRAT] i. Modò hypochondria non ſint dura; ſive illa duritas primigenia fuerit; ſive ipſius febris conſectaria: vt ſæpe fit irritò naturæ motu. Quod acciſſe legimus ei cui decimoquarto morbi die iecur intumuit. Eſt autem illius duritatis cauſa, inflatio, ſcirrhus, & inflammatio: ex quibus cauſis iſterici multùm ſœdati pereunt; albæque deiectionis iis vnâ ſecedit cum vrinis etuoſis, ac ſaturato colore flauis.

SIN AVTEM, ANOEPS] i. Ancipitis iudicij ab inflatione; ſiniſtri verò ab inflammatione & ſcirrho. Ac ſi diceret, talis iſterus ante & poſt ſeptimum diem calamitoſus: quia ſymptomaticus à viſcerum cacopragia, quæ diebus criticis tolli non poteſt. iſtericus durum iecur fieri, malum. Fuit in Hermocrate τὸ πονηρὸν ἐν ταῖς λαπαρῶς, i. diſtenſio mollis. Fuit Apollonius μεγάλῳ πάτερτι, i. viſcerofus; idem habuit παρὰ τὸ ἡπαρ ὀδυνηλὴ ζωνή, i. conſuſum circa iecur dolorem. Vterque iſtericus factus interiit.

malè erat ἀ-
ριετιδίτις.

128 Αἱ πυκναὶ διὰ τῆς αὐτῆς ὑποσφοφαί, πρὶν κείσιν ἐμειώδεες, μὲν ἔμετον ποίεοισι γίνονται δὲ ἐξ ὁσμώδεες.

Crebri eodem modo relapsus qui sub crisin sunt vomitores, tabi atri vomitionem faciunt: existunt etiam tremoriferi.

ſent. 5. part. 1.
6. Epid.

VERISSIMUM illud eſt quod vulgo dici ſolet. Frangit arcum intenſio. Sic laſſitudine artus franguntur, cùm diu multùmque in ſuo quique officio laborarint: quamvis nulla alia rei moleſtæ, quàm exercitationis nimix ſenſio exciteretur. Sed longè aliter ventriculi ſeres habet quando is vomiturit, vomit, atque ſingultit. Tum enim non ſolùm affligitur concuſſione; ſed etiam rei ipſius moleſtia quæ concuſſionem ipſam facit. Ex quo efficitur vt ſi in vomitu perſeueret, pro excrementis pituitioſis, æruginofis & atrabilaria tandem excludat: maximè verò ſi bilis perennitatem adferant crebri relapsus: de quorum natura & cauſis hoc loco dicendum eſt; tum autem quare ſint vomitores; tabique atri vomitionem faciant; atque tremorem adferant.

CREBRI RELAPSVS] i. Si febris à diſceſſione, cùm vale dixerit, velut poſtliminio reuertatur: quod Græcis ὑποσφραίν, vnde ὑποσφοφαί nomen habent, morbique ipſi nominantur ὑποσφομάδες; & quæ ὑποσφοφῶς ipſam faciunt, τὰ ὑποσφομάδια, καὶ τὰ ὑποσφραίν.

aph. 1. part. 4.
lib. 6. Epid.

EODEM MODO] i. Iiſdem periodis quaternariorum, ſeptenariorum, & vicenariorum: quod illud eſt, καὶ λόγον ὅτι ὑποσφοφῶν: vt in duobus fratribus & cæteris quorum iudicia & relapsus narrantur i. Epidem. Vel. **EODEM MODO**] i. Typo ſimili, & æquali periodo: quod ſerè accidit, vel importuna morbi exacerbatione quæ loco non fit; vel præpropere excretionem; vel à reliquiis quæ ſuperſunt. Vt enim quæ ſuperſunt reliquiæ, relapsus adferunt: ſic etiam quibuſcunque non critica lege febres quieſcunt, poſtliminio reuertuntur.

59. Coac.
proth. 21. 53.
1. & 26. 52. 7.

VOMITORES] Non quidem liberali & libera vomitione: ſed nauſcabunda potiùs alui proritatione, quam vocat ἐλξιν ὃν ἀπὸ ἐμέτε, vel τὰ ἐμπαδῶς ἐλάμνα, vel σικκρά ἐμίσματα ἐγγὺς ἀνήλων ἰούδα.

107. Coac.
proth. 30.
5. 1. 1.

TABI ATRI VOMITIONEM FACIUNT] Quia nigrum fit excrementum, quod priùs erat flauum: tum febris ipſius ardore & crebro relapſu; tum crebrò irrita ventriculi proritatione: quemadmodum phreniticis accidere legimus, de quibus extrat. Qui è phreniticis cum perſpiratione ſputatores redduntur, vomitum illi nigrum denunciant. Vbi Galenus ſic ait. Vomitus quidem illi denunciant, πρὶν ἐλξιν; nigrum verò, perſpiratione.

EXISTUNT ETIAM TREMORIFERI] Relapsus illi ἐμειώδεες, i. potiſſimùm manibus contremiſcunt; ſtabulante in aluo bile: & increſcente malo. Exiſtunt etiam conuulſifici, faciuntque σπασμὸν καὶ ὅτι σπασμωδῶν, i. muſculorum conſtituentium ſuras. 5. aphor.

129 Τὰ ἐν τελευταίοις πυρετοῖσι ἀλγήματα ὀξυμόμνα, τετατογῶν ποίεται, καὶ θρομβώδεα αἵματα διαχωρεῖ.

Quæ tertianarum febrium paroxysmis ingraueſcunt mala; eorum gentilitia ſunt.

EXPLICATIO petenda ex 123. Febres continuæ tertio quoque die ingraueſcentes, valde ſunt periculoſæ. Nam alterum prognofcos membrum non bene coheret, nec reuera eſt σπασμωδῶν. Illud verò τετατογῶν conſultò verti paroxysmorum tertianorum gentilitia; non quidem ſimplici & periodico motu, qui fit ſecundum na-

cundum naturam acutæ & tertianæ: sed grauiorum malorum accessione, quæ in commentariis nostris ad illam prognosin recensentur.

130 131 Εν πυρετοῖσι καὶ φλέβα ἢ ἐν τῷ τραχήλῳ σφυγμὸς καὶ πό-
νος, ἐς δυσεντερίαν ἀποτελεσθῆναι. Τὸ μετεβάλλον πολλακίς χρώμα καὶ
σερμασίαν, χεῖσιμον.

10 In febris quæ cum dolore micant in collo venæ, dysenteria habent
euentum. Huc spectat etiam crebra coloris in calore mutatio.

ENIMVERO arteriarum in collo micantium pulsus aspectabilis, non est proprium dysenteriae si-
gnum, nec etiam hæmorrhagiæ: quemadmodum nec crebra coloris in calore mutatio: nisi in febris
a natura iam deuictis. Nam febrium initis pulsus & coloratio subinde noua, certissima sunt argumen-
ta τῆς δυσεντερίας parotidum, conuulsionis, atque phrenitidis.

87. Cosc.

Ergo. IN FEBRIBVS] Quorum pepasmi sperabilem faciunt crisin.

20 QUÆ CVM DOLORE MICANT IN COLLO VENÆ] Pulsu aspectabili medico, & ægro
perceptibili non admota manu, cum sensatione rei molestæ à repletionem particulari sanguinis cum ardo-
re coniecta.

DYSENTERIÆ HABENT EVENTVM] In senibus: sicut hæmorrhagiæ in iuuenibus. Quæ
de re commemorabile illud est quod scripsit Hippocrates. Proruptæ sunt plurimis hæmorrhagiæ: potissimum
verò adolescentibus & atate florentibus. Peribant autem ferè omnes hæmorrhagiæ expertes. Seniores verò ad istæ-
ros, perturbationes aluinas, aut etiam dysenterias deducebantur: ut Bion. Populitæ sunt etiam dysenteria. Itaque
non inconsideratè micantium arteriarum pulsus dysenteriam, ex euentu, denunciare putabitur, ut hæ-
morrhagiæ succedaneam, ad quam propriè apparet pulsus ille in superata febre. Quatenus autem pul-
sus ille sit dolorificus, & ad hæmorrhagiam appareat, vide comment. Galeni ad aph. illum. Vehementi in
ulceribus pulsus hæmorrhagia superuenit. Conuenienter autem videor cum hac prognosi illud quod se-

21. lib. 7.

30 quitur coniunxisse. HVC SPECTAT ETIAM CREBRA COLORIS IN CALORE MTA-
TIO: alioqui nihil præ se fert boni, iuxta illud. Si noua coloratio subinde inducatur, diuturnitatem morbi
ostendit. Ex quo efficitur, coloris mutationem in perturbatione critica, sperabilis esse boni. Contrà in
propagatione morbi, accipitis esse iudicij: quoniam affectiones variæ, vnde coloris varietas, non tam
facile à natura vincuntur, quàm simplices & vniufmodi.

aph. 40. lib. 4.

132 Τοῖσι χολώδεσι πνέυμα μέγα ἐ πυρετὸς ὀξεί, καὶ ὑποχονδρί-
α πάντα παρ' ἐς ἀφίησι.

40 Biliosis hominibus respiratio magna, & febris acuta, cum hypo-
chondrij tensione coniuncta; ad aurem se recipit.

QUÆ IN hac prognosi commemorantur signa, sunt quidem syllogistica ascensus ad superiora,
vnde πνεύματι iniri debet hæmorrhagiæ potius, quàm parotidum: nisi fortè quis ipsas dixerit hæmor-
rhagiæ consecutivas ex euentu: quod excretionis imperfectæ, facilis in abscessum conuersio fiat. No-
tum est illud. si quid ex fluentibus relinquatur, promptus ad abscessum morbus.

aph. 18. part. 2.
6. Epid.

50 Ergo. BILIOSIS HOMINIBVS] Natura atque diata, i. victus ratione & vitæ instituto: vnde
sanguinis bile perfusi facili gargalimus ad caput, faciliisque orgasmus.

RESPIRATIO MAGNA] Et frequens: quæ signum est ἐξέλογον cordis prægrandi æstu incan-
descens: vnde micantium arteriarum pulsus magni, veloces, & crebri.

FEBRIS ACUTA] Concepto in bile febrili ardore, quæ in maioribus venis & arteriis stabulatur:
quam hæmorrhagiæ singularem esse causam in causo scripsit Galenus.

CVM HYPOCHONDRII TENSIONE CONIUNCTA] Enimvero hypochondrij tensio
doloris expertis & inflammationis, πῶς καὶ ποτὶν denunciat: quemadmodum & tensio dura ac dolori-
fica inflammationis propria, hæmorrhagiam salutarem vnicam habet. Sed ea tensio sic habetur paroti-
dum prænuncia, si hæmorrhagiæ quantitas desideretur ad perfectam & criticam exolutionem febris a-
cutæ. Sic enim Galenus comment. ad illam sententiam. Hypochondrij tensio cum camate & cephalalgia,
parotidas eructat.

lib. 11. & 30.
prognost.

60 AD AUREM SE RECIPIT] i. Parotidem facit: non quidem sponte sua, quæ ad hæmorrhagi-
am viam affectat: sed deriuatione reliquiarum excretionis, atque ut ita dicam, παραχρῆμα: quod spectat
illud. Laboriosa febre laborantibus, ad articulos & maxillas sunt abscessus expectandi.

aph. 31. 4.

133 Οἱ κὴ μακρῶν ἀναλαμβάνοντες, βύσιτοι, μηδὲν ἐπιδιδόντες ἐπι-
 133 *vel cruciatus.* σρέφοισι κακοήδως.

Qui diuturno defuncti morbo, ex animi sententia cibum capiunt, neque proficiunt, grauiſsimè relabuntur.

EXPLICATIO continetur comment. Galeni ad aphorismos 8. & 31. lib. 2.

134 Οἷσιν ἐν πυρετοῖσι φλέβες αἱ ἐν κροτάφοις σφυγματώδεις, καὶ
 134 *vel cruciatus.* πρὸς ὥπον ἐρρωμένον, καὶ ὑποχόνδριον μὴ λαπαρόν χρόνιον. Καὶ ἐ-
 πάυνονται χεῖρες αἱματός. ῥύσιος κὴ ῥινῶν πολλῆς, ἢ λυγρῆς, ἢ ἀσπασμοῦ, ἢ
 ὀδυώδους ἰσχυῶν.

*Quibus in febribus temporum vena micant, unaque facies succi
 plena atque decora; nec hypochondrium molle est; diuturnum. Nec ve-
 rò illa quiescunt, nisi prorupto liberaliter è naribus sanguine, aut con-
 uulsione, aut etiam coxarum dolore.*

DIVTURNORVM morborum, nec simplices, nec vniufmodi ferè sunt crises: maximè verò
 quando cum pepasmi difficultate, quæ diuturnitatis causa est, viscera in vitio sunt: vnde accessio diu-
 turnitatis.

Ergo. QVIBVS IN FEBRIBVS] i. Si cui in febris assiduitate, nec dum sperabili eius vacatione
 ex iis quæ apparent & fiunt: vti spes crisis affulget in perturbatione critica; iam antè signis pepasmi de-
 nunciata.

TEMPORVM VENÆ MICANT] Pulsu aspectabili medico, explicatis multùm arteriis, qua-
 rum maiores motus & citiores natura ciet ad expulsionem rei molestæ: proptereaque eam micandi
 insuetam rationem aliter expressit. φλέβες κροτάφων οὐχ ἰδρυμέναι, i. temporum venæ instabiles.

VNAQVE FACIES SVCCI PLENA ATQVE DECORA] Sic mihi rectè videor expli-
 casse illud πρὸς ὥπον ἐρρωμένον, i. ad verbum, facies benevalentium similis, & potissimùm sui: cui opponitur
 πρὸς ὥπον δὲ φθορῇ, i. faciei vitium. Est facies succi plena, quæ cernitur in colore & mole: sicut decora in
 caractere. Apparet enim sæpe facies saturato colore rubro suffusa: sed vultuosa, δυσπνίου, & aspectu
 terribilis, quæ πρὸς ὥπον ἐρρωμένον dici non potest. De qua legitur. Προσώπῳ εὐχρηστῷ, καὶ τὸ λίτω σκυθρωπὸν, πατηρὸν, 40
 i. facies aut læta ἔστω ρυτίδα, aut demissa nimis ἔστω μάστι, mala. Et. Μετῶπῳ ξυμπαγῇ ὅπῃ πυτίοισι, φρενιπύοις, i.
 Frontis his contractio, phrenitica. Itaque facies bella, succi plena, atque decora, quæ in febre non leni nul-
 lam ostendit remissionem, sed potius intensiorem habet; aut certè manet eadem, ad diuturnitatem
 morbi apparet. Verumenimvero, si ille faciei saturatus rubor sit extraordinarius ἐκ τοῦ λευκοχρότερου ἔστω, i.
 albiore modo; paratidum erit prænuncius; per deriuationem denegatæ, aut imperfectæ hæmorrhagiæ.
 Sin autem τὸ χλωρόμα λαμπρόν, i. illustris rubor mutationem habeat εἰς τὸν λευκοχρότερον ἔστω, i. in modum al-
 bidiorum, abscessum in articulis fore denunciat.

NEC HYPOCHONDRIVM MOLLE] i. Non in mediocritate contractionis & distensionis
 positum: sed prominulum ab inflatione quam facit contumax oppilatio, non autem ab inflammatio-
 ne, neque à scirrho. Etenim hypochondrij distensio fugax & critica, quæ in acutis febribus hæmorrha-
 giam; in transitu purulentorum pulmonum, cruralem abscessum denunciat: illa, inquam, distensio hic
 locum non habet.

Sequitur enim. DIVTURNVM] Ex materiæ contumacia, & generatione perenni. Est enim ge-
 nerationis perennitas in vitio hypochondrij.

NEC VERO ILLÆ QUIESCUNT NISI PRORVPTO LIBERALITER È NARI-
 BVS SANGVINE] A citiore & maiore pulsu, quem eò natura ciet, fortiùsque potentiam excre-
 tricem mouet, vt se exoluat molestiis causarum morbificarum: atque ita sanguinis profluvia infert.

AVT CONVVLSIONE] Per transitum materiæ à venis ad musculosum genus: iuxta illud. Fe-
 bri conuulsio finem imponit, &c.

AVT ETIAM DOLORE COXARVM] Abscessu ad eas partes ampliores, laxiores, & imbe-
 cilliores transeunte, per 151. Coac. Vide historiam Herophontis. Dum autem materia trāsīt ad ischium,
 tumet hypochondrium tumore fugaci, vt in Herophonte. Est autem hæc prognosis ἀδόλεστος in hypo-
 thesi, & euentu.

135 *Εν καύσῳ κοιλίῃ καὶ αἱμορραγίᾳ, θανάσιμον.*

In febre ardente si aluius profuse feratur, mortiferum.

ENIMVERO propria crisis causi, hæmorrhagia, in bonis ducenda non venit si criticam legem non ferret: qualem multis antè prognosibus iam expressit. Itaque profluuium alui, specie ipsa terrificum videri debet; quia non est proprium causi; quemadmodum hæmorrhagia & sudor. Exiisse tamen leguntur qui aluo prorupta, febris ardentis curationem receperunt. Et verò Hippocrates quatuor omnino statuit febrium ardentium indicatorias causas; è quibus tertio loco commemorat perturbationes alui nas biliosas, aut etiam dysentericas *ὑπεργίρας*, i. opportune.

IN FEBRE ARDENTE] Quæ celeriter, continenter, & vehementer mouetur; illaque symptomata secum habet coniuncta, sicut inexplabilem, linguæ scabriciem, partium extimarum frigus, alterutrum *ὑποσπόν*, nempe *αὐτὸ μετὰ τὴν ναυπώδην*: prout focorum varietate distincta est; cauarum scilicet partium hepatis, magnarum venarum, cerebrique ipsius, prorrh. 28. f. 2. 1.

SI ALVVS PROFVSE FERATVR] I. Sæpe, multum, & rapidè liquidis excrementis feratur, siue ducatur: vt sit proluuius alui proruptæ.

MORTIFERV] Sanè quidem, si & incunte morbo, & excrementis feratur hepaticis, ex caco-
pragia in attrahendo, aut sanguificando; vel etiam aluinis, à vitio stomachi omnia quæ offeruntur cor-
rumpentis. Ac sanè huiusmodi profluuium quia non suscipitur ratione critica naturæ humores noxios
infra expellentis, sed imbecillitate facultatis hepaticæ, aut alui morticinio; vt in Pario: huiusmodi, in-
quam, profluuium, mortiferi signi rationem obtinet: sed multò magis causa mortifera est; quia libera-
li & crebra ductione corpus facit infirmum, ipsūque ad exitium præcipitat. proth. 63.
lib. 3.
hist. 1. f. 63. j.
3. Epid.

136 *Ἐκ κοιλίης ἀλγίματος ὀπιπὼν, πυρετὸς καυσώδης, ὀλέθριον.*

Ex dolore ventris crudeli, causus lethalis.

30 VIDE comment. ad Coac. 33. & 81.

137 *Ἐν τοῖς καυσώδεσιν, ἢ χων πρὸς ἀνορθῶν μὲτ' ἀμβλυωμοῦ, & κτ' ῥίνας βαροῖς ὀξίσανται μὲτ' αἱμορραγίαντες.*

In calidis febribus, si flatu sonoro personent aures cum visus hebetudine, & narium gravitate, nec sanguis prorumpit; excessum patiuntur melancholicum.

QUEMADMODVM excursus ad superiora sanguinis bile perfusi qui educitur per hæmorrhagiam critica legē susceptam & factam, crisis facit propriam febris ardentis: ita si exitum inde non habeat, quod symptomatice, non autem vilo modo critica translatum est; phrenitidis & insanix consecutionem adfert. Sed earum affectionum ratio & generatio planissimè iam patefacta & explicata, nouam disputationem non exigit in philologia & philosophia. Superest vt commemorata hoc loco signa quatenus ad insaniam vel ad hæmorrhagiam apparent, doceamus.

Ergo. IN CALIDIS FEBRIBVS] Quæ sunt eximia inter acutas, celeritate, vehementia, & assiduitate; eximiaque illa secum habent coniuncta, linguæ scabriciem, sicut inexplabilem, partium extimarum frigus; interiorum ardorem cum alterutro alysmo.

SI PERSONENT AVRES] Nulla re scilicet extrinsecus incidente: sed flatu sonoro exitum non habente, quem facit crassi humoris resolutio à febrili ardore in cerebri arce concepto, ubi focus & domicilium est febris ardentis: quemadmodum in aliis quoque visceribus. Existit autem sonitus ille acutus aut grauis: pro meatuum libertate, vel angustia; materiæ tenuitate, aut crassitudine; tum expellentis naturæ valida vi, aut infirma.

CVM VISVS HEBETVDINE] A tetro vapore, & venenato humore, oculorum visoria instrumenta sedante.

ET NARIVM GRAVITATE] Quam facit humoris copia quæ in nares incidit, indeque non habet exitum: quem sanè haberet, si mitigatus humor, naturæ imperio regeretur.

NEC SANGVIS PRORVMPIT] Ac si diceret: Si echo aurium, visus hebetudo, narium gravitas, symptomata sunt febris calidæ in cerebro natæ, vel eò translata: non autem signa perturbationis critica ad hæmorrhagiam critica lege susceptam & prorupturam.

EXCESSVM PATIVNTVR MELANCHOLICVM] Est enim consentaneum, vt si *ὑπερβολῶς*, i. nature immerito, sed merito morbi, venerint illa symptomata echus, hebetudinis, & narium pon-

derosarum, quæ sunt in sensoriis, labefactis partibus cerebri unde vis audiendi, videndi, & olfaciendi manat; si bilis flava in cerebro peruratur, vel toto corpore arrabilaria facta, eò transferatur; summa delirij omnia consequantur, fiatque *ἐκτασις μελαγχολική*, i. *infamia melancholica*.

138 Τοὺς ἐν καύσοις τρεμοῖς, ὡρακοπὴ λύει.

Februum ardentium tremores, delirio solvuntur.

TREMORES, ardentium februum symptomata propagata, potissimum eò spectant, ut intelligamus; humorum morbificorum, vel potius cacochymia malignæ translationem sæpe fieri à venis ad nervos, & contra: quæ cum sint partium nobilissimarum, cerebri & iccoris *περικύπη*; venæ quidem huius; nervi autem illius atque spinalis medullæ; necessario efficietur ut cacochymia malignæ utroque facta translatio symptomata faciat partium obsessarum propria: cuiusmodi est tremor nervorum; indeque progressu principia & fontes afficiantur, signaque in iis luceant quæ propriarum affectionum pathognomonica esse dicuntur: cuiusmodi delirium est cerebri effera bile perfusi.

His ita constitutis. FEBRIVM ARDENTIVM] Quæ focum habent in maioribus venis atque arteriis, in quibus acerrima bilis & effera putris cumulatè mouetur, nec dum habet exitum intus, aut introsum foras; per hæmorrhagiam scilicet, aut sudorem.

TREMORES] Depravati artuum, pariter iussi & iniussi, motus: in quibus id quod mouet, & id quod mouetur, ex æquo certant virtute, & contumacia quam facit oppressio. Quæ affectio petrarò cadit in febres ardentes, estque symptoma eximiarum quas peperit bilis acerrima plena orgasmi: propter eaque hæc prognosis melius in aphorismis sic expressa legitur. *Quibus in febre ardente, tremores fiunt, &c.*

DELIRIO SOLVUNTUR] Non quidem ægrotis morbo defunctis, quod propriè *τὸ λύνει* significat: sed grauioris mali successione, tremoris molestiis liberatis. Est enim delirium grauius malum quàm tremor: quando tremoris consecrarium est per transitum *ἀπὸ τοῦ περικύπτον εἰς τὴν ἀρχὴν*, i. à *propaginis ad principia*. At verò sicuti metu debilitat delirium tremoris consecrarium: sic tremor delirio superueniens planè funestus. Illic enim alteratio est vix emendabilis: hic autem alienatio infanabilis, quæ priuationem dicit habitus.

Coac. 33.
& 78.

139 Ἐν καύσῳ ῥύσις ἐν μυκθήσῳ, τεταρτάῳ, κακὸν ὡς μὴ πᾶν ἄλλο ἀγαθὸν συμπίεση. πεμπτάῳ δὲ, ἥσασον κινδυνώδεις.

Si cui ardentè febricitanti, & quartum morbi diem agenti, sanguis fluat è naribus; grauißimum habet malum: nisi quid aliud bonum accesserit. Idem si fiat quinto, minùs periculosum.

TAMETSI hæmorrhagia febris ardentis, vna, inter cæteras, crisin facit ad ægri salutem; quòd ea verè sit critica: tamen nisi loco & conuenienter fiat, desperationem adfert salutis. Loco non fit quarta hæmorrhagia: conuenienter non fit, stillatim & parca manu. Quæ quia sunt pluribus iam explicata; ad illud me conuertam.

NISI QUID ALIUD BONVM ACCESSERIT] Ut liberalis hæmorrhagia, crebrò repetita: qualem fuisse legimus Metoni, post quartanam modicam, & cum prauis tum signis coniunctam. Vel: nisi quartanum stillicidium, pepasmi etiam quartam accessionem habeat. Tunc enim liberalis hæmorrhagia septimo die futura ostenditur: unde sperabilis vitæ salus.

156. Coac.

malè fuit
ἐγγραμ.

140 Οἷον ἐν τοῖσι καυσώδεσιν, ὑποθεψύχοις, διαχωρήμασιν, ὑδατοχόλοις, συγχοῖσιν, ὀφθαλμῶν ἰλλωσις, κακὸν ἄλλως ἢ πᾶν κατόχοι γίνονται.

Quibus ardentè febricitantibus, modicè aliosis, ex alio crebra deiectiones, liquida, & biliosa prorumpunt; unaque oculorum peruersio est: calamitosum: idque cum aliàs, tum si reddantur obstupidi.

COMPLEXIO est & consecutio symptomatum propagatorum, quorum aduentus & generatio, magnarum affectionum consecutaria esse solet: nec earum quidem omnium; sed inter eas eximiarum. Eximia quidem sunt febres ardentes in quibus apparent, eximarum partium frigus; deiectiones liquidæ, & biliosæ ex aluo proruptæ; oculorum peruersio, & catoche ipsa. Quæ omnia quemadmodum fiant, & quorsum appareant; sic mea ratio est.

QUIBUS ARDENTER FEBRICITANTIBUS] Quibus cum celeritate, vehementia, & assiduitate, summa sunt omnia febrilis ardoris, qui cernitur in lingue scabrie, siti inextinguibili, costarum aut ventris incendio.

MODICE ALSIOSIS] Per interceptionem & retractionem caloris natui. Alsiosos autem modice dixit; qua oratione symptoma expressit inseparabile febris ardentis.

**EX ALVO CREBRÆ DEIECTIONES, LIQVIDÆ, ET AQVOSÆ PRORV-
PVNT**] i. Multum & sæpe liquidis excrementis fertur aluus: propter ventriculi *πέπρωσιν*, aut iccoris *καταρρέσιν*.

VNAQVE OCULORVM PERVERSIO EST] Nempe musculorum utriusque canthi contractio, quam facit consumptio viuacitatis, & dissipatio nectaris viuifici cordis; illa quidem, à febre ardente; hæc verò, à profluvio alui.

CALAMITOSVM] Quia trium facultatum in officio vim debilitatam; triumque principiorum, hepatis, cordis, & cerebri exolutionem denunciant.

IDQVE CVM ALIAS, TVM SI REDDANTVR OBSTVPIDI] Ac si diceret. Si trium facultatum principia exaruerint, maximèque cerebrum, cuius symptoma sit *ἰλιαισις*; non pressa leuiter, sed fixa firmiter à siccitate insanabili. Id enim significat *παραχρως*.

47. Coac. &
proth. 6.
lib. 2.

141 Καύσος, ῥίγος ὀπτημομένης, λύεται.

Causus, rigore superueniente, soluitur.

QVI ET cuiusmodi sit rigor, frigus, & horror; prima distinctio harum decisionum suo veluti sinu complectitur. Scire autem licet, hoc loco rigorem subitum, febris ardentis finem adferre; si lege critica suscipiatur, & fiat. Hæc verò lex in rigore critico sancitur, ut febris ardentis materia primum in venis mitigata, exitum inde habeat, natura duce, ad panniculum carnosum, & cutim; quæ rei molestæ appulsu concutitur ad excussione & exclusionem. In concussione rigor existit. In excussione sudor, hæmorrhagia, vomitus, & alui profluvium. Sed illa concussio quæ facit rigorem, sic habetur optima, si & pepasmo denunciata fuerit ad ipsum tempus; & suppressione urinæ, ad speciem ipsam perturbationis criticæ, i. rigoris, qui varia ciet excretionum genera, prout natura & humor huc illic cursum inflectunt.

ERGO. CAVSVS] i. Febris ardens, quam genuit biliosus & acer humor quem arefactæ venulæ rapuerant: quam causæ morbificæ hypothese Galenus, tanquam demonstrationis fundamentum, posuit.

aph. 58. 4.
& 4. de acut.

RIGORE SUPERVENIENTE] i. Repente, egregie & semel coorto: per excretionem bilis morbificæ intus foras *ἐκ τῆς ἀγγείας*, non autem *ἐκ τῆς ἐλλείας*. Sunt enim hi duo in vniuersum fontes, ex quibus manant rigores symptomatici, critici, & periodici.

SOLVUNTUR] Quiescunt, liberali & libera vacatione bilis febriferæ, quam vacationem ciet rigoris concussio per hæmorrhagiam, sudorem, alui profluvium: ut nihil reliquiarum supersit ab ea concussione, pepasmo significata, conuenienterque suscepta atque facta. In aphorismis legitur. *Ἐπὶ καύσος ἐχρήματο, ῥίγος ὀπτημομένης, λύσος*, i. *Causo detentus, rigore soluitur superueniente*. Pertinet etiam ad explicandum sent. 9. & 10. part. 1. lib. 5. Epid.

142 Καύσος ὑποζυγιάζειν εἰώθεσι, ἢ ἡμέρας τεσσαράς ὀπτημένην-
τες ἔπειτα ἐφίδρωσιν. εἰ δὲ μὴ, τῇ ἐβδόμῃ ἢ δεκάτῃ.

Febris ardens, ut quaternarium ad crisin designarit, si sudatiunculam habet, redibit pro certo. Sin minus, septimo vel decimo.

EXISTIT quidem crisis perfecta morborum acutorum propria, tum propter *ἐρεθισμὸν*, i. *proritationem*; tum quia ferè est meabile corpus naturæ vi, meatuum libertate, & materiz prapARATIONE: quæ tres omnino sunt opportunitates liberalium & liberarum excretionum, per quas ægroti se morbis liberant. Et quamvis inter acutas eximie sint febres ardentes *πρὸς ἐρεθισμῷ*: tamen quia non semper in promptu est triplex illa opportunitas *τῆς εὐρείας* in febre ardente; ideo neque semper votis medicorum crisis respondet. Itaque pro hæmorrhagia sit stillicidium; pro liberali sudore, *ἐφίδρωσις*: vnde materia morbi superstite, & empyreumate, recidiuus accidit morbus. Non enim sudatiuncula, non etiam

stillicidio, febris ardens perfectè quiescit. Ex quo efficitur, ut morbi reliquæ, quæ ab imperfecta crisi supersunt, relapsum adferant morbi exacti.

Quæ cum ita sint. FEBRIS ARDENS] Quæ inter acutas principatum obtinet, quarum propria est crisis per plenam & liberam excretionem.

UT QUATERNARIUM AD CRISIN DESIGNARIT] Quamvis ediderit signa secundæ crisis, atque in futurum perfectæ, in pepasmo urinæ, qui cernitur hypostasi, materia & loco laudabilis. Ac si diceret; tamen si febris ardens primum quaternarium exegerit sine terrificis illis symptomatibus quæ incunte morbo apparent & fiunt ad exitum ægri, qualia leguntur i. lib. Epid. sed contrà, naturæ virtute processerit, ac sperabilem vitam fore ostenderit, ex urinæ pepasmo qui septimo die venturam crisin promittit.

SI INDE SYDATIVNCULA EXVDARIT] Vnde nemo vnquam febre defunctus est absolute: quia criticam legem non seruat in excernendo; cum nihil paucum sit criticum. Est autem huiusmodi, non quidem oppressione, ut esse solet febrium initiis; non exolutione, ut fatisciente natura diuturno & prægrandi morbo: sed inchoata excretionem, cuius copiam & libertatem perficere non potuit triplex illa conditio & opportunitas τῆς ἐπιόλης: de qua iam scripsit.

REDIRE SOLET] Ob causas iam explicatas: ac redire quidem eodem ipso die quo discessisse videbitur, i. quarto. Sin minùs, septimo vel decimo.

Eodem pertinet Coac. 7. Causorum rigores certa quadam lege sunt funesti: tum rutila cum sudore facies, in his mala.

143. Τοῖς κραινώδεις διακρίνοισιν αἱ τεσσερεσκαίδεκα ἡμέραι, καὶ φέρονται ἢ ἀναποδοται.

Eorum qui ardentem febricitant decisionem faciunt quatuordecim dies; vel ad interitum; vel ad salutem.

ENIMVERO febres acutæ intra quatuordecim dies crisin subeunt interitus, aut salutis. Quamobrem mirum videri non debet de ardentibus quæ inter acutas eximæ sunt. Etenim quibus cita mors venit, inquit Hippocrates, cita etiam crisis: quod morbi eorum celeriter, continenter, & vehementer procedant.

Ergo. EORVM QVI ARDENTER FEBRICITANT DECISIONEM FACIUNT] Velut arbitri & iudices disceptationum naturæ & morbi, vtrò citròque habiturum, quod ratum cuique esse debet, decernunt & statuunt.

QUATVORDECIM DIES] Qui duas morbi hebdomadas, & quatuor absoluunt quaternarios; siue illi referantur ad τὴν πρῶτην ἐξορῶν, i. primum insultum morbi; siue ad τὴν δευτέραν, i. adiectionem incrementi: prout initio est ardor febrilis, aut postea incessit. Existunt autem quatuordecim dies arbitri quàm longissimo intervallo. Nam & quinto & septimo alterutrius exitus decisiones fiunt: quoniam mutationis repentinæ, quæ crisin facit, celeritatem adfert perpetua & vehemens irritatio: qua certè nulla peruicacior excogitari potest quàm in febre ardente.

AD INTERITVM, VEL AD SALVTVM] Superato morbo per naturæ virtutem ex pepasmo & excretionem plena & libera humoris morbifici: quæ duo sunt instrumenta crisis perfectæ, quam perfectè & exactè subeunt morbi acuti. Nam crisis semisua non cadit propriè in morbos qui absolute sic nominantur: sed in eos qui ἐκ τῆς μεταπτώσεως, i. transitu ad quadragesimum diem: quamuis existant febres ardentes cum ἡμῖν πρότερον crisi, ut superiore prognosi demonstratum est.

144. Ἐκ κραινώσου δόσημαζος παρ' οὗς μὴ γμορμὸς πυώδης ἐπαύσονται.

Si cui ex febre ardente venit parotis quæ purulenta non fiat; haud facile superstes euadit.

IAM PRIMVM omnium constat, propriam febris ardentis crisin libera & liberali excretionem suscipiatque perfici humoris qui in vitio est, per hæmorrhagiam aut sudorem. Quod si pro sudore, sudatiuncula; pro hæmorrhagia, exiguum sanguinis stillicidium; excretionis loco, abscessus nascetur ad aures; denegata hæmorrhagiæ profusione & copia: quemadmodum paulò antè iam demonstrauimus. Vt autem parotides veniant ex febre ardente; tum verò quem habeant exitum cum superuenerint; iam suprà diximus, & infra dicetur pluribus.

145 Οἱ ληθαργικοὶ τρομώδεις ἀπὸ χιρῶν, ὑπνώδεις, δὴ ἄρρωστοι, οἱ
 δηματώδεις, σφυγμοῖσι νωδροῖσι, καὶ μελάρσια τὰ ὑποφθαλμία, καὶ
 ἰδρώτες ἔπιγίνονται, καὶ κοιλίας ὑποιδέοισι χολώδεις καὶ ἀκρατέας. Ἰὼ
 δὲ κατὰ ξηροὺς ἴχουσιν, οὐρα καὶ διαχωρήματα πορρίοντα λαδραίως.
 Τὸ ἔρον ὑποζυγίς πείν τ' οὐκ αἰτέουσιν, οὐδὲ δάτερον ἔδεν. Εμφρονες δὲ
 10 γινόμενοι τράχηλον ἐπώδυνον Φασὶν ἔχεν, καὶ διὰ τῆς οὐάτων ἤχους
 διαΐσκειν. Οὐκ οἶσι δὲ σῶζον τ' ληθαργικῶν, ἔμπυοι ὡς ἔπιτοπολὺ γίνονται.

*Lethargici manibus contremiscunt, soporati, decolores, unaque
 turgiduli, cum pulsu sepulto. Apparent etiam genae sublimes, bilio-
 saque alvus profusior intumescit; quam si astrictiorem forte habuerint:
 20 attamen urinae & faeces iniussa clam agro secedunt. Urina iumentorum
 similes. Porro autem nec bibere, nec aliud quippiam sibi dari postulant.
 Sed cum respuerint, cervicis dolore angiqueruntur, flatúsque sonoros
 per aures erumpere. Ex lethargicis, quicumque servantur, ferè purulen-
 ti redduntur.*

REFLECTI capitis symptomata sunt cataphorica, aut cephalalgica, aut catarrhoica. Intet ca-
 30 taphorica numeratur lethargus. Est autem delirium intermissionis expers, cum febre, sopore, & cita
 obliuione coniunctum. Ac delirium quidem cernitur in dissimilitudine morum, indecora corporis
 compositione, & ἀναμνηστικὰ laborum: sopor, in veterino & exolutione: febris, in calore, vrinis, & pul-
 su: cita obliuio, in necessariis rebus; vt oscitatione, respiratione, deiectionibus, & vrinis. Nam osci-
 tando diductam inferiorem maxillam claudere non meminerunt: nec micturientes matellam se po-
 poscisse: magnum & rarò spirant: iniussa excernit aluus, & iniussa vesica.

Ergo. LETHARGICI] Numeris omnibus absoluti, qui cerebro pituita putri, velut inebriato,
 continentur delirant: cum febre, sopore, & cita obliuione. Est enim delirium illud intermissionis ex-
 pers, cerebri malè affecti per idiopathiam, symptoma: sicut phrenitis.

comment. 2.
 li. 1. prout.

MANIBUS CONTREMISCUNT] Quando lethargi inueteratione fit cerebri alienatio: vel
 40 propagatione causæ lethargicæ à parte postica cerebri in cervicem.

SOPORATI] Cum vicissitudine fugacium vigiliarum, & arctioris somni: ex contraria vi putre-
 dinis, & materiae putrescentis.

DECOLORES] Faciei sympathia cum cerebro pituita inebriato. Est autem consentaneum vt co-
 lor humori similis efflorescat.

TURGIDULI] Cuiusmodi sunt qui somno indulgent meridiano; aut qui ad multam lucem dor-
 miunt, exhalandi vini, & concoquendæ crapulae causa. Nam diurnior somnus facit τὴν ἐφθόνην, i. eli- 2. de acut.
 cationem: quæ causa est cur lethargici videantur leucophlegmatici.

CUM PULSU EFFOETO] Pigro, tardo, vndoso, cum ἀσφυξίᾳ intercalari: per exolutionem fa-
 cultatis pulsificæ, in vsu pulsandi pernecessariæ. Ex quo perspicuum fit Hippocratem pulsam noticiam
 50 habuisse, eorūque sciētiā excoluisse: quod etiam testatur aperte locus ille 1. lib. περὶ γυναικῶν; lo-
 quitur autem de puerperis quæ non sunt puerperiales, i. quibus puerperia non bene respondent. Σφυγμοὶ
 βαργοί, ἐστὶ οἱ ὅτι καὶ ὀρεῖς ἀπὸ τοῦ ἀερόμενου, ἀπὸ τοῦ ἐνδύοντος, i. Pulsus molles; qui attolluntur nonnunquam, & non-
 nunquam deficient.

APPARENT ETIAM GENÆ SVBLIMES] Cuiusmodi cernere est ebriosis diurno so-
 pno excoctis: à peruersione quam facit musculorum vtriusque canthi æqualis contentio.

TUM SVBOR EXVDAT] Exiguo sudore madent; initio quidem, per expressionem ab op-
 pressionem; postea verò, ab exolutione partium solidarum.

BILIOSAQVE ALVVS PROFVSIO INTVMESCIT] Biliosa quidem, bilis domina-
 tu, à febris corruptione; profusior verò, sua sponte iniussa: tum quia lethargici non suæ sunt mentis;
 60 tum quia sensu carent partes excretioni dicatæ. Tumida autem conspicitur aluus, vt in hydropicis, cum
 alui profluuiο.

QVAM SI A STRICTIOREM FORTE HABUERINT] Quod exaruerint
 faeces.

ATTAMEN VRINAE ET FÆCES EXEUNT INIVSSÆ CLAM AGRO] 1. Non
 ægri sponte fertur aluus, neque vrinae funduntur: sed sine voluntate & sensu commeiunt & concacant

lectum. Qua de re scripta sunt illa. *Vrina quæ effluunt immemoribus, lethales.* Et, *Ex alio tenuia effluere.* &c. *VRINÆ IUMENTORVM SIMILES*] Perturbatione feri in venis, à flatulento spiritu cum ardore febrili. Quaritur in pronostico ubi de urinis agitur quæ immemoribus ægris, sua sponte, funduntur. *Αεὶ γὰρ πυρρίοισιν ὑπέρταται αἱ εἰς τὴν ὑπόστασιν ἀναταράσσονται*; i. An quod illis lotium excidit, est eiusmodi ac si hypostasim conturbaueris? Quæ perturbatio si ad iniussam urinae ductionem accesserit, tantò peius, quò plures facultates in vitio sunt. Tales urinae nominantur etiam *δολιγὰ ῥέειν*.

PORRO AUTEM NEC BIBERE, NEC ALIUD QVIPPIAM SIBI DARI CONTENDUNT] Quoniam nulla sitiferæ causæ sensio excitatur in iis qui non sunt apud se, nec sua sunt mentis: unde sui negligentes existunt, ac tam immemores ut si quid fortè poposcerint, cum in manus sumperint, id se manibus tenere amplius non meminerint, nec recordentur.

SED CVM RESIPVERINT] Explicato cerebro per materiae decubitum, & restituto in pristina complexione ac temperamentum: quòd perraro accidit in tam maligna cacochymia, tantæque naturæ oppressione.

CERVICIS DOLORE ANGI QVERVNTVR] Propter transitum materiae à cerebro in sobolem eius medullam: unde vigente lethargo, manibus contremiscebant per propagationem materiae tum in cerebro stabulantis.

FLATVSQVE PER AVRES VI EXPRIMI] Cum sibilo & tinnitu, qui echus naturam distinguit à flatu sonoro & murmure, estque huiusmodi propter conditionem validæ expressionis: quod ipsum significat, *τὸ ἡσφύρειν*. Est autem illa echo, spiritus flatulenti soboles, quæ modò gravis, modò acuta percipitur: prout valida aut remissa expressio est; flatus crassior aut tenuior; meatus amplitudo vel angustia.

EX IIS QVICVNQVE SERVANTVR, FERRE PVRVLENTI REDDVNTVR] Ex pulmonum vomica: nisi antè ad exitium præcipitentur à peripneumonia nata ex prolapsu materiae corruptæ, & fractis iam viribus à lethargo.

146 Οκλόστοις ἐν πυρετοῖσιν ἀκρίτως τὰ τρομώδεα παύεται. Τυλίοι-
α. χρόνω ἐς ἑδρῶν δ' ὅπως αἱ οὐλωδὴς ἐκπύουσα, καὶ κύστις ἐπ' ὠδυνος.

Quibuscumque in febribus tremores immeritò conquiescunt, iis lapsu temporis sedis dolorifici & purulenti abscessus nascuntur; unaque in vesica doloris acerbitas.

HÆC PROGNOISIS decisionem facit historiarum commemorabilis de Pythione, quæ prima legitur sectione 1.3. *ἢ ὅτι δὴ μ.* Etenim cum Pythion febris initio manibus contremiscere cœpisset, nec eius tremoris finem inuenire potuisset in quo permultos dies cum febre exegit; denegata liberali excretionem, foco febrili & sputi materia obsessis pulmonibus; tandem natura expediuit se illo symptomate per abscessum purulentum in sede, & stranguriosam urinam. Id autem accidit quadagesimo die morbi.

Ergo. QVIBVSCVNQVE] Præsertim iuuenibus: quorum validæ sunt vires ad pepasimum & excretionem.

IN FEBRIBVS] i. Febrim initius, quibus natura morificis causis opprimitur; eaque oppressio facit tremorem, ut Pythioni.

TREMORES] i. Iussorum in artubus motuum depravatio: ex pari & mutua contentione rei quæ movet, tum eius quæ movetur; quæ depravatio cernitur in virtute illius, & contumacia huius: unde homines toto corpore, omnibusque artubus contremiscunt: quod idem est atque illud. *ὅλως ἡς ἀκρατὴς ἐμώδης*, i. totius corporis impotentia quadam tremula.

IMMERITO CONQUIESCVNT] Sic ego de industria illud, *ἀκρίτως*, vertendum putavi: quia idem videtur esse quod, *ἀσθενέως*. Immeritò autem conquiescunt, sine propria crisi oppressionis illius quæ facit tremorem. Propria autem crisis est hæmorrhagia. Quæ causa etiam cur ipse Galenus ita scripserit. *si febrim initius tremor inciderit, nec vlla sit virium exolutio ex antea acta diata; sanguinis detractio necessaria est.*

IIS LAPSV TEMPORIS] Intra quadagesimum diem, si vires validæ pro agro pugnant contra vim morbi, anteaque pepasimi signa ediderint: ut in Pythione per sputa *ὑποπύονα*, i. subcocta,

DOLORIFICI ET PVRVLENTI SEDIS ABSCESSVS NASCVNTVR; VNAQVE IN VESICA DOLORES ACERBITAS] Sic in Pythione. *ἐμπύημα*, inquit, *ἐπ' ὠδυνος*, & *σφαιροειδὴς ἐξήμεν ὑπόστασις*. Unde, *τὸ δ' ἑδρῶν*, in, *τὸ ἑδρῶν*, commutandum duximus.

147 Τῶν πυρεασόντων οἷσιν ἐρυθρήματα ἴπ' ἀπὸ πύρεος, καὶ πόνοσ κε-
φαλῆς ἰσχυρὸς, & σφυγμὸς φλεβῶν αἵματος ῥύσις τὰ πολλὰ γίνεταί.

Si cum

Si cui febricitanti rubor in facie luceat, unaque capitis dolor prægrandis, & una venarum emicet pulsus; ferè profluuium sanguinis e naribus inde venit.

MAGNA expectatio est hæmorrhagiæ criticæ in morbis acutis, quam si neque medicus prævidere, neque præuisam, cum in propinquo est, velut digito indicare potest; vix videtur summam vituperationem posse vitare. Quemadmodum autem prævideri debeat, sæpe iam diximus. Hic quænam sit indicandi ratio cum propè abest, planissimè explicatur.

10 **SI CUI FEBRICITANTI**] Quando spes est releuandi, ex mansuetudine morbi, viribus ægri, vnde signa pepsimi certa innotescunt.

RUBOR IN FACIE SPLENDEAT] Suffusa sit rubore facies per excursus sanguinis mitificata bile perfusi: vnde certa opinio educationis è cerebro per nares.

VNAQUE CAPITIS DOLOR PRÆGRANDIS] Aucto capite repletionis causis: ex translatione critica humoris morbifici.

20 **ET VNA VENARVM EMICET PULSVS**] Aspectabilis medicò in temporibus ægri, & ægro perceptibilis atque molestus: ex dilatatione extraordinaria venarum, quæ hîc pro arteriis vsurpantur. Atque illa dilatatio extraordinaria, non est consecutaria cordis micantis: sed repletionis particularis arteriarum, vel etiam partium in quibus illæ micant. Cui quidem repletioni cum adiunctum sit partium repletarum robur, & meatuum amplitudo; propius nihil est, quàm vt vacuationem habeat loci & materiz propriam: ac profluuium, inquam, sanguinis è naribus, inde veniat: quæ sunt authoris verba.

148 Οἱ δὲ ἀσπαι, καὶ καρδιωμοὶ, καὶ πνευλισμοὶ, ἐμῆτος οἱ δὲ ἐρρωμοὶ, φύσαι, ψόφοι κοιλίης καὶ ἐπαρσίτες ἐν τὰ ἐσθλὰς κοιλίης.

30 *Quibus autem fastidia, cordis morsus, & crebre salina; in procinctu vomitio est: quemadmodum si ructus, flatus silentes, crepitus ventris, atque inflatio; rapidè fertur aluus.*

40 **QUEMADMODVM** à sanguine multa bile perfuso veniunt hæmorrhagiæ iis qui ardentè febricitant, quas in propinquo esse denunciant signa superiori prognosi explicata: sic etiam vomitiones febrium finem faciunt; quando ita comparata est ratio morbi & ægri, vt naturæ impulsu, & partium obfessorum conditione, humor qui in virio est, ad ventriculum & stomachum cursum inflectat. Vt enim cephalalgia in febre acuta, hypochondrium sursum intrò reuulsus, sanguine non prorupit è naribus, phrenitidis euentum habent: sic lipyriæ febres, non nisi cholera superueniente, sanantur. Ac de inclinatione critica ex impulsu naturæ, humoris motu, & domicilio ipsius morbi; multa nos quidem ad illarum prognoseon explicationem attulimus ex lib. *περὶ χυμῶν*. Est igitur vomitio inter excretiones criticas numeranda, si iure & loco, sponte sua suscipiatur & fiat.

125. & 126. Coac.

QUIBUS AVTEM FASTIDIA] Ac si diceret. Si loco tensionis hypochondriacæ, dolore & inflammatione carentis, fastidiosa sit aluus, quæ est acerrimi sensus, facitque homines anxios, vt ita dicam, virium exolutarum, omnique loci & figuræ impatientes; non quidem *αὐτὸ μὲν*, vt in iis quorum virtus à corporis oppressione obruitur; sed *ταυτοῦ δὲ*, à stomacho prauorum humorum moribus valde afflicto.

50 **CORDIS MORSVS**] Quasi ita velit. Si nulla sit alia illius anxietatis causa, quàm biliosus humor quo tunica ventriculi sunt imbutæ, unaque stomachus morsu vellicatur; vnde consecutio adfertur *τῷ καρδιωμῷ*, quod symptoma est, non quidem cordis micantis per se, sed oris ventriculi, quod veteres *τῷ καρδίᾳ* nominarunt: vt nulla suspicio sit anxietatis à virium oppressione; sed tantum à ventriculi & stomachi afflictione, cuius proprium symptoma est cardiogmus & cardialgia. Ac cætera omnia vomitionis signa quæ aliarum quoque partium & affectionum communia sunt, huius vomitionis efficiuntur propria.

61. aphor. 4. & 3. prognost.

60 149 Τοῖσι χρονίζουσιν ἀσφαλέως ἐν πυρετῷ ζωνεῖν, χωρὶς πόνου καὶ φλεγμονῆς, ἢ ἄλλης περὶ φάσιος δόψασιν πρὸς δέχεσθαι πόνου, καὶ οἱ δὲ ἡμῆτος, καὶ μᾶλλον ἐς τὰ κατὰ χεῖρα. πρὸς δέχεσθαι δὲ δεῖ τὰς δόψασιας τοῖσιν ὑπὲρ τεύκοντα ἔτα μᾶλλον. ὑποσκέπτεσθαι δὲ τοῦτοις τὰς δόψασιας, ἢ τὰς εἰκοσὶν ἡμέρας πύρετος ὑπὲρ βάλλη. τοῖσι δὲ πρὸς βου-

τέροις ἢ ἥσων γίνονται, & πολλῶν χρόνων χρομύων ἢ πυρετῶν. οἱ δὲ διαλείποντες ἢ λαμβάνοντες πεπλανημένως, φθινοπώρᾳ μάλιστα, ἐς τελευτῆν ὀφεικνέως μεδίσανται ἢ μᾶλλον τοῖσιν ὑπὲρ τὰ τελέοντα ἔτα γερονόσιν. Αἱ δὲ δόξαί τινες, τὸ χρομύος γίνονται ἢ μᾶλλον καὶ παύονται βραδύτερ, καὶ ἥσων παλινδρομέοισι.

Quibus inueteratio est cum securitate febris continua, nec tamen doloris, inflammationis, aut illabentis causa vis ulla inciderit; abscessum dolorificum, tumidumque imis in partibus expectare oportet: potissimum verò iis qui annos triginta compleuerint. Ac sanè abscessum expectare licet, cum febris viginti dies exegerit. Maioribus autem rarò abscessus fiunt: quantumuis longius febres eorum processerint. At verò febres intermissionis participes, quarum anormes sunt accessiones, idque autumno; degenerant abundè in quartanas: iis potissimum qui annis triginta sunt grandiores. Caterum supradicti abscessus & hyeme magis veniunt, & serius finiunt, & minus reuertuntur eò unde venerunt.

SEQUITUR UT patefacta excretionum criticarum περιόδῳ; deinceps de critico abscessu dicamus. Existunt enim morbi quorum curatio decubitu materię suscipitur atque perficitur, in quibus excretio nulla sperabilis nisi ex euentu, ut ita dicam: sicut dysenteria in febre acuta, senum urinae crassae, albae, & copiosae. Nam quibus in febribus rigores valida concussione cientur, rarò abscessus cooriuntur. Est autem abscessus κατ' ἐξουίαν hoc loco dictus, qui fit κατὰ τὸν ἀπόθαιον, i. per decubitum materię morbosae in artubus siue articulis. De cuius lege critica in qualitate, copia, tempore, decumbendi modo, & partium excipientium conditione; alio loco iam diximus. Ergo morborum critici abscessus huiusmodi fere sunt.

QVIBVS INVETERATIO EST CVM SECVRITATE FEBRIS CONTINVAE] Ac si diceret. In diuturnis morbis qui saluis aegri rebus producti sunt à vigesimo ad quadragesimum diem, & ultra, cum signis quae spem vitae faciunt in doloris acerbi vacuitate, somni & cibi suauitate, & libertate spirandi.

NEC TAMEN DOLORIS, PHLEGMONES, AUT ILLABENTIS CAUSAE VIS VLLA INGRVERIT] Si nulla sit alia diuturnitatis causa quàm difficultas pepasmi, quae posita est in materię copia aut contumacia; nec ulla excusatio possit adferri phlegmones atque doloris, siue viscerum in suo cuiusque officio laborantium, unde materię morbosae perennis generatio: nulla etiam causarum extrinsecus illabentium, ut pertinaciae clinicarum quae nihil rectum nisi quod ipsae praescribunt; negligentiae aut inscitiae medicorum, unde non mediocriter peccatur in commoda aegri, maxime verò quando per ignorantiam inter se dissentiunt, eaque dissensio non est opinionum, sed voluntatum; postremo aegroti contumaciae, ac tempestatum caeli repente coortarum.

ABSCESSUM LABORIFERVM, TVMIDVMQVE IMIS IN PARTIBVS EXPECTARE OPORTET] Quia in promptu non sunt tres illae opportunitates ad excretionem ciendam necessariae, libertas meatuum, validae vires, & materię preparatio quae sit meabilis. Nam diuturnarum febrium crassior materia est: tum ab oppressione fractae vires liberalem & citam excretionem ciere non possunt; nec intus foras; nec foris introrsum. Ex quo efficitur, ut denegata excretionem, quod reliquum est ipsa per se natura laboriosè perficiat atque suscipiat, materiam exprimendo supernè deorsum κατ' ἐξουίαν in partes amplitudine capaces, & laxitate ad excipiendum idoneas. Sunt autem abscessus, dolorifici quidem, sed laboriferi magis, quia laboriosos faciunt articulos in suo quemque munere & officio faciundo: prætumidi verò apparent, materię collectione quam exceperunt.

POTISSIMUM VERO ITS QVI ANNIS TRIGINTA SVNT GRANDIORES] Quoniam viris aetate illa minoribus ferè in promptu est triplex illa iam commemorata opportunitas qua excretio omnis suscipitur atque perficitur, naturae, meatuum, materięque meabilis. At tamen in prognostico minores natu annorum triginta, abscessuum feraciores, qui sunt breuioris temporis, esse scripsit. Frequentius verò, inquit, citiusque gignuntur abscessus huiusmodi, minoribus annis triginta. Sed huius prognosticos lectio, illi prognosticae anteponenda videtur: quoniam iuuenum excretionem propriae sunt in morbis acutis; ob eam sanè causam, quod ipsa natura, & iuuenum humor, ad excretionem cursum inflectit.

AC SANE ABSCESSVS TVM PRÆVIDERE LICET, CVM FEBRIS VIGINTI
DIES EXEGERIT] Quando acutorum morborum decisionem faciunt quatuordecim dies ad in-
teritum vel ad salutem; neque exactus quispiam est morbus acutus qui non eo temporis intervallo hi-
storiam suam exegerit; præcepta crisis occasione & causa, per excretionem, inclinatio fit ad abscessum;
modò validis viribus natura pro ægri salute pugnet cum morbo, vt in cephalalgia prægrandi, & icteris
inflammatione; pro hæmorrhagia fit suppuratum.

SENIORIBVS AVTEM RARO ABSCESSVS FIVNT; QVANTVMVIS LONGIVS
FEBRES EORVM PROCESSERINT] Vt in iuuentute excretio sperabilis est: sic in ætate con-
stanti abscessus. At supra illam ætatem, quando scilicet ventum est ad senectutem, neutrum sperabile:
quoniam in senectute vires diuturnitate morbi languent; materiæ contumacia est; meatuum item an-
gustia. Ex quo efficitur, vt in oppositione triplici *πρὸς εὐροίας*; nihil à natura suscipi, nedum perfici posse
videatur. Quod reliquum est igitur, aut concoctione lenta absoluetur, aut successionem adfert corru-
ptionis & cachexiæ.

AT VERO FEBRES INTERMISSIONIS PARTICIPES, QVARVM ANORMES
SVNT ACCESSIONES] Fuit illud Hippocratis iudicium de abscessibus criticis, vt eos non agnouerit
nisi in febris assiduitate; nunquam verò in discessione, quam *ἀπορροίας* vocant. Sic enim ait in pro-
gnostico. Abscessum porro expectare oportet, si continua est febris. Ergo febres intermissionis participes quæ
paroxysmi discessionem perfectam habent, cuiusmodi sunt tertianæ; sed quarum, inquam, anormes
sunt accessiones, i. typo regulari carentes: sic enim errorem febrium in paroxysmorum particularium
ἀπορία dixit versari. Sunt autem eiusmodi primigenia *ἀπορία*, vel secundaria. Ac primigenia quidem,
propter humorum qui in vitio sunt, *ἐπεροσμίαν*, i. naturæ varietatem, putredinis inæqualitatem, variam-
que partium obfessorum naturam. Secundaria autem, à causis extrinsecus illabentibus; aut irritato na-
turæ motu, vt à rigore frustra citato qui febrem tritæ ophyam, ex imparibus paroxysmis, in pares dege-
nerare facit.

IDQVE AVTVMNO] Inæquali, qui mutuo caloris & frigoris imperio regitur; & qui cum ab
intemperie calida ac sicca æstatis exactæ exudarit tenuior bilis portio, superstite crassiore, melancholici
humoris dominatu tenetur, cum paupertate caloris natiui, & cruditate quam pariunt *αἱ ὀπίραι*, i. bacca
arborum: quia, vt inquit Hippocrates, sunt *ἐργασμοὶ ἡλιώσις, πτόματα πυκνά, σίλλα ἀκατέστατα, ἀκρόδρυα, οἶνοι*,
i. opera insolata, frequentes potus, cibi inconstantes, arborum bacca, vina fortia.

ABVNDÉ DEGENERANT IN QVARTANAM] Sic enim illud, *ὀπιέντως*, vertendum duxi-
mus, quod significat sufficienter: vt in illo, *ἐν φρεσὶ καὶ οἷσιν ἐν ἀρχῇ, ὁ ὀπιέντως ἔχεται*, &c. Ac si diceret;
autumnus abundat quartanis, non solum *ἐν ἔξῃ* quartanarum incipientibus; sed ex abscessu aliorum
morborum per transitum in quartanam: quia melancholici humoris generatio est per autumnum,
propterea que feracior est quartanarum cæteris anni partibus.

IS POTISSIMUM QVI ANNIS TRIGINTA SVNT GRANDIORES] Quoniam ætate
illa pars est efficiendi causæ, suscipientis commoditas, ad generationem febris quartanæ.

CÆTERVM SVPRADICTI ABSCESSVS ET HYEME MAGIS VENIVNT] Quoniā
frigidiore sunt, crassiores hyberni humores procreandis abscessibus accommodati: quemadmodum
tenuis ad excretionem nati.

SERIVS EXOLVNTVR] Propter humoris contumaciam, ac temporis frigidam tempestatem.
ET MINVS REVERTVNTVR EO VNDE VENERVNT] Quoniam piger est in mouendo
humor temperamento frigidus, qualitate mitis, substantia crassus. Atqui recursus omnis fit per impul-
sum humoris temperamento calidi, substantia tenuis, & qualitate acris.

150 Τοῖσι δὲ πολλάκις ὑποζοπαθεῖσιν, καὶ ἐξ ἀμύλων ὑπεβάλλω-
σιν, ἰσχυρὰ καὶ φθίσις ὀπιενέως γίνεται.

80 Quibus autem crebri sunt eodem & inde relapsus, exacto semestri
labore; coxaria tabes incescit.

ENIM VERO febres continuæ diuturnæ, relapsibus & abscessibus crebræ sunt; illinc, reliquiis
quæ supersunt, vt superesse solent; hinc, noua partis iam afflictæ afflictione. Ergo si abscessus primū
coorti non ea fuerit in omni lege critica perfectio, perfectæque transitio quæ ægrotum febre exoluat;
ex crebro relapsu, crebra fit etiam cacochymia superstitis & succrescentis in eam partem apostasis, quæ
iam lassitudine fracta est arque percoluit. Sed inter articulos principatum obtinet coxa, tum amplitu-
dine loci, tum laxitate, & motus ad progrediendum maiore vi præter cæteros. Quoniam igitur ita com-
parata est coxæ ratio vt facili in eam fiat humoris prolapsus; siquidem cruda morbi sint omnia, eo que
perseuerante, finis decumbendi non inueniatur; ex eo eueniet vt & doloris acerbitate, & difficultate
pepasmī (vnde abscessuum serior exolutio) tum etiam decumbendi assiduitate pars labefactata, suoque,
vt ita dicam, defraudata genio; in labore officij incremento prohibeatur: quæ affectio, particularis ta-

bes dicitur, ut in pupilla; non autem sicut in phthoe, & tabe dorsali. Vide 3. de articulis, & 67. 2. progn. Huc pertinet etiam quod idem scripsit. Τα περὶ κριόμενα, ὡς ὁμῶς κρῖν, ἰσχυροῦται· ὡς δὲ μὴ, ἀσπίδια. ἧμαρ δὲ αὐτῶν ὁλέσιας τὰ μὴ σμικρά. i. Quae ante tempus iudicantur; siquidem cruda adhuc materia, recidiuum faciunt; si autem, crisis defectam. Haec nisi exigua sunt, mortifera existunt.

151 Οὐδὲν αὖ πυρετῶν ὑποσηματώδεα σημεῖα μὴ ἀντιδιδόται· κακώδεα.

Quaecunque dantur in febre abscessuum signa, si ex animo medici non fluunt; prava sunt.

QUÆMADMODUM superiore prognosi indicatoriarum causarum non indicantium tristes exitus demonstrantur: sic de signis hæc statuit; quando eiusmodi non sunt qualia debent videri & apparere, quorum prænumcia esse putantur. Quæ signa videntur critica, si eiusmodi non sunt, metum adferunt sinistri iudicii. Sic & hoc loco.

QUÆCUNQUE DANTUR ABSCESSVVM SIGNA] i. Quæcunque speciem præ se ferunt, & opinionem faciunt excretionis futuræ, aut transitus salutaris; ut faciei rubor, micantium arteriarum spectabiles pulsus, cephalalgia, hypochondrij fugax tensio, hæmorrhagia, pallida & turgidula facies quæ fuerat antè viuia, difficultas spirandi, articulorum labor, hyberna tempestas.

SI EX ANIMO MEDICI NON FLVUNT] Qui nihil mauult quàm ut natura liberetur causis morbificis, ἔξω, εἴσω, ἢ ἀντὶ ὅττι δέῃ, i. intro, vel foras, aut aliò quò decet. Ac si diceret. Si illa quæ fiunt, quæq; apparent, non sint eiusmodi naturæ vi & commodo, sed potius nutu & dominatu morbi; ut nihil boni rependant ipsi naturæ. Id enim significat τὸ ἀντιδιδόται: quemadmodum & συνδυασμένον.

PRAVA SUNT] Per regulam indicatoriorum non indicantium.

152 Τῶν πυρετῶν ὅτι μὴ ἐν ἡμέρησι κρισίμησι, μήτε μὲν σημείων λυπηρίων ἀφίεντες· ὑποζυγιάζουσι.

Quæ febres neque diebus criticis, neque cum salutaribus signis, vale dicunt; postliminio reuertuntur.

PRIOR pars versione & enarratione patefacta fuit 85. Coac. Signa autem λυπηρία vertimus, salutaria; quæ sunt eiusmodi in perpetuo pepasmo, excretionis cuiusq; morbi propria, & critico abscessu omni ratione laudabili, denique in iis quæ iure & loco apparent & fiunt. Ac de salutaribus signis, & prauis nihil intactum reliquimus comment. ad eam prognosin. Quæ prauis cum signis mitescent, aut cum salutaribus nihil concedunt; contumacia sunt. Extat etiam Galeni cōmentarius in hanc prognosin, 3. progn.

153 Τα ὀξεία τῶν νοσημάτων ἐν ἡμέρησι κρίνεται τεσσαρεσκάδεκα.

Acuti morbi intra quatuordecim dies iudicantur.

ΕΤΗΑΣ explicata fuit in illo. Eorum qui ardentè febricitant, decisionem faciunt quatuordecim dies; vel ad interitum, vel ad salutem. Iisdem etiam literis expressa legitur in aphorismis; ubi Galenus doctissimum edidit commentarium.

154 Τετάρτος ἀκελής ἐν πέντε, ἢ ἐν ἑπτά περιόδουσιν· ἢ τὸ μακρότατον, αὖ σίνα κενέται.

Tertiana exacta, quinque aut septem periodis, aut nouem ad summum, iudicatur.

HIVS prognoscos enarratio continetur in commentario Galeni ad 59. aphorismum 4.

155 Οἷον δ' ἐχομένηοισι πύρεσιν, αἷματος σάξεις ἐν ρινῶν, πᾶρμὸς
 ἡμορρῶν, λευκὴν ὑπόσασιν τὸ ἔρον ἰσθ' ἐν τῇ τελευτῇ· λευκὴν ἐν ἐβδόμῃ
 σημαίνει.

10 *Quibusunque februm initiis, ubi sternutatione, sanguinis stillicidia sunt ē naribus; siquidem urina quarto die hypostasim habeat albam; vacationem morbi, septimo fore ostendit.*

OMNE QUIDEM sanguinis stillicidium, ut ceteræ omnes causæ perexiguæ, in malis ducendum, estque omnino *χαλεπὸν*, i. *periculosum*: propterea quod ductu naturæ neque suscipitur, neque perficitur. Qua de re plura sunt à nobis alio loco disputata; maximè verò in illa. *Perexigua stillicidia, sinistra sunt crisis.* Et in illa etiam. *si quis in febre laboriosa cum perhorruerit, nonnihil criticè exudarit, indeque febris acuta exarserit; calamitosum: idque cum aliàs, tum si in hoc negotio sanguis stillarit.* Sed tamen ita comparata est ratio exiguarum causarum, ut si qualitate ipsa materiæ in vitio non sint, accessionem verò habeant pepasmi non solum inchoati, sed iam perfecti; non minus opinione & bonâ spe secundi iudicii nos consolentur, quàm metu sinistri exterreant. Est enim semper fidendum pepasmo.

10 Ergo. QVIBVSCVNQVE] Maximè verò iuuenibus, natura & vitæ instituto biliosis, à 18. ad 35. ætatis annum.

FEBRVM INITIIS] Acutarum scilicet, quarum celerrimi sunt motus, proptereaquæ celerrimas habent mutationes, indeque celerrimas crises. Initiis autem dixit, quia tum natura morbificis causis opprimitur, estque humorum cruditas, unde nulla excretio salutaris. Ac si diceret. Quamvis illud verè sit positum, causas & signa affectatæ crisis statim non debere conspici: tamen in proprio febris pepasmo, qui semper optatus venit omni febris tempore, feliciterque apparet; ut quæ iniqui esse iudicii putantur, ob intempestiuos motus, pepasmi beneficio fiant *ὑγιεινά*, appareantque ad speciem certam futuræ crisis perfectæ.

30 OBORTA STERNUTATIONE] Per concussionem cerebri ad exclusionem rei molestæ: ut nulla cerebri multum oppressi, neque fatiscientis suspicio sit: ut in iis qui februm initiis sunt comatosi. SANGVINIS STILLICIDIA SVNT E NARIBVS] Quæ solent esse formidabilia tempore, paucitate & excernendi modo.

SI QUIDEM VRINA QVARTO DIE HYPOSTASIM HABEAT ALBAM] Quæ celeritatem & securitatem crisis denunciat: quoniam omnino bona est illa hypostasis, tempore, materia, loco.

VACATIONEM MORBI SEPTIMO FORE OSTENDIT] Per liberam & plenam hæmorrhagiam, quam denunciauit stillicidium: sicut hypostasis occasionem illius. Vide comment. ad 92. huius diuini operis.

40 156 Τὰ δὲ ὀξέα κενεῖται αἷματος ἐν ρινῶν ρυένιος ἐν κελύμῳ· καὶ ἰδρωτός πολλὸς ἡμορρῶν· καὶ ἔρξ πύρεσιν, καὶ ὑαλώδεις ἡμορρῶν, ὑπόσασιν χηρὴν ἐξήνθιν, καὶ ἀδερῶν ἡμορρῶν· καὶ δακτύλιαι ἀξιολόγου· καὶ κοιλίης μυζώδεις, καὶ αἱματώδεις, καὶ δξαπίνης κατὰ ῥαγίσσης· καὶ ἐμέτων οὐ μοχθηρῶν καὶ κρίσιν.

At verò morbi acuti indicantur sanguine prorupto ē naribus in tempestina crisi; sudore item multo; atque purulenta urina, & vitrea, laudabili prædita hypostasi; quæ cumulate funditur, tum abscessu etiam commemorabili; necnon mucosa & cruenta alio repente citata; postremo vomitionibus minimè malis in crisi.

60 VT ACVTIORVM morborum non vna est manifestio, nec vna suscipientis & efficientis causæ conditio: ita nec vna crisis idea in qualitate humoris, tempore, loco, & excernendi modo. Ac sanè distinctiones omnium criticarum causarum hæmorrhagiæ, sudoris, vomitionum, deiectionum, abscessuum; iam patefecimus. Quod superest de strinis, & mēstruali profluuii; repetenda illarum causarum explicatio ex 1. & 2. ὁμοίᾳ. Signorum quæ visa sunt optimum maximumque fuit, plurimòsque liberauit à magni periculo, con-

uersio urine in strangariosam. Deinde subiungit. Urina illis erant multa, rubra, puri permixta, dolorifica. Quæ locum enarrans Galenus sic ait. Hæc omnia sunt deponentis corporis redundantiam succorum vitiosorum. Propterea seruati sunt omnes. Illa porro redundantia cum varia esset, merito fuit urinarum varietas: ut omnes omnibus non essent eadem; sed his tales, & tales illis.

157 Ἰπποὶ βαθεῖς, μὴ παραχῶδεις, βεβαῖαν κείσιν σημαῖνοισιν. ὁ παραχῶδεις μὴ ἀλγήμελος σώματος, ἀδέβαιαν.

Somni arctiores nec tumultuosi firmissimam crisin denunciant: contra tumultuosi cum labore coniuncti, incertam nec stabilem.

OMNIVM rerum à medico expectandarum nihil est optabilius bona crisi, quam ipse prævideat, exceperit, & in medendo ad legem criticam examinarit, ex perspicientia signorum prænunciorum, adiunctorum, & consequentium. Sanè in optimam partem cognoscitur medicus, & existimatur iure optimo adeptus bene sapienterque medendi facultatem. Quid plura? Omne tulit punctum quem penes ista vis est, atque norma curandi. Sed explicata sunt alibi signa crisis prænuncia, ad tempestiuam occasionem, & speciem ipsam crisis: Adiuncta sunt etiam patefacta in criticarum excretionum tempore, copia, loco, & excernendi modo. Sequitur ut consequentia propalam explicentur.

Exactæ criseos ad criticæ legis πῶς τέκνονται, omnia quæ in ægrotis naturaliter sunt constituta fidem faciunt bene scilicetque non solum à natura susceptæ, verumetiam perfectæ & absolutæ. Etenim iudiciâ & iudicata suis quæq; locis ὁρίσας, & certam opinionem faciunt restitutæ valetudinis, & metum auferunt futuri relapsus. Sed uti iam dixi; exactæ criseos iuxta legem criticam signa ostendunt, cum alia permulta quæ cernuntur in qualitatē corporis, actionibus, & excrementis; tum verò maximè somnus ipse. De quò ita philosophatur Hippocrates.

SOMNI ARCTIORES] Qui sunt eiusmodi per aliquot dies à crisi, quando necessitati par est dormienti somniarc incedi commoditas in temperie cerebri, materia somnifera, & tranquillitate animi bonarum cogitationum epulis saturati. Sic enim eos qui aliquot dies in vigiliis exegerunt, mitescens morbo, arctior somnus ita complectitur ut penè carotici esse videantur. Quæ causa impulit virum ut illam quæstionem posuerit ad disputandum. Τὸ καρδιὰς ἀρετὴ καὶ παρὰ τοῦ κακῶς; i. Estne sopor ubique malus?

NEC TUMULTUOSI] Quando scilicet homines morbo defuncti lege critica, placidè somnum incunt qui dono diuini gratissimè serpit; eoque alacriter & solvuntur & excutuntur, suauitate & copia materiæ somniferæ quæ dormiendi necessitatem velut nectare quodam cœlesti saturat, ob cerebri bene habiti temperiem, & mentis ipsius tranquillitatem. Ex quibus efficitur, ut phreniticorum memorata insomnia boni sint ominis. Nam phrenitici memorando somnia in somnis tranquilla; certam opinionem adferunt victricis naturæ, deuictique morbi.

FIRMISSIMAM CRISIN OSTENDUNT] i. Fœliciter à natura susceptam atque perfectam, inoffenso cursu signorum & criticarum causarum: vnde nec vllæ supersunt morborum reliquæ, nec ipse relapsus in metu est.

CONTRA TUMULTUOSI] i. Turbulenti, percussa mente, delirioque proxima. Est enim βεβαῖα absolutè dicta, cerebri alteratio, quæ in propinquo delirium esse denunciat: ob eam sanè causam quod malè affecto cerebro anathymialis tetra vim adferat.

CUM LABORE CONIUNCTI] Qui loco alacritatis, lassitudinem & gravitatem adferunt; tum propter paucitatem & impuritatem spiritus animalis, nectarisque in corde viuifici, & morbifici humoris cruditatem.

INCERTAM NEC STABILEM] Sic enim bona quæ sunt immerito naturæ; & mala, merito ipsius, vocat ἀδέβαιαν, i. incerta, vel ad salutem, vel ad exitum.

158 Εβδομαίοισιν, ἢ ἐνναταίοισιν, ἢ τεσσαρεσκαίδεκαταίοισι. ῥύσιες ἐκ ῥινῶν λυοῖσιν ὡς Ἰππιοπολὺ ἐστὶν πυρετοῖς. Ομοίως δὲ καὶ κοιλίης ῥύσις χολώδης καὶ δυσεντερειώδης, καὶ πόνος γυνάτων, ἢ ἰσχίων, καὶ ἔρον πεπαρδέν πρὸς πῶς κείσιν. Εὐ γυναικὶ δὲ καὶ Ἰππυμυῶν ῥύσις.

Septimum diem, morbi agentibus, aut nonum, aut decimum-quartum, sanguinis profluvia è naribus ut plurimum tollunt febres. Similiter etiam alius biliosa liberaliter ducta, aut dysenterica. Quinetiam

HÆC PROGNOISIS antichesi continet illius iam explicata. Quæ febres neque diebus criticis, neque cum signis salutaribus vale dicunt; postliminio reuertuntur. Explicatio autem petenda ex 1. & 3. 6^{to}. tum ex prognosibus superscriptis.

*Quicumque in febribus undecunque sanguinem profuderunt, cum
refectioni studere incœperint; ijs alui profusiores redduntur.*

Ex quo efficitur vt **Q V I C V N Q V E**] Omnis ætatis & sexus.

UNDECUNQUE SANGVINEM PROFUDERVNT] Vel narium hæmorrhagia, vel menstruali profusio, vel repetita sæpius detractio sanguinis incisa vena brachij aut malleoli.

IIIS ALVI PROFUSIORES REDDUNTUR] Quoniam illæ sunt effictæ & languent pau-
peritate caloris natiui, ex magna hæmorrhagia, unde multum laborant vel etiam fatiscunt in officio
mitificandi cibos, sanguinem procreandi, & distribuendi. Huc accedit quod illæ diuturna officij vaca-
tione factæ sunt ignauiores, nec desiderio ipsius naturæ ciborum avidissimæ respondere possunt: quia
omnis mutatio quæ ab ocio ad negotium suscipitur, nunquam bene perficitur: eaque omnino graui-
sima esse solet. Illud autem, *καταρρεσσει*, profusiores aluos significat, quæ crudis excrementis feruntur:
non sicut *σπυρρεσσει*, aphor. 20. 2. quod simplicem alui libertatem ostendit. Sed vt 4. aphor. & in pro-
phetico, *καταρρεσσει*.

*Quibus in febris, cum sudatiuncula caput dolet; iis suppressa al-
nus convulsionem denunciat.*

QVIBVS CVN QVE] ΠΛΗΘΕΣΙΝ ΑΙΤΙΟΙΣ, i. repletionis causis à spiritu & diata multum afflictis, multumque oppressis.

IN FEBRIBVS] i. Febrium initiis, quo tempore oppressionis summa sunt omnia.

CVM SVDATIVNCVLA] Capitis indigena, per expressionem ab oppressione: quia, ubi sudor, ibi morbus.

CAPVT DOLET] Intemperie scilicet atque solutione continui, à repletæ illius partis cacochymia maligna, vel illic collecta, vel eò translata, nec inde facilem exitum habente.

IIS SVPPRESSA ALVVS] Ex cuius suppressione repletum iam caput maioris atque perennis repletionis incrementum habet.

CONVULSIONEM DENVNCIAT] Non quidem necessariò, nec semper: sed ex euentu atque nonnunquam. De convulsione autem natura & causis infra dicitur.

161 Αἰ ἐπ' ὀλίγον δρασεῖαι θρακρούσεις, θηρώδεις· καὶ σπασμὸν δὴ θεωρημαῖνοισι.

Deliria paulisper ferocia, mox erunt immania: sed enim convulsionem prænunciant.

EXPLICATIO ex commentariis nostris ad 39. & ex Galeno ad 25. prorrh. f. i. i.

162 Σπασμὸς ἐν πυρετῷ γενόμενος, καὶ παύομενος αὐθήμερον, ἀγαθόν.

Quæ in febrem cadit convulsio, si eodem die quiescat: bene est.

ANTIETHESIN habes in illo. Convulsio in febre lethalis.

163 Σπασμὸς ἐν πυρετῷ χρόνιος παύει τὸ πυρετὸν, αὐθήμερον, ἢ τῇ ὑστεραίῃ, ἢ τῇ τρίτῃ· ὑπεράλλων δὲ τὴν ὥρην ἐν ἣ ἤρξατο, καὶ μὴ παύομενος· κακόν.

Febris convulsio vacationem adfert, quæ aut eodem febris die, aut postridie, aut ad summum perendie incidit. Sin eam qua cæpit horam excefferit, neque quieverit: male est.

NEMO EST omnium cui mirum videri non debeat, convulsioni locum esse sanationis, cum ea deiectæ naturæ symptoma existat, quando morbificæ causæ imperio regitur, eaque sæuiente quiescit, vnde cunque ipsa convulsio venisse putetur. Quæ causa est cur etiam in puerilis periculi plena sit: quamvis in iis naturam sequatur suscipientis causæ. Diximus convulsionem, iniustum esse earum partium motum, quæ naturaliter iussu nostro mouentur, eumque motum ἀναγκαστικόν, i. iniustum fieri sua sponte nobis inuitis. Sed id locum habet in primigenia convulsione, in qua scilicet partes quæ conuelluntur, convulsione causam intra se continent: repletionem scilicet, aut nimiam siccitatem, cum exaruerint, ac si incendio conflagrassent. Existit enim convulsio altera, quæ fit ex euentu, cum in opposito situ earundem partium, muscoli sunt congeneres magnitudine, robore, & numero æquales. Ibi sanè vnius loci resolutio, convulsionem facit alterius: quemadmodum cernitur in oris tortura. Ne longum faciam, hinc primigenia καὶ τὴν ἰδιοπαθῆσαν partium convulsarum proponitur; vtrum eò fiat, quò fieri posse narrat Hippocrates. Sanè huius duplex omnino causa est, quarum vnā tantum agnoscimus. Nam ex convulsione siccitatis nihil boni sperabile, sed contrā desperatio salutis ostenditur: quemadmodum in aphorismis & epidemiis testatum reliquit, & in chirurgicis libris.

Ergo. FEBRIS CONVULSIO VACATIONEM ADFERT] Convulsio, inquam, à repletionē nata convulsarum partium, vacationem febris adfert per absolutum transitum intus foras, à venis ad musculosum genus; non ad panniculum carnosum, & cutim; vnde rigor: non etiam ad nervos cernicales, dorsales, aut lumbares; vnde tremor, & inde delirium.

QUÆ AVT EODEM FEBRIS DIE, AVT POSTRIDIE, AVT AD SUMMUM, PERENDIE INCIDIT] Ac si diceret. Si nulla sit opinio siccitatis, vt nulla tum esse potest; et si orgasmus fiat intus foras, vt fieri solet incunte morbo, non autem cum iam processerit.

SIN EAM QVA CŒPIT, HORAM EXEGERIT, NEQVE QUIEVERIT] Quasi velit. Quamvis naturæ virtute suscepta fuerit atque perfecta, convulsificæ causæ intus foras effluxu in musculosum genus, nec subito exitu; si eam, qua cæpit, horam exegerit, in summa contentione partium, & impedimento

& impedimento actionum ad vitam tuendam necessariarum, vt respirationis, neque quicquid, festi-
tuta partium conuulsarum libertate, per sudorem, hæmorrhagiam, aut copiosam sanguinis detractio-
nem: vt in illo. *Hæmorrhagia vi suppressa conuulsionem facit, phlebotomia exoluit.*
— **MALE EST** Causa conuulsificæ maligna cacochymia, doloris acerbitate, & officij ad vitam tu-
endam necessarij longa nimis interceptione.

164 Οἱ διαλίποντες, ἀνώμαλως δὲ χλιαρόμυροι, κοιλίης ἐμφυσώ-
10 μύης, μικρὰ διαδιδούσης, ὀσφυαλγήσας· μὲν κρίσιν· Τυτέοις κοιλία
κατὰ ῥήγνυται.

*Quibus cum febris remissione inaequaliter incalescentibus, aluo in-
flata, modicè ducta, lumbi doluerint; idque post crisin; ijs alui pro-
fusus feruntur.*

RELIIQVIARVM materia febrilis commotio variè quiescens, & variè instaurata, nec tamen
20 delata in habitum corporis, vbi rigorem fecisset; suo veluti expiratu, ardoris in febris remissione non-
nulli, *χλαρὸν* sensum modò suscitatur, quem mox restingui finet. Fieri potest vt abscedat tandem in in-
testina, diarrhœamque committat; ab exiguo secessu tenuis humoris qui eò primùm illabitur; copio-
sioris eius vacuationis exordio priùs ducto; tantisper dum alui copia, qua oppletur, exonerata sub-
sidit. Antè namque cum cruditas esset, tumida cum borborygmo distendebatur, dolorémque disten-
sione creabat lumbis, quorum neruis, originem mesocoli ascripsit sectio tertia sexti Epidemion.

165 Οἱ δὲ περικαλῆες, πρὸς χεῖρα κωδοὶ, διψώδεις, ἀσώδεις, κοι-
30 λίης ἀπειλημένης βαρυόμυροι· ἐκλύονται· ἐστὶ δὲ ὅτε καὶ τὰ Ἰξέρυδρα ἐν
ποσὶ καὶ ἀγκυμάδια, τὰ αὐτὰ σημαίνῃ.

*Contrà qui incendio conflaquant, ad medici manum torpidi, sitibun-
di, fastidiosi, aluo suppressa oppressi; exoluntur. Fieri potest vt pedum
cum rubore ardor, idem denunciet.*

ADVERSAM hæc superiori habet alui suppressionem absolutam: vbi non sicut antè, febrilis
40 humor humescit: sed biliosus retortidus, multus, stomachum vapore feriens resoluit; cum stomacho
vires: quòd inde cor & cerebrum, validissima duo viscera, affici sit necesse. Itaque in viscerum æstu, &
oppressionem ab humorum copia suppressorum; vt iacentur; vix tamen animum, aut satis animi ha-
beat exhibendi manum poscenti medico: donec animo sæpe deficiunt, quòd signum est inter funesta
insigne. Hæc eadem sæpe facit sanguinis tenuissimi feruor, è vena dorsali ad stomachum refluens.
Feruorem autem testantur erysipelata, non tantùm in pedibus, quod ait; sed quacunque parte corpo-
ris, cum febre exorta.

166 Οἱ χλαρὲνοὶ τέταρτοι πυρετοὶ, ὁππενέως μεδίσανται ἐς τὰς ὀ-
10 ξείας νόσους.

Hyberna febres quartana, nonnunquam in acutàs transeunt.

QUI TRANSITVS si non lethalis, est petienli plenissimus; intermittentis febris in continuam;
eius quæ foras mouetur, in eam quæ intus. Quid verbis opus est? morbi *ῥάσος*, *πραότατος*, *εὐφορότατος*, *ε. Epid.*
ἀσπράγιστος, i. facillimi, mansuetissimi, mitissimi, tutissimi; in difficillimum, maleficentissimum, asper- *lib. πτελ*
rimum, periculosissimum: cuius sunt symptomata singula, totidem morbi. Mutationem hanc asci- *lib. πτελ*
scit, non tam æstas, morborum intermittantium procreatrix eadem & vincendo expultrix, humo- *πτελ.*
rum foras citato motu, dissipata materia; propterea quæ cum reliquis, tum quartanas breuiores fa- *iterum lib.*
ciens: quàm hyems, quæ continentes magis morbos solet excitare, dum frigus suum opponit humo- *πτελ. πτελ.*
rum excurfui; quos, quantum potest, condit in viscera & intima penetralia corporis. Eò autem sese
continuarum febrim materia recipit, lineam mouendi tenens à circumferentia ad centrum, contra-
riam intermittentium prædictæ.

2. ad Glau-
conem

Id certè non ira proclive est vt fiat. Neque enim natura in contrarias motiones, sine violentia, agitur. Contingit tamen, quod ipsi post Galenum vidimus; qui medicamentorum præterea purgantium acriori & intempestivo vsu, ex simplicibus quartanis duplices, triplicésque; ex triplicibus continuas oriri dixit. Arque iccirco prædictionis acerbiter sapientiz verbo mitificauit philosophorum sapientissimus, *Memius*.

PRIMI LIBRI

FINIS.

COACARVM



COACARVM HIPPOCRATIS

MAGNI PROGNΩSEΩN

LIBER SECVNDVS.

INTERPRETE ET ENAR-

ratore LVDOVICO DYRETO.

DE CEPHALALGIA.

ΕΦΑΛΗΣ πόνος σιῦτονος μετ' ὀξείας πυρέτης, καὶ CAP. I.
 ἄλλου σημείου τῆς δυσκόλων· θανάσιμον. ἀνδρὶ δὲ σημεῖον
 φαύλου ὑπερβάλλον τὰς εἴκοσιν ἡμέρας· αἱμαλὸς ῥύσιν, ἢ
 πύον ἐκ ῥινός, ἢ δόψασίας ἐς τὰ κάτω σημαίνει· μάστιγα
 μὲν νεώτεροις τῆς τελευτῆς πέντε, τὰς ῥύσιας. τοῖσι δὲ πρεσβυτέροις, τὰς
 δόψασίας, πρὸς δέχεσθαι· πρὸς μέτωπον, καὶ κροτάφοις ὄντος τῆς πόνου καὶ
 σιῦτονου, ῥύσιας.

melius
curatur

1 Capitis dolor prægrandis cum acuta febre, aliòve quopiam difficili
 signo coniunctus; mortiferus. Sin autem omni alio malo signo procul,
 dies viginti exceßerit; sanguinis profluvium, aut suppuratum è nari-
 bus, aut partium imarum abscessus denunciat. Maxime verò trigin-
 ta quinque annis minoribus; profluvia sanguinis: prouectioribus
 20 autem, abscessus expectare oportet. Ac certè profluvia omnino spe-
 rabilia sunt in frontis & temporum dolore prægrandi.

SEQUITVR VT patefactis & veluti in conspectum quendam adductis magnarum affectionum,
 earumque quæ inter ipsas excellunt symptomatis (quæ ὑπερῆχόμενα Græci vocant) deinceps in hoc se-
 cundo libro singularum partium laborantium decisiones exequamur; orsi à capite: sub quo nomine
 partem illam significamus quæ capillo tegitur, & cuius caluariæ adiacet; superiori quidem, pericra-
 nium; inferiori verò dura meninx. Quæ fabricatio descripta legitur apud Hippocratem lib. de pertu-
 sionibus capitis, διπλοὺς δὲ ἐστὶ τὸ ὅσπερ καὶ μέτωπον κεφαλῆς, i. duplex autem est os caput, &c.

30 Earum capitis humani partium, vel intemperies, vel continuitatis laceratio, vnde cunque venerit,
 scensionem facit rei molestæ, i. dolorem qui partis afflictæ nomen sibi adoptat, & κεφαλαλγία dicitur:
 quæ, ut iam diximus, capitis propria est; sicut delirium cerebri. Erit igitur cutis capillatæ, & pilo ca-
 rentis, cephalalgia. Erit etiam pericranij, caluariæ, diploes siue diploidis; intensa, remissa, grauis, acuta;
 omniumque tenuissima duræ meningis.

CAPITIS DOLOR INGENS ET FIXVS] Sic enim πόνον σιῦτονον rectè videor interpretari,
 quem in prognostico ad eundem scopum his verbis expressit. Κεφαλῆς ὀδυνῶν ἰσχυρὰν τε καὶ ξυνεχῆς: ut πόνος
 idem sit quod ὀδυνή: σιῦτονος verò idem quod ἰσχυρὴ καὶ συνεχῆς, i. prægrandis & intermissionis expers. Sit igitur
 capitis dolor intensus, hoc est, intemperiei & solutæ continuitatis fortiter impressæ permolesta & acer-
 ba perceptio, fixaque firmiter, quæ nullā admittit sympathiæ excusationem, neque perturbationis criti-
 cæ quæ fugax esse solet; sed indigenam generationem agnoscit, vel symptomaticum transitum, vel per-

cannem progressum sanguinis bile perfusi, qui exitum inde non habens, pondere, laceratione, & stimulis caput multum affligit. Quæ causa est quamobrem consideratè, non simpliciter, πονος scripserit, sed philosophicè εὐπινονος, ex perspicientia causæ morbificæ & partis obfessæ: ut sanè, hoc loco, cephalalgia fixa, tanquam morbi fixi, διέγνωσις, indeque ἀνέγνωσις ad explicandum proponatur. Simplex autem πονος sæpenumero venit per sympathiam, quæ tensionem facit in partibus quæ laborant: nunquam verò grauitas, quæ ubi est, ibi etiam eius causa existit, per collectionem sanguinis, vel affluxum. Sic enim præclare Galenus ad eum locum Hippocratis de pleuritide, ubi mammarum & brachij grauitatem examinat ad liberalem sanguinis detractionem. Ergo, capitis dolor ingens & contumax, quem facit indigena causa multa & acris, vel aliunde apportata, translatione vel progressu temperamentum & complexionem multum & celeriter alterando, continuitatem lacerando; idque cum aliarum partium, tum maxime duræ meningis.

CUM ACUTA FEBRE] Tum primigenia, quæ statim initio comitem habet cephalalgiam, cuius est, potissimum sequi efficientis causæ naturam, i. symptomaticam translationem & orgasmum sanguinis bile perfusi: tum etiam cephalalgiaë consecutaria: ut sæpenumero esse solet inflammata cerebri febris ardens.

ALIOVE QVOPIAM SINISTRO SIGNO] Sinistrum, hoc loco, signum, quod vocat δύσκολον, symptomaticis terrificam vim περιωπτερον exprimit. Est enim τὸ δύσκολον leue malum. Hic autem grauissimum obiicitur, cuiusmodi est περιωπτερον torius capitis, æruginosæ bilis crebra & pauca vomitio, ceruicis dolor, amblyopia, echo, delirium quoque ipsum: vnde cita mors venit. Quæ omnia luculenter sunt explicata distinct. 3. 2. de morbis, & comment. 2. 1. Epidem. Quamobrem illud, δύσκολον, eodem spectare videtur quò scriptum prognostici, Ἡ μὲν πρὸ περιωπτερον σημεῖον περιωπτερον, i. si lethalius quodpiam signorum adfuerit.

MORTIFERVS] Nec solum mortiferus; sed etiam nonnullis citra morte funestus. Sic enim, *ἡ δὲ ἀργὴ ἰσθμὸς ἐμείλει, καὶ ἐνίσταται τοῦ θανάτου πύλην*, i. Sed et æruginosa vomunt, quorum nonnulli celerim moriuntur. Quem locum enarrans Galenus ita scripsit. *Æruginosa vomitio, perusta bilis flauæ irritamentum fit; indeque propterea nonnulli citò moriuntur, quòd exaruerint partes in quibus ipsa bilis phreniifera lauitur.* Unde contingit agros conuelli, vnâque bilem æruginosam vomere, indeque celerius medicorum opinione mori. Sed tamen in hac symptomatum miseria existunt nonnulli qui validarum virium beneficio in biduum, triduum, aut etiam quintiduum vitam producant. Tamen si idem refert, cum æruginosa vomuerint, septimum morbi diem agentes mori. Tam citæ mortis causâ est doloris acerbitas quæ facit corpus infirmum, quæque ad infirmitatem adiungit humorum corruptionem; crebra malorum successio, & symptomatum vehementia; tum cerebri alienatio, per quam interceptio fit actionum ad vitam tuendam necessariarum.

7. Epidem. SIN AVTEM OMNIALIO PRAVO SIGNO PROCVLJI. Omnis alieni mali expert, quod vel confectionarium sit in labore partium officialium, vel superuenerit malorum accessione: sed tantum in alteratione consistat indigena, sine affluxus perennitate quæ cernitur in rubris vrinis, iumentorum similibus, perturbatis in genere venoso humoribus à flatulento spiritu cum ardore febrili, vnde cõuulsifica vis incidit, vt in Polyphanto Abderita, cui cùm in prægrandi cephalalgia & febre acuta decimum diem agenti, sternutamentis medicatum fuisset, oborto cervicis dolore acerrimo, fecit vrinæ iumentorum similes, nec inde fuit apud se, crebèrque sæuis conuulsionibus interiit. Huc accedit etiam vt nihil, malè instituta curatione, in comoda eorum peccetur: vt sternutamentis, nec iure, nec loco præscriptis, peccatum est in Polyphantum.

DIES VIGINTI EXCESSERIT] Neque plena manu hæmorrhagia proruperit quæ dolorem sedauerit, morbumque depulerit; neque doloris acerbitas hominem ad exitum præcipitarit, neque industria medici confectionem attulerit sanitatis ante vigesimum diem; sanguinem detrahendo incisa vena basilica, ad febrem, cephalica & recta frontis ad amotionem causâ coniunctâ, tum etiam nonando, purgando, cum abstinencia vini. Ipse autem cephalalgicus acerbissimam vim cephalalgiaæ ad vigesimum diem pertulerit, quo tempore minora fieri incipiunt omnia celeritatis, vehemèntiæ, & assiduitatis.

SANGVINIS PROFLUVIVM] Quod tamen illis diebus non est sperabile, cum exacta fuerit historia morbi acuti, quæ diebus absolutur quatuordecim; sed potius in prima periodo intra septimum diem debeat expectari, ut in hepatica phlegmone: quemadmodum hîc quoque legendum & observandum præcepit Galenus, comment. in hanc prognosin quæ scripta legitur, quanquam nō iisdem omnino verbis, 3. prognost. Quanquam hic quoque dies in acuto morbo locum sanguinis profluvio dare possit, per educationem materiæ mitigata, quam, dum esset immixta, natura obtinere non potuit.

AVT SUPPURATVM E NARIBVS] Quoniam humor qui fecit intensam cephalalgiam, nisi per hæmorrhagiam inde ubi stabulatur exitum habeat, aut per διαφύρην exudarit; quod reliquum est, in suppuratum aut corruptionem conuertitur. Nam scirrhī nulla suspicio esse potest. Itaque dominata caloris nativi victa cephalalgix materia; primū quidem fit suppuratum in suppurabilis materix foco conceptum, mox expuratum: quale cernitur in expurgatione purulenti pulmonis: quale in pleuritico empyemate: quale etiam rupta vomica hypochondrii, introrsum, vel foras. Ex quo efficitur verum illud esse quod in prognostico de hypochondriaca phlegmone Hippocrates καθευκός enuncianit.

AVT PARTIUM IMARVM ABSCESSVS DENVNCIAT] Enimvero partium imarum abscessus lib. 2. *ἐν τῶν* & in aphorismis, super hac re nusquam leguntur. Hic enim coepta curationis fiduciam in haemorrhagia, vel expurato stare scripsit. Dolenti caput & circumdolenti, *ἐν τοῦ* pus vel aqua vel sanguis fluens e naribus, aure vel ore, leuacionem adfert. aphor. 10. 6. Atque idem 2. *ἐν*

perniciosa cephalalgiam sedari posse tradidit hæmorrhagia, vel expurato. *Septimum diem agens interit cephalagicus; quem si evaserit, eadem pœna manet aut nonum aut undecimum. At sanguine prorupto è naribus; ὑπερφυσία; ῥεῖ δὲ καὶ ὑπερχολοῖ ὕδωρ, ἐκπύεται τὸ χεῖρον πύον γίνεται ἑκαπύρ, i. effugit: fluit autem subbiliosa aqua, inde labentibus diebus, concoctum pus, &c.* In prognostico autem eam defungendi morbo, quæ per abscessum fit, rationem non prætermisit: qualem in Herophonte observavit: qualem etiam in virgine Abderitana, cui à surditate superstes remansit pedum dolor, cætera perfectè convaluit, morboque defuncta est qui antè lethalis videbatur. Ac de ratione abscessuum, multa primo libro iam scripsimus ad decisionem morborum diuturnorum qui ita iudicantur.

AC PROFLUVIA QUIDEM POTISSIMUM MINORIBVS TRIGINTA QVINQUE ANNIS] Quoniam hæmorrhagiæ, omniumque adeo excretionum laus est per inquentutem & pubertatem, in quibus ætatibus tria illa sunt in promptu quæ ad ciendam excretionem sunt necessaria, naturæ virtus, meatuum libertas, & materiæ præparatio. Ac de profluvio quidem sanguinis illud iam ratum est; quò natura & humor cursum inflectunt, eò potissimum crisen inclinationes fieri. Scitum est illud etiam, tabem illis ætatibus maximè familiarem esse, quæ describuntur à 18. ad 35.

MAIORIBVS AVTEM ABSCESSVS] Ita comparata est ratio abscessuum criticorum, ut primum opinionem faciant sui in morbis qui salvis ægri rebus producti sunt ad vigesimum vsque diem, & ultra. *si vigesimum diem morbus excesserit; tum expectandus abscessus 17.3. progn. quamquam 33. eiusdem docet iis qui triginta annos prætergressi fuerint, rarò in abscessus febres desinere. Quæ causa est cur idem præceptor consideratè sic prognosin instruerit, 16.3. Expectandum magis est iunioribus annis 35. sanguinis profluvium; suppuratum senioribus.*

AC SANE PROFLUVIA OMNINO SPERABILIA SVNT IN FRONTIS ET TEMPORVM DOLORE PRÆGRANDI] Dolor intolerabilis circa tempora, suspicionem auget hæmorrhagiæ futuræ, quæ si sua sponte non venit, primam curationem habet qua sanguis mittatur. Intolerabilis est autem frontis & temporum dolor in cephalagiæ causa iam explicata, quòd eorum partium crassissime sint venæ, ac cerebrum illic iaceat vberius quàm parte postica. Quò fit ut cephalagiæ omnis acutæ fugacis & fixæ sensio primum sit in temporibus & fronte: quoniam cephalagica causæ impetus non antè quiescit, quàm ad extremas venarum oras pervenerit: necdum feritas eius domatur, donec oscula venarum recluserit, exitumque habuerit. Ex quibus efficitur verum illud esse quòd antè posuimus; omnem vacuationis necessitatem vacuandi modum habere ex humoris motu, naturæ impulsu, & partium obsessarum conditione & situ.

2 Οἷσι κεφαλαλγία, καὶ ἥχοι ἀπυρέτοι, καὶ σκοτεινία, καὶ φωνῆς βραδύτης, καὶ νάρκη χερῶν· ἢ δόσπληντοις, ἢ ὀπληπτικοῖς πρὸς δέχου τύτοις ἔσεσθαι, ἢ καὶ ὀπλησμονας.

40 Quibus cephalalgia & echus varietas sine febre, unaque vertigo tenebricosa incidit, & tarditas vocis, & manuum stupor; hos vel apoplecticos, vel epilepticos, vel etiam lethargicos, fore expecta.

CEPHALALGIA symptomatica explicatur indigenæ cerebri causæ.

QVIBVS CEPHALALGIA ET ECHVS VARIETAS] Si crebra cephalagiæ mutatio sit, modò antica parte capitis, modò postica, dextra item atque sinistra; eaque mutatio crebra cephalagiæ, variis distincta sedibus percipitur in variaensione molestæ rei impressæ: sicut & echus varietas in tinnitu, murmure, sibilo, & bombo: ut flatuum est crassitudo aut tenuitas, meatuum amplitudo vel angustia, facultatis expultricis robur vel imbecillitas. Quibus igitur ea est cephalagiæ & echus varietas, per sympathiam cerebri flatibus à cruditate crebri, necnon ab indigena causa multum afflicti, multumque oppressi.

SINE FEBRE] Ut nulla sit excusatio sympathiæ febrilis, unde febrium initis, convulsionibus crebro tentantur; ut Thasiana mulier vultuosa: nec verò vlla suspicio sit neque opinio febrilis ardoris in cerebro ipso, tanquam in foco, concepti, qui faciat echus & amblyopiæ assiduitatem cum narium gravitate coniunctam. Hic enim ecstasis melancholica denūciatur. Ergo sine febre sint hæc symptomata repleti cerebri & in officio laborantis consecraria, nec aliunde propagata: ut propagantur sæpe ab alio biliosa, & purgatione sursum instaurata curantur. Ac cerebrum in vitio sit, repletionem, crudorem, maligna cacochymia; ex tempestate austrina, pluviiosa, flatu sonoro placida; vel ex crapula, otio, & edacitate nata.

VNAQUE VERTIGO TENEBRICOVA INCIDIT] In qua falsò creditur circumagi caput, unaque caligant oculi; quòd facit turbulenta spiritus in capite commotio à flatulento spiritu & crasso humore: proptereaque prænuncia esse solet apoplexiæ, vel epilepsiæ, proximèque ab illis abest: quemadmodum de ἰσχυρῶ scriptum Galenus, qui reuera nihil aliud est quàm ἡ σκοτεινία.

ET VOX PVSILLA] Per propagationem à cerebro & neruorum principio in ceruicalem medullam, vnde imbecillitas τῆς ἀκροῦς, i. efflationis: propter infirmitatem musculorum intercostalium in quibus facultas animalis non lucet, spiritus interceptione.

MANVVM STYFOR] Oppilatione neruorum ceruicalium inchoata, ob quam efficitur vt spiritus animalis non perueniat liberè tota substantia ad eam partem à qua suscipitur actio.

HOS VEL APOPIECTICOS] Omni, vt ita dicam, animalitate captos; quod cernitur; motus & sensus repentina priuatione, cum spiritus animalis exitu prohibetur. Inde enim est vniuersalis exolutio, quæ apoplexia dicitur. Huc pertinet autem quod idem scripsit. Quibuscunque bene habentibus capitis dolores repente insurgunt, mox capiuntur voce, & stertunt; intra septimum diem moriuntur; nisi fortè febris superueniat.

VEL EPILEPTICOS] Oppresso cerebro in concussione ad excussione; vnde conuulsio vniuersi corporis per contractionem τῆς περικύτων, i. propagatum.

VEL LETHARGICOS FORE EXPECTA] Ac si diceret, aut κνηστικὰ καὶ αἰσθητικὰ δυνάμεις, i. motrices, sentientesque facultates labefactantur; aut etiam ἡγεμονικὰ, i. principes, vt in lethargo. Nam læsionis species affectionem ipsam cuiusmodi sit, denunciat: hoc est crudorem & sphacelissimum cerebri cum pituitæ corruptione coniunctum, vnde lethargus: de quo iam diximus priore libro.

3 Οἱ κεφαλαλγίες κατὰ πως ὁρακρῶντες, κοιλίης ἀποληψείσης, ὄμμα δρασίωδέντες, ἀνδρῶν ὁπιοδονώδεις γίνονται.

Si cui in cephalalgia firmiter fixa, parique delirio, substiterit aluus, vnâque voluantur ferociter oculi cum faciei saturato rubore; opisthonicus tandem fit.

EORVM QVI sursum ad caput feruntur humorum, calidi quidem acres ac tenues, deliria & hæmorrhagiam cient: frigidi verò & crassi, comata & paratidas, aliâque symptomata faciunt cataphorica; amborum autem communis est cephalalgia, vti & surditas: sed illa potius calidorum, hæc frigidorum. De catocha autem quæ propria est cerebri, illud sit certum quod Philippus & Archigenes memoriz prodiderunt, eam in tensione quam siccitas fecit, consistere: quemadmodum omne symptoma cataphoricum, in exolutione virtutis nerualis à nimio humore nata. Nam oculi catochorum aperti cernuntur atque immobiles: cuiusmodi esse solent eorum qui magna contentione aliquid intuentur. At comatoforum oculi sunt planè grauati, nec potis est ipsos continere apertos & palpebris explicatos. Quæ cum ita sint, planè efficitur, commemoratam in hac prognosi catochen, non posse completi suo nomine quæ passim de illa verè narrantur, si & cephalalgiam putetur habere coniunctam, & vim eximiam delirandi, & oculorum citam atque ferocem huc illuc volubilitatem: vt interim taceam faciem rutilam, & opisthoroni consecutionem. Enimvero catochi omnes stupent attoniti, eodémque statu manent quo deprehensi fuerint ac si obriguissent. Itaque non video quâ fieri possit vt in iis prædicta symptomata videantur. Sed in hac summa difficultate, & multum ancipiti consilij capiundi deliberatione, caliginem depulit ex oculis meis quod scripsit Galenus his verbis, aliorum opinione adducta, non sua. ὅτι κατὰ πως φασὶν ὅτι βέλαιος ἰδρυμένα, καὶ ὅτι κατὰ χρόμια νοσήματα, i. Catocha vocant morbos firmiter fixos. Quæ auctoritate fretus, ita vertendum & enarrandum putauit.

SI CUI IN CEPHALALGIA FIRMITER FIXA] Quæ non aliunde quàm agro referente, innotescit. Nam cætera morborum symptomata quæ vitio actionum versantur, ipsi medico aspectabilia sunt. Cephalalgiam autem firmiter fixam expressi, quòd illud κατὰ πως æquè sit aduerbium τῶν κεφαλαλγίες, atque τῶν ὁρακρῶντες.

prorrh. 3. 2.

prorrh. 3. 2. & 3. 2. Coac.

PARIQUE DELIRIO] Defendit Galenus delirium & catochen non esse αὐτάρκεια: id autem probat ex illo prorrhethici. Αἱ ἐρμώδεις, ἡλαφρώδεις, ἀσπαφώδεις ὁρακρῶντες. παύσσειν, i. Deliria cum tremore & palpo coniuncta, phrenitica. Quam ego prorrhethin veram admitto: sed in ea catochen non agnosco. Pari autem delirio exerceri τῶν ὁρακρῶντες consideratè scripsi, respiciendo ad illud κατὰ πως quod adiacet ipsi delirio: quemadmodum & cephalalgia.

SUBSTITERIT ALVVS] Vnde caput augetur cephalalgia causis, ipsa quæ cephalalgia petior sit atque acerbior: quoniam ad præparationem susipientis causæ accedit vis efficientis: non tamen alui suppressio, quam in prorrhethico nominat κοιλίης ἀποληψείσης; hic verò ἀποληψείσης, cephalalgia signum est: sed velut auctarium.

VNAQUE VOLVANTVR FEROCITER OCULI] Quoniam primus omnium trahitur in sympathiam cerebri malè affecti, ipsam quæ affectionem cuiusmodi sit, primus aperit; siue ea sit cataphorica; siue phrenitica. Itaque in suspitione delirij ab hypochondriorum pulsu, considerandos attentè oculos præcepit noster præceptor. Nam vt idem ait, Ἐν αἷς ὅψις πικρὰ κινεῖται. ὧν τις μαλῶναι ἔστιν, i. Si oculi cerebro moueantur, spes est furoris.

CVM FACIE RUTILA] Saturato rubore perfusa, & vultuosa: quæ signum est plethoræ cephalicæ æstuantis.

OPISTHOTONICVS TANDEM EVADIT] i. Cervicis convulsione, scapulas versus tenetur: sicut deliria omnia cum sopore coniuncta sunt convulsifica, ob tumultuosam in cerebro humoris crudi commotionem, quam ciet phreniticus ardor. Opisthotonici autem fiunt, nisi hæmorrhagia liberali, parotidibus, aut alui profluuiio ab opisthotono vindicentur: proptereaque dubitanter legendum, hoc modo. *Δεξι γὰρ ὀπισθοτονιάδες γίνονται; Ἀπὸ τοῦ ὀπισθοτονικοῦ fiunt?*

89. Coac.
proth. 18;

4 Τὰ ὑποσεῖοντα κεφαλὴν, ὄμματα ἔξερυσθαι, παρακρῖνοντα σιφῶς ὀλέθρια. & σίωνα ποθνήσκει τῆτο (ὡς αἰμορροεῖ) ἢ παρ' οὓς οἵδημα ποιεῖ. *malè esse
μαρτυρ.*

hæc decetant
& malè ὁσά
legebantur

Percussum caput, prærubri oculi, deliria clara; mortifera. Citò autem commoriuntur omnia, nisi vel hæmorrhagiam, vel abscessum faciant pone aures.

ENIMVERO partes officiales, ut singulae sunt à natura constitutæ, variisq; dicatæ officiis atque quodammodo consecratæ, suos quæque habent *σφοδρῆς*, i. *concutiendi motus* quando appulsu rei molestæ offenduntur. Sic enim sternutamenta, tussis, singultus cidentur concussione cerebri, thoracis, & alui. Sed illa concussio quæ dominatu fit illarum partium officialium, salvis ægri rebus omnino suscipitur atque perficitur, ac nutu naturæ de causa morbigica triumphantis res eunt. At secus habet in symptomatica concussione qua partes franguntur, neque quicquam proficiunt: sed damnis augentur, & graviorum symptomatum accessionem & successionem experiuntur. Ne longum faciam, longiusve exempla petantur, ad propositæ huius prognosticos explicationem accedamus, in qua perculsi capitis symptomata gravissima continentur.

PERCVLSVM CAPVT] i. Percussio ipsa capitis. Est enim frequens apud Hippocratem viurpationis causarum morbificarum pro morbis, ut morborum etiam pro ipsis ægrotis, & contrà. Itaque percussio capitis quam facit effera bilis excursus sursum ad caput, à rigore frustra citato, exempli causa: quemadmodum ex lumborum excursu sæpe accidit peruersio palpebrarum, quam *ἰσων* Græci vocant, quæ fit offensione capitis primùm percussio ex ea tam cita irruptione à vasis in partes acerrimi sensus unde acriter stimulatæ magna vi concutiuntur ad exclusionem materiæ dissocialis multum & acris. Sed illa concussio, ut ita dicam, fit impetu potius materiæ, quàm naturæ potentis. Itaque serpit vis causæ morbigicæ & progressum facit in partes quæ iure societatis & vicinitatis, faciliè trahuntur in sympathiam & contagionem capitis ita percussio.

26. Coac.
lib. 11

PRÆRUBRI OCULI] Materiæ decubitu & gargarismo ex dura meninge & pericranio in proprias oculorum membranas quæ illinc productæ veniunt.

DELIRIA CLARA] Quæ notis omnibus aspectabilia sunt; verborum obscenorum & nugarum garrulitate; morum institutorum dissimilitudine, quam ferocitas ipsa denunciat; tum indecora compositione.

40 MORTIFERA] Quemadmodum in cephalalgia intensa, prægrandi, & fixa, cum exitalibus signis coniuncta, qualia sunt hæc; prærubri oculi, & clara deliria. Nam oculi multum rubent ab inflammatione partium cerebro adiacentium, tum rubor ille liuescit à frigore, frigus à *νεκρώσει*, i. *extinctione*: ob eamque causam funesti sunt illi colores. Deliria verò clara lucent in phreniticis qui mutatione bilis flauæ in atram è potestate mentis exeunt, postea contremiscunt cum in propinquo mors eff. Denique mortifera sunt illa, alteratione versa in alienationem quæ insanabilis est.

proth. 9;
lib. 11.

AC CITO COMMORIUNTUR OMNIA] Ac si diceret; in iis nulla salus vitæ sperabilis: sed omnino ruit; propter summam doloris acerbitem, hominisque phrenitici ceptis immanibus efferi; & partium obsessarum corruptionem, quarum officio vita carere non potest.

50 NISI VEL HÆMORRHAGIAM] Quoniam omnis repletio propria vacuatione exoluitur, quæ coniunctam non habeat qualitatem malignam, aut visceris alicuius inflammationem. Itaque si prædicta symptomata sint *ἐκφυγῶντα* tantum repletioni capitis profuerit hæmorrhagiam cieri prima periodo, unde ad se redeat æger, & suæ sit mentis.

83. Coac.
lib. 11.

VEL ABSCESSVM FACIANT PONE AVRES] Derivatione sanguinis liberalem hæmorrhagiam non habentis. Atque tum parotides illæ videri poterunt salutare, si & suppurati fiant participes, & beneficio pepsimi vniuersali fruuntur, qui cernitur in vrinis hypostasi bona loco, & bona materia præditis; neque recursum & sympathia doloris crudelissimi, sint exitiales.

5 Κεφαλαλγία μὲν ἔδρης, καὶ αἰδοῖων ἀλγήματος, καὶ νωθρότητα, καὶ ἀκροσίω πρὸς χεῖρας, καὶ φωνῶν πρὸς ἀλγύει ταῦτα & χαλεπά. ἰσωνώ-
60 δεες δὲ καὶ λυγρώδεες γίνονται ἐν ἅτῳ μηνί· ἐκ τούτων φωνῆς λυθείσης ἐς τὸ αὐτὸ καθίστανται.

Cephalalgia cum dolore sedis & pudendorum, segniciem crisi nulla exhibent, & vocem debilitant. Hæc quidem non sunt admodum difficilia, sed soporata existunt singultuosa ad nonum mensem. Hinc soluta voce eodem recidunt.

HÆC PROGŒNOSIS confusancam habet syluam signorum atque symptomatum, quæ neque pathognomonica sunt, neque epigenomena per necessariam accessionem aut successionem, neque epiphænomena. Quamobrem ex iis nulla *ἀεγίσεις*, nulla etiam certa præsentio comparari potest eorum quod illa spectare dicuntur. Omnis autem institutio diagnostica, omnis item prognostica, quæ ab Hippocrate, hoc est, cum ratione ipsa suscipitur; tanquam ex signis ducitur quæ veteres *τὰ ἀμύθητ' καὶ ὁμοειδῆ* nominarunt.

6 Ασκαριδώδεις γινόμενοι ἐν κεφαλαλγίῃ κώφωσις, καὶ κῶμα παρακολυδοῦνται τὰ παρ' οὗς ἐπαίρει.

Huius prognosæ idem iudicium est, atque in superiore fuit. Non enim ascarides ullam opinionem faciunt futuræ parotidis. Itaque tolerabilior erit sic, ut legitur in prorethico.

Ἐν κεφαλαλγίῃ κῶμα καὶ κώφωσις παρ' οὗς π' ἐρᾶγεται: vel, παρακολουδοῦνται τὰ παρ' οὗς ἐπαίρει.

Cephalalgia consecrarium cum surditate coma, facit ut assurgant parotides.

COMA ET surditas in cephalalgia faciunt ut assurgant parotides: quoniam illæ nascuntur ab humore crasso & frigido, quando per transitum indigenæ causæ nascuntur. Atqui prima soboles cephalalgici crudoris est coma, secunda autem surditas; quæ duo nisi pepasmo & suppurato, aut etiam profuuiio alui sanescunt; si quidem salvis ægri rebus existunt, transeunt in eum abscessum qui ab auribus, quas infestat, nomen sibi adopratur, cuius prænuncia esse solet cum comate surditas: propterea quæ *ὡιδήμα* nominatum est superiore libro.

7 Οἱ κεφαλαλγέες καί ὀχως ὀδυώδεις ὄμμα ἔξερυσσον αἱμορροεῖ.

Quibus cephalalgicis firmiter & acriter caput dolet, unaque oculus multum rubet; sanguis profundetur.

CEPHALALGIAE prægrandis & firmiter fixæ tum criticæ, tum symptomaticæ propria est hæmorrhagia: sed ea tum præclare facit ad ægri salutem quando primis incidit cephalalgia: periodis: sic enim periculo defungitur æger quod propè aberat; si ea sit profusa, faciaturque ut cephalalgicus suæ sit mentis. Plurimum autem valet ad opinionem hæmorrhagiæ faciendam saturatus oculi rubor modo is non liuescat; quod signum est τῆς νεκρώσεως, iamiam mortiferæ. Quæ omnia paulò antè sunt ἀνθυσιῶς disputata.

8 Τὰ σείοντα κεφαλῇ, τὰ ἡχώδεια αἱμορροεῖ, καὶ γυναικὶ τὰ γυναικεία καὶ ἀβιβάζει· ἄλλως ἢ καὶ λὺ καὶ ῥάχιν καὶ κῶμα παρακολουθεῖ· ἴσως δὲ καὶ δυσεντερίαι.

Percussum caput, aurium echo, hæmorrhagiam cient; aut mulieribus muliebria deorsum effunduntur: idque cum aliàs, tum si inderhachis incandescat astu: fortassis etiam dysenterica sunt hæc.

NON RARO accidit ut ab eadem concussione excretiones variæ ciantur. Cuius theorematismis fidem & per-

dem & persuasionem adfert prognōsis illa superiore libro explicata. si cui cum riguerit atque sudarit criticē, rursus postmodum rigor sine causa ingruerit, ac tum à pepsimo somni sit expertus; huic venturam arbitror hæmorrhagiam. Est enim idem rigor criticus, & sudoris & hæmorrhagiæ prænunciatus; aluūque idem ciet deorsum & sursum. De capitis autem percussione & aurium echo; num illa sperabilem faciant hæmorrhagiam, aut mulieribus muliebria deorsum effundant; an verò etiam dysenterica videri possint, hæc mihi super his videtur ratio deliberandi.

Etenim PERCVSSVM CAPVT] i. Percussio capitis quam fecit excursus humoris, substantia, qualitate, ac temperamento efferi educationem non habentis, & cuius plethora micant in temporibus & ceruicibus aspectabili pulsu venæ, diastole extraordinaria, cuius appulsu feriuntur partes vicinæ, non sine molestia & offensione.

AVRIVM ECHO] Cuiusmodi ea fuerit meatuum amplitudine, vel angustia; humoris crassitudine vel tenuitate; virtutis expultricis robore vel infirmitate.

HÆMORRHAGIAM CIENT] Quoniam percussio capitis causam habet humoris efferi aëre, quæ antè non quiescit quàm ad extremas venarum oras peruenit, ubi facit anastomosis quæ exitum habet. Aurium autem echo fit à statu sonoro in aurium anfractibus, tanquam in ergastulis, conclusio; quem facit crassi humoris resolutio à febrili ardore in cerebri arce concepto, ubi tum focus est ac domicilium febris ardentis.

AVT MULIERIBVS MULIEBRIA DEORSVM EFFVNDVNTVR] i. Faciunt vt menstrua liberaliter profundantur: quod singulare & vnicum est naturæ perfugium atque præsidium ad salutem in omni repletionem tam vniuersali, quàm particulari, & in omni sanguinis gargalisimo siue orgasmo: quoniam ita comparata est mulierum natura, vt earum sanguis ad locos & naturalia cursum innectat, propterea quæ si bene valent natura & valetudinis cura, non nisi menstruales & puerperiales esse solent; nec vnquam hæmorrhagia, nec hæmorrhoidibus, nec etiam varicibus exercentur. Itaque tanta vis est profluuiorum hystericorum, vt puerperia puerperis, mēstrua verò mulieribus vacuis atque adeo virginibus vix adhuc menstrualibus, morborum acutorum calamitosam vim abigant, faciāntque vt morbis mortiferis defungantur. Nam grauidarum mulierum grauior & periculosa esse solet ipsa grauiditas in morbis acutis.

IDQVE CVM ALIAS] Ac si diceret. Cum in omni repletionem particulari & vniuersali sperabile sit oprandūque in primis profluuium menstruale, quod menstrua mulieribus ita sint consocialia, vt iuuenibus hæmorrhagiæ.

TVM SI INDE RHACHIS ESTV INCANDESCAT] Quoniam repletionis vacuatio, omnisque adeo cacoehymia purgatio significationem sui exhibet quod feratur, in partibus, vnde, & quæ, huc vel illuc viam affectat. Sic ad futuram hæmorrhagiam tensio est hypochondrij; in temporibus autem pulsu conspicuo venæ micant, & cum cephalalgia multum rubent. Sic in suppurato pulmonum, difficilior spiratio noua apparet, iamiam futura parotide, hypochondrium verò æquale. Contrà futuro crurum abscessu, libertas spirandi maior; hypochondrij verò inæqualitas in tensione. Ergo propturitis menstruis non immerito rhachis laborat æstu, si vel ad punctum temporis materia menstrualis cunctetur in lumbis ubi iacet vena insignis & arteria, vnde vasa feruntur ad vterum. Nam in trimestri menstruorum suppressione, rhachis lumborum intolerabili dolore cruciatur.

FORTASSIS ETIAM DYSENTERICA SVNT HÆC] Maxime verò in senibus. Huc pertinet prognōsis illa. In febribus quæ cum dolore micant in collo venæ, dysenteria habent euentum. Qua de re scriptum illud commemorabile est præceptoris. Prorupta sunt plurimus hæmorrhagia, potissimum verò iuuenibus. Peribant autem omnes hæmorrhagiæ expertes. Nonnulli etiam ab hæmorrhagia deducti sunt ad dysenteriam, vt Erasmi seruus, & Mylus. Nam seniorum propria sunt dysenteria, vt iuuenum hæmorrhagiæ.

9 Οἱ καρδιακοὶ καὶ βρέγμα ὀδυώδεις, ἀχρυπνοὶ, αἱμορραγέουσιν ἄλλως ἢ καὶ ἡ ἐς τράχηλον σιωτήν.

Qui grauescente capite dolenter ad synciput affliguntur somni expertes; sanguinem profundunt è naribus: idque cum aliis, tum si quid protendatur ad collum.

QVÆ CEPHALALGIA nomine τῆς καρδιακῆς exprimitur, vnde οἱ καρδιακοὶ nominantur; cephalalgia causæ firmiter fixæ focum & domicilium caput esse ostendit. Nunquam enim τὸ βάρος nisi pro causâ, vt ita dicam, coniuncta vsurpatur: indèque vacationem moliendam denunciat, ubi grauitatis sensio excitatur. Secus atque aliter κατὰ τὴν καὶ τὴν indicandum. Hæc enim sympathiæ non raro consecutaria sunt.

Ergo. QVI GRAVESCENTE CAPITE] Exrepletionem particulari capitis, quam vel indigena causa, vel aduena tandem inuexit.

DOLENTER AD SYNCIPVT AFFLIGVNTVR] Quod illa pars omnium cephalicarum sit acerrimi sensus, venasque habeat crassiores sanguine multo distentas, & quæ vbertate cerebri reli-

quis omnibus antecellit : ex quibus efficitur ut & indigena, & advena cephalalgia omnium sit capacissima & feracissima, omnibus telis atque traumatibus lauciata præter cæteras, cita etiam morte funestissima sit.

SOMNI EXPERTES] Ut omnis tollatur excusatio frigidi & crassi humoris soporiferi, materia verò acris & tenuis agnoscat.

SANGVINEM PROFVNDVNT E NARIIBVS] Facultatis expultricis virtute, & meatuum anastomosi, quam facile adfert sanguis bile perfusus : alioquin cerebro vis infertur, unde phrenitis & melancholica ecstasis.

IDQVE CVM ALIAS] Ac si diceret. Cum sperabilis omnino sit hæmorrhagia in temporum & frontis dolore prægrandi & fixo, atque in materia tenui & calida, quam demonstraui delirij aut hæmorrhagiæ consecutionem adferre, prout educationem habet, aut non habet.

TVM SI QVÆ CERVICIS TENSIO SIT] Quæ cernitur in conspicuo micantium arteriarum pulsu, unde significatio fit repletionis particularis, quam fecit commemoratus iam ad caput excursus. Scitum est illud. Τετραχὺς ὀδυνώδης, ὀμματὰ ἐξέρουρα, αἰμορραγικά. i. Cervicis dolor cum oculorum dolore, hæmorrhagiam ciet.

10 Τὰ ἐν κεφαλῇ γίνονται ἰώδεια ἐμέσματα μὲν κωφώσι, ἀρτηριοῖσι ταχὺ ἐκβάλλει.

In cephalalgia æruginosi vomitus cum surditate & somni vacuitate ; insaniam brevi denunciant.

IN PRORRHETICO legitur hæc prognosis, quam doctissimo commentario illustravit Galenus. Itaque nullas hinc meas arbitror esse partes, nisi ut transferam in hunc locum quæ illic sunt accuratissime scripta, numerisque omnibus philologiæ & philosophiæ absoluta.

Ergo. IN CEPHALALGIA] Quæ doloris acerbitate eximia est, ac cita morte funesta, nisi hæmorrhagiam habeat liberalem.

VOMITVS ÆRUGINOSI] i. Æruginosæ bilis crebra fursum & parca exclusio, quæ & qualitate ipsius humoris, & copia, & ipso excernendi modo, calamitosa est. Ac qualitate quidem humoris, quoniam æruginosa bilis proximè abest à nigra, & quocunque illa cursum ad excretionem inflexerit, & materiæ quæ ipsam genuit, & partis unde manavit ardorem & inflammationem ostendit. Copia autem, quoniam nihil paucum est criticum : quod spectat & illud. Παντα vomitus biliosi, mali. In excernendi modo vitium illud cernitur quod Hippocrates annotavit his verbis. Vomitus cum varietate, mali ; idque cum aliis, tum si frequentes fiant. Talis autem vomitio symptomatica, venit per sympathiam alui quam dura meninx & cerebrum inflammarum inuexit : cuius affectionis præter cephalalgiam symptomata hæc sunt.

CVM SURDITATE] Consecutaria morbi acuti & turbulenti, in homine non suæ mentis, labefactata scilicet parte illa cerebri unde vis audiendi manat.

ET SOMNI MOLESTA VACUITATE] Propter calidam & siccam cerebri intemperiem quam bilis perustæ nimia peperit abundantia.

INSANIAM] i. Melancholicam ecstasin in qua insaniam summa sunt omnia : quoniam bilis æruginosæ in atram facili mutatio est, cuius malignæ & effera cacochymia morsus acerrimi esse solent.

BREVI DENVNCIANT] Quoniam humorum qualitate acrium, substantia tenuium, temperamento calidorum, cita ad vigorem malorum, quæ ipsi faciunt, expeditio esse solet : ut in Philista, qui cum primo die flaua, mox æruginosa vomuisset ; secundo, sub meridiem, è potestate mentis exiuit : cuius historia fundamentum esse videtur huius prognosticos.

11 Οἷσι κεφαλῇς ἢ τραχίλης πόνος, ἢ ὅλως δὲ πρὸς ἀκροῦν τριμήνης αἰμορραγίᾳ λύει. ἅπαρ ἢ οὗτοι χρόνῳ λύονται, ἢ κώσις ἐπὶ ὀδυνῶ.

Si cui capitis & cervicis dolor, atque adeo uniuerſi quadam infirmitas incidit cum tremore coniuncta, hæmorrhagia exoluit. Quinetiam lapsu temporis hæc mala effugiunt ; ac tum vesica dolet.

INFIRMITATE corporis nemo exterreri debet, nisi terrificata sit infirmitatis causa. Terrifica est quam facit consumptio vitalis principij, nectarisque viuifici perennis dissipatio. Terrifica est etiam quæ fit immerito sine vlla vacuatione, tum aspectabili, tum inaspectabili. Nam facultatum effera vires veniunt ab exolutione trium principiorum, hepatis, cordis, & cerebri. Quemadmodum igitur facultates in officio versantur : sic robur ipsum in trium principiorum temperamento & complexionē cuique accommodata consistit. Si bene constituta sunt viscera, facultates in suo quæque officio vegetæ esse debent. Sed

proth. 12.
L.L.L.

proth. 47.
L.L.L.
proth. 26.
L.L.L.

proth. 32.
L.L.L.

al. αἱ δὲ κώσις
ὅτι τὸ αὐτὸ ἀπο-
λεμίζνεται.

bent. Sed ista non retro commentantur, neque vicissim verè semper enunciantur. Vt enim *δυσίαν* in officio, *δυσίαν* arguit in substantia principiorum; sic *ἰσχυρὸς* non semper *τὸν δυνάμει* edit vegetam, cuiusque vis in officio, virtuti substantiæ principiorum pariter æqualiterque respondeat. Id cernere est in baiulis, qui graviora portant onera, propterea quæ toto corpore contremiscunt. Hic certum est tremorem nasci ab infirmitate. Sed tamen de eo tremore vereri non decet, nec verò de infirmitate ipsa; quod nulla sit eius terrificæ causa. Secus est de fanaticorum tremore qui ab exhausto & cerebri alienatione incidit, mortemque præsentem intonat. Quæ cum ita sint, mirum videri non debet, si hæmorrhagia nonnunquam infirmitatis causas exoluat, viresque reddat vegetas, quæ ab oppressione olim fatiscere videbantur: quod quemadmodum fiat, hæc prognōsis apertissime planissimeque explicabit, hoc modo.

10 **SI CVI CAPITIS ET CERVICIS DOLOR**] *Πόρον* dixit; melius fortasse *βαρὺς* quod per sympathiam nunquam existit, sæpenumero autem *πόρος καὶ πόνος*. Ergo. Si cui capitis & cervicis dolor symptoma plethoricum sit utriusque partis; ac cervicis quidem, aut per excursum infernè sursum, aut per propagationem causæ morbificæ in cervicalem medullam, nec vlla vis extrinsecus incidisse puretur in musculosum genus, sed ille cervicis dolor cuiusmodi sit in causa & symptomate ipso, qualem expressit prognōsi prima 1. lib. qualem etiam in illo. *Cervicis dolor malus quidem in omni febre; pessimus autem is qui sunt in periculo insanie.* Et, *Cervicis dolor, oculi prærubri, sanguinem fundunt è naribus.*

proth. 42.
lib. 2.
proth. 46.
f. 3. i.

20 **ATQVE ADEO VNIVERSI INFIRMITAS QVÆDAM INCIDIT**] Ab oppressione quam facit ipsa repletionis suppressio, vel tantum oppressio nervorum principio per sympathiam, quæ iure vicinitatis & societatis, propagationem movet causæ morbificæ à principio in producta: qualis infirmitas cernitur, ut iam dixi, in baiulis, quando imparia gestant humeris onera, quibus depositis red-
duntur solito alacriores.

CVM TREMORE CONVINCTA.] Cum depravato quodam artuum motu, quando iussu nostro, non naturaliter, promentur: ob eam sanè causam, quia id quod movet & quod movetur, pari magisterio certant inter se. Ex tribus autem tremoriferis causis; oppressione scilicet, spirituum collectione, & virium exolutione, nos eam recipimus quæ contumaciore facit instrumenta ad parendum virtuti animali. Est autem oppressio, siue ea venerit per translationem humoris morbifici à venis ad nervos, quam finit delirium; siue per progressum à cerebro in producta.

30 **HÆMORRHAGIA EXOLVIT**] Quoniam repletionis tum vniuersalis, tum particularis per-
fugium est in hæmorrhagia, quæ propria est plethoræ vacuatio. Quæ causa est etiam cur in Pythione primis diebus tremulo, hanc legem Galenus sanciverit. Quotiescunque febrium initiis tremor incidit, si nihil antea vires effectas reddiderit; tum venæ sectio necessaria est.

comment. ad
hist. 1. f. 1.
3. Epid.

QVINETIAM LAPSV TEMPORVM HIS MALIS DEVRGVNTVR] Eòdem spectat prognōsis illa priore lib. explicata. Quibusque in febribus tremores immerito conquiescunt; iis, lapsu temporis, articulo-
rum dolorifici & purulenti abscessus nascuntur; vnaque in vesica doloris acerbitas. Ergo, lapsu temporis, hoc est, intra quadragesimum diem, si vires validæ pro ægro pugnarint contra vim morbi, anteaque pepasmi signa ediderint: ut in Pythione, per spura *ὑποπνικὰ*, i. subcolta.

146. Coze.
1. lib.

ACTVM VESICA DOLET] Ob stranguriam purulentam, & abradentem vrinæ proluuiem: qualis Pythioni profluxit, qui, sine critica hæmorrhagia, tremoris à repletionem vacationem habuit. In prophetico legitur hæc prognōsis *ἀπλὸς*, nec vlla vesicæ mentio fit.

proth. 60.
f. 3. i.

40 12 (Κύσις δόποληφθεῖσα) ἐν τῇσιν ὀξείῃσι κεφαλαλγίῃσι, καὶ τῇσι ναρ-
κώδεσι μὲν βαρύνει ἐδέλει σπασμώδεια χυμώδαι.

Declarat p. 1.

*Vesica interceptio in cephalalgia prægrandi, aut stuporifera cum gra-
uitate; convulsione studet finiri.*

50 **VESICÆ INTERCEPTIO**, siue vrinæ suppressio, tum primigenia; tum etiam morbi acuti consecraria; convulsione habet euentum. Est enim tanta vrinæ suppressæ feritas ut omnia naturæ præsidia labefa-
ctæ: maxime verò recursum habeat ad caput, unde symptomatum gravissimorum prouentus. Hoc spe-
ctatigitur ut intelligamus, omne genus cephalalgia, tum calidæ & acutæ, tum etiam frigida, atque tor-
pida, & soporata, convulsionem adferre: quando ad præparationem suscipiendæ causæ miseria vrinæ
suppressæ accedit: maxime verò si vel exolutionem vesicæ, vel eius *αἰμαθονία* vrinæ suppressio conse-
quatur. Tum enim non solum refluxum caput excipit: sed etiam cerebrum in vesicæ afflictæ contagio-
nem trahitur, generis similitudine, & vasorum communione. Ex perfrigeratione, *vrinatum interceptio*, ma-
la. Vide prognōsin 17. f. 3. i. proth. Plurimum autem facit ad huius enarrationis veritatem quod scri-
psit Galenus ad illam prognōsin, *intercepta vesica, præsertim cum cephalalgia, habet aliquid convulsivum.*

proth. 36.
f. 1. i.

proth. 38.
f. 3. i.

13 Κεφαλαλγίῃσι λυεῖ πύον διὰ ρινῶν, ἢ πύελα πάχια, καὶ αἵνομα.
λυεῖ δὲ καὶ ἐλκυσιν ἐκδυσις ποτὲ δὲ καὶ ὑπὸ, & κοιλίης ρύσις.

Cephalalgiam tollit expuratum per nares, aut sputa crassa odore carentia. Quinetiam exolvit ulcusculorum ubertas: nonnunquam et somnus, et alui profluuium.

36 SANE CUIQUE morbo sua debetur crisis per exolutionem propriam causæ cuiusque morbificæ, & neoterisimum partis obsessæ. Exolutio fit causæ morbificæ excretionem, pepasmo, abscessu; pro qualitate humoris, impulsu naturæ, & meatuum conditione. Sed incidunt tamen successiones morborum, quibus auocatur natura ab instituto cursu, ut qui opinionem fecerant excretionis per hæmorrhagiam, mutata velificatione, cum inueterauerint, pepasmo vel abscessu exitum finemque inueniant. Ac ne longum faciam; huius theorematris authoritatem fundabit proposita ad explicandum prognosis. 10

CEPHALALGIAM] Cuius inneteratio est, quæque salvis ægri rebus ad vigesimum usque diem producta, sperabilem amplius non facit hæmorrhagiam quæ primis periodis in procinctu esse videbatur; cephalalgiam, inquam, firmiter fixam, humoris crassi & frigidi sobolem.

TOLLIT] Amotione causæ coniunctæ, & partis obsessæ neoterismo. Id enim significat π λύνει, quod Galenus interpretatur ὁ δὲ ἀπὸ πύου πάλιν, i. perfectè hominem sanare, ut nihil reliquiarum supersit. Excipio tamen illud, π λύνει, quod ab Hippocrate per sarcasmum vsurpatur aph. 26. 6. Οἷον αὖ ἐν τοῖσι καύουσι ἔσται ἡμῶνται, ὥστε πάλιν λύνει. i. Quibus, in causo tremores fiunt, eos delirium soluit.

EXPURATVM PER NARES] Quoniam humor qui fecit intensam & prægrandem cephalalgiam, nisi per hæmorrhagiam, inde ubi stabulatur, exitum habeat, aut per ἀσφορῆσιν exudarit; quod 20 superest, in suppuratum aut corruptionem conuertitur. aph. 10. 6.

AVT SPVTA CRASSA ODORE CARENTIA] Quando per fauces pituita purulenta screatur, quæ illuc è foco cephalalgicæ descendit. Crassa autem, pepasnum; odoris expers, ipsius partis integritatem significat. At, ut parotidas discutit & ad æqualitatem curis adducit tussicula cum praelismo coniuncta: idem quoque faciunt aduersus dolorem capitis sputa crassa odore carentia.

EXOLVIT ETIAM VLCEKV PROFVSA VBERTAS] Prorupta in cutim materia multum acri, cuius profusio cephalalgicæ pariter æqualiterque respondet. Id enim significat ἐκλύει. Nam π λύνειν, idem quod ἐκλύειν. Ulcera autem facit ichorum collectio corporis superficiem erodentium.

NONNVNQVAM ET SOMNVS] Quemadmodum enim somno mitescit delirium: sic & cephalalgia suauitate anathymiascens, & cerebri temperata complexionem.

ET ALVI PROFVIVVM] Vti coma surditatem & ophthalmiam. Hinc veniunt in usum ad curationem cephalalgicæ, catapotia cephalica.

14 Κεφαλῆς ἀλγῆμα μετεῖω μὲ δὲ ψῆς τοῦ οὐσῆς, ἢ μὲ ἰδρώτος μὴ λυόντος τὸ πυρετὸν δόποσάσις ἐν ἔλοιῳ, ἢ παρ' ἑς σημαίνει, μὴ κοιλῆς ἐκταραχθείσης.

Capitis dolor modicus cum siti aluina coniunctus, aut cum sudore non exolvente febrem; vel gingivarum abscessus, vel parotidas fore ostendit, nisi profusè aluius feratur.

CEPHALALGIA modica distinguitur ab intensa, cuius antè, naturam, symptomata, causas, & cessationes ostendimus.

ERGO. CAPITIS DOLOR MODICVS] Quem vel modica intemperies leuiter pressa facit, vel inferiorum partium sympathia.

CVM SITI ALVINA] Cuius ab impuritate alui, sensu excitatur; quando ea natar vel pituita falsa, vel bilioso humore. Sic enim apud Hippocratem ἡ νόσος pro aluo legitur vsurpata. Porro autem sitim distinguit alui ab ea quæ est vniuersi corporis, ut in causo; & à pulmonum siti, cuius causam & focum his verbis expressit. Σίτιν sedαντ' ἔρκεντ, frigidam auram ducεε, ἔρ frigidam bibere.

AVT CVM SVDORE NON EXOLVENTE FEBREM] Vel potius π πύου capitis, non πυρετός: quia moderatus est dolor à causa, ut iam dixi, leuiter pressa. Ac si diceret; si modica cephalalgia indigena sudore capitis non sedatur, unde expressio potius quàm excretio cephalalgicæ materiæ significatur.

VEL GINGIVARVM ABSCESSVS] A causa sitis aluina, per continuitatem interioris tunica alui, quæ palato & ori communis est; vel etiam prolapsu catarrhi in gingivas, quarum vniuismodi est caro & simplex.

VEL PAROTIDAS FORE OSTENDIT] Præsertim si capitis dolor coniunctum habeat coma, & surditatem.

NISI PROFVSE ALVVS FERATUR] Qua profusione parotides non solum arcentur, sed etiam cum abortu faciunt, dissipantur, ut in Clazomenio. Sed tamen in aluo perliquida, si è gingivis exudet lan-

exodet sanguis, pestiferum: quoddam labefactata naturali œconomia, sanguis in vitio sit, & sua corruptio-
ne partium substantiam labefactet; quod in gingiuis porissimum cernitur, quarum simplex & vniuf-
modi caro est.

15 Κεφαλαλγία κακώδης μὴ βαρεῖα, ποιεῖ π. σπασμῶδες.

Cephalalgia veternosa cum gnavitate, ferè convulsifica est.

20 EXPLICATIO repetenda ex commentario ad prognosin 12. huius libri.

16 Οἱ κεφαλαλγικοὶ, διψῶδες, ὑπάρχοντες, ἀσαφεῖς, ἀδυνάτοι,
ἐπὶ κοιλίῃ ὑγρῇ κοπιῶδες· ἢ ἐξ ἧ γε ἔξαιρίζονται;

*Cephalalgici, sitibundi, pene somni expertes, obscuri, morbo fracti, ex
aluo liquida laboriosi; etiā mne fanatici?*

20 SYMPTOMATA hæc infanz metum adferunt ex euentu; quatenus scilicet ipsa infanzia in cerebri
ardore febrili existit, cuius illa soboles esse possunt per progressum & sympathiam simplicem, vt cepha-
lalgia, sitis, vigiliæ. Existunt etiam quæ per translationem infanz faciunt consecutariam, vt κόπος ἐλκώδης,
ἀδυναμία, i. lassitudo vlcerosa, imbecillitas, alius prorupta bile. Nam ἡ ἀσάφεια, proprium esse dicitur phre-
nitidis eximiaz. Vt igitur symptomata hæc, signa ἐμφανῆ videri possunt infanz, quod ea calidæ intem-
periei, biliosæque humoris sint ἐκφυγὰ; sicut ipsa phrenitis: tamen ὁμοειδὴ ipsius phrenitidis ipsa nemo
philosophus dixerit; cuiusmodi sũnt illa quæ antè commemorauimus, verborum absurditas, morum
dissimilitudo quæ ferocitas denunciat, & indecora compositio. Erunt igitur ex euentu, nisi quis fortas-
se obiecerit ea cum τῇ ἀσάφεια coniuncta, in ἐκείνῃ conspirare, cuius præparatio cernitur in ea obscurita-
te. Quoties enim ad suscipientis præparationem accedit vis efficientis, repentina inde morbi generatio
consequitur: quemadmodum quoties ad partis afflictæ calamitatem, perennis causæ morbificæ accessio
fit; efficitur etiam prioris morbi in grauiorem mutatio. Sic igitur symptomata hæc phrenitidis eximiaz,
aut etiam infanz iamiam futuræ coniurata, vt ita dicam, videri poterunt: quamuis ea omnia simul exi-
stere nihil necesse sit.

CEPHALALGICI] i. Cephalalgiz acerbitate vexati, quam facit bilis effera cum sanguine mixta.

SITIBVNDI] Siti aluina, per stomachi cum cerebro sympathiam, quæ cernitur etiam in vomitu
æruinoso.

SOMNI EXPERTES] Propter calidam & siccam cerebri intemperiem, quam feritas bilis inue-
xit, & anarhythmiaecos minimè somnifera qualitas: ex quo efficitur vt vacuitate somni cum doloris acer-
bitate coniuncta, facilis mutatio sit bilis flauæ in æruinosam & atram; vnde infanzia.

OBSCURI] Phrenitidis inueteratione ac cerebro iam bile perfuso & infecto, vt lanæ alba veneno
Assyrio fucata; vnde vires languent effatæ, nec potis est membra iactari, vocem canoram edi; vel etiam,
silentio melancholico taciturni, qualem fuisse legimus Dealcis uxorem. Denique obscura deliria clavis
iam commemoratis contraria.

MORBO FRACTI] Exoluti, multum infirmi, tremuli, ψαλακώδεις, ναδροί, quorum ναδρότης cernitur
ἐν τῇ ἐρρηξί.

EX ALVO LIQVIDA] Biliosis excrementis, meracis atque spumantibus sæpe & parum ducta.

LABORIOSI] Κόπος ἐλκώδης, qui sæpenumero delirij prænuncius esse solet, quando biliosæ mate-
riz laborificæ translatio fit ad caput; quod nunquam accidit in κόπῳ πινώδῃ, i. labore iensino.

ETIAMNE FANATICI?] Ac si diceret. Etiā mne adhuc è potestate mentis exeunt, infanzque
summa omnia præ se ferunt; quamuis & silentio & exolutione fuerint iam pene sopiti? Sanè quidem,
non solum eo nomine quod deliria cum silentio, tremore & palpo sint valde phrenitica: sed quod ap-
pulsu bilis atræ, morsus acerrimi, vt ita dicam, ψυχὴ ἀσθητικῆς χρείται, i. anima ad sentiendum excitatur, non
aliter atque sitis falsò sedatur, quæ excitatur rursus sitiferæ causæ incremento. Omnis autem affectio
fere sequitur naturam efficientis causæ, vt in illo. Quibus excussa infanzia, febris acuta superuenit; phrenitici
rursus sunt.

17 (Κεφαλαλγίες) ὑπόκωφοι, χεῖρας τρυμῶδες, τράχηλον ὀδυώ-
δες, ἐρέοντες μύχανα δεδασυμύχα, ἐμέοντες μέλανα ὀλέθριοι.

*Cephalalgici surda stri, qui manibus contremiscunt, ceruice dolent, ni-
gra & aspera meiunt, ac nigra quoque vomunt; planè sunt desperati.*

SYMPTOMATVM pestiferorum concursus cum signis funestis continetur, unde certa vitæ desperatio est. Quoties enim ad symptomatum cacoethiam ipsa signorum accedit, nihil est de vita sibi promittendum: quoniam pestiferi morbi ingrauescentis magisterio, ægroti natura omnino tenetur. Enimvero de symptomatis illud præceptum est, ea inter spem metumque posita esse, quatenus huiusmodi sunt vel illiusmodi, pro varia temporum ratione in quibus apparent & fiunt. At signa quæ ipsa per se existunt, nec ullam vim efficiendi habent, nunquam à se mutantur, ut bona mala sint, aut mala bona. Ut enim pepasimus celeritatem & securitatem crisis denunciat: sic cruditas tarditatem & recidivam. Sic urinae hypostasis materia & loco bonâ; deiectio qualitate, copia, tempore, & excernendimodo laudabilis & naturaliter constituta; sic etiam anacatharsis libera & liberalis sputi incorrupti, nec fædi coloris atque odoris; arteria item fortiter & æqualiter micans; libertas spirandi; omnia hæc semper in bonis ducenda, quoniam semper apparent & fiunt καὶ λόγον naturæ; contraria verò ἀλλοῦ λόγον naturæ, & magisterio morbi; proptereaque omnino mala atque terrificæ. Secus est de symptomatis quæ non minus bona spe nos consolantur, quàm meru exterreant; prout à natura stant, aut imperu morbi eduntur. Ergo ut cephalalgia, surditas, manuum tremor, cervicis dolor, symptomata sunt ipsa per se terribilia: ita si adiunctionem habeant urinae nigrae & asperæ, vomitus item nigri, desperatam salutem ostendunt. Quæ omnia cuiusmodi sint, & quemadmodum fiant; cum autem quorsum appareant, huius est prognoseos videre.

CEPHALALGICI] Signum diagnosticon capitis malè affecti, symptoma verò prægrandis interperiei, vel continuitatis solutæ.

SVRDASTRI] Offensione τῆς ἀκουστικῆς δυνάμεως, **P. audiendi facultatis**, per dissolutionem integritatis in parte illa cerebri unde vis audiendi manat.

QVI MANIBVS CONTREMISCUNT] Quod illis vsuvenit propagata cephalalgia causa in cervicalem medullam, unde veniunt nervi ad manus.

CERVICE DOLENT] Adducto in cerebri sympathiam nervorum principio, diuturna afflictione læso, nec vlla doloris causa extrinsecus incidere in musculorum genus. Etenim principiorum & propaginum facilis est mutua inter se contagio, facilisque mutua συμπηρωσις. Atque hæc quatuor symptomata ab eodem fonte principia causasque ducentia, sunt quidem per se ipsa plena periculi, non tamen adimunt expectatione vitæ, nisi se illis prava quoque signa adiunxerint: cuiusmodi sunt quæ sequuntur.

NIGRA ET ASPERA MEIVNT] Quæ sunt eiusmodi: nigra quidem, à sanguinis & quatuor humorum sero, prægrandi æstu & incendio conflagrante; non autem humore melancholico vel ut fuligine saturato: quod sæpenumero salutiferum est, præsertim mulieribus quæ à menstruorum vel puerperiorum suppressione laborant: aspera verò, propter hypostaseon qualitatem orobearum, fursuracearum, spumantium, & laminearum; quæ sunt omnino quatuor pravarum tota substantia hypostaseon genera. Nam plura sunt alia colore & loco malarum. Δεδασμένα autem ἢ διὰ τὰ nominauit præter consuetum scribendi modum in aphorismis, prognostico, & epidemiis, ubi nusquam legitur τὸ ἔρον διὰ τὴν δέδασμένον: ut studio obscuritatis ita scripsisse videatur in hac prognosi, quemadmodum rectè annotavit Galenus nominans eam obscuritatis affectationem, τὸ ὀπτηδένημα τῆς ἀσφαλείας.

NIGRA VOMUNT] In prorrhethico aliter scriptum reperio. Non enim vomitum nigrum cieri, sed venturum prædixit, καὶ ταῦτα ἢ, μέλανα ἔμεπον πρὸς δέχεται ἔχειν: quod etiam Galenus transfert ad nigras deiectiones, quæ post æruginosas sequi solent, sicut & vomitio ipsa: sed ea tamen frustra expectantur, cum ipsæ per se sufficienter urinae nigrae & asperæ ad prædictionem interitus mox futuri. De vomitione autem nigra, de quæ urinis nigris erit alius dicendi locus.

SVNT DESPERATI] Sic enim ἀέσπριοι, per metonymiam, sunt ἀέλητοι. Desperatæ salutis ratio in theoremate catholico exposita est.

18 Οἱ κεφαλαλγῆες ἐφιδρῶντες, κοιλίῳ ἀπολελαμμένοι πασμάδες.

Quibus cum sudatiuncula caput dolet, alio suppressa; conuulsione tentantur.

ET IN PRORRHETHICO, & in priore libro huius diuini operis, hæc prognosis expressa, & explicata legitur. Excipitur tamen hic febris, quam cum reliquis symptomatis voluit illic esse coniunctam. Et quoniam fastidiosè nimis videtur se Galenus gerere in eius prognoseos decisionem, nec eam dignatur philologiæ & philosophiæ luminibus illustrare, ne quid intentatum relinquere, tentant & ipse aliquid quod nonnihil lucis adferret, quod in hunc locum transferri poterit ex comment. ad prognosin 160. prioris lib. Quod superest, hoc spectat hæc prognosis ut intelligamus, conuulsionem in metu esse quoties in cephalalgica oppressione, unde sudor exprimitur qui cephalalgiam non exoluit, alui suppressio veterem auget oppressione: quamvis non accidat necessariò, neque semper; sed ex eventu, atque nonnunquam. Nam paratides non rarò inde assurgunt. Hactenus de Cephalalgia.

DE CARO ET COMATE.

CAP. II.

Deile.



Ο ΚΑΡΩΔΕΣ (ἡρά γε) πανταχοῦ κακόν;

1 An soporari ubiuis malum?

10 DICTVRVS de cataphoricis malis, à distinctione causarum disputationem instituit, ut ex earum perspicientia quid cuique euenturum sit, & quorsum illa fiant, certò statuatur. Id fecit primùm in Caro, qui inter illa est eximius. Symptomata sunt cataphorica, in quibus cernitur κατὰ πορὸς πρὸς ὑπνώδης, i. inclinatio quædam somnolenta & veter-
 20 posa, ut neque oculis, neque cerebro lucem accipiant; sed contrà semper oculis noctem commissis palpebris, ac semper videantur solui in somnos, vigilēte aut dormiant. Sed inter ea symptomata principum obrinet κάρος, quem veteres ἀπὸ τῆς κάρης, i. à capite nominauerunt, ex animaduersione cerebri occupati, quoties τὴν τῆς φαντασίας ἀπόλειπαι ἢ ἐκλύειν, i. amissionem aut exolutionem phantasia exprimere voluerunt. Est enim caros symptōma & signum phantasiae exolutæ. Exolutionis autem causa est prægrandis frigida intemperies quam acida pituita inuexit. Prægrandis intemperiei frigida causam esse dixi pituitam acidam: quoniam cari natura & ὑπαρξίς versatur ἐν τῇ λύσει, i. in resolutione; quemadmodum τῆς κατὰ τῆς
 30 ἐν τῇ λύσει, i. in tensione. Atqui non existit ἡ λύσις, quin nerui madescant, vnde exoluitur πῆγος & robur eorum. Atque in caro cernitur animalitatis interceptio in sensu & motu; quemadmodum in apoplexia; si tantum libertatem spirandi exceperis, quæ in apoplexia nunquam est, manet autem in caro. His ita constitutis, super quæstione proposita hæc mihi videtur ratio deliberandi, ut τὸ καρῶδες primùm hoc loco significet tum symptomatici cari speciem & ideam, tum arctioris somni & excussu difficilis necessitatem sarietatem; vel ex necessitate dormiendi quam peperit diuturna somni vacuitas cum pari opportunitate somniferarum causarum coniuncta; vel ex affluentia soporiferæ materiæ quam genuit liberalior vini vsus. Itaque certum est τὸ καρῶδες quod venit à prægrandi intemperie τῆς πρώτης ἀποδνηκῆς, i. sen-
 40 sorij primi, siue primigenia, siue consecraria sit ut in Hermocrate, siue à mutua contagione musculorum temporalium & cerebri; certum est, inquam, tale καρῶδες semper in vitio esse, fierique pessimis ægri rebus. At verò τὸ καρῶδες quod sine vlla cerebri offensione sit quæ firmiter fixa sit, sed tantum cum leuiter pressa, ut in ebrietate; vel certè nulla, ut in somno critico non turbulento; tale profectò καρῶδες cum spe salutis prædiuite initur. Tale καρῶδες fugat delirium; tale καρῶδες non rarò cephalalgiam exoluit, & in pueris, febrem: denique tale καρῶδες μὴ ἀεὶ ἀσθενὲς, βέβαιον κρίναι σημαίνει, i. non turbulentum, firmam crisin ostendit.

2 Οἱ κομῶδες ἐν δερχῇσι γυρόμενοι μὲν κεφαλῆς, ὀσφύος, τρα-
 40 χήλου, ὑποχονδρίου ὀδυνῆς ἀγρυπνέοντες ἡρά γε φρενιτικοί; μυκτὴρ ἐν
 50 θυπέοισιν ὀστροαίρων, ὀλέθριον ἄλλως τε καὶ τέλειρταί οἱ ἐξείν, ἢ δερχο-
 60 μένοι. κακὸν δὲ καὶ κοιλίης πλείλυται ὁ ξερύδρη.

Qui ab initio & continenter sunt comatosi, unà cum capitis, lum-
 10 borum, cervicis, hypochondrij dolore, somni expertes; etiāne phreni-
 20 tici? Substillum narium in his mortiferum; idque cum aliàs, tum verò
 30 quartum diem agentibus, aut ineuntibus morbum. Pestifera est etiam
 40 prolumies alui prærubra.

Hic GENVS alterum symptōmatis cataphorici proponitur explicandum, quod veteres κομῶδες δι-
 50 xerunt. Est autem symptōma cataphoricum in quo non potis est lucem accipere oculis, cum illi semper
 noctem accipiant, quamvis nonnunquam difficile non sit è cerebro somnum excutere, nonnunquam
 etiam difficillimum quando sopore sepultum est. Duplex enim κομῶδες statuitur, vnum ὑπνώδης, alterum
 60 ἀγρυπνῶν. Sed utriusque communis est iniussa oculorum conuiuentia. In omnibus comatosis apparent
 oculi somno conuiuentes: quemadmodum in lethargicis genæ sublimēs. Est igitur coma; inclinatio ve-
 ternosa quæ cernitur in conuiuentia oculorum, quam facit exolutio virtutis nerualis in phantasia debi-
 70 li & infirma. Sic enim dicitur coma phantasiae infirmæ symptōma; quemadmodum caros abolitæ. At-
 que in omni comate humoris ingressu neruorum πῆγος exoluitur. Sed omne coma diuisum est in mixtum
 & simplex. A mixtum quidem nascitur ex pari dominatu diuersorum humorum, bilis & pituitæ, pari-
 ter inter se concertantium. Simplex verò, vel à pituitæ simplicis & incoaptæ abundantia, vel à cerebri
 exolutione; vel ab eiusdem perfrigeratione febrilis ardoris consecraria. Atque mixtum coma semper
 est ἀγρυπνῶν, simplex ὑπνώδης: illud tantum oculis noctem accipit: hoc cerebro & oculis lucem fugit, nec

potest eam capere. Vtriusque autem commune est, oculis, veluti somno arctissimo, conuiuere. Coma-
tis mixti natura & causæ, tum autem malorum accessio atque successio, in hac prognosi feliciter exa-
ta leguntur. Simplicis autem causæ & decisiones continentur in proximis.

QVI SVNT INITIO COMATOSI] i. Qui continentur conuiuent oculis, oppressione ce-
rebri quam mixta facit cacochymia bilis & pituitæ pariter inter se concertantium; illa quidem, ad so-
mni excussionem; hæc verò, ad soporiferam impressionem: & quarum mixtione monstrum nascitur
biceps phrenitidis & lethargi, quod *παραμανία* veteres nominarunt. Continentur autem ideo ponē-
dum existimaui, ut indigena cerebri causa putetur: quoniam nullum coma, nullum delirium potest vi-
deri *διωκόμενον*, i. *continuum*, quando in cæteris partibus, pituitæ & bilis offensiones cerebrum in contra-
gionem & sympathiam adducere possunt. Initio autem scripsit præceptor, ut omnis tollatur statim o-
pinio cerebri vel exoluti, vel refrigerati à febrili ardore: quod ineunte morbo nunquam accedit, quo
tempore natura morbificis causis opprimitur.

CVM DOLORE CAPITIS] Excitataensione rei molesta, i. bilis irritantis, in parte sensus a-
cerissimi, qualis est dura mening; ex quaensione opinio fit comatis neuriquam soporati & somno se-
pulti: quoniam in tali comate sunt corda oblita laborum, propter interceptionem vel impedimentum
animalitatis in soporatione sensus & motus.

CERVICIS ET LUMBORVM] Per propagationem causæ morbificæ à cerebro in spinalem
medullam, vel etiam perennem excursus ex lumbis ad caput: quoniam, uti iam dixi, facilis est contra-
gio principiorum & productorum.

HYPOCHONDRII] Vnde generationis & affluxus perennitas materiæ sursum ad caput; & ad
suscipientis causæ præparationem accessio & vis efficientis.

SOMNI EXPERTE] Quoniam in summa dormiendi necessitate non suppetit opportunitas
causarum somniferarum: quamvis in somnum solui reapse videantur, propter conuiuentiam oculo-
rum; nihilominus tamen somnum inire non possint. Ac tale coma iure optimo dicitur *ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν*, *ἐξ*
ἀγνοίας.

ETIAMNE PHRENITICI?] Ac si diceret. Etiamne tandem phrenitidis consecutio adferatur,
hoc est, delirii perpetui cum vigiliis & febre coniuncti, quod facit bilis effera morsus acerrimi in ea par-
te cerebri in qua mens principatum exercet. Sanè quidem, cum alterario cerebri vires acquisiuit eun-
do, pituitaque exhausta, cerebrum dominatu bilis tenetur, unde coma excutitur. Ex quo efficitur, trium-
phata comatis causa, delirium patefcere, quod pariter cum comate regnabat, sed obscure tamen quasi
sepultum atque sopitum: quemadmodum si bilis, pituitæ abundantia pituitesceret, utique proderetur
lethargus. Quamobrem comatosi vigiles, & vnà possunt esse phrenitici, & phrenitidis successionem
habere.

SVBSTILLVM NARIVM IN HIS MORTIFERYM] Omnia enim sanguinis stillici-
dia sunt *χάλεπα*, i. *periculosa*, ut cæteræ omnes indicatoriæ causæ exiguæ. Aut enim malignos vel multos
humores naturæ imperio regi non posse, aut infirmitatem summam ipsius naturæ testantur: sed ea stil-
licidia sic habentur mortifera, si qualitate sanguis in vitio sit, qualis esse solet meracis, ut in Philisco.

IQVÆ CVM ALIAS, TVM VERO QVARTVM DIEM AGENTIBVS] Quoniam
substilla & hæmorrhagiæ quarto die, contra naturam morbi cientur qui paroxysmos habet dierum im-
parium. Omnis autem *ἀφαισις* quæ vertitur in *ἀπασιν*, calamitosa est, facitque *τὸ δυσχερὲς τὰν πάσιν*, *ἐν*
quemadmodum rectè annotauit Galenus ad illam prognosin, *stillicidia vndecimo mala*.

AVT INEVNTIBVS MORBYM] Non quidem periodo aut *καρπὸς* (nam tertio die bona est
hæmorrhagia) sed primo statim morbi appulsu, quam *πρὸς τὸν εἰσβολὴν* nominare solent: ob eam sanè
causam quæ in substillo dicta est.

PESTIFERA EST ETIAM PROLVVIES ALVI PRÆRVBRA] Nihil erat neces-
se ad faciendam fidem periculi superiorum symptomatum quæ sunt *ὁμοειδῆ* conspirantia in idem; nihil,
inquam, erat necesse aduocare *τὰ ἐπικυλῶντα* quæ sunt in suo genere lethalia, cum illa per se ipsa sufficiant.
Enimvero coma mixtum quod phrenitidem habet coniunctam aut consecutariam cum progressu cau-
sæ indigenæ, & translatione aduenæ, quodque substillo sanguinis tempore & qualitate pessimo, deu-
ctæ naturæ signum ostendit, nihil ampliùs requirit ad persuasionem futuri exitij. Atque illa cernuntur
in actionibus & excrementis quæ sunt ipsius cerebri & membranarum eius, propterea quæ sunt *ὁμοειδῆ*,
& ad instituendam prognosin accommodata. Quod igitur adiecit, pestiferam esse prærubram alui pro-
luuiem, verè quidem dixit, sed non apposuit. Est enim proluuius illa pestifera, sed labefactæ naturalis
œconomiz soboles, & hepatis multum effœti certissimùm argumentum: sicut symptomata iam expli-
cata, cerebri; ob eamque causam funesta, quod partium illarum officio vita carere non possit. Atque
ut de illa proluui, cuiusmodi sit, & quorsum fiat, paucis exponam; certum est omnem cruentam deie-
ctionem iecori acceptam referri: sed periodicam atque fugacem virtute illius fieri; perpetuam verò,
torminosam, carniū loturæ similem, summæ infirmitatis, planèque virtutis retentricis exolutæ syllo-
gisticum signum esse. Quoties autem iecur ab inueteratione intemperici iam exolutum sui tædet offi-
cij ad vitam tuendam necessarij, tum in angusto spes est. Atque ita proluuius alui prærubra homini ne-
cando ipsa per se est satis; neque apposuit, meo quidem iudicio, ad constituendam symptomatum *ὁμοειδῶν*
cerebri perniciem aduocata videtur, cum sit *ἐπικυλῶν*, nec ab eodem fonte principia causasque du-
cat: nisi fortasse quis dicat; quod plures facultates, pluraque principia in vitio sunt, eò res ægri peius ire.

Vide lib. 4. *τῶν ἀφροδισίων*, & comment. Galeni ad proth. 2. l. 1.

3 Οἱ κομῶδεις ἐξ ἄρχῆς ἐφιδρώσαντες, οὐροὶ ἐν ἑπιπόνοις, κα-
 τικοί, ἀκρίτως δὲ πρὸς ψυχόνες διὰ ταχέων, πρὸς αἵμα-
 τώδεις σποσμώδεις ὀλέθριοι.

*Comatosi quibus ab initio sudatiuncula exudavit, cum permolesta
 urina, & ardore febrili immerito alsiosi, mox æstu incandescentes, co-
 matosi, subinde ad pedes delapsi; mortiferum habent malum.*

ALTERVM genus comatis ab exolutione nati in hac prognosi continetur, quod suæ decisionis
 enarrationem à nobis requirit. Est enim decisio hæc multis obstructa difficultatibus, quas expedire dif-
 ficillimum est, nec verò nisi à sciente animaduerti possunt. Ac primum tollatur comatosi nomen quod
 in principio decisionis scriptum est, retineatur autem quod est in fine. Non enim ab initio sunt coma-
 tosi qui ab exolutione somno sepulti iacēt: quemadmodum in comate mixto quod esse diximus mon-
 strum biceps phrenitidis & lethargi, ex mixtione bilis & pituitæ pari robore inter se dimicantium. Tale
 coma initio statim apparet, nec morbi alterius confectarium esse solet.

20 Ergo. QVIBVS AB INITIO SVDATIVNCVLA EXVDAVIT] Per expressionem
 quam fecit capitis oppressio. Vt enim sudatiuncula dicitur vel capitis, vel vniuersi corporis: ita huic lo-
 co appositâ in scopum authoris, propriè ad caput pertinet; eaque, ineunte morbo, causam habet ex-
 pressionem; quemadmodum iam producta deque viribus triumphare, partium solidarum exolutionē.

CVM PERMOLESTA VRINA] Sic enim legendum duximus, non autem, ἔρρις πίπτει. Quor-
 sum enim concoctio in concursu symptomatum funestorum, quæ nunquam bonitatis naturam exuit,
 vt ex bona fiat mala? nisi quis fortasse obiciat fugacem esse concoctionem cum vicissitudine crudita-
 tis, indeque fieri vt quæ sunt urinae modò pepsimi participes, modò expertes, non sint in bonis ducen-
 dæ: fortassis etiam videantur prauæ, vt quodam loco scripsit Hippocrates. Sed illud substitutione vel
 ostentatione non caret, sophisticum est, propter eaque ab omni philologia & philosophia exploden-
 dum.

Est autem permolesta urina, quæ cum labore excernitur, non quidem vesicæ vitio, sed alieno.

ET ARDORE FEBRILI] Sic enim οἱ καυστικοὶ sunt exponendi. Nam τὰ καυστικὰ dicuntur morbi
 in quibus ardor lucet; tum etiam excrementa præcalida, quorum vis est faciendi morbum acutum ci-
 tissimæ crisis, valdeque periculosum, si ardore conflagent.

IMMERITO ALSIOSI] Non inconsideratè illud, ἀκρίτως, verti immeritò, quod est sine signis
 & salutaribus causis, vt in Philisco qui visus est febris expertus in summo ardore. Tamen enim cutis vi-
 detur alior quam solebat, non ramen sic febris vacationem denunciat, vt rectè annotauit Galenus
 comment. ad illam prognosin, τὰ ἐγκαταλημμένα καὶ καίματα ἐν ὑποχονδρίῳ πυρετῷ πρὸς ψυχόνες, κακόν. i. Reliquia
 in hypochondrio supersites febris extinctæ, mala.

40 MOX ÆSTV INCANDESCENTES] Conceptæ in visceribus flammæ appulsu; quæ cum
 euauerit, partes, vt erant, marmore frigidiores relinquit. Qua de re illud iam exposuimus. Extimarum
 partium cita in vtrumque mutatio, ac sitis huiusmodi, praua est. Quo loco adducta sunt multa quæ ad propo-
 sitæ decisionis explicationem pertinere videbantur, illinc huc transferenda.

SVBINDE AD PEDES DELAPSI] Tales enim sunt ναδροί, in quibus ab exolutione insanabi-
 li netuorum principij cernitur ἡ ἔρρις, quæ est veluti quædam πάρεσις. Ναδρότης autem, ἔρρις, καὶ πάρεσις,
 καὶ ἄλλαι idem significant 3. Epid. sect. 3.

COMATOSI] Ab exolutione cerebri diuturna oppressione fatiscens, quam initio denunciauit
 sudatiuncula capitis per expressionem: quia vbi sudor, ibi morbus.

MORTIFERVM HABENT MALVM] Quoniam omne symptoma natum à principij exo-
 lutione, quam fecit morbificæ causæ inueteratio; mortiferum est atque funestum. Tale est substillum
 sanguinis nigri quartum diem agenti in comate mixto. Talis etiam prærubra alui proluuius ab effæcto
 hepate, quod iam sui tædet officij.

4 Οἱ κομῶδεις ὕπνοι καὶ ἀκαταψύξεις ὀλέθριον.

Somni veternosi, vnaque alsiosi; mortiferi.

60 EXISTIT etiam mortiferum coma simplex quod cerebri inuexit refrigeratio quam ardor fe-
 brilis reliquit exhausta cerebri, vt ita dicam, viuacitate: quale in Hermocrate animaduertit, quem somni
 vacuitas comatosum reddidit vndecimo die morbi. Fuit Hermocrati mortiferum illud coma, quoniam
 intemperies frigida, febrilis ardoris confectaria est insanabilis. Ea lege funestus est hydrops à μαεραμῷ
 πρὸς ψυχόν, i. consumptione retorrída quam febris acuta induxit. Eadem lethargus à phrenitide.

Ergo. SOMNI VETERNOSI] Βαθὺς ὕπνος κομῶδης, vel κόμα ὑπνώδης, coma soporatum sopore

ex cussu difficili, qui proximè accedit ad carum, & in quo vix potis est oculis aut cerebro lucem accipi. VNAQUE ALSIOSI] i. Cum refrigeratione coniuncti, quam vocat σφοδρά ψύξη τῆς κεφαλῆς, quæ omnium maximè soporifera est, vnde soporatus est multum Hermocrates vndecimo die morbi cum decem iam dies exegisset in febris ardore, lingua perusta, vigiliis, hypochondrij tensione, isto symptomaticè diffuso, non effuso; quibus adde excrementa perusta vniuersi corporis affectionem igneam denunciantia.

MORTIFERI] Vide commentarium ad historiam 2. part. 2. 3. Epid.

Malè fuit κα-
ταψώδεις, κα-
τωδεις.

5 Κωματώδεις, κατωδεις, κενωφωμόεις, κοιλίης κατερρώχνης
ἐρυθρά διελθόντα πρὸς κρίσιν ὠφελεί.

*Comatosos laboriosos, tum eos qui obsurduerunt, alius prorupta sub-
rubris excrementis adiuvat in ipsa crisi.*

HIC TERTIVM genus comatis veterinosi proponitur quod in oppressione cerebri causam ha-
bet, non quidem ex pari dominatu pituitæ & bilis indigenarum cerebri, qualem in comate mixto agno-
uimus: sed quod ex vtriusque humoris affectione nascitur in aliis partibus quæ cerebrum ipsum in con-
tagionem & sympathiam adducere possunt. Eiusmodi sunt alius & venæ, in quibus perturbatio com-
mouetur à flatulento spiritu cum calore contra naturam, cuius perturbationis apparent signa in vrinis
iumentorum similibus. Quale etiam coma illud nascitur, de quo ita scripsit. Comatosi maximè erant phre-
nitici, & qui laborabant causo, & qui alio quopiam morbo magno. Quem locum enarrans Galenus sic ait.
Craßitudo materia faciebat quidem coma, is præsertim quibus afflictum caput fuerat. Affligunt autem phrenitici,
prima ratione afflictionis, hoc est, ab indigena causa per idiopathiam. Κατωδειςιν verò, ex quodam euentu. Etenim fe-
brilis calor humores prauos effert ad caput. Tunc autem in ea tempestate pestifera redundabant crudi & frigidi.
Quemadmodum autem quæ in hac prognosi continentur symptomata comatis & τὸ κόμην, alibi sunt
exposita in catalogo eorum quæ cum febre terrificâ esse solent: hæc remedium quo illa quiescunt, hic
nobis excipiendum proponitur. Vt igitur, comatosi, laboriosi, caliginosi, vigiles, subfundantes malè sunt:
ita, comatosos, laboriosos, obsurdescentes alius aperta subrubra laxans, circa crisin iuuat.

6 Κωματώδεις ἀσώδεις, ὑποχόνδριον ὀδυνώδεις, σμικρὰ ἐμείωδεις
τὰ παρ' ἑξ ἰχρῶσι. πρὸς δὲ πρὸς τὸ πρὸς ὥπον ἐπάρματα μὲν κώματος.

*Comatosi fastidiosi, vnâque dolenter hypochondriaci, sæpe & parum
vomentes; aurium abscessus habent. Antea verò faciei tumores cum
sopore ipso coniunctos.*

HIC ETIAM comatis decisio continetur, quod faciunt affectiones viscerum quæ cerebrum in
sympathiam & contagionem adducere possunt, indeque materia illuc transfertur; aut etiam in cerebro
ipso ciatur, vnde paratides confectariæ esse solent. Enimvero crudi humoris ad caput translatio euentum
habet comatis atque parotidum; idque cum aliâ, tum si adiuncta sit præparatio causæ suscipientis, quæ
cernitur in facie turgidula hominis iam soporati.

Ergo. COMATOSI FASTIDIOSI] Qui & figuræ omnis & omnium ciborum fastidio effe-
runtur, acerrimæ bilis impulsu ventriculum & stomachum laceßentis atque quodammodo exoluentis
atque talis αὐτῇ reuera est κατωδεις, non autem αἰέμεπις.

VNAQUE DOLENTER HYPOCHONDRIACI] Hypochondrio scilicet inflammatione
obfesso, vnde bilis exudat in aluum, nervulique duo iecori & ventriculo sociati affliguntur. Hæc ieco-
ris inflammatio cerebrum quidem per aluum in sympathiam & contagionem adducere potest propa-
gatione causæ morbificæ: quemadmodum ipsa tensio hypochondrij doloris expers transitum absolu-
tum significat; quando scilicet humor, relicto priore foco, transit ad caput. Sed neutrum faris appo-
sitè, nisi apponatur commemorata suscipientis causæ præparatio. Nec verò hypochondrij tensio dolo-
ris expers aliò spectat in perturbatione critica, quàm ad hæmorrhagiam; in suppurato autem pulmo-
nis, restituta spirandi libertate, quàm ad cutaneum abscessum. Nam hypochondriacus dolor inflamma-
torius hæmorrhagiam habet salutarem primis periodis. Quid igitur superest? vt intelligamus transitum
& progressum partium caput in suæ affectionis contagionem adducientium, non minùs præparationis
suscipientis causæ, quàm vi efficientis, euentum habere vel hæmorrhagiæ, vel comatis, vel parotidum.
Nam coma ab oppressione natum, quale descripsi, vel parotidibus excutitur, vel aluo prorupta subru-
bris excrementis in crisi.

PARVM VOMENTES] Quæ vomitio symptomatica est bilis continenter à iecore in ventricu-
lum prorepentis, nec vllam leuationem adfert: sed contrà caput grauioribus damnis auger.

AVRIUM ABSCESSVS HABENT] Necessariò, vel ex euentu. Ac necessariò quidem, in primigenia cerebri affectione, quam hominis facies turgidula iam soporati ostendit, nisi alius prorupta, parotidum materiam & occasionem tollat. Ex euentu autem, si hæmorrhagiæ inchoatæ deriuatio fiat pone aures, quod ipse innuisse videtur in prorrhethico, vbi non scripsit, vt hîc, σμικρὰ ἐμπαύδες, sed αἱματώδεια μικρά; quemadmodum & 6. ὅτι ὁπδήμ. Καὶ μὴ μόνον ἐγκαταλείπεται, ἐπιμονὴ τὸ νόσημα πρὸς ἀπίστασιν, i. si quid ex fluentibus relinquatur, promptius ad abscessum morbus. De parotidibus autem quæ & cuiusmodi sint, alio loco iam diximus priore libro; pluribus item dicemus in hoc secundo, si Dominus voluerit.

10 ANTEA VERO FACIEM CVM VETERNO TVMORES] Ac si diceret; suscipientis causæ præparatio maximum habet momentum ad ea quæ cuique accidunt suscipienda. Itaque turgidula facies velut ἐφθόνης εἰδηματώδης, indigenæ causæ soboles, vt in lethargo diximus, tum necessariò, tum ex euentu; symptomatis cataphorici consecrariam denunciat parotidem, quando ad caput translatio fit crudi & crassi humoris. Notum est illud. Ἐν κεφαλᾷ καὶ κώμα καὶ κώφωσις παρ' οὗ π' ἐξέρχεται, i. In cephalalgia prorrh. penul. & vi. 63. 1. cōmā & surditas ad aurem aliquid eructat. Et, Ὑποχόνδρις σπύγξις μετὰ κώματος ἀσώδους, καὶ κεφαλᾷ καὶ ἐπὶ τοῦ ὤτου, i. Tensio hypochondrij cum comate fastidioso & cephalalgia, ad aurem affluit.

7 Τὰ ἐξ αἵφνης ὀφθαλμοὶ ἀλυσμῶ· αἱμορραγικὰ.

10 Quæ continuo deliria exoriuntur cum iactatione coniuncta; hamorrhagiam cient.

PERTINET decisio hæc ad distinctionem suscipientis causæ, cuius ἀγνοία comparatur ex signis propriis morbi & partis obfessa, quæ dicuntur ὁμοειδῆ. Ergo si verum est, vt certè omnino est, quod posui superiore prægnosi, non inferiores esse partes excipientis cerebri, quàm efficientis causæ, vel ad generationem morbi, vel ad exclusionem materię morbosicæ, tum per excretionem, tum per abscessum; planè efficitur vt quemadmodū facies turgidula & œdematosa hominis iam soporati cum hypochondrij alterutra tensione coniuncta, quamcunque μετέπλυσεν & ἐπηχύνεν ad parotidas conuertit, nisi alius prorupta subrubris excrementis ipsas assurgere prohibet: ita facies prærubra cum aspectabili pulsu venarum atque delirio, hæmorrhagiam fore denunciat.

30 QUÆ CONTINVO DELIRIA EXORIVNTUR] Affectione partium & sanguinis bile perfusi, quæ citò cerebrum in sympathiam & contagionem possunt adducere, faceréque symptoma humoris morbosici proprium, quod est delirium non perpetuum. Nullum enim perpetuum est præter phrenitidem & consecrariam eius insaniam, quæ causam habent in cerebro firmiter fixam.

CVM IACTATIONE CONIUNCTA] I. Fastidio omnis figuræ & loci, propter cuiusque in decumbendo molestiam; quod sani faciunt laboriosi quando satagunt modò huius, modò illius negotij, omnis moris in quoque perficiendo impatientes; estque illud propriè τὸ δύνειν. Porro autem cum duplex omnino sit causa quæ facit ἀλυσμum, vna, proprietates quædam humoris molesti, non tamen multi, neque vsquequaque aluum replentis, sed in eius tunica stabulantis; altera verò facultatis à corporis gravitate oppressio quæ summam in decumbendo δυσφορίαν efficit, vnde ἀλυσμος: hæc sanè in huius ἀλυσμῷ αἰτιολογiam vsurpanda venit. aph. 44. 7. & 45. 1.

40 HÆMORRHAGIAM CIENT] Bene aut malè, prout ἀλυσμῷ tempus distinctionem adfert symptomatice iactationis, aut criticæ. Vide prognosin illam. Quicunque diebus criticis sine sudore perfrigerati prol. 27. 1. 1. tactantur, pessimè habent.

8 Τὰ κωματώδεια ἀσώδεια, ὀδυνώδεια ὑποχόνδρια, σπύγξις σμικρὰ πύονα· τὰ δ' οὗ ἐπάρματα.

50 Comatosa fastidiosa, dolentia hypochondria, spūta item crebra & pauca; tumorum pone aures prænuncia.

HVIUS decisionis ratio & explicatio in hunc locum apportanda ex comment. ad 6. huius cap. Sed hoc interest, quòd hîc pathologica mutatio est morbi & ægri; deinde quòd πυελισμὸς pro crebra & pauca vomitione vsurpetur, quæ duo tolerabilia sunt apud Hippocratem; postremò, quòd suscipientis causæ conditio prætermisita sit, quam illic non prætermisit. Itaque complexio est confusanea partim signorum ὁμοειδῶν, partim ἐπὶ ὁπδήμ, ex qua nihil statui potest neque necessariò, neque ex euentu 60 quid successurum sit.

9 Κωματώδεις ἢ ἐξ αἵφνης ἀσπασμῶδες;

Comatosi etiámne quid habent convulsificum?

EXTREMUM illud erat ut diceret de mutatione prioris mali in peius, quæ scilicet ferè accidit per causæ morbificæ & partis obsessæ alterationem maiorem, vel incrementum, quando ad oppressionem partis nobilissimæ accedit perennis materiæ morbificæ affluxus. Ergo si coma non excutitur lege critica, utrum habet conuulsionis euentum, nisi antea mortiferum sit? Enimuero coma mixtum quod in phrenitidem transit, conuulsione potest finire, per alienationis successionem ex alteratione prægrandi. At verò in simplici comate vndecunque nascatur, id locum non habet: quoniam eius natura & *ἵσχυς* consistit in resolutione; conuulsionis autem in tensione. Nisi fortasse quis adferat conuulsionis causam quæ ex euentu cernitur, quando vnius partis resolutio conuulsionem facit alterius. Sed istud esset deceptitium. Est enim par & æqualis in comate *λύσις*, ut nulla *ῥαγὶς* ex euentu fieri posse videatur.

10 Κωματώδεια μεμωρομένη κατὰ χα, ὑποχόνδρια καὶ κοιλίῳ ἐπληρωμένοι, δάπνοιτοι, ἀπολελαμμένοι, ἐφιδρουῦντες ἤρα τούτοις τὸ δουλερόν πνεῦμα, καὶ τὸ ρονοειδὲς δὴδόν, λύττα σημαίνῃ; κοιλίῃ δὲ ἤρα χαλώδης πρὸς διέρχεται; τὸ λαμπῶδες ἐν τούτοις οὐρηδὲν ὠφελεί, καὶ κοιλίᾳ δὲ τούτοις ἐκτρεφάσονται.

Comatosi fatui catochi, hypochondrijs & aluo prominuli, ciborum fastidiosi, alius nihil reddens, sudatiuncula exudans; etiāmine spiratio caliginosa, & genitalis urina singultum denunciat? an verò etiam biliosa alius una secedit? urina pellucida his adiumentum adfert: quinetiam ijs alui perturbata feruntur.

CONFVSANEA hæc symptomatum atque signorum sylua, *ἐνδεῖν* nullam ostendit quò fiant atque appareant, nec verò vllam *ἀπὸδεῖν* recipit quorsum & quamobrem ita fiant atque appareant. Sunt enim permulta reapse *αὐτοῦται*; plurima verò *ἐπεροχῶν*: ut nulla inde constitui possit doctrina nec disciplina medendi, quæ *ἐκ τῶν ὁμογῶν καὶ τῶν ὁμοειδῶν* comparari solet. Sed tamen experenda verborum & rerum explicatio, atque in hunc locum transponenda ex Galeni comment. ad prorrh. 6. §. 2. 1.

11 Εγκεφάλου σφακελίσαντος ὁ μὲν ἐν τῇσι τέλεισιν ἡμέρησιν, ὁ δὲ ἐν τῇσιν ἐβδόμησι τελευτῶσι. τὰς δὲ διαφύροντες σώζονται. Οἷσι δὲ ἀναλμηδεῖσι τῶν τοικτέων ὑρεθῇ διεσπικὸς τὸ ὅστέον. ἀπόλλυται.

Cerebro syderato, alij quidem tertio syderationis die, alij autem septimo vitam finiunt. Quibus elapsis, periculo defunguntur. Sin autem anatome facta, os dissociatum cernitur; sine dubio moriuntur.

QUÆ ex ancipiti certamine, incertòq; Marte naturæ & morbi ratio prælagendi comparata initur, ancipitem quoque habet euentum interitus aut salutis. Nec verò quæ à magisterio morbi instituitur, firmissimum illud adferre potest ad certam, stabilem, omninòque veram ac minimè fallacem prognosin. Excipio tantum apoplexiam, anginam primæ speciei, syncopen quoque cardiacam. At quæ prognosis ducitur *ἐκ τῶν ὁπφαινόμενων*, vix vnquam, vel nunquam potiùs aberrat à scopo. Multi sunt quidem terrifici morbi specie & magnitudine ipsa; sed nulli adimunt spem salutis, nulli certò mortiferi atque funesti, in quibus non appareant signa superatæ naturæ, quæ veteres *τὰ ὁπφαινόμενα θανατώδεια* nominarunt. Cernuntur hæc in qualitate corporis, actionibus, & excrementis. Vt in prægrandi plenitide spes in angusto est, nò tamen certa desperatio: ita nihil spei reliquum, quando in stertore, aut nulla est, aut certe exigua pèrque difficilis, & praua expurgatio, cum vrina prærubra & pulsu effæcto.

Sed quorsum, dicit aliquis, quorsum tam multa de morbis incerti iudicij atque mortiferis, quorum præsenfio cum distinctione iam commemorata ad fidem faciendam comparatur atque initur? Quia profectò videmus hoc loco descriptam syderationem cerebri, quamuis ipsa per se terrificæ sit, non autè videri funestam, quàm os caluariz dissociatum appareat; vel omnino semper esse mortiferam, etiam si dies funestos exegerit, si tale sit *ὁπφαινόμενον* dissociati ossis.

Ergo. CEREBRO SYDERATO] Per prolepsin vsurpato syderationis nomine, i. dum syderatur cerebrum, ut inchoata videatur syderatio, non autem numeris omnibus absoluta, quæ insanabilis est; tanquam

est; tanquam priuatione induta. Proptereaque melius legeretur, *σφακελίσις ἐκ φάρυγγος*, quàm *σφακελίσις*; melius etiam quàm in aphorismis ubi scripsit. *Οκτώσι σφακελίσις ὁ ἐκ φάρυγγος*: quod verbum *καταχρηστικῶς* aph. 48. 7. usurpatum defendit Galenus. Nam propriè sphacelus, perfectam cuiusque partis corruptionem significat. Sed quemadmodum carnis corruptio gangræna dici solet: ita syderatio ossis, nomen sibi vendicat. *τὸ σφακελῖν*, quod Hippocrates docuit, cum ait. *Καὶ ἔτι κίνδυνος σφακελίσις τὸ ὅσπερ τῆς πτέρης*, i. *Periculum ne syderetur os perna*. Alibi verò carnem corruptam nominauit *συνωρεῖν*, *μυδιάσαι*, καὶ *σηπόμεναι*, quam corruptionem carnis recentiores gangrænam dixerunt. Vt igitur multum interest inter gangrænam & *σηπόμεναι*, quod illa perfectam absolutamque *νεκρώσει* carnis significet; hoc verò, *μυδιάσαι*, i. *nigredinem* & inchoatam corruptionem. Sic inter sphacelon & *σφακελίσις*; ille enim, carbunculationem ossis; hoc verò, alterationem qua itur ad alienationem, denunciat. Atque ut sæpenumero rerum absolutarum verba & nomina pro inchoatis usurpantur: ita quoque hîc talis usurpatio consideranda videtur, ut *σφακελίσις* dicatur cerebrum, quod in corruptionis meru est. Sed qui sit, & cuiusmodi cerebri sphacelismus, quæso attentè videamus; tum autem, quibusnam signis ad illius sphacelismi cognitionem deducamur.

Enimvero, Aristoteli sphacelismus crudor est cerebri, quem facit *ὕγρασία πολλή καὶ ψυχρά*, i. *mador multus frigidus*, quem fortasse quis rectè nominauerit carum. Sed eum sphacelismum ita descripsit Hippocrates. *syderato cerebro, dolor ab occipitio in spinalem medullam inuadit, ac tum frigus ad cor peruadit, vnaque sudor citò cieitur, effluitque sanguis è naribus; nonnulli etiam vomunt; hic tribus diebus vitam finit. Et infra. si quem sphacelus corripit, dolor anticam potissimum capitis partem occupat, intumescit, liuescit, cum febre & cerebro rigore. Hunc secare oportet, neque abradendo quiescere, donec ventum sit ad diploidem.*

ALII QUIDEM, TRIBVS; ALII VERO, SEPTEM DIEBVS VITAM FINIUNT] Pro varia syderatæ partis conditione & situ. Nam syderato bregmate, & in puero, citior mors venit, quàm in occipite & aduultore.

QUIBVS ELAPSI, PERICVLO DEFVNGVNTVR] Ac si diceret, si causam melasmi fortis natura expulerit, aut medicus multum celeratque fidelis terebrando exhauserit, partique afflictæ neoterismum induxerit; restituentur.

SIN AVTEM ANATOME FACTA] Per decussatam carnis sectionem, & pericranij à caluaria meruentem inflammari, auulsionem.

OS DISSOCIATVM APPAREAT] Tactu & aspectu, & modiolò religiosè & prudenter circumactò, ut colore, caractere, & mole sit omnino à se mutatum, & à naturali connexionè & situ amotum.

MORIVNTVR] Quoniam signum est perfectæ *νεκρώσεως*, & quod omne viuens confortis mortui impatiens esse solet.

12. Τοῖς κεφαλαλγικοῖσιν, ὅσα ραγεῖσιν ἐκ τοῦ ὀπίθεν, ῥύσις ἐκ μυκτῆρος λαῦρος, παχεῖα, κακόν· ὀφθαλμὸν παραλῆσαι οὗτοι, ῥιγίλοι. ἢ εἰ καὶ κρῖνα φον διαρραγαί, σπασμώδεις;

Cephalalgicis ex caluaria posticæ fractura; si crassior è nare sanguis riuulosè prorumpat; graue malum denunciât. Atque cum prius oculo perdoluerint, rigent. An verò etiam quæ cadunt in tempora ossium effractura sunt conuulsifica?

HACTENVS de syderatione cerebri quæ *καὶ τὸ πρὸς τὴν ψυχὴν* usurpatur, quæque intra tertium diem in quibusdam, in aliis verò decidionem habet intra septimum, interitus aut salutis: ac salutis quidem, si naturæ virtus exoluat se causâ syderante per erysipelas faciei; aut si medicus ægri diligens & studiosus modiolò eximat tantum ossis caluariæ, quantum modiolus ipse suo circumactû complexitur, indeque sanam virulentam exhauriens partem *σφακελίσις* incipienti, sed quæ *σφακελισμὸν* nondum contraxit, neoterismum inducat. Sequitur ut de fracturis caluariæ hoc loco dicendum sit, ut disputationi institutæ colorum pulcherrimum imponamus. Disputatio quidem instituta fuit de symptomatis omnibus quæ capitem repleti & cerebri confectaria esse solent. Ea sunt, ut iam diximus, vel cephalalgica, vel cataphorica, vel catarrhoica. Ac singulorum decidiones sunt explicatæ, eorum scilicet quæ veniunt *ἀπὸ τοῦ ἐνὸς ὀπίθεν*, i. *ab internis quæ intra sunt*. Superest igitur ut idem faciamus in iis quæ incidunt *ἀπὸ τοῦ ἐξ ὧν*, i. *ab externis*, cuiusmodi sunt ea quæ capitis *πρόματα* nominantur. De quibus Hippocrates librum conscripsit, quo nihil diuinis inter medicorum & philosophorum scripta reperiri posse arbitror.

Ergo. CEPHALALGICIS EX CALVARIÆ POSTICÆ FRACTVRA] i. Quibus lapsu, vel casu, vel ictu telis obtusi, grauis, & duri, validis contorti viribus, fissa est capitis proiecatura postica, quam verticem vocat Hippocrates; aut si nulla sit proiecatura postica, quibus occipitis fissura grauiter dolet caput. Fissuram autem dixi, non *ἐσθλὴν*: quoniam hæc dicitur *ρῶγμα*, in qua longius excurrit linea quàm ubi telum infecerit, quæque semper coniunctam habet *τὴν φάρυγγα*, i. *collisionem*. Nam quicquid funditur, idem

ut collidatur necesse est; nec tamen hæc retro commeant. Potest etiã hoc loco intelligi effractura quam veteres nominarunt *πλοῦς ἐστὶν ἐσφράσσει*, quæ suo ambitu continet omnes differentias fracturarum, quæ sunt ἡ ἐσφρη, ἡ φράσις, ἡ ρήγμα, καὶ εἴσω ἐσφράσσει, i. teli sedes siue incisio, collisio, fissura, & effractura, in qua percussus os labat vel intro effringitur. Earum differentiarum descriptio in specie & idea cuiusque, accuratè scripta legitur in prædicto lib. *ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ τραύματος*. Hic autem vis magna posticæ proiecturæ illata ostenditur, quod & percussa findatur, & collisione summa sanguis exprimitur ad nares: sed hæc dicitur paulò post.

SI CRASSIOR E NARE SANGVIS RIVVLOSE PRORUMPAT] Ac si diceret; si non solum os percussum findatur, quod ægrè fit, quia crassissimum est, multaque carne contextum, propter eaque omnium facillimè ictibus ac telis quibusque resistit; sed si tanta, inquam, ictus ac teli vis fuerit, ut summa collisione sanguis exprimitur ad nares è venis & arteriis quæ coeunt in vas insigne quod videtur ad nares excurrit. Quæ causa est cur ipsa frons inter calvariae partes sola, & siru, & vasorum productione contineri dicatur; propterea quæ sola omnium, si percutiatur, inflammationi exposita: quoniam omnis percussæ calvariae inflammatio superuenit, quando pars quæ continet exonerat se in eam quæ continetur.

GRAVE MALVM DENVNCIAT ATQVE FACIT] Denunciat quidem, quoniam vis teli & ictus illata, non minùs ossi crassissimo calamitosa est, quàm mitior ictus temporibus atque fronti. Huc accedit quod sanguis niger proruptus, & sphacelissimi metum adfert, & cerebro crudorem & vinacitatis extinctionem inducit. Quod Halicarnasseo cuidam homini quinquagenario contigisse legimus, cui cum ad cephalalgiam & oralgiam liberaliter sanguis detractus fuisset, vacuitate sanguinis læsum est caput refrigeratum; indeque, cum delirio, mortis consecutionem habuit.

ATQVE CVM PRIVS OCULI PERDOLVERINT] Propagatione inflammationis dura meningis ad oculos, quibus in oris ipsa finitur.


RIGENT] Concepta rigoris causa, vel in parte quæ riger, vel in quam est recursus; in occipite scilicet unde primùm manauit, indeque in spinali medulla: quod signum est *παλινώπου* morbi, & sphacelissimi: qui denunciatur *ἀπὸ τῆς καλίδος εἰς τὴν περικύματα*.

lib. 2. de
morb.

AN VERO ETIAM QUÆ CADVNT IN TEMPORA OSSIVM QVASSATIONES, SVNT CONVULSIFICÆ?] Exoritur hic alia quæstio de fractura calvariae, utrum quassata temporum ossa convulsionem adferant; sicut ingens fissura & effractura occipitis, hæmorrhagiam. De qua quid statuam, sustineto donec habeas capite ei rei consecrato, sub finem istius libri.

DE AVRIVM AFFECTIBVS.

CAP. III.



ΤΟ Σ πόνος σιώντονος μὲν πυρετὸς ὀξείος, καὶ ἄλλὰ τῶν σημείων τῆς ὑποδυσκόλων, ἐστὶν μὲν νέους ἐβδομαίοις κτείνει, καὶ σιώντωτόν, ὡραφρονήσαντας, μὴ ρυένιος πολλοὶ πύξ ἐκ τῶν ὠτῶν, ἢ ἐκ ρινῶν αἱμαίος, μηδὲ ἄλλου τῶν σημείων χησὸς χημοδύς. τοῖς δὲ πρεσβυτέροις βραδύτόν, καὶ ἥσων δύαμρεῖ. πᾶτε γὰρ ὦτα φθάνει ἐκπύειν, καὶ ὡραφρονέοισιν ἥσων. ὑποσσεφολοῖσι δὲ πολλοὶ τείλων, καὶ ἀπόλλυνται οὕτως.

Aurium dolor intensus cum febre acuta, cumque sinistro quopiam signo; iuvenes quidem, septimo die aut etiam celerius; nec sua mentis, interimit, si quidem nec liberale sit expuratum ex aure, neque ex naribus hæmorrhagia; nec verò salutare aliud adfuerit signum: seniores autem & serius & rarius tollit. Nam suppuratum præuertit, nec ita delirant. Sed tamen plerisque horum morbus reuertit, atque sic moriuntur.

A CAPITE & cerebro transitus est per progressum vel transitum ad aures, quæ granibus admodum morbis obnoxia sunt: neque profectò alius vel importunior, vel acutior morbus est, quàm is qui symptomata exhibet, tum epigenomena, tum epiphænomena aurium inflammatione obsessarum. Sanè aurium inflammationes atque dolores eiusmodi sæpe sunt, ut ad dementiam mortemque præcipitent.

pirent. Atque in auribus quàm in oculis aliquanto maius periculum est, quòd oculorū vitia intra ipsos nocent; aurium verò inflammationes facilem habent cum cerebro sympathiam facilemque recursum. Quò magis inter initia protinus succurrendum est, ne maiori periculo locus sit.

ERGO. AVRIVM] Scilicet interiorum, non exteriorum quæ nominantur auriculæ, quia iure nullo societatis cum cerebro sympathiam habere possunt, quemadmodum audiendi meatus in cavitare ossium temporalium anfractuosa quæ ad cerebri amplitudinem excurrit, membranamque accipit acerrimi sensus, & neruum ad audiendi vim accipit quintæ coniugationis. Atque in eo sinu vernaculus quidam aer ambiendi consocialis, triaq; item ossicula, malleoli & incudis, stapedisque similia continentur.

DOLOR INTENSVS] In quo acerbioris & molestiæ summa sunt omnia, cuiusmodi esse solet inflammatorius in parte sensus exactissimi; unde materia effera, tanquam in ergastulo conclusa, nequit exire nec exudare, proptereaque perennis syntimoria est morbi & causæ morbificæ. Atque cum dolorem melius idem præceptor nominat *ὀδυνην ὀξείαν* in prognostico.

CVM FEBRE ACUTA] Doloris ipsius & inflammationis consecutaria. Est enim aurium inflammationum tanta vis dolorifica, ut febrem habeat symptomaticam; more magnorum morborum, maxime verò eorum qui inter ipsos eximij sunt. In prognostico eam febrem acutam propriis notis expressit, cum ait, *συνεπὴς ἔσται τε καὶ ἰσχυρὰ*, i. cum febre continua & vehemente. Est enim febris acuta quæ celeriter, continenter, & vehementer mouetur; ut febris hæc primigenia videri possit, quæ per propagationem causæ morbificæ, aures afficiat. Sed nihil est *συνεπὴς*, i. intensum, quod adiunctum non habeat *πὸ δυνάμεως*, i. continuum. Atqui partium & humorum affectiones quæ cæteras in contagionem adducere possunt, *πὸ δυνάμεως* nunquam faciunt, i. contagiosi vitij assiduitatem.

ad commentum
prohibet.

CVMQVE SINISTRO QVORIAM SIGNO] Quoniam hic locus est fallax ad præsentionem certò instituendam; attendendum præcipit ad alia quoque signa quæ statim initio morbi apparent: sed *πεπρωμένον* nominavit *ὑποδυσκολα* quæ veriùs dicuntur *καίμια ἢ τανατώδεια*. Sunt autem in primis cephalalgia, dementia, & vrina prava tum alba, tum prærubra.

IUVENES QVIDEM, SEPTIMO DIE] Iuvenes quidem, quòd temperamento & complexionem sint biliosi. Est enim iuuenibus *πυρρὰ καὶ θερμὴ τῆς κράσεως*, i. biliosum & calidum temperamentum, proptereaque inflammationibus mirum in modum exercentur. Septimo autem die, quemadmodum cephalalgici ex dolore intenso. Nam peracuti morbi intra septimum diem decisionem faciunt interitus aut salutis.

AVT ETIAM CELERIVS] Idem quoque scripsit in prognostico, & lib. 6. *ἢ ὀδυνη. Δι' οὐδ' αὖ τινος καὶ ἐξ οὐδ' αὖ τινος, τὰ πρὸς τῇ τρίτῃ καὶ τεταρτῇ*, i. Per aures & ab auribus plerique tertio die moriuntur. Quem locum enarrans Galenus sic ait. Sæpenumero grauis morbus aures corripuit, qui serpendo, serie quadam, propter continuitatem, prorepat ad cerebrum, mortisque causa fuit. Sæpe etiam contingit ut cum magna materiæ copia cerebrum obsideret, eam natura amandarit ad aures, agrotantique perniciem attulerit.

NECSVÆ MENTIS INTERIMIT] Doloris acerbitate, cerebri ardore conflagentis exolutione. Tales autem è potestate mentis exeunt, concepta in cerebro phrenitidis causa, quæ facilem habet mutationem in atram bilem, facilemque adfert cerebro alienationem ex alteratione prægrandi.

SI QVIDEM NEC LIBERALE SIT EXPVRATVM] Hæc salutaris & propria crisis est omnium phlegmonarum, non expectanda tamen, ut experenda, in capite aut visceribus. Nam suppurabilis materia & inflammatio, priusquam suppuratum concipiat, multos ad exitum præcipitat. Ac suppurato quidem & expurato aurium dolor exoluitur, si febris quicuerit forè primigenia, cum saluari signo vrinæ.

NEQVE EXNARIBVS HÆMORRHAGIA] Quæ phlegmonarum initiis facit ut non solum periculo, sed etiam morbo defungantur ægroti, præcepta inflammationis & febris materia & occasione. Sic hypochondriaca inflammatio, sic etiam cephalica, non solum inchoata, sed etiam perfecta quiescit.

NEC VERO SALVTARE ALIVD PRÆSTO FVERIT SIGNVM] Cuiusmodi esse solet *ὑποδυσκολα* materiæ inflammatoriæ, doloris remissio, somnus delirium sedans, febris vacuitas, aliis pro-rupta biliosis humoribus.

SENIORES AVTÈM] i. Homines constantis ætatis, & senes crudos.

SERIVS ET RARIVS TOLLIT] Nam suppuratum præuertit, nec ita delirant, cum æquè calido non sint temperamento gradum coctionis superante.

SED TAMEN PLEVISQVE HORVM MORBVS REVERTIT] Non sic defunguntur priore morbo, ut non iteratò recrudescat, ob pepasmi & excretionis inchoatum, non autem perfectum motum.

ATQVE SIC MORIVNTVR] Ferendo posteriori morbo impares viribus, quas prior infregit.

2 *Κωφωσις ἐν ὀξείῃ καὶ τραχώδεϊ ὀδοντολογουδοῦσα, κακὸν κακὸν*
60 *δὲ καὶ ἐν τοῖσι μακροῖσι. ἀλλὰ δὲ τοῦτέοισι καὶ ἐς ἰσχία πόνοις.*

Surditas morbi acuti turbulentique succedanea, graue est malum: graue est item surditas diuturni. Quinetiā his dolores profert ad coxas.

SEQUITUR vt patefacto doloris inflammatorij periculo & crisi, prout cuiusque laborantis comparata est natura vniuersalis & particularis; sequitur, inquam, vt de ipsis aurium morbis, quatenus in vitio sunt functione propria, hoc loco dicendum sit. Præcipuum autem symptoma cernitur in surditate: sicut oculorum in cæcitate. Est autem surditas, perfecta offensio auditus: quemadmodum cæcitas ipsa visus. Ac secundum cæcitatem misera est conditio surditatis, auriumque quæ obsurduerunt: quoniam earum vsum proximum à luminibus nobis natura dedit. Sed tamen surditate non vsque adeo exterreri debemus, nec symptōmate, nec signo, donec perspecta fuerit eius causa, firmiterne fixa, & vbi; an verò leniter pressa ad exigui prædicationem temporis atque fugax. Enimuero firmiter fixa in facultate audiendi cum febre acuta, metu nos terret, tanquam fatalis ad interitum. Stabilis autem in vitio instrumenti, & febris experts, nihil terrificum præ se fert: miserationem tantum mouet amicis. At verò surditas leuiter pressa & fugax in morbis acutis, cum sanè habet euentum sinistri aut secundi iudicij, quem ipsa translatio vel propagatio, quo iure quaque iniuria, quòve item loco denunciat; & succedanea illius symptomata, vt sunt parotides, hæmorrhagia, alui profluuium, & coxæ abscessus. Est enim talis surditas in quibusdam critica; in aliis symptomata.

His ita constitutis. **SURDITAS**] i. Auditus interceptio, quæ fit impedito prohibitōque appulsu *ἢ ἀκουστικῶν*, i. audiendorum; vel *ἢ ἀκουστικῶν*, i. auditorij effceta virtute.

SUCCEDEANEA MORBI ACUTI TURBULENTI QVÆ] i. Delirij, cuius prænuncia esse solet perturbatio. *Ταραχὴ* per autem morbum dixit turbulentum, in quo delirium dementiaque splendet. Est igitur hæc surditas morbi acuti turbulentique succedanea; hoc est, delirij atque dementia.

GRAVE MALVM] Non quidem symptōmate læsæ actionis vnde malorum accessio sit ac damnis afficiatur ægrotus: sed signo labefactatæ partis illius cerebri vnde vis audiendi manat. Vt enim roboris exolutio est, ita vacatio facultatis. Huiusmodi sunt illa iā explicata. *Quibus morbo iam fractu, videndi vis audiendi ve perit, mors in propinquo est.* Existunt enim multæ in cerebro mansiones, quarum integritas, variæque vitia, propriis cuiusque neruis, in sensuum instrumentis apparent. Nam surditatis leuiter pressæ atque fugacis in febre, vnde illa veniat, & quorsum appareat, causas aperiet quæ huic citima est prognōsis mox enarranda.

GRAVE EST ITEM SURDITAS DIUTVNI] Pars hæc prognōsis non legitur in prothetico, vbi superior sententia Galeni commentatio probatur verissima, & illustratur. Est autem veluti aphorismus quidam & breuiarium excerptum de historia Heropyti Abderitæ quæ narratur 3. *ἢ 6. m. d. part. 3.* Fuit Heropytus Abderita cephalalgicus *ἰσχυρὰ δὲ*, i. ita vt cephalalgiam haberet sueque deque, per aliquot dies. Inde acuta febre correptus decubuit, decimoquarto febris die obsurduit, durauit hæc surditas cum perturbatione atque delirio ad quadragesimum diem, quo sanguis prorupit è naribus, vnde resipuit, factusque è surdo surdafter. Deinceps à quadragesimo ad sexagesimum, crebra fuit hæmorrhagia, sed modica, cuius eo diu vacationem habuit. Ac tum acerbissimus dolor coxam dextram exerceuit, febris incanduit, nec ita multò post inferiorum omnium partium dolores venerunt. Denique ita res erant, vt vicissitudo quædam cerneretur febris cum surditate, & doloris ipsius coxarij. Nam in leuatione febris, incrementum erat doloris coxarij; & contrà, in huius remissione, febris exacerbatio. Atque in illa successione mutua laborum, tandem ad octogesimum ventum est diem, quo quidem omnia concesserunt, nihil tamen ex toto dimisit. Ad postremum, centesimo die omnia quicuerunt, febris & surditas exolutæ fuerunt, prorupta biliosis excrementis liberaliter aluo, editisque pepalms signis octogesimo. Itaque periculosam putauit surditatem in diuturno morbo, qualem exegit Heropytus ad centesimum diem, qui validarum virium beneficio morbi mortiferi curationem habuit: eaque curatio propemodum miraculo apponi debet.

3 Ἐν πυρετοῖσι, κώφωσις κοιλίῳ ἐφίστησιν.

In febre, surditas aluum sistit.

EXISTIT altera surditatis causa quæ in meatus auditorij oppilatione consistit: quemadmodum superior in exolutione partis illius cerebri vnde vis audiendi manat; proptereaque vt illa per se insanabilis est, ita morbi acuti turbulentique consecutaria desperationem salutis ostendit. Sed oppilationis qua impeditur appulsus *ἢ ἀκουστικῶν* ad partem illam cerebri in cuius virtute vis audiendi posita est, oppilationis, inquam, non vnica consideratio est. Etenim quæ in vetustatem incidit, eius inueteratio curationem vix recipit. Repentina autem, febris quidem experts, locum habet remediis conuenienter præscriptis, si diuturna non fuerit morbosæ causæ generatio, quam multiplex & varia echo multò antè denunciat; febris verò particeps, bene aut malè, commodo aut incommodo ægri finitur, quatenus critica aut symptomata est.

Quæ cum ita sint. **IN FEBRE**] Quæ scilicet in contagionem cerebrum ipsum adducit, eoque transitum facit vel progressum febrilis materiæ, vt in Heropyto.

SURDITAS] i. Auditus interceptio per impedimentum appulsus *ἢ ἀκουστικῶν*, propter oppilationem meatus, vel auditorij nerui offensionem. Qualis enim est conditio crystallini humoris ad visionem faciendam, talis & intimæ auditorij meatus orz vbi dilatarum neruum attingit. Ergo surditas vitio instrumenti, non facultatis, qualis descripta est superiore prognōsi.

ALVVM SISTIT] Quoniam perraro accidit vt simul existat sursum deorsumque humoris concitatio atque commotio, si choleram tantum exceperis, quæ toto genere symptomatrica est, nisi in lypyria febre quam sola exoluit. Talis autem surditas aluum sistit, non ratione sui, sed causæ suppressæ aluum ducentis. Est autem hæc, bilis excusus sursum ad caput: quamvis inducendæ surditati aptior sit frigidus humor per oppilationem meatus, & intimæ oræ stuporem. Sed tamen in febre surditatis causa est nimia bilio si humoris ad aures translati abundantia. Quæ causa est, cur & biliosæ deiectiones abducta surditate subsistant: & contrâ, surditas exoluitur aluo prorupta biliosis excrementis. Sic enim Heropyro surditas aluum stertit, quem alui profluuium, & dysenteria, surditate & coxario dolore celeriter explicauit. Ac de successione mutua surditatis & alui suppressæ, per multa sunt alibi literis Hippocraticis exarata, & à Galeno commentariis illustrata.

aph. 28. 4.
86. 60. 4.

4 Ωτα ψυχρά, καὶ διαφανέα, καὶ σινεσαλμύρα· ὀλέθριον.

Frigida aures, pellucida, inuersæ; ad ultima iam venturæ esse testantur.

CONSENTANEVM est etiam complecti animo quantum auriculæ sint à se mutatae in qualitate, & habitu corporis quæque sui. Sunt enim *πυκνέμενα* quibus deducimur ad præsensuionem futuri interitus, quando ita constitutæ apparent, vt iam vltimis propinqua esse omnia testentur: non secus atque nares acutæ, oculi concaui, collapsa tempora, cutis circa frontem intenta & dura. Quemadmodum igitur vesicæ *ἀμαρτησία* in morbis acutis, vnde vrina supprimitur; quemadmodum etiam *κατὰ ψυχρὰς μετέσλην-
ρουσιν*, i. partium extimarum liquor & refrigeratio: sic etiam auriculæ frigida, inuersæ, pellucida, mortem in propinquo esse denunciant. Quamobrem verò ita sit, paucis aperiam.

AVRICULÆ] Sic enim *Ωτα* distinxit Galenus in aurem interiorem, & exteriorem quam prisci Latini auriculam nominarunt, quæ systasin habet cartilagineam.

FRIGIDA] Quia frigoris capacissima, vt corpus cartilagineum paucò sanguine irrigatum, & nulla carne vestitum; facileque ab exhausto laborant vitalis principij vnde frigent; nec incalescunt nectaris viuifici affluxu, quo præter cætera defraudantur.

PELLUCIDÆ] i. Sic albescentes emortuæ, vt marmore albo frigidiores & politiores videantur.

NON ENIM SIC PELLUCIDÆ SUNT vt lumen & lucem transmittant, quemadmodum æther, aer, vitrum.

INVERSA] Per quandam conuulsionis speciem, neruum illum versus, vnde sentiendi facultatem accipiunt. Non enim mouentur nisi in iis quibus supra auricularum radices latus proreperit musculus.

MORTIFERÆ] Quoniam ad vltima ventum esse testantur. Vltima autem dico, consumptionem humidi primigenij in quo est vita, & caloris vitalis, nectarisque viuifici extremam paupertatem, vnde vita reficitur, eiusque dissipatio instauratur.

5 Βόμβος ἐν ὀξείᾳ, καὶ ἤχος ἐν ὥσιν· θανάσιμον.

40 *Bombus in acutis, & echo in aure; mortiferum.*

ACVTORVM morborum omnia tum pathognomonica, tum epigenomena, tum epiphænomena, certis definita distinctaque legibus, quorsum & quemadmodum illa fiant atque appareant, operæ precium est complecti animo ad bene & conuenienter cuique medendum. Sed inter eas leges quæ de morborum natura, deque illorum causis atque symptomatis sancuntur, nullæ sunt magis medico necessariæ, quàm illæ quæ ex insolentium rerum obseruatione nascuntur. Huiusmodi sunt coma in acutis, partium extimarum cita in vtrumque mutatio, & fitis huiusmodi; bombus, echo, vrinæ albæ, cæteraque omnia quæ sunt quæque apparent contra naturam morbi aut ægri. Quid enim minus est morbi acuti quàm coma, bombus, & echo? Sunt quidem hæc omnia crudi humoris & spiritus flatulenti *ἐκ-
ρα*, non autem sanguinis bile perfunsi; qui regnare dicitur in febre acuta, propterea que non sine causa videtur terrifica, sæpe etiam mortifera atque funesta, quatenus longissimè absunt à natura febris acutæ.

Quæ cum ita sint. BOMBVS] i. Flatus crassior qui bombilat, more apum, in ora interiore meatus auditorij, & ab ampliore loco repulsam passus, vt ita dicam, in angustiore agitur, vnde exitum habere non potuit. Quæ causa est cur spiritus ille flatulentum, magno cum murmure interioris oræ meatus auditorij fremat, vbi scilicet dilatatum neruum attingit qui excipit sonorum appulsus, facitque *πῶς ἀκούει*. Hinc aeris vernaculi integritas labefactatur, nec tum est ampliùs ambiententi consocialis. Enimvero vernaculus ille aer silenti motu præditus, nunquam fremit nec tinnit ipse per se, nisi cum digitus in aurem impingitur, aliudve quippiam meatum oppilat. Ac tum illo fremitu auribus bene esse testatur, & naturæ & valetudinis curæ.

ERGO. BOMBVS IN ACVTIS] Qui non solum celeriter, continenter, & vehementer mouentur; sed etiam sunt *Γεωχόδους*, indigena vel aduena causa. Nec verò bombus ille excusationem ullam habet perturbationis criticæ ad futuram hæmorrhagiam, vt fere nunquam habet; quemadmodum echo.

ET ECHO IN AURE] i. In meatu auditorio elisi flatus sonori sonorum varietate distincti, pro-

flatulenti spiritus crassitudine aut tenuitate, meatus angustia aut libertate, facultatis expultricis contentione aut remissione. Atque inter bombum & echo hoc interest, quod in bombo solum murmur bombilar in ora interiore meatus auditorij, neque eliditur; in echo autem, spiritus elisio est quæ sonum edit grauem, acutum, mixtum; prout conspiratio est facultatis, flatuum, atque meatuum. Est autem varietas nulla in bombo, nisi καὶ ἤσιν καὶ μᾶλλον, i. secundum magis & minus. Sed tamen echus nomen non raro καθ' ἑσπερινὸν vsurpatur, ac fortè sapius quàm κωϊός. Hic autem propriè vsurpatum, suspicionem non adfert criticæ perturbationis ad hæmorrhagiam, cuius echo non raro prænuncia esse solet: vt in illo. Percussus caput, aurium echo, hæmorrhagiam ciens. Sed ipsam echo dixit in aure: quoniam flatu sonoro per sonat auris, qui vel sonum edit sibili, vel crepitus, vel etiam stridoris cuiusdam: quod in bombo fieri nequit ob causas prædictas.

Coac. 8.
cap. 1. & lib.

MORTIFERUM] Quoniam neque indicatorium, neque iudicans, propterea non solum difficilis iudicij, sed etiam mortiferum. Vt enim indicatoria non iudicantia in excretionibus sunt lethalia, quando excrementa sunt toto genere praua: sic in qualitate corporis & actionibus dyscritis, vel in acrisia susceptis quæ absolutam nobilissimæ partis exolutionem ostendunt, cum ipsius causæ exoluentis perennitate; non solum in angusto spem esse, verumetiam mortem propè abesse declarant. Talis explicata ratio est surditatis morbi acuti, turbulentique consecrariæ.

6 Ηχοι μὲν ἀμβλυωσμοῦ, καὶ κατὰ ρίνας βαρέος· ὀφθαλμοῦ, καὶ αἰμορραγίας.

Huius regulæ veritas anquiri non potest, nec propalam explicari.

Meliùs sic.

Εν τοῖσι καυσώδεσιν, ἤχων πρεσβυμορμίων μὲν ἀμβλυωσμοῦ, καὶ κατὰ ρίνας βαρέος· ὁρίζονται μὴ αἰμορραγίαν, μὴ αἰμορραγίαν.

In calidis febribus, sonori aurium flatus cum visus hebetudine & narium grauitate, sanguine non prorumpente; è potestate mentis abducunt.

Cuius rei explicatio in hunc locum transponenda ex commentario ad 137. lib. 1.

7 Οἷσι κώφωσις μετὰ καρηβαρίας, καὶ ὑποχονδρίας ἐνιάσιος, καὶ πρὸς αὐτὰς ἐνοχλεῖν· αἰμορροεῖ.

Quibus aures obsurduerunt cum grauitate capitis, hypochondrij tensione, & splendoris offensione; sanguis è nare prorumpit.

Ex hac surditate afflatur veluti quædam aura salutis, quatenus hæmorrhagiam denunciat salutarem. Nam surditas morbi acuti turbulentique consecraria planè παναγίας habetur, nec inde longè abest symptomatica echo, & bombus in morbis acutis. At surditas quæ alium sistit per febrem, siquidem comitata fuerit signis pepasmi, vel hæmorrhagiæ ciet; vel facit vt postliminio alius feratur subtribris excrementis, & dysentericis, atque ita fœliciter subleuetur saluis & integris ægri rebus. Hic autem signa ὁμοειδῆ continentur hæmorrhagiæ iamiam futuræ, cum surditate coniuncta; nempe splendoris offensio, & tēsis hypochondrij; quorum illud, causæ coniunctæ; hoc verò, antecedentis certissimum est argumentum: quando scilicet constat transitum fieri sanguinis bile perfuncti ad caput, vnde vel hæmorrhagiæ cietur, vel delirium excitatur. Hoc autem loco sperabilis hæmorrhagiæ, non formidabilis delirij, firmissimum illud est quod initio posui, nempe vrinæ pepasmi, qui vt celeritatem, ita securitatem crisis denunciat.

Itaque. QUIBUS AVRES OBSURDVERUNT] Cita surditate quæ alium sistit, non ratione fui, sed reuocatione bilis alium ducentis: quoniam perraro accidit vt concitatio bilis sursum vnâ, deorsumque feratur. Itaque sursum trāsata surditatem inducit per oppilationem meatus auditorij, & impedimentum appulsus πρὸς αὐτῶν ad domicilium τῆς αἰσῆς.

CUM GRAVITATE CAPITIS] Vt cephalalgia causa in cerebro mansionem habere putetur, quod ipsa grauitate ostenditur, non autem solo dolore & πόνῳ qui non raro accidit per sympathiam; grauitas verò nunquam: ex quo efficitur vacationem inde suscipiendam, vbi grauitatis sensus est atque perceptio: propterea hinc meliùs τὴν καρηβαρίαν, & appositè magis ad hæmorrhagiæ præfensionem appo-

fuit, quàm

fuit, quàm in prognost. τὸ κεφάλαιον δόξεν, i. caput dolere: quæ affectio nō minùs sympathica est, quàm idiopathica. Declarat illud ipsum quod idem τὸ κεφάλαιον δόξεν, prænuncium esse dixerit vomitionis, ut paulò post hæmorrhagiæ. Atqui nemo dubitat quin cephalalgia prænuncia sympathica sit: quemadmodum hæmorrhagiæ idiopathica. Tum enim per hæmorrhagiam indigena cephalalgia causa excluditur, vel etiam aduenia quæ iam in cerebro stabulatur.

HYPOCHONDRII TENSIONE] Dextri præsertim, quæ vacationem habeat inflammationis atque doloris. Hæc enim febrium acutarum crîsim per hæmorrhagiam ostendit: quemadmodum ipsa tensio dura & dolorifica hæmorrhagiam ciet, indeque quiescit, alioqui mortifera, nisi suppurato & expurato conuenienti funesta vis præueniatur. Nam in particularibus morbis, exempli causa, in suppurato pulmonis non expurato, hypochondrii tensio superueniens, opinionem facit abscessus cruralis.

ET SPLENDORIS OFFENSIONE] Sic enim τὸ ἐν ὄφθαλμοῖς πῦρ ἀνίσταται, vertendum putant, quòd illud eòdem spectare videatur, quòd scriptus in prognostico ἀμβλυωμένος, ἢ μετὰ δόρυ γὰρ πρὸς φαίνεσθαι, ἢ τὸ ὀφθαλμὸς. Sunt enim molestæ illæ quasi quædam ignis scintillæ, aut fulgetræ quædā fugaces quæ ob oculos obuersantur. Quinetiam splendoris appulsus oculi molestè ferunt prærubri, in lacrymis ultro manantibus, quæ sunt etiam hæmorrhagiæ indices, nisi fortè sint ad interitum fatales. Sed illæ scintillæ signa sunt conspurcari spiritus à sanguine bilioso, qui non antè quiescit quàm ad extimas venarum oras peruenit, quarum anastomosis, qua data porta, factaque vi via, profunditur.

SANGVIS E NARE PRORVMPI] Maximè verò iuuenibus, temperamento, habitu, & vitæ instituto, ac victus ratione biliosis. &c. Vide octauam cap. 1. decisionem, & alias multas.

8 Εὐδὲ πύρετῳ ὦτα κωφοῦνται, μανικόν.

In acuta febre aures obsurdescere, furiosum.

SYPERSTITIO esset vel ostentatio distinctiones adferre delirij symptomatici, phrenitidis, atque insaniz. Sunt enim hæc legibus definita atque distincta, quæ si repetenda essent transferendæque in hunc locum, necessariò illud usurparemus quod alibi scripsit Galenus, ἐπὶ τῶν ὁμοίων ὁμοία λέγει ἀναγκαῖον, i. in similibus similia cogimur d. cere. Constat igitur quòd insania phrenitidis hoc loco succedanea est per ὁδοπέρας, i. concessum iter bilis flauæ in atram, quod facillimum esse solet quando bilis flaua exitum non habuit post longum certamen, longamque in cerebro moram; vnde surditas succedanea, quæ antè fuerat hæmorrhagiæ prænuncia. Huius autem prognoscens ratio & explicatio continetur comment. ad prognosin 137. prioris libri.

9 Οἱ δύσκωφοι ἐν τῷ λαμβάνειν τρομώδεις, γλῶσσαν παρὰ λευμῶν, νεύροι· κακόν.

Egregiè surdi, capiendo contremiscentes, lingua etiam capti, exoluti; grauissimum habent malum.

QUEMADMODUM surditatis commoda sunt explicata, quando cum signis hæmorrhagiæ coniuncta est, si ipsa hæmorrhagia accesserit; quemadmodum etiam eiusdem surditatis incommoda sunt patefacta, si ea sit irrita hæmorrhagiæ succedanea: sic in hac prognosi catalogus recensetur omnium symptomatum cerebri, quæque proferuntur à cerebro, ab eadem surditatis causa, hoc est à multarum cerebri mansionum exolutione. Est enim surditas cum vrinæ pepasmo, hypochondrii tensione indolente, & splendoris offensione; hæmorrhagica. Est item surditas irrita hæmorrhagiæ, turbulentique somni succedanea, furiosa. At verò prægrandis surditas quæ totum cerebrum ab exolutione in vitio esse testatur, cuiusmodi illa sit & quorsum appareat; declarabit huius prognoscens decisio his verbis concepta.

EGREGIÈ SURDI.] i. In quibus eximia sunt omnia surditatis, ut ea vix vnquam aut nunquam sanescat: quemadmodum lentiginosi & albescentes dicuntur δυσκλίεις, quòd eorum vlcera difficulter & ægrè sanescant; contra qui corporis habent εὐχολίαν καὶ εὐδωρίαν, i. succi bonitatem & carnis, tenera sunt τρυφερά; non quòd illi faciliùs quàm cæteri sauciantur, sed quòd faciliùs curationem recipiant.

CAPIENDO CONTREMISCENTES.] Scilicet manibus ipsis, quarum munus & officium est ἀπαινεῖν, i. apprehendendū. Contremiscunt autem, quòd in vitio sint nerui ex propagatione causæ tremoriferæ à cerebro in ceruicalem medullam. Est autem efforta vis principij ab exhausto laborantis. Nam solennis est mutua sympathia & syntimoria principiorum & quæ ab ipsis propagantur. Agnosco autem manuum tremorem alienari cerebri succedaneum, non alterationis phreniticæ consequentis prænuncium, qualem per sarcasum alibi dixit delirio ipso exolui.

LINGVA ETIAM CAPTI.] Labefactata parte illa cerebri vnde vis loquendi manat, nouemque musculis linguae defertur & datur, per neruos septimæ coniugationis, eaque paralytis homines facit ἀνίστους.

EXOLUTI] Qui subinde delabuntur ad pedes, nec potis est ipsos decumbere; exoluta, non oppressa facultate animali cuius imperio regitur ipsum corpus, etiam in decumbendo & dormiendo. Ac talis certe *κατὰ φύσιν* est veluti quædam *πείρασις* vniuersi corporis, unde venit commemorata *ἐπὶ φύσιν* quæ cernitur in iacendo, non autem in decumbendo. Est enim decubitus quædā actio, cuius priuatio *ἐπὶ φύσιν* nominatur.

GRAVISSIMUM HABENT MALVM] Quale dicuntur habere ij quibus in febre, nec sperabili vlla crisi, morbo iam fractis, videndi vis audiendive perit. Talibus enim mors instat, collapsa parte illa quæ olim, dum esset integra, libertatem spirandi, facultatemque instrumentis mouentibus impertiebat, quæ nunc adimitur non secus atque in apoplexia. Collapsæ autem partis signa in cerebro & à cerebro, ad vltimum ventum esse testantur.

10 Προσπορεύουσιν ὁρῶσιν, καὶ φῶσι, καὶ οὖρον ἐξέρχουσαν, ἀναίσχηνον, ἀναιωρῶμενόν· φθαρτικόν.

Ingrauescente morbo surditas, urinaque prærubra, nunquam refides, cum enæoremate; phrenitica sunt hæc.

VERISSIMUM illud est, quod sepe iam posui, theorema catholicum. Si ad præparationem suscipiētis causæ, vis aliunde similis magna & ingēs ingruerit, prioris mali in peius necessaria mutatio est. Tū illud. Quoties in vitio est pars aliqua nobilis officialis, vel idiota, accessione perenni causæ morbificæ damno augetur, sepe etiam labefactatur. Sic æruginosæ vomitiones cum surditate & vigiliis cōiunctæ, infaniam breui futuram ostendunt. Sic etiam deliria cum exolutione virium firmiter fixa, vel, vt ipse author expressit, *κατὰ φύσιν* mortifera. Ne plura confectæ quæ sunt innumerabilia.

INGRAUESCENTE MORBO] i. Qui vires acquirit eundo, neque mitescit pepasmo, neque vlla excretionē quæ faciat vt æger alacrius morbum ferat, si quidem morbum ex toto nō tollit, quod noster præceptor de bono & optimo sudore pronunciauit. Ergo ingrauescente morbo, symptomatum calamitosorum & signorum prauorum accessione & successione, per quæ deducimur ad cognitionem & scientiam inflammationis, venenatæ qualitatē, & symptomaticæ translationis ad partes illas quarum officio vita carere non potest.

SVRDITAS] Quæ nascitur obruta bilioso humore parte illa cerebri in qua domicilium est atque mansio *τῆς ἀκοῆς*.

VRINAQUE PRÆRUBRA] Non quidem multa bile saturata, sed inflammatione feri multum rubens. Sunt enim signa; vt Græci vocant, *αἰμασμία*, surditas per translationem biliosi humoris, & tincta bile vrina quæ potius expers esse debet biliosæ tincturæ. Est igitur multum rubens, inflammatione feri quod in venis & arteriis incendio conflagrauit. Vrina enim humorum qui in iis vasis continentur, quemadmodum complexionē & temperamento sint constituti, certissimum est argumentum. Nos autem prærubram vrinam potius quàm subrubram, hoc loco, legere & explicare maluimus; quoniam subrubra vrina, nec signo, nec causa, in malis ducenda. Quin etiam tales vrinæ secundum naturam coloratæ, ipsa coloratione sunt salutare: quamuis & tenues & cum diuulsis enæorematis excludantur, vt in Clazomenio annotauit. Quamobrem consideratē *ἐπὶ φύσιν* *ἐξέρχουσαν*, *αἰμασμία* *τὸ κατὰ φύσιν* legendum duximus & explicandum.

NUMQVAM RESIDENS] Sic visum est, *τὸ ἀναίσχηνον*, interpretari. Sunt enim huiusmodi vrinæ iumentorum similes, quæ Græcis *ὄρεα* nominantur. Nunquam enim talium vrinarum fæces, vt ita dicam, residunt; quales in vxoribus Philini & Dromeadæ ita describit. *Vrina ita crassa & turbida ac si perturbata esset, diu deposita non residunt. Colore & crassitie sunt iumentorum vrinis similes.* Pertinet igitur *τὸ ἀναίσχηνον* ad substantiam vrinæ, quæ nihil aliud est quàm serum quatuor qui in venis & arteriis continentur humorum. Denunciat autem, *τὸ ἀναίσχηνον*, summam in iis vasis perturbationem à flatulento spiritu, & insigni ardore febrili.

CVM ENÆOREMATE] Impropiè quidem dixit *ὄρεα* *διαφρενιμένα*, cum illud ipsum enæorematis nomen, vrinæ liquorem non exprimat, sed aliunde veniat à partibus quarum coctionem, perustionem, vel colliquamentum denunciat. Sic in Philisco legimus enæoremā rotundum, torosum; in aliis biliosum, nubeculosum, conglomeratum, nigrum; in aliis album, æquale, & læue. Nam enæorema pro hypostasi non raro vsurpatur. Erunt igitur *ὄρεα* *ὀφιστάμενα*, *διαφρενιμένα*, *ἀναίσχηνον*; & contrā, *ὄρεα* *κατὰ φύσιν*, *αἰμασμία*.

PHRENITICA SVNT HÆC] *Ομοίᾳ* quidem ab incendio natæ, sed non *ὁμοειδῆς*. Fuit enim Galeni constans illud de vrina iudicium, quod ea nunquam phrenitidem denunciat, sed ex ea tantum significatio fiat vt se habent iccur, renes, vesica; quemadmodum etiam valeant vasa ipsa sanguinem continentia, tum autem quàm vegeta sit facultas & potentia per quam humores procreantur & mitificantur. Sed tamen Hippocrates scripsit, vrinæ aqueas atque pellucidas, potissimum ad phrenitidem apparere. Idem præceptor ait perturbatas vrinæ iumentorum similes, præsentem cephalalgiam, aut mox futuram denunciat. Quin etiam in Larissæ virginis signum posuit *ὄρεα* *κατὰ φύσιν*, i. delirij, *κατὰ φύσιν* *μετὰ πορὶ ἐξιδρυμάτων*, i. enæorema suspensum, non fixum. Est igitur inter Coacas decisiones referendum illud quod legitur in prom. *Ἐν διαφρενίᾳ τὸ κατὰ φύσιν*, *τὸ κατὰ φύσιν* *τὸ μὴ πορὶ διζήματα ἀφανισθέν*. *ὄρεα* *κατὰ φύσιν* *καὶ οἷα κατὰ φύσιν*, i. Si quid in vrina pendulum cernitur, vaneſcente cruris dolore; phreniticum: tum si quid eiusmodi in echo appareat. Delirandi autem causa

10. Code:
cap. 1. 2
prop. 10. 1. 1

Icterefcere in his malum. Malum eft etiam ab ictero infatuari. Tales enim voce captos contingit cum integritate fenfuum strangulari. Fortaffe etiam cadet alium afflictaui fui officij.

12 Ἐπὶ κωφῶσδε καὶ νωθρίῃ, ἐκ ρινῶν ἀποσάzzειν, ἔχει π δύσκολον· ἐμ-
πος τειλέειν θερμόσδε, καὶ κοιλίης ταραχή.

Huius prognoscos prior pars veritatis luce omnino clarissima est, nec ullam continet ancipitem iudicandi rationem, si tantum illam *in demissionem* emendaris, ac pro ea substitueris *in demissionem* *in demissionem*, quod dignè & appositè fiet pro eo ac meretur ipsa hypothesis, quæ habet symptomata pathognomonica, epigenomena, & epiphænomena *in demissionem*, planè fatalia ad interitum. Cernuntur autem in furditate, torpore, & crebro delapsu ad pedes, substilloque sanguinis. Pars altera huius prognoscos omnem respicit philosophicam demonstrationem, quia non potis est benignè iis fieri quibus hæc mala contingunt. Nam per tantam infirmitatem saluti esse non potest vlla excretio.

hæc decernit;
proque iis
male fuit
invenitque
agnitum

SVRDITAS quæ alium sistit, & cetera simplex ab oppressione soporatum, certa sunt *natura* partitum, non quidem dolore & inflammationis sympathia eximiarum, cuiusmodi esse solent febrium ardentium succedaneæ, sed mediocrium tamen & spectabilium, in quibus cernere est vetus illud. Ne quid nimis. Id enim significat *materia*. Quod autem attinet ad fastidium, causa illius in hunc locum reponenda ex 6. Coac. cap. 2. huius 2. lib.

14 Κώφωσιν ἐκ πυρετῶν, ῥύσις ἢ ῥινῶν λυγρὰ, καὶ κοιλίης ταραχή.

*Surditatem ex febris natam soluit profluvium sanguinis è nari-
bus, aluique commotio.*

QUÆMADMODUM in febre surditas alium sistit: ita surditatem natam à febre exolvit proflu-
vium alui. Sic & hæmorrhagia lib. 4. aphor. Sed satis iam de hac quæstione antea nimum multa
prognosis suprà explicatis.

DE PAROTIDIBVS.

CAP. III.



A δὲ ὀδυνηρῶς τῶν οὐκ ἀνιστάμενα · ὀλέθρια.

1 *Qua verò dolenter ad aurem assurgunt: pestifera.*

HACTENUS de surditate, ex cuius perspicentia, causarumque eius, decisio-
nes pulcherrimæ sunt institutæ & explicatæ, quæ mirificos adferunt peritæ fru-
ctus ad bene & convenienter cuique surdo & surdastro medendum. De parotidi-
bus, loco, disputationem instituir, quod illæ sint auribus ipsis proximæ, atque ut ita dicam citimæ,
vnde nomen habent atque quodammodo sibi, inter vicinatis & societatis, id ipsum adoptant. Quineti-
am in parotide dolorifica periculo locus est: quemadmodum in auris interioris dolore intēso, quem
facit inflammatio cum febre acuta.

QUÆVERO] Ac si diceret. Patēfacta aurium molestia in signis atque symptomatis, sequitur
eorum, qui sub auribus nascuntur & oriuntur tumorum historiam prosequamur. Id enim aperit parti-
cula, δ, quæ semper instituti sermonis cum superiore connexionem ostendit.

DOLENT] Ex qualitate & copia humoris morbifici, & distensione, ac duritate, & renitu
partis obsessæ acerrimi sensus, vicinæque cogentis in contagionem & sympathiam afflictionis suæ. Sic
enim Galenus parotidum dolorificarum causas esse dixit τῶν τῶν θερμότητος καὶ δυσχερείας ἰσχυρῆς, ἢ σφοδρῆς, i.
paritum tensionem & vehementem intemperiem. Ex quo efficitur ut symptomatis vnius mentio, cætero-
rum omnium phlegmones magnæ propriorum complexionem ostendat. Sunt autem rubor, calor,
pulsus, renixus, dolor; quorum priora duo, sunt alteratæ partis propria; totidem posteriora, immuta-
ti habitus; postremum verò, ambarum commune.

AD AUREM ASSURGUNT] Opportunitate glandulæ quæ iacet ad aures, & rivulorum san-
guinis numerosa propagine, vnde partes illæ affluxus & refluxus incommoda faciliè experiuntur, per
orgasmum, exclusionem siue decubitus, & attractionem; quod omnium etiam glandularum
commune est, præsertim verò bubonum. Assurgunt autem tumore contra naturam prærubro, & do-
lorifico; à tensione magna glutinosi humoris firmiter & contumaciter impacti, tum à prægrandi in-
temperie calida quam secum portavit sanguis bile perfusus, tum per excursum, tum per recursum ex
irrita hæmorrhagia.

PESTIFERÆ] Primum quidem parte obsessæ, causæ vel unica consideratio sufficit ad calami-
tōsam vim ipsarum parotidum dolorificarum. Assurgunt enim sursum comprehendendo morbo im-
pares; proptereaque ita sunt pestiferæ, tum etiam doloris acerbitate, humorisque morbifici refluxu
ad cerebrum, & derivatione ad pulmones: vnde catholici illius theorematis veritas. Τὰ ἐπὶ δυνάμει ἀκρίτως
ἐξ αἵματος καὶ αἰμαλῶν ἵστα φλαῦρα, i. Quæ ex mala crisi dolorifica sunt, si repente flaccescant, mala. Huc accedit,
quod parotides rubræ & dolorificæ, siue sint expertes siue participes suppurati, semper periculi loci ha-
bent; expertes quidem, nisi liberaliter biliosis excrementis alius feratur, profluatve vrina, ut in Cla-
zomēnio; participes verò, si vniuersitatis excrementa mancant cruda & prava. In vniuersum, tales pa-
rotides dici non possunt δίοσχοι, ut Cassius voluit, à fausto salutis omine. Sunt enim abscessus ἡμῶν
neque ἀνάρροποι, i. semisui, non rependentes.

2 Τὰ τῶν οὐκ, ἐκ τῆς ἐμπεραδεν ἀλήμειος, ἐρυθήμειος ἐν πυρετοῖς
γινόμενα · σημεῖον μὲν ἐρυθπέλειος ἐπὶ προσωπῆς ἐσομύου. ἀτὰρ καὶ
αἰσθητοὶ ἐκ τῆς ποιουτέων γίνονται μὲν ἀφωνίης, καὶ ἐκλύσις.

*Parotides rubræ, exacti iam morbi superstitēs, in febris orta; signa
sunt erysipelatis in facie nascituri. Quinetiam ex talibus convulsiones
veniunt cum aphonia & exolutione.*

MORBORVM naturam & causas tenere, est hoc sanè aliquid, vel potius multum. At successiones morborum, quò se illi vertant, velut è specula, prauideri; profectò est artificis fulgore suo vrentis, ar-
tisque infra se positas prauigantis. Sed admirabile est quantam in medicis admirabilitatem faciat pa-
tèdum vera certaque prognòsis, qualem hoc loco nobis explicandam proposuit.

PAROTIDES RUBRÆ] Sic enim vertendum duxi πὰρ ὅς ἐρυθματὰ, i. ad verbum, sub auribus, vel, pone aures suffusi rubores. Nam πὰ ἐρυθματὰ videntur hìc dici αἰδήματα φλεγμονώδη, i. tumores inflamma-
1079. quemadmodum idem vocat faucium inflammationes, πὰ ἐρυθματὰ, & c. πρὸ ὅτι π. κυματῶν ἐρυθματὰ. lib. 2. progn.
Est enim phlegmone parhognomonicon signum, rubor. Atqui phlegmone sub auribus orta, est vera parotidis. Ergo parotides rubræ: quæ sunt eiusmodi ab excursu vel recurso, atque, vt ita dicam, eructatio-
10 ne sanguinis quo pars illa obfessa tenetur. Est enim consentaneum vt qualis humor, non refluus, in par-
te aliqua stabulatur, talis & color eluceat.

EXACTI IAM MORBI SUPERSTITES] Palam est nomen πὰ ἀγνῶματ. pro morbo vsur-
pari qui causa est doloris atque molestiæ. Itaque parotides quæ oriuntur ἐκ τῶ ἐμμεσθῶν ἀγνῶματ., reuera
sunt morbi iam exacti succedaneæ, vel illius morbi superstites, quæ aliunde venerunt; cuiusmodi fue-
runt Hermippi Clazomenij, de quibus ita scriptum reliquit. *Assurgentes in febribus cum dolore parotides,*
vel etiam desinente febre; neque subsidunt, neque suppurant.

IN FEBRIBVS ORTÆ] Quales, inquam, fuerunt Clazomenij, cuius historia docemur, parotidis febrium acutarum succedaneas, quamuis & specie ipsa, quòd sint rubræ & dolorificæ; & suppu-
rati expurati que vacuitate, videantur funestæ: tamen cum signis coniunctas salutaribus, diarrhœa, dy-
10 senteria, aut etiam profluuiò vrinæ, salutem ægro parere.

SIGNA SVNT ERYSIPELATIS IN FACIEM EXITVRI] Per expressionem bilio-
sæ materiæ vel biliosi feri è iugularibus arteriis & cervicalibus venis amplioribus, in angustiores faciei,
illinc productas. Sic enim proreperit materia parotidum ad maxillas, malas, & genas; vt facies ipsa nihil
aliud sit quàm dolorificum tuber. Secus in parotide diffusa & laxa 1. lib. πρὸ ὅτι. Est autem erysipelas tu-
mor citrinus & fugax dum premittitur digitis, cuius molestia maior est in calore, quàm in renixu & pulsu.
Causam habet erysipelas, humoris biliosi orgasmum vel expressionem.

QVINETIAM EX TALIBVS CONVULSIONES VENIYNT] Ac si diceret. Terrifica
est omnis dolorifica & rubra parotidis, quæ nisi humoris morbifici suffusione in faciem erysipelatofam,
leuationem habeat; quia sunt acerbiores dolores tumoris crudi atque coacti, quàm larè diffusi; aut et-
10 iam nisi profluuiò alui, prorupràque vrina tollatur, facilè in spasmus transierint translatione sympto-
matica in cerebrum, & nervos spinales.

CVM APHONIA] Per interceptionem vocalium instrumentorum.

ET EXOLUTIONE] Sanè quidem aponia cum exolutione coheret, iuxta illud. *Firmiter hærens* proth. 4.
cum exolutione vocis carentia, lethalis. Sed tamen hìc nulla sunt exolutionis argumenta, nisi cum in propin-
quo mors est. Etenim conuulsionis & exolutionis nulla simul in nobis mansio esse potest. Ac sanè præ-
stat exolutionem conuulsionem tolli, quàm exolutionem conuulsionem.

3 Τὰ παρ' οὗς ἔπ' ἐιλέοισι δυσώδεα, πυρετῶ ὀξεί, ὑποχονδρίῳ σίω-
40 τῶν, χρονωτέρως δεδέντα κτείνει. male m. s. 1. lib.

*Parotides graueolentis voluuli consecraria, cum febre acuta, hypo-
chondrij meteorismo diutius tumescentes; interimunt.*

ALTERVM genus parotidum pestiferarum describitur, quæ non sunt pestiferæ: quemadmodum
superiores, conditione partis obfessæ, quæ capax non est humoris morbifici; aut doloris acerbitate, &
cerebri sympathia: sed tamen quæ sunt funestæ, quamuis paulatim assurgant, ac diutius maneat, ob
10 eam sanè causam quòd cum symptomatis coniunctæ sint pessimis, vnde significatio sit partium corruptarum,
ex eaque corruptione efficitur, vt ipsas partes tædeat sui quamque officij.

Ergo. PAROTIDES] Alio nomine πὰ φήρα à Satyris, qui priscorum lingua nominabantur φηρῆς,
erantque sub auribus ruberosi, vt visum erat pictoribus atque poetis.

GRAVEOLENTIS VOLVULI CONSECRARIA] i. Ilei cum stercoris aut chyli vomitio-
ne coniuncti, cum ructu, spiratione, crepitu, & perspiratione totius fetida. Hæc enim symptomata sunt
ilei consecraria, quando ad vltima ventum est. Nam proprium & inseparabile est ilei, nihil deorsum fer-
ri, cum alui torminibus & cardiogmo; quod accidit per αἰώ ἀνω, i. reuolutionem sursum, vel chyli, vel fa-
cis aluinæ, ab inflammatione tenuis intestini, aut contumaci oppilatione crassi & glutinosi humoris.
Itaque cerebri non leuis offensio esse solet, quando adducitur in sympathiam stomachi grauiter in illa
10 vomitione & singultu vexari, adeo vt non solum dementie, sed etiā conuulsionis consecutio adferatur.

CVM FEBRE ACUTA, HYPOCHONDRII METEORISMO] i. Cum prominente hy-
pochondrio, nec ille meteorismus hypochondriacus ab inflatione prominet, vel à scirrho: sed ab in-
flammatione, sympathica quidem iccoris, idiopathica verò tenuis intestini: ex quo efficitur meteoris-
mum illum borborygmi expertem esse, participem verò torminum acerbissimorum.

DIVTIVS TUMESCENTES] Quod in aduerbio legitur hìc, in proth. comparatiuum no-

men est hypochondrio meteoro adiunctum; vt meteorismi, non autem parotidum, diuturnitas representetur. Sed neutrum rectè ad mentem præceptoris. Namque in meteorismo hypochondrij quem facit inflammatio, tum in voluulo fœdi odoris, periculo & citæ mortis locus est potius, quàm diuturnitati. Nec verò diutius tument parotides cùm cita mors venit, vt venire solet in dolorifico hypochondrij meteorismo, & voluulo fœdi odoris. Non enim fœdi odoris, nec vomitus accessionem habet, nisi cùm in propinquo mors est. Itaque diuturnum illud, silentio prætereundum.

INTERIMUNT] Non ipsæ quidem solæ, sed vitio partium vnde venerunt, quæ periculum vitæ non possunt, nec suppurato, nec alio prorupta biliosis excrementis: quod ipsum neque voluulo tueri potest, cuius illud proprium est, & inseparabile, nihil deorsum ferri.

4. Τὰ παρ' οὗς, Φαῦλα τοῖσι παραπληκτικοῖσι.

Parotides prauæ sunt paraplecticis.

PARTIVM QVÆ sponte nostra mouentur exolutio, parendique adempta potentia, quamvis symptomate ipso sit grauis & permolesta, quòd nulla pars ne minima quidem officio vacare possit sine vniuersitatis dispendio, ad cuius conseruationem omnes optima conspiratione atque consensu pro se quæque incumbunt: tamen signo ipso causarum efficientium philosophica distinctio est, maioris mali, atque minoris, terrifici, aut securi. Sunt enim læsorum principiorum facultatūque grauior casus, quàm propaginum & instrumentorum. Hippocratis sæculo extitisse legitur mulier quædam quæ cùm diu multūque tussiculosa fuisset, nec commemorabile quippiam extussiuisset, exolutionem passa est paraplegicam sinistri cruris, & brachij dextri, cætera bene habuit, omnique alteratione caruit faciei & mentis. Nec verò illa paraplectica exolutio vltra vigesimum diem producta est. Huic sanè cerebrum credibile est in vitio non fuisse. Itaque melius illi fuit, quòd illæso principio in eam paraplegiam incidere, quam suspicor esse naram ex transitu pulmonarij morbi; partim in brachium, intercepta expurgatione; partim in crus sinistrum, non bene suscepto nec bene peracto abscessu crurali, quòd ipsa materia cursum inflexerat. Existunt etiam paraplectici, quibus luxatæ sunt xj' τῶν σκολίων, i. in latius, vertebræ ceruicales. Nam vertebrarum illarum duo semicirculi constituunt vnum foramen rotundum, quò exitum habent nerui ceruicalis medullæ. Quòd sit vt vertebræ vnus in alterutram partem luxatio, neruum ex euntem comprimat, vbi loco excidit, eaque compressio viam spiritui intercludit, vnde paraplegia partis illius cui mouendi vis denegatur, vt ampliùs iussu nostro vel sponte nostra, quod est xj' τῶν ἀσπίδων, vel ἀσπίδων, moueri non possit. Malæ sunt quidem illæ paraplegiæ, fateor; sed tamen symptomate ipso potius molestæ sunt: at quæ vitio principij veniunt, quibusdam sunt funestæ, quales commemorat Hippocrates historia 3. vniuersali 1. ἢ δ' ἐπὶ. Hæc ineunte hyeme paraplegiæ orta sunt multis, quorum nonnulli citò moriebantur, quòd esset morbus admodum epidemicus: καὶ γὰρ οὗτος νόσος ἐπιδήμιον ἐστίν. Ad quem locum hæc scripsit Galenus. Consuetæ tamen paraplegiæ in resolutionem membri desinit, hominem non interimit. At quæ per id tempus grassabatur, lethalis erat, cerebro iam admodum perfrigerato. Quæ cùm ita sint, facilis erit demonstratio cur paraplecticis prauæ sint parotides, ex paraplegicarum causarum distinctione. Non enim parotides in paraplegia oriuntur, quin periculo sit locus ex causa ipsius paraplegiæ, & parotidum loco & situ.

Ergo. PARAPLECTICIS] i. Alterutro brachio, aut crure alterutro captis, exempli causa: quem admodum apoplectici toto corpore capiuntur. Qualis enim totius corporis exolutio in apoplexia cernitur, talis & brachij, aut partis alterius, in paraplegia. Sed huius prognoscos paraplegia ab eodem fonte principia causasque ducit vnde apoplexia ipsa, nempe à cerebro multum refrigerato, vel potius à mansionem eius aliqua multum refrigerata, penèque extincta.

PAROTIDES] Quæ inde veniunt vnde paraplegia ipsa cerebri symptomatica, quarum etiam prænunciæ sunt causarum efficientium notæ, coma & surditas; vnde scilicet eructantur.

PRÆUÆ SUNT] Ne dicam funestæ, vt iudicatoriæ omnes causæ exiguæ, quæ & qualitate malæ, & loco, infausti sunt ominis. Ac qualitate quidem, quoniam sunt insuppurabiles; loco autem, quoniam periculo semper locus est in omni abscessu semifluo nec rependente: vt interim taceam afflictionem vicinarum partium nobilissimarum, in sympathiam & contagionem coactarum.

malè fuit το
περιφύσει.

5. Τὰ παρ' οὗς (ὡς ὁξέσι) μὴ ἐμπνεῦντα δανάσιμον. κοιλία δὲ καὶ
τοῦτοι πάρα φέρονται. ἀεὶ γὰρ τοῖσι τὰ παρ' ὠτα κεφαλαλγικοῖσι
ἀεὶ τε ἐφιδροδοῖσι τὰ αἶμα; ἢ ἀεὶ τε καὶ ἐπὶ ῥιγέοις; ἢ ἀεὶ γὰρ αἱ κοιλία κα-
τὰ ῥήγνυνται; καὶ τοῖσι καὶ κωματώδεες; ἀεὶ γὰρ τὸ ὑδατώδες οὖρον ἐναγ-
ρῶμον λαμβάνουσι, καὶ τὰ ὑποπόικια ἐκλθκα, δυσώδεα;

*Parotides in acutis suppurati expertes, funesta. Sed forsan his alui
feruntur.*

feruntur. *An cephalalgicis assurgunt parotides? An verò quibus sudatiuncula sursum exudat? Etiamne iis qui perhorrescunt subinde? Quid verò? etiamne comatosis aluo prorupta? Estne tum aquosa urina cum enæoremate albo, cætera autem variegata, peralba, & foedi odoris?*

FUIT ILLUD studium præceptoris in hac prognosi, ut crisin parotidum dolorificatum, omni-
 10 que prænnuncia ipsarum signa complecteretur; eaque cuiusmodi sint, & quorsum appareant, nobis exam-
 inanda proponeret. Sequar igitur illud consilium; parique studio ad examinandum aggrediar, orsus à
 crisi parotidum rubrarum & dolorificarum quæ cum acutis morbis coniunctæ sunt. Ac primum scire
 licet ex consuetudine scriptorum Hippocratis lectum esse ἐν ὄξειν, αἰτὴν τὴν ἐν μακροῖσι. Nam in diuturnis
 paræ sunt ipsæ parotides, quæ vel in iuuenibus non rarò, ἀσήμεως, καὶ ἀσυνέως, i. sine signo, & tamen sine no-
 xa vanescunt, derogantque fidem ei catholico theoremati. Qui iniudicatò flaccescunt dolorifici tumores, ma-
 li. Nisi quis iure optimo veritatem eius defendat, quod scripserit, τὰ ἐπὶ δυνάμει, quod i. Ἰπποκράτης in parotidi-
 bus illis non agnouit, quas nominavit ἐπὶ ῥήματι ἀνὸ δυνάμει. Sed ut redeam ad institutum, idem præceptor
 nos docuit eos qui parotidas habent ex morbo acuto, non nisi per suppuratum & expuratum, periculo
 posse defungi.

20 Ergo. PAROTIDES IN ACUTIS] i. Quæ consecrariam febrem habent; vel, quæ sunt exacti
 iam morbi acuti superstites, rubræ & dolorificæ.

4 SUPPURATI EXPERTES] Quod vnicum naturæ perfugium est in omni phlegmone cum
 summa doloris acerbitate, atque renixu, ex calido humore multum impacto, multumque coacto. At-
 que victricis naturæ omnemque recursum & gangrænam prohibentis, omnemque à cerebro iniuriam
 propulsantis, certissimum signum est illud suppuratum laudabile, quod suo candore, partis integritate
 tem; lenitate, caloris innati vim; æqualitate verò, materiæ ipsius bonitatem denunciat.

FVNESTÆ] Ob eas sanè causas quæ suprà sunt expositæ, quas nihil necesse est hic denuo memo-
 rare.

30 SED FORSAN HIS ALVI FERUNTUR] Ac si diceret; cum in procinctu periculum est,
 ipsi periculo locum tollit aluus prorupta biliosis excrementis, quemadmodum accidit Clazomenio.

AN CEPHALALGICIS ASSVRGVNT PAROTIDES?] Sanè quidem, ut suprà iam do-
 cuit. In cephalalgia coma & surditas faciunt ut assurgant parotides.

AN VERO QVIBVS SVDATIVNCVLA SVRSVM EXVDAT?] Etiam si ab oppres-
 sione cerebri veniat illa ephidrosis, quæ nunquam naturæ desiderio respondet in excernendo; unde ef-
 ficitur ut pro excretionem fiat abscessus pone aures: quemadmodum in hæmorrhagia irrita, nec liberali,
 progn. 4. Coac.

ETIAMNE IIS QVI PERHORRESCVNT SVBINDE?] Reuera omnis rigor qui fru-
 stra fit, translationem facit ad caput.

40 AN FLVENTE ALVO COMATOSIS?] Maximè, cum sit argumentum oppressionis sum-
 mæ, de qua per diarrhœam nihil deducitur: nisi fortè coma exolutionis soboles existit; tum enim para-
 tis nulla assurgit.

ESTNE TVM AQVOSA VRINA CVM ENÆOREMATE ALBO, CÆTERA
 AVTEM VARIEGATA, PERALBA, ET FOEDI ODORIS?] Profectò. Quia urina alba
 tincturæ biliosæ expers, si nulla sit excusatio diuturni morbi, perturbationis criticæ, aut etiam bilis sup-
 pressæ vel ad intestina deriuatæ; translationem ad cerebrum factam esse, fieri denunciat; præsertim si
 pèdulum sit enæorema, cuius significatio superioribus declarata, cacoethiam foetori adiunctam ostendit.

60 6 Τὰ παρ' ἑς λαπαύσει βηχία μὲ πτυαλισμῶν ἰόντα.

Parotidas æquant tussicula cum ptyelismo orsa.

QVEMADMODVM tumores iniudicatò flaccescètes mortiferi: sic salutare illi qui idem faciunt
 cum signis & causis. Sed illius κατὰ μοῦνον in parotide εὐσημον, non vna eademque ratio est. Nam præ-
 ter cæteras iam explicatas, ptyelismus proponitur, unde qui periculo locus erat, tollitur: quemadmo-
 dum in faucium inflammatione εὐκρίται sunt καὶ εὐσημα, sputum purulentum, sternive rubor atque cerui-
 cis; alioqui transitus fit mortiferus atque funestus è faucibus in laryngem, vanescente faucium tumore
 ἀσήμεως καὶ ἀσυνέως.

60 Ergo. PAROTIDAS ÆQVANT] Sic enim τὸ λαπαύσει vertendum, quod propriè significat mo-
 lem æquari solo, non quidem per inaspectabilem æquabilitatis causam, quæ nulla esse potest ad salutem
 in parotide dolorifica, multumque coacta: sed per aspectabilem morbosæ causæ vacationem, tum
 propriam, tum succedaneam; cuiusmodi suscipitur suppurato & alui profuuiio. Excipio tantum para-
 tidas doloris expertes i. lib. Ἰπποκράτης.

TVSSICVLÆ CVM PTYELISMO EVNTES] Quas edit concussio pectoris materiam

studentis excutere quæ per naturalem meatum deerrat in amplitudinem oris, eaque per ptychismum tabi & inflammationi locum tollit; quarum profectò causa esset, nisi ea liberam expurgationem haberet. Hic autem studiosi obseruabunt quantum interfit inter τὸ λαπαρῶσαι, καὶ ἀφανίζειν ex aphor. 14. part. 4. 6. 7. & ex 1. eiusdem operis.

7 Οὐρα τοῖσι παρ' ὠτα ταχὺ, καὶ ἐπ' ὀλίγον πεπαυμένον· φλαῦρα, καὶ τὸ κατὰ ψυχὰς ὥδε· πονηρόν.

In parotidibus urina citò & paulisper mitigata, pestifera. Et quæ huiusmodi est refrigeratio, pessima.

ADMIRABILE est quantum lucis adferat diuina hæc prognos̄is ad præensionem futuri euentus morborū omnium particularium & vniuersalium quorum vis est in vniuersitate. Huiusmodi sunt, febris acuta, cynanche, pleuritis, parotis, &c. Ac ne in cæteris excurrat lōgius mea oratio; de parotidibus mea sic ratio est; nullas dolorificas parotidas videri posse secundi iudicij quæ careant vrinæ pepasmo stabili, omnibūque parotidum diebus inde labentibus ex quo apparere cœperit, conspicuo, firmiter fixo, & bonitatis accessione in dies magis ac magis laudabili. Etenim cū parotis homini necando satis sit tum per se ipsa, tum ex euentu; si eius malum iam conceptum malæ causæ accessionem habeat: insanabilis profectò erit: ob eam sanè causam quòd prioris morbi, vel mali, semper in peius mutatio sit quando perennitas est tum generationis, tum affluxus materiæ morbificæ ad partem obsessam, quæ omni conditione iam expōita, periculi atque interitus locum habet. Quemadmodum autem in parotidibus urina citò & paulisper mitigata sint pestifera, agetum videamus.

IN PAROTIDIBVS] Cum febre coniunctis. Nam cætera capitis mala febris expertia, suisque deque habent vrinas.

VRINÆ CITO ET PAULISPER MITIGATÆ] i. Modò pepasmi participes, modò expertes, neque hypostasim laudabilem ostentantes exactum ad morbum: cuiusmodi sunt quæ cernuntur aliquando puræ, nonnunquam verò prædita hypostasi alba & læui.

PESTIFERÆ] Quia vicissitudo est magisterij inter naturam & morbum, qui vt vires acquirit eundo: sic naturæ fatiscantis præsidia labefactat, iisque collapsis nulla ampliùs pepasmi signa eduntur, sed cruditatis & prauitatis: ac tum de morbo multum vereri oportet superata natura. Itaque tales vrinæ pestiferae sunt in parotidibus etiam purulentis; quod accidisse legimus pictoris ancillæ: quia particularis coctio frustra suscipitur in cruditate vniuersalium excrementorum.

ET QUÆ HUIUSMODI EST REFRIGERATIO, PESSIMA] Extimarum partium citata in virumque mutatio, & sitis huiusmodi, mala est.

malè fuit
translatum.

8 Τὰ ὡς ἔς ἐν τοῖσιν (ὀξέσιν) ἐκπυδόμενα, μὴ λευκῷ σφόδρα, καὶ ἀνόδμω κτείνει· καὶ μάλιστα γυναῖκας.

Parotides in acutis purulente, nec albo exactè ac nihil olente, interimunt; potissimum vero mulieres.

ERIT PROPECTO catholicum hoc theorema; quòd vnde salus vitæ sperabilis, inde salutis desperatio esse debet, si id merito naturæ non fiat. Quod cū in omni alio molimine locum habet, tum verò maximè in suppurato & expurato, quod quidem si in contrarium vergat naturæ, caloris natui, materiæque habilis ad mitigandum; vt pro albiſſimo pure, fuscum aut nigrum; pro æquali, diuulsum; pro læui, asperum, rupta vomica fundatur; mali sit ominis, atque, vt ita dicam, fatale ad interitum. Quoniam autem parotidum rubrarum & dolorificarum omnis quæ lege critica suscipitur exolutio, suppurato perficitur, nisi profluuium ventris habeat succenturiatum, vel ptychismum; vt erit suppuratum, colore, substantia, situ, odore; sic bonis aut malis ægroti rebus è vomica effundetur.

Ergo. PAROTIDES] Quæ cum doloris acerbitate sub auribus orta sunt.

110. Coar.
2. lib.

IN ACUTIS] Nam in diuturnis paræ sunt nec suppurabiles; vt appositè magis & consideratè legendum videatur, in acutis, quàm, in diuturnis. Sunt autem parotides in acutis, quarum decissionem continet citima huic prognos̄is.

PURULENTÆ] Mutatione facta phlegmones in vomica quæ pus effundit.

NEC ALBO EXACTE] Scilicet pure, quod exacto candore, partis obsessæ integritatem significet cum pari virtute caloris natui, & benignitate humoris pepasum recipientis: sed contrà, quæ pus reddunt ἀμωρῶδες, i. amurcosum, biliosum, & inæquale.

AC NIHIL OLENTE] Quod in prognostico requirit, ὡς ἡκιστα δυσώδες, i. quàm minimū fædi odoris. Nam δυσώδεια nimia, signum est putredinis, non pepasmi. Hic autem vocat summo iure ἀνόδμω, non quòd

non quòd omnino nihil oleat, sed quòd non sit graecolens: sicut mulieres bene olent, quæ nihil olent.

INTERIM VNT] Quoniam *δυσωδία*, corruptionis atque putredinis signum, ipsaque putredo non minus pestifera est cerebro, quàm inflammatorius dolor dum phlegmone ipsa maneret atque vigeret suis comitata symptomatis longè grauius. Talis prauitas cernitur in thoracis empyemate, vnde per vltionem pus exit foetidum atque cænosum. Talis etiam in iecoris suppurato & expurato quod refert amurcam. Pertinet etiam ad huius loci explicationem, quod idem scripsit de pestiferis erysipelatis. *Ἡ δὲ πύμα συνιστάμενον, ὡς πύμα ἵκελον, ἀλλὰ σηπιδὼν πρὸς ἄλλη. i. Erat autem consistens fluxio, non puri similis, sed alia quædam putredo.* Nam ex communi putredinis causa, quæ putrescunt, singula suam quæque propriam obtinent corruptionis & putredinis differentiam. Ergo illud demum pus erit laudabile & gratiosum, quod visu & olfactu percipitur album, æquale, & laue, minimùmque foedi odoris. Sic enim examinandum præcepit Hippocrates ad finem i. lib. prognost. Subiungit autem hæc verba. *Τὸ δὲ διατηρόμενον τοῦτο καμνύει:* cuius demonstratio facilis erit ex percipientia causarum optimi puris. Contraria enim contrarium consequentia esse solent.

9 Τὰ παρ' ἑς, μάλιστα καὶ τῆς ὀξέως ἐν τοῖσι καυσώδεσι γίνεται καὶ λευκὸν (μύ) κρίσιν ποιήσῃ, καὶ ἐκπεπαίνηται, ἢ ἐκ ρινῶν αἷμα ῥυῖ, ἢ οὖρα ὑπό-
στασιν παχεῖαν λάβῃ, ἀπολλύεται. καὶ πολλὰ δὲ τῆς τοιούτων οἰδημάτων
20 θεωροῦμεθα.

Inter acutos, parotides potissimum in causis assurgunt; ac tum si febrem lege critica non expellant, nec ipsa coquantur, nec sanguis fundatur è naribus, nec verò urina excipiant crassam hypostasim; moriuntur. Sed & abscessus eiusmodi, non raro antè residunt.

OMNIS parotidum dolorificarum decisio hîc continetur.

30 INTER ACUTOS MORBOS] Essentiales scilicet febres, quæ celeriter, continenter, & vehementer mouentur.

PAROTIDES] Rubræ & dolorificæ.

POTISSIMUM IN CAUSIS ASSURGUNT] Per excursum ad caput, & recursum ad aures, quem facit irrita hæmorrhagia, quæ propria est causi crisis. Hoc autem interest inter febrem acutam & causum; quòd febris hæc, celeritate, vehementia, & assiduitate eximia sit; ac præter acutam, ardorem habeat inæqualem viscerum, & partium extimarum. Inde adeo veritas elucescit illius aphorismi. *Qui sunt in febribus laboriosi, iis potissimum vel in articulis, vel in maxillis abscessus assurgunt.* Laboriosos autem vocat, vel à labore intenso & pertinaci, vnde veniunt febres ardentes; vel à quiete ocio, cum nimia humoris abundantia, & contumacia, vnde nascuntur febres diuturnæ.

40 AC TUM SI CRISIN NON ADFERANT] Ut certè adferre non possunt: quia sunt abscessus *ἡμῆροι* neque *ἀνῆροι*. Solum enim critica lege assurgunt per transitum pulmonicorum morborum, si quidem purulentæ reddantur.

NEC IPSÆ EXACTE COQUANTUR] Ac si diceret; quamuis parotides cum signis pepasimi ortæ sint à febre ardente quæ inter acutas eximia est: tamen nisi propria & exacta cōcoctione exoluantur, & in se ipsa residant.

NEC SANGVIS FUNDATUR È NARIBUS] i. Nisi hæmorrhagia liberalis periculi causam & occasionem tollat, ubi periculo locus est, ob causas iam explicatas.

NEC VERO URINÆ EXCIPIANT CRASSAM HYPOSTASIN] Quæ in desiderio suppurati & hæmorrhagiæ, duorum naturæ perfugiorum, in parotidibus dolorificis succenturiantur, ut alius prouta criticæ, & ptyelismus.

MORIUNTUR] Acerbitate doloris, & cerebri in sympathiam & contagionem adducti grauiissima offensione.

SED EIVSMODI ABCESSVVM PLVRIMI ANTE RESIDVNT] *Δοίμως* scilicet καὶ ἀκρίτως, vnde pestifera vis maxima esse solet, per theorema sæpius iteratum. Hoc autè spectat authoris oratio, cum parotides febrium ardentium consecutariæ & succedaneæ, sint *ἐκ τῆς ἀσυμβεβηκότων*, i. ex iis quæ ab-
sunt, pestiferæ; tum verò funestæ, si omnem salutis conditionem effugiant foris intro refluxa.

10 Προσεπιθεωρεῖν δὲ καὶ τοὺς πυρετοὺς, λευκὸν τε ὑπέραινωσιν, λευκὸν τε ἀνιῶ-
σι καὶ οὕτως ἀποφαινέσθαι.

Ibi tum febres contemplari oportet, num ingrauescant, an verò mitescant; atque ita pronunciare.

EST HOC theorema experientia, quod cum superiori decisione coniunctum, futuri euentus partitum dolorificarum certam prognosin constituit. Est autem huiusmodi. Si merito naturæ residuum paratides, febris ipsa mitescat atque quiescat; sin minus, ingrauescat id quod significat, πῶς θνήσκει.

ATQVE ITA PRONNCIARE] i. Certò statuere quid euenturum sit, quod medici officium est nunquam aberrantis à scopo.

DE FACIE.

CAP. V.



ΡΟΣΩΠΟΝ ἐκ μετώρου ταπεινούμνον, καὶ φωνὴ
λειοτέρη, καὶ ἀδενεσέρη γινώμνη, καὶ πνεῦμα μανώτερον, καὶ
λειότερον ἀνεῖν ἐς τὸ θῆπουσαν σημαίνει.

1 *Facies è tumescente residens, vox item blandior atque mollior, tum spiritus rarior atque facilior; remissionem postridianam fore denunciant.*

DE INCEPS operæ precium est cognoscere & intelligere num facies à se mutetur, & vnde mutatio illa veniat in colore, caractere, & mole; tum autem quorsum appareat.

Enimvero ægroti facies, quæ prima omnium venit sub aspectum medici, bene valentium similis esse debet, potissimumque sui. Etenim quò propius absunt à peculiari cuiusque natura, qualitas corporis, actiones, & excrementa; eò melius ægroti res eunt: quò verò longius, eò peius. Quænam autem qualitas corporis vel naturaliter constituta, vel à se mutata ex vitio complexionis & temperamenti, potissimum cernitur in faciei colore, caractere, & mole; primum de mole prognosin duxit instituendam, cum ea scilicet tumescit, vel residit in morbo. Ac primum de ea quæ ex tumescente citò residit, sic orsus est in hac prognosi.

FACIES EX TUMESCENTE RESIDENS] Quæ nonnihil concessit de statu priore in quo erat cum ægrotare cœpit, in eoque mansit vsque adhuc, quod morbi est diuturni; vel si eius molis accretio fuit, facies in se ipsa residit, pristinumque recipit characterem, humoris ipsius vnde tumescebat exclusionem; vnâque etiam venæ in superciliis oculorum, angulis, manibusque, aspectabili pulsu micantes quiescunt, idque sæcundo die, hoc est, critico. Sic enim alio loco. Ἐν πύρετι ἐξορτες, πῶς ἀεὶ τὸ ἀρῶσθαι ἰσχυρὰ ἢ ἐν ἡμέρῃ γρημῶ, πῶς θῆπουσαν λύνει. i. Si detinente febre, facies extenuetur die critico; sapationem promittit cōsequente.

VOX ITEM BLANDIOR ATQVE MOLLIOR] Quæ fuerat antè rauca & aspera, vel, ut idem loquitur, φωνὴ κακουμένη καὶ κατελῶσα, i. vitata vox ex in faucibus elisa; ob nimiam fuliginis abundantiam, pulmonum & musculorum intercostalium in exsufflatione laborantium oppressionem; tum etiam catarrhi perennem affluxum. Vox igitur antè vitata, in gutture & faucibus elisa, quæque rancis, ut ita dicam, bombis stridebat; nunc blandior atque mollior, extincto cordis ardore, explicatis pulmonum alis, vocalium instrumentorum libertate restituta.

SPIRITVS RARIOR ATQVE FACILIOR] i. Spiratio libera, facilis, & in mediocritate posita omnium circumstantiarum quæ cernuntur in motu, quiete, explicatione thoracis, & materiæ spirabilis qualitate; eaque mediocritas accepta refertur moderationi vsus in corde, libertati instrumentorum mouentium, deducentium, & excipientium; maximè autem voluntati regulariter se ad illam functionem gerenti. Cæterum πνεῦμα μανώτερον scripsit de respiratione rariore quæ fuit antè citatior atque velocior à phlegmone cordis, cuius remissio & moderatio in die sæcundo ipsam fecit liberiores & liberaliores in vsu, voluntate, & instrumentis. Nam rara spiratio præter vsum necessarium, cum instrumentorum libertate, signum est delirationis. Propterea hîc rariorem & faciliorem annotauit: quoniam talis respiratio vacationem denunciat phlegmones cordis cum libertate omnium instrumentorum; laryngis, pulmonis, atque thoracis.

2 Προσώπου διαφθορὴ θανάσιμον ἥσων δὲ, εἰ δὲ ἀγρυπνίῳ, ἢ κοιλίης ἐκτάραξι γινώται καδίσταται δὲ ἐν ἡμέρῃ καὶ νυκτὶ τὸ διὰ ταῦτα διαφθαρεῖ.

Facies cadauerosa mortifera. Sed ea minus tamen qua ob vigiliis, aut ventris solutionem eiusmodi est. Atque talis corruptio his de causis orta, uno die finitur.

FACIES qualitas aspectabilis & tractabilis naturaliter constituta in colore, caractere & mole, non immerito secundæ valetudinis opinionem facit. Quæ verò multum à se mutata cernitur, terrificæ esse solet; idque cum aliis, tum maximè in morbis acutis quorum acerrimâ commotio, & citam, & stabilem faciei mutationem adfert, ex causæ ipsius mutantis, & corruptentis, perennitate. Quæ causa est cur philosophicè ex perspicuentia causæ mutantis & corruptentis, faciei corruptionem nominatur, quam ipsi cadauerosam expressimus.

Ergo. **FACIES CADAVEROSA**] Qualis in cadauere cernitur, pallida atque collapsa, & omnino à se mutata in colore, caractere, & mole; ut amplius agnosci non possit, ne ab iis quidem qui ægroto familiariter vtebantur: cuius contrariam alio loco iam exposuimus, quam idem præceptor nominavit *αἰσχροπνὴν ἔρρωμένον*, i. faciem succi plenam atque decoram.

MORTIFERA] Quoniam sic emacruit, ut ad ultimam ventum esse testetur. Emacruit autem exhaustum humidi primigenij, vnaque etiam defraudata nectare viuifico cordis, i. spiritu, sanguine, & calore vitali. Exhaustum humidi primigenij, partiumque solidarum, ut ita dixerim, colliquamentum attulis febris tabifica, cuius ardore partes ipsæ liquuntur. Nectaris autem viuifici defraudatio venit à paupertate sanguinis, & cordis multum in suo officio laborantis infirmitate; ex qua efficitur ut neque sanguinem liberaliter haurire possit, neque spiritum quem ducimus excipere; eademque duo naturæ nostræ sola, *αἰσχροπνὴν*, i. consocialia, partibus omnibus, uti solebat, liberè & liberaliter impartire. Quoties autem perennis consumptio est partium solidarum, vnaque perennis dissipatio nectaris viuifici paulò antè descripti, morticina est eius natura qui ægrotat. Sed eius morticinæ naturæ significatio potissimum lucet in facie.

SED EA MINVS. TAMEN] Scilicet facies morticini hominis prænunciæ est, nec inde tam citæ & certa mors venit. Ac si diceret; quamuis omnino fatalis sit ad interitum, minimèque sanabilis morbus in quo talis facies cadauerosa cernitur prima periodo: tamen.

SI OB VIGILIAS] i. Vacuitatem somni, non quidem cerebri intemperie, & anathymias eos prætitare inductam; sed potius agendi aliquid causâ, aut mœrore susceptam.

AVT INEDIAM] Vnde genius defraudatur, syrrhoe cordis non instauratur, nec non cerebri; vnde pallida collapsaque apparet facies, qualem notauit in iis qui incenati dormitum inere, quibus cernuntur oculi cum palpitatione temporum, & partium extimarum refrigeratione. Nam *qualis terra arboribus, talis & venter hominibus*.

AVT VENTRIS SOLVTIONEM] Non quidem per *κακὴν ἀσθένειαν* firmiter fixam ab exolutione, vnde ipsum rædet sui officij, ut in pleuritide inueterata: sed alio aliquantisper prorupta per fugacem diarrhoeam, aut hypercarbarin.

EIVS MODI. EST] Scilicet facies cadauerosa, per inchoatam extenuationem à spiritus & humoris dissipatione, non autem à partium solidarum perenni exhausto; nec verò eiusmodi sit ab vlla extrinsecus incidente vacuatione quam liquefaciens febris attulerit: sed ipsa per se extiterit.

ATQVE TALIS CORRUPTIO] Non quidem vera, sed quæ primo aspectu talis apparet, nempe collapsa & pallida; sed laxa, non intenta, quod inchoatæ extenuationis signum est, nō perfectæ.

His DE CAUSIS ORTA] Vigiliis, inedia, profluuiio alui, hæmorrhagia; sudore, quarum vacuationum non firmiter fixæ sunt causæ, neque perennes à febre maligna, vnde solidæ partes liquuntur; sed fugaces.

VNO DIE FINITVR] Siue consistit, nec ultra procedit: sed contra initium habet *ἐκ τῆς πρώτης* intra vigintiquatuor horas, si quidem ab illis causis fugacibus orta sit.

3 Γένειτο δ' αὖ τῶν οὐφθαλμοὶ κοῖλοι, ρῖς ὀξεῖα, κρόταφοι συμπεπιωκότες, ὥτα ψυχρὰ ἢ σίωεσα λυγρὰ, δέρμα σκληρὸν, χρῶμα ὠχρὸν ἢ μῆλαν. περὶ τὸν ὅλον ὃ τέτοις βλέφαρον, ἢ χεῖλος, ἢ ρῖς σιωλόμεως διασπόμενον.

Fuerit autem sanè huiusmodi facies cadauerosa; oculi concavi, nares acute, collapsa tempora, frigida aures atque reuulsa, cutis dura, color pallidus aut niger. Quod si etiam livida his fuerit palpebra, aut nasus, aut labrum; cita inde mors venit.

QVEMADMODVM signorum omnium syllogisticorum ex quibus exquiritur veritas omnis certæque *πικρὰ* cognoscendi & prædicendi, nulla sunt magis *πικρὰ*, quam quæ spectantur in faciei colore, caractere, & mole; si quidem rerum earum spectabilium causæ perspectæ sint: ita causarum ignorance nesciamus magis erramus, labimur atque decipimur, quam in dissimilitudine faciei. Sed ea distinctio iam superiore prognosi exposita est. Nunc cadauerosæ faciei characterem, & quamobrem ita sit, exponamus.

FVERIT SANÈ HVIVS MODI] In qua nec inedia, nec vigiliarum, nec profusioris alui, nec aliarum rerum tabifica febris minimè cōsectariarum, sed aliunde ortarum atque fugacium, exculatio possit adferri.

OCULI CONCAVI] Hebescentes, immobiles, & sua orbita abdit; spiritus animalis paupertate, septem musculorum æquali contractione, humorum trium & quinque tunicarum consumptione.

NARES ACUTÆ] Exhausto musculorum qui narium pinnas intrò adducunt.

COLLAPSA TEMPORA] Consumptione musculorum qui temporibus à capite cutim impertiunt, quæ alibi nusquam in capite cernitur.

FRIGIDÆ AVRES] Quæ frigoris capacissimæ sunt, vt corpus cartilagineum, paucò sanguine irrigatum, nulla carne vestitum.

REVULSÆ] Per quandam conuulsionis speciem netuum illum versus vnde sentiendi facultatem accipiunt. Non enim mouentur nostra sponte. Vt vera conuulsio esse non possit, nisi iis quibus latus musculus supra aurium radices proreperit.

CYTIS DURA] Quando ad vltima est ventum maciei. Vide Coac. 3. lib. 1.

COLOR PALLIDVS AVT NIGER] Certissimum corruptionis argumentum, & defraudatæ partis nectare viuifico.

PALPEBRARVM AVTEM, NARIVM, LABIORVM LIVOR, BREVI LETHALIS] Quoniam signa sunt extinctionis caloris viuifici, quæ quidem in corde est ipsa mors. Atqui extinctio in parte vna, ad extinctionem apparet futuram in toto: multò magis si pars illa liuori opportuna non sit: vt hæ profectò nō sunt natura sua cutaneæ. Atqui omnium difficillimè liuorem palpebræ contrahunt largo spiritu irriguæ: vt sit omnium propterea in illis signum certissimum.

4 Προσώπῃ εὐχροία καὶ σκυθρωπότης ἐν ὀξείᾳ κακὸν. μετώπῃ ξυγαγῶν ἤτις τοῦτέοις φρενιτικόν.

Egregie colorata facies & vultuosa; pestifera. Quòd si præterea frons contrahatur; phreniticum.

HIC CERTE non minùs sua debet habere bona suspecta qui repentè speciosior & coloratione factus est; quàm mala vereri qui contra consuetudinem multum emacruit, & colorem decorumque amisit. Quemadmodum autem iam patefacta & explicata est *πικρὸς* quæ ducitur ἐκ τῆς πικρῆς spe-
tabilium in colore, caractere, & mole faciei, per corruptionem omnino à se mutatis, quæque ad vltima ventum esse testantur, aut sperabilem adhuc vitæ salutem ostendunt; idque ex perspicentia causarum eam mutationem efficientium, prout scilicet causæ illæ sunt leuiter pressæ atque fugaces, aut firmiter fixæ & stabiles: ita propositum illud est præceptoris in hac prognosi, decisionem facere eorum quæ prima fronte in facie bona esse videntur; solane, vt ita dicam, fronte; an verò reapse ipsi naturæ & ægro studere videantur.

His ita constitutis. EGREGIE COLORATA FACIES] i. Saturato rubore suffusa, nec eo quidem refluxo, vt in iis qui vetecundia erubescunt; sed fixo & stabili. Sic enim *εὐχρὺν τὸ προσώπῳ* idem significare quod *πικρὸν ἐξέρχεται* Galenus auctor est in prorrhethico: quamuis gratiosum sit nomen *εὐχρὺν*, & spei plenum, cum alibi passim, tum verò in historia Clazomenij, in quo solum illud signum salutare notauit, *εὐχρὸν*. Itaque facies egregie colorata contra naturam & consuetudinem eius in quo talis lucet splendorque, nec tamen hæmorrhagiæ criticæ opinionem facit, sed incendium cerebri aperte testatur, vnde facilis transitus ad melancholicam ecstasim esse solet, cuius in promptu est signum hoc.

ET VULTUOSA] Aspectu terribilis, qualem Hippocrates vidit in ea muliere quam vocat *δυσχολία* ex atræ bilis dominatu quæ facilem habuit generationem ex sanguinis æstu quo multum incanduit; vnde primùm facies visa est egregie colorata. Melancholiæ autem certissimum signum est facies vultuosa, quod in illa muliere tanti fecit Hippocrates, ad melancholiæ, omnisque dementiæ contemplationem, vt cum diurni mœoris inueteratio purgationum menstrualium suppressionem excepisset; sola faciei caperatio tantæ calamitatis signum ediderit, accedente paulò post vicissitudine garrulitatis & silentij, quam sustulit menstrualis materiæ profluuium, cuius suppressio vrinas faciebat nigras cum securitate coniunctas, de quibus ita philosophatur Galenus. *Vrinarum color, etsi nigrarum, nihil mali portendebat, quod menstruorum suppressio esset valde melancholicorum: vnde merito factum est vt vultuosa & horribilis esset, nonnihil delirans ac nonnihil etiam cumatosa.*

PESTIFERA] Calamitosa, vel etiam mortifera. Ac calamitosa quidem mulieri Thasiæ, crebra vicissitudine conuulsionis & dementiæ; quam calamitatem sustulit profluuium menstruale. Mortifera verò, mulieri quæ Cyzici gemellas difficulter pepererat, indeque lochiorum excursu sursum ad caput nugas garriuit, siluit, tandè que è potestate mentis exiuit; cum paulò antè fuisset vultuosa, contumax, atque fastidio & contumacia insolens. Itaque ergo conuulsionibus crebra, cum frigore extimarum partium, phrenitica interiit 14. dic.

5 Περί προσώπου εὐχροία, καὶ ἰδρώτες ἀπυρέτοις κόπρῃνα παλαῖα ὑπόχοντα. ὁ σημαίνει, ἢ διαίτης ἀπαξίω.

Eximia faciei coloratio, & sudores febris expertium, facies vetustas subsistere, aut irregularem dietam testantur.

HACTENVS de signis faciei quæ apparent in morbis acutis. Nunc de coloratione extraordinaria, aut mala consuetudine parata, & quibus artibus deleri possit, prognosin institui.

EXIMIA FACIEI COLORATIO] Non insita, nec gentilicia, non item reffusa; sed fixa & stabilis, quæque perennem habet in naturalis œconomiz vitio causam.

ET SUDORES] Multi à somno, per expressionem ab oppressione quam fecit nimia superuacanei humoris abundantia, quæ vel inueterationem habet, vel recens nata est dietæ vitio; propter eaque illa, purgationem; hæc verò, solam mutationem dietæ requirit. Sic enim Galenus. Το μὲν γὰρ πλεονὲς τῆς ὑγρῆς πρὸς δυνάμειν σημαίνει, ἥτοι δὲ πλεονὲς ἢ δὲ λαμβανόμενον σιτίων ἀμπελειαν. ἢ δὲ πλεονὲς ἐμπεριεσθῆναι ὑπερβαλόν. Καὶ εἰ μὴ δὲ πλεονὲς ἢ δὲ λαμβανόμενον σιτίων ἀμπελειαν. καλοῦνται πολλὰ λαμβάνειν. εἰ δὲ δὲ πλεονὲς ἐμπεριεσθῆναι κατωπίον.

6 Τὰ κτ' ῥίνας ἐρυθήματα· κοιλίης ὑγρανορροίας σημεῖα· τοῖσι κτ' τὰ ὑποχόνδρια, ἢ πλάθμονα πόνοισιν ἐμπυορροίσι· κακόν.

20 *Rubores narium, signa sunt profusioris alui: malum pulmonis aut iecoris empyemati.*

ERYTHEMATA hoc loco dicuntur, non eodem modo quo in illa prognosi, πὲρ τῶν ἐς ἐρυθήματα, Coac. 1. cap. 4. lib. 2.


vbi tumorem significant rubrum, & phlegmonem ipsam sub auribus ortam quæ parotis nominatur. Hic enim simpliciter pro suffusione rubra vsurpantur, quæ non assurgit in molem tuberculi phlegmonosi; sed potius refert ἐκχυμωσιν, i. suffusionem quandam erysipelatosa, alibi dictam αἵματος. Nec verò hic narium rubor πλεονὲς ὑγρῶν, i. eximiam illam faciei colorationem exprimit, quam superiore prognosi explicauimus. Illa enim vetustas facies manere in aluo, aut irregularem dietam ostendit; hanc verò dicit profusioris alui signum esse.

30 Itaque nullo modo ad commemoratam illam πλεονὲς ὑγρῶν potest referri. Erit igitur hic rubor, mea quidem sententia, suffusio quædam erysipelatosa, per feri cuiusdam substillum quod in narium densitate subsistit. Et quoniam nimia illius feri abundantia natat caput, idem his vsuuenit quod balbis quos maximè longa exercent alui profluvia. Scitum est illud. Τραυνοὶ ὑπὸ δισσώροισι μάλα δύνανται μακρῆς. Nā quoties è capite feri prolapsus excipitur à vētriculo, inde profluuium alui eicitur.

MALVM IECORIS AVT PVLMONIS EMPYEMATI] Malum, inquam, rubores illos in facie efflorescere, quibus significatio fit vaporis teterrimi expirantis ex empyemate putido, quod ipsum per se est mortiferum. Vel etiam, malum est ad empyema sese alui profluuium adiungens, aph. 16. 6. Venit autem profluuium alui, vel prolapsu in intestina catarrhi quem expiratio illa commouit; vel rupta intus vomica, viamque inde habente ad aluum: quorum est posterius peius priore. Vide part. 4. 0.

40 1. 2. 6. Epid. ac sustine donec audias explicari Coacam illam. Peripneumonici lethale est pus secedere.

DE OCVLORVM AFFECTIBVS.



ΦΘΑΛΜΩΝ καθαρότης, καὶ τὰ αὐτέων λευκαὶ ἐν CAP. VI.
μυδύων, καὶ πελίων, καθαρεύειν κρίσιμον. Ταχέως
μὲν ἐν καθαρορροίῳ, ταχέως σημαίνει κρίσιν. βραδέως
δὲ, βραδυτέραν.

1 *Oculorum nitor, eorumque alba ex nigris & liuidis nitentia; salutare. Ergo si pura breui redduntur, ea puritas citam crisin ostendit: sin autem serius, tardiozem.*

60 QVEMADMODVM oculi summa cura tuendi sunt, quod illi ad vitæ simul & vsu & dulcedinem conferunt; ac præter ea quæ cuique animantium generi tributa sunt, præstantior alius in homine sit oculorum finis; naturæ cognitio, Dei comprehensio, ipsaque, penè dixerim, beatitudo: sic eos magna contentione animi, intentaque visionis acie intueri oportet, ad comparandam futurarum criseon præfensionem, eorumque quæ adfunt, quæque præsentia sunt perceptionem: idque cum in omnibus morbis, tum maximè in acutis. Solenne est illud Hippocratis. Οφθαλμοὶ ὡς ἀρχὴ ζωῆς, ὥτε καὶ γὰρ. 1. Vt 7. 4. 6. Epid.

lent oculi, sic ipsa persona. Est enim rationi consentaneum ut si ex colore, caractere, & mole, tempera-
menti & habitus, humorumque quorum dominari pars vnaquæque tenetur, notitia comparatur; fir-
missimum illud ex oculis adferri possit, qui ut nativa puritate cæteris partibus antecellunt, ac suo nito-
re facultatum ipsarum virtutem faciunt aspectabilem: ita si à se mutantur, & facultatum quarum po-
tentia totum corpus administratur infirmitatem, & naturalis œconomiz impuritatem ostendant. Sunt
enim gemmarum & margaritarum apertiores maculæ, quàm silicum obscurorum. Et quoniam oculi
iure societatis & vicinitatis cerebri arcem contingunt, inde adeo fit ut principiorum *τὸ ἴδιον* in substan-
tia, facultatum verò *τὸ διωκόμενον* in officio, validasque vires declarent, quæ in nativa coloratione, habitu
succo pleno, splendore, & facili motu cernuntur. Sin autem cœcavi, squallentes, malè colorati, & in mo-
uendo pigri appareant, facultatum principia in vitio esse testentur, cerebrum scilicet, cor ipsum, & ie-
cor. Quæ omnia quoniam decisiones proprias sunt habitura, quibus cuiusmodi sint, & quamobrem
fiant atque appareant ratio explicabitur; sufficit hoc loco propositæ prognosæ causas adicere, quod
ea cæterarum huius argumenti de affectionibus oculorum sit veluti canon & regula.

Quæ cum ita sint. **O C U L O R U M N I T O R**] i. Oculi velut gemmei, puritate humoris crystalli-
ni, & aquei siue albuginei; tum etiam tunicarum araneosæ, corneæ, qua pupillam attingit, vuez, &
adnatæ politura: ex quibus efficitur ut rerum aspectabilium sint *ἐν πύλαισι καὶ ἐν φύλαξι*, i. *prompti suscep-
tiores* eg. custodiæ oculi. Verumenimvero, ut visionis instrumentum esse *ὁδὸς διαφανής*, i. aqua pellucida,
quod faciliè excipiendis, & fideliter continendis rerum aspectabilium speciebus sit maxime accommo-
datum: sic proprium & vernaculum oculi lumen *τὸ ἐξ ἑαυτοῦ* sibi *ἐν αὐτῷ*, i. *consocialia*, velut porritur
quidam, traiecit ab extremo lumine ad intimum animæ per quod visio ipsa perficitur. Quantum igitur
ἡ αὐτὴ, i. *radius* puritate superat aërem, vaporem, aquam, & terram: sic visionis instrumentum *αἰσθη-
τικὸν*, i. *radiosum* cætera vincit *ἀσθητικὰ*; auditus quidem, quod est *ἀερῶδες*, i. *aërium*; olfactus, *ἀτμῶδες*,
i. *vaporosum*; gustatus, *ὕδατιδες*, i. *aquosum*; tactus, *χωρῶδες*, i. *terrestre*. Ergo. **O C U L O R U M N I-
T O R**] Qui est huiusmodi puritate humoris & tunicarum pellucidarum, cum politura adnatæ; tum
etiam vernaculi luminis, ut ita dicam, fulgore. Atque is nitor cernitur ab iis qui oculos intuentur in pu-
pilla, iride, & tunica alba; cuiusque nitore ipse sibi æger est conscius, qui neque lucis appulso offenditur,
nec mulcas venatur, floccos auellit, nec denique visis mendacibus exterritur.

E O R U M Q U E A L B A] i. Membrana *ἐπιπεφυκὴς*, i. *suprema*, ab ultimis pericranij oris cum ve-
nulis eius ad iridem usque producta, ubi efficitur communis tunica ocularium musculorum.

E X N I G R I S E T L I V I D I S N I T E N T I A] i. Si oculi decorem amittunt recipiant, & si oculo-
rum candida, liuore non ita pridem decolorata, tandem albescant, ac denuo naturaliter colorètur; non
quidem instauratione complexionis emortuæ, quam *ἐκρωσιν* Græci vocant, liuoris parentem: quia non
potius est à privatione habitum denuo comparari: sed amorione fucillationis quam veteres *ἐκχύμασι*
nominarunt; cuiusmodi esse solent quæ sub oculis videntur percussionum vestigia, *ὕπωμα* Græcis di-
cta, si tantum procatarcticam sugillati oculi causam exceperis. Cuiusmodi est etiam calcani fracti mol-
lis adhuc *μελασμός*, i. *nigredo*, inflammationis expers, quem facit venularum *ναυσιέσεις* per sanguinis, ex alto
lapsu, expressionem, qui tamen æquali duræ cutis succisione, foris aquæ, & olei, tum elleborismo gan-
grænescere prohibetur.

S A L V T A R E] Id enim significat *κρίσιμον* absolutè usurpatum. Est autem salutaris nativa oculis re-
stituta coloratio; quatenus illa spem adfert secundi iudicii atque salutis: ob eā sanè causam, quod trium-
phantis naturæ lumen, non minus in oculis declaratur, quàm afflictæ calamitas. Itaque quemadmodum
oculi saturato rubore nigrescunt, vel etiam liuorem cōtrahunt ab inflammatione quadam cerebri, aut
venularum repletionem, aut sanguinis ipsius *κακότητι*; quemadmodum item amblyogmæ obscuratur per
spiritum & splendoris vernaculi impuritatem: sic illis calamitatibus defunguntur per *ἀφροεμασίαν*, i. *ca-
rentiam ardoris*, quam facit materiæ mitificatio victrice natura, & per sinceritatem spirituum humorum-
que, quæ intacta superest, caligine omni dispulsa. Commemorata autem vitia oculorum, *κρίσιμα* esse
non possunt quando existunt; ut esse solent cum in propinquo est critica hæmorrhagia & vomitio i-
psa. Declarat illud quod impuritatis & obscuritatis amotio, salutarem fore crisin ostendit.

Ergo. **S I P U R A B R E V I R E D D V N T U R**] Cuius puritatis argumentum est nitor, non ita
pridem fœdatus, qui nunc restitutus apparet, fracto iam morbo: vnde facultates lucent in officio, ex
principiorum virtute, & meatuum libertate. Desperabilis est autē nitor in parte emortua, vel quæ gan-
grænam concepit. Pertinet autem ad huius prognosæ explicationem, quod idem scripsit de cerebro
syderationem ingresso. *Cerebro syderato; alij quidem tertio syderationis die; alij autem septimo vitam finiunt:*
quibus elapsis periculo defunguntur. Sin anatome facta, os dissociatum cernitur, sine dubio moriuntur.

E A P U R I T A S C I T A M C R I S I N O S T E N D I T] Ut enim pepasmi excrementorum morbi-
ficorum, celeritatem & securitatem crisis denunciant: ita personæ ipsius qualitates naturaliter consti-
tutæ, vel in toto corpore, vel in quibusdam partibus morbo obsessis, aut per sympathiam malè affectis;
cum restitutæ fuerint, & ad se redierint ex longo aduersæ valetudinis intervallo: quemadmodum in lin-
gua docebitur. Non enim minora sunt argumenta futurarum criseon in qualitate corporis, quàm in pe-
pasmo excrementorum; ut ratio ipsa docet in morbis siccis cum iam humescere cœperint. Cæterum nos
illud, *τὸ πάθος*, potiùs ad temporis breuitatem, quàm ad celeritatem actionis referendum putauimus: sicut
in illo fecit Galenus. *Πύλον δὲ γὰρ τὸ πάθος τὸ ἀντιπύλον, καὶ ἐν πύλιν.* Idem enim significat *τὸ πάθος*, quod *τὸ
ἀντίπαθος*, aph. 12.1.

S I N A U T E M S E R I V S, T A R D I O R E M] Propter contumaciā morbi, & imbecilliorē
naturæ virtutem. Contrariorum enim contraria sunt consequentia. Huiusmodi autem sunt illa. *Si spu-*
ritum cū

nam cito apparet, morbum facit breviorē, βραχύτεν; sin serius, producit, μακρύτεν. Hæc prognōsis legitur in aph. 12. c. libello Hippocratis περὶ κρίσεων.

2 Τὸ ἀχλυνώδες τῆς ὀφθαλμοῦ, ἢ τὸ λευκὸν ἐρυθρανόμορον, ἢ πελαγινόμορον, ἢ φλεβῶν μυαίνων πληρέμορον ἐκ ἀσείων.

Oculorum caligatio, album ve rubens, aut linens, aut venis obsitum nigris; indecorum.

ENIMVERO bene res eunt, quando nitent oculi puritate humorum, & proprii atque vernaculi luminis, ut ita dicam, fulgore; aut si antea decolorati obscurative fuerint, pristinum decorem recipiunt. Qua de re extrat superior. decisio explicata. Sed ut natiuus ille, aut restitutus nitor, spem adfert secundi iudicii in morbis acutis: ita visionis obscuritas & caligatio; tum etiam oculorum fœda liuore aut saturato rubore decoloratio firmiter fixa, de vita actum esse testatur, cum aliis signis quæ foris cernuntur, & intus versantur, mox explicandis.

OCULORVM CALIGATIO] Aspectabilis scilicet medico intuenti, & conscia ipsi ægroto qui suæ est mentis. Ac medico quidem aspectabilis est in hypochymate, floccorum auulsione, & glaucōmate vel amaurōsi. Conscia autem ægroto in scotodinia, amblyopia, & cæcitate. Sic enim Galenus τὸ ἀμαυρώμενον ὄμμα, καὶ τὸ ἀχλυνώδες, αὐτὰς τε καὶ μὲν, καὶ τὰς ὁρᾶς γίνεται δῆλον. Sed tamen hoc interest, quod omnes caligantes hebescent; non autem omnes hebescentes caligant. Nam caliginosis præter hebetudinem, visa occurrunt caligine involuta, veluti spectra quedam. Atque ea caligo nebulam & nubem contingit, nebula quidem crassior, nube verò tenuior. Est autem spiritus & humoris, velut aëris, perturbatio quedam, quam ἡλῶσιν Græci vocant. Sed hebetudinis nomen generalius est, quàm visionis caliginosæ. Ut enim caligatio & hebetudo sint visionis obscuræ: ramen caligatio accessionē habet caliginis intus conceptæ & genitæ. Ἀμαυρώσις verò vel hebetudo concretione nullam in hebescentibus ostendit humoris contra naturam, iis qui oculos intuentur: sed tantum profligati splendoris notas aperit in oculis velut emortuis, cuiusmodi esse solent decrepitorum & iamiam moribundorum senum. Nos autem caligationem hîc posuimus, qua hebetudinis & allucinationis ratio continetur. Sic in sacris literis caligarunt oculi Isaac, non allucinatione, sed hebetudine, vel amaurōsi. Ergo. OCULORVM CALIGATIO] i. Allucinatio qua muscas venantur, floccos carpunt, festucas auellunt, visis mendacibus exterrantur, ut Dealcis vxor; quod accidit humorum & spirituum impuritate, non quidem ex aluo, aut pulmonibus, neque ex ambiente aduena: sed oculi obscurati indigena firmiter fixa: ut nulla perturbationis criticæ excusatio possit adferri. Huius autem allucinationis, quam alibi vocat ἀμβλωσμον, causâ est, vaporis atrii, aut crassi cuiusdam humoris ἐ cerebri in oculos illabentis permixtio. Similiter hebetudo, quam facit splendoris proprii quæ luminis extinctio, vnde nominantur αἱ ὀφθαλμοὶ ἀσπῆρες, καὶ ἀμαυροῦν, καὶ ὄμμα ἀμαυρώμενον & τὸ ἀμαυρόν, lib. 6. Epid. i. squallentes oculi, nec splendentes, oculus & hebetatus & hebes: quod infirmitatem summam denunciat, & νέκρωσιν visificæ facultatis. Quamvis autem caligationis nomine complexus fuerim visionem ἀσπῆρας καὶ ἀχλυνώδης, i. squallidam & caliginosam; distinctionem tamen non prætermisi quam scripsit Galenus ad illud. Ὅμμα ἀμαυρώμενον φλαυρόν, καὶ τὸ πεπηγός, καὶ ἀχλυνώδες, κακόν. i. Oculi hebescentis signum malum: sic & concretus & caliginosus.

ALBUM VE RUBENS] Ab inflammatione duræ meningis, & pericranij; vel à venularum repletionē, & sanguinis κακότητι; vel etiam ab effera bilis suffusione. Atque illud album ita sit rubens, non quidem rubore fugaci qui maximam vim habere dicitur ad præensionem hemorrhagiæ; sed fixo & stabili planēque symptomatico; per propagationem inflammationis è dura meninge in tunicam albam.

AUT LIVENS] Liuet enim perfrigeratum, perfrigeratur emortuum, emoritur autem per extinctionem viuacitatis in vitali principio, & paupertatem nectaris viuifici à corde exhausto.

AUT VENIS OBSITVM NIGRIS] Per τανύωσιν vel ἐκχύμασιν venarum pericranij, in venulas tunica albæ, ubi refrigeratus sanguis nigrescit. Qualis enim venarum color, talis & ipse sanguis existit.

INDECORVM] Ἀππῶν, absponum: quod nec iure, nec loco apparet, nec minùs exterreret medicos metu sinistri iudicii, quàm idiotas. Nam si commemorata signa iure & loco fieri viderentur, propterea quæ essent, vel hemorrhagiæ, vel criticæ vomitionis prænuncia; ut concedam idiotis videri terrificæ; at certè medicos spe quadam salutis consolarentur. Itaque apud medicos locum decori haberent. At sunt eiusmodi ut neque ab his, neque ab idiotis recipiantur. Sunt igitur omnino indecora, nec vlllo modo gratiosa. Eorum autem signorum vim multis in locis expressit. Hæc omnia censere oportet praua. i. progn. & progn. 11. c. 2. i.

3 Φλαυρόν δὲ καὶ τὸ τῆς αὐγλῆς φάγαν, ἢ δακρύειν, καὶ διασπρέφειν, καὶ ἑτέρῳ ἐλάσσω γίνεσθαι, πονηρόν. καὶ τὸ τὰς ὀφθαλμοὺς πυκνὰ διαρρίπτειν, ἢ λήμια μικρὰ ποιεῖν αὐτὰς, ἢ αἰγίδα λεπτὴν ἔχειν, ἢ τὸ λευκὸν μεῖζον γίνε-

αἰαί, τὸ δὲ μέλαν ἐλάσσω· ἢ κρύπτειν τὸ μέλαν ὑπὸ τὸ αἶμα βλέφαρον.

Sed prava quoque sunt hæc, lumen refugere, aut illacrymari, aut distorqueri, & alterutrum altero minorem fieri. Præuium est etiam, oculorum aciem crebrò huc illuc voluere; aut eandem lemis, tenuique pellicula obstrui, album incrementum, nigrum diminui, aut nigrum etiam sub palpebra superiore occultari.

SED PRAVA QVOQUE SVNT HÆC] i. A regula & præscriptione naturæ multum aberrantia.

LVMEN REFUGERE] i. Splendorem auersari Solis, & lumen à luce impressum, quod facit aspectabilem cuiusque corporis superficiem per colorationem quæ ætrem pingit. Atque ea splendoris auersio, instrumenti vitio accepta referri non debet; vt in iis qui natura sunt myopes, propter pupillæ mydriasis, & spiritus subtilissimi faciem dissipationem; qualis etiam cum ophthalmia semper coniuncta est: sed infirmitati potius facultatis visificæ, quæ in partis illius cerebri exolutione consistit vnde videndi vis manat, & profligationi vernaculi & proprii oculorum luminis quod amplius non habet exterius lumen consociale, vt habere solebat, cuiusque appulsu recreabatur.

ILLACRYMARI] Vt lacrymarum exceptio nulla sit, vel à procatartica causa, vt à fumo, & caparum odore; vel à perturbatione critica hæmorrhagiæ prænuncia; vel à catarrhi propagatione in oculos, quam facit orgasmus, attractio, vel exclusio: sed ab exolutione caruncularum quas oculorum canthis natura obduxit, vnde potentia retentricis efferta vis denunciatur; tum etiam à melancholia, vt in Dealcis vxore quæ modò lacrymas profundeat, modò risu os resoluebat. De lacrymis autem quod ad earum distinctionem attinet, sufficient illa præceptoris catholica. Quibuscumque per febres acutas, maxime verò ardentes, iniussu ac sponte sua funduntur lacrymæ; iis hæmorrhagiæ è natibus expectare oportet; si quidem cætera non sint exitialia: quandoquidem iis quorum malè res eunt, non hæmorrhagiæ, sed mortem denunciant. Et in febribus aliusve morbus sua sponte lacrymari, nihil absurdum: absurdum autem sine voluntate id facere. aph. 52. 4. Vbi Galenus τὰ πύκνωσις reprehendit, ac pro illo, ἀποπύκνωσις, legendum censet, ἀποκαλυμμένος ὁ πύκνωσις, i. mortiferè absurdum. Sed mea quidem sententia, idem significat hoc loco ἀπύκνωσις, quod in superiore prognosi, 30 in ἀσύνου.

AVT DISTORQVERI] Distorquentur autem conuulsione musculorum ipsos mouentium. Sed ea conuulsio quæ sit iniussu musculorum motu, qui naturaliter sponte nostra mouentur, eiusmodi est, vt vel collectione extraordinaria fiat musculorum conuulsionis causam habentium, nempe exhaustum & siccitatem; vel paralyti & resolutione antagonistarum, vnde contrahunt se muscoli, sursum, deorsum; dextrorsum, sinistrorsum. Siue autem conuellantur à siccitate, siue resoluantur ab exolutione principij vnde vis mouendi in oculos propagatur; pariter æqualiterque in vitio sunt, non quidem proprio, sed alieno; labefactatæ scilicet facultatis motricis. Illud autem vitium cernitur potissimum in musculis ocularibus, quemadmodum in temporalibus: quoniam τὰ κοινὰ καὶ τὰ ἐγγύς τῶν ὀφθαλμῶν καὶ μάλιστα κακοῦται, i. communia & vicina prima omnium, & maxime læduntur. Eam peruersionem attingit aph. 49. 4.

ET ALTERVTRVM ALTERO MINOREM FIERI] Quod accidit defraudato alterutrius oculi succo, propter inopiam vel interceptionem alimenti; vel etiam propter extinctionem facultatis vernaculæ & vniuersalis.

PRAVVM EST ETIAM OCVLORVM ACIEM CREBRÒ HVC ILLVC VOLVERE] Huiusmodi sunt ὀφθαλμοὶ ὁρῶντες, καὶ ἀσέκοντες, contremiscentibus à siccitate musculis, qui tremor infansibilis est; vel inflammata parte illa cerebri vnde nerui oculorum motores nascuntur. Quæ causa est cur delirij notæ potissimum luceant in deprauato & feroci oculorum motu: vt est facilis mutuaque ὁρῶν καὶ ὁρῶντος sympathia. Ac tremor ille commemoratus, delirij succedaneus esse potest, ac prænuncijs: quia indecora est oculorum actio crebrò huc illuc volutorum. Delirio igitur superueniens, accersit mortem. Præstat enim delirium superuenire tremori, quàm tremorem delirio.

AVT EANDEM LEMIS, TENVIQVE PELLICVLA OBSTRVI] Non quidem expressione humoris è cerebro, cuius tenuior pars facit ophthalmias ῥοῶδεις, i. fluentes; crassior verò, lemas: pituita scilicet in angulis in hærescente, aut quæ inducit palpebris epiphyses, quas interpretatur Galenus ἐπιπυκνώσεις ὀφθαλμῶν. Hæc enim sequuntur naturam efficientium causarum, hoc est, tempestatum; & sufficientium oculorum. Sed lemas intelligo, oculorum sordes, quæ cum exaruerint, vel arenulas in angulis expriment, vel ἀχλὺν in ipsa pupilla: propter infirmitatem potentia naturalis oculorum vernaculæ quæ succum alibilem mitificare non potest, vnde pro alimento restant vestigia pituitæ, quæ nihil aliud est quàm ἡμίπυκνον αἶμα, i. sanguis semicoctus. Notabilis autem signorum observatio quibus facultatum vitia in oculis representantur; animalis quidem, in hebetudine, hallucinatione, tremore, exolutione, & conuulsione ocularium musculorum; vitalis, in liuore; naturalis, in cruditate.

ALBUM INCRESCERE, NIGRVM DIMINVI] Pertinet hoc ad ῥυτίδωσιν, vel ῥυτίωσιν, quæ propria est pupillæ corrugatio. De qua in oculorum vitij illud expressit. Καὶ οἱ ῥυτίδωμένοι ὀφθαλμοὶ. Quem locum enarrans Galenus sic ait. Tum oculos contingit corrugari intus, cum adnata musculus oculum mouentibus membrana ad coronam producta, soluitur & laxatur. Ergo, maius fit album, laxitate; minus nigrum, corrugatione.

AVT NIGRVM ETIAM SVB PALPEBRA SVPERIORE OCCVLTARI] Quod cernere est in iis qui animi deliquio exoluntur, quibus obuertuntur oculi superiorem palpebram versus, ut occultata pupilla, quam nigrum vocat, nihil appareat præter adnatam tunicam. Tum est moriendum ægro, quando hæc fiunt.

4 Πομπρόν δὲ καὶ ὀμμάτων κοιλότης, καὶ ἐκθλιψίς ἐξω σφοδρά, καὶ λαμπρόδος ἐκθλιψίς, ὥστε μὴ δυνάσασθαι πλεῖν κόρην ἐκλείνεσθαι, καὶ βλεφαρίδων καμπυλότης, καὶ πῆξις ὀμμάτων, οἷνε χέως ἔμειν, καὶ χρώματα μεταβάλλειν, καὶ βλέφαρα μὴ συμβάλλειν ἐν πῶ καθύδην, ὀλέθριον. κακὸν δὲ καὶ ἰλλάντων ὀφθαλμός.

Quinetiam praua sunt hæc, oculi concaui, & foras multum exertiti, tum sic perstricta oculorū acies, ut potis non sit amplificari pupillā; præterea extimarum palpebrarum curuatura, oculorum concretio, aut ipsos continenter nictare, colorem mutare, nec posse palpebras dormiendo committi, pestiferum. Mala est etiam oculorum peruersio.

OCV LORVM cauitas cuiusmodi sit, & quamobrem ita sit, nuper in facie cadauerosā iam diximus. Certum est oculos fieri concauos, multumque subidere, quādo liquuntur à febre tabifica, adestque vna paupertas vinifici nectaris quod à fonte vberissimo cordis in extimas partes difflebat dū bene resistebant; nunc autem parca manu in visceribus stabulatur. Sed ea calamitas colliquamenti & defraudationis quotidiani pabuli, potissimum lucet in oculis, qui, ut molliores, facilius liquuntur quā cæteræ faciei partes; tum autem spiritus animalis multi participes in secunda valetudine, simul atque eo carere cæperint, collabuntur: ut mirum videri non debeat si tam vehementer subsidant.

ET FORAS MVLTVM EXERTI] Paralyticis musculis & in cerebri exoluti contagionem adductis, quam affectionem cum superiore, Celsus Hippocratem secutus, ita cōiunxit. Hæque aut vehementer subfederunt, aut facti tumidiore sunt. Hippocratis verba hæc sunt. Οφθαλμοὶ θαλασσορέοντες, ἢ ἐξίχοντες, ἢ ἐκκοινοὶ ἰσχυρὰς γινόμενοι. Non minora autem sunt mala & incommoda exoluti principij, quā exhausti in morbis acutis. Declarat illud repetita cōmemoratio cōcauorum oculorum in mentione extortorum, & veluti foras prosectorū, quamuis paulo antè concauorum meminerit in descriptione faciei cadauerosæ.

TVM SIC PERSTRICTA OCV LORVM ACIES, VT POTIS, NON SIT AMPLIFICARI PVPILLAM] Corrugatione scilicet vixæ tunicæ quæ facit pupillam, absumpto liquore albugineo, & spiritus animalis profligatione, & interceptione; collapsio meatu visorio, hoc est, optico nervo, vnde spiritus animalis visioni dicatus ad pupillam oculi peruenire non potest, ut peruenire solet tota substantia.

PRÆTEREA EXTIMARVM PALPEBRARVM CVRVATVRA] Quam cernere est in dormientium ὑποφάσι, quibus album quippiam dormiendo apparet, conuulsis pariter ocularium angulorum musculis, qui ad dimidium vsque tharsi ambo feruntur, eorūque vnus aperiendæ, alter claudendæ palpebræ dicatus est: vnde efficitur ut æquali vtriusque conuulsione pars altera tharsi claudatur, altera verò aperiatur. Talem curuaturam quam in prognost. καμπυλον βλέφαρον nominauit, idem etiam per ὀμμάδος καὶ ἐκθλιψίς expressit, quam ipse Galenus palpebrarum διαστροφῶν interpretatur: sicut idem præceptor explicauit his verbis. Ἐν μὴ διαλείποντι πυρετῷ, τῷ χέλι, ἢ τῷ βλέφαρον, ἢ ὀφθαλμῷ, ἢ πρὸς διαστροφῶν, i. febre non desinente, si labra, aut palpebræ, aut oculus, aut nasus perueriatur.

OCV LORVM CONCRETIO] In qua agnoscitur vel ocularium musculorum paralytis, vel æqualis contentio atque distensio, vel summa infirmitas & νεκρωδὴς quædam, vel profligatio mouentis ipsos facultatis. Constat enim oculorum πῆξις in ἀκυσία consistere, cuius ἀκυσίας omnino sunt causæ prædictæ.

AVT IPSOS CONTINENTER NICTARE] Per auersionem splendoris, aut tremorem musculorum palpebras mouentium. Distinctio autem nictationis, repetenda ex 83. Coac. lib. i. in febre cōtinua, qui voce capiti iacent, atque nictantur; siquidem prorupto è naribus sanguine, vocem receperint, & apud se fuerint; periculo defunguntur. Sin autem secus acciderit, cum difficultate spirandi, citā mors venit. Itaque nunquam ægri nictantur marmarigarum molestia & offensione.

COLOREM MVTAERE] In descriptione faciei cadauerosæ sic ait. Quod si etiam liuida his fuerit palpebra, aut nasus, aut labrum, citā mors venit. Causæ sunt explicatæ.

NEC POSSE PALPEBRAS DORMIENDO COMMITTI] Cate circa frontem intenta & rigida, vel resoluta & paralytico musculo lato, cuius officium est præter cætera palpebras demittere.

PESTIFERVM] Collapsus naturæ præsidij, & viuacitatis extinctione à febre tabifica & colliquante.

cap. 6. lib. 2.
lib. a. progn.

part. 1. 6. Epid.
aph. 49. 4. &
Coac. 78.
1. lib.

comment. ad
11. prot. 1. 1.
& ad 17. part.
1. 1. 6. Epid.

vide cōment.
ad 130. 1. lib.

MAIA EST ETIAM OCULORVM PERVERSIO] Ex *lumborum anadrome oculorum illoſi*, malum denunciat. Commemorata autem ſigna omnia ſunt exitialia, niſi ſint à perturbatione critica; aut peculiari natura & conſuetudine; aut à fugaci cauſa, vt vigiliarum, inedia, profuſioris alui. Sed ea quæ his de cauſis orta ſunt, vno die finiuntur.

5. *Οφθαλμοὶ ἐρυθροὶ ἀπυρετῶ γινόμενον, κοιλίης πονηρίῳ χρονίῳ σημαίνει.*

Oculorum rubra ſuffuſio, febris experti, diuturnam ventris afflictionem denunciat.

H A C T E N V S de oculorum affectionibus quæ cum febre ſunt, neque ex perturbatione critica, aut peculiari cuiusque natura, aut etiam fugaci cauſa ortæ putantur: ſed à calamitoſa vi febris cum virium infirmitate coniuncta. Nunc de iis quæ in vacatione febris ſolæ exiſtunt, cuiuſmodi eſt oculorum rubor ita deſcriptus.

OCULORVM RUBRA SVFFVSIO] Ex capite fuſa per ſeri cuiuſdam ſubſtillum quod in oculorum denſitate ſubſiſtit: non autem eximia illa coloratio & prærubra inflammatio ſicca, quæ fæces veruſtas ſubſiſtere, & irregularem diætā teſtantur; ſiue ſit perturbatione tunicæ adnatæ, ſiue *πραχμα*, i. *aſperitas palpebrarum*, ſiue epiphyſis, *ἐπιφύσις*, aut ſycōſis; qualia ſunt repleti capitis catarrhoica ſymptomata, ex diuturna tempeſtate auſtrina quam exceperit aquilonia, vnde *ὀφθαλμοὶ ῥοῶδες, λευκὰ συμπτὰ*.

FEBRIS EXPERTI] Vt illa ſuffuſio non ſit tabificæ febris ſymptoma, non etiam ſignum perturbationis critica, quod, præter cætera, maximam vim habere dicitur ad hæmorrhagiam.

DIUTURNAM VENTRIS AFFLICTIONEM DENVNCIANT] Vt enim rubor narium ſignum eſt liquidioris alui: ſic & rubra oculorum ſuffuſio febris experti. Nam quotiescunque nimia ſeri abundantia natat caput, idem his vſuuenit quod balbis quos maximè longa exercent alui profluua. In promptu cauſa eſt, quia cum ſeri prolapſu ventriculus affligitur, profluuium alui cietur. Exiſtiſſe multi leguntur hiſtoria 2. 1. Epid. quibus poſt inueterationem ophthalmiæ fluentis, *ſub aſtatem facta eſt lienteria, vel etiam tenefimus, diarrhæa bilioſorum tenuium, multorum, crudorum, mordacium, nonnullis aquoſorum*. Porro Græcum illud *πονηρίῳ χρονίῳ*, diuturnam ventris afflictionem Latine expreſſimus, in qua liquidis excrementis cum moleſtia & offenſione fertur aluus. Quod enim de liquidiore aluo ſcripſit in aph. & Coac. idem in eam ſententiam per afflictionem explicauit. Hippocratis verba hæc ſunt. *Οχι- cunque in febribus vñdecunque ſanguinem liberaliter profuderint, iſs, cum reſectioni ſtudere cæperint, κοιλίᾳ καὶ χρονίᾳ*. In prorrh. ſcripſit in eandem ſententiam, *πομπροῦνται*. Vide Galeni comment.

6. *Αἱ δὲ ὀφθαλμοὶ ἐπαναστάσεις, ἐν τῇσιν ἀνακομῆσιν κοιλίῳ κατάρρηγνύουσι.*

Quæ circum oculos aſſurgunt puſtula, dum reſectioni opera datur, aluum prorupturam oſtendunt.

Q V O N I A M ita comparata eſt naturæ ratio in omnibus qui nuper morbo defuncti ſunt, vt aluus eorum pigrior ſit in concoquendo, ſiue illius ſegniciæ cauſam dederit ſanguinis liberalior euacuatio; ſiue diuturna officij vacatio, quod febrē vigente, potiùs in curationem illius incumbendum erat, quàm reſectioni ſtudentum: vnde adeo ſit, vt propter imparem neceſſitati commoditatem, aluus collapſa ſiccior & immemor ſui officij, cum paupertate caloris natiui, nec medici, nec ægri votis reſpōdeat, dum reſectioni opera datur, exacto iam morbo, aut certè affecto. Quæ cauſa eſt cur in ventriculo cruditati ſit locus, ſymptomatumque huius prognofis conſecutio.

Q V Æ C I R C V M O C V L O S A S S V R G V N T P V S T V L Æ] Quæ ſunt epiphyſes palpebrarum foris & intrus pullulantes, viſioni maximè officientes, quas priſci medici *σῦκκα* vocabant, Galenus autem *ἐπιφύσεις ὀφθαλμοῦ*.

D V M R E F E C T I O N I O P E R A D A T V R] In permoleſta ventriculi conuerſione ab ocio ad negocium, necnon in caloris natiui paupertate, quam vel euacuatio liberalior, vel ardor febrilis inuexit; tum etiam collapſo habitu ex officij quotidiani vacatione. Quæ conſideratio vniuerſalis & particularis naturæ, eò præceptorem adduxit, vt ſi pleuritidis ſua ſpōnte quieuerit, priſſanam ſolidam plenior manu exhibendam putari; ſin autem artificio medici curationem receperit, cremorem priſſanæ, & parciore manu.

A L V V M P R O R V P T V R A M O S T E N D V N T] Seri prolapſu, & fatiſcente aluo. Nam quibuscunque liberalior ſanguis vñdecunque profluxit, iis, cum reſici cæperint, aluus liquidior cumulatè ducitur. Et, *Oculorum rubra ſuffuſio, febris experti, diuturnam ventris afflictionem oſtendit.*

7 Ἐπὶ ὀφθαλμῶν διαστροφῇ κοπιῶντι, πυρετῶν, ρίγος ὀλέθριον· καὶ
κοματώδεις ἐν τυτέοισι· κακόν.

*Si ad peruersionem oculorum, laborioso febricitanti rigor accesserit;
perniciosum. Tum comatosi in his gravissimum habent malum.*

10 HÆC PRŒGNOSIS in prothetico iisdem exarata literis continetur, in cuius explicatione, tam
perspicua est Galeni oratio ut facile omnem dubitandi occasionem tollat de structura & connexione
vorum illarum, πυρετῶν καὶ κοπιῶν. Hoc spectat igitur Galeni oratio, ut intelligamus eò peius res ire,
quò plura symptomata lumen suum ostendunt, ac plures partes labefactatæ sunt. Etenim peruersio o-
culorum, febris, lassitudo vlcerosa, rigor & coma, eiusmodi sunt ut nihil necesse sit ea simul existere,
cum ipsa per se singula sufficiant ad exterendum. Sed tamen pestifera sunt perenni generatione &
propagatione in corporibus nostris causæ, vnde symptomata illa veniunt quæ causæ illius morbificæ
& partis oblesse propria, & simul consecutaria esse solent.

Ergo. SI AD PERVERSIONEM OCULORUM] Fixam & stabilem, quam vel vnus partis
oculorum facit conuulsio, vel antagonistæ exolutio, ἰσχυρὴ Græci vocant. De qua illud perceptum ex-
tar Galeni. in vniuersum, oculorum distorsio (per distorsionem autem explicat illud, dextro illofus fuit) bono signo
non est, siue ab excursu lumborum, siue quomodocunque fiat.

LABORIOSO] Lassitudine scilicet vlcerosa, quæ, ut phlegmonosa, etiam dementiæ opinionem
facit; nunquam verò tensua.

FEBRICITANTI] Ut illa peruersio accadat propagatione causæ morbificæ à lumbis ad caput;
vnde symptomatum amplificatio; non autem per transitum criticum, qualem expertus est homo ille
qui in Dealcis hortu iacebat.

RIGOR ACCESSERIT] Frustra citatus è venis, non ab vlla parte vomitum habente; ut sym-
ptomaticus ille rigor frustra citatus translationem faciat ad diaphragma & caput. Est enim rigorum, ex dor-
so vis, quàm aliorum acerbior.

30 PERNICIOSVM] Quoniam ad partis nobilissimæ, i. cerebri oppressionem, accessio fit perpetuæ
translationis ab orgasmo.

TUM COMATOSI IN HIS GRAVISSIMVM HABENT MALVM] Nec solum comatosi;
verum etiam phrenitici, atque fanatici, pro varia morbifici humoris conditione. Nam eorum qui sur-
sum ad caput feruntur humorum; tennes quidem & effecti, vel hæmorrhagiam cient, vel dementiam
adferunt; crassi autem cum biliosis mixti, κῶμα ἀγρυπνόν; frigidi verò ipsi per se, κῶμα ὑπνῶδες & surditate-
tem. Omnia autem symptomata per symptomaticam translationem orta, sunt indigenis longè peiora;
quoniam ad præparationem suscipientis causæ accedit vis efficientis, vnde magnorum malorum, &
inter illa eximiorum consecutio adferri solet.

40 8 Οφθαλμοὶντι δυνδρὶ, πυρετῇ ὑπὸ χρομῶν λύσις· εἰ δὲ μὴ· κίνδυ-
νος τυφλωθῆναι, ἢ ἀπολέσθαι, ἢ ἀμφοτέρω.

*Lippienti viro superueniente febre, lippitudinis exolutio: sin minus,
cacitatis aut mortis, aut utriusque periculum est.*

ENIM VERO pleraquæ mala superueniente febre sanescunt, quæ ipsius primigeniæ consecutaria
esse solent: quemadmodum multa existunt quæ febris finem adferunt, quibus ipsa remedio est, aut æ-
gris damnosa, prout κατὰ λόγον ἡ ὁφθαλμῶν, se habet. Quartana sanat epilepsiam: tertiana exaurit & listit
catarrhum. Eadem adolescentes facit incrementis augescere. Si quis ebrius repente obmutescat, con-
uulsus moritur, nisi superueniente febre vocem recipiat. Melius est febrem superuenire conuulsio-
ni, quàm conuulsionem febri. Sanè quidem febris conuulsionem exoluit, si acuta sit, nec prius extiterit;
aut certe si fuerit, exacerbationem habeat: alioqui febris conuulsioni impar, ipsam calamitosiorem &
contumaciorem efficit ad exoluendum. Nam ἡ ἐξαιφνης ἀποπληκτικὰ λευκώνας, ὅτι πυρετῶν ἀντι-
χρῆσις ὀλέθρια, i. Apoplexia repens orta, lenta superueniente febre, mortifera. Contrà conuulsio febre excluditur, quæ aut
eodem febris die, aut postdie, aut etiam perendie incidit.

Ergo. LIPPIENTI VRO] Cuius oculi sunt inflammatione obfessi, vel sanguinis in tunicam
adnatam, vel acerrimi feri affluxu, per orgasmum, exclusionem, & attractionem. Οφθαλμοὶντι autem no-
men simpliciter usurpatum, æquè pertinet ad mulieres atque ad viros; quemadmodum & illa in genere
masculino expressa. Οφθαλμοὶντι κατὰ τὴν διαφάνειαν λευκῶναι ἀγρόν, & ἐν τῷ μύκῳ ὑδρωμένῳ τῷ κινδυνῷ. &c. Nam &
mulieres ophthalmia laborant. Eadem sunt etiam calculosæ. Cur autem lippienti adiunxerit illud, viro,
non hercule inuenio, nisi quis fortè dicat acriora esse omnia febris & ophthalmiæ in viris, quàm in mu-
lieribus: sed hoc non satis est. Dicam quod sentio, hanc prognosin breuiarium esse cuiusdam historiæ

cuius Hippocrates fuit testis oculatus, quam nondum inuenire potui.

SVPERVENIENTE FEBRE] Non quidem per propagationem causa ophthalmica, sed propria generationem; unde superuenit febris quæ antè non fuit, sicut in conuulsione diximus.

LIPPITVDINIS LEVATIO] Exudante sero acerrimo quod in pericranio stabulatur, & sub-
stillum perenne habet in oculos; aut etiam dissipato humore crasso qui oculorum venas replebat: non
secus atque meri porione discutitur; unde solennis ille aphorismus. *Dolores oculorum potio meri exoluit.*

SIN-MINVS] i. Si nihil opis attulerit ipsa febris, nec intus foras morbificum humorem moueat per sudorem; nec foras introsum, ut per liberalem hæmorrhagiam: sed orgasmum faciat in partem afflictam.

CÆCITATIS, AVT MORTIS, AVT VTRIUSQUE PERICVLVM EST] Cæcitas quidem, per luminis oculorum proprii profligationem, humoris crystallini *αμαύρωσιν*, & pupillæ ipsius præstrictionem; ab inflammatione prægrandi, propter assiduam materię ad oculos *μεγέθυνσιν*, unde fit *χρόνωσις*. Non minùs enim terrifica est catarrhi per febres conditio, quàm sperabilis exolutio.

AVT MORTIS] Calamitosa vi febris quæ cernitur in venenata qualitate, ardore, & translatione symptomatica. Quemadmodum enim dolores hypochondriorum inflammationis expertes, superueniente febre, sedantur: sic quæ ex hypochondriorum doloribus febres nascuntur, pestiferæ.

9 Οἷον ὀφθαλμῶσι κεφαλαλγίῃ πρὸς γίνεται, ἢ παρανοχουθεῖ χρόνον πούλω· κίνδυνος τυφλωθῆναι.

Quæ lippitudinem anteiuuit cephalalgia, aut insecuta firmiter fixa hæret; periculum cæcitatis adfert.

QVEMADMODVM coryza, i. catarrhus, isque ferinus, & sternutatio; siue ante pulmonis mala regnarit; siue iis iam ortis superuenerit, ipsos pulmonarios in discrimen vitæ adducit, facitque ut spes in angusto sit restituendæ salutis: ita cephalalgia firmiter fixa quæ lippitudinem vel anteiuuit, vel consecuta est, periculum cæcitatis adfert. Sed calamitates coryzæ, & sternutationis crebræ in peripneumonicis, loco explicabuntur. Nunc de cephalalgia ophthalmicæ sociæ, quæ illam societate iniuit per transitum aut progressum, ad huius prognoscens demonstrationem dicamus cuiusmodi sit, & quamobrem ab ea cæcitas in metu esse possit.

Ergo. CEPHALALGIA] Prægrandis scilicet atque intensa, quàm facit indigena causa multa & acris, vel aliunde translata, temperamentum & complexionem capitis multum diuque alterando, & continuitatem lacerando; idque cum aliarum capitis partium, tum maximè vtriusque meningis, cum desperabili hæmorrhagia, suppurato, abscessu, quibus exolui solet, nisi fortè cephalalgicum ante vigesimum diem ad exitium præcipitarit.

QVÆ LIPPITVDINEM ANTEIUIT] Humor prolapsu in oculos, quem neque vacuauit hæmorrhagia; neque expuratum per nares; nec sputa crassa, odore carentia: nec vlcusculorum vber-
tas; nec alui profluuium.

AVT INSECUTA FIRMITER FIXA DIU MANET] Quia post vigesimum diem sperabilis non est hæmorrhagia, per quam cephalalgicæ molestia ægri defunguntur, quando ea incidit primis periodis: nec verò cephalalgici eo naturæ beneficio gaudent, quod expectandum præcipitur in ea prognosi. *Quibus cephalalgicis firmiter & acriter caput dolet, vnaque oculis multum rubet, sanguis profunditur.*

PERICVLVM CÆCITATIS ADFERT] Qualis oculorum *πύρωσις* etiam melancholicis in metu esse solet; de qua illud præceptum legimus, aph. 55. 6. Deniq; omnis ophthalmia quæ perennem habet humoris generationem & affluxum, ut in cephalalgia cõtumaci, merum adfert cæcitatis: quod in puella quadam nuper vidimus, quæ cum menstrualis esset ac succi plena, nec ei menstrua responderent, post inueterationem cephalalgicæ, occæcata est.

10 Οφθαλμῶν πρὸς διάρροια ἀπὸ πτωμάτων χρησίμων.

Quæ lippienti sponte diarrhæa cietur; salubris.

EA DEMVM lege naturæ suscipitur vacuatio, qua morbificus humor excluditur conuenienter & dignè per liberalem & liberam excretionem, vel per abscessum *αὐτὴν ἴσως* in ea parte obortu, quæ omnino sit capax humoris morbifici. Melior est autem excretio quàm abscessus per decubitus. Sed ea excretio salubritati corporis accommodatissima est, quæ morbi cuiusque propria esse dicitur, in specie, materia, & subiecto: cuiusmodi est diarrhæa lippientibus, sponte naturæ ducta.

Ergo. LIPPIENTI] Ophthalmia laboranti, quam genuit acerrimi serci affluxus è cerebro vel dura meninge; siue illa sit primigenia, vel à spiritu, vel à diæta, vel ἀπὸ τῆς ἐνέργειας; siue præuiam habuerit cephalalgiam firmiter fixam quæ adfert periculum cæcitatis, ὅτι τὰ ὅμοια πρὸς αὐτὴν ὑπὸ φλέγματος καὶ ὁρμῆς

oculi mutilantur decubitu pituita.

DIARRHOEA] Alui profluuium, in quo liquidis & subrubris excrementis fertur aluus, raro & multum, cum abdomine molliter constituto, solido, & succi pleno; tum crassescere paulatim humore prorupto.

SPONTE] Non ope, nec artificio medici, nec etiam vlla incidente extrinsecus causa; vt vitio dia- 74. aph. 4. et, aeris inclementia, ventris afflictione, quam paulo ante nominauit *ποσειδών τις κακίας*. Quamuis autem illud, *ἀπὸ παντομάτου*, per illud, *sponte*; philosophorum stomacho arrideat; tamen quoniam tum hic, tum alibi commodo agri suscipitur atque perficitur; ideo naturæ magisterio fieri id ipsum diximus, quod non fit *μάττω*, vnde *παντομάτου* deductum esse nonnulli voluerunt. Quicquid enim sponte sua, frustra. 1. Phleg. non fit, nec temerè; naturæ imperio tribuendum putamus, quæ nihil facit *μάττω*. Atque *παντομάτου* illud, 10. vel *αὐτομάτως*, vel *ἀπὸ παντομάτου*, opponitur τῇ *θεραπείῃ*; ita tamen vt. *θεραπείας* nomen latius usurpatum complectatur ea quæ foris incidunt, quo iure, quæque iniuria; vt in illo. Οἰστροὶ ἀπὸ παντομάτου αἵμα ὑρέονται. 2. Ph. 7. 4. *ποσειδών* ἀπὸ τῆς νεφρῶν φασὶν ῥῆξιν σημαίνει. i. Quæ sanguinem sponte meium, illis rupta est in renibus vena. Vide Galeni cōment. Ne longū faciā, extat locus apud Hippocratem, qui apertissimè planissimèq; explicat quid & cuiusmodi sit τὸ ἀπὸ παντομάτου. Τὰ δὲ τοιαῦτα ἀπὸ παντομάτου γίνονται, τὰ πικρὰ, καὶ τὰ ἀγαστὰ. ὅς τις καὶ ἐπεχθεῖσα 15. τὰ πνευμάτιος ἐχόμενα, ἢ πεπνευμονίης, ἢ ἐμπύου ἔσται. κακόν. i. Sponte hæc bona malæque contingunt; alui perturbatio pleuritidis, aut peripneumoniciis, empyiciis ve; malum. Contrà ὑψύδρω, καὶ αὐλωδῶδε, ἢ πο λευκὸς φλέγματις ἐχόμενα, ἐπεχθεῖσα ἢ καλὴν ἰσχυρὰς ἀγαστὴν. i. Aquoso, lienoso, leucophegmatica; alui perturbata, bono est. Deinde subiungit. Τὰ δὲ τοιαῦτα δὲ ἐδὲ μάλω ἐπὶ ἀμασίλω, ἐπὶ σφίλω τῷ ἰσχυρῶν γίνονται, καὶ ὅ γίνονται ἀλλὰ ἀπὸ παντομάτου, καὶ 20. ὁπποῦντος γινόμενα. ἀφελὴ, καὶ βλάστης καὶ τὸν αὐτὸν λόγον. i. Hæc enim à nulla pendent medicorum sapientia aut insipientia; sed casu & fortuitis contingentiis, ledunt eadem & non ledunt.

SALVBRIS] Non quidem signo, sed causa: quod ea diarrhœa nimiam prauis humoris vacuet abundantiam atque reuclat. Idem quoque fit artificio. medici ad imitationem naturæ comparato, per clysteres, & purgantia medicamenta.

II Ομμάτων ἀμαύεσις, καὶ τὸ πεπηγὸς, καὶ τὸ ἀχλυνώδες. κακόν.

Oculorum hebetudo, cōcretio, et caligatio; denunciat graue malum.

EXPLICATA est comment. nostris ad 1. huius cap. in qua recensetur cāalogus ocularium affectionum quæ cum febre sunt.

12 Ομμάτων ἀμαύεσις ἀμα ἀψυχίη· σπασμῶδες σιωτόμῶς.

Obscuratio oculorum cum exolutione, citam conuulsionem ostendit.

Huius prognosæ demonstratio debet mandari literis ex comment. Galeni ad illam prorrhēti, 40. quæ sic habet. Quinetiam ceruicis & dorsi oborta refrigeratio, conuulsifica est: quod si præterea vrina fundantur *spumantes*, vnâque fuerit animi exolutio, & oëulorum obscuritas; conuulsionem testantur. His ita constitutis. *PROT. 20. C. 3. 1.*

OBSCURITAS OCVLORVM] Non quidem à caligatione, sed ab exhausto humoris crystallini, & spiritus visifici, atque splendoris oculorum proprii extinctione, quam siccitas ipsa fecit à febrili ardore: siquidem illa obscuratio præuias habuerit conuulsificas causas, nempe ceruicis & dorsi refrigerationem cum vrinis spumantibus; quæ sunt profectò iustissimæ conuulsionis causæ. Nam *frigus posterio- 7. Coac. lib. 3.* rum est cōnuulsificum: maxime verò in causonibus, quando & sæpe & frustra venit, ac viribus ægri iam fractis. Vrinæ verò spumantes siueliquantur, siue à perturbatione flatulenti spiritus eiusmodi sint; ytrovis modo semper conuulsionis futuræ opinionem faciunt.

CVM ANIMI DELIQUIO] Non quidem syncope quæ cordis propria est; quæque in præcipiti 40. virium omnium lapsu consistit: sed in lipopsychia, aut κατὰ χευστικῶς dicta lipothymia, per quam significatio fit infirmæ facultatis animalis: sicut etiam per oculorum ἀμαύεσιν. *PROT. 20. C. 3. 1. 2. Ph. 23. 1.*

CITAM CONVULSIONEM OSTENDIT] Vel conuulsionem in propinquo esse testatur: quia præuiarum, conuulsionis causarum vis primùm lucet in spiritus animalis dissipatione, vnde lipopsychia; & instrumentorum cerebro vicinorum atque cōmunium consumptione, vnde non solum ipsa conuulsio, sed etiam cita mors venit.

13 Οφθαλμοὶ ὀρφνόησι ἐν ὀξεί, καὶ κίνησις ὀξείη, καὶ ὕπνος παραχρῶ- 60. δης, ἀγρυπνίη, ποτὲ δὲ καὶ αἱ σάξεις ἐκ ρινῶν [σπασμῶδες].

Oculorum caligo in morbis acutis, citæque huc illuc conuersio, turbulentus etiam somnus, vigiliæque ipsa, nonnunquam verò & sanguinis substillæ à naribus; conuulsionis prænuncia.

QVEMADMODVM partium posticarum frigus sæpe & frustra abortum, fractis iam egri viribus; urinz item spumantes, maximam vim habere dicuntur ad conuulsionem ciendam: sic irrita vis eorum nihil efficeret, nisi eam suscipientis causæ præparatio ad efficiendum adduceret. Sed ea suscipientis causæ præparatio potissimum cernitur in signis earum partium quæ sunt propinquæ atque communes foco & domicilio ipsius conuulsionis. Est autem cerebrum, in quo etiam signa sunt epigenomena & epiphenomena futuræ conuulsionis. Oculi verò, societatis & vicinitatis iure, omnium facillimè certissimèque cerebri afflictionem testantur. Quæ omnia in hac decisione his literis continentur.

OCULORVM CALIGATIO] Quam facit impuritas & obtenebratio, vel spiritus visifici & proprii oculorum luminis, vel humorum & *ὁρατῆς*, i. *aspectabilia* excipientium; vt in iis veluti caliginis cuiusdam suffusio esse videatur, tum ipsis ægrotis, tum medicis atque propinquis oculos intuentibus. Conuenienter autem reposita esse mihi videtur *ὁρατῆς*, & expuncta *ὁρατῆς*: quoniam si *ὁρατῆς* oculorum sponte nostra constituta sit, *ἔστιν ἀπαιρητόν*, i. *nihil absurdum*. Sin autem *ἀναγκαῖος*, nec naturaliter, erit quidem indecora atque terrifica. Verum si eiusmodi sit resolutione omnium ocularium musculorum: nihil ostender conuulsificum. Quod si eadem sit oculorum *ὁρατῆς* quæ *πῆξις*, i. *concretio*; certum est ipsam in pari conuulsione positam esse ocularium musculorum. Sed de fixis oculis paulò antè scripsit in illo. *Ὀμμάων ἀμύρσεις, καὶ τὸ πατήρ*. Præterea quomodo simul existere possunt immobiles fixique oculi, & ij qui crebrò huc illuc voluuntur? Quod si quis obiiciat *τὴν ὁρατῆα* idem hoc loco significare quod oculorum *ῥάσος*, quod est phreniticum & conuulsificum; sciat is velim me istam ferocitatem agnoscere potius in torua conuersione, vel potius coniectione oculorum, quàm in rectitudine ipsa. Nam & Agamemnona sic intuitum legimus vatem Calchantra. Et cum ille responso Calchætis irarum fluctuasset, *καὶ ὅτε δὲ οἱ πρὸ λαμπρόν τι εἶπεν*: paulò post ad Calchantam conuersum, & oculos in eum coniciendam ita describit Homerus. *Καλχάντα ποσειδά καὶ ὀσήμενος ποσειδάων*. Vbi Eustathius illud, *καὶ ὀσήμενος*, *διττὴν καὶ ὀράων ὑποβλεπόμενος* interpretatur. Sed furibunda Didonis, & cæptis immanibus effera contra Æneam, clarissima est illa ferocitatis in oculorum aspectu descriptio apud Virgilium.

Talia dicentem iam dudum auersa tuetur,

Huc illuc voluens oculos, totùmque pererrat

Luminibus tacitis, ex sic accensa profatur.

Huc accedit, quod omnis dissimilitudo morum quam ferocitas ipsa denunciat, in nullum aliud delinij genus cadit quàm in phrenidem. Fuisset igitur philosophicum magis, rectitudinem oculorum, quam, si diis placet, ferocitas facit; potius videri phreniticam, quàm conuulsionis prænunciam, aut conuulsificam: iuxta illud, *ὀμμάων ῥάσος ποσειδάων*, i. *oculi ferocitas phrenitica*.

IN MORBIS ACUTIS] Et inter eos qui sunt eximij celeritate & vehementia, vt febres ardentes, quarum ardore natius calor, & spiritus profligantur; cerebrum exarescit; & symptomatica humoris efferi translatione affligitur.

CITVSQVE HVC ILLVC CONIECTVS] Quæ affectio, tremoris propria est; vt concretio conuulsionis, si caui sint oculi; sin autem exerti, paralytici. Atqui tremor ille in morbis acutis, suapte natura, quæ in siccitate consistit, & successione delirij, citam mox adfert conuulsionem.

TVREVLIENTVS ETIAM SOMNVS] Percussa mente, delirioque proxima: ob eam sanè causam, quod cerebro malè morato, malèque constituto, anathymiasis fumida vim adferat; potius quàm consolationem.

VIGILIAQVE IPSA] Quod in summa dormiendi necessitate, non est par conciliandi somni commoditas, quam suppeditat vaporis somniferi suauitas, bona cerebri temperies, cum animi tranquillitate coniuncta.

NONVNQVAM VERO, ET SANGVINIS SVBSTILLA ENARIBVS] Quæ sunt omnino praua, vt cæteræ omnes causæ indicatoriæ pauca: præsertim si sanguis substillans, qualitate & substantia in vitio sit, idque die critico. Scitum est illud. *Exigua sanguinis stillucida, sinistra sunt crisis, aut planè mortifera*.

CONVLSIFICA SVNT HÆC] In morbis scilicet qui inter acutos eximij sunt vehementia & celeritate, vt febres ardentes, in quibus si luceant commemorata symptomata quæ in cerebro & a cerebro nata spectantur, conuulsionem affuturam testantur.

14 Πρὸς ἀφωὸ μὴ πεικαέες· φρενιτικοὶ γίνονται· καὶ μᾶλλον ἐν αἵμα μὴ ρύη.

Qui ad contactum minimè sunt astuosi; euadunt phrenitici; magisque si sanguinem non profundant.

FVIT HIPPOCRATIS consuetudo & institutum explorandi manu qualitates corporum cuiusmodi essent, in calore, consistentia, mole; vnàque micantium articularum pulsus. Eam explorandi rationem sæpe nominauit *πρὸς χεῖρα*, i. *ad manum*, vt in illo. *Οἱ πρὸς πρὸς χεῖρα οἱ μὲν δακνόμενοι, οἱ δὲ πρὸς πρὸς χεῖρα*, i. *Febres ad manum mordaces nonnullæ, nonnullæ mitiores*. Et alibi. *Οἱ πρὸς χεῖρα αἰσώμενοι, κακόν*, i. *Qui ad manum exiliunt, malo sunt loco*. Hic autem vocat *πρὸς ἀφωὸ*, quod tangendi vis per vniuersum diffusa corpus, maximè

st. Coac.
huius cap.

part. 3. c. 1.
6. Epidem.

61. Coac.
1. lib.

4. Epid.
63. Coac.
1. lib.

maximè lucet, splendētque in manu.

Ergo. QVI AD CONTACTVM MINIME SVNT ESTVOSI] Tales in prothetico nominantur καυτικοί, ἀκρίτως ἀσπύχοντες, i. estuantes, iniudicatio perfrigeratos: vt qui caufone, aut lipyria laborant. Πικρῆς, autem opponuntur τῷ ἀσπύχοντι, vt patet in illo. Οἱ καυτικοί, ἀκρίτως ἀσπύχοντες, διὰ τῆς ἀσπύχου, i. ardentes, iniudicatio perfrigerati, mox rursus incallescunt. Cetera perspicua sunt.

DE LINGVA ET RELIQVIS ORIS PARTIBVS.



Λ Ω Σ Σ Α δὲ καὶ δὲ καὶ μὲν πεφικνῆα, πῶδε χρώ- CAP. VII.
ματι διαμύρσασα, περιόντος δὲ τῆς χροῦς τραχυομύρνη,
καὶ πελιαομύρνη, καὶ ρηγνυμύρνη. θανάσιον. σφόδρα δὲ
μυαομύρνη. ἐν τεσσάρων καὶ δεκάτῃ κρίσιν γίνεσθαι δηλοῖ.
Χαλεπωτάτη δ' ὅστις ἡ μύλανα, καὶ χλωρή.

1 Lingua autem quæ initijs morborum rigidiuscula est, sed in calore manet, labentibus inde diebus exasperatur, liuescit, & fit huiusmodi; mortifera. At verò quæ multum nigrescit, intra decimumquartum diem crisis fore ostendit. Ac certè calamitosissima est nigra & virulenta.

30 MAGNA SVNT argumenta quæ ex qualitatibus & actionibus linguæ petuntur, cum perspicientia causarum res illas efficientium; ad cognoscendum & prædicendum quid cuique euenturum sit in morbis acutis. Est enim lingua sermonis organum, & gustatus. Eadem duabus expleta partibus quas linea mediana coniungit: vtraque autem spogiosa triplici contexta fibrarum seu villorum genere, tenui membrana contegitur; quam accipit partim à gula, partim à gutture; vnde cum illis societatem iniuit: sed propriam habet à nervo quartæ ac tertiæ coniugationis ad gustus rerum omnium saporatum; quemadmodum & musculos nouem habet motuum vartorum ministros ad sermocinandum, quorum alij à styloide, alij ab hyoide & cornibus eius, alij à maxilla inferiore & mento exorti, optima conspiratione atque consensu linguæ inseruiunt. Erit igitur lingua naturaliter constituta, quæ in sermone atque gustatu similis est bene valentium, & potissimum sui, nec vllò modo à se mutata est in colore, caractere, & mole. Sin autem in vitio sit, ea profectò mala ostender quæ in his decisionibus recensentur, quorum singula cuiusmodi sint, & quorsum appareant; ex causarum cuiusque perspicientia explicabuntur.

LINGVA AVTEM] Ac si diceret, loco de lingua dicendum: Sed illud, autem, in omni philologia; instituta rei præsentis cum superiore connexionem ostendit.

QVA INITIIS MORBORVM RIGIDIUSCVLA EST] Prima periodo, quæ primo absoluitur morbi quaternario, est πεφικνῆς, vel πεφικνῆς habet, ab inchoata inæqualitate quæ pristinam sustulit læuitatem; quam πεφικνῆς communis tunica linguæ fictior facta, obduxit. Solenne est illud Hippocratis. Τὰς φωνὰς οἱ πεφικνῆς φωνὴ ἔχοντες, καὶ αἱ γλώσσαι ποτεφικνῆς, καὶ ὅσαι τραχύμηνες, ὑπὸ νόσων φασπύχουσι. Quæ vocem asperam edunt, & quibus est subaspera lingua, & quæcunque similes his à morbo asperitatis. Itaque lingua πεφικνῆς vel ἀσπύχου, i. rigidiuscula, nihil aliud est quàm aspera, cuius asperitas in minutissima inæqualitate consistit: quemadmodum Galenus explicat comment. ad part. 18. sect. 3. 6. Epidem. Atque eam minutissimam inæqualitatem comparat ponto, cum primum flante Zephyro, pristinam sui æquoris in tranquillitate positam læuitatem amittit, ac velut perhorrescere incipit. Multum igitur differt lingua πεφικνῆς ab ea quæ dicitur περιμύρνη; multum etiam à πεφικνῆς à μύρασι μύρασι, i. consumptione terribili. Quod autem morborum initiis eam πεφικνῆς notabilem esse dixeris, eo certe feceris quia quibuscunque ardentem febricitantibus nulla vitæ salus sperabilis esse solet, eius desperata salutis signa potissimum cernuntur ineunte morbo, qualia describit Hippocrates historia 3. vniuersali 1. Epidem. Quod si quis obijciat, Nicodemum Abderitam præclare & foeliciter morbo defunctum esse, cui febris litum initio, lingua perusta visa est; sciat is velim, pepasmo & excretionibus febrem mirum esse, & lænitatem linguæ restitutam fuisse. Hic autè prauitatis accessio docetur in signis quæ sunt ardentium febrium συνεδρῶνται & in lingua vires acquirunt eundo.

SED IN COLORE MANET] Geminio scilicet, qualis est suæ genens in lingua naturaliter constituta. Ac si diceret; quamuis lingua rigidiuscula sit, retiner tamen decorem coloris natiui, quoniam fucata non est fulgine, nec etiam perfusa humoribus qui strabulantur ἐπὶ τῇ ἀσπύχῃ, i. in partibus quæ commercium habent cum lingua: cuiusmodi sunt pulmò, ventriculus, venæ hypoglotides, cere-

brum quoque ipsum. Quinetiam à matrice lingua ipsa fucatur. Præter hæc, aliunde nusquam. Est enim catholicum illud Hippocratis. Γλώσσα ὁμοχρῶς τοῖς πνεύμασι· διὰ τὸ ταύτῃ γινώσκωμεν τοὺς χυμοὺς, i. Lingua profusibilis est concolor: propterea quæ ab ea humores innotescent. Vbi Galenus τὰς πνεύμασι interpretatur, ea quæ veniunt à ventriculo, vel à venis nutritioni dicatis; quibus & cerebrum adiungendum putauimus, pulmones, & ipsam matricem. Nam quod idem scripsit, colorationem linguæ denunciare humores quorum magisterio corpus tenetur; pertinet ad explicationem illius theorematismis quod paulò antè posuit, γλώσσα ὑποσημαίνει, i. lingua urinam indicat. Ad cuius theorematismis demonstrationem Galenus hanc distinctionem apposuit. Τοῖς μὲν οὖν εἰρημῶνους σημαίνει ἀκαταῖσι δὲ πᾶσι τὰ δυνάμια· τοῖς δὲ πνεύμασι δὲ αἰσχυρῶς σημαίνει. Signorum, inquit, res ipsæ omnino consuetudinæ sunt: non autem rerum necessariorum signa ipsa.

LABENTIBVS INDE DIEBV5] Exacta scilicet prima periodo quæ quatuor diebus absoluitur. Sic enim Hippocrates πνεύμασι χροῖν vocare solet, inoffensam quatuor morbi temporum successionem; sicut & quatuor anni temporum, veris, æstatis, autumnii, & hyemis anniuersariam vicissitudinem: vt si quis totam exegerit hyemem in sicca tussi cum raucitate coniuncta, nisi in πνεύμασι χροῖν, i. secundo vere quiescat; alteram experitur tabis differentiam.

EXASPERATUR] i. Quæ incunte morbo fuerat πνεύμα ex minutissima inæqualitate, & inchoata asperitate à siccitate membranarum quas partim accipit à gula, partim à gutture; nunc tactu & visu percipitur περυστή, i. perusta & quàm asperrima; glandularum saluam affundentium, & venarum hypoglottidum nimia siccitate.

LIVESCIT] Tum per ἐκχύμωσιν ἢ ναυσίωσιν, i. effusionem vel nauisiam, venarum virulentarum; tum per caloris viuifici paupertatem, penèque dixerim, extinctionem. Ac si diceret; lingua quæ prima periodo asperior facta, suauetudine apparuit, & pristinum decorem coloris retinuit; si progressu temporis, inualecente morbo, plumbea videatur, ac si eiusmodi sit viridi bile suffusa atque fucata, per continuitatem interioris tunicæ pulmonum & alui, à perenni generatione bilis, & perenni ad illas partes affluxu. Omnino enim tam variis coloribus lingua fucatur, ex varia coloratione humorum atque vaporum ipsam fucantium. Est enim τὸ χροῖμα τοῦ χυμοῦ ὅμοιον, i. color humoribus similis. Eius autem colorationis opportunitatem adfert linguæ ipsius mollitudo, & raritas, ac vasorum circumiacentium amplitudo.

ET FIT HIULCA] Non secus atque hiulcatur pinguis terra quæ diuturna pluuiarum vacuitate, & solibus perusta exaruit, atque diuulsa est.

MORTIFERA EST] Propter μδραστικὸν πῦρ, quem ardor febrilis inuexit. Est autem μδραστικὸν περυστικὸν à febre ardente, irreparabilis; propterea quæ funestus.

AT VERO QUÆ VLTIMUM NIGRESCIT] i. Quæ saturato nigrore fucata est, vnâque multum aspera vel hiulca; vt par sit ratio causæ nigroris & asperitatis; & ambo sint ναυσικά symptomata conflagrantis incendio corporis, humorumque æstu incandescendum.

INTRA DECIMUM QVARTVM DIEM CRISIN OSTENDIT] Quia febris διακρῖς, i. peruens, tam celeriter, tamque vehementer mouetur, vt citam mortem adferat. Observabit medicus philologiam planè philosophicam in nomine crisis. Non ita pridem in theoria ocularium affectionum, crisis nomen, secundum iudicij significationem obtinuit; hic autem sinistri: sed illic appositum fuit τῇ κρίσει, hic autem τῇ κρίσει.

AC CERTE CALAMITOSISSIMA EST NIGRA ET ΧΑΛΚΗ] Hippocratis catholica hæc sunt de linguæ coloribus. Lingua, inquit, serum denunciat. Nam linguæ χλωραὶ sunt χολώδες, i. biliosæ, rubræ à sanguine; nigræ ab atra bile; αἰαί, i. albo fucata, à perusta fuligine, tum à materna parte; albæ à pituita. Quæ cum ita sint, facere certè non possum quin à Galeno dissentiam in philologia & philosophia colorationis illius quam χλωρὰ vocat Hippocrates. Fuit illud Galeni iudicium, linguam tum esse χλωρὰ quando fucatur bile, quam ipse nominat ὠχρὰ, eamque bilem omnium mitissimam esse, quod a quæ cuiusdam substantiæ sit particeps, propterea quæ ἀπλῶς, i. simpliciter & absolute bilem nuncupat; cætera autem bilis genera παρανόμως sic appellari ἐκδυρὰ, ἐρυθρὰ, λευκώδη, πορροειδῆ, ἰώδη, ῥιζοειδῆ, καὶ χροῖν. Quod si verum est, non video cur eximia sit periculo lingua χλωρὰ, quam bilis mitissima, aut certè omnium minimè acris infecit. Sed audiamus Hippocratem qui nunquam aberrauit à scopo, ac stetit in eo quod ille sapienter iudicauit. Hippocratis verba hæc sunt. Γλώσσα χλωρὰ χολώδες, τὸ δὲ χολώδες ἀπὸ πόνου, i. Lingua virides, biliosæ: biliosum autem à pingui. At cuiusmodi sit bilis quæ gignitur ἀπὸ πόνου, idem clarissimè aperuit his verbis. Καὶ οἱ τὸ μὲν πόνον, χολὰ ἔχουσιν· τὸ δὲ αἷμα, ῥιζοειδῆ. i. Ac quibus pingue, bilis flaua; quibus sanguis, nigra. Constat igitur bilem flauam sobolem esse τὸ πόνου. Sed eius bilis multi sunt gradus qui feruore illius affurgunt, & serri naturalis vacuitate. Huiusmodi sunt, æruginosa & vitellina. Nam si in secunda valetudine ἀπὸ τὸ πόνου nascitur bilis flaua, ab illa exorta febris peruens, æruginosam procreabit. Verè igitur video esse dicturus γλώσσα χλωρὰ, significare herbaceam. Est autem χλωρὰ πῶς, i. periculosissima. Idem enim significat τὸ χλωρὸν. Atque huius periculi cū incidentis causam explicat Galenus comment. ad prorrh. 10. l. i.

Γλώσσην ὡρὰ τὸ δεικνύον ὡς πρὸς χροῖμα λευκὸν καὶ αλβὸν· σημεῖον ἀνέστως τῆ πυρετοῦ, παχέος μύκτου τῆ ἐπιχρυσήματος, αὐθιμίας λεπιοτέρου

λεπιότερα δὲ, ἐς τὴν ὑπεραίην· ἐπὶ λεπιοτέρῃ, τεταμένην. Τὰ αὐτὰ σημαίνει ἐπὶ ἀκρὴν τὴν γλῶσσαν γινόμενα, ἥσων δὲ.

Lingua ad medianam lineam velut alba salina peruncta; febris dimissionem denunciat, idque eodem die, si quod superinducitur, crassum est; sin autem tenuius, postridie; quod si etiam tenue magis, perendie. Eadē planē ostēdūt quæ sunt eiusmodi in extima lingua, sed nō ita certō.

VT FACIES cadauerosa ex fugacibus causis orta, vno die finitur, & intra vigintiquatuor horas initium habet ἐπαπορρώσεως, i. redintegrationis, vt facies ē tumefcente residens; vox item blandior atque mollior, quæ fuerat antē rauca & aspera; spiritus rarior atque faciliior, in quo summa erant omnia difficultatis & angustiae; vt tandem oculorum nitor, quos impuritas magna fœdauerat, spem adferunt citæ & securæ crisis atque salutaris. Sic lingua inæqualitate ob siccitatem aspera, & terri vaporis, corruptiq; humoris infectione multūm fœdata; si ex hiulca fiat aspera, ex aspera rigidiuscula, ac tandem pristinam læuitatem & mollitudinem amissam recipiat; eadēque si progressus, vel potius, vt ita dicam, retrogressus faciat ex nigra in flauam, indēque in pallidam, mox in suauerubentem; sanē ex ea mutatione ac veluti retrogressu in suum decorem coloris natiui; pro metu sinistri iudicij, consolabitur medicum spe summa secundi. Quod Nicodemo Abderitæ contigisse legimus, cui ἔρχομενο, i. febricitare incipienti, lingua perusta visa est; conualuit vigesimoquarto. Quod etiā Larissæ virgini, quæ, ineunte febre καυσώδει, linguam habuit λευκώδη καὶ ξηρῶν, i. fuliginosam & siccam; restituta est die sexto. Erit igitur hoc ratum persuasumq; omnibus; symptomata febrium συνεδρεύοντα, partim medicos exterrere, partim etiam consolari, prout progressum habent in peius, aut retrogressum in melius; illic, ὅθεν λόγον naturæ; hic καὶ λόγον ἰππίου, pepasmo & excretionē in morbi exclusionem incumbētis. Planum id faciet huius prognoscens explicatio quæ est huiusmodi.

30 LINGVA] Quæ visa est non ita pridem aspera & fœdo colore fucata.

AD MEDIANAM LINEAM] Quæ per median linguam excurrit, ligamentum acerrimi sensus ostentans, quamuis à larynge natum, quo bifida lingua connectitur, vestitur, munitur. Talem agnouit lineam Aristoteles in utero, quam vocat δίκροτον ὑπεραίαν.

VELUT ALBA SALINA PERVNCTA] i. Delibuta humore albo, læui & æquali, ac velut spermatice; qualis est laudata vrinæ hypostasis. Eius autem salinæ albæ significatio comparatur ex perspicuitate extincti ardoris quo viscera conflagrabant, mitificati humoris morbifici, & succi alibilis inchoata assimilatione, vnde supersunt reliquæ albæ: sicut in vrina hypostasis alba, læuis, & æqualis, perfecto pepasmo.

40 DIMISSIONEM FEBRIS DENUNCIAT] Non secus atque hypostasis alba; non minùs etiam quàm oculorum nitor qui ex antiquato liuore lucet splendetque; nec verò aliter quàm os humescens in sicca pleuritide. Non enim minora sunt argumenta futurarum criseon in qualitatibus corporum, quàm in pepasmo humorum morbificorum.

IDQUE EODEM DIE, SI QVOD SUPERINDUCITVR CRASSVM EST] Vt enim pepasmi perfectio celeritatem crisis ostendit: sic eius perfectionis nota certissima est crassitudo humoris quæ in mediocritate consistit, eaque crassitudo virtute naturæ perficitur quæ diffusa est per solidas partes vniuersi corporis.

SIN AVTEM TENVIUS, POSTRIDIE] Vt enim sunt gradus concoctionis: ita citò aut serò crisis ventura dicitur.

30 QVOD SI ETIAM TENVE ADHVC MAGIS] Vt inde maior cruditas significetur, ex contumacia materia, & caloris natiui infirmiore vi.

PERENDIE] Quia ex imperfecto signo tam cita crisis, atque perfecta, non est sperabilis.

EADEM SIGNIFICANT QVÆ SVNT EIVSMODI IN EXTIMA LINGVA, SED NON ITA CERTO] Quāuis enim extima lingua quæ adiacet primoribus dentibus, exuium scabrū, & fœdo colore fucatum prima deponat omnium linguæ partium: tamen quia longiùs abest à foco ardoris, ac ferè glandularum salina madescit, non ab humore venarum mitificato, vt mediana linea: idco non ita certò futuram crisin denunciat. Animaduertet autem medicus non eum describi humorem quo delibuta lingua in pulmonis inflammatione apparet. Hæc autem decisio legitur in libro περὶ κρίσεων.

60 3 Γλῶσσα Τρομάδης μετ' ἐρυθρήματος καὶ ῥίνας, καὶ κοιλίης ὑγρῆς, καὶ δὲ ἄλλων ἀσήμως ἐχόντων καὶ πνέοντα· πονηρὸν, καὶ ὀξείας καθάρσεως ὀλέθρου σημαίνει.

lib. i. progn.
& i. Coac.
cap. 5. 2

in lib. i. me
περὶ κρίσεων legi
tur ὅτι τὸ σαρὰ
δίκροτον
i. de ortu
animal.

Lingua tremula cum suffusione narium rubra, & liquida aluo, si nulla de pulmonibus significatio sit, graue malum denunciat, citâsque purgationes perniciosas indicat.

VT LINGVA OMNIS CÔTRA NATURAM TREMULA, EST MULTUM TERRIFICA: SIC EADEM FACIT VT MEDICUS TO CORPORE PERHORRESCAT, QUÂDO IPSA CÔTREMISCIT, CUM ILLIS CÔDITIONIBUS QUÆ IN HAC PROGNOÏ CÔTINENTUR.

LINGVA TREMULA] QUÆ CONTREMISCIT DUM EXERITUR, AUT VOCEM EFFORMAT FERMOCINANDO. CONTREMISCIT AUTEM DEPRAUATO MORU QUI χ^{r} $\alpha\epsilon\sigma\alpha\iota\sigma\tau\alpha\iota$, η $\kappa\alpha\tau'$ $\delta\iota\sigma\tau\alpha\iota$, i. voluntate aut instinctu, suscipitur: sed non χ^{r} $\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$.

CVM RVBORE NARIVM] i. Ruboris suffusione à feri cuiusdam subtillo, quod in narium densitate subsistit. De quo iam illud præceptum est. Rubores narium signa sunt liquidioris alui. Vide commentarium nostrum in eam prognosin.

ET LIQVIDA ALVO] QUÆ LIQUIDIS EXCREMENTIS SÆPE & MULTUM FERTUR, EODEM MODO QUO IN BALBIS QUOS LONGA EXERCENT ALUI PROFLUVIA: VNDE EFFICITUR, RUBOREM HUNC NARIUM NON POSSE REFERRI AD EXIMIAM ILLAM FACIEI COLORATIONEM QUÆ FÆCES VETUSTAS SUBSISTERE IN ALUO TESTATUR.

SINULLA DE PVLQNIBVS SIGNIFICATIO SIT] AC SI DICERET; SI ALIUS LIQUIDA NUL- lum adfert pulmonibus laborantibus adiumentum, nec fiat λόγος τῆς φύσεως. Qua de re illud scriptum ma- net iam explicatum. Quibus in febre lateris dolor incidit, siquidem perliquidus & biliosus alui prorupta feratur, mutescit; sin autem collapsa maneat appetentia, ac tum sudores cum saturato faciei colore fundantur, & supersite 20 cardialgia; hi cum diutius egrotarint, peripneumonicò modo intereunt. Ergo si nec aluo liquida, nec vrina cum hypostasi crassa prorupta, nec anacatharsi, nec parotidibus, nec abscessu crurali; pulmones vllam leua- tionis suæ significationem adferant, pestifera complexione malorum quorum vnumquodque ipsium per se fatale est ad interitum.

CITASQUE PURGATIONES PERNICIOSAS DENVNCIAT] Nam quibus hypochon- driorum aut pulmonum mala suppurât, malè res eunt. Suppurât autem pulmonum mala quæ nec ana- catharsi, nec phlebotomia, nec liberali vrinæ crassæ profluuiò, nec abscessu crurali exoluuntur. Ac sup- puratum illud, rupta vomica, suffocat ægrum; aut etiam tabificum est. Itaque cum de pulmonibus nul- la ad leuationem significatio est, tum ægri dicuntur $\epsilon\chi\alpha\sigma\tau\alpha\iota$ $\kappa\alpha\tau'$ $\alpha\epsilon\tau\iota\pi\epsilon\upsilon\mu\omicron\upsilon\iota\varsigma$, i. haberi à peripneumonia, in cuius inueteratione superueniens alui profluuium, citam mortem adfert, propter κακοστέγαν ventri- 30 culi & hepatis.

4 Γλῶσσα ὡραλόγως ἀπαλωομένη, καὶ ἀσώδης, μὲν ἰδρωτός ψυχρὴ, ἐπὶ κοιλίῃ ὑγρῇ· μὲν δὲ ἐν ἐμέτων ὅστις σημεῖον. ὃ κοπιῶδες ἐν τετέτοις κακόν.

Lingua immeritò molliuscula facta cum fastidio, sudore frigido, in- super aluo liquida; signum est vomitionum nigrarum. Hic laboriosum esse, grauissimum malum ostendit.

NON MINVS SUSPECTA ESSE DEBENT QUÆ, SPECIE, BONA ESSE VIDENTUR, NEC SUNT TAMEN: QUÂM QUÆ IMMERITÒ MALA APPARENT. NIHIL IN BONIS REAPSE DUCENDUM, QUOD χ^{r} λόγον naturæ non fiat. Nullum for- midabile malum, quod ὡραλόγως morbi apparet. Enimuero sitim sedari quæ non ita pridem fuerat in- explebilis; optimum esse videtur iis qui ægris præsto sunt: secus autem medicis qui exterrerentur metu, si ea sitis conuenienter naturæ sedata non fuerit. Eodem modo de linguæ molliitudine sentiendū, quan- do ex rigidiore & asperiore, immeritò fit læuis & molliuscula.

LINGVA IMMERITO MOLLIVS CVLA] Sine pepasmo & crisi, ac sine catharsi, & sanguinis detractione liberaliore, potu, & epithematis; superstitè adhuc febrili ardore, & morbifici humoris cruditate.

FASTIDIO SA] Sero imbuta quod facit vt carnes natura dulces, gustanti sint ingrati saporis; vn- 40 de $\alpha\upsilon\sigma\iota\sigma\tau\alpha\iota$ $\pi\alpha\iota\tau\omega\upsilon$ $\gamma\omega\mu\alpha\tau\omega\upsilon$, i. auersio ab edullis; siue ea deprauatio venerit ab impuritate ventriculi, cuius interior tunica communis est linguæ, palato, & ori. Sic lingua & ventriculus mutuò se afficiunt. Est au- tem ventriculus domicilium τῆς ἀσῆς, i. fastidij nauseabundi.

CVM SVDORE FRIGIDO] Per exolutionem stomachi, & caloris vitalis retractionem: unde refrigeratio partium extimarum, stabulante in aluo nimia bilis abundantia, vt in biliosis hominibus qui contra consuetudinem incenati cubuerunt.

EX ALVO LIQVIDA] Liquidis & serosis excrementis prorupta, ex nimio feri prolapsu à cere- bro; unde lingua molliuscula & ptyelismus.

SIGNVM EST VOMITIONVM NIGRARVM] Maximè verò in phrenitide, si rigor incidit. Qui è phrenitidis cum perfrigeratione sputatores fiunt, vomitum illi nigrum denunciant: vomitum quidem, vt annotauit Galenus, ptyelismo; nigrum verò, perfrigeratione. Ac nigrum fit excrementum quod prius erat flauum, ardore febrili, & ipsa ventriculi cum cerebro sympathia. Talis autem vomitio, phreniticos reddit fanaticos.

Αἱ Τρυμώδες γλῶσσαι, καὶ καὶ κοιλίῳ ὑγρῷ ποτὲ ποίεοισι· με-
λαιδεῖσαι δὲ ἐν Τυτέοισι, Τελὺ δανάιον σημαίνεισιν. ἥ γὰρ Τρυμώδης
γλῶσσα σημαίνει ἐχιδρυμδρὴν γλώμην;

*Quinetiam lingua tremula, nonnullis faciunt liquidiores alium.
Ibitum denigrata, mortem acceleratum iri significant. An verò etiam
lingua tremula non solidam mentem denunciat?*

LINGVÆ TREMVLE] Non quidem inconstantes & fluxæ, quæque suo loco stare non pos-
sunt, à febrili ardore huc illuc citatæ; sicut ὀφθαλμοὶ ἐκδεδιγμένοι qui edunt citos coniectus & varios: sed
nostro iussu ad mouendum excitatæ, siue exerantur, siue etiam voces efformant; quod pari magisterio
certent inter se facultas & instrumentum.

QVIBVS DAM ALIQVANDO LIQVIDAM REDDVNT ALVVM] Etenim cum lingua o-
mnis tremula infirmitate fiat potentia animalis, si eius infirmitatis causa sit oppressio ex nimia humo-
ris in cerebro abundantiâ, indeque lingua ipsa, vicinitate & societate madescat; eius madoris participem
faciet alium, per continuitatem interioris tunicae quæ ipsi cum aluo communis est; eademque prorsus
ratione in hoc tremore linguæ, alius profusè feretur, qua balbis.

IBITVM DENIGRATÆ CITAM MORTEM MOX ADVTVRAM TESTANTVR] Ac si diceret; si lingua tremula cum alui profluuium multum nigrescat, nec illa coloratio fugax breui ha-
beat redintegrationem ad meliorem statum; mortem in propinquo esse denunciat: quod ad calami-
tosam vim morbi, unde perennis generatio atræ bilis ex flava, eiusdemque excursus qui colore nigro
linguam inficit; accedit summa virium infirmitas quam diarrhoea peperit symptomatica.

AN VERO ETIAM LINGVÆ TREMVLA NON SOLIDAM MENTEM OSTENDIT?] Sanè quidem, si per epigenesin phrenitidis contremiscant: sicut & oculi ἐκδεδιγμένοι qui varios mouent
coniectus, etiam si nostra sponte in nullum aspectabile coniiciantur. Etenim cerebro conflagrante,
non potis est oculos, nec linguam quiescere. Ut enim frigoris proprium est partes ipsas, in quibus sta-
bulatur, pigras in mouendo, planèque immobiles reddere: sic è contrario, vis illa caloris esse solet, ut
continenter moueat, nec ullam quietis partem impertiat. Itaque non solidam mentem nominavit, in-
constantem & vagam; certissimum incandescens æstu cerebri argumentum, unde phrenitis, & conse-
catoria eius tremula lingua. In hanc particulam extat Galeni comment. ad 10. prorrh. l. i. Sed tamen hæc
melius per quætionem, quàm illic per enunciationem, explicanda proponitur.

6 Αἱ τραχεῖαι κατὰ ξηραὶ γλῶσσαι· φρενιτικαί.

Lingua aspera multumque sicca; phrenitica.

QUEMADMODVM lingua tremula, qualem descripsimus, signum est non solidæ mentis: sic lin-
gua aspera multumque sicca, phrenitidem ipsam denunciat. Sed tamen utriusque signi sic comparata
ratio est, ut neutrum habeat πέρας ad indicandum, nisi quatenus affectionis consecrarium est quæ in
quætionem adducitur. Exempla sunt multa in Epidemiis.

Ergo. LINGVÆ ASPERÆ] Sic enim legendum duximus, auctore Galeno. Nam Græcum illud, *δαρπύα*, nomen est inchoatæ inæqualitatis, quam facit inchoata siccitas. Lingua madescit & mollius-
cula est, à consociali humore quem accipit ex vasis & glandulis salivæ vberibus. Sed ea salivæ vbertas
cum primum exarescere incipit, tum lingua fit *δαρπύα*, i. *rigidiuscula* (quam paulò antè *περικύαν* nomina-
uit.) Sin autem siccitate processerit, asperitas maior percipitur. Quod si etiam siccitatis summa sint ο-
μνία, tum ulceratur lingua; non secus atque squalor diuturnus terram hiulcat. Ergo linguæ asperæ
multumque sicca, exhaustis salivæ fontibus atque rinulis unde humescebant, per febrilem ardorem &
cerebri incendium.

PHRENITICÆ] Per sympathiam cerebri æstu incandescens; quemadmodum linguæ tremulæ
quæ sponte sua, non autem nostra mouentur; signa sunt haud solidæ mentis.

7 Οδόντας σίυνερίζει ἢ πρίεν ὃ μὴ σίυνηδες ἐκ παιδείας· μαρτυρὸν, καὶ
δανάσιμον. ἥδη δὲ ὡρα φρονῶν ἡ ποίη τὸ παντελῶς ὀλέθριον. ὀλέ-
θριον δὲ καὶ ξηραίνεσθαι τοῦ ὀδόντας.

Collidere dentes aut stridere, si cui à puero familiare non sit : fanaticum, atque mortiferum. Quòd si quis iam demens id faciat ; omnino funestum. Pestiferum est etiam dentes exarescere.

MAGNA SUNT etiam argumenta ad bene scienterque prælagiendum, quæ ducuntur ex partium illarum actionibus quarum vitio dentes, iniussu nostro commissi, colliduntur, crepitant, atque strident; partim ipso crepitu, crepundiorum more sonori; partim stridentis plaustris, aut serræ secantis modo, fragosi.

Ergo. DENTES] Ocho primores, canini quatuor, & viginti molares in vtraque maxilla, vtrinque per gomphosin coarticulati : quibus in ore constructis manditur, extenuatur, & molitur omnis cibus.

COLLIDERE] Vt, quasi quodam mordendi studio, firmiter ad se inuicem adhærescentes, mutuo attritu stridorem edant velut fragosum; qualis in molarum collisione auditur, vnde significatio sit cõuulso- rum maximè temporalium musculorum.

AUT STRIDERE] Erat mihi animus verbum illud *σπρίεν*, & Latinum, *stridere*, per eam paraphrasin explicare quam apposuimus *πρὸς αὐτοὺς*. Sed non fuit satis animi, quòd animaduertim Galenum eam dentium *σπρίεν* comparare vagis oculorum coniectibus; qui vulgo *ῥωπες* dicuntur. Ergo stridere dentibus planè significat dentium strepitus, qui vt in crepitaculis crebro allisus cidentur (*claque-ter Galli* vocant) quod est tremoris argumentum : vt illud collidere, conuulsionis.

SI CUI A PUERO FAMILIARE NON SIT] Natura scilicet; aut instituto parta collidendi aut stridendi cõsuetudo; nec vlla sit puerilis ætatis excusatio in quibus hæc fiunt. Nā pueri cõuulsionibus faciliè exercètur, si febris acuta, est, si alius nihil reddit, si vigilant, si expauescunt. Denique si ita comparata tremoris & cõuulsionis ratio, vt neq; facultas, neq; ipsius facultatis principium in vitio sit firmiter fixo.

FANATICVM] Nam grandiores pueri atque viri non tam faciliè in febribus conuelluntur, nisi si- gnum aliquod valentissimum deterrimùmque accesserit : qualia pleraq; in phrenitide exoriuntur. *Phrenitici, sputatores, fanatici, etiāne tremuli*? Obseruabit studiosus temporales musculos, & masseteras, quorum afflictione per sympathiam cerebri exhausti, dentium stridor & collisio contra naturam & institutum ægri cietur, incidente tremate, conuulsionem & collisionem adferre maxillæ inferiori. Sed ea conuulsio coniunctam non habet insaniam : sed *πρὸς κάρσιν καὶ σπρίων*, i. alterati *ἐν* intenti contra naturam, adfe- rant *τὸ κάρσος*, vel, vt scripsit Hippocrates, sint ipsi *καρσώδες*.

MORTIFERVM] E potestate mentis à melancholia exeunt; quibus tremores oboriuntur, malè sunt. Vbi *κακῶς* nomen, vt demissè dictum, Galenus emendat, ac pro eo substituit *πανόμους*. Tales enim progres- sus facit phrenitis ad interitum, vt suprà ostendi.

QUOD SI QVIS IAM DEMENS ID FACIAT, AD VLTIMA VENTVM ESSE TE- STATVR] Ac si diceret; si à phrenitide valentissima deterrimàque, afflictionem descriptam ostendar musculorum cerebri communium & propinquorum, per sympathiam exhausti principij & facultatis effcètæ; nullam salutem vitæ amplius posse videri sperabilem planè testatur. Itaque melius est delirium superuenire tremori, quàm tremorem delirio.

PESTIFERVM EST ETIAM DENTES EXARESCE-RE] Causæ sunt explicatæ in lingua.

8 Οδόντος σφακελισμός· ἀπόστημα ὡρὰ ἔλον χυρόμῃρον λύει.

Dentis sphacelismus; abscessum in gingiva exoluit.

DENTIVM stridor, itémque fragor quemadmodum fiant in morbis acutis, & quæ signa syllo- gistica inde ducantur, demonstratum est superiore prognosi. Nunc de affectionibus dentium quæ proprio ipsorum vitio inesse dicuntur, non alieno; sicut fragor & stridor à tremore aut conuulsione temporalium musculorum & masseterum. Illic enim dentium veluti rixæ & prælia cernuntur & audi- untur : sed tamen non sunt in vitio dentes ipsi. Hic autem secus est illis. In promptu est sphacelismus, in quo malorum eximia vis est inter omnia quæ dentibus possunt accidere.

Ergo. DENTIS] i. Ossis acerrimi sensus, quod tantum atteritur, quantum molendo mandit; ac tandiu crescit, quoad quiescit; omnium affectionum capax, omnibûsque morbificarum causarum te- lis expositum, quibus & caro ipsa, nec cum minori perceptione rei molestæ; vnde sæuissimis doloribus cruciatur, in eoque symptomata conspiciuntur omnia intemperiei, phlegmones, continuiratis, & con- tiguiratis emoræ.

SPHACELISMVS] i. Absoluta dentis corruptio, in desperatione viuacitatis. Tamen enim spha- celus vniuscuiusque substantiæ corruptionem in omni parte complectitur: propriè tamen significatio eius ad ossa transfertur; vt nomen gangrænæ, ad carnes. Itaque *καὶ σφακελισμός* cerebrum sphacelatum iam dixit, cui gangrænæ potiùs competit appellatio. Dentium autem sphacelismum facit, vel concepta in ipsis causa, vel gingivarum corruptio : quemadmodum in tremate capitis, diffuens caro sanie; vici- miculatum os facit caluarie quæ politissima erat.

ABSCESSVM IN GINGIVA EXOLVIT] Ac si diceret; dentis sphacelismus contigu-
tis emoræ vitio incidit, propter affluxum ichoris, aut magnæ phlegmones feritatem: quoniam locati
locus est conseruatio; quod in puerulis cernere est qui fiunt galiancones, luxata brachij arthradia; &
quæcunque ossa vitium attingunt, incremento prohibentur. Si igitur vel sponte sua excidat, vel chirur-
gia radicitus auellatur, vt necessariò auelli debet (quoniam omne viuens cõsortis mortui impatiens esse
soler) ex euentu abscessum exoluet qui corruptionis causam dedit. Quod etiam faciendum præcepit
Hippocrates, vbi demonstratio huius prognoseos continetur. Quotiescunque dolore tentantur dentes; si ca-
riosi sunt, si commouentur, veniunt auellendi; integri & immobiles vrendo exsiccandi. Iuvat etiam masticatio, πλ
δ' αμασσηματα. lib. πειπιδων. Idem lib. 5. πειπιδων. narrat Aspalij filiam leuacionem habuisse odontalgia,
infuso castorio cum pipere.

9 Επὶ ὀδόντος σφακελισμῷ πυρετὸς ἰσχυρόνδ' σφοδρὸς, καὶ πα-
ραφροσύνη θανάσιμον. ὡς δὲ σώζονται, ἐλκεα ἐκπυήσῃ, καὶ ὅσα ἀφίσταται.

*Si dente syderato ingens cum delirio febris accesserit; mortiferum.
Sin autē periculo defungantur; vlcera suppurabunt, ossaque abscedent.*

20 SI DENTE SYDERATO] Non quidem ab ichore & phlegmate putri, cuius quidem tabe ex-
cuanantur dentes quos non domat ignis, flammæ cremat; nec verò à cibis in aluo bilefcentibus, aut
mala & vitiosa eorum gomphosi in alterutra maxilla: sed ab inflammatione cum pulsu & summa do-
loris acerbitate coniuncta, quam peperit sanguinis bile perfusi affluxus. Hic autem sphacelismum vo-
cat, inchoatam syderationem: quemadmodum supra in cerebri sphacelismo ostendimus, vbi ἐκφυλάσ-
σφακελίζοντες, non autem, σφακελίσαντες, legendum censuimus.

INGENS FEBRIS] Per propagationem causæ morbificæ ad cor, quod etiam crebro accidere
scripsit Hippocrates, calce perfracto.

CVM DELIRIO] Hic operæpretium fuerit Galenum philosophantem audire super eo sym-
ptomatum concursu qui consecutione fit calcis perfracti. Consensit cor, per arterias; per neruos, cerebrum.
30 Aliqui cum sit cor caloris natui fons & officina, cerebrum ratiocinationis; consequens illud erit, febrem esse à corde;
delirium, à cerebro. Atque in his casibus, sympathia vs magna lucet quæ in officij communicatione, & vicinitate
principiorum & insinuationum consistit.

MORTIFERVM] Est enim spes in angusto, cum febris ingens accessionē habet prægradis delirij.

SIN AVTEM PERICULO DEFVNGANTVR] Pepasmo & excretionem libera, vt hæmor-
rhagia est.

VLCEA SUPPURABVNT] Victrice natura, & feritate morbi exclusa, & inchoati sphaceli-
smi ad integritatem reditu.

OSSAQVE ABSCEDENT] Luxata gomphosi dentium per suppuratum; aut eorum iam cor-
ruptorum exclusionem: quoniam πᾶν τὸ ἔξαιμον καὶ ἀποσπαστὸς, ἀφίσταται ἀπὸ τοῦ σώματος καὶ ζώης. i. Exangue omne
40 & alienum, à sanguineo & viuentē separatur.

lib. de capite
vulnere.

10 Οἷσι δὲ τὴν ὑπερώϊον ὑγροῦ συστροφὴ γίνηται ὥς τὰ πολλὰ
πνοῦται. Male οὐσαν.

Quibus ad palatum humoris collectio est; fere fit purulenta.

50 TUMORVM omnium crises fere sequuntur naturam humoris morbifici & partis obsessæ. Atque
vt cõparata vtriusque ratio est καὶ φύσις: sic diaphoresi aut suppurato tumores exoluantur. Vt autem al-
terutrus vel vtriusque conditio est ὡς φύσις, ἢ ὡς λόγος τῆς φύσεως: ita gangræna, aut scirrhi consecu-
tio adferri solet. Omnino enim, quicunque in partibus assurgunt tumores mutationem suscipiunt, aut
digestionis, aut suppurati, aut gangræna, aut scirrhi. Atque ex illis quatuor mutationum generibus, prio-
ra duo sunt καὶ λόγοι τῆς φύσεως: postiora verò ὡς λόγοι. Quæ cum ita sint, considerandum, sitne omni-
no suppurabilis quæ ad palatum assurgit humoris collectio.

QVIBVS AD PALATVM] i. Ad partem oris superiorem, fornicis modo, conuexam modicè,
nec admodum cauam, vt in iis qui κεφαλὴν habent φεζὴν, fulcro cuneiformis ossis subnixam, foraminulis
oblitam expurgandæ pituitæ dicatis, sed crassa membrana obductis, quam à ventriculo accipit. Est au-
60 tem cerebri basis quædam.

HVMORIS COLLECTIO EST] Sic enim συστροφὴν legendum & interpretandum duximus,
quod ea sola suppurati sit capax: quamuis & συστασις huiusmodi esse videatur. Nā & Hippocrates omne
rheuma, i. fluxum, distinxit εἰς τὸ ὀρμώμενον καὶ τὸ ἑνωμένον, i. in concitatum & consistentem. Sed tamen con-
uenientius multò ad propositæ quæstionis decisionem, ἢ συστροφὴν legenda & explicanda videtur, quàm
σύστασις. Multa enim συσταται, quæ non συσρέονται, i. consistunt quæ non colliguntur. Nam qui humores
1. Epid.

pravi & efferi confluunt in partem aliquam, ibique cumulantur firmiter fixi, propriè dicuntur *συρρέειν*. Atque ex eo verbo *συρροφείν* nominantur, quæ suo ambitu continent tumores contra naturam à fin-
 xione ortos, quorum *ήγμονικόν* ad sanationem solum, occurrit phlebotomia. Omnium enim morborum
 systrophæ, alioqui sanabiles, fiunt insanabiles, nisi earum curatio initium ducat à sanguinis detractione;
 maximèque si pro phlebotomia purgatio præscribatur. Eam *της συρροφής* conditionem atque naturam
 prudenter Hippocrates animaduertit in illo. *Quibuscumque mulieribus sanguis intra mammas conculcatur,*
συρρέφεται, maniam prænunciat. Quod non facit ipsius sanguinis *ύπαισις*, procreando lacti ad mammas
 cursum inflectentis. Sed quoniam ea collectio ferè purulenta euadit, quærendum videtur vtrum sup-
 purari laudabilis ea mutatio suscipiatur & fiat. Existisse dicuntur in tempestate pestifera quorum abs-
 cessus mutationem purulentam habuerunt, cum ligamentorum ossium, & musculorum prolapsu. Nam
 à communi putredinis causa quæ putrescunt singula, propriam quæque obtinent corruptionis diffe-
 rentiam. Ergo non omne suppuratum in bonis ducendum. Nec verò omne rheuma *συνισμαμεν* fit simile
 bono puri, sed alia corruptio peior priore nascitur, vt est in eodem 3. Epidem. Quæro igitur an suppu-
 ratum laudabile semper sperandum in ea humoris collectione circa palatum. Enimuero suppuratum
 laudabile potius miraculo apponendum, quàm in validæ partis natura, humorisque mitificabilis man-
 fuerudine sperandum. Nam ea collectio in palato non facilè fit, foraminum pleno, & si acciderit, præ-
 clusis foraminibus, membranam densiorem corrumpit ex facili, osâque tenuia; quæ cum exciderint
 verissimū illud esse testantur quod scripsit Hippocrates. *Οσσιον όστιον άπό υπερώης άπήλθε, ποτίοισι μήν ήα ή*
ρίς όσσις δέ, όδεν οι όδοντες, άκρη σιμυόεται. i. *Quibus os à palato abscedit, iis media naris resimatur.* At quibus illud cui
 adherent dentes; resimatur extima. Pertinet hæc prognôsis ad curationem virulentia, quæ nihil aliud est
 quàm propagatio phymatum virulentorum, quam facit humorum & viscerum conspurcatio ex con-
 tagione impura. Vide lib. 2. *σπελ τόσων*, vnde prognôsis hæc desumpta est.

II Τὰ πρὸς χύνας ἀλγήματα σφοδρὰ κίνδυνον εἰς ὅσας ἀνάπλουν
 ἔλθειν.

Sani maxillarum dolores, excessuri ossis periculum adferunt.

E A D E M ratio huius prognôseos quæ adducta est in suppurato collecti humoris ad ipsum palatum.

12 Χείλος συσπώμενον σημαίνει κοιλίης χολώδε κατάρρηξιν.

Labri concussio; biliosam aluum prorupturam ostendit.

A D E N T I B V S & maxillis, ad labia transcendendum, quorum affectiones eadem methodo quæren-
 dæ & examinandæ, qua in aliis faciei partibus vsi sumus. Sed eam quærendi & examinandi methodum
 in propositionis ipsius & singularum vocum explicatione indicabimus, hoc modo.

L A B R I] i. Oræ ipsius oris, quæ tum ad efformandas voces, tum ad mulgendas nutricum pa-
 pillas facta est, atque quodammodo sculpta ex confusanea cute & musculo, vt verè dici possit *μὴς δερ-*
ματώδης, ή δέρμα μυώδης, i. musculus cutaneus, aut cutis musculosa. Ipsum verò labrum tali substantia prædi-
 tum, quaternis vtrinque musculis iussu nostro mouetur; sursum, deorsum; dextrorsum, sinistrorsum; an-
 trosum, retrorsum.

C O N C U S S I O] Sic enim *χείλος συσπώμενον* idem significare hoc loco putamus, quod *χείλος τὸ κάτω σπώ-*
μενον, i. labrum inferius concussum. Non enim diastrophe hic fingi potest ab exolutione partis oppositæ,
 aut conuulsione laborantis; nec verò *κόνκος πατισμός* quem facit vtriusque partis conuulsio. Hæc enim
 firmiter fixa, non aliunde continuationem accipiunt, quàm à cerebri afflictione. Atque ea concussio
 per sympathiam accidit vetriculi cōcutientis se ad excussionem rei molestæ: quemadmodū ptyclismus.

B I L I O S A M A L V M P R O R V P T V R A M O S T E N D I T] Quoniam illa concussio labij,
 consecraria est acerbissimi morfus in stomacho; proptereaque signum est vomitionis acerrimorum hu-
 morum.

13 Τὰ ὑπὸ οὐλῶν αἵματι ἐπὶ κοιλίῃ ὑγρῇ ὀλέθρια.

Qui è gingivis insuper aluo liquida, sanguis exudat; pestiferum.

H A C D E C I S I O his expressa literis legitur ad finem huius diuini operis, prognôsi penultima. *Επὶ*
κοιλίῃ ὑγρῇ, πρὸς ὅσον αἷματι ἐπὶ τῇ κοιλίῃ πατισμός. i. *Aluo humida sanguinem è gingivis effluere; mortiferum.*
 Non enim ea *ἐπὶ τῇ κοιλίῃ* manat à systrophe morbi cui leuationem adferre solet, vt in pleuritide, ophthal-
 mia, phrenitide, cancro. De quo scriptum illud reperio in Epid. lib. 5. & 7. Apud Abderitas mulieri curpiam
 in pectore obortus est cancer; effluebat autem è papilla sanies, quæ suppressa mortem attulit. Sed exoluta retentri-
 ce potentia,

ce potentia, & sanguinis ichorosi prauitate, cum destillatione ferina quæ totum os primum, deinde verò ipsum ventriculum facit aphthosum, vnde labefactario naturalis œconomiz; quæ potissimum certatur in lenteria, & vitiata hæmatosi, cuius vitium maximè patet in gingiuis quarum simplicissima caro est. Qualis igitur est *αἰχμησὶς ἐξερυσθῆναι* in iccoris exolutione; qualis etiam sudor cruentus quem facit ichorosus sanguis exudans per cutim: talis & cruor qui è gingiuis elabitur. Ceterum vt pestifera est dysenteria hepatica; vt etiam calamitosa lenteria quæ superuenit ori aphthoso, maximè verò grauidis quibus omnem gerendi & nutriendi opportunitatem adimit, proptereaque abortionem facit: sic etiam mortiferum denunciat malum qui è gingiuis ichorosus sanguis exudat: quoniam labefactata iam dudum naturali œconomia, cum desperatione *τῆς ἐπανορθώσεως*, vires effertæ breui ad interitum sunt collapsura, per consumptionem vitalis principij, & paupertatem nectaris viuifici.

Aristot. cap. 19. lib. 3. hist.

14 Πνῶλα ἀναχρέμψες ἐν πυρετῷ πελιδναί, μέλαναι, χλωδῆες πᾶσαι μὲν κακῇ. ὑποχωρέσουσι δὲ καὶ λόγον χρήσιμοι.

Malè fuit inisus.

Sputi in febre expurgationes liuidæ, nigra, biliosa; omnes omnino malæ. Quæ autem conuenienter procedunt, salubres.

20 ANAXPEMFΣIEΣ hîc idem quod *ἀνακαταρσις*; faciles & expeditæ; vel impeditæ & difficiles. IN FEBRE] Quæ nec intermissionem habet, nec dum vllam pollicetur: sed contrâ quæ perpetuum ciet excursus ad thoracem, cum eductio nulla leuationem adfert. Præua sunt omnia sputa quæ nullam doloris leuationem adferunt.

LIVIDÆ] Argumento putredinis fœdæ quæ à morticinio partis vnde venit, separata esse nequit.

NIGRÆ] Quæ sunt meracorum omnium pessimæ. 2. prognost. Si ita meracum sit sputum, vt nigrum appareat; deterrimum. Est autem facta eiusmodi, vel perusta bile æruginosa; vel causa ipsius νεκρώσεως, i. mortificationis.

30 BILIOSÆ] Æruginosæ, quæ sputa vocauit *χλωρæ*. Huius generatio fertur accepta perustæ bili flauæ, quæ, participatione feri, antè quidem erat *ώχρæ*, i. pallida; nunc eo exhausta, redditur flaua & vitellina.

OMNES SVNT PRAVÆ] Quoniam vacuationes malæ, malarum quoque affectionum signa existunt. Atqui meracorum excrementorum vacuationes sunt malæ. Appello meraca, expertia sui naturalis feri, à consumptione ardoris febrilis, vel in obfessa parte, vel in vniuerso corpore.

QVÆ AVTEM CONVENIENTER PROCEDVNT] Si sunt flaua sputi accuratè pituitæ permixti, aut sanguine perfusi; non tenuis proindeque fugacis, vt in ferina destillatione; non etiam viscidum & glutinosum, quod exhibet contumaciam: si, inquam, sputorum istiusmodi liberæ sint & copiosæ vacuationes, morborum initia, quæ mali leuationem adducant, spirandi libertatem restituendo.

SALVBRES] Quoniam *καλῶς καὶ κρίσιμως*, i. bellè & criticè suscipiuntur, proptereaque conferunt, & alacriter feruntur ab ægris.

40 Ex his apparet *τὸ ὁπισθίον*, quod erat in libro, rectè fuisse à nobis mutatum in *τὸ πῶσιον*. Cum ex illo sequuntum fuisset id absurdi, quod sputum quodcunque, modò ne suppressum, in bonis haberi deceret; etiam æruginosum; immo liuidum & nigrum.

15 Οἷσιν ἀλμυρῶδεα πύελα καὶ βήξ ὑφίσταται. Τυτέοισι χρώς ἐρυθραίνεται, οἷς δὲ ξανθήματα. πρὸ δὲ τῆς τελευτῆς τραχύνεται.

50 Si cui sputa salsa, vnaque tussis quiescunt, illi rubet corpus velut exanthematis obsitum: sed ante interitum exasperatur.

SI CUI SPVTA SALSA] Quæ sunt eiusmodi vel à putredine pituitæ, vel à feri biliosi cum pituita permixtione; eaque salisilago tabifica est, facitque siccam tussim cum raucitate coniunctam; quæ nisi lapsu consequentis temporis quiescat, alteram tabis efficit differentiam à primitiua pulmonum exulceratione.

QUIESCANT CVM TVSSI] Infirmitate partis quæ ampliùs concuti nequit ad promouendam expurgationem humoris tabifici qui in pulmonibus residet.

60 IIS RVBET CORPVS VELVT EXANTHEMATIS OBSITVM] Pustulæ toto corpore pullulant; ab erodente sanie per ipsum diffusa.

SED ANTE INTERITVM EXASPERANTVR] Quoniam partes solidæ suo defraudatæ alibili succo, & spiritus tabifici appulsu, & febre lenta; non solum rigidiusculæ sunt, verum siccitatis intensione, maiorem inæqualitatem concipiunt. Hoc est documentum phthificæ quam facit in corporibus nostris, φθόν.

16 Ανάχρεμψις πυκνή, ἢν δὴ πῦρ ἄλλο σημεῖον θεωρεῖται· φρενιτικόν.

Screatio frequēs, si quod aliud signū accesserit; phrenitidis nuncia est.

H V I V S prognoscos demonstratio legitur in 6. 12. & 30. sectionis primæ prioris prorrhæti; ex quibus nos etiam commentariū scripsimus ad 99. 1. lib. Quamobrem ne abuti videar otio & literis, mihi religio est denuo scribere πρὸς αὐτὸν καὶ αὐτὰ.

DE VOCE.

CAP. VIII.



1 μὴ σιλήσει ἀφωνία κακίστη.

1 Quæ cum exolutione veniunt vocis carentia, pessima.

V E R S A T V R illud in peruagato medicorum sermone, nullam vitæ salutem posse videri sperabilem, quando vis morbi cuiusque asperissima cum virium exolutione coniuncta est. Atque illud theorema catholicum legibus & exemplis medicinæ clarissimum fecimus comment. ad 22. 1. lib. Quemadmodum igitur ex rigore cum cephalalgia exolutiones, mortifera; quemadmodum etiam deliria fractis iam viribus, pessima: sic etiam quæ cum exolutione, vocis carentia sunt; pessima. Quoniam autem de aphonia & exolutione multa iam scripsimus; sufficit hoc loco dicere, πῶς ἀφωνία καὶ ἐκλυσις ab iisdem fontibus principia causæque ducere, eorūque symptomatum πῶς ὑπαρξὴν consistere in extinctione caloris nativi, unde paupertas materiæ vocalis; & facultatis motricis infirmitate, unde vocalium instrumentorum ad ἐκφύσησιν, i. efflationem, & modulationem impotentia. Vide comment. ad 22. & 35. prioris lib.

2 Αἰ ἐπ' ὀλίγον θράσες ὄρακρούσιες· πονηρόν, & θηριώδες.

Deliria paulisper ferocia, mox erunt immania.

V I D E 54. & 90. prioris lib. & Galenum comment. ad prorrh. 25. f. 1. 1.

3 Οἷσι φωνὴ ἅμα πυρετῷ σιλείπει μὴ ἀκρίσιος τρομάδες θνήσκοι.

Quibus cum febre vox hæret post acrisiam; tremuli moriuntur.

V E T V S ILLVD scitum est; melius multò esse naturam quiescere, quàm aliquid frustra moliri. Nam & acrisiæ in febribus, in causa sunt diuturnitatis; non tamen funestæ, si vacationem habeant erethismi, i. proritationis. Quæ verò acrisiæ manant ab irritò erethismo; illæ sinistri iudicii esse solent. Ac tales acrisiæ per oppressionem & malam translationem, crudelissimi doloris atque interitus, non raro, consecutionem adferre solent. Quæ causa est cur ita scripserit summus præceptor. Ὡμα καὶ ἀπείρια, & ἐς κακὴς ἀποστάσεως προέρομνα· ἢ ἀκρίσιος, ἢ πόνοις, ἢ θανάτοις, ἢ αὐτῶν ὑποτροφαί. i. Cruda nec cocta, & in prauos abcessus conuersa; acrisias, labores, mortes faciunt, vel eorundem recursus. Sed cum irrita omnis contentio terribilis est; tum illa maximè quæ frustra rigorem ciet, cuius inanem concussionem hîc subaudire oportet, quæ in illo prætermissa non est. Quæ ex rigore incidunt aphonia, tremore excutuntur.

Ergo. Q V I B V S] In cruditate humoris morbifici, cum prauitate signorum omnium constitutis.

C V M F E B R E] Quæ nec intermissionem habet, nec vllam ostendit sperabilem.

V O X H A E R E T] Faucibus, nec de pectore depromi potest, propter infirmitatem summam intercostalium musculorum; siue illa causam habeat oppressionem; siue exolutionem potentia animalis, unde suscipi nequit, nec perfici valida exsufflatio ad vocem edendam.

P O S T A C R I S I A M] Vel melius acrisias, frustra sæpenumero tentata crisi; quæ contentio quò frequentior est, cò peius res eunt: vt si crebrò ciantur rigores fractis iam viribus ægri. Atque illud nomen τῆς ἀκρίσιος, non quidem pro crisis vacuitate vsurpandum videtur, quam diximus causam haberi diuturnitatis, non interitus, quæque in pepasmi difficultate consistit, propter humoris morbifici contumaciam: sed potius atque verius, pro ea secundi generis acrisia, quam crudi humores, & in malos abscessus conuersi attulere; per quam morbus vires acquirit eundo. Est igitur acrisia duplex; vna quidem, quæ vacuitatem crisis habet; altera verò, quæ crisin obtinere non potuit. Atque illa quidem mutationis expressa est;

pers est; hæc verò prauæ particeps, prauique abscessus. Quod autem acrisia sit irritæ mutationis consuetaria, perspicuum fit ex eo quod scripsit in prothetico in eandem sententiam. *Οἱ φωνῆς μετὰ κρίσιν ἀλλεῖται, ἀμα πυρετῶσι ἐρωδῶδες.* Vbi sanè illud, *μετὰ κρίσιν*, nihil aliud significat quàm *δυσελπίαν*. proth. 19. l. 2. 11.

TREMULI MORIUNTUR.] Pertinet hoc ad explicationem prognoscens illius. *Quæ ex rigore incidunt aphonie, tremore excutuntur*: quod, mea quidem sententia, per sarcasum scriptum est; quemadmodum & illud. *Οἷον ἐν καύσιν* *ἔσθ' ἰσχυροῦται, ἀφροντί λυσι.* i. *Quibus, in causis tremores fiunt; eos delirium exoluit.* Certissimum enim est, omnem aphoniam quæ à rigore venit cum virium exolutione, sanari non posse: quoniam inde significatio fit exolutæ potentie animalis cum extinctione caloris natiui. Nec sanè video quæ causa possit esse tremoris in exolutionem virium incidentis. 11. Coac. 1. lib. aph. 26. 6.

4. *Αἱ ἐν πυρετῶ ἀφωνίαι ἀπασμώδεα τρόπον, κηστῶσαι σιγῇ ὀλέθριον.*

Quæ in febre conuulsivæ sunt aphonie, si cum silentio fanatice fiant, mortifera.

EXTAT Galeni paraphrasis in hanc prognosin quæ sic habet. *Αἱ ἐν πυρετῶ ἀφωνίαι, καὶ ἀπασμώδεα ἔσθ' ἰσχυροῦται πλεονῶσιν εἰς τὴν μετὰ σιγῆς ἔκστασιν ὀλέθριον.* i. *Quæ in febre conuulsifico modo sunt aphonie, si cum silentio insana successione adferant, mortiferum habent malum.* Nos igitur, ne aberremus, Galenum ducem sequemur hoc modo. proth. 19. l. 2. 11.

QUÆ IN FEBRE.] Aucta symptomatis atque grauissimis ægri damnis, propter acrisiam ex irritō cretismo; & cruditate ac feritate humoris morbifici in prauos abscessus conuersa.

CONVULSIVÆ SUNT APHONIA.] Quæ conuulsifico modo existunt, iniussa collectio- ne partium materiam vocalem exprimentium, deducendum, excipientium, & modulantium: qualis aphonie causa consideratur in cataleptis & in ebriis qui voce capiuntur conuulsi. Atque multum interest inter causas propositæ aphonie, & eius quam cum exolutione fieri iam demonstrauimus per extinctionem caloris natiui, & summam infirmitatem potentie animalis, proptereaque fatalem ad interitum iamiam futurum.

SI CUM SILENTIO FANATICE FIAINT.] Metonymia est afflictionis pro afflicto. Ac si diceret, si homines voce capti è potestate mentis exeant cum silentio, quod fortè cuiusdam ridiculum videri possit, qui existimarit omnem aphonum necessariò reddi *ἀναδον*, propterea quæ mirum non esse, eum silere qui voce sit captus. Sed intermissione temporum hæc distinguuntur, vt in Pythione, qui altero die morbi fuit *ἀναδον*, *ἀφανος*, καὶ βραχυπνοός. i. *silens, voce captus, breuè spirans.* Itaque si dissipata, vel aliò conuersa conuulsionis causa, vocem recipiat; nec tamen loquatur, ac lingua in vitio non sit; perspicuum est illud silentium excessus melancholici, vel melancholicæ insanie symptoma esse. Et quibus ita mens in officio laborare videtur, similiter sunt affecti vt illa Dealcis vxor, quam vel nugarum garrulitate, vel silentio, eximie phreniticam & fanaticam fuisse narrat Hippocrates. Quæ de re illud extat iam explicatum. *Qui cum silentio è potestate mentis exeunt, nec voce sunt capti; mortiferum habent malum.* Etenim, quemadmodum feritate bilis atra fit *ἐκστασις* illa *μεταβολικὴ*: sic alienatione cerebri à diurna & vehementi alteratione, cum scilicet exaruerit; tum pro clamore, silentium; pro iactatione, segnicies; pro artuum contentione, lenis tremor; pro vigiliis, coma & cataphora veteriosa. 71. Coac. 1. lib.

MORTIFERÆ.] Quoniam omnis partium nobilium alienatio desperationem salutis ostendit. Sic vxor Dealcis interiit. hist. 15. sec. 3. Epid.

5. *Αἱ ἐν πόνου ἀφωνίαι δυαδάνατοι.*

Qui ex dolore voce sunt capti, crudeliter moriuntur.

QUONIAM aphonie vndeunque venerit in morbis acutis, celeritatem moriendi ostendit; nunc ex distinctione causarum ipsius aphonie, cuiusmodi sit; moribundorum ab illo casu, interitus docere instituit.

ERGO. QUI EX DOLORE.] i. Acerbissima conuulsione intercostalium musculorum, quæ initis morborum illapsa, firmiter fixa manet, nec intra eam qua incidit, horam, discutitur: alioqui febris medicatoria. 163. Coac. 1. lib.

VOCE SUNT CAPTI.] Denegata expressione & appulsu vocalis materie ad instrumenta phonica, & impedita eorum modulatione ad vocem edendam.

CRUELITER MORIUNTUR.] Crudelissima morte intereunt, hoc est, vt Græci loquuntur, *ἐκτασθῆναι* vt contra, qui cum exolutione voce sunt capti, *καθραίνεσθαι*, *clari*. Crudeliter autem moriuntur, symptomatum vehementia in doloris acerbitate, meteorismo difficilis respirationis, iactatione, cephalalgia, delirio quoque ipso.

6. *Αἱ μὲν ἐκλύσι κατὰ πᾶσιν ἀφωνίαι ὀλέθριαι.*

Quæ cum exolutione firmiter fixa, sunt aphoniam; funesta.

ENIMVERO duplex est omphino causa τῆς ἀφωνίας; una quidem quæ διὰ τὴν πύσιν ὀφθαλμῶν, i. tensione forti; altera verò διὰ τὴν ἐκκυσιν τε καὶ χαλάνην τῆς πύσιν ὀφθαλμῶν ἐργαζομένων μὲν τε, καὶ νεύρων, i. exolutione & laxitate musculorum nervorumque vocem edentium. Atque illa quidem quæ in tensione consistit, fatalis est ad crudelissimam mortem; hæc verò, ad tensionis expertem. Nam aphoniam cum exolutione musculorum atque nervorum firmiter fixa, moriendi sensum adimit. Quod superest, hic nullæ sunt aliæ mæx partes, nisi ut quid sit τὸ κατὰ πύσιν explicem, huic loco accommodatum. Ne longum faciam, catoche & exolutio existere simul nequeunt; ut neque τὰς καὶ λύσιν. Nam catoche ἐν τῇ πύσιν consistit. Erit igitur ἡ κατὰ πύσιν ἐκκυσιν, exolutio firmiter fixa. Quod autem τὸ κατὰ πύσιν in ea significatione vsurpetur, perspicuum sit ex illo Galeni. Symptomata catoche non solum dicuntur quæ vocatam inferunt catocchen; sed & illa etiam quæ sunt firma & fixa. Similiter idem ostendit, quod ἀδονικῶς iam explicauimus, κατώδες, λυγρόδες, κατὰ πύσιν κακοί. Huc etiam pertinet prognostis illa iisdem expressa literis quæ legitur prorrh. 4. l. 3. 1.

7 Αἱ κατακλώμεναι φωναὶ μὲν φαρμακείῳ, ἢ ἐκ πονηρόν; τούτων

④ πλείους ἐφιδρῶσι, καὶ κοιλίας καδυζαίνονται.

Interruptæ voces à medicatione, utrum prava? Ac sanè plurimis sudatiuncula exudat, & liquidis excrementis fertur aluus.

VOCES κατακλώμεναι idem significant quod κατακλάσις φωνῶν. Atqui κατακλάσις nomen in artibus frequens est apud Hippocratem, quando iacente supino ægroto videntur συγκατακλόμενα crura, ἢ ἀσπασμένα, i. contracta aut implexa. Sic etiam in oculorum & palpebrarum peruersione, κατακλάσιν vsurpavit, cum ait. Ὀφθαλμοὶ θρόσος ὀφθαλμῶν, καὶ ῥίμης αὐτῶν, καὶ κατακλάσις κακόν. i. Oculorum continuis audax, phreniticus; sic & coniectus frequens & contortio. Vbi Galenus sic ait. Κατακλάσιν λέγει τὸ ὀφθαλμῶν, ὅπου ἀσπασμένοι τὰ βλέφαρα. i. Κατακλάσιν appellat oculorum, cum eorum palpebra peruertuntur. Est igitur κατακλάσις, τὸ ἀσπασμένον; & κατακλάσις, ἡ ἀσπασμένη, ἢ καμπυλότης. Quæ cum ita sint, quænam peruersio in voce fingi potest, quam in cruribus multum contractis & implicatis, tum in extimarum palpebrarum curvatura Hippocrates annotavit. An verò sunt hic voces expressæ, quas in tempestate pestifera tabidos depromere folios narrat, easque vocat insueto nomine κατεκλῶσας, pro κατεκλόμενας, hoc est, distortas: quamvis illud vitium aptius & significantius participium illud, ἰλαγονόμενα, explicaret, ut in illo, δεξιῶ ἰλαγον, sinistro ἰλαγον fuit. Vbi Galenus πύσιν ἰλαγον interpretatur ἀσπασμένον; quemadmodum etiam commentario ad illam prognostin, Εξ ὀφθαλμοῦ ἀσπασμένους ὀφθαλμῶν ἰλαγον, κακόν. i. A lumborum ascensu, oculorum illois, mala. Sanè operæ præcium est legere & intelligere Galeni philologiam super eo loco ubi φωνὰς κατεκλῶσας vocat Hippocrates: sed ea relicta, mihi abundè sufficit philosophiam doctoris amplecti, quæ proferetur paulò post in huius prognosticæ explicatione. Ac certè constat ex perspicacia re ipsius, causarumque ipsam efficiendum; voces hic dici κατακλώμενας, quas illic κατεκλῶσας nominavit: nisi quis forè dictionum aucepseclamet, malè ætium participium pro passiuo vsurpari. Iam verò cuiusmodi & quam obrem illa κατεκλῶσας φωνῶν, ἢ φωνὰς κατακλώμεναι, iam ad docendum aggredior.

VOCES INTERRUPTÆ] i. Quæ faucibus hærent, in quibus materia vocalis quasi conglomerata subsistit; vnde φωνὰς κατεκλῶσας, quales annotavit Hippocrates in tabidis, ex prolapsu catarrhi ferini materiæ vocali occurrentis, maximèque in tempestate pestifera, austrina, ventis placida, & pluviosa, quæ caput replet ichore, hoc est, fero maligno, & piruita falsa. Huiusmodi autem sunt interruptæ, ex pari contentione instrumentorum vocalium, & materiæ vocalis obrutæ catarrho ferino. Idem quoque non raro accidere narrat phreniticis alia ratione, ob infirmitatem & contractionem intercostalium musculorum, vnde materia vocalis in via subsistit. Etenim quibus interrupta vox est, similiter affecti videntur ut ij quibus spiratio in faucibus eliditur, & vnica inspiratione spiritum bis terve recipiunt. Ac talis difficultas spirandi nominatur πνεῦμα πρὸς ὀφθαλμῶν, i. expiratio offensans, aph. 68. 4. πνεῦμα διαπασσόμενον, i. respiratio duplicata, part. 2. 2. Epid. πνεῦμα ὡς περ ἀνακλόμενον, i. respiratio velut perrupta; hist. 3. 7. Epid. πνεῦμα ἀνακλόμενον, i. respiratio retracta, in Philisco; διπλὴ ἐστὶν ἐπανακλήσις, i. duplex intro reuocatio, 6. Epid. πνεῦμα ἀνακλόμενον, i. respiratio ascendendo intercidens, 4. acut. Convulsionis autem nuncia est hæc respiratio elisa in faucibus. Sed inter eam respirationem, & intercisam vocem, vel, ut ita dicam, intercalarem aphoniam, hoc interest; quod illa sit afflictorum duodecim musculorum spirationi dicarorum, nervorumque ipsos mouentium symptomatica; hæc verò, tremulorum intercostalium & nervorum, vel ipsorum vitio, vel materiæ vocalis obrutæ catarrho ferino & ad perpendiculum illabente. Denique vocis interruptio in depravatione consistit τῆς ἐκφυσησέως, i. exsufflationis, cuius copia & libertate voces ex animi sententia depromi solent.

A MEDICATIONE] i. Si quis inconsideratè purgationi operam dederit, quæ vel ἐκ γαστρίδος & choleram, vel oppressionem argulerit, citata materia quæ citam exsufflationem non habuit. Omnis enim materiæ concitatio quæ citam expurgationem non habet, oppressionem facit, ægrumque damnis afficit; non secus atque acrisia ab irritō crethismo humoris morbifici, in malos abscessus conuertitur.

VITVM CALAMITOSA?] Sanè quidem. Nemo enim est omnium quem id nescire persuasum habeam.

AC PLVRIMIS QVIDEM EXVDAT SVDATIVNCVLA] i. Vel toto corpore exudat rufcidus humor, vel in capite & ceruice; idque per expressionem ab oppressione, vel exolutionem à cholera & hypercatharsi.

ET LIQVIDIS EXCREMENTIS FERTVR ALVVS] Aut quia ventriculorum tædet sui officij, aut quia prolapsu catarrhi ferini inconsideratè citati scætet aphthis quæ ipsi sunt ægrotandi causa, & in officio laborandi; vnde funesta lienteria.

8 Ἐν ἀφωνίᾳ πνεῦμα οἷς τοῖσι πνιγμένοις ἀπὸ χρόνου πονηρόν. ἢ ἐξ ἡμετέρας πνιγνόν;

In aponia respiratio ut in iis qui strangulantur sublimis; pestifera. Etiamne phrenitica?

IN IIS QVI non nisi recta ceruice, vt anginosi; aut nisi residendo respirant, vt peripneumonici, & asthmatici; respiratio multum sublimis cernitur, μετέωρος: qualis in anginosa muliere. Hanc vocat ἀπὸ χρόνου, quod eius violenta ductio prima omnium sub aspectum veniat medici intruentis, ac velut prima in promptu sit ad intuendum. Talem etiam difficultatem spirandi expressit cum ait. Οἷς πνεῦμα ἀπὸ χρόνου, φωνὴ δὲ πνιγνόν, ὁ ἀπὸ χρόνου ἐγκάθηται. &c.

Coac. 6. cap. 10. lib. 2.

ETIAMNE PHRENITICA?] Sanè quidem, si nervorum vitio sit hæc difficultas spirandi, non instrumentorum deducendum & excipientium.

9 Αἱ ἐν κεφαλαλγίᾳ ἀφωνίαι ἅμα ἰδρῶν πυρετώδεις, χαλῶνται ἐφ' αὐτοῖς ἀνίσταται, χρονιώτερες. Ἐπὶ ῥιζῶνται τοῦτο οἷον, & πονηρόν.

Quibus ex cephalalgia voce captis, unaque cum sudore febriculosis, alius laxatur iniussa; ut se collegerint, diu tamen laborant. Atque his superrigere non est damnosum.

IN HAC PROGNOSE varia metonymia est afflictæ pro afflictione, & afflictionis pro afflictæ. Sed eam metonymiam faciliè nos & convenienter ad nostri authoris ὁρίωνας conuertemus, Galenum ducem secuti, cuius extat dilucida paraphrasis comment. ad 2. promth. f. 3. 1.

40 ERGO. QVIBVS EX CEPHALALGIA] Auscto capite morbificis causis, indeque meningibus alteratione & distensione afflictis, quod in cephalalgia laboret nervorum origo, non autem in capite sit localis affectio aphoniz.

VOCE CAPTIS] Per violentam contractionem musculorum atque nervorum, quam fecit materiz cephalalgicæ translatio ad partes depromedæ voci dicatas: quæ aphoniz causa & ratio in illa prognosi iam explicata est. Quæ in febre convulsiva sunt aponia, si cum silentio fanatica fiant; mortifera.

Coac. 4. huius 8. cap.

VNAQUE CVM SVDORE FEBRICVLOSI] Qui sudor exprimitur ex humore tenui, cuius nimia abundantia natat caput, vnde etiam facultas retentrix multum oppressa fatiscit. Est autem reuera sudatiuncula, quæ per expressionem symptomatica est, nec ullam febris remissionem adfert, nec facit vt æger tolerantius ferat morbum.

50 TVM ALVVS LAXATVR INIVSSA] Non quidem liquidis excrementis ducta, sed facibus; quod est ancipitis euentus. Vacuatio iniussa ferè symptomatica esse solet mentis in officio laborantis, aut exoluti sphincteris muscoli.

VT SE COLLEGERINT] Vt morbo leuari nonnihil videantur.

DIV TAMEN LABORANT] Materiz contumacia, & naturæ infirmitate. Nisi fortè ad exitum rapiantur oppressa & labefactata parte cuius officium est vitæ tuendæ necessarium. Patet illa labes vocis interceptione, & alui citra voluntatem ductione.

HIS SUPERRIGERE] i. His si super illa quæ dixi oboritur rigor: vt illud, ὅτι, frequentiam hoc loco non designet.

NON EST DAMNOSVM] Modò sudorem promoveat. Sic enim vis sepulta & languens exci-
60 tabitur ad exclusionem materiz morbificæ. Idem quoque faciet sternutamentum.

10 Αἱ μὲν ἀφωνίης κινεῖσιν ὁλέθρια.

Si quis voce captus è potestate mentis exeat; morti est proximus.

QVIA quod plures facultates vitium admittunt; eo est peius agrotō. Offensionem cerebri delirium arguit; vocis interceptio, nervorum principij.

II Αἱ τοῖσιν ὑπὸ ῥιζέουσιν ἀφωνία· θανάσιμον. εἰς δὲ κεφαλαλγίες
Θιξτοὶ ὑπὲρ κέως.

Quæ à rigore incidunt aphoniam, funesta. Sunt hi nonnihil cephalalgici.

QVÆ A RIGORE] Vnde scilicet nulla excretio promouetur: sed translationem habet matrice morbosicæ ad diaphragma & caput.

INCIDUNT APHONIA, FUNESTA] Quod ad præparationem suscipientis causæ accedat perennitas & vis efficientis. Nam præparationem suscipientis, cephalalgia antecedens declarat.

SEQUEBANTVR prognoses quatuor, quas, quia in demonstrationem non cadunt; Duretus reiiciendas putauit: iniuria temporum accidisse dolens, quod ex optimis pessimæ sint factæ.

DE RESPIRATIONE.

CAP. IX.



NEYMA, πυκνὸν μὲν καὶ σμικρὸν ἔον· φλεγμονῶν, ἐπὶ τὸν ὅσον τῶν καλεῖται τοποισι σημαίνει. μέγα δὲ καὶ διὰ πολλῶν ὡρα φροσύνῳ ἢ ἀσπασμόν.

I Respiratio frequens & parua; inflammationem, & laborem denunciat partium spirabilium. At verò magna & rara; dementiam, aut conuulsionem.

IN MEDICINA nullus feracior locus est quàm de spirando. Hic nusquam quidem non est, nec ullam instituendæ prognosæ rationem patitur esse expertem sui in morbis acutis. Quoniam enim respiratio sic ad vitæ conseruationem necessaria est, vt eius fructu, vel ad punctum temporis, vix videatur posse carere; quemadmodum spirandi libertas præclare ad salutem apparet & facit in omnibus morbis qui celeriter, continenter, & vehementer mouentur: ita difficultas spirandi omnis terrificata esse debet, quando excusationem non habet, aut perturbationis critica, aut crisis ipsius. Bene res eunt viri illius qui in aduersa valetudine, maximèque autem cum incanderit æstu febrili, spiritum ducit ex facili. Ex qui in libertate illa spirandi vnà cum doloris acerbissimi nobilium partium vacatione, & sòmi benignitate; qui, inquam, interierit Hippocrates vidit neminem. Nam facilis illa & liberalis respiratio, mirificos adfert sanitatis fructus, non solum temperatione & expurgatione febrilis ardoris qui focum habet in corde: sed etiam instauratione nectaris ipsius viuifici, perennitatem à corde habentis, quo partium solidarum viuacitas recreatur atque reficitur contra calamitosam vim febris, vnde absumitur, atque quodammodo liquitur.

Principio enim omni animantium generi à summo rerum opifice Deo tributum est, vt viuacitati cuiusque fugaci tuendæ & instaurandæ, viuifica quædam res atque facultas suppeteret, ac veluti præstò esset, ne ipsa viuacitas ante diem deficeret. Hæc autem viuacitas mansionem habet in vitali principio partium solidarum, quarum virtus est ipsa natura fundata in humido primigenio spiritu & calore perfuso, quod à semine vtriusque parentis in matricem illapsum, fatalem intra se fouet & continet vitæ & interitus necessitatem, quæ μίαν πωρομένη dicitur fabricationis humanæ. Hinc vita hominum natura & necessitate fatalis. Ac natura quidem, πρὸς ἀκρίνειαν, i. per secretionem; necessitate autem, πρὸς ἐνυμμίαν, i. per concretionem. Cum enim vitale illud principium, quod πρὸς ἀκρίνειαν veteres nominarunt, perpetuam patitur ἀκρίνειαν complexionis suæ, ac temperamenti quoque sui ἀλλοίωσιν, nec aliunde cōseruationem & instaurationem sui obtineat, quàm ex appulsu τῆς σπέρματος, quam propriè & consideratè, nectar viuificum appellamus; quoniam illud nectar votis naturæ & vitæ omnino respondere non potest, quantumuis naturaliter sit cōstitutum; hinc venit altera fatalis moriendi necessitas, quam ἐν τῷ ἐνυμμίαν positam esse diximus: quemadmodum idem si, vel alteratione eximia, vt in acutis febribus; vel corruptione & alienatione, vt in peste & phthoe, in vitio sit; citam mortem properare facit: ac tum iam ægri, non quidem fato, sed ante diem petire & mori dicuntur.

Verum enim uero quemadmodum ex complexione, & temperamento, ac spiritu prolifico vitalis illius principij, iacta sunt tria illa fabricationis humanæ fundamenta, quæ tandem in vitæ & animalitatis assurgunt principia, cerebrum, cor, & iecur; ex quibus totidem facultates in corporibus nostris lucent: ita

lucet: ita virtute & conspiratione optima principum illarum partium, *ἡς ζωῆς καὶ τῆς βίης*, i. vitæ & animalitatis ratio omnis perficitur atque absolvitur. Atque illa vitæ & animalitatis ratio atque conservatio cernitur in œconomia trium facultatum, naturalis, viralis, & animalis; earumque tam constans & certa est *συννομή*, ut mutuas tradant operas in perpetuitatem animalis. Ut enim per eam quam modo dixi *τὴν σὺννομήν*, partium solidarum vivacitas fluxa recreatur atque reficitur: sic ad ipsius perennitatem quam habet à corde vivificam, præsentaneum accipit subsidium, partim à iecore per iccorariam venam; partim à cerebro, per eam movendi vim qua spiritum ducimus. Ergo in sanguine & spiritu vivifica syrtis continetur; nec aliunde accipit generationem & conservationem sui. Nec verò vllum aliud requiri debet in rerum natura *ὑπερὸν*, nisi id vnum quod spiritui & sanguini putatur esse *ἐννοεσθῆναι*, i. consociale: cuiusmodi sunt ea quæ commendantur *τῇ εὐχολίᾳ*, quæque suavitatem participant gratiosæ humoris atque odoris. Itaque superstizio est, vel ostentatio, celebrare aurum, si diis placet, potabile; cæteraque chymica ebriosi illius, fanaticique athei Paracelsi: quorum iam pridem explosa commendatio est à schola Hippocratis, exultatque apud hypocritas medicos, & veteratores, quos nulla res præter versutam quandam hypocrisin commendare potest, & quorum vanitas ambagibus tantum foetissimum esse solet. Sed ut redeamus ad id quod demonstrandum suscepimus de respiratione.

Est igitur id rarum persuasumque omnibus, *τὴν σὺννομήν* vitæ conservatricem, nutrimentum & respiratione perennem obtinere sui generationem atque affluxum. De nutrimentum aliàs, nunc de respiratione dicendum.

Respiratio igitur, *ἀναπνοή* Græcis dicta, est actio partim iussa, partim iniussa, qua ducitur aër, vaporque fumidus expurgatur. Hæc volucrum, pecudum, atque hominum communis est, omnium denique vocalium animantium. Nam insectorum spiratio, *ἐνπνοία* Græci vocant, eodem modo non suscipitur, neque perficitur: quamvis in eundem scopum & finem ducta sit. Etenim sola transpiratio, *ὑπερπνοία* dicunt, sufficit illis, quod modicus eorum calor satis habet, per eam diapnoen, refrigerationis ab aëre circumfuso: quemadmodum & mulieres hystericæ, quarum ad tempus nulla respiratio est, sublato ipsius usu per dissipationem spiritus & caloris vitalis à venenata seminis corrupti aura; sed sola diapnoe tantisper contentæ sunt, donec suffocationis hystericæ causam excluderint, & ad se redierint. Ac piscium & insectorum materia non est vniuscmodi: quæ transpirando ducitur: quorundam enim tenuior est, ut apum, vesparum; quorundam crassior, ut fucorum, scarabeorum; crassissima est etiam lumbricorum, atque serpentum qui in latibulis exigunt acrem hyemem donec soluta fuerit. Sic aquatiliū eadem conditio est; quædam enim tenui vtuntur aqua fluiali, vt lucij, leucisci; quædam crassiore, vt cyrtij, quemadmodum & omnia genera gentis squamigeræ, quæ in mari veliferas circumnant puppes. Est enim consentaneum vt suum cuique sit consociale simile. Scitum est illud Theophrasti, & ante eum, Platonis. *Ὅμοιον ὁμοίῳ ἐννοεσθῆναι τὰ βῆ*, i. Omnia similibus gaudent. Ergo quibus aëris spiritus, iis aër materia est ad respirationem; quibus aquei, aqua. Sed in aëria spiratione, quæ tum respirando, tum transpirando fit; certi etiam sunt gradus. Ut enim volucra tenuissimo vtuntur aëre: sic terrestria paulò crassiore: crassissimo autem planèque terreo, quæ hypogæa. Quamvis autem homini consentanea sit planèque necessaria, purissimi, temperatissimi aëris respiratio ad spirituum ætheriorum instaurationem: nihilominus tamen crebra in eo cernitur spirituum alteratio, & alienatio, ex tempestatum ac temporum defectione, & locorum spurcorum aura impura; eoque fit aut qualis inspiratur aër ac circumfusus transpiratur, tales omnino sint mortalium spiritus atque humores, ex aëre quidem caliginoso, caliginosi; ex nebuloso, nebulosi; ex sereno cælo, puri ac tennes, proptereaque salubres. Atque vt multis de causis à Deo instituta respiratio est: ita si earum causarum ratio aliqua desideretur; vitiove id fiat spirabilis materiæ, aut respirationis ipsius; non potis est hominem salubriter vivere, quod impar sit necessitati commoditas.

Quæ cum ita sint, planè efficitur, respirationis à Deo institutæ causas finales esse has; temperationem, refractionem, & purgationem caloris qui in sinistro cordis ventriculo stabulatur; & vtriusque spiritus instaurationem, vitalis & animalis. Atque in vniuersum tres causæ existunt cur ita inearat & fiat, earumque causarum ratio omnis consideratur in usu triplici iam commemorato, & in instrumentis, & voluntate. Est enim respiratio, vt initio posui, actio partim iussa *καὶ ἐννοεσθῆναι*, partim iniussa *κατὰ ὁρμήν*. Cernitur autem *ἐννοεσθῆναι* in certa quadam ducendi, cohibendi spiritum deuotione: quemadmodum *ἡ ὁρμή* quando nulla sponte nostra, sed tantum sua, respiratio suscipitur atque absolvitur: sicut in arctissimo somno, sopore, & apoplexia; vbi necessitas ipsa spirandi, nervorum & musculorum vim excitat ad functionem. Sed in apoplecticis breui finem habitura est ipsa respiratio: quia cum stertore coniuncta est per spirabilium organorum infirmitatē, proptereaque interitu finitura. In ea spiratione nulla lucet electio; sed tantum instinctus, quo ducit, & tanquam authore, *κατὰ ὁρμήν*, spiritus intro ducitur. Nam voluntatem ab electione, i. *καὶ ἐννοεσθῆναι*, in respiratione quotidiana docet experientia, tum illud Hippocratis. *Ἰνὸν τὸν χαλεμὸν συνελθόν, μακρόπνοος*, i. remedium oscitationis continens; ex longis intervallis spiritum ducere. Quem locum eleganter admodum, vt cætera multa, ex Hippocrate Platon in suum usum transtulit, cum de singulu disputatio incidisset, his verbis. *Ἀπνευστὶ ἔχοντι πολλὸν χρόνον, παύεται ἡ λυγρὴ*, i. spiritum diu cohibendo singulus cessat.

De instrumentis autem respirationi dicatis, primum quidem eorum distinctio sic à veteribus tradita est, vt alia sint respirationis libera; alia verò, coactæ, atque, vt ita dicam, *πρὸς ἀνάγκην* editæ. Atque ita duæ omnino statuuntur respirationis species, vna quidem libera; altera autem coactæ, & vim experta. Aclibera quidem est, quæ placido spirandi usu planè est *ἀδύνατος*, penèque dixerim, *ἀπνοία*: quemadmodum Hippocrates nominare solet tempestatem aquiloniam flatus sonori expertem, seu *νινεμὸν*, vt in illo. *Ἐπὶ τὸ πονεῖν τὸν ἀπνοίαν ὅλα τέσσαρα*, i. tempestas austrina, ventis placida. Violenta autem, quæ aspe-

stabili thoracis explicatione & collectione cernitur in iis qui aliquantisper citò progrediuntur, & currunt; cuiusque multi sunt gradus ad suspiriosa *ἀσπυρῶν, μαρμελαρισμῶν, & ὀρθόπνοιας* usque. De quibus loco dicitur. Ac liberæ quidem, ad inspirandum suam dicavit operam diaphragma; ad expirandum verò, abdominis muscoli. Violentæ autem, seni dextra atque sinistra muscoli, quorum quaterni, inspirando; bini; expirando inferuunt. Nam deducendo, & excipiendo spiritui, & expurgando vaporis fumido; nulla instrumentorum distinctio est in omni respiratione, tum libera, tum violenta. Etenim commune est omnium vocalium animantium ducere aërem per arteriam; excipere, per ipsum pulmonem. Commune est etiam per easdem partes vaporem fumidum exhalare. Ut autem vaporis fumidi exspiratio, si pariter inspirationi respondet, non minùs meretur de vita, expurgando natium cordis calorem; quàm inspiratio, salubrem spiritum foris ducendo: ita vocis commoda secum refert è corde, quando intercostalium musculorum contentione expressa, vertitur in efflationem: ac tum à iussu larynge, tanquam ab aucupis canoro utriculo, modularè ad palatum reflectitur. Huc spectat vetus illud quod omnem de vocis natura, & causis doctrinam paucis complectitur. Est autem huiusmodi. *Ὅτι πλείον τὸ θερμὸν μεγαλοφωνότερον. καὶ ὅτι ψυχρὸς αἰὲρ πλείους δυνὸν δὲ μέγαλόν, μέγαλα καὶ ἔκτρονα γίνεται.* Quibus, inquit, caloris abundantia est, ius plena sunt voces. Etenim frigidus aër plurimus. Positis autem magnis duobus, oriunda quoque sunt magna. Ac si diceret; si ad instrumentorum vocalium amplitudinem accesserit vocalis materia; copia, vox inde oriunda necessariò magna erit. Est autem credibile, amplificationi caloris nativi, amplitudinem cordis; pulmonum, laryngis, atque thoracis convenienter sufficere; nisi caput in vitio sit. Ex quo efficitur, ut si caloris nativi abundantia parem obtineat suæ amplificationis opportunitatem in respiratione & efflatione; vox plena, sonora, & magna edatur: quoniam copiosa vocalis materia, validis expressa viribus musculorum thoracis intercostalium, liberum habet exitum per venam arteriosam, fistulasque pulmonis, indèque modulationem accipit in larynge, per musculos duodecim ei voci modulandæ dicatos. Fructuosa est etiam vaporis fumidi exhalatio siue efflatio; non solum ad prolabantis catarrhi propulsionem: sed ad illius quoque iam prolapsi expurgationem. Ac tum tussiculosus aut suspiriosus malè habet, quando vaporis fumidi efflatio, neque prolantis catarrhi appulsus & impetum inhibere, neque prolapsi contumaciam potest radicitus extirpare. Hinc veniunt asthmaticæ orthopnoæ: illinc depascentia ulcera, quæ *πνεύματα* Græci vocant; unde catarrhi effecti, *πνεύματες* nominantur. Sed patefacta respirationis utriusque natura, perspectis etiam partibus, earumque omnium causis; superest ut eius differentias, & cur ita sint, *αἰδιουπτικῶς* explicemus.

Enimuero respiratio omnis naturaliter constituta, quæque vsui necessario convenienter congruentetque respondet; in moderatione & æquabilitate consistit inspirationis & expirationis. Ea moderatio cernitur in mediocritate cuique naturæ & habitui consentanea, rerum earum quibus respiratio patrat. Sed rerum earum quæ in respirando considerari solent, quatuor omnino genera esse reperio; motum, quietem, id quod mouetur, & id quod mouendo ducitur atque educitur. Ergo illa demum respiratio moderata erit, quæ in singulis hominum naturis, prout intensior est aut remissior vsus, mediocritatem ostendit motus, quietis, explicationis, & materiæ ipsius spirabilis; & in qua sani homines nullo modo à se mutati videntur. Hæc sanè est respirationis symmetria, in qua, scilicet, nihil nimis, quæque omni caret excessu atque defectu. Hæc, in libertate inspirandi & expirandi, spiritum ducit ex facili; vaporem excludit: unde efficitur ut voto naturali cordis bene respondeat. Huic respirationi prima deberur laus vitæ hominum conseruandæ. Hæc cæterarum omnium quæ à symmetria deficiunt, veluti canòn est & regula quædam, qua non solum defectionis illius cognitio comparatur; sed etiam restituendæ moderationis amissæ ratio continetur. Ut autem simplex & vnica est symmetria: sic multa defectionum genera esse solent, tum in excessu, tum in defectu. Ac sanè tot esse necesse est, quot sunt ex quibus ipsa respirationis constituitur œconomia. Sunt autem, inspiratio, exspiratio contrariis editæ motibus; proptereaque quiete gemina terminatis. Itaque rerum earum respirationis œconomiam constituentium, singularum gemina erit à symmetria defectionio; vna quidem, plus æquo; altera verò, minus. Velocitas enim aut tarditas motus, à symmetro defectionem ostendit; raritas & frequentia, quietis; magnitudo & paruitas, inspirationis & expirationis; copia & paucitas, materiæ inspirabilis & expirabilis, cum frigore aut calore. Quæ omnia summus medicinæ dictator, paucis expressa literis, feliciter ita complexus est. *Πνέματα σμικρά, μέγαλα, πυκνά, ὀφθαλμὰ ἴστω σμικρά, ἔξω μέγαλα ἴστω μέγαλα, ἔξω σμικρά. τὸ μὲν ἐκπνέον τὸ δὲ κατεπνέον. διπλὴ ἴστω ἐκπνέουσιν ὅς δὲ κατεπνέουσιν. θερμὸν, ψυχρὸν. i. Spiraciones parue, magnæ; magnæ frequentes, raræ; intrò parue, foras magnæ; intrò magnæ, foras parue; producta, offensans; bis intrò reuocata; calida, frigida.* Ergo dyspnœa omnis versatur in magnitudine, aut paruitate; frequentia, aut raritate; velocitate, aut tarditate; calore, aut frigore. Atque ita respiratio omnis in vitio esse dicitur, quando maior, aut minor est; tardior, aut velocior; frequentior, aut tardior; calidior, aut frigidior. Tum illæ defectiones tam in excessu, quàm in defectu, considerari debent; vel in vtraque respirationis parte; vel in alterutra: idque tam simplices, quàm compositæ. Existunt enim quædam foris parue, intus magnæ, & contrà: quædam item magnæ, veloces, atque frequentes; aliæ contrà, parue, raræ, & tardæ. Sunt etiam magnæ & raræ: plurimæ etiam geminatæ, tum inspirando, tum expirando. Sed tempus est ut earum dyspnœarum causas, & quorsum ita fiant appareant, ex nostri authoris præscripto fideliter exponamus.

RESPIRATIO] i. Aëtis inspiratio, vaporisque fumidi exspiratio: sic enim spiritum, pro actu spirandi, interpretandum duximus, quod ei ducendo comparata sit respiratio, proptereaque ipsa causæ finalis nomen sibi adoptet. Quæ nominis ratio frequenter vsurpata legitur in Epidemiis, aphorismis, atque prognosticis. Quinctià à Galeno sic explicatur, cum in prædictis libris, tum in iis quos de dyspnœa scripsit; ut

scripsit; ut nihil necesse sit plurā de spiritus nomine, quorū modis vsurpetur, in hunc locum adferre.

FREQUENS] i. Cuius inspiratio & exspiratio, contrariis editæ motibus, breui quietis geminæ interuallo, & quasi puncto temporis terminatæ, crebrò inuicem subeunt atque succedunt: similiter vt arbores breui diffitæ interuallo, densòque satū consistat. Atque eam loci intercapedinem, eleganti metaphorā, ad temporis interuallum accommodauit; tum hīc, tum in aliis decisionibus iam explicatis, vbi *μακρότερον πνεῦμα* legitur pro spiratione rariore quæ fuerat antè frequentior atque citatior, cum inflammatio cordis præuens esset; cuius vacationem ostendit nunc rarior facta cum libertate instrumentorum, laryngis, pulmonum; atque thoracis. Hippocratis verba sunt hæc. *Πρόσπιπτον δὲ μετὰ τὸ πνεῦμα μακρότερον, καὶ λεπτότερον αἶμα ἐπὶ τὸν δρόμον σημαίνει. i. Facies è tumefcente residens, vox item blandior atque mollior, tum spiritus rarior atque facilior, remissionem postridianam fore denunciat.* Eam proprietatem vocum, in arborum satū densiore aut rariore Theophrastus eleganter secutus est, lusitque illius aucupio festiuè. *Εἰ τὰς φυταῖς τὰς πυκναῖς, μακρὰ τὰ δένδρα· ἐν δὲ τὰς μαλαῖς, πυκνά. i. plantando, arbores densæ, raræ; raræ, densæ.* Quoniam autem hoc loco quæritur de respiratione frequenti, cur ita sit, breui sic habendum; ipsam per se nihil aliud denunciare quàm imparem necessitati commo- ditatem; vt quemadmodum Ascanius sequebatur patrem non passibus æquis: ita cum amplificationi caloris, amplitudo spirationis respondere non potest, eius desiderium frequentia compensetur.

ET PARVA] Quæ sit inchoata, non autem perfectæ explicatione & collectione thoracis ad libe- rē inspirandum & expirandum; nec dignè pro eò ac respirandi vsus exposcit. Est autem paruitas, defe- ctio respirationis à symmetria in quantitatis defectu: quemadmodum frequentia in breuitate quietis, aut etiam penè nulla.

INFLAMMATIONEM ET LABOREM DENUNCIAT] i. Incandescentis æstu cordis ardo- rem, & spirabilium instrumentorum contumaciam, per quam cordi morem non gerunt, neque parem adferunt vsui necessario promptitudinem. Neutra enim difficultas spirandi, alterutrius vitij signum est syllogisticum. Nam neque paruitas, semper dolorem; neque frequentia, semper ardorem ostendit. Am- bæ simul vtriusque vitij consecutariæ sunt; nempe doloris atque ardoris.

PARTIVM SPIRABILIVM] i. Ad verbum, opportunitatem spirandi habentium; cuiusmodi sunt cor in triplici vsu; thorax in mouendo; pulmones in excipiendo; arteria in deducendo. Ac si dice- ret; frequens & parua respiratio denunciat in cordis æstu eius desiderio non responderi, quod instru- menta spirabilia in vitio sunt; thorax à pleuritide; pulmō à peripneumonia; larynx ab angina. Denique; vt paucis absoluiam, quicquid eiusmodi est vt spiritum aditu prohibeat, vaporēque fumidum ad exi- tum citò sollicitet; suspiriosos homines facit. Quod in pituitosa inconsideratè, i. nec iure, nec loco præ- scripta, sic noster præceptor animaduertit. *Sydeatarum, inquit, ac velut de cælo tactarum costarum causa est; quod priusquam dolor quiescerit, pleuritici homines moriuntur: mox enim πνευμαίνται, i. suspiriosi redduntur.* A spi- ritu autem multo & frequenti, i. crebra respiratione, glutinosissimi sputi eruditæ, libertatem meandi intercipit. Et- enim illud ipsum quod inhibetur sputum, & quod ad pulmonum bronchia contumaciter adherescit; & spiritum in- trō duci prohibet, & citò foras excludi cogit. Atque ita vicissim mutuas tradunt operas in perniciem ægri. Etenim sputum inhibitu, & quod subsistit, nec exitum habet; spiritum crebrum facit: crebrior autem factus, glutinosum & contumax reddit sputum, nec finit ipsum inēabile fieri.

AT VERO MAGNA ET RARA] Quæ scilicet opponitur frequenti & paruæ; in qua, inquam; explicatur thorax quantum potis est, ac sine vlla difficultate in omnem dimensionem amplificatur; at- que colligitur ad inspirandum & expirandum: propter libertatem instrumentorum omnium spirabi- lium quæ omni culpa vacant, cum facultatis virtute, & summa spirandi necessitate, ob febrem acutam.

ET RARA] Interuentu longæ quietis inter expirationem modò expressam, & inspirationem mox repetendam: vt par sit expurgationi temperatio pernecessaria in ardore febrili; quod quia hīc locum non habet, cur ita sit, paulò post aperit atque docet.

DEMENTIAM] i. Actionum principum deprauationem, idque vel à ceteri inflammatione; vel à sanguinis multa bile perfusi eò translati suppressione: vnde dementia firmiter fixa & stabilis, cuiusmo- di esse solet phrenitis atque insania. Est autem delirij proprium signum quod tantum in illud cadit, non tamen inseparabile; magna & rara spiratio: ob eam sanè hypothesin, quoniam in summa spirandi ne- cessitate quam febris acuta inuexit, & pari spirabilium instrumentorum libertate, quam magnitudo o- stendit; sola voluntas in causa est quamobrem talis respiratio rara sit, quæ debuit esse frequēs. Est enim tum æger sui negligens neque memor, & cuius voluntas non antè erigit se ad functionem, quàm acrior sensio excitata fuerit in phantasia per incrementum necessitatis: quod certius est in rusticis hominibus qui stupent attoniti visu tabulæ politissima arte depictæ, quàm dum hiant ore magnæque animi con- tentione intuentur, non antè respirāt, quàm nimia oppressionē propemodum suffocati ad se redierint. Eadem ratione phrenitici *βραχυπνοὶ* dicuntur, i. parum & rarò bibentes, ob deprauatum communem sensum; ex quo efficitur vt rei molestæ sensio non excitetur in τῇ φαντασίᾳ nisi rarò admodum, cum sci- licet per accessionem causæ sitiferæ, phantasia redditur ἀδόκητος. Huiusmodi autem deliria quæ posi- ta sunt in τῇ ἀγαθῇ Cīa, circa res necessarias versari dicuntur, de quibus eam prognosin iam explicauimus.

Quæ circa res necessarias versantur deliria, pessima; indeque si ingrauescant, funesta. Talis fuit exitus Philisici, qui sexto die interit, de quo summus artifex posteris artificibus illud meditandum reliquit. *Τὸ πρὸς τὸν ἕκτον τὸ πνεῦμα, ὡς αἰσθάνομαι ἀκαλουμένῳ, ἀραίον, μέγα. i. Hinc non desit spiritus rarus, magnus, velut reuocato, duci.* Idem legitur de Sileno. Idem de Dromedæ vxore. Nam in Dealcis vxore, magna & rara spiratio suc- cessionem habuit paruæ & raræ, quam *βραχυπνῶν* vocat. Omnia autem quæ circa res necessarias versan-

Coac. 1. cap. 5. lib. 1.

Coac. 1. cap. 5. lib. 1.

cap. 8. lib. 1. de causis plant.

101. Coac. 1. lib.

promiss. 8. lib. 1.

103. Coac. 1. lib. 1. & 11. Epid.

6.2. lib.

tur deliria, enunciationem causæ catholicam habent in hoc aphorismo. Οὐδὲν πνεύματος ἢ τῶ σπύματος, πᾶσι τοῖς πόνον μὴ ἀδύνατον πνεύματι ἢ γὰρ μὴ τοῖσι. i. Qui aliqua laborantes parte corporis, sæpe laborem non sentiunt; his mens laborat.

101. Coac.
1. lib.

AVT CONVULSIONEM] Non quidem ipsa per se, nisi per hypothesein iam propositam, cum deliria circa res necessarias ingrauescunt, cuiusmodi est illa. Phrenitici parum & raro bibentes, idque cum strepitu; contremiscunt, aut conuelluntur. Etenim tum phrenitici contremiscunt, quando id quod mouet & quod mouetur, mutuis certant imperiis, vicissitudine motuum iussorum & iniussorum. Conuelluntur autem motu iniussu musculorum ad sua principia: quod symptoma est alienationis à vehementi alteratione, per nimiam siccitatem; proptereaque signum mortis iamina futura. Huc spectat & illud. Phrenitici sputatores fanatici; etiá mne tremuli: Tum illud. Deliria paulisper ferocia; mox erunt immanissima: atque futuras conuulsiones prænunciant.

59. Coac.
1. lib.

2 Ψυχρὸν μὲν θανάσιμον θανάσιμον δὲ καὶ πυρετῶδες, καὶ λυγνῶδες πνεῦμα· ἥσων δὲ τῷ ψυχρῷ.

Ac frigidus quidem spiritus est lethalis: lethalis est etiam æstuosus & fumidus; minùs tamen quàm frigidus.

V T. M A G N A & rara spiratio certissimum est delirij argumentum: sic parua & rara interitus iamina futuri. Ac ferè omnes qui aliquantisper magnum & raro spirarunt, eò deueniunt; vt non nisi parua & rara spiratione vti possint: quoniam ex rei pernecessariæ omissione, naturæque, vt ita dicam, defraudatione, cum accessione & incremento causarum morbificarum, vires collabuntur & languent effæta. Quod vxori Dealcis contigisse legimus, quæ cum dies aliquot morbi exegisset in magna & rara spiratione, cum nugarum garrulitate, vicissim reddita fuit βραχύπνοος, remissa phrenitide ac vicissitudinem habuit magnæ & parvæ spirationis; tum garrulitatis atque silentij: ac tandem βραχύπνοος, καὶ ἀφανὲς vigesimopræmo die interiit. Nam Pythion secundo die fuit βραχύπνοος, ἀψαυδὲς, καὶ ἀφανὲς; paulò post edidit πνεῦμα μινυθῶδες, respirationem minutulam, quæ breui interitus finem habuit. Ne longum faciam.

S P I R I T V S Q V I D E M F R I G I D V S] i. Cuius appulsu per expirationem, frigoris sensio excitatur medico qui proximè abest ab ægro. Talis spiritus consecrariam habet respirationem parua & raram, vt rectè in prognostico annotauit Galenus; ac parua quidem, nullo penè spirandi vsu necessario, neruorum & musculorum vim ad functionem excitante; raram verò, propter fuliginis paucitatem quæ cum potentia animalis infirmitate coniuncta, paulò post consecutionem adfert τῆς ἀφανίας μὲν ἐκλύσεως.

L E T H A L I S] Dilucidius sic in prognost. *Frigidus autem per os & nares expiratus; lethalis admodum, ἥδη*, hoc est, iam inde à causis prægressis. Ac si diceret; à febrili ardore quo ipsum cor conflagrauit, extincta penè viuacitas perennitatem amplius non habet caloris viuifici, in cuius extinctione mortis natura consistit. Qua de re illud à nobis iam explicatum est. *Deliria in spiratione minutula & sudatiuncula, citam mortem denunciant.* Non enim à minutula respiratione, delirij significatio fit; sicut à magna & rara: sed cum ea spiratione coniunctum sæpe apparet ex inueteratione phrenitidis in cerebro stabulantis. Denique quod initio posui, parua & rara spiratio, siue minutula atque frigida, magnæ & raræ consecraria est; per alienationem quam alteratio magna inuexit: quemadmodum inde venit pro clamore, silentium; pro iactatione, quies & ἥρεσις; pro artuum euibratione, levis tremor; pro vigiliis, coma & cataphora veteriosa. Est autem lethalis hæc respiratio, tum propter irreparabilem caloris natiui extinctionem; tum quia omnis intemperies ab ardore frigida est insanabilis. Ac sanè tam certa est mortis præsentio ex frigido spiritu, vt nulla spes amplius affulgere posse videatur: quamuis denuo incallescant ægroti. Tæstis est illa sententia. *In lethalibus signis est ardens qui è cute spiritus expirat, frigidò priùs nare excluso.*

71. Coac.
1. lib.part. 4.
6. Epid.aph. 2. scd. 2.
6. Epid.
proth. 60.
1. 2. 3.

69. 1. lib.

L E T H A L I S E S T E T I A M F U M I D A E T A E S T V A N S V A P O R A T I O] Talis exspiratio fundit excrementum καυσθῶδες, vel καυστικόν, quod etiam πνεῦμα θολερὸν nominauit lib. de humoribus: quamuis Galenus neget hoc esse Hippocratis. Ac tale excrementum καυσθῶδες, ostendit efflationem potius, quàm expirationem: propterata scilicet musculorum contentione ad expurgationem fuliginosi excrementi, quod suffocationis metum adfert nimia abundantia, quam parit impuritas cordis, atque pulmonum æstu prægrandi incandescientium. Qua de re illud extat. *Qui dormiendo efflant, malo sunt loco.* Quod sequitur, M I N V S T A M E N Q V A M F R I G I D V S] Ostendit alterationem quantumuis maximam, longius abesse ab interitu, quàm alienationem quæ iam adest, quæque præsens est in parua, rara, minutula, seu frigida respiratione.

3 Καὶ τὸ μέγα ἔξω πνεῦμα (φ), μικρὸν δὲ εἶσω καὶ τὸ μικρὸν ἔξω, μέγα δὲ εἶσω κάκιστον δὴ, καὶ πλησίον θανάτου.

Tum magnus

Tum magnus foras efflatus, intrò parvus; & contrà, foras parvus, intrò magnus; pessimus est sanè, & morti propinquus.

EXPLICATÆ sunt quatuor differentiæ spirationis difficulter susceptæ. Sunt autem; parva frequens; magna rara; parva rara; frequens & magna. Earum omnium patefacta ratio est. Nunc de inæqualitate in vnica respiratione dicendum. Huiusmodi prima occurrit.

FORAS MAGNA, INTRO PARVA] Causa in promptu est: quoniam ex nimia fuliginis abundantia, expirationis maior necessitas incidit, quàm inspirationis; eique morem gerunt muscoli qui expirando præsumunt, contumacioribus fortasse iis quos inspirandi gratia quaternos, vtrique thoracis parte, natura collocavit. Est autem periculosa hæc respiratio: quoniam non minùs verendum de suffocatione, quàm de incendio natiuum calorem & humidum primigenium exhaustiente, si conuenienter non temperetur.

FORAS PARVA] Vaporis fumidi paucitate, & expirabilium instrumentorum vitio.

INTRO MAGNA] Ob summam inspirandi necessitatem, ab ardore febrili, & inspirabilium musculorum omni culpa vacantium libertatem. Contraria enim contrariorum consequentia esse solent.

Talis autem respiratio qua spiritus ducitur intrò magnus, foras parvus, PESSIMA EST SANE, ET MORTI PROPINQUA] Propter incredibilem spirandi necessitatem ex ardore quo cor ipsum conflagrat, vnde frequens repetita inspiratio, quantumvis magna, voto ipsius cordis respondere non potest, ob eamque causam, inchoatam expirationem intercipit anticipando, idque fortassis etiam propter musculorum expirabilium contumaciam, vnde syntimoria causarum mutuas operas in perniciem ægri tradentium; videlicet, ardoris vitalem spiritum & nectar viuificum exhaustientis; tum suffocationis ex nimia fuliginis abundantia quæ expirationem non habet. Quamuis autem causæ illæ sint plene mortiferæ: tamen non tam citò interitum properare faciunt, quàm parua & rara spiratio, in qua spiritus frigidi appulsus percipitur, exitum per os & nares habentis. Est enim iam verè illud positum, non esse tam citam mortem alterationis quàm alienationis præsentis: nisi quis fortasse excusationem adferat suffocationis quæ hîc in metu est, vnde cita mors venit.

40 4 Καὶ τὸ ἐκλεῖνον, καὶ κατεπείζον, καὶ ἀμαυρὸν, καὶ διπλῇ εἶσω ἐπα-
ναλκμοῖς, οἷ] Πρωτόνιοι.

Quinetiam tarda, velox, obscura, duplex intrò reuocatio; qualis cernitur in ijs qui super inspirant.

SPIRATIO TARDA ET PROPERATA] Quæ cernitur in lenta inspiratione, & cita expiratione; ob eam sanè causam, summa periculi habet omnia, quòd in officio multum laborant muscoli inspirabiles, nec pares necessitati præstò se adhibent, vbi vel ipsa celeritas in desiderio mora est propter potentiam animalis infirmitatem à cerebri exolutione natam. Nam citæ expirationis causa est expirabilium musculorum contentio, suffocationis metu, quibus auxiliares manus adferunt intercostales; vt veluti concussio quædam sit thoracis studentis excutere id quod sibi molestum est. Omnes autem partes officiales, maiore contentione excitantur ad exclusionem rei molestæ, quàm ad comparationem necessariæ.

OBSCURA] Τὸ ἀμαυρὸν, ἢ ἀμαυρίσις, ἢ καὶ ἀμαύρωσις, symptoma proprium est visionis effactæ, vbi nulla caligo est, nulla allucinatio, sed hebetudo simplex quæ nullam in hebescentibus concretionem ostendit humoris alieni, iis qui oculos intuentur: sed tantum profligati splendoris notas aperit in oculis velut emortuis, cuiusmodi esse solent decrepitorum & iamiam moribundorum senum. Hoc igitur 50 ed spectat vt doceat, obscuritatis huius causam non aliò referendam esse quàm ad exolutionem vitalis spiritus; & extinctionem caloris natiui: quemadmodum oculorum ἀμαύρωσις venit ab exhausto humoris crystallini & spiritus visifici, atque splendoris oculorum proprii extinctione, quam siccitas fecit à febrili ardore. Ac tantum interest inter hanc respirationem & πνῆμα θολερὸν, quantum inter hebetudinem & allucinationem. Huius respirationis exempla eduntur ad tempus in verè hysteris, quæ huiusmodi sunt dissipato respirationis vsu, non autem impeditis spirandi instrumentis.

DUPLEX INTRO REVOCATIO] Hæc difficultas spirandi cernitur in iis quibus ipsa in faucibus eliditur, & vnica inspiratione spiritum bis terve recipiunt, vt pueris qui vapularunt. Conuulsionem autem significat. Contrario verò modo eduntur voces quæ faucibus hærent interruptæ, in quibus materia vocalis quasi conglomerata subsistit, ex prolapsu catarrhi ferini ipsi materiæ occurrentis. Ceterum hæc difficultas spirandi nominatur πνῆμα παροσμῶν, aphor. 68. lib. 4. πνῆμα ὡς πρὸ ἀνακαλύ-
60 μων, hist. 1. 1. Epidem. πνῆμα ἀντασσωμένον, διπλῇ εἶσω ἐπαναλκμοῖς. 6. Epidem. πνῆμα παροσμῶν ἐν τῇ ἀν-
φρῶν, 4. acut.

Εὐπνοία δὲ ἐν πᾶσιν ὁκόσται ἐν πυρετῷ ὀξείῃ, καὶ ἐν τεσσάρων ἡμέρῃσι
κείνεται· μέγαλιν ἐχέροπὴν ἐς σωτηρίαν.

Spiratio autem libera in omnibus qua cum febre acuta sunt, & in ijs etiam qua quadraginta diebus indicantur; praeclare ad salutem apparet & facit.

BONVS philosophus demonstrandi peritus, optimus idem medicus, quem penes est ἡ ἐπιμέλεια τῆς ὥρας, εἰς τὴν καὶ φύσιν, i. redintegratio eorum qua à natura excidere (ad quem veluti scopum omnia referuntur) quae pertinent ad bene & convenienter cuique medendum) posteaquam difficilis respirationis omnes differentias explicauit, quas accuratè pertractauit in defectione à symmetria rerum omnium respirationis oeconomiam constituentium; tum autem, cur ira, & quorsum fiant appareantve, causas aperuit: nunc spirationis liberæ commoda quibus utimur ad conquirendam valetudinem in morbis acutis, breuiter feliciterque commemorat.

SPIRATIO AUTEM LIBERA] Quæ votò cordis responder, prout intensior aut remissior est spirandi vsus in febre acuta, idq; sine offensione cæterarum causarum; spirabilem instrumentorū dico, & voluntatis. Non enim potis est cōplecti animo πῶς εὐπνοίαν quæ cernitur in moderatione inspirationis & expirationis cum mediocritate quietis & motus, quæ nusquam locum habet in febre acuta.

IN OMNIBVS QVÆ CVM ACVTA FEBRE SVNT] i. In febribus tam essentialibus, quàm symptomatiscis.


ET IN IIS ETIAM QVÆ INTRA DIEM QVADRAGESIMVM INDICANTVR] Cuiusmodi sunt febres quæ, ὡς μετεωρίσταις, retinent acutarum nomen, cuius naturam amiserant ex inchoata crisi, vel irritò erethismo: propterea quæ periodorum quaternariarum in septenarias mutationem habuerunt à vigesimo die ad quadragimum vsque.

Coac. 1.
cap. 5. 2.

PRÆCLARE AD SALVTEM APPARET ET FACIT] Apparet quidem, signo libertatis causarum spirabilem, & salutiferæ causæ, quæ mox futuram salutem ostendit: qualis est illa. Facies; ἐν τῇ μετὰ τὴν κρίσιν residens; vox item blandior atque mollior, tum spiritus rarior atque faciliior qui fuerat ante frequentior atque minor; remissionem postridianam fore denunciant. Præclare autem facit, nō solum tēperatione & expurgatione febrilis ardoris qui focum habet in corde; sed etiam instauratione nectaris viuifici perennitatem à corde habentis, cuius appulsu partium solidarum viuacitas recreatur atque reficitur contra calamitosam vim febris, unde absorbitur atque quodammodo liquitur.

DE CERVICĒ.

CAP. X.



ΡΑΧΗΛΟΣ σκληρὸς καὶ ἐπώδυνος, καὶ χυύων σπύ-
δεσις, καὶ φλεβῶν σφαγνίδων παλμὸς ἰσχυρὸς, καὶ τενόντων
ζώπαισις· ὀλέθριον.

I Cervicis duritas & dolor praegrandis, maxillarum item coarctatio, venarumque iugularium pulsus fortis, unaque chordearum contentio; mortifera sunt haec.

NUNC DE ceruice dicendum, cuius mala in omni febre grauissima esse solent, si nulla vis in musculorum genus inciderit: maximè autem quando phrenitis in metu est. Omnium verò terrificorum ceruicis malorum in causa est, vel cerebri propagatio, vel excursus qui ducitur è lumbis. Nam quæ intra ceruicem mala accidunt, laryngis aut pharyngis, i. faucium aut ipsius gutturis propria sunt; cuiusmodi est angina. Et quæ vertebrarum luxatarum symptomata sunt, & λόρδωσις faciunt, aut κύφωσις, aut etiam σκολίωσις. Hic autem ceruicis totius aspectabile & tractabile malum ingens proponitur, quod & doloris acerbitate, & officij necessarii impedimento, & partium nobilissimarum sympathia, symptomatumque numero, mortiferam calamitatem ostendit. Est autem huiusmodi.

CERVICIS DVRTAS] In qua ceruix obrigitur ex fluxione nara humoris coacti, qui vel organo, vel decubitu eò confluit, omnemque ceruici efficiendi vim adimit, tum in proprio motu, tum in communicatione officij.

ET DOLOR PRÆGRANDIS] Qui vera inflammationis symptomaticus est cum duritate cōiunctus: quemadmodum in duritate hypochondrij dolorifica loco dicitur. Est enim vera inflammatio, iuxta recentiorum placitum, tumor contra naturam ex sanguinis affluxu coortus, cum rubore, calore,

calore, pulsu, renixu, & dolore coniunctus.

MAXILLARVM ITEM COARCTATIO] i. Iniussa firmaque inferioris maxillæ cum superiore adhæsiō, per conuulsionem temporalium musculorum, quam facit expressio sanguinis multa bile perfusi, è ingularibus arteriis, & cervicalibus venis in angustiores illuc productas. Sic enim prorepit materia parotidum ad maxillas, malas, & genas; vt facies ipsa nihil aliud sit quàm dolorificum tuber. Quæ de re illud extat iam demonstratum. *Parotides rubra, exacti iam morbi supersites; signa sunt erysipelatis in facie nascituri.*

Coac. 1.
cap. 4. 2.

VENARVMQVE IUGULARIVM PVLVSVS FORTIS] i. Aspectabilis medico, & ægro permolestus, ex dilatatione extraordinaria venarum, quæ pro arteriis vsurpantur. Atque illa dilatatio non est consecraria cordis micantis, sed pléthoræ particularis, vel inflammatarum partium in quibus illæ micant.

VNAQVE CHORDARVM CONTENTIO] Non quidem musculorum tenuium, chorda, in medio progressu, distinctorum, qui à styloide apophysi feruntur in maxillam inferiorem, aperiendi causa: sed fortissimorum tédinum crotaphitarum, qui subter zygomatic inferuntur in apophysin coronoidem maxillæ inferioris.

MORTIFERA SVNT HÆC] Doloris acerbitate, nobilium partium sympathia, officij necessarii impedimento: tum quia cum opisthorono rigor necat; tum quia muscoli crotaphitæ ἀποσπόμενοι καὶ ἐκτεταμένοι ὡς φόνον, i. alterati & intenti contra naturam, à trōmate quidem sunt καρώδεις, ab inflammatione verò phrenitici; ac tantorum malorum accessione homini necando intra decimum diem satis sunt, lib. 2. καὶ ἐξ ὧν. Vide lib. 11. de vsu partium.

2 Ταὲν φάρυγι ἰσχυρὴ ἀλγήματα πινυώδεα ἀπὸ κεφαλῆς ἀλγηδόνος ὁρμώμενα· ὀλέθρια. *malè ἰσχυρῶς. al. αὐτομάτως.*

Qui cum aequalitate faucium dolorifici strangulatus à dolore capitis concitantur; mortiferi.

30 VT RERV omnium quas ad vitæ conseruationem Deus parauit, nihil est melius, nihil viuificum magis, nec magis expetendum, quàm liberalis & libera respiratio: ita nihil æquè mortiferum atque strangulatio ipsa, quæ omnium, penè dixerim, funestorum symptomatum proximè abest à morte. Huic mortiferam vim non minorem tribuit summus præceptor, quàm forti apoplexiæ. Strangulantium autem causarum, quas Græci κινάχας vocant, vt omittam πῆλα ὑστερικῶν quæ fugax est, quæq; opinionem tantum facit strangulatus vnde nomen habet; strangulantium, inquam, causarum tria reperio genera, vnum est illaqueatio; alterum, inflammatio; tertium, dentis luxatio. De illaqueatione notum est illud. *illaqueati exoluti, nec dum mortui, ad vitam non redeunt si os spumat.* Dentis luxati ratio (est autem ille dens, apophysis vertebræ secundæ ceruicis, quæ cum prima vertebra valido ligamento cōnectitur) dentis igitur luxati ratio & consecraria eius symptomata explicantur lib. 2. καὶ ἐκ τούτου. Hæc autem decisio inflammationis momenta continet, atque cynanchicæ huius causæ magnitudinem in perenni generatione, loco, symptomatumque vehementia nobis examinandam proponit. Omnia autem prædicta strangulantium causarum genera, nominantur cynanchica, quod cynanchen illa faciant, i. caninam strangulationem, in qua, more canum, lingua exeritur, similiter vt illis cum difficulter spirant. His ita constitutis.

40 QVÆ CVM AEQUALITATE FAUCIVM] Sic enim expressi ταὲν φάρυγι ἰσχυρῶς. Huiusmodi autem sunt fauces quæ carent omni rubore, calore, pulsu, renixu; quæ symptomata sunt inflammationis propria. Ac si diceret; si fauces omnis tumoris atque ruboris expertes appareant, quod in prognostico de angina scripsit, quæ nihil aspectabile, nihil tractabile ostendit neque in ceruice, neque in faucibus, ipsa verò abdita & occulta, summam doloris acerbiter, summamque difficultatem spirandi parit, 50 ὁ ὀρθόπνοιος Græci vocant, in qua non nisi recta ceruice spiritus duci potest. Significat autem φάρυγξ, amplitudinem oris quæ cernitur inter gulam & guttur, cui adiectum in genere fœminino ἰσχυρῶς pro ἰσχυρῶς congruenter adiunximus, ex veterum emendatione Galenique ipsius.

proth. 54. Ca.
& 12. f. 3. 1.

3 Αἰτραχίλας, καὶ μέλα φρονὺς ψύξεις δοκέεσθαι, καὶ ὅλα δὴ τῶ σώματος· ἀπασμώδεις· ἐν τούτοις κεμνωδεις ἐρήσεις.

60 *Cervicis & dorsi perfrisiones falsò credite; totiusque adeo corporis; sunt conuulsificæ: in his farinaceæ mictiones.*

Huius prognosæ explicatio repetenda ex comment. ad 88. 1. lib. Legitur autem sic. *Qui cum feroci perturbatione somno excussus, è potestate sui exeunt; gravissimum habent malum, & conuulsificum; idque cum aliis, tum si prorumpant sudores. Conuulsificæ sunt etiam cervicis & dorsi falsò credite perfrisiones, totiusque adeo*

corporis; ac tum urinae spumantes. Hic melius tamen diuisa est, ut in prorrhethico, quam illic coniuncta.

ERGO. CERVICIS ET DORSI FALSO CREDITAE PERFRIXIONES] Quoniam eiusmodi sunt, non quidem à paupertate caloris natui, vel eius retractione, ob viscera incedio conflagrantia, nec verò materiae frigidiore appulsu partes illae perfrigescent: sed expressione symptomatica bilis efferae, è venis scilicet in musculosum genus acerrimi sensus, ubi sensationem excitat suae feritatis & actionis, eaque sensio rigorem ciet concussione partium stimularum ad expurgationem materiae; quae tamen calida est generatione & corruptione: tamen opinionem facit perfrictionis in parte nervosa, ob eamque causam sensio illa sequitur magis naturam suscipientis causae quam efficientis: accedente etiam caloris natui afflictione ex rei contrariae occursu laborantis.

PERFRIXIONES] Quae & numero malae sunt: quia crebro incidunt, iuxta illud, *si rigor crebro incidat*. Deinde quia significatae non sunt, urinae pepasmo ad tempus; & suppressione illius, ad speciem crisis. Tum quia vires effatae languent, ut neque tam crebras concussiones perferre possint, neque ad vacationem liberalem sufficere. Ergo perfrictiones illae falso creditae & frustra citatae, translationem faciunt morbificae materiae ad diaphragma & caput.

TOTIVSQUE ADEO CORPORIS] Hic falsam opinionem frigoris pertinere ad vniuersum corpus Galenus ex veterum sententia auctor est: quia non est verisimile, inquit, vniuersum corpus perfrigerari; immo non potius esse ait: propterea quod illud, *δυσκείσαι*, rectè appositum fuisse. Sed velim ut scrupulum mihi eximat quem ipsemet, scripto suo, iniecit, cuius verba sunt haec. *Cum duplex sit perfrigeratio, vniuersi corporis una, altera extimorum; peior est illa vniuersi.* Maneat igitur, quomodo à nobis distincta est, propositio.

CONVULSIFICAE] Quoniam huiusmodi perfrictiones falso creditae, frustra oboratae, cum prius oriundae sint è vasis, tandem symptomaticae fiunt inflammatae spinalis medullae, ac membranarum eius. IN HIS FARINACEAE MITIONES] Melius in prorrh. *αφρώδες*, quam lectionem probat Galenus: quoniam siue sint huiusmodi à colliquatione; siue à flatulenti spiritus perturbatione; utrovis modo, magnas praese ferunt necessitates conuulsificas.

4 Οἷσι καὶ φάρυγγα ἐρεθισμοὶ ὀπιμνέως τὰ ὅτι οἷς ἐφάρμακα (ἐρεθίζεται, ἢ ἀπολαπύσσεται.)

Irritamenta faucium satis molesta; parotidas eructant, aut aquant parti obfessa.

OI EPEΘISMOTI dicuntur proritationes quas inferunt τὰ ἐρεθιστικά. Sunt autem τὰ ἐρεθιστικά quae veniunt in offensionem & molestiam, vel vniuersi corporis, vel partium eius quarundam; idque ὡς ἐξ ὧν, vel ὡς ὅτι ἐρεθίζων, i. intus vel extrinsecus. Τὰ ἐξ ὧν sunt diæta, spiritus, pharmaca. Ac spiritus quidem, ut tempestas aquilonia, horrifera, tussifica, & rhagadibus foeta. Diæta autem, victus ratione, & vitæ instituto; vinum acidum, pyra acerbæ: denique fortes cibi & fortia vina, quae perturbationem adferunt iis qui calidiore sunt aluo. De pharmacis autem notum est illud, *τὰ κεκλιμένα, καὶ τὰ κεκεκλιμένα ὀπίσσω, μηδὲ κινεῖν, μηδὲ γεωποποιεῖν; μηδὲ φαρμακεῖν, μηδὲ ἀλλοιοῖν ἐρεθισμοῖσι χεῖροισι· ἀλλ' ἑλκεῖν, i. quae indicantur, et indicata sunt purper; illa mouere non decet, nec innouare, aut pharmacia, aut proritatione alia; sed relinquenda.* Huiusmodi sunt omnia quaecunque foris & intus, abradendo, mordendo & exasperando molesta sunt. Sed ἐρεθισμοὶ qui veniunt ὡς ἐκ ἐνόντων, sunt, tussis ferina, itémque siccae leuiter irritantes, lumbrici, tormina, pruritibus, & quae sunt eiusmodi.

ERGO. IRRITAMENTA FAUCIUM] Quae molestiam patiuntur ρεύματος ἢ σπασίματος ἢ ὀρίσματος, i. fluxionis consistentis aut concitatae; ac consistentis quidem, ut phlegmones, aut erysipelatis; concitatae autem, ut fluxionis tussiferæ.

SATIS MOLESTA] Id enim significat, ὀπιμνέως, quod, auctore Galeno, medium locum obrinet inter symptomata spei plena, & illa quae, in spe exigua, metu nos terrent: sicut homo ὀπιμνέως nominatur in cuius vitæ & moribus cernitur verus illud quod admodum scitum est. Ne quid nimis. Ad eam veluti normam examinauimus illud iam explicatum. Εν τοῖσι φρενιχαῖσι, ἐν δὲ χεῖρσι τὰ ὀπιμνέως, &c. Ergo, si faucium proritatio ex rheumate consistente, nec ita sit magna, ut doloris acerbitate veræ anginae non cedat, ac talem adferat in deglutiendo angustiam, qualem in muliere anginosa legimus; nec ita parua, ut leuem pariat deglutiendi molestiam, cum leui dolore qui somnos non adimit. Aut si proritationis causa sit fluxio concitata; tussis inde nata, nec tam sit mitis, quae nihil aut parum extussiat; nec tam ferina, ut peccus ipsum tussiendo rumpatur.

PAROTIDAS] Sic enim τὰ παρ' οἷς ἐπάρματα, in ea significatione passim leguntur.

ERUCTANT] In Græco hoc non legitur, neque alterum verbum, ADÆQUANT: sed tamen alterutrum necessariam constructionem ostendimus, ex distinctione causarum fauces non leuiter irritantium. Ergo, in proritatione satis molesta faucium à rheumate consistente, parotidas nasci possunt, opportunitate glandulae quae iacer ad aures, faucibusque adiacet; tum riuiulorum sanguinis numerosa propagine, unde partes illae affluxus & refluxus incommoda vicissim facile experiuntur. Assurgunt, tumore contra naturam, qui sequitur naturam efficientis causae. Pertinet ad eam parotidum notationem aphorismus

aphorismus ille. Οταν φάρυγξ τοσέ, καὶ τὰ φύματα ἐν τῇ στόματι ἐκφυέται, i. Vbi guttur dolet, papulae per corpus erumpunt. Nos autem consulto parotidum antecedentem causam per illud verbum, eructant; expressimus: quoniam omnis parotidum generatio fit per τανσίωσιν ἢ ἐρευνῆν: cuius opinionis sequestrum habeo præceptorum cum alibi passim, tum verò in illa prognosi. Εἰ κεφαλὴ καὶ κόμα καὶ κόφωσις, παρ' οἷς π' ἐξερεύεται, i. In prot. 75.5.3.1.

VEL ADEQUANT PARTI OBSESSÆ] Hoc pertinet ad eam pruritum seu creberrimum qui fit appulsu ρεύματος ὁρμωμένου ex parotidibus ad fauces ipsas. Est enim affluxus & refluxus, diadoches & palindromes, eadem planè conditio, per eandem, veluti aquæ ductus, per quos affluit & refluit materia. Sic enim parotidas posse sanari, & ad equalitatem reduci circumiacetium partium testatur prognosilla. Τὰ παρ' οἷς λαπίωσι βηχία μετὰ πνευσμῶν ἰόντα, i. Parotidas adequat iusticula cum ptyelismo. Nam quæ materia parotidum per naturalem meatum decrat in amplitudinem oris, ptyelismum facit; concussionem coorta pectoris ipsam conantis excutere; atque hic ptyelismus rabi & inflammationi locum tollit: quænam profecto causa esset parotidum materia, nisi ea liberam anacatharsin haberet.

Coac. 6. cap. 4.2. & 74. prot. 1.3.1.

5 Φάρυγξ ἐπώδυνος, ἰσμή, καὶ δυσφορὴς ὁλέθριον ὀξέως.

10 *Fauces dolorifica multum, æquales, cum iactatione; crudeliter & citò mortifera.*

Hic duo sunt quæ non cohererent cum veritate rei propositæ: quia reapse non possunt existeret, ut planè videantur συναδύατα καὶ ἀσύστατα. Est enim ἀδύατον, doloris acerbiteriam esse in faucibus quæ sunt æquales. Est quoque illud ἀπρον, faucium significationem conuertere in laryngem. Etenim neque hæc laevis est in dolorifico strangulatu; & eius inæqualitas non est aspectabilis medico: ut ridiculum sit æqualitatem referre ad guttur, quæ in angina non est, quam scripsit Hippocrates μηδὲν ἐκδηλον ποιεῖν. i. nihil aspectabile, nihil tractabile secum habere, nec aliud ad cognitionem sui adferre & exhibere, præter intolerabilem vim doloris & orthopnoeam. Quæ cum ita sint, non est cur otio abutamur & literis ita explicatione huius prognoseos, quæ ira legi debet.

10 Τὰ ἀλγήματι πνιγώδεια ἐν φάρυγι ἰσμή ὁλέθρια ὀξέως.

Cuius ratio reperenda ex comment. ad 2. huius cap. Pertinet autem ad primam speciem anginae, descriptam lib. 3. prognost.

6 Οἷσι πνῶμα ἀνέλκεται, καὶ φωνὴ πνιγώδης, σπόνδυλος ἐγκλίνεται. Τυτέοισιν ὅτι τῇσι τελευτήσιν, οἷς συσπῶνός τις πνός, τὸ πνῶμα γίνεται.

10 *Si cui cum spiratione sublimi strangulabunda vox editur; vertebra intro luxata est: huic vitā mox finituro, veluti conuulsiva fit respiratio.*

ET HUIUS quoque emendari sic debet ὑπερον ὑπερπρον, ac velut hypallage quædam quæ iudicium medici omne peruertit. Non enim quia sublimis est respiratio, & strangulabunda vox; ideo luxata est intus vertebra: sed quia luxata vertebra est, ideo sublimis respiratio.

Sic igitur melius.

10 *Si cui vertebra intro luxata est, inde cum spiratione sublimi, strangulabunda vox editur: atque huic vitā mox finituro, veluti conuulsiva fit respiratio.*

7 Φάρυγξ τρηχυδεῖσα ἐπ' ὀλίγον, καὶ κοιλίη (διαβορβορέζουσα) deficiit. κενῶς ὕψανασσάσει, καὶ μετώπου ἀλγήματα, ψιλαφώδεις (κοπιώδεις) defuerit. ἐν στήμασι καὶ ἱμαλίοις ὀδυώδεις: τὰ ἐκ τούτων αὐξανόμενα, δύσκολα.

Fauces paulisper exasperate, aluiisque obmurmurans inanibus desidendi conatibus, ac frontis dolores, palpatores laboriosi, tum stragulas & vestes agrè ferentes; quacunque augescunt, difficilia sunt.

T A M E T S I hæc prognos̃is complexionem & syndromen habere videtur symptomatū & signorum quæ ab eodem fonte non manant, nec sunt eiusdem generis: tamen si quis attentè consideret, eiusmodi sanè sunt, vt ab iisdem nata principiis, prognos̃eas incundæ rationem contineant.

Ergo. FAUCES EXASPERATÆ] Quorum asperitas inflammationis consecutaria est, quæ mutationem attulit coloris, characteris & molis, ac læuitatis denique & æqualitatis pristinæ, in tumore, robore, pulsu, renixu, dolore, cuius acerbitate non cedunt gutturali anginæ, si inflammatio magna sit.

P A V L I S P E R] Vt inflammatio sit fugax, nec stabilis; quòd eius materia temperamento calida, substantia tenuis, qualitate acris, feritate sua & orgasmo ἀσήμεως & ἀκρίτως excursum fecerit ad cerebrum: sicut translationem sæpe habet è faucibus in laryngē, eodēmq; die anginosum iugulat quo in laryngem cursum inflexit. Notanda autem significatio τὸ ἐπ' ὀλίγον, quod per aduerbium temporis verti debet, non quantitatis; vt fauces dicantur paulisper exasperatæ, non parum. Atque in hac significatione scriptum legitur in illa prognos̃i. Αἱ ἐπ' ὀλίγον δραστήιαι καὶ ἀκρόβουτοι ἡμεῖς εἰσιν. Eodem spectat & illa. Τὰ ἐπ' ὀλίγον δραστήως ἀσπερόντα ῥιζαρχολαῖα.

A L V S Q V E O B M V R M V R A N S] In hac prognos̃i nulla mētio τῶν βορβορυγμῶν: sed in prorrhethico facta est, eamque scripturam hīc retinendam duximus: quoniam borborygmus arguit meteorisum hypochondrij, quem recens oborta, non hēctica causa inuexit, sine vlla suspitione inflammationis hypochondriacæ. Est autem murmur illud intestinorum doloris experts, quod facit spiritus strepitum non magno, neque multo, cum humore nonnullo infra detrusus.

I N A N I B V S D E S I D E N D I C O N A T I B V S] Peristaltico intestinorum motu, naturali contrario, per sympathiam phrenitidis; tum propter translationem bilis ad cerebrum, cuius vacuitate, intestina sunt in excernendo pigra, ducūtūque ægrè facibus & excrementis biliosæ tincturæ expertibus; teste illa prognos̃i. Εἰ φρενιτικαὶ λευκὴ διαχώρησις, κακόν, i. Phreniticis alba deiectio, mala. Sed irriti conatus alui in borborygmo; signa sunt & causæ phreniticæ, & affectionis ipsius.

A C F R O N T I S D O L O R E S] Quos facit translatio & excursus sanguinis multa bile perfusi, quæ non antè quiescit, quàm ad extimas venarum oras quæ sunt in fronte peruenerit, vnde si liberum exitum per hæmorrhagiam non habet, phrenitidis consecutionem adfert. Atque ira translatione & excursu sanguinis qui paulò antè faucium asperitatem induxit, quia nō vacuatur, phrenitis excitatur. Talem phrenitidis generationem & causam expressit in illa prognos̃i. Doloris acerbitas paulisper ad iugulum fixa, si ad superiora vertatur, mortiferum adfert malum. Pari iure, hoc loco, sic enunciabimus de proposita faucium asperitate. Faucium asperitas & inflammatio paulisper fixa, si ad superiora vertatur, phrenitidē parit mortiferam. Phrenitidis autem mortiferæ signa sunt hæc.

P A L P A T O R E S] Qualem accepimus fuisse Dealcis vxorem, quæ ἐφάλαφα, ἐππλεν, ἐγλυφε, ἐστερόλογε, i. palpabat, floccos carpebat, sculpebat, festucas auellebat, obiit 21. quorum symptomatum causas explicauit Galenus ad illam prognos̃in. Deliria cum palpo coniuncta, sunt valde phrenitica.

L A B O R I O S I] Lassitudine vlcerosa, quæ & phrenitidis prænuncia, & consecutaria esse potest. Atque hæc sufficiant. Tantum illud animaduersione dignum, quòd scripserit ὁ πινώτερος, δύσκολα, quæ sunt planè ὀλέθρια.

8 Τὰ κ' φάρυγτα ἰχνεῖ ἀλγήματα. τὸ δ' οὖς ἐδῶμα, καὶ ἀσμοὺς ἐργάζεται, καὶ τραχήλου, καὶ νώτε ἀλγήματα.

Faucium dolor prægrandis; parotidas & conuulsiones facit: atque cervicis & dorsi acerbos dolores.

H V I V S prognos̃eas pars illa quæ pertinet ad parotidas, nuper analyticam habuit explicationem. Hoc tantum interest, quòd suprā, faucium proritacionem satis molestam id facere asseuerauit, quòd ad doloris acerbitem hīc referendum scripsit acceptum. Accedit & illud, quòd illic faucium proritacionem non minùs exoluere, quàm facere ipsas parotidas demonstrauimus: quòd fortasse in faucium prægrandi dolore locum non habet. Exoluuntur enim parotides tussicula cum ptyclismo coniuncta, non autem faucium inflammatione prægrandi, quæ summam doloris acerbitem vnà secum adducit. Itaq; hīc nostræ sunt partes de parotidum generatione inflammatarum faucium succedanea scribere quòd ad huius loci enarrationem pertinere maximè videatur.

Ergo. FAUCIUM DOLOR PRÆGRANDIS] Ab inflammatione magna quam facit fluxio consistens & concitata sanguinis multa bile perfusi & efferi.

P A R O T I D A S F A C I T] Quomodo suprā audiuius, 4. huius cap.

E T C O N V V I S I O N E S] Translatione materiæ ad cervicis medullam, membranas & nervos; tum ad musculos ipsos per progressum, vnde cervicis duritas, maxillarum coarctatio, carotidum arteriarum pulsus fortis, chordarum temporalium distensio: vnde etiam cervicis & dorsi dolores hīc cōmemorati.

9 Μέλαι πυρετὸς ὀξείος, ἀσμοὶ ὀλέθριον.

Et verò conuulsiones cum febre acuta, funesta.

HOC PERTINET ad exprimendam πύ δυνάμει, i. gravitatem symptomatum superioris decisionis. Distinctio autem talis est. Convulsio febris acutæ confectaria ab exhausto, funesta, tum vniuersalis, tum particularis. Convulsio autem febris finem adfert, quæ aut eodem febris die, aut post die, aut etiam perendæ incidit: modo eam, quæ inijt, horam non excesserit. At verò febris convulsionem exolvit, quæ antè non fuit, aut si fuerit, exacerbationem habuit.

10 Τραχήλου καὶ πήχεος ἀλγήμελα· ἀσπασμώδεα. ἀπὸ πρῶτον
δὲ ταῦτα.

Cervicis & cubiti dolor, est convulsivus: id autē à capite nasci solet.

HIC ETIAM noster author id habet propositi, ut quæ cervicis & faucium mala, successione & accessione pariant incommoda, nobis aperiat. Est autem huiusmodi præsens decisio. Si dolor cervicis ingens propagationem habeat, aut translationem dolorificæ materiæ per quintam conjugationem nervorum cervicalium ad cubiti musculos qui inde movendi facultatem percipiunt; sanè insulsus tum erit motus eorum qui antea non nisi nostra sponte & imperio movebantur; quæ ratio depravari motus qui contra naturam suscipitur, convulsio nominatur. Ergo non est dubium quin fluxio concitata, simulatque in cubito systrophem habuerit, convulsionē faciat; nisi detractione sanguinis è vena illius cubiti occurratur: quoniam ubi gravitas est, quæ nunquam accidit per sympathiam, inde sanguinis detractionis molienda: quemadmodum in pleuritide faciendum præcepit. Et verò Galenus ipse detrahendi sanguinis locum indicat ex eo præceptoris theoremate. Ἀκτὶα ἢ ῥέπη δὲ τῷ συμφορόντων χωρίων, i. Ducendum quæ reperi, per loca commoda: ubi remedium huius propositi mali docetur his verbis. Quæ mala ex dorso ad cubitum veniunt; phlebotomia exolvit.

Quod sequitur. ID AUTEM E CAPITE NASCI SOLET] Nos quidem, authore Galeno, faciem pro capite usurpatam, ad ipsum caput & cerebrum referendam duximus. Idem enim significare ait Galenus, πρὸ πρῶτον, quod illud nuper iam explicatum, ἀπὸ κεφαλῆς ὁρμώμενον: ut fluxionis concitatae fons & origo sit caput & cerebrum, indeque translatio fiat per cervicem ad cubitum, cum suo communicantem principio, tum generis similitudine, tum vicinitate, & operis societate. Fluxionis autem è capite concitatae decisio eodem spectat, quod explicatum iam illud. Ἀπὸ κεφαλῆς διηκδόνος. &c.

11 Κατὰ φάρυγγα ὄχλοι, ἱγνοὶ, πνευλιζόντες ἐν τυτέοισιν, ἐν ὑπνοῖσιν ἰδρῶτες ἀχαιοί. ἥρα γε καὶ τῷ ἰδρῶτι καμφίεσθαι τοῖσι πλείστοισιν ἔπνηρόν; ὧς τὰ κατὰ πόνου τυτέοισιν εὐφοροί.

10 Quinetiam faucium pruritantes cum aequalitate et ptyelismo, faustos in somnis habent sudores. Nam & levare sudore, plurimis non est infastum. Tum qui deorsum descendunt labores, toleranter feruntur.

HUNC ὄχλον superius ἐρεθισμὸν nominavit. Sudores his bonos esse ait, quod per eos inutilis humor exudet, si toto manent corpore stillatim & calidi. Ex quo interrogationem inutilem puravi, cum nemo sit qui ea de re dubitet. Cæterum tribus modis quiescunt hæc mala, sudore; tumore in illis partibus; & venæ sectione, ut libro de ea Galenus tradidit.

12 Ἐν ἀλγήμετι νώτου, καὶ στήθεος, αἱματώδης ἔρσις Ἰππιασσα· ὀλέθριος Ἰππινόνως.

In dolore dorsi & pectoris, cruenta mictio ubi sistitur; crudeliter mortiferum est.

60 DORSI ET pectoris laborantium dolore inflammatorio, miræ symptomatum copiarum esse solent, tum accessione per propagationem, tum successione per transitum; siue is diadochen faciat; siue translationem: quemadmodum in ceruice iam demonstratum est. Quæ omnia loco scribentur. Hic autem sufficit causas aperire mictionis cruentæ & quare suppressio eius crudeliter mortifera sit, quod significat ὀλέθριος Ἰππινόνως. Multi enim suppressa urina moriuntur κατὰ πόνον, sine vlla doloris acerbitate, somno veteroso sepulti.

Ergo. IN DOLORE] Affectione firmiter fixa & stabili à rheumate consistente & concitato, de summa doloris acerbitas nasci solet in partibus acerrimi sensus.

DORSI ET PECTORIS] i. Thoracis antica & postica parte obsessi à rheumate consistente & concitato, quod illis in partibus dolorificam habet *πῶς οὐσπερὶ* periculosæ pleuritidis; in dorso quidem, per venas thoracicas; in pectore autem, per eam quæ mammaria nominatur. Inde pleuritis nascitur, quam Hippocrates vocat dorsalem, in qua urinam ferri commemorat, primum quidem *ὑγραιμῶς*, quarto, aut tertio morbi die; nonnullis etiam *αἱματώδης*. Eiusmodi esse solet *τὸ ἰχθυώδες* quod è carnibus assis exudat. Idem quoque author est, eiusmodi pleuritidem coniunctum habere rigorem cum doloris acerbitate secundum spinam ad pectus; ac tum urinas reddi cruentas.

CRVENTA MICTIO VBI SISTITVR] i. Si urina referens *τὸ ἰχθυώδες* quod è carnibus assis exudat, quæ pari & eodem vitio renum fertur, quo prærubra ventris proluviis loturæ carnum recens mactatarum similis, quam fundit iecur effertur & exolutum. Non enim crueta hic potest videri molta bile saturata, aut inflammatione feri prærubra: sed tantum sanguinolenta, qualem descripsit Hippocrates. Nec verò talis urina vesicæ vlcera confectaria est: quia funditur *τὸ πῶς οὐσπερὶ*, i. repente, & nulla incidente extrinsecus causa. Vnde adducor ut credam renes in causa esse cur talis fundatur, idque vel supra venula prorupto illuc sanguine vbi venæ non sunt affixæ, quemadmodum in vesica; vel oppressione quæ facit expressionem; vel exolutione ipsorum renum & colatorij per quod urina materia fecernitur à sanguine renum alibili. Nō enim hīc liber agnoscere calculi asperitatem quæ faciat urinam cruentam renum attritu, vnde sanguinis mictione urina inficitur: quod in nephriticis Hippocrates annotavit, *αἱματώδης ὑρῖσις*. Ceterum dorsalis hæc commemorata pleuritis, propagationem etiam facit ad lumbos, vnde symptomata nephritica nasci solent; non quidem per translationem humoris dolorifici, sed per sympathiam societatis & vicinitatis. Solenne est illud Hippocratis. *Quibuscumque diaphragmate inferius gibber enascitur; horum nonnullis renum & vesicæ morbi enascuntur*. Nulli autem sympathici morbi, priores exolunt vnde ipsi venerunt. Secus est de crurum varicibus, & dysenteria, quas facit humoris gibberosii translatio, gibbumque ipsum sanar. Iam verò quod urinae cruentæ suppressionem crudeliter mortiferam esse dixit, antequam illius crudelitatis causas exponam, quærendum videtur quamobrem supprimatur; num etiam peioribus ægri rebus suppressio illa fiat, quàm liberalis mictio.

Hic ego ischuriam propriè dictam quæ tantum vesicæ propria est, solam agnoscere nullo modo possum. Pertinet enim hæc, non minùs ad partes vnde fecernitur, & per quas in vesicam illabitur. Huiusmodi autem sunt renes & urinae ductus, quorum offensione, quemadmodum urinae cruentatæ funduntur: sic etiam sisti possunt, ut in nephriticis; tum inflammato rene; tum etiam calculo in urinae ductus impacto. Quid verò? nonne huc spectat etiam renum diu multumque afflictorum *ῥέπσις*? Itaque si dorsalis hæc iam explicata pleuritis prorepat in rhachitin, eiusque membranas, tandè quæ sit crebra horroribus cum cita calor vicissitudine; tum demum eveniet ut acerbissima urinae suppressio consequatur. *Crebri ex lumbis horrores, cum cita calor vicissitudine, pestiferi; gravissimam urinae suppressionem ostendunt*. Atque illa frigoris & calor vicissitudo venit *ἐκ τῶν*, non autem aliunde cietur *ἐκ τῶν*: sicut horrores critici & periodici, qui fiunt à cacochymia è vasis illuc diffusa. Est enim cōstans & rata Hippocratis sententia, manetque apud medicos firma consensio; omnem rigorem, omnemque horrorem qui intus, non extrinsecus ducitur, inde cieri, quod cacochymia è vasis in lumbos & dorsum expressa, vellicet partes illas acerrimi sensus. Quæ causa Hippocratem adduxit ut scriberet. *Rigores mulieribus quidem primum, mox viris, excitantur à lumbis secundum dorsum ad caput*. Quod si quis aliunde rigeat; palam est ipsum rigere à purulento abscessu, non autem à vasis. Ac si diceret. Rigores quidem omnes periodici, critici, & symptomatatici à motu febris principia causasque ducunt, cacochymia è vasis diffusa: ut ibi domicilium febris esse putemus vnde rigor venit, non vbi cietur. Sin autem partium ipsarum vitio nascantur; abscessus purulenti signa existunt, vbi, & vnde cietur. Ergo cita illa calor & frigoris vicissitudo, inflammationem denunciat ipsius rhachitis, & membranarum eius. Etenim descripta iam inflammatio maiores habet sistendi opportunitates, quàm promouendi urinam. Valet autem ad *ἰχθυώδες* & *αἱματώδες*; non autem ad *ὑρῖσιν* ipsam. Quod sequitur, ab ea suppressione citam & crudelissimam mortem venire; non eò spectat ut doceat, perennitatem mictionis cruentæ, cum manet pleuritis, ab interitu vindicare. Nam & Hippocrates author est, pleuriticum sic affectum cum tali urina vitam finire quinto, aut ad summum septimo die morbi. Huc accedit quod in hac dorsali pleuritide symptomata nephritica sunt planè sympathica: nulla autem pleuritice materię aliò translatæ *ἢ πῶς οὐσπερὶ* Cui succedanea: cuiusmodi esse dicuntur varices cruales, dysenteria quoque ipsa. Atqui verissimum illud est quod scripsit Galenus. *Ὅτι καὶ συμπαθεῖται ἡ ῥέπσις τοῖς ῥήματι, οὗτων ἔστιν ἐν τοῖς λυκαῖς τοῖς ἐξ ἀρχῆς παθόν. I. Eorum quæ per sympathiam nascuntur, nullum est quod priorem morbum possit exolvere.*

Supereft, ut quare crudeliter mortifera sit urinae cruentæ suppressio, exponamus. Enimvero, simplex urina dum sistitur, si excursum ad cerebrum habeat, cataphoricum parit symptoma, lethargum; sanguinolenta autem, quoniam feritatem contraxit, & febris æstu incanduit; quoquò se verterit, malignæ cacochymia & qualitatē effert vim acerbissimam secum portat: vnde efficitur, ut & doloris acerbitate, & interceptione officij nobilissimarum partium; postremò sympathia vicinarū & sociarum, cita morte atque crudeli funesta sit. Quod autem hīc sit *ἐκ τῶν*, suprà iam legimus *ἐκ τῶν*,

13 Τραχήλου πόνος, κακόν μὲν ἐν πυρετῷ παντὶ κακίστον δὲ οἷσι καὶ ἐκμανῶσαι ἐλπίς.

Cervicis dolor cum in febre omni terrificus; tum verò pestiferus ijs qui sunt in metu insania.

10 INTER symptomata epigenomēna quæ veniunt καὶ πῶς δηγῶμεν, i. propagationem causæ morbificæ, ac locum habere dicuntur; non quidem simpliciter in magnis morbis, sed in iis tantum qui inter ipsos eximij sunt; dolor cervicis, qualem describit Hippocrates, non ultimarum est partium, sed certè primarum. Etenim verè illud est positum; omnem δηγῶμεν pessimam quidem esse reapse, sed multò peiorem haberi, quando fit via vi ad nobilissimas partes quæ habent imperium in corporis vniuersitatem. Et verò cum morbi omnes qui aliorum propagatione veniunt, sunt primigeniis acerbiores: tum maximè id cernere est in nobilissima parte, cuius officio carere non potis est saluis ægri rebus; cum scilicet illa pars offensionem concipit ab humore tum effero, tum indomabili: qualis esse solet qui ex priore morbo vitium fecit. Sanè cervicis dolor frequens est in querelis ægrorum qui ardentè febricitant, qualem fuisse legimus, præter alios multos, Silenum. De quo ita scripsit Hippocrates. *Silenus febris ardens corripuit. Cæpit autem lumbis dolere, capitisque habuit gravitatem, ac tum cervicis erat distensio.* Hunc idem narrat diem suum vndecimo morbi obiisse, qui tamen celerius interiisset, nisi ætatis virtutè interitus celeritatem repressisset. Erat enim natus annos viginti.

Ergo. CERVICIS DOLOR] Qui nulla vi in cervicis musculos incidente, sed à distensione venarum & articularum cervicalium excitatur; eaque distensio hæmorrhagiæ criticæ non est prænunciæ, neque fugax: vt esse non potest quæ ineunte morbo molesta est, nec antè significata fuit. Oboritur autem tumor ab inflammatione dorsalis medullæ & membranarum eius.

CVM IN FEBRE OMNI TERRIFICVS] Qualis fuit illè Sileni, quem symptomaticus sanguinis excurfus per distensionem effecit.

10 TUM VERO PESTIFERVS IIS QVI SVNT IN METV INSANIA] Cuiusmodi sunt ταραχῶδες qui animo perturbantur, quorum perturbatio ad phrenitidem viam munit sternitque; tum ij qui ex mansuetis repente fiunt protervi in quæsitis atque responsis; & qui vrinas reddunt pellucidas, aqueas, nigroque præditas enzoremate. In talibus enim pestiferus est dolor cervicis: quoniam ad præparationem suscipientis causæ, inde vis adfertur magna efficientis.

14 Ἐπὶ σήδεος ἀλγήμεσι πυρετῶδες, κοιλίῃ τε τραχώδης, δακνῶδης σήμεῖα μὲν αἰώνων ὑποχωρησιῶν.

40 *In dolore stomachi febriculoso, alvus cum morfu prorupta; deiectiones nigras denunciat.*

EODEM spectare videtur quò illa. Quibus cum biliosa deiectione premitur morfu pectus; amarescitque os; malum. Hoc igitur proponit intelligendum, illas demum excretiones duce natura non fieri, nec salvis & integris ægri rebus, quarum excrementa sunt effera atque perennia, quæque vnà pariter sursum deorsumque feruntur.

10 IN DOLORE STOMACHI] i. In cardiogmo & æstu ardenti, à bile flaua in tunicis ipsis ventriculi feruentissima, vnde stomachus ipse mordetur ex facili καὶ λόγον & meritò; vt nihil aliud planè sit καρδιωμός; quàm δῆλός τῃ σήδεος iam explicata. Quæ causa est etiam cur hic, τῷ σήδεος, orificium ventriculi esse putem, usurpata per synecdochen cartilagine ensiformi pro sterno, quod σῆδος non rarò dicitur, cuius ipsa pars est: & per metonymiam, id quod sub illa ensiformi cartilagine continetur, orificium nempe ventriculi, quod veteres πύλινον nominarunt; ne aliud esse videatur commemoratam hoc loco τῷ σήδεος ἀλγίμα, quàm καρδιωμός.

FEBRICVLOSO] i. Si febris accessionem habeat ingentis æstus à bile in aluo feruentissima; vnde syntimoria fit eius in continenter gignendo, & laceffendo. Est enim perennitas prorationis & generationis in dolore stomachi febriculoso, quem alibi sic expressit. *Εν πύλοι πυρετῶσι καὶ μᾶλλον ἰσχυρὸν πύλινον καρδιῶν.* i. In febribus, circum ventrem æstus ingens. &c.

60 ALVVS CVM MORSV PRORVPTA] i. Quæ biliosis excrementis profusè fertur: ac profusè ideo scripti, quòd nomen τῆς παραχῆς non est deiectionum modicarum, sed nimiarum & profluentium. Biliosas autem adscripsi; quia & cum morfu feruntur, & in nigras tandem mutantur. Nec verò biliosarum deiectionum ratio intelligenda ἢ καλὴν καὶ καλοῖμον, i. bene felicitèque ductarum; vt bilis subrafra crassescens, qua multum & rarò sine stridore fertur aluus, solida, mollis, & succi plena. Sed potius animo completi velim alteram biliosarum deiectionum conditionem, quæ est ἢ καὶ κακορεσέων μάλλον ἢ κα-

per & aëropodestipar, i. saturata nimium bilis, atque spumantis, quæ non minùs excernendo calamitosa est, quàm stabulando. Non enim diutè excernitur, hypochondriorum ardor extinguitur; sed exardescit magis, neque iactatio ipsa quiescit: adde quòd sedis & intestinorum vlcerifica esse solet.

SIGNA DEFECTIONVM NIGRARVM] Quoniam bilis flauæ in atram facilis mutatio est: tum etiam quia iecoris afflictio diuturna, ipsum sic reddit effæctum, vt nò solum officij tædio, sed etiam exolutione sui, in vitio esse videatur, indèque descendant *ἡ ζωρήματα μέλαινα αἷμα*; præsertim si extrinse partes perfrigerari cœperint. Vt enim. *Quæ è phrenitico cum perfrigeratione sputatores redduntur, vomitum illi nigrum prænunciant.* Sic perturbata aluus diuq; crocea bile ducta, incidete perfrigeratione, nigra excernit.

15 Τὰ ἐν ὀξέσιν καὶ φάρυγγα ἰχνυλὸν ὀδυνώδεια, πινυώδεια: ὅτε χαλνοὶ μὴ ῥηιδίως σὺν ἀζονῇ ἰχνυλῷ, ἀδρακροῦσιν καὶ ἐκ τούτων φρενιτικοὶ, ὀλέθριον.

Qui cum equalitate faucium, in acutis, dolores & strangulatus adsunt, nec oscitanti os facile cogitur, quamuis equali, deliratio est, indèque phrenitici desperati.

OMNIA quidem vera sunt quæ in hac prognosi leguntur: sed parum appositè scripta, quia nò sunt *ἁπλοῦς*, vt ex eorum signorum complexione non posse id effici videatur, quod ipse euenturum prædicat. Principio anginam describit quæ nihil aspectabile, nihil tractabile ad sui cognitionem adfert, præter intolerabilem doloris acerbiteriam & *ὀρθόπνοιας*. Id enim declarat æqualitas faucium & strangulatus. Ac talis angina ab inflammatione laryngis nata, non minùs, penè dixerim, circa morte funesta est, quàm ea quàm facit carnicificis illaqueatio. Nihil igitur erat necesse ad prædictionem phrenitidis mortiferæ, aduocare cynanchen, quæ homini necando ipsa per se satis est, si quod aliud morbi genus; nec vnquam, si quid indico, phrenitidis prænuncia est. Sufficiet igitur demonstrare quòd fiat vt oscitanti, quàmuis equali, os cogi non possit. Sed tamen ne quid perfunctoriè scripsisse videamur, enarrationem huius prognosticæ à principio ad finem, Deo duce & auspice, sic perducemus.

QVI CVM ÆQUALITATE FAUCIVM] i. Inflammationis expertum, vt esse solent in vera cynanche quæ nihil edit conspicuum, neque in faucibus, neque in sterno: vt suprà iam demonstratum est, & explicatum quid vocet *φάρυγγα ἰχνυλόν*.

DOLORES ET STRANGVLATVS] Quæ duo symptomata nobis aperiunt veram cynanchen, ab inflammatione natam musculorum propriorum laryngis.

IN ACVTIS] Quò tendit & illud. si cui dominatu febris detento, repenitè incidat strangulatio, faucibus nullo tumore obsessis; inde cita mors venit.

NEC OSCITANTI OS FACILE COGITVR] Vacatione officij musculorū crotaphitarum, in homine sui securo & negligenti: quemadmodum mox intelligemus ex eo quod sequitur.

QVAMVIS ÆQUALI] Sic enim vertimus *ἰσχυρῶς*, cui subaudiendum est *ὄρν*; vt illa æqualitas referatur ad faciem, quæ naturaliter sit constituta, naturalemque suam obtineat *τὴν ὁμόμορπον*, nullòque modo sit à se mutata. Ac si diceret; si oscitando æger teneat semper os hians, non à conuulsione musculorum aperiendum, non à luxata maxilla inferiore, nec à paralyti musculorum claudenrium, crotaphitarum & masseterum. Secus sit in iis de quibus exarata & explicata fuit hæc prognosticis. Cervicis durities & dolor prægrandis, maxillarum item coarctatio, venarumque iugularium pulsus fortis, vnæque chondarum coarctatio; mortifera sunt hæc.

DELIRIO EST] Homini sui immemoris, nec sensationem rei molestæ percipientis, nisi admodum raro; cum scilicet accessione causarum morbosicarum symptomatumque vehementia, *ἢ φαντασία ἢ ῥησις ἀποδύκονται*.

INDEQUE PHRENITICI DESPERATI] Etenim, si luxata inferiore maxilla, nisi quàm citissime reponatur, crotaphitarum musculorum & masseterū distensio & alteratio per phlegmonem & erysipelas, in similem affectionem cerebrum ipsum adducit, quo pariter similiterque simul affecto, febres acutæ incidunt cum offensione & vitio omnium animæ actionum; quidni oscitatio magna & ad extremum perducta, sine vicissitudine clausione, parem vim adferet, primum quidem musculis, mox cerebro ipsi, vnde tum febris acutè, tū phrenitidis consecutio adferetur: maximè verò iis quibus in propinquum est ipsa phrenitis, cuiusmodi sunt *οἱ ἀδυναστεύοντες*, ex cerebri sympathia quam primigenia febris induxit: Animaduertit autem medicus, *τὸ ἀδυναστεύειν* fieri per sympathiam cerebri; *τὸ δὲ φρενιτικόν*, per idiopathiam: atque sympathiæ facilem esse transitum ad idiopathiam. Libet autem adscribere verba de maxilla inferiore luxata. *Τῆ πρῶτην*, inquit, *ἐν μέρει ἐμβολήσιν ὡς ἔχουσιν, ἐμβολῆς δὲ ἔσθις ἀποδίδει εἶρηται. ὡς δὲ μὴ ἐμπύον κίνδυνος ἀπὸ τῆς πυλῆος ἐπὶ πυρετῶν ἔκταται, καὶ τῆς κεφαλῆς. κεφαλῆς μὲν ὅτι μὴ ἐστὶν, καὶ ἀποδύκονται; καὶ ἐπὶ τῇ μὲν ἀπὸ τῆς φύσεως. i. Hanc reponere citò oportet, quomodo ante dictum est. Nam nisi reposita breui fuerit, periculum animæ imminet à febre continua, & segnicie veteriosa. Sunt namque soporati hi musculi, & distenti, & alterati contra naturam.*

16 Φάρυγξ ἐλκωμένη ἐν πυρετῷ μετ' ἄλλου σημεῖος τῷ δυσκόλῳ
κινδυνώδες.

Fauces exulcerata in febre, cum alio signo difficili; periculosum.

10 **VIDEOR** bellè pensum meum absoluturus, si ad enarrationem huius prognoseos, historiam recensuero unde catholicum hoc theorema desumptum est. Historia legitur prima tempestate i. lib. 7. quam nos Latine sic expressimus. Vnicum, idèque maximum inter eos qui tunc regnabant morbos; & horridus, multos interimebat. Eorum autem qui vitam finiebant, plurimos exercebant pathemata huiusmodi; febres horridæ, acutæ, continuæ, quatum modus erat hemitritæus, vnius quidem diei remissionem habentes, alterius vero exacerbationem. Omnino autem vires acquirerebant eundo, ac celeritatis, vehementiæ, & assiduitatis accessione ingrauescentes; quod significat ὅτι τὸ ἐξυπνοῦ ἔκδηλον. Tum sudores quidem continenter, sed non toto corpore exudabant; extremæ partes frigida vix recalescentes. Alui cum torminibus ferebantur biliosus, paucis, meracis, tenuibus, mordacibus quoque; & crebrò ad egerendum surgebant. Vrina tennes, cruda, decoloris, paucis, aut si crassiores essent, exigua hypostasi, nec bene constituta; sed cruda quadam & intempestiva erant prædita. Extusiebant pauca frequenter, parum cocta vix eduentes. Quibus autem grauissimæ erant pathemata, ijs ne paulisper quidem apparebat pepasmus: sed totum exiiebant morbum cruda spuentes. Ceteram mala hæc omnia inde principia causasque ducebant, quod ineunte morbo ad finem vsque, fauces dolenter habebant. Erant autem rubore suffusa cum inflammatione: rheumata exigua, tenuia, acria, unde citò liquebantur & vitiabantur. Accedebat & illud grauissimum; quod omnia vefcendo accommodata & bona fastidiebant toto morbi decursu. Suis experies, delirique cum in propinquo mors esset.

Ergo. **FAUCES EXULCERATÆ** i. Dolenter affectæ, rubræ, inflammata; a rheumate tenui, acri, ferino.

IN FEBRE Acuta, continua, horrida, qualis est hemitritæus.

CVM ALIO SIGNO DIFFICILI i. Sudatiuncula, turbatione alui symptomatica, prævis vrinis, praua quoque & difficili anacatharsi; quæ omnia non δυσκόλα solum, sed etiam reuera sunt πινέει.

30 **PERICULOSVM** Vel etiam funestum: propter morbificæ causæ perennitatem, & affectionum syntymoriam; tum etiam partium obsessarum præstantiam, doloris acerbiteratem, & officij ad vitam tuendam necessarij interceptionem; cum infirmitate virium à colliquatione partium, viuacitatis exhaustio, & viuifici nectaris paupertate.

17 Ἐν πυρετοῖσιν ἔξαπίνης πνίγεσθαι, καὶ κατὰ πίνειν μὴ δύνασθαι, χροεῖς οἰδηματιος· κακόν.

In febris, strāgulari repētè, nec deglutire posse, sine tumore, malum.

40 **IN OMNI** morbo malè res eunt quando symptomatum accessione, & vnà damnis æger augeatur, & vnà peccatur in comoda eius; unde curationis fiducia ac spes salutis ruit. Enimvero nihil tam facie sperabilem ægri salutem, quàm ipsa respirandi, & deglutiendi libertas. Comoda liberæ spirationis nō ita pridem sunt explicata. Deglutiendi autem libertas quantum opis ad curationem adferat, vel illud declarat maximè; quod omnis neoterismus, omnisque epicrasis, tum ipsa nutritio, deglutiendo suscipitur. Difficultatis autem calamitas signo ipso terrificæ esse debet: quoniam in causa est eius conuulsio, vel exolutio pharyngis atque laryngis. Quæ cum ita sint, hæc mihi videtur ratio explicandi prognosin.

IN FEBRIBVS Quarum discessio nulla est, neque futuram crisin ostendunt; celeriter autem, continenter, & vehementer mouentur.

50 **REPENTE STRANGVLARI** i. Nulla præeunte προφασί, i. prauidentia, quæ posita sit vel in asthma, vel in peripneumonia, vel in vomica, vel in ceruicis λορδῶσι, i. luxatione supina, vel in tuberculo & inflammatione laryngis (nam quæ ab illis causis incidit strangulatio, non fit repente, nec sine prognosi, nec sine summa doloris acerbitate, cum meteorismo & orthopnea.) Nos enim τὸ ἔξαπίνης idè significare putamus, quod ἀπὸ τῶν τυμμάτων, quod est, sine prophasi, vel insita & prænūcia, vel extrinsecus incidente. Hicigitur qui repente incidit strangulatus sine tumore, fit sua sponte, non autè in vera angina quam facit inflammatio propriorum muscutorum laryngis, de qua iam diximus. Huiusmodi sunt. Quibus cum febre vox faucibus hæret, ab infirmitate muscutorum intercostalium, & exolutione laryngis. Huiusmodi etiam, interruptæ voces, quas vocat κατὰ κλάμεναι φωνὰς καὶ καπνίστας. Inde etiam veniunt ἀφῶνοι, βραχύπνοοι, & qui spirationem edunt minutulam, quam idem vocat πνεῦμα μινυζῶδες.

60 **NEC DEGLUTIRE POSSE, SINE TUMORE** Ut ea difficultas spirandi & deglutiendi, aliò sit referenda quàm ad tumorem, i. inflammationem faucium & laryngis; ad paralyin videlicet ipsam instrumentorum, & facultatis infirmitatem. Nam qui à tumore faucium difficulter deglutiunt, aut etiam deglutire nullo modo possunt, similiter afficiuntur ut anginosa Bitanis, de qua sic legitur. Potius per nares effluebat, deglutire non poterat: sed id non fiebat ἔξαπίνης, nec αὐτομάτως. Nec verò ad normam huius prognoseos adducendi sunt illi cynanchici, qui faucibus inflammatis, potulenta refundebant per nares, par. 7.

Coac. 4.
cap. 8. lib. 2.

Coac. 7.
cap. 8. lib. 2.
3. Epidem.

hiff. 4. part. 2.
3. Epidem.
lib. 6. Epid.
part. 7.

nec deuorare poterat. Huc etiam vocandus aphorismus ille. A febre habito si, faucibus non tumescens, strangulatus repente incessat, mortiferum. Multum enim interest inter hoc; nullo existente tumore & nihil conspicuum exhibere in faucibus.

M A L V M] Vel potius mortiferum: quoniam in summa necessitate spirandi, facultas id efficiendi adimitur.

18 Τεράχνηλον ὁπισθὰ φλυῶν μὴ δυνάσθαι, μηδὲ καὶ ἀπίνειν· θανάσιμον ὡς τὰ πολλὰ.

Melius sic.

Ἦν ὑπὸ πυρετῆς ἐχορδύω ὁ τεράχνης ὁπισθὰ φηται, καὶ μὴ καὶ ἀπίνειν δυνάσθαι, οἰδήματι μὴ ἐόντι· θανάσιμον.

Si cui in dominatu febris repente cervix peruertitur, nec deuorare potest, nullo apparente tumore; mortiferum.

H V I T S prognoscens idem scopus qui fuit superioris, propterea que idem syllogismi argumentum, quod medium vulgò dicunt. Est autem huiusmodi. Vndeunque in febris dominatu damna augentur, & vnà curandi opportunitas amittitur; inde salutis desperatio esse solet. At qui in febris dominatu, cervix repente peruersa, deuorandi facultatem adimens, damnis auget, vnàque curandi opportunitatem tollit. Ergo inde salutis desperatio est. His ita constitutis.

S I C V I I N D O M I N A T V F E B R I S] i. Illi demum qui magisterio febris tenetur, vnde summa spirandi, summaque deglutiendi necessitas ad epicrasin, & neoterismum.

R E P E N T E C E R V I X P E R V E R T I T V R] Non quidem luxata in anticam, posticam, aut in alterutram partem vertebra; ab ictu, iactu, & casu; nec verò ab vilo tumore qui vertebrarum ligamenta neruosque, vi, ad se rapuerit, indeque cervicis peruersionem quoquouersum attulerit. Talem enim causam quæ sæpe incidit, ac sæpe signa edit in vertebra intrò luxata; illud explodit. Nullo apparente tumore. Sed quæ peruertitur ab intemperie admodum sicca, quæque ad vltima siccitatis peruenit, quæ facit ὄχλω, καὶ ἄνθρακον, καὶ δισστροφὴν τῶν μορίων, i. tractionem, tensionem, peruersionem partium.

N E C D E V O R A R E P O T E S T] Tum vitio faucium, tum rapta ad λόρδωσιν vertebra dente, vnde gula comprimitur, iam inde nimium rescicata.

N V L L O A P P A R E N T E T Ū M O R E] Neque in faucibus, nec in ceruice: quia quæ inde venit difficultas deglutiendi, nondum salutis spem adimit.

M O R T I F E R V M] Ratione signi & causæ. Vt enim signo insanabilis est hæc difficultas: sic ipsa causa damnorum cumulum adiungit in febre acuta.

DE HYPOCHONDRIIS.

CAP. XI.



ΠΟΧΟΝΔΡΙΟΝ δὲ γῆ μαλθακὸν εἶναι, καὶ ἀπονόν, καὶ ὁμαλόν· φλεγμαῖνον δὲ, ἢ ἀνωμαλῶς εἶναι, ἢ ἀλγούμηνον· σημεῖον δ' ἐρώσεως εἶναι ἐκ βύθδεος.

Iam verò hypochondrium esse decet molle, doloris expers, æquale. Contrà exastuans, aut inæqualiter constitutum, aut etiam dolore affectum; morbi est non mansueti.

I N M E D I C I N A nullum frequentius nomen auditur quàm hypochondriorum, partiumque quæ in hypochondriis continentur. Nulla hypothesis in medendo, nulla recursus initur quæ hypochondriorum διαθεσιν non proponat. Denique fundamentum curationis est hypochondriorum posita, vt assollet, ad deliberandum affectio. Nulla est morbi species, nulla idea, quæ ad sui cognitionem atque scientiam hypochondriorum distinctionem non habeat, quo iure, quaque iniuria. Et quoniam omnia quæ sunt in medendo, scopū habent id quod est naturaliter constitutū, vt ex comparatione similium ac dissimiliū intelligamus quantū & quemadmodū vnumquodq; à symmetria discesserit, tam in excessu, quàm in defectu; primum quidē noster author de more institutū; maiorū, proponit hypochondrium bene constitutum in complexione & temperamento, quod διαθεσιν idem vocat. Est autem huiusmodi.

I A M V E R O H Y P O C H O N D R I V M E S S E D E C E T] Ac si diceret. Patefacta omni prognosi de respirando, perspectis etiam malis partium quæ respirationi deducendo inferuiunt, vt faucium, atque laryngis, partiumque circumiacentium, quæ sunt, ceruix & vertebra eius; sequitur vt de hypochondriorum affectio-

2. Epidem.
Coac. 6. huius
cap.

comment. ad
aph. 35. 4.

lib. 1. progn.

rum affectionibus hoc loco dicendum sit, quod eorum œconomia, secundum respirationem, necessaria sit ad vitam tuendam, nec sine summo salutis & vitæ discrimine in vitio esse possint. Huius paraphrases ducem habeo particulam, scilicet, quæ semper, auctore Galeno, disputationis propositæ cum superiori connexionem ostendit. Ergo. **HYPOCHONDRIUM**] Pars illa epigastrii quæ subiaceret, vel adiaceret cartilaginibus thoracis costarum, unde nomen habet, multiplici tamen significatione distinctum, modo per synecdochen, modo per metonymiam, modo etiam per antonomasiam. De hypochondriis proprie dictis solenne est illud. *Abcessum minus faciunt ventris, quam hypochondriorum tumores.* Sed metonymia verè est in illo. *Αἱ ἀσθενείαι τῶν ὑποχονδρίων, ἰ. Successiones hypochondriorum.* Quin etiam locus ille metonymicè dictum hypochondrium planè testatur, ubi oxymelitis commoda explicantur. Sic enim legimus. *ὑποχονδρίων καὶ ἀσθενείων, ἰ. παῖσι, εὐμενέες.* i. Hypochondrio, visceribusque quæ ibi sunt, gratiosum: quamvis & ibidem synecdoche notari possit, quemadmodum & in hac prognosi quæ hypochondrium singulare continet, pro utroque. Non enim hic per antonomasiam usurpatur, sicut in illo de Hermocrate, *ὑποχονδρίων ἐν τῇ λαπαρῇ, ἰ. hypochondrij distensio mollis*: ubi Galenus docet hypochondrij nomen absolute usurpatum, significare hypochondrium dextrum καὶ ἐξ ὅλῳ, quod fieri diximus per antonomasiam. Est autem hypochondrium dextræ pariter atque sinistræ partis, propterea quod duplex esse decet, quod in prognostico scripsit, *ἀεὶ οὕτως*, quod scilicet præclare ad salutem apparet & facit. Nam hypochondrium naturaliter constitutorum multa sunt commoda quibus utimur ad naturalem œconomiam cœnationis, digestionis, & excretionis; ut respirationis libertatem omittam: ac proinde consentaneum est ut omnes epigastrii partes, quibus illæ res perficiuntur, vacent omni culpa & vitio, quam quidem expectandam vacationem, hypochondriorum arguit descripta his verbis conditio.

MOLLE] Non quidem substantia, cuiusmodi est œdema (nam debet esse solidum, quod *εὐσχηλον καὶ παχὺ* dixit) sed loco & situ, quod *λαπαρὸν* vocat cum ait. *Δεῖ δὲ ἐν παντὶ τῷ νοσήματι, λαπαρῶ τὸν κοιλίῳ ἔχει εὐσχηλον.* i. Oportet in omni morbo alium esse mollem & solidam. Est igitur molle hypochondrium, quod neque distentum est, neque repletum nimis, omnique caret renixu: sed faciliè pressum subsidit in contractionis & distensionis mediocritate positum.

DOLORIS EXPERS] Ut hypochondrij mollitudo & æqualitas, signa sunt naturaliter existentia: sic ipsa doloris vacuitas, argumentum est petiturum ex iis quæ *ἀσυμβεβηκότα* Græcis dicuntur. Ut si quis cum fabricationem capitis commendaret à temperamento, complexionem, & cœformationem; idem si addiderit, non facile offendit frigoris & caloris impulsus; quemadmodum prima illa *γνωστέα*, i. notitia percutitur ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ, i. ex iis quæ adsunt: sic hæc postrema ducuntur ἐν τῷ ἀσυμβεβηκότῳ, i. ex iis quæ absunt. Est autem hypochondrium doloris expers, certissimum argumentum vacationis rerum earum quæ facere solent dolorem, distensionis scilicet & intemperiei validæ. Ac distensionis causa sunt crassi & glutinosi humores, contumaciter partibus, quæ laborant, infarcti. Sed intemperies nascitur ex iisdem calidis aut frigidis egregiè fortiterque. In hac igitur doloris vacuitate, nulla inflammationis suspicio esse debet.

ÆQUALIS] Scilicet utraque parte, tam sinistra, quam dextra; idque in omni symmetria qualitatæ, quantitatis, & consistentiæ: ut neutra parte sit calidius aut frigidius; magis item minusve contractum, neque distentum; nec verò durius: ut tale hypochondrium tam bene habitum; omnes epigastrii partes omni vitio carere ostendat; id quod est maximè expectandum in omnibus morbis acutis, non solum ad crises, verum etiam ad curationem, medici artificio institutam.

CONTRA EXÆSTVANS] Æstu incandescens, tum ab inflammatione sicca iecinoris, tum à bile maligna saturatæque, cuius expurgatio non extinguit τὸ καύμα, i. ardorem qui perennitatem habet in visceris *δυσέως φλογέει*, i. dispositione inflammatoria; propterea quæ sanguinis detractione prius quam purgatione curatur. Qui contra facit, malum insanabile reddit. Non enim hic phlegmone accipienda pro ea quæ κατ' ἐξ ὅλῳ à recentioribus sic nominatur, de qua dicitur paulò post. Nec verò incandescendum hypochondrium causam agnosco flatuum interceptionem: quoniam, ut ait Galenus, *ἐδὲ ποτὶ ἢ τὸ πνέματις ἀπὸ τῆς ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ φλογέει δὲ δὲ* (i. ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ). i. Interceptio flatuum, inflammatoriam dispositionem hypochondrio nunquam infert.

AVT INÆQUALITER CONSTITUTVM] Parte alterutra, vel utraque, totòque abdomine certis quibusdam locis, hic calidius, illic frigidius; hic durius, illic mollius; hic lævius, illic asperius; alibi doloris expers, hic dolens. Denique magis minusve distentum: quamvis distensio, siue cum meteorismo, siue cum retractione, non semper hypochondriacorum viscerum inflammationem denunciat. Nam. *Quibus acuta vox, hypochondria sursum intrò reuulsa sunt*, ut Sileno, de quo ita scriptum legimus. *ὑποχονδρίων ἐν τῇ ἀμφοτέρῳ ἀσθενείᾳ, πρὸς ἀμφοτέρῳ ὑποχονδρίῳ.* i. Hypochondrij distensio utrinque in longum ducta, ad umbilicum velut remollita. Hoc enim diaphragmatis inflammati signum est, quod tunicam intercostalem, unaque transversos hypochondriorum musculos ad se rapit, illasque partes sursum intrò reuellit. Nam illa quæ facit meteorismum distensio, symptomatice esse solet tum phlegmones, tum scirrhi, tum obstructionis, flatulentique spiritus. Sed earum causarum decisio atque prognosis, propriorum cuiusque signorum reclaris breui explicabitur, duce Christo.

AVT ETIAM DOLORE AFFLICTVM] A causis dolorificis iam explicatis. Contrariorum enim contraria sunt consequentia. Tum is qui intelligit cur hypochondria sint doloris expertia, facile complectetur animo quæ sint iis dolentibus causæ ipsius doloris.

HAVD MANSVETI EST MORBI] Sed contra maligni, qui scilicet eiusmodi esse dicitur, aut quia cœtumax est atque in prauos abcessus mutatur, unde diuturnitas doloris, crebri relapsus, mors quoque ipsa; aut quia merum adfert sinistri iudicii, spem verò salutis omnino non adimit; ut verè illud videar esse dicturus, quicquid Galenus reclamet. *Quæ ex hypochondriorum doloribus febris nascitur, terrifica.*

2 Οἶδμα δὲ ἐν ὑποχονδρίοις σκληρόν τε εἶναι, καὶ ἐπώδυνον (ϕ)· κακίστον μὲν εἰ ὅρα πάντων εἶναι τῶν μολευόντων τῶν δὲ ἐκ τῆς ἐνὸς μέρεος (ϑ), ακινδυνότερον δὲ ἐκ τῆς ἀερεῶν.

At verò tumor in hypochondriis durus quidem ac dolorificus, pessimus est, si sit ab omnibus partibus. Eorum verò qui sunt unius partis, periculi minus habet qui è sinistris assurgit.

HYPOCHONDRIORVM naturaliter constitutorum, aut contrà, signa syllogistica superiore prognosi omnia sunt adducta; quorum alia petuntur ἐκ τῆς ἀσθενείας, alia ἐκ τῆς ἀσμενείας. Hic noster author ex officio sibi incumbere putavit, explicare hypochondriorum morbos unde illa πικρὰ causas ducunt; eorumque morborum naturam, symptomata, periodos, paroxysmos, & crises aperire. Sanè hic locus mirificos adfert scientiæ fructus ad comparandam τέχνην διαγνώσεως, περὶ γνώσεως, καὶ θεραπείας: quæ tria sunt medici officia in omni exercitatione medendi. Sic igitur ait summus dictator.

AT VERO] Quod est huiusmodi. Est hoc sanè aliquid, vel etiam multum, habere notitiam hypochondriorum malè constitutorum ex ardore, dolore, & inæqualitate: sed causas intelligere unde illa gignuntur, & quorsum appareant; est sanè artificis peritissimi & experientissimi.

IN HYPOCHONDRIIS] Metonymicè dictis pro visceribus hypochondriacis. Nam hypochondriorum mala quantumvis dura & dolorifica, nec citam mortem adferunt, nec illis exoluuntur criticis legibus quæ in hac prognosi continerentur, malisque hypochondriacis in ea descriptis tribuuntur. Enimvero hypochondriorum quæ adiacent cartilaginibus notharum costatum, ut cæterarum abdominis partium quæ superiarent peritonæo tunica; omnium, inquam, mala eiusmodi planè sunt qualia scribit in aphorismis. Τὰ ἀχμήματα τὰ καὶ κατὰ τὴν γαστέρα, τὰ μὲν μετώρα· κατὰ τὰ πλάγια. τὰ δὲ μὴ μετώρα· ἰσχυρότερα. i. Dolores qui ventrem tenent, cum tumore; leuissimi sunt: sine eo, grauiissimi. Ergo non omnis meteorismus dolorificus hypochondriorum, denunciat viscerum inflammationem: quoniam abdominis musculi dolere possunt, atque tumere, concepta in ipsis causa doloris atque tumoris, per distensionem propriam, & eximiam intemperiem. Nam quæ à visceribus inflammatione aut scirrho obsessis, tensio duritasque incidit in hypochondrium, per oppressionem accidit: nisi fortasse excusatio sit apostematis è visceribus in hypochondria abscedentis. Sed hypochondriorum externorum vitia, suis quæque notis certissimisque argumentis, à visceribus hypochondriacis distinguuntur.

TUMOR] i. Moles contra naturam, quæ vel humoris affluxu, vel congestionem assurgit.

DURVS] Tensione visceris, quam facit humoris crassi & glutinosi contumaciter infarcti affluentia, vel nimia abundantia. Cæterum eius duritatis contagionem ostendit hypochondrium externum, haud quidem concepta intra se duritatis causa quæ tensionem faciat: sed à viscerum oppressorum afflictione distentum. Nec verò viscerum tumor omnis, hypochondriorum duritate & meteorismo percipitur. Declarat id commemorabile illud de Hermocrate. Hypochondrij mollis distensio. Sunt enim distensio & mollitudo ἀσπλάγη. Sed ea distensio, iecoris propria est; mollitudo autem, hypochondrij. Quinetiam iecoris caui inflammatio, vix hypochondrij distensionem habet tractabilem; conuexi autem inflammatio magna, facilem exhibet in hypochondrio contagionem. Cæterum œdematis nomen omnia phymatum complectitur genera quæ consistunt in systrophe, non autem in suffusione. Hic autem coniuncta tumori duritatis & doloris accessio, systrophicam inflammationem ostendit, quæ cum rubore, calore, pulsu, renixu, & dolore cõiuncta est: quam recitantes medici phlegmonen κατ' ἐξοχὴν nominarunt.

DOLORIFICVS] Tum proprio vitio, tum alieno; ac proprio quidem, conuexarum hepatis partium distensione summa, & intemperie maxima: quæ duo glutinosi humoris præcalidi infarctui induci solent; cum accessione tussis, dyspnœæ, lateralis doloris, & iugularis. Alieno etiam vitio dolet hypochondrium ab oppressionem nimis distentum.

PESSIMVS EST] Atque in angusto spem esse declarat, officij ad vitam tuendam necessarij interceptione, doloris acerbitate, vicinarum & sociarum nobilium partium sympathia & syntimoria; tum etiam celeritate, vehementia & assiduitate, unde citra mors venit.

SI SIT AB OMNIBVS EPIGASTRII PARTIBVS] Quia quod plures partes in vitio sunt, eò res ægri peius eunt; pluribus inde labefactatis facultatibus, pluribus etiam partibus in contagionem adductis.

EORVM VERO QVI SVNT VNIVS PARTIS, PERICVLI MINVS HABET QVI È SINISTRIS ASSVRGIT] Quoniam lien officij præstantia & dignitate, ut iecori inferior est, atque minor: ita celeritate, vehementia, & assiduitate morborum ingruentium; nec adeo citam crisin habet, nec tam celeriter ac faciliè periculo locum cedit.

3 Σημαίνει δὲ ἐν ὀρχῇ μὲν τὰ τοιαῦτα θανάτον σιῦτομον. ὑποβόλλοντα δὲ τὰς εἰκοσι, τῆς πυρετῆς μῆρον (ϑ) ἐμπύησιν.

Verum tumores eiusmodi, per initia quidem nati, mortem in propinquo esse denunciant: sin autem vigesimum superent, manente febre, in suppurationem vertuntur.

NUNC hypochondriacorum viscerum per systrophem inflammatorum pericula, & crises quibus defunguntur iis periculis, explicatur. Ac sanè pericula sunt in morte citissima. Defungendi ratio in abscessu & hæmorrhagia: quamvis in abscessu adhuc periculo sit locus, neque abscessus critici hinc certa sit crisis, ut mox docebitur.

10 ERGO. TUMORES EIVSMODI.] Scilicet hypochondriacorum viscerum, non abdominis, qui neque citam mortem adferunt, nec crises recipiunt quas in hac prognosi expetendas proponit: nec vero omnes omnium viscerum tumores, sed tantum iecoris, aut vtriusque hypochondrij inflammationes per systrophem assurgentes. Nam hypochondriorum tumores sinistra tantum parte tractabiles, periculi minus habent propter lienem, ut ait Galenus.

PER INITIA QUIDEM NATI.] Non autem per diadochen oborti, neque fugaces: qualem accepimus fuisse tumorem splenicum Herophontis. De quo sic legitur apud Hippocratem, *πεντῇ αὐτῷ ἡντιν, ἡ ποσὶς ἐν τῷ σπένει, i. quinto die lien intumuit, hypochondrium distentum est.* Deinde subiungit. *Ὀκταὺν ἡντιν, ἡ ποσὶς ἐν τῷ σπένει, i. octavo die lien intumuit, mens restitui;* dolente prius hypochondrio subiecto lieni. Hic autem principij nomen refertur ad primum insultum morbi, quem *πρῶτον εἰσβολὴν* Græci vocant.

20 MORTEM IN PROPINQVO ESSE DENUNCIANT.] Mortem quidem denunciant quoniam nulla salus vitæ sperabilis in amissione officij tam necessarij, doloris acerbitate, partium nobilium sympathia & syntimoria; tum generatione perenni pravorum humorum. Citam autem: quoniam celeritè sunt crises morborum illorum qui celeriter, continenter, & vehementer moventur. Tam citæ mortis exemplum legitur in Coi sorore. *τῇ Κωὶ ἀδελφῆς ἡπὲρ ἐπὶ τῇ αὐτῆς ἑπάρει. ἑπὶ τῇ ἀπὸ τῆς δευτέρης. i. sorori Coi hepar intumuit consueti lieni modo: secundo die interiit.* Sed quàm convenienter & appositè notandum præcepit eum tumorem durum ac dolorificum *ἐν ἀρχῇ, i. ineunte morbo;* ut scilicet hepatis aut vtriusque visceris inflammatio systrophica, sit primigenia, ex affluxu nata, non autem ex collectione quam fecit obstructio. Declarat historia nepotis cuiusdam Apollonij Abderitæ, qui cum longo tempore in prava diæta vix progredereetur, *ἐστὲν τε μὲν γὰρ ἀσθενὴς, i. viscerosus,* cum hepatis dolore quotidianò, & ictero, faciei que colore subalbo; tandem oborta febre decubuit, ac trigesimo quarto morbi die interiit.

SIN AUTEM VIGESIMVM SUPERENT.] Salvis & integris ægri rebus, qui bonitate fortassis materiæ, viribusque validis, restitit ad vigesimum diem, periculoque defunctus est; nulla tamen prorupta hæmorrhagia.

IN SUPPURATIONEM VERTUNTUR.] Quam licet expetendam, sine tamen salutis discrimine expectari non potis est. Nisi enim pus album sit, minimumque fædi odoris, ac foras effundatur; semper periculo locus erit. Nam pus amurcosum, cænosum, foras effusum; lethale est. Tum pus æquale & album, si intrò perductum, cutim contra se afficiat, aut cum integritate curis aduersa naturalem œconomiam labefaciet; periculi metum & causam adducit. Caterum vigesimi lex quaternarios 40 complectentis periodus considerari solet in omnibus morbis acutis, qui à denegata excretionē, salutis aliquam spem adferunt per abscessum. Talis fuit observatio in prægrandi cephalalgia. Talis in pleuritide. Talis etiam in catarrho procumbente in ventrem superiorem.

Prætermisi quod est in hac prognosi commemorabile, nempe illud, *μένοντες ποσὶν, i. manente febre,* ut hypochondriacæ inflammationis maneat constans systrophe quæ nullam adhuc mutationem accipit suæ molis atque coloris; nec exolutione, per *διαφύρην*; nec suppurato, per concoctionem; nec scirrhum, per concretionem; nec corruptione, per gangrenam. Tot enim modis, nec pluribus, inflammatio omnis per systrophem, mutationem accipit suæ molis, characteris, atque coloris.

10 4 Γίνεται δὲ καὶ τέτοις ἐν τῇ πρώτῃ περιόδῳ, ῥῆξις αἱμαλὸς διὰ ῥινῶν, καὶ κάρτεω φέλλει. Τὰ δὲ πολλὰ κεφαλῇ ἔτοι πονέοισι, καὶ ὄψεις ἀμβλυώποισιν, καὶ μᾶλλον εἰς ταῦτα προσδέχου ἢ ῥῆξιν. ἡλικίῃσι δὲ μᾶλλον τεύχοντα πέντε ἐτέων πρεσβύτεροις δὲ ἥσσον.

Quinetiam accidit his, ut in prima periodo sanguis prorumpat è naribus, & plurimum opis adferat. Ac ferè tum caput his dolet, visus hebescit. Ad quæ intentus, profluvium magis expecta; idque inter atates ea potissimum quæ trigintaquinque annis finitur: pronectioribus autem, minus.

ALTERA hic ratio est defungendi periculo cui locus esse solet in hypochondriacorum viscerum inflammatione quæ per initia morbi, perque systrophem nata, editur. Est autem hæmorrhagia, siue profluuium sanguinis è nare κατ' ἑξῆς alterutrius visceris inflammati, quod non raro morbos exoluit qui antè lethales videbantur. Scitum est illud. *Profluvia oboriuntur sanguinis sæpe multa*: quod vetus dictum vfor-
pauit Galenus in Metone, cuius sanatio, quam per hæmorrhagiam consecutus est, etiam cum prauis signis, miraculo debet apponi. Sic igitur ait.

QVINETIAM ACCIDIT HIS] Ac si diceret, in tam calamitosa viscerum inflammatione, quæ magis terret medicum, quàm vlla spe consoletur secundi iudicij, ac penè dixerim, desperationem salutis ostendit. Accidit his quibus hypochondriaca viscera inflammatione sunt obfessa, vel, vt ipse ait, tumore duro ac dolorifico; accidit, inquam,

VT IN PRIMA PERIODO] I. Primo septenario duobus absoluto quaternariis, quorum prioris vt officium est indicandi, sic posterioris iudicandi. Non enim lege critica bene sancita; excretio vlla suscipitur quæ antè significata non fuerit; nisi fortasse quis phlegmones excusationem adferat, in qua vel ipsa celeritas mora est, idemque faciendum artificio, vel expetendum à natura, quod in ædibus incendio conflagrantibus fieri solet. Hic enim quò citius trabes & tigna extrahuntur, eò meliora ædificia restaurando seruantur. At si cremari cœperint, inutilia sunt. Ita quò citius inchoata phlegmone sanguinem reuellendo, vacuando, aut etiam coësfundendo curatur; eò facilius curationem recipit, superflue partis ipsius, quæ inflammari cœperat, integritate.

SANGVIS PRORVMPTAE NARIBVS] Translatione ad caput sanguinis multa bile perfusi: propterea quæ substantia tenuissimi, temperamento calidissimi, & qualitate acerrimi; vnde facilem
habet orgasmum, excursumque facilem ad caput, vbi, si ex natura agitur, non prius quiescit, quàm ad
extimas venarum oras peruenerit, vnde per anastomosin erumpit.

ET PLURIMUM OPIS ADFERAT] Quia systrophem inchoatam reprimat, factam exoluit, valétque ad inhibendam fluxionem concitatam, & ad vacuandam consistentem. Sed ea hæmorrhagia liberalis & libera, sic habetur optima, plurimumque opis & adiumenti adfert ad consequendam valetudinem, si fiat κατ' ἑξῆς, i. è directo, vel ad amussim, non autem ἀνὰ πλάγιν, i. è regione, vel ex opposito. Quæ de re illud extat quod ad sententiæ huius persuasionem sufficit. Τὰ ἀνὰ πλάγιν αἱμορραγέοντα κακίον; ἢ ὅτι ἀπὸ τοῦ μέγιστου, ἐκ δεξιῆς πέειν καὶ τὰ κατὰ τὸ πρὸς ἀνέρον ὡσαύτως, i. Quæ ex aduerso sunt hæmorrhagiæ male: velut in liene magno sanguinem fundere è nare dextra. Hoc theorema catholicum agnouit Galenus esse Hippocratis, quod in prorrhethico scriptum legit. Sed eius interpretatio super nomine hypochondrij, in prognostico quidem, tantum pertinet ad vtrumque viscus; in prorrhethico autem, præter vtrumque viscus, ad hypochondria externa. Sed, quod pace illius dixerim, huius hæmorrhagiæ criticæ non sunt capacia. Huc accedit, quòd in singulari numero hypochondrium nominauit, quod, κατ' ἐξοχὴν, dextrum significat; & per metonymiam, iecur ipsum.

AC FERETVM CAPVT HIS DOLET] Quoniam ex translatione caput repletur. Repleti autem capitis symptomata sunt cephalalgica: vt etiam paraphorica, cataphorica, & catarrhoica esse solent; pro varia humoris caput replentis natura, & varia partis excipientis conditione. Cephalalgia huius criticæ prognoses leguntur in Epid. prognost. prorrheth. & in Coacis decifionibus, quæ ἀνὰ πλάγιν sunt explicatæ.

VISVS HEBESCIT] Non quidem extinctione luminis oculorum proprij, profligatque splendoris per cōsumptionem humoris crystallini; qualis cernitur in oculis velut emortuis moribundorum hominum: nec verò caligatione & tenebrosa vertigine, quam σκοτεινίαν & τὸ ὀφθαλμὸς vocant (hoc enim vomitionis prænuncium est cum cardio gmo:) sed amblyopia aut marmaragibus tantum ægroto confici, non autè medico aspectabilibus. Sic enim prognosticum hæmorrhagiæ scriptum est, ἀνὰ πλάγιν αἱμορραγέοντα κακίον; ἢ ὅτι ἀπὸ τοῦ μέγιστου, ἐκ δεξιῆς πέειν καὶ τὰ κατὰ τὸ πρὸς ἀνέρον ὡσαύτως, i. Quæ ex aduerso sunt hæmorrhagiæ male: velut in liene magno sanguinem fundere è nare dextra. Hoc theorema catholicum agnouit Galenus esse Hippocratis, quod in prorrhethico scriptum legit. Sed eius interpretatio super nomine hypochondrij, in prognostico quidem, tantum pertinet ad vtrumque viscus; in prorrhethico autem, præter vtrumque viscus, ad hypochondria externa. Sed, quod pace illius dixerim, huius hæmorrhagiæ criticæ non sunt capacia. Huc accedit, quòd in singulari numero hypochondrium nominauit, quod, κατ' ἐξοχὴν, dextrum significat; & per metonymiam, iecur ipsum.

AD QUÆ INTENTVS, PROFLUVIVM MAGIS EXPECTA] Si iure & loco appareant: per transitum, non autè per progressum. Nam indicatoria quæ non iudicant, aut difficilis sunt iudicij, aut mali.

IDQVE INTER ETATES] Quoniam, quò natura & humor viam affectant, eò crifes in inclinationes fiunt. Iuuenes in secunda valetudine sanguinem profundunt è naribus à 18. ad 35. annum: in aduersa autem, si morbis acutis corripiantur, tres habent opportunitates excretionis; naturæ vim, meatuum libertatem, & humoris tenuitatem.

Τὰ μαλθακά δὲ καὶ ἀνώδυνα ἢ οἰδημάτων χρονιωτέρας μὲν τὰς κρίσις ποιέεται· ἥσων δὲ ὅσιν ἐπικίνδυνα. ὑπερβάλλοντα δὲ τὰς ἐξηκόντα ἡμέρας, τὴν πυρετοῦ μόνον ἐκπύεται.

Tumores autem molles ac doloris expertes; seriores illi quidem adferunt crises: at minus aliis periculosi. Sed hi quoque tamen sexagesimum diem superantes, manente febre, in suppuratum vertuntur.

TUMORIBVS iam explicatis qui consistunt in phlegmone per systrophem sanguinis nata, contrarij opponantur hoc loco, qui, ut illi dicitur ac doloris acerbitate molesti sunt, metúque nos terrēt ita mollitudine & doloris vacuitate mites, spem nobis adferunt secundi iudicij. Commune est quidem amborum febris: sed illorum prægrandis & ingens, quæque symptomatum vehementia, celeritate, & assiduitate, citam sapenúmero mortem venire facit: horum verò *εὐήθης*, quæque expetendam non præripit exolutionem ipsorum: sed potius cunctando ad pepasnum viam munit, materiam suppurabilem faciendo. Illorum quidem celeriores sunt crises, quibus nonnunquam ægroti periculo defunguntur; sed in angusto spes est, ac semper de morbo verendum donec conualuerit æger: horum verò seriores; sed cum spe diuite secundi iudicij. Quæ cum ita sint, hæc mihi videtur ratio explicandi.

TUMORES AUTEM MOLLES] Quorum mollitudo contraria est dicitur phlegmonarum per systrophem sanguinis obortarum. Molles autem considerantur in substantia viscerum obfessorum, non in situ aspectabilis hypochondrij, quod neutiquam in vitio est proprio, sed alieno, ut infra docebitur. Atque hæc mollitudo venit ab humore diffuso, non autem nimis coacto: cuiusmodi erant parotides tempestatis primæ 1. *ἡ δ' ἐστὶν*. *Ἡ δὲ ὁ ἔσθης αὐτῶν χαῖναι, μεγάλα, περιμέτα, ὃ μετὰ φλεγμονῆς, ἀνιδύνα.* i. Tumorum hic erat modus; molles erant, diffusi, magni, sine inflammatione, indolentes. Superuacaneum est autem id quod præter mollitudinem attributum legitur, in prognostico, tumoribus hoc loco descriptis; quod scilicet dum premuntur, digito cedant. Atque id opinionem facit tumorum in hypochondriis externis tractabilium & aspectabilium: sed falsò.

AC DOLORIS EXPERTES] Vacatione scilicet tensionis & intemperiei prægrandis, quas facere solet humor contumaciter obfessæ parti impactus, cum accessione caloris, aut frigoris permolesti.

SERIORES ILLI QUIDEM ADFERVNT CRISES] Etenim quando crisis mutatione perficitur, mutatio autem motu; quorum morborum labores continenter, celeriter, & vehemēter mouentur; citas etiam crises adferre solēt. Atqui tumorum mollium dolorisque expertium tardi sunt motus, nec assidui, nec vehēmentes. Itaque mirum videri non debet si eorum tardæ sint crises, quibus exoluantur.

AT MINVS ALIIS PERICULOSI] Quia nec tanta est muneris auocatio, nec tanta doloris acerbitas, nec tanta nobilium partium sympathia, nec denique tam calamitosa vis.

SED HI QVOQVE TAMEN SEXAGESIMUM DIEM SUPERANTES] Ac si diceret, quamuis in mouendo sint pigri, proptereaque mutationem criticam serò suscipiant, ut febris quartana quæ illam ob causam longissima est, præsertim hyberna: tamen, quoniam ita comparata est tumorum, maximè interiorum, conditio, qui in calidioribus locis & partibus stabulantur, ut nisi exoluantur digestionem, vacationem, aut suppurato; quod reliquum est, corrumpantur cum parte obfessâ; inde adeo fit ut hic commemorati tumores, virtute naturæ exactis quadraginta diebus, qui propter materiæ contumaciam finem adferre non potuerunt, nec vacuando, nec digerendo; tandem insequente prima periodo, i. primo post quadragesimum vicenarij, coctionem recipiant, & in suppurationem vertantur.

MANENTE FEBRE] Quam peperit materiæ tumorificæ inchoata putredo; necdum consistente tumore per *ἀσφόρητον* fluxionis consistentis, aut vacationem per loca lege naturæ commoda. Sed tamen ipsa febris materiam reddiderit suppurabilem ad suppuratum, caloris natini potētia & partium solidarum integritate confectum. Atque illud suppuratum crisis est tumorum contra naturam, secundum *ἀσφόρητον* expetenda. Solenne est illud, *Πάν τ' ἐκπύειν αὐτὸς ὁ σφοδρὸν ἐστὶν γὰρ πεπασμὸς, καὶ κρίσις ἀμα, καὶ ὑπόστασις*. i. Nihil quod suppurat, reuertit. Hic enim pepasmus est, & crisis simul, & abscessus.

IN SUPPURATVM VERTVNTVR] Materia suppurabili mitificata, per integritatem partis solidæ, in substantia; eiusque facultatem, in officio; vtrinque autem per calorem natium, unde conficitur pus album, æquale, & læue, quod significationem edit rerum illarum virtute & officio suppurabilem materiam mitificantium, atque exclusionem, bonis ægri rebus, perficientium.

6 Πλεμπλήσια δὲ σημαίνει τοῖσιν ἐν ὑποχονδρίοις, καὶ τὰ πλεῖστον
10 λίω, πλεῖστον ἥσων ἐκπύεται τὰ πάντα ἐκείνων ἥκιστα δ' ὑπὸ ὀμφαλόν.

Similiter autem significant, ut qui in hypochondriis stabulantur, ipsi etiam qui sunt in ventre tumores; nisi quod hi minùs quàm illi in suppurationem vertuntur, minimùmque omnium, qui sub umbilico sunt.

VT OMNIUM systropharum omniumque tumorum inde natorum sua cuiusque est propria crisis qua exoluntur saluis & integris ægri rebus: ita cōsequendæ illius criseos opportunitas, potissimum in partis obfessæ natura atque conditione consistit. Atque ut qui sunt duri ac dolorifici, per systrophem sanguinis oborti, faciliùs in suppurationem vertuntur quàm molles ac doloris expertes: ita beneficio illius criseos fruuntur celerius in visceribus, quàm in epigastrio; quod in hac prognosi docetur, quæ distinctionem continet obseruatione dignam, tumorū meteororum abdominis, & hypochondriacorum viscerum, de quibus hucusque iam institutæ sunt decisiones.

ERGO. SIMILITER SIGNIFICANT] Qualitate scilicet partis affectæ calidioris, frigidioris,

mollioris, durius, dolorificæ, aut contra dolore carentis, similiter oborti tumores significant exolutionem sui sperabilem digestionem aut suppurato, celeriore aut tardiore.

VI II QVI AN HYPOCHONDRIAS STABULANTVR] i. In iecore aut liene, duri & dolorifici, aut molles ac doloris expertes.

IPSI ETIAM QVI SVNT IN VENTRE TVMORES] Hic ventrem intelligit, non quidem promptuarium illud portionis & cibi de quo legitur aphorismus ille. *Αἱ κοιλίας τῶ ἀμύωνος σημεῖα τῶν* i. Ventres hyeme calidissimi: nec verò illum ventrem qui superior appellatur, de quo pulmonibus ac thorace dicitur aphorismo illo. *Κατὰ πόρον ἐς τὴν ἀνὰ κοιλίαν, ἐν εἰκοσὶν ἡμέραις ἐκπορεύεται.* i. Catarrhi prolabentes in superiorem aluum, viginti diebus suppurant. Sed ventrem intelligit, totum illud abdomen cum mesenterio & epiploo coniunctum, quod aphorismus ille considerandum proponit. *Οὐκ ὀσσοῖσι ἢ παρ' ὕδατος πληθεῖς τὸ ἐν κοιλίᾳ παρ' ἡμῶν τούτων ἐν ἡ κοιλίᾳ ὕδατος ἐμπυκνῶται.* i. Quibuscumque aqua repletum hepar eam in omentum effundit; illis venter aqua turget. Atque tumores ventris hoc loco commemorati, sunt illi quos alibi nominavit *ἀγχομυκταί, μετώρεσ*. His ita constitutis, quærendum videtur an ventris explicati tumores, similiter significant ut ij qui in hypochondriacis visceribus stabulantur. Quid enim? an meteo-ri vëtris tumores similia edunt symptomata, tum partis obsessæ & humoris morbifici propria, tum verò partium vicinarum & sociarum sympathica, ut hypochondriacorum viscerum haud ita pridem descripti & explicati? An cita mors venit ab epigastricis, ut venire solet ab hypochondriacis ambarum partium duris ac dolorificis, præsertim verò dextræ partis, per hepatis inflammationem systrophicam? Quid verò? an epigastricos tumores hæmorrhagia exoluit, ut viscerales? Audiamus Galenum super hac re. proposita differentem. Enimvero, inquit, tumores hypochondriorum duri ac dolorifici mortem haudquaquam breui futuram denunciant, nisi partium quoque interiorum aliqua simul affecta fuerit. Interiores verò esse novimus, iecur, ventriculum, diaphragma, lienem. Musculi namque hypochondriorum phlegmone obsesi, tollere hominem è vita non possunt, nisi, quod raro accidit, vel magnitudo phlegmones eximia fuerit, vel imbecilla admodum vires, vel perperam æger curetur à medicis, vel ipse in comoda sua peccarit. Nam hæmorrhagia similis ratio esse non potest in epigastricis, ut in visceribus hypochondriacis. Ergo non similiter epigastrici tumores significant, ut viscerales. Quamobrem similitudo illa non ad omnium partium obsessorum conditionem debet referri, tam interiorum, quam exteriorum; nisi tumorum etiam distinctio adiungatur, ut in prognostico fecit his verbis: loquitur autem de mollibus. *Εἰ δὲ ὑποχόνδριον ἐξήκοοντα ἡμέρας, ὅτε πυρετὸς ἔχων, καὶ τὸ εἶδημα μὴ κατὰ στήθεον ἐμπύον ἐστὶν, σημεῖον καὶ τὸ πῶν, καὶ τὸ ἐν ἀλλῇ κοιλίᾳ καὶ τὸ αὐτῆς.* i. Quod si sexaginta dies febris excesserit cum tumore non subsidente, pus factum hinc tri significat; tum si in reliquo ventre fuerit. Ergo similitudo illa tumorum pertinet ad ædemata mollia & indolentia, tam abdita, quam meteo-ra, & in abdomine consistentia. Similiter enim hæc ut illa nascuntur, ac similiter exoluntur, si tantum exceperis suppurandi opportunitatem quæ maior est in visceralibus, quam in epigastricis: quod sequentia verba declarant.

NISI QVOD MINVS HI, QVAM ILLI IN SVPPVRATVM VERTVNTVR] Quod sanè falsum esset de phlegmone epigastrica per systrophem nata. Hæc enim suppurato sanescit, nec suppuratum morte antecurrit; ut hypochondriaca interior, quæ ipsa per se funesta est, nisi hæmorrhagia primis periodis, aut post vigesimum diem, suppurato, periculi locus tollatur, si convenienter fiat & exeat. Tumores autem molles dolorisque expertes, meteo-ri quidem, rariùs in suppurationem vertuntur, quam interiores, tum hypochondriaci, tum reliquarum partium ventris: quod materia frigidior in abdomine diffusa, non faciliè fit suppurabilis à calore febrili, nec tam faciliè suppuratum concipiat virtute caloris natiui, quam quæ in visceribus, reliquoque ventre interiore stabulatur.

MINIMUM QVE OMNIUM, QVI SVB VMBILICO CONSISTVNT] i. In hypogastrio vel aqualiculo, quæ pars adiposa longissimè omnium abdominis partium distat à fonte vivifici nectaris, nec tam plena manu syrphoen recipit, quam superiores. Huc pertinet illud. *Τοῖσιν ἐμπύονμασιν ἐν ὁσφί, ὅρος.* i. Empyematus umbilicus terminus.

Malè fuit.
καὶ γίνεται δι-
ταῦτα μὲν ἐν χυ-
τῶν τῶ δὲ αὐτῶ
καχυμῆτος.

7 *Τῶν δὲ ὀνὼ ἐμπυηματῶν, τὰ μὲν ἐν χυτῶν ἐστὶ συλλεγόμενα, τὰ δὲ ἐν σπλάγχνοις καχυμῆτα.*

Suppuratorum autem quæ sursum sunt, alia quidem in tunica stabulantur collecta, alia verò sunt in visceribus ipsis diffusa.

HACTENVS de natura, symptomatis, periodis, & paroxysmis tumorum hypochondriacorum & reliqui vëtris. Quin etiam patefactæ sunt crises quibus periculi locus tollitur, ac spes salutis affulget quæ in angusto erat, si iure & loco illæ crises suscipiantur & fiant. Enimvero tumorum hypochondriacorum, hoc est, iecinoris, aut lienis, aut utriusque, qui duri sunt ac dolorifici, ut esse solet omnis systrophica phlegmone, defungendi periculo ratio primùm posita est in libera & liberali hæmorrhagia quæ primis periodis prorumpit κατ' ἑξιν alterutrius visceris, aut utriusque obsessi: non autem αὐτοπαλιν. Hæc si desit, nec breui ad exitum præcipiter æger, sed validarum virium beneficio, symptomatum calamitosam vim sustinere possit ad vigesimum usque diem; suppuratum erit in promptu quod ægrum ab interitu vindicabit si eiusmodi sit, ut qualitate puris, copia, tempore, & excernendi modo, medici operatis respondeat. Nam hypochondriacorum viscerum tumores qui & vna sunt molles, & vna doloris expertes, periculi minus

riculi minus habent, quamvis eorum sit tardior crisis. Hi etiam suppurato finiuntur, nisi ante sexagesimum diem exoluantur. Reliqui autem ventris tumores qui phlegmonem systrophicam præ se ferunt, atque doloris acerbitate ac duritate se produnt, ut non sunt ita perniciosi quam hypochondriaci, nec similiter ut illi per hæmorrhagiam exoluantur: ita suæ molis mutationem suppurato & expurato recipiunt, tum epigastrici, tum hypogastrici. Molles verò similiter ut hypochondriaci terminantur, nisi quod pettarò in suppurationem vertuntur, præsertim ij qui sub umbilico nascuntur, parte illa scilicet quæ adiacet pubi, quam veteres ἡπρον καὶ παυροσπριον nominarunt. Hæc fuit nostri authoris ὁρίσιν in ea disputatione quam hæcenus instituit de tumoribus viscerum hypochondriacorum, ac cæterarum partium quæ in abdomine continentur. Nunc sequitur ut suppurati, quod ipsis tumoribus mutationem attulit, conditiones, unde & quorsum appareant, explicentur. Ac primum de hypochondriacorum tumorum suppurato dicendum. Dicendi autem methodus & ratio sic ab authore præscripta.

SUPPURATORVM AUTEM QUÆ SVRSVM SVNT] i. Abscessuum purulentorum qui phlegmonarum per systrophem obortarum mutationem ex pepasmo aut putredine attulerunt, vel ad interitum, vel ad salutem. Ergo. **SUPPURATORVM**] Quæ fecit pepasmus, si bona sunt; vel corruptio ad gangrænam, si mala atque mortifera.

QUÆ SVRSVM SVNT] i. Quæ stabulantur in suprema regione abdominis ubi sunt hypochondria, ventriculus, diaphragma, iecur, & lienem circumplectentia: sic enim τὰ ἀνω vertenda duxi, ex mente authoris quæ spectat corporis dimensionem in longum, non in profundum. Αἷματις δὲ ῥῆξιν μάλα καὶ αἰσθητὰ πόνον παροξύνεται χεῖν. i. sanguinis eruptionem è supernis præsertim partibus oportet expectare. Ac, sicut, Latine dixi cum M. Tullio, qui nares & oculos sursum esse tradidit lib. 2. de nat. deor. Iam verò consilium illud fuit authoris primum de suppurato agere viscerum hypochondriacorum phlegmone systrophica obfessorum, quod & illa omnium suppurati capacissima sunt, nec minus à suppurato metu nos terrent, quam spe salutis consolantur, si tale id non sit, quale mox optimum describetur.

ALIA QUIDEM IN TUNICA STABVLANTVR COLLECTA] i. Alia quidem simplicitè à pepasmo nata sunt & edita, subque consistunt loco, virtute naturæ cōglomerata. Eiusmodi autem sunt quæ, mitigata phlegmone, in tunica obfessi antè visceris continentur, non in substantia ipsa. Atque ea sunt colore alba, ex integritate partium solidarum; lævia, ex virtute caloris insiti sese in omnes materiarum partes æqualiter insinuantis; æqualia, bonitate ipsius materiarum pepasmi capacis. Hunc autem locum misere corruptum, ac velut carcinoma insanabile execandum, sic restituendum putavi ex alio loco, cuius verba hæc sunt. Οὐότοι τὸ ἥπαρ ὁρίσινον κελύεται, καὶ μὴ τὸ πύον καθαροὶ ῥυῖ καὶ λευκοὶ παρέρχονται. ἐν χιτῶν γὰρ τὸ πύον πύεται ὅτι. καὶ δὲ ἀμυρῇ ῥυῖ ἀπόλλυται. i. Quibuscumque purulentum hepar vititur, si quidem putum pus inde fuit albumque; seruantur (nata huius romica conclusum tenetur:) si amurcosum, moriuntur. Quod autem ait bene collecta videri, non diffusa; quorsum hæc fiant, ne bis idem mihi dicendum sit, mox explicabitur in ea prognosi quæ huic citima est.

ALIA VERO SVNT IN VISCERIBVS IPSIS DIFFVSA] Quæ loco & situ mala sunt, ne dicam funesta; ac loco quidem, quia sunt ἀμυρῶδη, βορβορώδη, i. amurcosa & cænosa, partis corruptæ certissima argumenta: situ autem, quia diffusa; cuius diffusionis vitia sequēs prognosis indicabit.

8 Θανάσιμα δ' εἶναι αὐτῶν ὅσα αὖ εἰσω ῥαγῇ. τῶν δὲ λοιπῶν ἐμπυημαίων, τὰ μὲν ἔξω ῥηγνύμενα, βέλπισον μὲν ὡς ἐλάχισον καὶ ὀξύτατον συλλέγεσθαι.

Abscessuum predictorum lethales sunt illi qui pus effundunt intus. Reliquorum autem suppuratorum quæ foras abscedunt, principem locum obtinet quod ut brevissimè, sic acutissimè est collectum.

EST ILLVD verè positum, manetque ad vnum firma consensus medicorum. Omnia quæ magisterio naturæ sunt in pepasmo & excretionem, cocta secerni, secreta excludi quod ipsa natura viam affert per loca ex sese commoda, nec ex euentu incommoda. Sunt quidem ἡ πεπασμοὶ καὶ ἀπὸ πόνων πάσης ὁπίας. Sed illi pepasmi ἔξω ἢ εἰσω ῥέπειν, ἢ ἀλλῇ ὅπῃ δέ. Atqui omnium supernacaneorum humorum expectanda concoctio est, quod ea celeritatem & securitatem crisis denunciet: ita potissimum oranda venit ea quæ conuenienter naturæ fieri solet exclasio, quod scilicet natura ipsa cursum inflectit. Ergo quemadmodum suppurata viscerum hypochondriacorum quæ in ipsorum tunica sunt collecta, certam opinionem faciunt victricis naturæ in coquendo: ita spem adferunt secundæ criseos in excernendo, quod illa inoffenso cursu excludantur foras per cutim sine vlla viscerum offensione. At verò prædictarum partium suppurata diffusa, non autem collecta, ut omnia ferè sunt impura, ac magis à corruptione nata quam à pepasmo, propterea quæ pessima, ne dicam, lethalia: sic etiam maiore motu terrifica esse solent, effusione non tam purulenta, quam virulentæ materiarum, quæ intorsum delata, non minus ruinosæ est partibus per quas fertur, quam illis unde manat noxam contractam ostendit. Atque hic scopus est nostri authoris, quod dirigit institutam prognosin.

ABSCESSVM PRÆDICTORVM] Qui attributi sunt visceribus hypochondriacis, quorum

alii in tunica stabulatur collecti, alij verò sunt in visceribus ipsis diffusi; ac post vigesimum diem nati ex phlegmone dura, systrophica, & dolorifica; aut post sexagesimum, ex tumore partium illarum molli, ac doloris experte.

LETHALES SVNT QVI PVS EFFVNDVNT INTRQ] Sanè quidem, tum superstitie vitio partis obsessæ cuius officio vita carere nequit; tum succrescente noua offensione partium virulentam potius, quàm purulentam materiam excipientium, vnde labefactatur coquendi vis in ventriculo, distribuendi in ieiuno, excernendi in crassioribus intestinis, quibus virulentum pus illud vlcericum esse solet. Hinc dysenteria crudelis quæ fractis iam viribus immisericorditer ægrum exercet.

CÆTERORVM AVTEM SVPPVRATORVM] Quænam hîc nominat cætera suppurata: ea videlicet quæ aliò quàm hæc, modò explicata, cursum insectunt, virtute naturæ foras exclusa, nò autem sua sponte introrsum dilapsa: cuiusmodi sunt ea quæ in viscerum tunica stabulantur collecta, non in visceribus ipsis diffusa. Empyema verò nominare consuevit omne partium omnium phyma quod in pus alteratū est: quauis empyici per antonomasiam dicatur, quibus collectū pus est in capacitate thoracis.

QVÆ FORAS ABSCEDVNT] Virtute naturæ, meatuum libertate, & accurato pepasmo.

PRINCIPEM LOCVM OBTINET] i. Præclare ad salutem apparet & facit, omnèque tulit punctum inter phymata suppurata.

QVOD VT ANGUSTISSIME] i. Breuissimo circumscriptum loco, partium vndique circumiacentium optima conspiratione, pus ipsum vndiquaque propellentium.

SIC ACVTISSIME EST COLLECTVM] Hoc enim maiores denunciat opportunitates validarum naturæ virium, liberorum meatuum, & puris exquisitè mitigati. Sed tamen crudorum phymatum lōgè alia ratio est. Quò enim latius diffusa sunt, eò meliora sunt; nec ita sunt dolorifica, nec ita corruptioni & gangrænæ obnoxia. Libet adscribere quæ super suppuratorum phymatum conditione scripta sunt in prognostico. Τὰ δὲ δισπνήματα αἰδὲ χειρὸς σκέπησθαι τὰ ἐντὺ θιν. Οὐκ οὐ μὴ ἔξω τρέπεται· ὅρσις δὲ μὴ πῖ ἔοντα καὶ ὡς μέλιστα ἐκκλίνοντα ἔξω, καὶ ἐς ὅδῃ ἀποκαρπύμενα. τὰ δὲ μεγάλα πῖ ἔοντα καὶ πλατῖα, καὶ ἥμισυ ἐς ὅδῃ ἀποκαρπύμενα· κάκιστα. i. empyemata considerare sic oportet. Quæcumque foras conuertuntur, optima sunt, si parua eminent acuminata: magna verò, & plana, minimūque turbinata; pessima.

9 Τῶν δὲ εἶσω ρηγνυμένων βέλπισον ὅ,τι αὐτὸ μὴτὲ πόνῳ, μὴτὲ ὄγκῳ, μὴτὲ χρώματι διάδηλον ἔξω ποιέη· τὸ δὲ εἰς δυνάμιν κακίσον.

Sed tamen eorum quæ introrsum feruntur, optimum quidem illud quod neque dolore, neque tumore, neque colore conspicuum quicquam foris exhibet. Contrarium verò pessimum.

ENIMVERO phymata purulenta viscerum hypochondriacorum, terrifica esse debent quæ introrsum funduntur. Quòd si ad illam symptomatum calamitosam vim, cum virium infirmitate cōiunctam, accesserit signorum, quæ συνεδρεύοντα Græci vocant, concursus cum summa difficultate curandi, velim potentia potius; inde salutis desperatio esse debet.

Conc. super-
tior.

Ergo. SED TAMEN] Correctio est illius prognoscos in qua scriptum erat. Suppuratorum quæ introrsum sunt, illa demum lethalia esse quæ intrò funduntur. Est autem hic scopus authoris; omnia quidem cuiusmodi periculosa esse phymata purulenta, ob eas sanè causas quæ iam sunt explicatæ: sed tamen inter ea, minimum periculi secum adferre.

OPTIMUM QVIDEM ILLVD EST] Non specie quidem bonum, tantum abest vt optimum, quod absolute scriptum significat id in quo bonitatis summa sunt omnia, vt hypochondrium optimum, sudor optimus qui ex toto morbum tollit, bonus autem qui facit vt æger alacrius ferat morbum: sed optimum, comparatione aliorum quæ omni ex parte pessima sunt. Sic latronum optimus dici solet, qui inter suos æquales est minimū malus. Ac talis loquendi modus frequens est apud Hippocratem. Erit igitur hîc, βέλπισον, idem quod ἡσπὼν ὀλέθριον.

QVOD NEQVE DOLORE] Quem facit distensio & dyscrasia prægrandis ab humore contumaciter parti impacto, cum accessione frigoris aut caloris eximij.

NEQVE TUMORE] Tractabili, & aspectabili mole cōtra naturā, cum inæqualitate partis obsessæ.

NEQVE COLORE] Ab humore tumoris quo ipsa pars fucatur simulatque tumor affurgit. Nam qualis humor non refluit, talis & color lucet in cute.

CONSPICVVM QVICQVAM FORIS EXHIBET] i. Cutim contra se non afficit, nec vllam eius mutationem adfert in colore, caractere, & mole. Atque hanc phymatum purulentorum expectendam conditionem si intrò rumpantur, his verbis descripsit Hippocrates. Αἰεὶς δὲ μὴδὲν ἔξω χεῖρον δεικνύοντες· αὐτὰ δὲ περὶ σπλάγχνων, καὶ ἀσπλάγχνων, καὶ πᾶς τὸ ἔξω χεῖρον ὁμοχρῶος φαίνεται. i. Tumores sunt illi optimi qui externas partes non attingunt, sed sunt suspensi, non dolentes, cum æquabilitate externæ partis.

CONTRARIUM VERO PESSIMVM] Sic enim geminatur malum quod ipsum per se in alterutra parte grauissimum est. Nec verò in hoc cuniculoso vlcere locus relinquitur σφραγιστός, qua vna curatio vlcere duce natura suscipitur atque absolvitur. Nihil enim crescit quod suæ accretionis fundamentum & basin non habeat. Ac talia vlcera oppositarum partium erosione nata, verè sunt ἔμμορτα: qualia leguntur.

qualia leguntur nephritica, in quibus & vnà pus foras erumpit, & vnà purulentæ redduntur vrinæ. Vi-
de Hipp. lib. *de morbo crasso*.

IO Τῶν δὲ τυτῶν διὰ πᾶχος πύς, & διασημαίνει.

Existunt tamen horum nonnulla, quæ ob crassitudinem puris, nihil tale ostendunt.

BENE RES eunt quando naturæ potentia phymata purulenta reguntur ad vacationem puris intrò aut foras. Malo sunt loco res ægri, quando humoris dominatu sursum deorsum, foras introrsum, vacationis inclinatio fit. Sæpe autem accidit, vt irrita sit quæ pariter æqualitèrque intrò & foras cursum inflectit vacuatio. Nec verat quo minùs periculosa sit vltèr citròque fluctuatio, quamuis non appareat ex mutatione coloris, characteris & molis in cute opposita. Est enim calamitosa omnis materiæ morbificæ intenrata propagatio: quia fit *ἡ δὲ λόγος* naturæ & *ἡ λόγος* morbi. Μετάπλησις autem, i. *transitus*, in bonis ducenda, quamuis non eò perueniat quò natura cursum inflexit. Iuuanda est igitur arte natura, vt exitum habeat pus quòd propter crassitudinem, partiumque quæ repit densitatem, in conspectum venire non potest. Enimuero aspectabile & tractabile suppuratum, non magnam requirit à medico industriam; diligentia & fide tantum est opus. Quod autem in occulto later, non nisi à scientie animaduerti potest, nec nisi ab eo in quo summa sunt omnia industriæ & exercitationis. Ratio cognoscendi abditum phyma purulentum, posita est primùm in distinctione criticarum periodorum, deinde in obseruatione signorum antecedentium, consequentium & adiunctorum. Etenim pleuritis *ἀπὸ* quæ sanguinis detractione, diata, & fotu nihil concessit; decimoquarto die fit purulenta. Phlegmone *ὀστροφική* viscerum hypochondriacorum, mutationem accipit suppurati intra vigesimum diem. Doloris acerbitas versa in grauitatem, liporhymia & syncope, febris de nocte recrudescens, interdiu mitior; postremò rigor qui antè non erat, nouissimè crebrò citatus, idque *ἀπὸ* certissima sunt argumenta phymatis purulenti in abdito stabulantis. Hanc *διὰ γὰρ τούτων* rationem traditam legimus à dictatore nostro, tum in prognostico, tum in Coacis decisionibus iam explicatis. Solenne est illud. Πῶς ἀπὸ *τῆς ἀφ' ἐλκῶν*: vbi per prolepsin *τὰ ἑλκῆα* vsurpantur pro ipsa vomica nondum pus euomente. Quod autem ad huius prognoseos enarrationem attinet, repetenda est Galeni interpretatio ad aph. 41. 6. Nos purulenta in abdomine phymata, nihil conspicui in cute habentia, sæpenumero scilicet, ducente Deo, curauimus aperta vomica per *μετέπλησιν* eò delara atque collecta, secuti eam *διὰ γὰρ τούτων* rationem quam ab Hippocrate hauseramus; vt in clarissima fœmina D. Dantragues 1555.

II Τὰ πρὸς φάτα τῶν ἐν τοῖσιν ὑποχονδρίοισιν ἐπαρμάτων, τῶ μὴ οὐ φλεγμονῇ ἢ, καὶ τοῖς ἀπ' αὐτῶν πόνοις, λύει βορβορυγμὸς χρομόμος ἐν ὑποχονδρίῳ, καὶ μάλιστα μὲν δις κπείσων δι' ἕρπον καὶ διαχωρημάτων. εἰ δ' ἢ μὴ καὶ αὐτὸς διαπεραιώδης. ὠφρῆϊ δ' καὶ αὐτὸς ὑποκαταβάς ἐς τὰ κάτω χρεῖα.

Tumores hypochondriorum recens obortos, inflammationis expertes, & inde dolores natos soluit borborygmus fremens sub hypochondrio: maxime si aut ipse per se secedat, aut cum urinis & deiectionibus: quin iuuat is ipse, si modò descendit.

FACILIS ex sese propositio, sententiæ conceptu, & vsu verborum, facilitatis amplius accepit à Galeni commentario vno ex iis quos edidit in secundum prognostici, cuius ipsa vicesimaquinta est; & altero ex iis quos scripsit in quartum aphorismorum, vbi septuagesima quarta legitur. Alleuiabo ipse lectorem pœna adeundi librum, si monuero; *ἐπαρμάτω* hic esse, prognostici *κυστώματα*, à quo affectu *ὑποχόνδρια* *μυώεα* quartus aphorismorum appellauit; *πρὸς φάτα* etiam hic, quæ illic *νιάρα*. Quod ad rem facit, vt & illud; ABESSE INFLAMMATIONEM; quo intelligamus tumoris materiam esse, non humorem crassum & viscidum qui inueteratorum est, non biliosum ardentem qui inflammationem facit; sed bilem pituitamve, alterutram aut vtramque, vel etiam flatum permixtum his aut ab eis secretum; siue hunc, siue illarum vnā, aut alteram, siue ex omnibus simul; mire, facilem, sola peccantem cruditate, neque ipsa vix emendabili, qualis intemperiei intestinorum hecticæ soboles existit, non nūper exortæ, ac sese dantis in conspectum, quæ proponitur. Propterea offert sese aliud agentis ratio cur borborygmo (quod est effectum nomen à murmure infra detrusi flatus) siue secedente, *διὰ γὰρ τούτων* siue saltem descendente, *ὑποκαταβάς*; cum scæcibus aut urinis, vel ipso per se, vt erit conditio materiæ conclusæ hypochondrio, subidet & æquatur. Nimirum quia de ea vnde tumor assurgit materia, tan-

tum eo deducitur. Vt borborygmo protinus non exoluatur tumor; at breui exolutum iri arguit, victo-
riæ testis nativo calori aduersus humorem partæ: contra quam in σπύσσω, cum intestina contorquentur
à flatu sursum reuoluto; quod eius natura fert, cum potiore nostra non vincitur.

Progrediendum vltcrius. Nam in febre hæc si notantur & fiunt, decubitus habent materię febri-
lis in iecoris sedem, vnde borborygmo exclusa, mutationē adfert criticam salutarem *ἀποτοκός τις ἐστὶν*,
i. *decubitus in effluxum*: ibi ex aduerso cunctata & putrescens, morbum morbo, periculosiorem pericu-
loso fuerat additura.

12 Σφυγμὸς ἐν ὑποχονδρίῳ μὲν δορυβὺς ἀσχετὸς καὶ μαλ' ὅπως πικρὰ κινέωνται.

*Pulsus in hypochondrio cum perturbatione; dementia est: magisque
si oculi crebro mouentur.*

SEQUITUR post historiam phymatum hypochondriacorum, nunc de ipsorum sympathia di-
cendum quam habent cum propinquis sociisque partibus, tum iure ipso vicinitatis & societatis, tum
etiam translatione aut propagatione humoris morbifici. Magna est sympathia cerebri & diaphragma-
tis, magna item ventriculi, maximèque oris ipsius; tum generis similitudine, tum operis societate, tum
etiam vasorum communione; ex eaque sympathia nascitur earundem partium syntimoria, qualis esse
solet principiorum & propaginum. Primum igitur de sympathia cerebri prognosin instituit.

P V L S V S] i. Arteriæ micantis ictus ægroto molestus, tum propter arteriæ ipsius plenitudinem par-
ticularem, tum propter angustiam loci in quo liberè micare solebat, & libertatem ademptam à phle-
gmone per systrophēn nata. Atque in hac significatione, pulsus nomen non rarè scriptum legitur, vt
in pulsu hæmorrhagiæ, abscessus, delirij, qui aspectabilis est medico, & dolorificus ægro: vt omnium
medicorum opinio fuerit id vnum significari pulsus nomine, quod modò expressi. Sed aliam quoque
opinionem mihi faciunt alia scripta Hippocratis quæ pulsus nomen significare ostendunt liberam mi-
cantis arteriæ diastolen atque systolen, sine ictu & percussione partium circumiacentium. Ac talem pul-
sum tractabilem esse medico in extimis partibus, non aspectabilem, nec verò percipi posse ab ægro nisi
admota manu.

IN HYPOCHONDRIO] Alterutro vel utroque: quamuis κατ' ἐξουίαν singularis numeri hypo-
chondrium de dextro dicatur. Ergo qui in hypochondrio pulsus inest, quod in prognostico scriptum
est, vt omnis tollatur opinio pulsus extraordinarij musculorum abdominis.

CUM PERTURBATIONE] Mentis & animi; non autem, vt Galenus voluit, metu periculi
quo non minùs exterrantur medici, quàm is qui ægrotat. Etenim talis perturbatio ducta ex metu illo,
nullam delirij opinionem facit. Sed ea perturbatio mentis quam πᾶσι καὶ ἀσχετὸς vocant, qua stupent
attoniti, visisque mendacibus, falsisque opinionibus percelluntur; certissimum est iamiam futuræ de-
mentię argumentum. Ergo pulsus, vel palpitatio (sic enim loquitur in Sileno) quæ inest in hypochon-
drio per metonymiam dicto pro partibus quæ intrà sitæ sunt, cum perturbatione animi qualem descri-
psi, vt inde suscipientis causæ præparatio demonstretur habilis ad excipiendam vim efficientis.

DEMENTIÆ EST] Id enim significat τὸ ἀσχετὸν, eodem spectans in hac prognosi, quò in
prognostico illud μαλ' ὅπως πικρὰ κινέωνται: qua voce nihil maius in vilo delirij genere dici potest. Tamen si
τὸ ἀσχετὸν, transitus est ad τὸ φρενιτικόν: vt etiam transitus esse solet à sympathia in idiopathiam. Testis
est illa prognosin non ita pridem explicata. Qui cum æqualitate faucium in acutis dolores ἐστὶν strangulatus ad-
sunt, nec oscitanti os facile cogitur, quamuis æquali; deliratio est, indeque phrenitici desperati. Hic autem dementi-
tiæ causam efficientem in phlegmone systrophica diaphragmatis positam esse docet. Nam diaphrag-
matis inflammari sua etiam phrenitis esse solet, vt cerebri: ex eoque euentu veteres diaphragma, πᾶσι
φρενιτικὸν nominarunt. Eius phrenitidis decissionem nobis attulit illa prognosin. Quibus acuta vox, ius hypo-
chondria intrò sursum reuulsa sunt. Tum illud quod ea de re scriptum legitur lib. 3. καὶ ἐν ῥέσσει. Ex aliis quoque
morbis dementes euadunt. Sed illis dolet diaphragma, vt tangi vereantur & formident.

MAGISQUE SI OCULI CREBRO HVC ILLVC VOLVANTVR] Hinc scire licet τὸ
ἀσχετὸν, κατὰ φρενιτικὸν vsurpatum αὐτὸ τὸ φρενιτικόν. Etenim cum dissimilitudo morum quam ferocitas
denunciat, in nullum aliud delirij genus cadat quàm in phrenitidem; palam est, oculorum crebros & in-
decoros huc illuc coniectus, etiam nullo proposito aspectabili; ferocitatis cuiusdam signa esse: quæ
deprauatio, quoniam τὸ ἀσχετὸν nuncia hic esse dicitur, non dubium est quin τὸ ἀσχετὸν idem sit
quod τὸ φρενιτικόν, ἢ τὸ μαλ' ὅπως: sicut author scripsit in prognostico, πᾶσι μαλ' ὅπως ἐστὶν. Etenim vt linguæ
tremulæ signa sunt haud solidæ mentis: sic etiam oculi crebro huc illuc indecore coniecti, qui scilicet
nostra sponte in nullum aspectabile coniciuntur. Atque hi linguæ & oculorum deprauati motus, non
nisi per epigenesin phrenitidis accidunt. Nam cerebro inflammato, non potis est oculos lingamve
quiescere: quia partes illæ proximè absunt à cerebro. Porro autem vt frigoris proprium est partes ipsas
in mouendo pigras & segnes reddere: ita caloris illa vis esse solet vt continenter moueat, nec vllam
quietis partem impertiat.

13 Καρδίας πόνος, καὶ σφυγμὸς ὑποχονδρίων, πυρετὸς ἀειψυχέρης κακόν. ἄλλως τε καὶ ἐφιδρώσιν.

Stomachi dolor, & pulsus hypochondriorum, febre extincta, malum denunciant: idque cum alijs, tum in sudatiuncula.

HIC VICINARVM partium sympathia per progressum consecutaria, cum magnitudine affectionis unde ipsa venit, proponitur. Sympathia cernitur in dolore stomachi; magnitudo affectionis in pulsu hypochondriorum & febre extincta, cuius extinctio falsò creditur ex partium extimarum perfrigeratione. Exolutionis autem vel oppressionis signum est ἐφιδρώσις, i. sudatiuncula.

Ergo. STOMACHI DOLOR] i. Cardiognmus, quem facit bilis acerrimæ morsus & vellicatio in ore ventriculi, quod stomachum Latine expressimus. Eius autem bilis generatio perennis atque perennis affluxus venit à iccore inflammato: qua de re alijs satis iam multa.

ET PULSUS HYPOCHONDRIORVM] Qui est magnæ inflammationis signum inseparabile, cuius inflammationis eximie consecutarius est ille stomachi dolor, ac singultus; non autem cuiusvis. Distinctiones autem causarum cardiognmi & singultus alibi sunt explicatæ. Est enim singultus, symptoma tunicarum ventriculi concussarum ad excutiendum id quod ipsis tunicis contumaciter adhærescit: cardiognmus autem & cardialgia, oris ipsius acerrimi sensus, quod inde καρδίας veteres nominarunt, aph. 17. & 65, lib. 4.

FEBRE EXTINGTA] Ad verbum, perfrigerata, ex vacatione caloris partium extimarum, quæ quia sunt alioz, opinionem faciunt exolutæ febris: sed falsò. Nam Pythioni Thasio visa est crebrò talis dimissio febris: sed idem paulò post αἰετημαθὴν ἐπὶ τῷ χεῖρὶ, i. in peius, ac decimo die interiit. Sic etiam Philiscus tertio die morbi visus est febris expers, obiit sexto. Itaque diorismus hic veterum fuit super dimissione febris vniuersali & critica, ut ea verè exoluta dicatur quicuisse, non refrigerata esse: quoniam non in febrili calore superficiei, febris natura & focus habetur; sed in ardore poris partium interiorum. Sic enim mortiferus causus interiora perurit, exteriora verò ne modicè quidem calefacit. Idem quoque faciunt lypyriæ febres. Quæ causa est cur in prothetico ad huius prognoscens veritatem còsideratè & appositè proposuit τὰ ἐγκαταλιμνησμένα καὶ ῥέοντα ἐν ὑποχονδρίῳ, πυρετὸς ἀειψυχέρης, i. residuos in hypochondrijs ardores, febre refrigerata. Sed parem vim habet ad demonstrationem, commemoratus hoc loco hypochondriorum pulsus ægroto molestus ac dolorificus, ex icu micatis arteriæ quæ amplius liberè, ut solebat, micare nò potest; ob interapedinis suæ angustia & libertatè ademptà à phlegmone visceris per systrophem nata. Est præterea inflammationis eximie signum inseparabile, pulsus ægroto permolestus ac dolorificus.

hist. 5, 52.
3. Epid.
hist. 2, Epid.

MALVM] Inflammatione partis quæ homini necãdo ipsa per se satis est, ac mortem in propinquo sæpe denūciat; tum accessione & successione symptomatum grauiorum, ut cardiognmi & singultus, quæ tantum inflammationis eximie consecutaria esse solent. Inflammationis autem magnitudo cernitur in pulsu & frigore partium extimarum.

IDQUE CVM ALIAS] i. Semper suapte natura, & iure viciniratis ac societatis partium vicinarum atque communium.

TVM VERO IN SVDATIVNCULA] Quæ, ut omnes exiguæ causæ criticæ, pessima est; tum verò funesta, quando exudat vitio & resolutione partium solidarum sic effectarum ut sibi alibilem succum assimilare non possint, sed elabi diffleretque sinant. Est autem ephidrosis, illa sudatiuncula qua roscidum est tantum caput, ceruix, & thorax, aut etiam quæ perexigua toto exudat corpore. Cæterum prognosis hæc iecoris propria est; ut superior, diaphragmatis.

proth. 7.
lib. 1.

14 Ες ὑποχόνδριον ἐμπίπτοντα ἀλγήματα, ἄλλως τε πονηρόν, καὶ ἐν κοιλίας καδυζαίνει. Κακίῳ δὲ ἐν ὀλίγῳ γινόμενα, καὶ τὰ παρ' αὐτῶν ἐκ τούτων κακοήδεα, καὶ τὰ ἄλλα ἐκπύματα.

Quæ cadunt in hypochondrium dolorifica mala, cum alijs praua sunt, tum verò si faciunt profusiores aluos. Peiora autem quæ breui nascuntur. Tum quæ assurgunt ex his paratides, multum terrifica, ut cætera expurata.

HIC GENVS aliud symptomatum explicatur, quæ phlegmonatum systrophicarum in hypochondrijs obortarum per progressum consecutaria non rarò esse solent. Sunt autem paratides, & alui profusio, quæ inde nata, omnino terrifica esse debent: quia verè criseos exculationem nullam habent. Quod ut perspicuum fiat, hæc mihi videtur ratio enarrandi.

QUÆ CADVNT.] Ad verbum, quæ incidunt, vel sua sponte, vel cum prævidentia. Ac sua sponte, orgasmo effertur materiæ, qui vel inueterationem habet generationis, vel repentè coortus est. Cum præ-

videntia autem, primigenia, ex diata vitio in victus ratione, & vitæ instituto; succedanea vero, per
transitum alicuius morbi qui primigenio periculiosior esse solet.

IN HYPOCHONDRIVM] Scilicet dextrum, κατ' ἐξοχην ita dictum, & per metonymiam, in he-
par: idque convexa eius parte, aut caua.

Corr. 35.1.13
proth. 21.
f.1.1.

DOLORIFICA MALA.] Tumores duri & dolorifici, vel inflammationes per systrophem nate, quarum symptoma extremum dolor est: ut eo nomine dolorifica causa significetur, i. phlegmone ipsa, ut in illa prognosi iam explicata. Ex hypochondriorum doloribus nata febris, mala.

CUM ALIAS PRAVA] Ne quid acerbius dicam, doloris vehementia & sympathia vicinarum ac
solarum partium, febre acuta, vnde grauissimorum symptomatum vis, saepe etiam cito mors venit.

TUM VERO SI FACIUNT PROFVSIORES ALVOS] Quæ paulo antè reddebāt *μετὰ πνευμάτων, καὶ χολώδων ἀκρῶτα*, i. deiectiones pilulatas *ἐν βίλοις* mēras: nunc autē feruntur chylofis-
cibus ab inflammatione iciuni, aut saniosa proluvie; cū ab inueteratione causæ morbificæ iam tædæ
hepar sui officij.

PERORA AUTEM] Unde spes abiicitur, prater symptomatum calamitosam vim in actione, & lesionis specie, cum pari molestia doloris coniuncta.

QVÆ BREVI NASCUNTUR] Repetina generatione; non autē ipsius generationis causa. Nam
generatio causæ morbificæ paulatim fit: impressio autē morbi, in pñcto indivisi-
bilis. Et quò inueteratio
causæ morbificæ maior est, eò repetina magis impressio periculosior esse solet. Iā verò multum interest
inter hūc recentē hypochondrij tumore, inflammationis participem, & cum qui expers est. Hic enim bor-
borygmo exoluitur, quē sæpenumero excitat febris, & qui cum urinis aut deiectionibus excidit, aut qui
ipse per se cum statu silēti aut sonoro traiectus excluditur, aut etiā qui ad inferiora vētris deolvitur.

TUM QVÆ ASSVRGVNT EX HIS PAROTIDES] Tum per excursum primigenium, tum
per recursum ex irrita hæmorrhagia.

MVLTVM TERRIFICAE Quoniam illæ sunt *αἱ ἀρροῖαι καὶ ἡ ἀρροῖα*; tum quia ne suppurato quidē in his periculū locus tollitur, superflue partis vitio vnde illæ veniunt.

• Vt CETERA EXPVRATA] Quoniam nulla salus vitæ sperabilis in vitio nobiliũ partium insanabili.

15. Τὰ καρδιαλγικά μὲν σφόδρ' κοιλίης θηλεία κατὰρρήνεται.

A cardialgia cum torminibus; ventris fere prorumpunt.

EXISTUNT multa symptomata quorum remissio sperari debet exclusione causarum molestiarum facientium; ut alij smi nauseabundi, vomitione si febris adsit, neque adsit perennis generatio eius; ut vomitionis in nephritide, prolapsu calculi in vesicâ; quemadmodum nuper vidimus in tumore hypochondij recens abortu & inflammationis ex parte, qui borborygmo à febre citato curationem recepit. Hic autè cardialgiæ molestia, torminûmque ferocitas, quomodo exoluatur inopinato remedio, docetur his verbis.

CARDIALGIAE; Dolores stomachi, & fastidia nauseabunda, quorum causa firmiter fixa non est, neque contumaciter adhærescit, ut in muliere illa quæ cum diu multumque laborasset à corde, tandem prissana & succo mali punici, eius doloris vacationem habuit: sed leviter pressa ab erethismo fugaci.

Drift. 4
Meteor.

CUM TORMINIBVS.] Tenuium intestinorum cruciatibus sine borborygmo, non quidem contumacibus atque exolvi metuentibus; cuiusmodi sunt ab hectica intemperie hydrōpis sicci præputia; vel à perenni, ex iecore inflammato, bilis affluxu; sed qui per intestina vagantur cum vicissitudine cardialgiæ, vnde illi mitescunt ac rursus efferantur, pro varia superiorum & inferiorum partium offensione: nunquam tamen alibi quàm in tenuibus intestinis & stomacho stabulantur, nisi quando vel sua sponte, vel arte fugati vermes excedunt. Est enim cōsentaneum vt ibi mancant, vbi gignuntur, aut moriantur alieno in loco; vt *σκωληκίς* mali armenæ non viuunt in pruno: quæmuvis illæ arbores sint confo- ciales. Gignuntur autem *ειδὲς χείρα* chylosæ materiæ, quæ nusquam est nisi in ventriculo & tenuibus in- testinis. Quæ causa est cur sapientes medici potiones amaras exhibeant, præsertim è scordio: lac autem subiiciant, vt illinc fugati, hinc verò allecti, relicto ieiunio, descendant in colon, vbi, vel ad punctum temporis durare non possunt vita superstite. Omnia enim quæ viuunt, quæque moventur, in suo quæ- que loco seruantur; atque ex iis aluntur ex quibus constant.

Arist. 2. de
cælo, &
2. de ortu.

VENTRIS FERÆ PRORUMPVNT] Quænam sunt ventris feræ? lumbrici, tæniæ: nam ascarides gignuntur in ano. Quænam igitur feræ prorumpunt ex torminibus & cardialgia? lumbrici. Nam tæniæ nullam habere possunt exundi opportunitatem: quoniam fasciæ similes, vnde nomen habent, tantum patent in longum, quâ tum intestina sunt longa. Deinde bulimo potius, quàm torminibus & cardialgia indicantur: vt cætera illorû signa præteream. Huc accedit, quod in fœtu gignitur dum grævida gestatur in aluo, aliàs nunquam: quia non potis est ipsum in lucem editum salubriter viuere, nisi pridianæ fœces, vnde illi gignuntur, descenderint. Quod autem attinet ad nomen τῆς μέλαιας, palam est pro vermibus vsurpari: quia sunt feræ ventris. Ac ne longum faciam, cæterâque omittam quæ huc aduocari solent τῆς μέλαιας, μέλαιας, καὶ μελωματων; sufficiet locus ille libelli τῆς χειρὸς. Κατακλυσος, δὲ τῆς ἀσθῆτος ἀποστῆται τοῦ ἐν ὅρῳ ὄντος ἀσθματός, ἢ φαρμακός, ἢ ἑλκός, ἢ χυμὸς πρὸς σπαστικὸν, ἢ βλάστημα, ἢ φόσος, ἢ ἔσθρις, ἢ μέλαια, ἢ καύμα, ἢ αἰνὸς τοῦ πύθους. i. Iniechio ἔσθρις abluo iis quos abiecessus manes in sedem, aut medicamentum, aut vlcus, aut tumor aliquis concretus, aut germen, aut flatus, aut stercus, aut fera, aut astus, aut alia quæpiam passio. Distinctio autem significationum τῆς μέλαιας legitur in comment. Galeni ad illam prognôsim. Τὸ μελωδες τῆς φθροπύου, καὶ καρδιαγίας, καὶ τὸ μελωδες, καὶ τὸ μελαχολιών. i. Ferinym autumnus, eius cardialis index, horror, tristitia.

Καρδίας δ' ἔμμελα

16 Καρδίας ἀλγῆμα πρεσβυτέρῳ, πυκνῶς ἡπιφοιτῶν· θανάτου ἔξαι-
πνάμον σημαίνει.

*Dolorificum cordis malum atate iam grandi, crebrò reuertens; repen-
tinam mortem ostendit.*

10 *Quæ in vetustatem incidunt mala, haud facillè curationem recipiunt. Et quæ ab inueteratione
causarum morbificarum & affectionum ipsarum, crebrò, repente, & vehementer symptomata incidunt;
terrifica esse debent, tanquam mortifera: idque cum aliàs, tum si quis pariter aduersa valetudinis, &
ætatis senio confectus fuerit. Est enim irreparabilis temperamenti & complexionis mutatio, quam se-
nectus inuexit. Est quoque desperata, exhausta viuatitatis, nectarisque viuifici reparatio. Ergo pessima
res, quando malorum inueteratio, crebrâque symptomatum repetitio incidit in vetustatem ætatis, quæ
ipsa per se morbus est. Quæ cum ita sint.*

DOLORIFICVM CORDIS MALVM] i. Cardialgia vel cardiognus, cum syncope cordis mi-
cantis in sympathiam & contagionem adducti; non solum vicinirate, sed etiam societate quam stoma-
chus habet cum corde per nervum sextæ coniugationis.

20 *ÆTATE IAM GRANDI*] Vnde natura infirmior, meatus angustiores, materia contumacior in
oppilando. Hinc facilis oppressio, facilisq; interceptio τῆς συρροῆς, cū paupertate spiritus & caloris vitalis.

CREBRÒ REVERTENS] Ab inueteratione affectionis veneficæ, vnde perennitas cacoehymiae
malignæ, & qualitatis venenatæ quæ cardialgiam facit syncopicam.

REPENTINAM MORTEM OSTENDIT] Dissipatione pestifera viuifici nectaris quæ ab ex-
hausto venit; propterea quæ non est reparabilis, quemadmodum ea quæ venit à suffocatione hysterica.
Scitum est illud. Quæ vehementer & crebrò sine causa apparente exoluuntur; tandem repente moriuntur. aph. 40. 21

17 Οἷον ὑποχόνδρια μετεωρίζεται, κοιλίης ὑπόστασις· κακόν· μάλι-
στα δὲ ἐν Φθινώδεσι τῶν μακρῶν, οἷς κοιλία ὑγχαίνονται.

*Quibus hypochondria tumore assurgunt, aluo suppressa, malum: ma-
lum est etiam maximè, quibus ex inueteratione morbi tabescentibus, al-
ui profusè feruntur.*

40 *HYPOCHONDRIA tumore assurgunt ab inflatione, inflammatione, & scirrho. Malum est fisti-
alium in meteorismo ab inflammatione: quoniam inflammationis eximiae signum est, quia vehiculū
fecis absumitur, & peristalticus intestinorum motus sursum retrahitur. Hinc geminatur malum op-
pressionis partis obsessæ, tum accessione & incremento causæ morbificæ. Nec verò hæc prognosis pu-
gnat cum illa nuper explicata. Quæ cadunt in hypochondrium dolorifica mala, cum aliàs praua sunt; tum verò
si faciunt profusiores aluos. Ergo meteorismus hypochondrii ab inflammatione aluo suppressa, & signo,
& causâ terrificus. Sed malus est etiam qui ab inflatione meteorismus assurgit, vbi sistitur aluus. Est au-
tem meteorismus duplex ab inflatione obortus. Nam borborygmo exoluitur is qui repente assurgit.
Qui verò in vetustatem incidit, causamque habet status perennis, intemperiem hecticam, suppressione
alui damnosus est ægroto. Atque hîc peristaltico motu, naturali contrario, intestina sursum mouentur.*

MALVM EST ETIAM, ETC.] Quoniam ab inueteratione morbi tabifici, & paupertate calo-
ris natui, succedit ἡ κακοσχημία ventriculi & hepatis, easque partes multum effetas iam tædet sui officij;
10 ac tum in propinquo mors est, cum nigris excrementis fertur aluus.

18 Ἐν ὑποχονδρίῳ φλεγμονὴ δόπονηλική ὅστιν, οἷς πρὸ τοῦ θανάτου
μύηνα διαχωρεῖ.

*In hypochondrio phlegmone expuratoria est, quibus ante mortem ni-
gra deijciuntur.*

60 *OMNIS vacuatio qualitate praua, quæque excretionis modo & tempore nullam iudicandi vim
habet; mortifera est: idque cum aliàs, tum verò in viscerum inflammationibus per systrophēn natis.
Ergo. IN HYPOCHONDRIO*] Dextro, καὶ ἐξ ἑωχῶ ita dicto, & per metonymiam in hepate.

PHLEGMONE] i. Inflammatio per systrophēn nata: non enim à phlegmone sicca, quam φλόγ-
ον vocant, fit suppuratum: sed cum inualuerit, ac vires cundo acquisiuerit, insanabilis mali successione

habet, quod *μδρασμὸν ἐξερρυγῆ*, i. *consumptionem et torridam* veteres nominarunt, unde lenta mors venit, & hydrops, per alienationem sanguificæ facultatis.

EXPURATORIA EST] Puris in viscere ipso diffusi, non in membrana collecti: atque pus illud, post vigesimum diem, inflammationis finem attulit, quâdo liberali hæmorrhagia primis periodis phlegmone exoluta non fuit; ipse verò æger, validarum virium beneficio, succique vitalis affluentia, ad illum usque diem superstes permanet, nec antè ad exitum præcipitatus est.

QUIBUS ANTE MORTEM NIGRA DEICIUNTUR] Est enim mortifera, morticinique hominis illa expurgatio prava; tum quia iecoris corruptionem & exolutionem arguit, ut omnis deiectio nigra faculenti sanguinis quæ sua sponte continenter diffluit pigro lapsu; ut etiam pus *ἀμυρῶδες* & *βορβορώδες*, quod hypochondrio antè perusto foras effunditur; tum etiam quia introsum ducta, naturæ præsidia labefactat, symptomatisque gravissimis ægrum afficit, cum vires effictæ languent. Ac talibus pari ratione mors denunciatur & venit, qua iis quibus à morbo acuto, aut lento, aut tremate, aut aliter quovis modo extenuatis, vel atra bilis, vel sanguis niger deicitur, indeque postmodum moriuntur.

19 Ὑποχονδρίων σιῦταισις, μὲν κώματος ἀσώδους, κεφαλαλγῶν· ὅς οἱ ἐπιπρεῖ.

Hypochondriorum tensio cum fastidioso comate, in cephalalgia; parotidas fundit.

OMNIA quæ apparent signa certam prognosin constituunt, quæ diorsimum habent ex causis unde nascuntur & sunt. Non enim omnis hypochondriorum tensio idem significat: sed ut sunt illius causæ, ita denunciat id quod adest quodque presens est, futuròsque euentus certò prænunciat. Sic ex vrinis albis diuersa prognostica iniri solent, ex causarum perspicientia unde illæ sunt albæ. Nec verò causarum idem iudicium. Distinguendi ratio necessaria, potissimum cernitur in hac prognosi.

HYPOCHONDRIORVM TENSIO] Non quidem hypochondriis intro sursum retractis, quæ tensio diaphragmatis inflammati propria est, facitque vocem acutâ quæ fuerat antè gravis, & ad phrenitidem apparet; nec verò ea tensio firmiter fixa & stabilis, quam facit perennitas statuum ab hectica intemperie tenuium intestinorum; minus etiam illa quæ assurgit à phlegmone per systrophem nata, nisi fortassis ex euentu, quando irrita sanguinis translatio ad hæmorrhagiam, palindromen facit ad aures. Sed tensio fugax & leuiter pressa ad exigui prædicationem temporis, ab excursu hæmorrhagico, qui irritis cursum reflectit ad aures. Ac talis tensio numeratur inter signa *τῆς ἀσώδους καὶ κεφαλῆς*, estque doloris & inflammationis expers.

CVM ANXIOSO COMATE] i. Oculorum conniuentia veteriosa, quam facit infirmitas *τῆς ὀφθαλμοῦ ἀσθενείας* ab oppressione, non autem à refrigeratione. Sed illud coma nihil necesse est anxiosum videri; non enim anxietas esse potest neque *ναυτιώδης*, neque *ἀνέμετος*, ubi per simplicem transitum humor sursum cursum inflectit, non autem per progressum; quoniam nulla manet relicta in visceribus oppressio, nec in alio nauseabunda causa. Nec solum hac ratione adductus delendum putavi *τὸ ἀσώδες*: sed etiam Galeni autoritate fretus, qui id faciendum præcepit.

ET CEPHALALGIA] Sic enim legitur in prorrhethico, ut hîc cephalalgico. Est enim cephalalgia comatosa parotidum prænuncia. Hæc autem cephalalgia symptoma est repleti capitis humore crasso & pigro.

PAROTIDAS FVNDIT] Magis enim mihi probatur prorrhethici lectio quæ habet *ἐπιπρεῖ*, quam huius prognosin in qua legitur *ἐπιπρεῖ*. Parotidas autem fundit caput repletum, cuius repletio est cataphorica & cephalalgica. Huius autem repletionis causa est *ἡ ἀσώδης ὁρμή*, i. *ascensus*, quam hypochondrij fugax tensio, inflammationis & doloris expers denunciat. Atque ex rerum earum perspicientia Galenus probauit illud prorrheticum. *Ἐν κεφαλαλγῇ κώμα καὶ κώφωσις παρ' οἷς π' ἐρευνῆται*, i. In cephalalgia coma & surditas aliquid ad aurem eructat.

20 Μὲν ὑποχονδρίων ἐπὶ τῶν τοῖσι χολώδεσι, πνῦμα μέγα, καὶ πυρετὸς ὀξύς· τὰ οἷα ἐπιπρεῖ.

Tumore hypochondriorum vaneſcente, spiratio magna, biliosis quidem, & febris acuta; parotidas vomit.

NIHIL ERAT necesse huc aduocare concursum & complexionem signorum ad constituendam prognosin parotidum. Sunt enim quædam *ἐπὶ προφῶν* minimæque propria huius prognosin. Singulorum veritas elucescet in enarratione quam sic aggredior.

TUMORE HYPOCHONDRIORVM VANEſCENTE] i. Meteorismo, qui paulò antè visus est assurgere

est assurgere cum vacatione doloris & inflammationis, nec tamen exolutus est borborygmo qui ad inferiora ventris descēderit, exitumve habuerit cū flatu aut deiectionibus, sed per anadromen euauerit.

BILIOSIS] Natura, & vitæ instituto, quorum familiaris esse solet magisque propria sursum inclinatio, quàm deorsum.

ET FEBRIS ACUTA] Quæ hypochondriaci meteorismi consecutaria non est, nec symptomati-
ca (sic enim febris nomen non obtinent) sed essentialis, quæ homini bilioso accessionem adiungit
parotides potissimum in causis assurgunt. *aph. 74. 4.* *Coac. 3. cap. 4. lib. 2.*

SPIRATIO MAGNA] In prorrhético legitur. *Οἱ πνεύμαζομένοις.* Galenus autem *πνεύμαζομένοις* interpretatur, *ὅς μέγα καὶ πρὸς ἀνὰ πνεύματα.* *is magnum & crebrò spirantes*: sed talis respiratio locum habere non potest vbi spirandi libertas impeditur ab occupatione partium spirabilium, quam facit humoris sursum translatio. Erit igitur spiratio parua & crebra, quæ semper earum partium laborem vel inflammationem denunciat. Spiratio autem magna & frequens, solius cordis incendio conflagrantis propria est & inseparabilis; si nulla sit excusatio dementiæ, aut impedimenti partium spirabilium. Ergo melius in prognostico dyspnœam scripsit, vbi de abscessibus agit peripneumonicarum affectionum. Abscessus nascuntur inferiorum partium, quibus ad hypochondria, ardoris quid descendit: superiorum autem, quibus hypochondriū molle sine dolore est: & tamen difficultas spirandi sine causa manifesta intermittit. Erit igitur huius prognoseos decisio talis. Quotiescunq; denunciata sursum inclinatio, repletionē adfert capitis comatosam, & cephalalgicam; tum expectari debent parotides. Atque tensio hypochondriorum recens oborta, inflammationis expers, quæ sine borborygmo exoluitur, maximèque in biliosis, & acuta febre cum difficultate spirandi, *ὅς δὲ πρὸς* opinionem facit. Ergo, si illa sursum ad caput inclinatio repletionem faciat cephalalgicam & comatosam; parotidas funder.

21 *Εν ὑποχονδρίων ἀλγήματι ὑποβορβορίζοντι, ὁσφύος ἀλγήματι ἐπιγινώσκον ἐν πυρελοῖς κοιλίας ἐπιπολλὺ καυχεαίνε, μὴ φῦσα καὶ ἀρραγῇ, ἢ ἔρξῃ πλῆθος ἐπέλθῃ.*

30 *In dolore hypochondriorum cum borborygmo, lumborum superueniens dolor in febribus, aluos profusiores facit; nisi flatus prorumpat, aut copia urina feratur.*

Huius prognoseos explicatio repetenda ex illa iam explicata. Tumores hypochondriorum sine inflammatione recens obortos exoluit borborygmus qui cum deiectionibus & urinis, vel cum strepitu foras exitum habet, aut qui ad inferiora ventris deuoluitur. Tum ex comment. Galeni ad *aph. 74. 4.* *Coac. 11. huius cap.*

40 22 *Επὶ ὑποχονδρίῳ χρονίῳ, καὶ κοιλίῃ δυσώδῃ, ὅς οἱ δόποσημα κτείνε.*

In diuturno hypochondrii meteorismo & aluo graueolente, abscessus qui ad aurem assurgit, necat.

IN HUIUS prognoseos enarratione cogor id facere quod faciundum præcepit Galenus, vt scilicet dicam & scribam *ὅς δὲ αὐτῶν & αὐτῆς, καὶ ὁμοίαν ὅς δὲ ὁμοίων.* Atque hic nullæ sunt aliæ partes meæ, nisi vt quæ consideratè & conuenienter alibi super hoc theoremate scripta sunt, ea inde repetita, huc transferam, appositæque singulis verbis accommodem.

Ergo. **IN DIUTURNO HYPOCHONDRII METEORISMO]** Qui assurgit à tumore molli & œdematoso viscerum hypochondriacorum, vel ab inflatione diuturna & stabili quam facit perennitas flatuum ab intemperie hæctica renuium intestinorum, vnde peristaltico motu, naturali contrario, intestina sursum infernè mouètur; aut glutinosi humoris copia vnde vicissitudo voluuli & straguriæ.

ET ALVO GRAUEOLENTE] i. Ileò, cum stercoris aut chyli vomitione, & cum accessione ructus, spirationis, & perspirationis fœdi odoris. Hæc autem symptomata sunt ilei consecutaria; quando ad vltima ventum est. Nam proprium & inseparabile signum est ilei, nihil deorsum ferri, cum alui torminibus & cardiogmo, quod accidit per *αὐτῶν εἶναι* fœcis aluina & chyli, ab inflatione fixa & stabili; aut inflammatione tenuis intestini sinuosi; vel ab oppilatione crassi & glutinosi humoris. Quicquid enim remeare facit, aut permeare prohibet chylum & stercus, voluuli consecutionem adfert. Iam verò quod aluū graueolentem hic vocat, de voluulo dixit in prorrhético, & suprà in Coacis. Quod ad diuturnitatem attinet hypochondriaci meteorismi; certum est, oborto voluulo, non posse existere, sed multò antè voluulum præcessisse, per inueterationem causæ morificæ, si inflammationem tantum exceperis. Nam in meteorismo hypochondrii qui ab inflammatione assurgit, & nato iam voluulo fœdi odoris; periculo & citæ morti locus est potius quàm diuturnitati. Non enim voluulus accessionem habet vo-

protr. 25. f. 3. 1.
Coac. 3. cap. 4. lib. 2.

protr. 63. f. 3. 1.
Coac. 3. cap. 4. lib. 2.

comment. ad aph. 11. 7.

mitus & fædi odoris, nisi cum in propinquo mors est.

ABSCESSVS QVI AD AVREM ASSVRGIT] i. Parotis, modò spatium assurgendi sit oborto iam voluulo. Quicquid enim humorem ciet ad caput, vnde succedit ipsius tensio cephalalgica & comatosa, parotidas fundit.

NECAT] Non ille quidem suo pte tantum vitio (quamvis homini necando per se sufficiat) sed alieno. Ac semper in tali parotide periculi locus est, quo quis defungi non potest, nec suppurato, nec alio prurupta biliosis excrementis, vt in Clazomenio; quod in voluulo sperari nequit. Huius autem prognoscos decisio sic exarata legitur suprâ. *Paratides graueolentis voluuli confectaria, cum febre acuta, & hypochondrij meteorismo diuturno; interimunt.*

23 Τοῖς ἀπὸ ὑποχονδρίων ἀλγήμασι κοιλίῃ καὶ μικρὸν ὑπογαστρὰ διαδιδόσκα, καὶ βραχέα κοπρόδεα ἐκχέει· ἄρα καὶ αἱμορραγίῃ;

Meliùs sic in prorrhethico, §4. f. 3. i.

Αἱ πυκναὶ καὶ μικρὰ δύσαστες ὑποξανδαί, γλιγρὰ, ἔχουσι μικρὰ κοπρόδεα μὲν ὑποχονδρίῃ ἀλγήματι, καὶ πλῆρῃ, ἰκτερώδες· ἄρα γε ἴησιάντων αὐτῶν, οὗτοι ἐκλύονται; ἅμα δὲ καὶ αἱμορραγέοις; πύτοις τὰς ὁφύος, ἀλγήματι ἐν πύτοις αἱμορραγίᾳ.

Deiectiones crebrò & paulatim egestæ, subflauæ, & glutinosæ, parit̃ minutulæ stercorosæ, cum hypochondrij dolore, & lateris, ictero assidente; an subsistentibus illis, hi exoluuntur? vnâque etiam sanguinem profundunt? His lumborum tensio dolorifica sanguinem fundit.

IN HYPOTHESI huius prognoscos, theorema continetur alterationis versæ in alienationem, quæ mutatio simulatque apparet, desperationem salutis ostendit. Atque id locum habet tum in facultatum principiis, tum in artubus qui ab illis reguntur.

Ergo. DEIECTIONES] Alii excrementa subducta, & omnium superuacaneorum siue τῶν ἐκείνων egestionis; siue illa sint colliquamenta, siue humores.

CREBRO ET PAULATIM EGESTÆ] Quæ ratio egerendi symptomatica est, tum oppressæ naturæ, tum cacochymix malignæ intestinis multum abradendo & exasperando molestæ; vnde nulla ægri leuatio, sed grauiorum malorum incrementum cum vacuitate somni coniunctum. Hinc biliosorum humorum perennitas, & summa infirmitas ægri.

FLAUE ET GLUTINOSÆ] Quæ duæ sunt qualitates saturatæ bilis, qua dum fertur aluus, nec tollit anxietatem ægri, sed auget; nec hypochondriorum ardorem exinguit, sed multò magis accendit. Est autem vlcerifica intestinorum & sedis.

NON VNQVAM ETIAM MINUTULÆ STERCOROSÆ] Ac si diceret; si aluus feratur minutulis fæcibus rotundis, duris & nigris: cuiusmodi sunt διαχωρήματα στυγεράδιν, i. caprarum stercorosas pillulas referentia, quorum duritas siccitatis nuncia est; nigredo ardoris quo viscera conflagrant.

CVM HYPOCHONDRII DOLORE ET LATERIS] Ab inflammatione systrophica conuexarum hepatis partium, quæ vicinitate & societate in contagionem latus adducit, vt hepate inflammato pleuritis falsò credatur ex tussi & difficultate spirandi: sed tamen diuersa doloris proprietate, in hepate quidem inflammato, tensiui; in pleuritide verò, punctorii.

ICTERÓ ASSIDENTE] Quod proprium est symptoma συνεδρεύον, i. assidens hepatis vel obstructi, vel inflammatione obsessi; non autem pleuritidis, habeturque ab Auicenna pro vero diorismo hepatis inflammari non latens. De ictero satis iam aliàs.

AN SVBSISTENTIBVS ILLIS] Caprarum globulis & excrementis biliosis, abundè saturatis; siue illa omnino suppressa sint; siue subsistant mutatione in alia excrementorum genera, vt pro duris & sphericis, ducatur aluus chylotis; pro flauis & glutinosis, feratur prolucis rubra; quod signum est alterationis versæ in alienationem & exolutionem qua iecur rædet sui officij.

HI EXOLVNTVR] Infra legitur ἐκχλυσίνται. Exolutionis signa & causæ modò sunt explicata.

VNÂQUE ETIAM SANGVINEM FVNDVNT] Non quidem liberali hæmorrhagia, vt in προτ. 6. f. 1. 1. substillit, aut etiam profluuiio exoluti hepatis symptomatico: sicut in prorrhethico scripsit, μικτὴρ ῥοή, i. natus profluuius. Atque ex illo profluuiio nihil aliud expectari potest quàm maior infirmitas, & vitium exolutio: quoniam nulla excretio quantumvis critica, potest videri salutaris, cum vires effætz languent.

24 Οἷσιν ἑξαίφνης ἀπυρέτοις ἐοῦσιν, ὑποχονδρίαι καὶ καρδίαι πό-
 νος, καὶ πρὸς σκέλεα, καὶ τὰ κατωτέρω μέρη, καὶ κοιλίη ἐπλήρται· φλεβοτο-
 μίη λυθείη, καὶ κοιλίης ῥύσις. πυρέξαι βλαβερὸν τούτοις· μακροὶ γὰρ
 πυρετοὶ, καὶ ἰσχυροὶ γίνονται, καὶ βήχες, καὶ πνύματα, καὶ λυγμοὶ γίνονται. λυέ-
 σθαι δὲ μολυσμάτων τούτων, πόνος ἰσχυρὸς ἰσχύων καὶ σκελέων, ἢ πύξις πύσις,
 10 ἢ ὀφθαλμῶν σέρησις ἐπιγίνεται.

*Quibus continuò in febris vacatione, hypochondrij & cordis do-
 lor, crurumque ac partium inferiorum, & unà venter in molem as-
 surgit; phlebotomia exolvit, & alui profluvium. Ibi tum febricitare
 calamitosum: quia diuturna sunt febres, & validae. Quinetiam inde
 veniunt tusses, difficultas spirandi, atque singultus. Quæ omnia quan-
 do exolui debent; coxarum prægrandis dolor & crurum, aut puris ex-
 pectoratio supervenit, aut oculis capiuntur.*

SYMPTOMATVM catalogus recensetur in hac prognosi & citima, quæ sanguinis detractionem
 requirunt ante catharticum, & quorū ipsa detractio sanguinis est ἡγεμονικὸν ad curationem recipiendam.

Ergo. QVIBVS CONTINVO] Ad verbum, *repenti*, i. nulla extrinsecus incidente prævidentia,
 ac nulla extrinsecus nata, quæ opinionem faceret sui (id enim significat, πρὸ ἑξαίφνης, valētque idem quod
 illud ἀπὸ τοῦ ἑξαίφνης.) Ac si diceret. Quibus repente oborta est hypochondrij & cordis afflictio.

30 IN FEBRIS VACVITATE] Sic in aphorismis, ἀπυρέτοις ἐόντι καρδιαγῆμος, &c. i. Si nulla fuerit essen- 17. lib. 4.
 tialis febris generatio, neque discessio: sed manserit febris experts, donec ingruerint symptomata ex-
 plicanda. Tum autem ut neque sit hypochondrij dolentis consecutaria febris, nec hypochondrij dolor
 symptomaticus. Denique, ut antè fuerit, ita nunc sit febris vacuitas.

HYPOCHONDRII ET CORDIS DOLOR] Ab interceptione bilis, eiusque perenni ad cor
 affluxu, unde cardiagmus, cibi fastidium & oris amaritudo: quæ omnia sine febris accessione possunt
 4 aph. 17. 4.
 existere. Non enim cuiuscunque inflammationis iccoraria symptomatica est febris, sed tantum eximia.
 Perennitas autem bilis à iccore æstuante; suppressio, ab oppilatione; cordis morfus, à reflexu eius ad
 stomachum.

40 CRVRVMQVE AC PARTIVM INFERIORVM] Per ταυσίωσιν biliosi sanguinis è vasīs cru-
 ralibus eo sanguine distentis in venulas, indeque in carnes & musculos quibus affixæ sunt; indeque ve-
 nit spontanea lassitudo phlegmonosa & vlcerosa.

ET VNA VENTER IN MOLEM ASSVRGIT] Non quidem meteorismo ab inflammatione
 systrophica, quia febrem habet semper coniunctam; nec verò ab inflatione, quam facit collectio fla-
 tuū: nunquam enim flatuum interceptio secum adfert dispositionem inflammatariam in hypochondrio.

PHLEBOTOMIA EXOLVIT] Quæ vnicum est curationis ἡγεμονικὸν in malis quæ vel à systro-
 phe, vel ab incendio, vel ab oppressione nascuntur. Nam systrophæ quidem debetur rheumatis conci-
 tari tenuissio, consistentis amotio & detractio; phlogos refrigeratio, & temperamenti atque comple-
 xionis symmetria; oppressioni à suppressione vacuatio. Quæ omnia planè in sanguinis detractione di-
 uina sunt. Huc accedit quòd ubicunque purgationis & phlebotomix necessarius incidit vsus, à phlebo-
 50 tomia auspiciandum. Qui contrà facit, tam est in vitio, quàm si ipse manus adferret ægroto; quòd mor-
 bum aliqui sanabilem, ex euentu faciat insanabilem.

ET ALVI PROFLVVIUM] Ut scilicet biliosis excrementis feratur aluus, quæ stabulando in hy-
 pochondriis, & febrem accendunt, & œconomiam naturalem labefactant; visceraque unde gignuntur
 per syntymioriam magis afficiunt. Illud autem profluvium sponte citatum bene fit; si multum & rarè
 cietur, si bilis quodammodo pituitescit, nec ita videtur effera; tum si hypochondrium sit æquale, dolo-
 ris & inflammationis experts. Talis expurgatio sponte naturæ convenienter suscepta procedit καλῶς καὶ
 4. acut.
 κεραιῶς, ac melius ægroto est. Sin autem artificio medici ad imitationem naturæ comparato instituenda
 purgatio sit, eiusmodi esse debet ut detracto sanguine, moderationis & securitatis seruantissima ni-
 hil omnino periculi secum pòrter. Sic enim faciendum præcepit cauitque his verbis. Δέεται δὲ ἀσπράγξις,
 60 καὶ μετρίως μετὰ φλεβοτομίῃν ἢ φαρμακίῃν. Ac tam religiosus fuit in purgando, ut, non nisi summa necessi-
 tate coactus, catharticum exhibendum putarit, ac solo clystere contentus medicinam facere instituerit.
 Ut autem purgatio medici votis respondeat, plurimum ad hoc valet præmissa detractio sanguinis, quæ
 corpus expurgandum mirificè facit ὑπόω, i. fluxile, excitata naturæ vi ab oppressione laborantis, &
 comparata meatuum libertate. Scitum est illud. Quando purgare consilium est, corpora debēt effici meabilia.
 4. acut.
 2 aph. 9. 2.

IBI TUM FEBRICITARE, CALAMITOSVM] Quoniam nisi tutò & citò bilis exitum ha-

beat detractio sanguinis, inde cathartico aut clystere; rapitur à venulis arefactis, ac tum excitantur febres malignæ. Est enim iam illud ratum persuasumque omnibus. *Quæ ex hypochondriorum dolore veniunt febres, terrifica.* Et, *Quæ ex aluinis doloribus febres nascuntur, terrifica.* Hæc autem suprâ sunt explicata.

QVIA DIUTURNÆ SUNT FEBRES ET VALIDÆ] Sunt igitur hæc febres diuturnæ, materiz contumacia, vnde difficultas pepasmi; & vitio visceris hypochondriaci, vnde perennitas causæ morbosæ, & perennis attractio à venulis arefactis: validæ autem, symptomatum vehementia, quæ cernitur in doloris acerbitate, cibi fastidio, siti, iactatione, & somni vacuitate. Ac ne longum faciam; omnia in peius ruunt. Atque ut scripsit Hippocrates, *χρόνια sunt hæc καὶ δυσχερῆ.*

QVINETIAM INDE VENIUNT TVSSES] Ob nimiam humoris abundantiam quæ ad thoracem & pulmones cursum inflectit, & partes illas ad expurgandum irritat. Sic enim Galenus ad illud locum. *Secuta sunt tussēs. Dum expurgatur, inquit, humorum redundantia, consuevere tussēs oboriri.*

DIFFICULTAS SPIRANDI] Parua & frequens, à labore partium spirabilium obsessarum. **ATQVE SINGULTVS**] Concussio frequens ventriculi studentis excutere glutinosam bilem quæ ad eius tunicas contumaciter adhærescit, quam inflammatum iecur eò transmissit, ac sensationem excitat suæ molestiæ per duos nervulos, ventriculi & iecoris societatem coniungentes. Atque ex eo singultus significatio fit adauctæ phlegmones, & feruentis à febre. Omnia enim symptomata quæ *ἐμφύματα* Græci vocant, magnarum affectionum & auctarum consecutaria esse solent; ut singultus hepaticæ phlegmones; non quidem cuiusvis, sed eius tantum quæ est eximia.

QVÆ OMNIA QUANDO EXOLVI DEBENT] *Ασπίως καὶ ἀκρίτως* cum febris in vetustatem inciderit, variisque symptomatis exercuerit ægrum à bilis perennitate, & propagatione; tum à colliqutione prava, vnde abscessus fiunt aut magnitudine intolerabiles, aut paruitate inutiles, ut prodesse non possint.

ISCHIORVM SUPERVENIT DOLOR PRÆGRANDIS ET CRVRYM] Quoniam diuturnæ febres continuæ, abscessus faciunt per materiz decubitus; ut intermittentes diuturnæ, quartanas. Sin autem pars aliqua lassitudine fatigata fuerit, aut perdoluerit antequam ægrotare quis coeperit; in ea se morbus obfirmat. Atqui multò ante natam febrem, quæ arceri debuit sanguinis detractio & purgatione; coxæ, vel ischia potius (nam coxæ pro lumbis nominantur à Celso) tum etiam crura doluerant. Abscessum autem ischiadicorum successio esse solet in febribus quæ dicuntur tritæophyæ.

AVT PURIS EXPURGATIO] Ex materia in pulmones translata, vnde difficultas spirandi & tussis, quæ neque liberali expurgatione intra decimumquartum diem cæpit expurgari, nec sanguinis detractio vacuata fuit, sed in suppuratum versa est.

AVT OCVLIS CAPIVNTVR] Cessante singultu, ob excursum bilis ad cerebrum, maximèque ad illam partem cerebri vnde videndi vis manat, ex cuius inflammatione labefactatur *καὶ ἡ αἰσθητικὴ καὶ ἡ διορθητικὴ*. Nam læso principio, afficitur facultas, quæ in officio cernitur. Ipsum verò sensorium, vicinitate & societate affligitur. *Quæ de re illud extat. Ἐπὶ ἐμέτω λυγρὸν καὶ ὀφθαλμοὶ ἐρυθροὶ καὶ ὀκνοὶ. i. Singultus ex vomitui superueniens oculorum rubor, malus.*

25 Οἷσι πόνοι ὑποχονδρίων, καρδίας, ἥπατος, τῶν δὲ ὀμφαλὸν με-
εῶν· αἷμαλος διαχωρήσας, σώζονται· μὴ διαχωρήσας, θνήσκοι.

Hypochondriorum, hepatis, cordis, partiumque umbilico circumpositarum dolores; excluso sanguine, periculo defunguntur; non excluso, intereunt.

HIC ETIAM hypothesis altera ponitur hæmorrhagiæ, aut phlebotomiæ tam necessariæ, ut ea prætermittenda, necesse sit vita defungi: quemadmodum adhibita, vel sponte naturæ, vel artificio medici; bona spes affulget periculo defungendi. Est autem hypotheseos huius theorema catholicum. In omni dolore hypochondriorum, hepatis, cordis, partiumque sub umbilico circumiacentium; sanguinis exclusio sperabilem vitæ salutem ostendit: contrà suppressio, desperationem salutis. Atque id quomodo fiat, hypothesis explicatio declarabit, cuius verba hæc sunt.

HYPPOCHONDRIORVM] i. Earum partium epigastrii quæ adiacent nothis costis, quæque viscera iecoris, lienis, diaphragma quoque ipsum & stomachum circumplectantur. Dolore autem vexatur ab oppensione partium subiectarum.

HEPATIS] A tumore duro & dolorifico; vel à nimia sanguinis abundantia intumescens, ut in iis qui ultra præscriptum tempus, perfractum crus elatum in lecto continuerunt, aut altero crure sunt mutili, nihil autem cibi quotidiani & potionis dederunt.

CORDIS] A bilis refluxu, quæ percanitatem habet in iecoris æstu; communicatur autem cum stomacho per tenue intestinum, ac suæ molestiæ & feritatis sensationem excitat in stomacho acerrimi sensus per duos nervulos iecori & cordi communes; vnde singultus, cardiognus, & cibi fastidium.

PARTIVMQVE VMBILICO SVBIACENTIVM DOLORES] Ieiuni intestini, & sinosis, quod *ἐλκω* Græci vocant; quæ duo intestina suis torminibus cruciantur, exudante bile à iecore inflammato: quem-

mato: quemadmodum ab omni inflammatione serum exudare solet; ut in pleuritide quod siccum rufum excitat; in phrenitide, quod pyelismum facit. Atque hæc symptomata sunt cauarum partium inflammatione obsessarum.

EXCLUSO SANGVINE] Sic visum est interpretari illud, *διαχωρήσαντες αἷμας*, ne quis alium sanguine proruptam intelligat, quo iure, quaque iniuria. Nam *διαχωρήσαντες* nomen, tamen si frequenter usurpatur pro alui deiectione: tamen non raro significat eam, quæ omni ex parte cietur, vacuationem, ut in illo. *Τὸν περὶ τῶν αἱμάτων, καὶ τῶν χυμῶν, καὶ αἱ διαχωρήσεις γίνονται*. i. Celeriter nutrientium, celeres quæ sunt consumptiones. Vbi *διαχωρήσεις* idem sunt, quod *ἀποδιώσεις*; ut idem planè illic docere velit, quod alibi scripsit. *Τὰ εὐδαιμόνια πάντα, ἔστιν εὐαδαιμόνια*. i. Quæ facile alterantur, facile item absumuntur. At *ὑποχώρασις* nunquam aliter quam pro egestionem per aluum legitur apud Hippocratem, ut in illo, *ὑποχωρήματα ῥέγαντα*. Sed ut concedam hinc sanguinis *διαχωρήσις* usurpari, quæ fit prorupto per aluum sanguine; conuenienter naturæ suscipitur ea quam *δυσεντερίαν αἱματώδη*, i. dysenteriam sanguineam veteres nominarunt, quæ cietur liberaliter & vehementer, non tamen est diuturna, nec cibi fastidium adducit: talis virtute fit hepatis, ut hæmorrhoides quoque fugaces, quas habent homines, non autem ab iis habentur. Ceteræ omnes cruentæ deiectiones veniunt ab hepatis *ἀρρώστια*, vel mesenterij aut intestinorum vitio.

PERICULO DEFUNGUNTUR] Ut per liberalem hæmorrhagiam quæ primis prorumpit hepatis inflammari periodis, aut liberali sanguinis detractio quæ fit incunte morbo. Est enim sanguinis profusio, curationis *ἡγεμονιών* ad retractionem rheumatis concitati, & ad detractioem consistentis.

NON EXCLUSO INTEREUNT] Quoniam inflammatio fixa tantorum causa malorum jecoris, cordis, & tenuium intestinorum; tum interceptione officij necessarij; tum ipsa doloris acerbitate, partiumque omnium nobilium sympathia & syntimoria; breui futuram mortem ostendit, nisi ægrotus, liberali hæmorrhagia, periculo defungatur aut validatum virium beneficio, experendam suppurationem expectet; quæ cum venerit, non omnino, nec semper periculi locum tollit: quemadmodum supra demonstratum est.

26 Οἷσιν ὑποχόνδρια λατῶρα, πρὸς ὥπερ ἔρρωμύς, & λύονται χεῖρς εἰς αἷματος ῥύσιος ἐκ ῥινῶν πολλῶν, ἢ ἀσπασμῶν, ἢ ὀδυώδους ἰγίων.

Meliùs sic, ex prognosi 134. lib. 1.

Οἷσιν ἐν πυρελοῖσιν αἱ ἐν κροτάφοις φλέβες σφυγματώδεις, καὶ πρὸς ὥπερ ἔρρωμύον, καὶ ὑποχόνδριον μὴ λατῶρον χερόνιον. καὶ οὐ πᾶν ὥνται χεῖρς εἰς αἷματος ῥύσιος ἐκ ῥινῶν πολλῆς, ἢ ἀσπασμοῦ, ἢ ὀδυώδους ἰγίων.

40 Quibus in febribus temporum venæ aspectabili pulsu micant, unâque facies succi plena atque decora, nec hypochondrium molle; diuturnum: neque quiescunt, nisi prorupto liberaliter è naribus sanguine, aut convulsione, aut ischiorum dolore.

EST QUOQUE hypochondrij tensio diuturnorum causa malorum, idque cum aliâs, tum si accessionem habeat corporis nihil à se mutari in pristina mole atque colore. Est etiam signum hæmorrhagiæ, quando denunciat anadromen sanguinis caput replentis, cum pulsu aspectabili venarum in temporibus micantium, & facie suffusa rubore. Quineriam cruralem abscessum fore ostendit, cum restituta libertate spirandi per transitum materiæ pulmonariæ deorsum factæ, distenditur. Quæ omnia cum his diorismis pronuntiata, veritatis lucem habebunt.

Ergo. QVIBVS IN FEBRIBVS] Essentialibus, quarum labores continenter infestant, necdum sperabilem faciunt discessionem, ex iis quæ apparent & fiunt ad tempus & speciem crisis.

TEMPORVM VENÆ ASPECTABILI PULSV MICANT] A particulari ipsarum repletione, unde micando percutiunt circumiacentes partes, in quarum intervallo liberè olim pulsabant sine appulsi molesto. Est enim talis pulsus vel à particulari venæ repletione, vel ab eiusdem oppressione per inflammationem systrophicam partium circumiacentium.

VNAQUE FACIES SVCCI PLENA ATQUE DECORA] i. Facies bene valentium similis, & potissimum sui, quæ contrariam habet *πρὸς ὥπερ ἔρρωμύον*. Est autem facies succi plena quæ cernitur in colore & mole: sicut decora in charactere. Non enim hoc loco agnoscimus faciem saturato rubore suffusam, vultuosam, & aspectu terribilem, quæ propria est phreniticorum: sed faciem naturaliter constitutam, quæ nihil de suo statu concessit: est autem genuino rubore suffusa. Iraque talis facies quæ in febre non leui nullam habet remissionem, sed potius incrementum, qualis alibi nominatur *πρὸς ὥπερ ἔρρωμύον*; ad diuturnitatem morbi apparet.

aph. 12. 21

lib. 1. mel. 7. 2. 3.

aph. 21. 4.

41 πρὶ ἀρρώστιας

Coac. 4. cap. 5. lib. 5.

Coac. 1. 1. 2. 3.

aph. 27. 2.

NEC HYPOCHONDRIVM MOLLE] Sic enim melius, quam simpliciter molle, quod nihil aliud denunciat præter expectendam hypochondriorum constitutionem; nisi fortè repentinam tensionis mutationem habuerit per humoris excursum vnde repletur caput ad hæmorrhagiam; quod hic verisimile non est: quia subiungitur diuturnitas morbi. Non erit igitur molle, sed distentum ab inflatione phlegmonosa, quam facit oppilatio contumax.

[DIVTIVNVM] Quia diuturnitatis prænuncia sunt hæc, ex quibus significatur humoris morbifici contumacia, & perennitas eius. Sunt autem, hypochondrij tensio, pulsus venarum micantium aspectabilis medico, & agro molestus; tum facies nihil concedens de suo.

NEQVE QVIESCUNT] i. Exitum habent secundi iudicij ad ægri salutem. Nihil enim salutariter exoluitur ἀκρίτως καὶ ἀσήμερος. Sed theorematibus illius veritas lucet in verbis illis, πάντοτε ἢ λύνεται, quæ semper sunt veræ crisis.

NISI PRORVPTO LIBERALITER ENARIBVS SANGVINE] Si eiusmodi sit tensio hypochondrij, doloris & inflammationis expers, vt significata sanguinis ad caput anadrome, repletio eius sequatur cephalalgica, cum amblyopia marmarigarum micantium, & pulsu aspectabili temporaliū arteriarum. Citatior enim maiorque temporum pulsus, fortius potentiam mouet excreticem vt se exoluat molestiis causarum morbificarum; atque ira ciet hæmorrhagiam.

AVT CONVULSIONE] Quæ primo incidit morbi die, aut posttridie, aut ad summum perendie, per transitum humoris morbifici è venis ad musculofum genus: iuxta illud. Febris convulsio finem adfert.

AVT ISCHIORVM DOLORE] Si tensio hypochondrij repente oborta sit, cum libertate spirandi post longam dyspnœam, materia illac trãseunte dum cursum inflectit ad articulos imbecilliores, & ampliores, & laxiores: vt in Herophonte, cui paulisper sinistrum intumuit hypochondrium, paulò ante abscessum cruris κατ' ἰσχύν. Est autem hæc prognôsis ἀδόλεστος in hypothesi & euentu.

27 Αἱ πρὸς ὑποχόνδρια ἐν πυρετῷ ὀδυῶναι ἀπὲρ αἰμορραγίας, δυνάδω, δύιδρωπι λυόμεναι κακόν. πούτοισιν ἐς ἰσχίον ἀλγήματα.

Hypochondriorum dolores in febre, si muto & sudore carenti & hæmorrhagia exoluantur; malè res eunt: nisi dolores ad ischia transeant.

OMNIS ἀκροσία quæ irritò sit crethismo, funesta est grauiorum malorum accessione, parique successione, nonnunquam etiam cita morte. Secus est de acrisia cruditaris alumna, nec tamen ab irritò crethismo in malos abscessus conuersa. Hæc enim sola crisis vacuitate contenta est, propterea quæ diuturnitatis comes, non autem interitus. Sed ἀκροσία τέταται frustra criseos confectaria, morborum acutorum primigeniam tollit naturam, facitque vt illi acutorum nomen retineant ἐκ μετεπίστας; & ex irrita crisi κατ' ὀφθαλμῷ, deducantur ad eam quæ fit κατ' ἰσχύν ἀποθήσει; quod gratiæ, vt ita dicam, potius quàm naturæ ipsius merito apponi debet.

Ergo. HYPOCHONDRIVM DOLORES] Vel tensio potius repentina & fugax, inflammationis & doloris expers, ac sine borborygmo; vnde significatio sit τῆς ὀφθαλμῶς. Quòd autem sic explicanda videatur præsens hypochondriorum affectio, facit vt adducar, illud.

IN FEBRE] Essentiali, continua, & acuta, quæ sanguinis dominatu multa bile perfusi focum habet in maioribus venis atque arteriis, nec dum mitificata pepasmo, translationem facit ad caput, ipsumque replet humore qui propter feritatem, cerebri virtute non regitur ad excretionem per hæmorrhagiam: sed capitis repleti symptomata edit paraphorica & cephalalgica.

MUTO] Qui fandi est impotens, denegata mouendi facultate musculis nouem linguæ, per obstructionem nerui septimæ coniugationis, impedita parte illa cerebri vnde vis manat linguæ morrix. Sed tamen adducor potius vt credam id fieri eximio calore febrili concepto in cerebro, qui partes vicinas atque locas continenter ciet mouétque, nec vnquam sinit quiescere; vnde lingua tremula signum est non solidæ mentis, ex eoque tremore organi dialectici atque sermonis dædali, homines videntur δυνάδω. De δυνάδω & ἀφωνίᾳ satis iam alibi. Sed instat Galenus qui aduerbialiter legit δυνάδω, & interpretationem citat quorundam qui censent illud, δυνάδω, significare idem quod ἀφώνος: quoniam λόγος in genere τῆς φωνῆς continetur. Ipsa verò φωνὴ à veteribus dicitur αὐδὴ. Sed curiosa hæc nimis est enarratio. Est autem incundum legere discepcionem Galeni fundatam in eo quod ipse malè legit, ἰδρῶπι λυόμεναι; censet autem legendum, ἰδρῶπι μὴ λυόμεναι. Sed multò melius hic ἀνιδρῶπι λυόμεναι, vt mox cuique facillimum erit iudicare.

SVDORE CARENTI ET HÆMORRHAGIA] Quæ duo sunt excretionum genera, per quæ omnis affectio plethorica solet exolui, modò illa repletio sit malignæ cacochymix expers, nec vlla sit inflammatio systrophica & fixa in parte obfessa. Sic Larissæam virginem symptomatis repletionis defunctam fuisse legimus; capitis quidem, per hæmorrhagiam; venarum, per sudorem; vteri & locorum, per menstruale profusum. Tot autem necessaria sunt vacationum repletionis propriarum genera; quot affectionum ex ipsa sedes & foci existunt. Huc pertinet illa prognôsis iam explicata. In febre continua, qui voce capti iacent atque nictantur, siquidem prorupio è naribus sanguine vocem receperint, & apud se fuerint; periculo defunguntur. Sin autem secus acciderit; cum difficultate spirandi cita mors venit.

MALB

MALE RES EVNT] Quia cum bilis efferat sursum ad caput excursus hæmorrhagiæ successio- nem non habuerit, paraphorica symptomata facit terrificæ, ne dicam mortiferæ. Huc accedit, quod omnia quæ præiis cum signis misceant, aut cum salutaribus nihil concedunt; calamitosa sunt.

ATQUE DOLORES AD ISCHIA TRANSEVNT] Vt enim febris ex actiis ob irritam pro- ritationem, acutæ naturam amittit, quæ in laborum vehementia, celeritate & assiduitate consistit: ita ex crisi hæc excluditur, deducitur ad eam quæ fit κατ' ἀπόδοσιν. Atque ita, si naturæ virtus ἀντὶ ἑρρότης ac liberaletem molitur abscessum, quo, feritate ipsa deuicta, morbus fiat pepalini particeps, cuius antea fuit expers; periculofocus tollitur quod in propinquo erat. Dolores autem ad ischia trāscunt & ad bubones, indē- que ad femur; vt duce natura abscessus procul exoritur κατ' ἔξιν ἀντὶ ἑρρότης neque ἡμάρτορας, sed ἀξίως τῆς πε- 10 ελευθέρως, in parte scilicet morbificæ totius materiæ capacissima. Quod accidisse legimus Herophonti, qui, cum in angusto spes esset, diadoche facta in lienem, vnde ipsius tumor & hypochondrij tensio, pri- mum respicit; auditus libertatem recepit, indēque ad bubonem dolore oborto, mox in vtramque ti- biam, cum residisset rumor lienis; præter spem defunctus est morbo qui antè lethalis videbatur.

28 Οἱ καὶ κοιλίῳ ἐν πυρετῷ παλμοὶ· κίττασις ποίεουσιν. αἱμορροίη δὲ φεικώδης.

30 Palpitatio ventris in febre, insaniam facit: indēque cietur hæmor- rhagia horrifera.

PALPITATIO ventris usurpata pro pulsū, quemadmodum legitur in Sileno & in Phrenitico, translationem facit humoris calidi tenuisque sursum ad caput. Ergo paraphorica aut hæmorrhagica.

hist. 1. 2. Epid.
hist. 4. Part. 3.
3. Epid.

PALPITATIO VENTRIS] i. Pulsus quem facit repletio venæ particularis, vel vniuersalis, vn- de percipitur appulsus ægroto molestus, ac dolorificus, propter angustiam intercapedinis vbi liberè o- lim micare solebat. Ac repletio illa particularis est, vt in crebris ictibus venarum temporalium aspecta- bili pulsū micantium; vel vniuersalis, vt in illo. Οἱ παλμοὶ δέες δι' ὅλας ἀεὶ γὰρ ἀφ' ὧν τὴν τέλει τῶν σιγῶν. i. Continenter tre- 30 mulant, an voce capti moriuntur? Ac particularis quidem legitur in pulsū temporalium arteriatum, qui aspe- ctabilis est medico, & dolorificus ægro, ad futuram hæmorrhagiam, delirium, & ad ipsum quodque ab- scessum. Talis est ille prorrhethici, qui eodem spectat quod præsens hæc prognōsis. Οἱ δὲ ὁμοφρόν πέντοι παλ- μοὶ δέες· ἔχει μὲν π καὶ γνάμης ὡς ἀποφορὸν. Vniuersalis autem palpitatio, præter illud prorrheticum iam ad- ductum quod non sapit Galeno, pace tanti viri, locum illum perperam & contra Hippocratis mētē interpretantis; aliunde nata quàm ipse putat, in prorrhethico memoriæ prodita est ex Phrenitico, his verbis. Παλμοὶ δι' ὅλας τὸ σῶμα, i. Palpitatio per totum corpus. Atqui phreniticum idem scribit, secundo die quo percepta est palpitatio toto corpore, ἀφανῶς, i. voce captum fuisse. Ergo non est verisimile tālem ἀφανῶς, aut palpitationem venisse à spiritu flatulento cumulo δὲ ὑψῆς, vt Galenus voluit commen- tatio ad prorrh. nuper adductum, cum idem Galenus tam citæ mortis causam (interiit enim quarto) 40 retulerit ad virulentam qualitatē æruginosæ bilis, cuius dominatu phreniticus tenebatur. Quod autem palpitatio ipsa pro pulsū, & Græcum nomen ὁ παλμός ἀντὶ τῆς σφυγμῆς non rarò usurpetur, declarat illud Sileni; ὑποχονδρῖος παλμός ἐξωχρῆς, i. hypochondrij continens palpitatio: quem paulò antè narrauit vtriusque hypochondrij tensionem habuisse oblongam, diaphragmate inflammato.

protr. 2. 5. i. 2.

protr. 1. 2. i. 2.

IN FEBRE] Quæ focum habet in lumbari arteria, vnde plethora ipsius & eius quæ nominatur lib. 4. i. 2. cœliaca, estque ὁ δὲ πρὸς τῆς κατὰ κοιλίης, i. spiraculum inferioris ventris.

lib. 4. i. 2.
3. 2. 2. 2.

INSANIAM FACIT] Per alterationem cerebri ab atra bile, cuius actiores sunt morsus quàm flauæ: propterea quæ ἐκτασις ῥιζοχολικὴ nominatur, ipsique fanatici per periphrasim sic descri- buntur, οἱ ῥιζοχολικῶς ἐξισταμένοι, i. qui melancholicè excedunt, in quibus insaniz summa sunt omnia. Sed tamen demissæ symptomatis crudelissimi vim expressit in illo. Οἱ δὲ ὁμοφρόν πέντοι παλμοὶ δέες· ἔχει μὲν π 30 καὶ γνάμης ὡς ἀποφορὸν: vbi Galenus palpitationem refert acceptam spiritui flatulento; paraphoricam autem videri, offensione diaphragmatis, quod generis similitudine & societate principium, i. cerebrum in contragionem adducit. Galeni verba hæc sunt. Τοῖς νεύροις δὲ ὁ μιστοῖς ἢ δ' ὅτι συμπαρῶν εἶναι. i. Nervosis par- tibus principium consentit. Arqui nulla diaphragmatis offensio videtur paraphorica, præter inflamma- tionem systrophicam. Nulla autem spiritus interceptio affectionem inducit inflammatoriam. Quò se igitur vertet Galenus? Sed in palpitatione ventris verendum erit de mox futura insaniam, si ea fiant appa- reantque quæ scripta sunt in hac prognosi. Pulsus quoque in hypochondrio cum perturbatione; dementia est: 40 magisque si oculi huc illuc voluntur: quod in prognōstico dixit, ὅπως μανῶναι ἐλπίς, i. hos excessivos spes est. Cause sunt explicatæ.

4. act. 2.

Coac. 12.
huius cap.

ATQUE INDE CIETUR HÆMORRHAGIA HORRIFERA] Quæ scilicet de- 50 nunciatur horrore qui frustra fit, propterea quæ translatiōnem facit ad diaphragma & caput; aut quæ consecratum habet horrorem.

29 Αἱ ἐς ὑποχόνδρια ἐν πυρετῷ ὀδυῖναι ἀνάσσουνται, ἀνιδρώσιν λυμῶναι· κακοηδέες. πύποισιν ἐς ἰσχία ἀλγήμεῖα. ἅμα πυρετῷ καυσώδη, κοιλίῃ καλαρραγέισα· ὀλέθριον.

Hypochondriorum dolores in febre subsultim vigente, qui sine sudore exoluntur; terrifici. Horum ad ischia transitus est. Ac si cum ardente febre alius profusè feratur; mortiferum.

HÆC PROGNOSIS est omnis diuisa in partes duas, quarum prior enarrationem habuit analyticam. Est enim iisdem penè conscripta verbis, si tantum exceperis vocem illam ἀνάσσουνται. Est etiam in eundem scopum conscripta. Superest igitur ut quid sit πὸ ἀνάσσειν, paucis aperiam. Aperiendi autem ratio repetenda ex comment. ad prognosin illam. Οἱ πρὸς χίεα ἀνάσσουντες, κακόν. ἰ. Qui ad manum exiliunt, malo sunt loco. Non enim dolores propriè ἀνάσσουνται, nisi fortassis παλμώδεις ἢ σπυρματώδεις: de quibus non ita pridem satis iam multa scripsimus ad citimam huic prognosin: nisi etiam qui transferuntur sursum, cuiusmodi sunt illi qui relictis lumbis, transeunt ad diaphragma. Sed ἀνάσσειν dicuntur qui velut à tonitruo somno excutuntur, omnibusque artubus contremiscunt, subsultim mouentur, nec vlllo stant loco metu perculsi. Qualem accepimus fuisse mulierem Thasiam δυσάθιον, quæ à mēstruorum suppressione febrem habuit conuulsionibus crebram, quibus quiescentibus, nugarum garrullitate, verborumque obscoenitate insigniter delirauit. Ad postremum, vacatione conuulsionum, coma ipsam subiit, καὶ πάλιν γερσε ἀνίστα, ἰ. mox excitata exiliit. De transitu autem doloris ad ischia, superior prognosin causam cui ita fiat apertissimè declarauit.

Iam verò posterior pars huius prognosios mihi non videtur δυσάθιος, neque ὁμοιῶδης instituto prognostico. Sed neque appositè scripta, quamuis vera; nisi fortasse quis dicat quod paulò antè docuimus; nullā vacationē, nullam excretionem, nullum deniq; abscessum, quantumuis magnū & ἀνίρροπον, videri posse exoluentæ affectioni plethoricæ accommodatum & proprium, si ipsa plethora sit malignæ cacochymiae particeps, aut cum inflammatione coniuncta. Ex quo efficitur dolores coxarticos acerbitate ipsa, prorupram alium per cacopragiam ventriculi & hepatis, aut per exolutionem potentiorē retentricis, febrem ardentem symptomatum vehementia & assiduitate; omnia hæc simul necessariò esse mortifera, cum singula, per se, homini necando sufficiant. Veritas autem posterioris partis si appositè scripta non sit, splendet tamen in illa prognosin. In febre ardenti, si alius profusè feratur; mortiferum.

30 Οἱ περὶ ὀμφαλὸν πόνοι παλμώδεις· ἔχουσι μὲν ἔτι καὶ γῶμης παρὰ φορον. Περὶ δὲ κρίσιν τύποισι φλέγμα ἄλις συχνὸν σὺν πόνῳ διέρχεται.

Umbilici dolores cum pulsu coniuncti, nonnihil præ se ferunt mentis percussa. His autem adueniente crisi, pituita satis multa cum labore excernitur.

Ο Μ Ν Ι Α quæ in hac prognosin continentur, sunt ὁμοιῶδης prognostico instituto, super delirio, & crisi naturæ conuenienter susceptæ per dolorificam pituitæ excretionē qua ducitur alius. Ac sanè prior pars, veritatis luce illustrata est comment. ad illam prognosin. Palpitatio ventris in febre insaniam facit. Ex quo efficitur, febris nomen hic desiderari, propterea quæ ipsam prognosin mancam videri. Sed enunciatio ipsa facit ut aliquid de meo iure concedam, quo nuper usus sum in hoc theoremate. Nullam diaphragmatis offensionem posse videri paraphoricam, ad insaniam vsq; in qua dementiæ summa sunt omnia, præter inflammationem systrophicam. Hic enim tantum abest ut ex hac palpitatione insaniam nasci dicat, aut ex ea posse insaniam opinionem fieri, vt leuem suspicionem inde moueri mentis emotæ seu percussæ, disertis verbis asseruer, cum ait, ἔχει ἔτι καὶ γῶμης παρὰ φορον, ἰ. habet aliquid mentis percussæ. Itaque rationem admitto qua dicit Galenus paraphoricam esse diaphragmatis offensionem, sympathia quam habet cum cerebro, generis similitudine & societate. Sed offensionis causam nullo modo probare possum, quam scribit oriri ex flatulento spiritu, frigoris vi cumulatè suppressio. Est enim verum illud quod alibi ratum esse voluit ipse Galenus, quod flatuum interceptio dispositionem inflammatoriam nunquam infert. Ipsa verò crisis quæ finem adfert symptomatis ex palpitatione natæ, offensionis causam planè ostendit his verbis.

ADVENIENTE CRISI] Quæ ἔτι λόγῳ naturæ suscipitur atque absoluitur, vnde morbus ipse, omniæque symptomata inde nata solent exolui. Nihil enim sine crisi quiescit bonis aegroti rebus. Nec vlla leuatio

vlla leuatio salutaris, nec stabilis, quæ non fit *καὶ λόγῳ*, i. conuenienter & merito.

PITUITA SATIS MVLTÀ EXCERNITVR.] Ergo pituita in vitio est, vnâque palpitacionis, indeque deliracionis causa. Est enim persuasum omnibus, eam demum cuiusque morbi causam videri, quæ dum adest, dumque præsens est, morbus ipse viger; dum verò abest virtute naturæ explosa, quiescit atque exoluitur. Quod vt concedam: tamen non efficitur pituitam sine inflammatione diaphragmatis, mærem appetere. Inflammationis autem causa est febris quam genuit pituitæ corruptio stabulantis inter diaphragma & ventrem. Ipsa verò palpitatio, cuius naturam nuper expressimus, & signi & causæ rationem obrinet ascensus ad superiora. Quanquam & sine hac, dementiæ genus omne focum habere potest in diaphragmate, sicut in cerebro. Vt igitur bilis flaua in cerebro facit phrenitidem; bilis atra infaniam, pituita putris lethargum: sic in diaphragmate, pituita putris cum febre quæ palpitacionem inducit, deliracionem quoque facit quæ proportionem responderet lethargo. Adueniente autem crisi, per pepasimum, proritationem, & meatuum libertatem, natura duce, pituita per aluum excernitur; quod ei facile est, cum & ipsa ex eodem foco, vbi nunc stabulatur, per meatus vrinarios exitum habeat, quod penè miraculo apponeretur, vti Marinus censuit, nisi admirabilem excundi rationem patefecisset Galenus comment. ad illum aph. *Quibus ventrem inter & diaphragma pituita concluditur & dolorem facit, quæ in alueorum neutrum exitum habet; his per venas conuersa in vesicam aqua, solutio datur morbi.* Quod sequitur de alui contentione in excernendo, vt præteream varias super hac re lectiones quas in prorrhethico annotauit Galenus, eodém pertinere sententia hæc quòd illud scriptum in aphorismis. *Quicumque lienosis dysenteria fugaci corripiantur, curationem morbi recipiunt.*

procr. vlt. c. i. i.
aph. 43. & 48.
6.

31 Μείλα κοιλῆς ὑπόσασιν, ὑποχόνδρια μετέωρα· κακόν· μάλιστα δὲ τοῖσι φθινώδεσι τῶν μακροῶν, καὶ οἷσι κοιλῆαι ὑγραίνονται.

A suppressione alui, meteorismus hypochondriorum, grauis: maxime verò ijs qui ab inueteratione tabescunt, tum ijs etiam quibus alui profusè feruntur.

VIDE comment. ad 16. huius capituli.

32 Τοῖσιν ἀλυσμώδεσιν ἐν ὑποχόνδριῳ, τὰ ὥς οἱ ἐσθρύντα· κτείνε.

Quibus in hypochondrio anxius parotides assurgunt; ipsos interimunt.

EST QUOQUE huius prognosticæ ratio explicata cōment. ad illam suprâ his verbis conscriptam.

40 Quæ cadunt in hypochondrium dolorifica mala; cum aliâs praua sunt, tum verò si faciunt profusiores aluos. Peiora autem quæ breui nascuntur; tum quæ assurgunt ex his parotides, multùm terrificæ, vt cætera expurata.

12. huius cap.

33 Τὰ κατὰ κοιλῆν σκληρύματα μὲν πόνος, πυρελοῖσι φεικώδεσιν δὲ ποσίοις σμικρὰ ἐφυγρανομήνης, καθάρσιν εἰς δίδοντα· ἐς ἐμπύησιν ἤξει.

Duritas alui cum dolore coniuncta, & febre horrifera, & cibi fastidio, si aluo parcè ducta non expurgetur; in suppuratum vertetur.

PVLCHERRIMVS hic erit colophon disputationis institutæ de hypochondriacis & aluinis tumoribus, qui vel ab inflammatione accidunt systrophica, vel à scirrho, vel ab œdemate, vel ab inflatione, vel etiam ab humorum segregatorum suppressione. Omnium autem symptomata pathognomonica & cōfessionaria per sympathiam vicinitatis & societatis, & per morbificæ causæ propagationem, sunt explicata. Quinetiam patefactæ sunt crises, periodi, & paroxysmi; vt nihil omnino prætermisum esse videatur. Pertinet autem præscripta hæc prognostis ad illum locum de aluinis tumoribus iam exaratum. Similiter autem significant vt hypochondriaci, ipsi etiam qui sunt in ventre tumores: nisi quòd hi minùs quàm illi in suppurationem vertuntur; minimùmque omnium, qui sub umbilico assurgunt. Vt enim tumores hypochondriaci, duri quidem ac dolorifici, per systrophien in visceribus oborti, maximèque in iccore, citam mortem adferunt, nisi hæmorrhagia liberali periculum propulsetur primis periodis, aut validarum virium beneficio ægtorum suppuratio maneat intra vigesimum diem cum incerto euentu; molles autem non ita periculosi, & qui ad sexagesimum vsque diem dare solent inducias donec suppurato crisin suscipiant: ita quicumque tumores in reliquo ventre assurgunt, duri quidè, cū dolore coniuncti, atque profundi, si fortè non habeant exitum per alui profluuium, vt hypochondriaci per liberalem hæmorrhagiam; similiter

vt illi, in suppuratum vertuntur. Nam musculorum systrophæ dolorificæ, non raro etiam suppurato fâ-
nescunt, nec ante suppuracionis diem ad exitum agros præcipitant; quod facere solent hypochondria-
cæ, nisi fortè grauior in commoda & salutem eorum peccetur.

Ergo. DVRTITAS ALVI] Non quidem à siccitate, qualem agnoscimus in iis qui multum à febris
marasmo emacruerunt: nec verò duritas alui existimanda quam facit hypochondrij vtriusque tensio,
per contractionem ab inflammatione septi transuersi; multò minùs etiam intelligenda est duritas alui,
quæ venit ex ea causâ quam docet illa sententia. Μίξις τῆ κατὰ τὴν γαστέρα σκληρώσις. i. Mixtio ventrem indurat.
Sed alui duritas quam σκληρώσις nominat, idem planè significat quod in matricis orificio summus præ-
ceptor hoc nomine distinxit à scirrho & grauiditate. Erit igitur duritas alui à tensione, non quidem fla-
tulentia, nec item scirrhus: sed phlegmonosa, quam facit phlegmone systrophica, multò minùs tactui
contumax, minùsque renitens quàm scirrhus, estque ipsa doloris particeps, cuius expers esse dicitur scir-
rhus. Ergo. DVRTITAS ALVI] Quam facit aluina phlegmone systrophica, loco tantum, partisque
obsessæ demissione differens ab hypochondriaca, ac celeritate periculi, symptomatumque magnitudi-
ne, illa minor: quoniam in aluo tantum assurgit; quo nomine intelligimus, non quidem cibi promptua-
rium, nec superiore ventrem, i. thoracem: sed amplitudinem illam quæ continet intestina, mesente-
rium, pancreas, & epiploon, quæque vestitur peritonæo tunica & epigastrio; si tantum epigastrij par-
tem illam exceperis quæ hypochondrium nominatur.

CVM DOLORE CONIUNCTA] Hoc signum est syllogisticum τῆ σκληρώσεως, quo vnico, præter
renixus contumaciâ, distingui debet à scirrho doloris experte. Est autè doloris accessio per diffensionem
eximiam partis obsessæ, cum intemperie maxima, & oppressionem contiguæ acerrimi sensus. Huc per-
tinet etiam partium vicinarum & sociarum sympathia, sicut in duritate vteri dolor imi ventris atque
coxarum, cum rigore, & febre.

ET FEBRE HORRIFERA.] Vel potius horrore febrifico; vt quemadmodum horror sympto-
maticus esse solet purulenti abscessus: ita febris consecraria sit horrore frustra citati per afflictionem
caloris natiui. Est enim ratum illud iam sæpe vsurpatum; quod omnis rigor, omnisque horror cietur à vasis
aut vlcerebus. Exempla rigoris ab vlcere passim leguntur in pleuritidè purulenta, in phthisi, in renum
abscessu, &c. Nos autem symptomatice horrore ab vlcere, i. vomica pulmonis signa perspeximus in
Christianissimo Rege CAROLO IX. 1574. Erit igitur febrificus horror potius quàm febris horri-
fara; ne quis mali causam referat ad hemitritæum febrem, quæ vna propriè nominatur φευκώδης, i. hor-
rifica. Atque hic τῇ φευκώδεσιν similiter nasci videtur vt in phthisi, de cuius diagnosi extat illud iam explica-
tum. Labores horriferi cum suspirioso anhelitu, signa sunt tabis. Sed huius rei memoria non dubito quin ani-
mis hæreat studiosorum qui commentarios nostros attentè legerunt.

ET CIBI FASTIDIO.] Sic enim veteres inter ἀσπίς & ἀσπίτης hoc interesse dixerunt, quod ἀσπίς
sint ἀνδρες qui cibos non capiunt; ἀσπίτης autem qui cibos respuunt, auersantur, atque quodammodo
abominantur, quos alibi scripsit ἀπενονμένους ἔχειν τὰς τὰς ἀπογοφερόμενα, i. fastidio efferri in cibos & remedia
conuenienter præscripta. Est igitur ἀσπίς cibi fastidium, & ἀσπίτης homo cibi fastidiosus. Est autem hoc
symptoma terrificum signo & causâ. Ac signo quidem, quoniam ventriculi facultatem ἀρκεῖν in vitio
esse denunciat, vel ob ferini catarrhi prolapsus, nimiamque malignæ cacochymię abundantiam, vt in
tabidis; vel ob ipsius ventriculi νέκρωσιν, vt in Pario. Quæ res adduxit virum vt cibi fastidium terrificis
omnibus signorum generibus anteponendum duxerit in tritæophya febre. Πολλὴς δὲ τῆς ἀσπίδος ἀσπίτης
καὶ πικρὴς ὅτι τῷ νοσηματίῳ, καὶ μέγιστον μὲν σημεῖον παρεπομένον τῷ πλείστον, ἀσπίτης ἔστι πάντων γενημάτων. i. Cum mul-
ta & varia iniudicatio fierent, prius nihil fuit quàm à cibo abhorre. Hæc sola post multas acrisias ab irritio
crethismo, Darium quendam Thalium 120. die vita defungi fecit. At verò contrariarum causarum per-
spicientia, eidem summo dictatori theorema illud catholicum iure extorsit. Εἰ πάσῃ νόσῳ τὸ ἐρῶδες τὸ
ἀγαθόν, καὶ εὖ ἔχειν τὰς ἀπογοφὰς ἀχρον. i. In omni morbo mente esse solida, ad ea quæ offeruntur bene habere,
bonum. Vbi Galenus adiecit, μέγιστον. Atque ad huius theorematismis expressionem plurimum certè valuit,
quod idem in beneficio appetentiæ restituta obseruauit, literisque ita mandauit. Vnicum, inquit, per-
utile maximumque eorum, quæ tunc apparere, signorum, plurimòsque ab interitu vindicauit, illud certè fuit, qui-
bus in stranguria conuersio facta est. Deinde paulò post. Κοιλία πρὸς εἰς τὸ φρονεῖν καὶ κακὴν ἔσται, καὶ
ἐκείνῳ γενημάτων πᾶσιν ἰδέσθαι ἔχον. i. Quin alui pestime turbata, subsistebant, & cibos suauiter degustabant. Iam
verò dubitari nō potest quin cibi fastidium, siue ἀσπίς, grauiſsimorum malorum accessionem adiun-
gat, ex eo quod genium defraudando, & solidarum partium vitale principium labefaceret, vnâque ne-
ctar viuificum cordis, σπέρμα Græci vocant, exhauiat.

SI ALVO PARCE DVCTA NON EXPVRGETVR.] i. Si alui τῆ σκληρώσεως purgationem sui
non habeant per vacationem rheumatis consistentis, liberali deiectione, non quidem symptomatica
purulenti abscessus, vt esse solet suppurati quod intra vmbilicum finitur; τῶν ἐμπύμασιν ὁμοφύλος ὁρὸς ὅσιν
τῶν ἐμύμασιν ἐκπίσκει, καὶ τὰς ἐξείσσονται. i. Empyematum est terminus vmbilicus; ea qui concepturi sunt aluo turbā-
tur: sed λόγῳ naturæ suscepta, & critica. Sic enim tumores qui sunt infra hypochondrium, ad vmbilicum
vsque, maximèque hypogastrici; exoluuntur. Testis est illa sententia. Εἰ Περὶ τῶν τῶν γαστρῶν τῶν ἐν τῇ
καὶ τῶν τῶν ἡσπῶν τῶν ἐν τῇ. i. Perinthy vacuatio genitura similis, non raro fit lege critica. Nam hypogastriorum
ferè huiusmodi esse solet. Quæ causa est etiam quam obrem tumores aluini minùs in suppuratum abeant,
quàm hypochondriaci, maximèque ij qui sub vmbilico assurgunt.

IN SUPPURATVM VERTETVR.] Non tam partis merito, quàm rheumatis consistentis, seu
materiæ stabulantis vnde tumor assurgit; quæ finiri necesse est; vel diaphoresi, quæ hic locum non
habet; vel concoctione, vnde suppuratum; vel concretionem, hinc scirrhus; vel corruptione, inde gan-
græna. Atque

lib. 5. aph. &
lib. 6. Epid.

6. Epid. part. 5.

lib. 2. τῶν

2. μολυσμῶν.

Coac. 8. & 10.
7. lib.
lib. 2. progn.

1. Epid.

Coac. 17.
1. lib.

1. Epid. part. 1.

3. Epid. part. 3.

1. Epid. part. 2.

aph. 32. 2.

1. Epid. part. 2.

sent. 32. part. 2.

6. Epid.

6. Epid. part. 2.

10

20

30

40

50

grana. Atque omnium phlegmonarum systrophicarum, omniumque cedematum talis conditio lege naturæ sancita est; nisi tum primis periodis materiæ consistentis vacuatio, & concitæ reuulsio, aut detinatio consequatur.

34 Ἰπὲρ ὀμφαλὸν πόνος, καὶ ὀσφύος ἀλγῆμα φαρμακείῃ μὴ λυόμενα· ἐς ὑδρωπῶδες ξηρὸν ὀποτελεῖται.

Meliùs sic in aphorismis, II. lib. 4.

10 Οὐόσοισι σφόφοι, καὶ πρὸ ὀμφαλὸν πόνοι, καὶ ὀσφύος ἀλγῆμα, μὴ λυόμενα μὴτε ὑπὸ φαρμακείας, μὴτε ἄλλως ἐς ὑδρωπᾶ ξηρὸν ἰδρύνει.

Quibuscumque tormina, partiumque circumcirca umbilicum labores, unaque lumborum dolor, qui neque à pharmacía, neque aliter exolvitur; in hydropem siccum finitur.

20 HÆC SENTENTIA in aphorismis eò scripta legitur, ut intelligamus pharmacíæ irritam purgationem in falsò credita purgandi necessitare. Ut enim pharmacíæ locus esse videtur in alui torminibus quæ sursum mouentur, habentque πρὸ αἰῶς ἔλκεσι, i. reuolutionem sursum, ut borborygmi κατὰ: ita catharticum frustra exhibetur ad ea tormina quorum perennis generatio est ab hectica intemperie tenuium intestinorum, quam nulla purgatio ad symmetriam potest reducere.

aph. 74. 4.

Ergo. QVIBVSQVE TORMINA] i. Sæui dolores qui abradendo & exasperando in tenuibus intestinis excitantur, faciuntque πρὸ αἰῶς ἔλκεσι, unde nominantur οἱ σφόφοι, proximèque absunt à voluulo cuius prænuncij esse solent, atque in eum degenerant, si tanta fiat morbosica causæ accessio ut chylum & stercus remeare faciat, aut certè permeare prohibeat. Nascuntur autem tormina tum à forti morsu intestinorum, tum à flatulento spiritu exitum non habente: sicut in colo, colica ipsa. Hic autem nos 30 torminum causam agnoscimus spiritum flatulentum, ut inde hydropis sicci, de quo hic agitur, generatio consequatur.

PARTIVMQVE VMBILICO CIRCVMIACENTIVM LABORES] Qui necessariò & interclusi status, & acrioris morsus consecutarij esse solent; atque ij cernuntur in doloris acerbitate, & impedimento proprii cuiusque muneris in distribuendo, & discernendo chylum à fæce. Partes autem circumiacentes sunt intestina tenuia, ieiunum & sinuosum.

VNAQVE LVBORVM DOLOR] Per sympathiam vicinitatis & societatis, pèrque ipsam propagationem causæ dolorificæ: quoniam totum mesenterium, quod est omne diuisum in mesarcon 6. Epid. & mesocolon, originem ducit à nervis & ligamentis lumborum. Hinc vetus illud de triplici fonte hy- Part. 4. dropum. Ἀρχονται δὲ οἱ πλείστοι μὲν ἀπὸ τῆς κεντέων, καὶ τῆς ὀσφύος, οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ ἡπατος. i. Nascuntur plurimi à lumbis 6. lib. 2. progn.

40 ilibus; nonnulli à iecore.

QVI NEQVE A PHARMACIA, NEQVE ALITER EXOLVUNTVR] Ob flatulenti spiritus perennitatem ab intemperie hectica tenuium intestinorum quibus mederi non potis est; nec pharmacía, flatibus excludendis; nec etiam neoterismo, intemperiei hecticæ ad temperationem adducendæ, ut fori, hapso, litu, &c. Quod enim strophorum irritam curationem esse dixit pharmacía & aliter; planè ostendit morborum omnium curationem suscipi pharmacía ad expurgationem; & neoterismo, ad complexionis & temperamenti moderationem, atque symmetriam partium afflictarum. Quæ duo curandi τέχναι siue remedia si frustra, bene an malè, adhibeantur; desperatam curationem ostendunt, malique in peius conuersionem.

50 IN HYDROPE SICCV FINITVR] Καταξησιῶς hydrope dicto, ex tumore abdominis ab inflatione quam fecit perennis generatio flatulenti spiritus interclusi. Nam verè is demum abdominis tumor hydropis naturam ostendit, quem facit humoris aquosi suppressio.

DE DORSI ET LVBORVM

AFFECTIBVS.



60 Α δὲ ἐξ ὀσφύος ἀλγῆματα χρονιώτερα, πυρετῷ παροξυνόμενα τεταμογρῶς ποιεῖ ταὶ δρομῶδεια αἵματα διαχωρεῖν.

CAP. XII.

I Diuturni ex lumbis dolores, qui tertio quoque die

vi febris exacerbantur; grumosi sanguinis deiectionem faciunt.

H A C T E N U S de hypochondriacorum viscerum, partiumque alvinarum tumoribus: nunc de lumbaribus malis dicendum. Cernuntur autem mala in lumbis quæ continent, ut in musculis; quæ foris adiacent, vertebris quinque lumborum, qui numerus vertebrarum in homine tantum est, non autem in cæteris animantibus, ne in simia quidem. Cernuntur quoque in vertebris ipsis luxatis, unde fit *κνῶσις* antè, post *κνῶσις*, dextra & sinistra *σκολίσις*. At verò continentur in lumbis medulla, adiacet infus musculi *ψάι* dicti cum insigni vena & pari arteria, stabulantur autem bini renes, urinæ ductus, vasa spermatica, uterus quoque mulierum. Veniunt autem à lumbis ut oriunda quædam, *μεσάρων* & *μεσocolον*: quæ duo omnino sunt partes totius septi intestinalis quod *μωστμελον* Græci vocant. Omnium verò lumbarium partium quæ continent, quæ continentur, quæ adiacent lumbis, quæ stabulantur, quæque à lumborum ligamentis & nervis originem ducunt; omnium, inquam, sua est cuiusque affectio; sua etiam sympathia cum sociis atque propinquis, earumque propriæ sunt idæ signis syllogisticis explicandæ in decisione prognosæ de lumbaribus morbis institutarum. Ac primum in hac prognosi agit de malis dolorificis quæ cōfectaria sunt lumborum.

D I V T V R N I E X L U M B I S D O L O R E S] Quorum causa est firmiter fixa in mesenterij tensione & intemperie. Nam tuberculorum lumbarium materia, unde luxatio, quamvis opportunitatem magnam habeat translationis, in amplitudine venæ lumbaris, unde τὸ κνῶμα, i. giber sæpe exoluitur: tamen non antè ad intestina transfertur, facitque dysenteriam, quàm mitigari cœperit & suppurari. Scus est de crurum varicibus quæ humoris adhuc crudi exclusione in truncum venæ lumbaris, apparèt, idémque faciunt ad curationem: τὸ κνῶμα, quod ipsa dysenteria. Sed hoc loco agitur de sanguinis grumosi deiectione, quæ aliunde nequit venire quàm à visceribus hypochondriacis, vel à mesentericis venis.

Q U I T E R T I O Q U O Q U E D I E V I F E B R I S , E X A C E R B A N T V R] Τετανοήσας, scripsit hoc loco, quo alibi τετανομένη ἔστιν. Nam γένεσθαι, καὶ φέειν, ἢ φέειν idem significant usurpata pro generationis perennitate. Fundit humo facilem victum iustissima tellus. Vnde fundus dicitur τὸ φέειν, i. à fundendo, quo verbo perennis significatur propagatio. Huc pertinet illa prognos. Quæ tertianarum febrium paroxysmis ingrauescunt mala; eorum paroxysmorum propria sunt, ac sanguinis grumosi deiectionem adferunt. Hic autem consulto non exacerbari, sed ingrauescere, ipsæque mala tertianorum paroxysmorum propria esse dixi: quia non simplici & periodico motu exacerbantur, ut tertianæ, & biliosæ acutæ: sed grauiorum malorum accessione ingrauescunt; eaque mala cernuntur in febris ardore, doloris acerbitate, cardiogmo, iactatione, delirio, vigiliis, & inexhausta siti, denique in omnibus symptomatis translationis, malignæ qualitatris & inflammationis; cuiusmodi sunt tritæphyæ τὸ ὅλον ὀπιθιδόντες καὶ αἰάροντες ὅτι τὸ κακίον, i. perpetuò in petus accrescentes; cuiusmodi sunt etiam hemitritæ τὸ ὅλον ὀπιτὸ ὀξύτερον ὀπιθιδόντες, i. perpetuò facescentes in vehementiam. Nam febres omnes continuæ quæ tertio quoque die ingrauescunt verius quàm exacerbantur; aut sunt tritæphyæ, aut hemitritæ, de quarum natura satis iam multa scripsimus.

G R U M O S I S A N G V I N I S D E I E C T I O N E M F A C I V N T] Sanè quidem si potis est, idque ad ægri salutem; sin minùs, desperata salus est ægri. Est enim iam verè positum illud perceptum. In omni dolore hypochondriorum, hepatis, cordis, partiumque sub umbilico circumiacentium, sanguinis exclusio sperabilem vitæ salutem ostendit; contra suppressio, desperationem salutis. Atque illud perceptum facit ad explicationem illius prognosæ. Quibus hypochondriorum, hepatis, cordis, partiumque circum umbilicum labores, exclusio per deiectionem sanguine, liberantur; non exclusio, intereunt. Quod autem grumosi sanguinis deiectionem fieri annotavit, planè ostendit dysenteriam αἵμα τῷ δὲ per liberalem & liberam excretionem, non autem per cacopragiam iecoris exoluti. Talis enim cacopragia proluviem facit sanguinis non grumescens. Nec verò serofus ille sanguis grumescit: sed ruber & crassus in amplitudine intestinorum, quod hæmorrhoidum suspicionem tollit: quia illæ sanguinem grumosum fundere non videntur, quamvis salutariter valde ferantur (si habeantur, non habeant) ad mala dolorifica lumborum & mesenterij atque renum. Omnis autem sanguis è venis expressus corrumpitur atque grumescit; ut sunt partes in quas effunditur: quoniam φυλακὴ extra venas non habet.

2 Τὰ ἐν ὀσφύϊ ἀλγήματα αἱμορροϊκὰ.

Dolorifica in lumbis mala; sanguiflua.

Q U E M A D M O D U M dolorifica ex lumbis mala, si quidem naturæ imperio tandem regantur, dysenteriam faciunt grumosi sanguinis salutarem: sic etiam illi qui sunt in lumbis oborti dolores, profluio sanguinis sedantur atque quiescunt. Atque ut viscerum hypochondriacorum, stomachi, partiumque umbilico vicinarum dolores, exclusio sanguine exoluntur; non exclusio, interimunt: ita lumborum dolorifica mala, quæ scilicet intra lumbos ex partium adiacentium repletionem & cacochymia nascuntur, non minùs in febre terrifici à suppressione causari, quàm dolor cervicis qui nulla vi in cervicis musculis incidente excitatur. De quo extat prognos iam explicata. Cervicis dolor enim in febre omni terrificus, tum verò

tam verò pestiferus in metu insanie: Quod in Sileno annotavit, & in Hermocrate, tum alibi passim. Sed hic nulla mentio febris. Quamobrem aliò cōvertere nos oportet dolorifica in lumbis mala sanguiflua.

Enimvero. DOLORIFICA IN LYMBS MALA] Quæ veniunt ex appulsu molesto micantis arteriæ, & oppressionē musculorum intrusadiacentium lumbis, ex nimia sanguinis abundantia in vena magna lumbari, & repletionē quadam particulari, quam fecit hæmorrhoidum in viris quidem suppressio; in fœminis verò menstrua interclusa, tum affluendo, tum resfluendo. Ex quo efficitur, notitiam comparari doloris lumbaris quorsum ille fiat, & quorsum appareat, ex perspicientia rerum præteritarū, & signorum præsentium. Nam in melancholicis à temperamento & diætâ, hæmorrhoidum futurarum signa sunt, aut symptomata suppressarum. Sic in mulieribus menstrualibus *ἡ δυνάμις*, prænuncijs sunt menstruorum viam ad *καὶ τὴν* affectantium; interclusorum consecrarij aut resluentium. Quinetiam hæmorrhœici, & menstruales fœminæ; lumbiqueruli siue *ὀσφυγίαι*, ambo fiunt *ἀσπίδες* & cardialgici: quoniam ex illa nimia sanguinis abundantia & repletionē particulari vasorum insignium quæ adiacent lumbis, tenue quoddam serum quod in ventrem prorepat, indeque in orificium eius, cardialgiam facit; ipsa verò copia cumulatè viam deorsum affectans quò cursum inflectere consuevit, quando in lumborum regione subsistit, aut eò reduit prohibito exitu; dolorifici mali in lumbis cōsecutionem adfert, tum per micantis arteriæ molestos appulsus, tum per lumbarium musculorum nētorūque oppressionem.

SANGVIFLUA] Ut soboles sanguinis affluentis & resluentis sine prouidentia quæ intrinsecus extrinsecusve inciderit, sed sua sponte: vel etiam ex eo sunt *αἱμορροῖαι*, quod sanguinis deorsum prorupione, quam ipsa cient, quiescant; non secus atque in vlceribus à forti pulsu hæmorrhagia cietur: quoniam natura sui diligens non rarò *validius agens, magnū & violentum edit arteriarum motum; expellendi* studiosa quæ sibi molesta sunt; atque ita hæmorrhagias inferit.

3 Αἱ δὲ ὀσφύος ἀλγίματος αἱμορροῖαι λαῦραι.

Quæ ex lumborum dolore cientur hæmorrhagia; large.

EODEM spectat hæc prognôsis quò citima huic modò explicata, cuius demonstratio repetenda ex comment. Galeni ad illum aph. A forti in vlceribus pulsu, hæmorrhagia. Ut enim fortiter micat arteria ex contentione forti naturæ studentis excludere quæ sibi molestiam adferunt; indeque cientur hæmorrhagiæ: ita quò maior est amplitudo venarum siue arteriarum micantium, & amplificatio maior ex illa naturæ contentione forti; eò quæ inde cientur hæmorrhagiæ sunt largiores. Atqui lumbarium arteriarum maior est amplitudo, quàm cæterarum. Nos enim eandem statuimus hoc loco causam doloris coxarij, lumborum, quàm in superiore prognôsi.

4 Οἷον ἐξ ὀσφύος ἀλγίματος ἀναδρομὴς ἐς κεφαλὴν, καὶ χεῖρες νερκώδεις, καὶ καρδιαλγία, καὶ ἡχώδεια αἱμορροῖκα λάβρως, καὶ κοιλία κατὰ ῥήγνυσται τέτοιαι, καὶ νῶμαι περὶ χῶδες ὅτι πολὺ.

Quibus ex dolore lumborum anadrome fit ad caput, torpida manus, cardialgia, auriumque flatus sonori; hæmorrhagiæ large; tum alui profuse feruntur, ac mentes perturbata ut plurimum.

IN HAC prognosi complexio est signorum quibus denunciantur hæmorrhagiæ largæ quæ cientur ex lumborum dolore. Quinetiam symptomata continentur quæ veniunt ab excursu dolorificorum in lumbis malorum; ex quibus vel hæmorrhagia cietur, vel paraphorica ipsa redduntur & fiunt. Sanè lumborum excursus caput replet, ex eaque repletionē, symptomatum capitis omnium paraphoricorū, cataphoricorum, cephalalgorum, & catarrhoicorum principia causæque ducuntur. Atque ut ceruicis dolor, ita coxarius in febre omni pestiferus iis qui sunt in metu insanie quando excurrit ad caput, nec antè quiescit hæmorrhoidibus, aut menstruorum profluvio; post autem hæmorrhagia è naribus exitum habeat. Quæ cum ita sint.

QUIBUS EX DOLORE LUMBORVM EXCURSVS FIT AD CAPVT] Vele etiam ad diaphragma: Αἱ δὲ ἐνὶ πύρετι ἡρόμεναι ὀδύνας περὶ τὴν ὀσφύν καὶ τὰ κάτω χεῖρα, καὶ ἡ φωνὴ ἀπὸ τῶν κατωτέρων ἐκέρχεται κέρτα. i. vt Celsus interpretatur. Dolores circa coxas & inferiores partes orti, si ad viscera transierunt, subitòque desierunt; mortem subesse testantur. Sic hypochondrij tensio inflammationis expertæ, & repentina, quæ sine borborygmo cum difficultate spirandi exoluitur; sursum ad caput cursum inflectit, ipsumque replet: vnde nascuntur symptomata, humoris morbifici & partis obsessæ propria; nisi hæmorrhagiæ; eorum generatio prohibeatur.

TORPIDA MANVS] Quod signum minimè esset *ὀμειδὲς* futurarum cerebri affectionum ex hac

prognosis præuilarum, si torpor ille veniret per progressum causæ in cerebro firmiter fixæ, quæ libertatem meandi adimeret spiritui animali, per oppilationem nervorum cervicalium qui propagatur in manus. Esset enim torpor inde natus, signum potius caraphonicum, quàm paraphoricum, aut hæmorrhagiæ futuræ; quæ duo pathemata repleti capitis consecutaria proponuntur in hac prognosi: sed reuera torporis illius causa est ceruicis oppressio, quam facit venarum & arteriarum distensio ex ipso humoris excursu, dum viam ad caput affectat. Hinc ceruicis dolor qui febre ineunte, nec vlla sperabili crisi, ut esset tum nequit, pestiferus esse solet iis qui sunt in metu infantiæ. Hinc Pythioni manuum tremor ab eadem oppressione, quem sanandum iubet Galenus copiosa sanguinis detractio, his verbis: *ὅταν τρέμος ἐκίνηται τῶν χειρῶν, καὶ οὐκ ἔσται κρίσις, ἀλλὰ θάνατος*. Atque ita manuum torpor signum erit *ἀπονεκρωτικὸν* prænuncium delirij aut hæmorrhagiæ.

CARDIALGIAE] Hoc signum est *συνεστραφέντος* & *συνεστραφέντος* doloris coxarum ex nimia sanguinis abundantia dum stabulatur in coxis, multò etiam magis eius quæ sursum fit translationis, relicta lumborum sede. Tum enim tenue quoddam serum prorepat ad ventrem, indeque ad orificium eius quod est acerrimi sensus. Hinc veniunt commemorata hoc loco cardialgia.

AVRYMQUE FLATUS SONORI] Non quidem bombi, quorum flatus crassior bombilamento apum in ora interiore meatus auditorij, nec vnquam eliditur, atque nascuntur ferè ab exolutione partis illius cerebri vnde vis audiendi manat: sed echus varietas, hoc est, sonori flatus varietate distincti pro flatulenti spiritus crassitudine aut tenuitate, meatus angustia aut libertate, facultatis expultricis contentione aut remissione. Atque talis echo varietate sonori elisa, non rarò hæmorrhagiæ prænuncia est, non rarò etiam fortis delirij. De hæmorrhagia scriptum est illud. *Percussum caput, aurium echo hæmorrhagiam ciens*. De forti delirio solennis est illa prognos. *In febre ardente edita echo cum hebetudine visus, tum gravitate narium, excessum minatur melancholicum*.

HÆMORRHAGIÆ LARGÆ] Prorupto sanguine qui prorepat ad ultimas venarum oras quæ sunt ad imam frontem, vnde per anastomosis faciem, qua data porta, ruit. Sunt autem hæmorrhagiæ largæ ex copia sanguinis, meatus amplitudine, & cōtensione fortis naturæ studētis molestia expediri.

TVM ALVI PROFVSE FERVNTVR, AC MENTES PERTVRBATÆ VT PLVRIMVM] Melius sic. **AVT MENTES PERTVRBATÆ, &c.** Ab eiusdem humoris excursu, denegata hæmorrhagia, fortis delirij consecutio adferatur. Omnis enim repleti capitis ab excursu, paraphorica est; si cum vigiliis & perturbatione mentis coniuncta est, nec liberali hæmorrhagia, delirij locus tollatur. *Ταπεινώτερον* autem dixit *ταπεινώτερος*, *ἀπὸ τοῦ ἐκείνου* *μεταχειρισθείς*.

QVAMVIS TVM ALVI PROFVSE FERANTVR VT PLVRIMVM] Ac si diceret, alui profluvio delirij occasio non præripietur, ut saepe fit, per concitati rheumatis retractionem, & consistentis detractio: quoniam hoc loco venter in vitio est ob seri acrioris eò translati cacochymiam. Itaque tametsi liquidis excrementis fertur aluus: tamen repleti cerebri affectio, ipsius propria vacuatione per hæmorrhagiam, aut sanguinis detractio non tollitur. Eadem ferè prognos legitur in *proth. 47. l. 3. 1.*

ἡ Αἰσινώτης ἀλγήμετος, δὲ πρώτης δεξιᾶς δύσκολον.

Qua ex dolore dorsi principia morborum ducuntur; difficilia sunt.

SYMPTOMATVM ex dorso & lumbis nascentium productionem docere instituit, quorum vis gravisissima esse solet, ob eam sanè causam quòd ex lumborum & dorsi dolorificis malis principia ducant, nec minùs calamitosa sunt quàm quæ in partibus illis firmiter fixa herent. Nam permagni interest scire, veniarne malum ex dorso, an sit in dorso. Quoties enim *τὸ δὲ* vel *ἔξ* legitur apud Hippocratem, motum significat à materia quæ novi symptomatis casum inducit. Huiusmodi sunt illa. *Σεπὶν ex aluo profusiore intumuit. Ex elleboro lethalis convulsio. Ex hæmorrhagia hydropes nascuntur*; & quæ sunt eiusmodi prope modum infinita. Ergo multum interest dicat ne quis, Rigor in dorso, an rigor ex dorso. Nam rigor in dorso, febris denunciat focum, non vbi fit, sed vnde cietur. Cietur quidem in dorso, sed ex appulsu cacochymiae *ἀπὸ τοῦ ἀγρίου*. At verò rigor ex dorso initium ducit ex proprio dorsi vitio, ipsamque partem vnde venit, laborare ex causa dolorifica illie concepta ostendit. His ita constitutis.

QVÆ EX DOLORE DORSI PRINCIPIA MORBORVM DVCVNTVR] Idque per transitum aut progressum. Ac per transitum quidem, ut dolorifica lumborum mala, quæ his relicta, trāsēunt ad diaphragma & caput; pleuritis versa in peripneumonia; peripneumonia in phrenitidem. Rigor item qui frustra cietur, translationem facit ad septum transversum & caput. Per progressum vero, ut cruenta mictio ex dorsali pleuritide; pestifera urinae suppressio ex crebris lumborum & dorsi horribus cum cita caloris vicissitudine, vnde significatio affectæ per inflammationem rhachitidis & membranarum eius. Præterea luxationes dorsi à tuberculo, quæ faciunt antè *λόφωσιν*, post *κύφωσιν*, dextra & sinistra *σκολίωσιν*: ut taceam gibberum qui ante pubertatem venit ab asthma. Sed huius prognos veritas elucescet in exemplis infra scriptis.

DIFFICILIA SVNT] *Ταπεινώτερον* dixit quæ ferè mortifera esse solent. Nam illud *δύσκολον*, noxam leuem significat, quæ sanè hic magna est. Etenim quæ per transitum commemorata sunt mala excursa ex lumbis & dorso ad caput, mortifera, aut certe calamitosa multum. Ex rigore autem qui frustra fit, atque transla-

que translationem facit ad diaphragma & caput, primum ab oppressione venit capitis & cernicis dolor; quæ duo simul coniuncta, sunt malè affecti cerebri atque medullæ propria; mox à fatiscientis cerebri alienatione veniunt sudationculæ & aphoniæ, inde mors. Denique omnes morbi excursus symptomati-
 10 cæ & recursus consecrarij, sunt primigeniis longè peiores. Nam cætera ex dorso mala, progressu calami-
 tatis & pestiferæ translationis causam ostendunt in locis adductis. In dorso autem mala difficulter sanantur, in lumbis facilius per opportunitatem venæ insignis.

lib. 2. 1. 2. 3.

6 Ἐν ἀλγήματι ὁσφύος σπυγνῶν καὶ ὑποφορῇ πλείονι, ἀπὸ ἐλλεβορῆ
 10 ἐμέσται ἀφεσθία συχνὰ ὠφρῆι.

In dolore lumborum pragranti, & larga deiectione; ab elleboro vomere spumantia multa prodest.

DOLORIFICA in lumbis tubercula facilem transitum habent in venam insignem quæ adiacet lumbis, unde varices assurgunt in cruribus. Et cum dolorificus humor mitigari cœperit & suppurari, nec antè, transitus quoque fit ad intestina. Hinc veniunt dysentericæ quæ sanant tubercula, sicut varices, unaque lumborū κωφώματα inde nata per veram ἐπιμόρφωσιν, i. redintegrationem, ad æqualitatē spinæ reponunt. Sed illa curatio suscipitur atque absolvitur, natura duce, per transitū materiæ tuberculū facientis, unde luxatio. Est enim transitus naturæ magisterio susceptus & ad optatum finem perductus, primigeniorum morborum tutissimus medicus. Ac talem transitum factum ἡ νόσος, veteres ἀσθενῶν nomina-
 20 runt; contrarium verò, i. ὁδὴ νόσος, nec præeunte natura, μετέσσει. Secus est de sympathia, siue illa ius habeat viciniratis & societatis, siue etiam veniat per propagationem causæ morbificæ, manente adhuc primigenio morbo & foco. Quæ cum ita sint.

IN DOLORE LUMBORVM PRAGRANTI ET CONTVMACI] Id enim significat ἄλγος σπυγνῶν, uti iam in cephalalgia scripsimus ad locum illum, κεφαλῆς πόνος σπυγνῶν, i. Capitis dolor intensus; ubi demonstratum est, πόνον σπυγνῶν, planè idem significare quod illud prognostici eodem conscriptum, κεφαλῆς ὀδυνῶν ἰσχυραὶ καὶ συνεχεῖς, i. dolores capitis fortes & continui. Est igitur hic dolor σπυγνῶν, pragrantis, contumax, & firmiter fixus: quemadmodum idem scripsit in aure, ὥς πόνος σπυγνῶν, i. auris dolor intensus. In prognostico autem, ὥς ὀδυνῶν ὀξεῖν, i. auris acutus dolor. Est autem acerbitalis huius causa, tensio summa partis obsessæ, ab humore systrophico cum intemperie forti.

Coac. 1. cap. 12. lib. 2.

ET LARGA DEIECTIONE] Quæ non exoluit doloris acerbitalitatem, nec minuit; ut neque facit cruenta mistio in dorsali & pectorali dolore: quoniam omnia quæ inde nascuntur symptomata nephritica, sunt per sympathiam, non autem per transitum: nulla autem sympathia mala, priora exolunt. Ergo profusum alui cum dolore lumborum, non eodem modo accidit quo dysenteria & varices, unde tubercula, quæ faciunt gibberos, exoluntur: sed per sympathiam mesenterij, societatis iure, unde nascuntur hydropes, in quibus quod alius profusior est, eò maiorem in molem assurgunt, magisque intumescunt; aut per propagationem feri cuiusdam in ventrem, unde naturalis œconomia labefactatur, indeque non maior leuatio sperari potest, quàm paraphoricorum symptomatum propulsio ab alio prorupta, ex lumborum dolore ad caput excurrente. Qua de re hanc prognosin explicauimus, & ex Græco emendatè sic conuertendam duximus. Quibus ex dolore lumborum excursus fit ad caput, torpida manus, cardialgiæ, auriumque flatus sonori, hæmorrhagiæ largæ, aut perturbata mentes; quamvis tum alui profusè ferantur.

Coac. 1. cap. 3. lib. 2. lib. 3. progn.

lib. 2. progn.

Coac. 4. huius cap.

AB ELLEBORO VOMERE SPVMANTIA MVLTA PRODEST] ὠφρῆι ait, non ὠφέλησιν; ut in illo. Dolenti caput parte postica, vena frontis recta incisa profuit. Ergo illud ipsum ὠφρῆι, i. prodest, aut iuvat; certum remedij adiumentum, nec ampliùs anceps denunciat, omnemque tollit dubitationem adhibendi. Sed quæro illud, primum cur prodest vomere, deinde cur spumantia multa, tum ab elleborismo, nec aliunde. Enimvero in diarrhœæ dominatu (id enim significat ὑπὸ διαρροῖς ἐχόμενον) iniussa vomitio diarrhœam exoluit, neque immeritò: quia retractio fit humoris morbifici. Quod autem natura duce & sponte conuenienter suscipitur, artificium præbet medico ad imitationem naturæ comparatum. Ex quo efficitur ut nunquam aberret à scopo. Idem præstat humoris morbifici deriuatio ad vrinæ ductus, vrinam stranguiosam cientis, quando liquidis excrementis fertur aluus, κακωνήτα ἔσται, i. peiorem in modum. Tum enim citò subsistit, facitque vir æger gaudeat cibis conuenienter apposis, quos paulò antè fastidiosè respuebat. Sed illud adiumentum quod ex vomitione adfertur, non solum considerari debet in retractione humoris diarrhœici, sed in detractione dolorifici in lumbis impacti & consistentis, uti mox in elleborismo dicemus. Sequitur ut ostendamus cur liberalis esse debet vomitio, & quare multa vomere tum oportet. In promptu causa est, quia nihil paucum est criticum. Deinde, quod omnis vacuatio, lege naturæ, sursum deorsumve commota, multum & rarò debet cieri. Atque in vomitione damnantur καὶ τὰ μικρὰ ἐμέσματα, καὶ τὰ ἐγγὺς ἀλλήλων ἴοντα, i. vomitiones parue & frequentes. Spumantia multa ideo sunt posita, ut qualitas humoris dolorifici ostendatur, quæ coniuncta cum excretionis modo & copia, legitimam κατὰ φύσιν ostendit ad naturalis καθαρώσεως imitationem, medici artificio susceptam, unde percepti catholici veritas. si qualia decet, purgantur; confert, & leuiter ferunt. Sic & vomitum depletio. Sed cur spumantia in bonis duxit, quæ inter deiectionum vitia praua numerauit? Sanè o-

6. Epid.

aph. 26. 6.

«

«

1. Epist. hist. 4. vniuers.

comment. ad 47. 2. proth.

26. 2. proth.

aph. 2. 2.

20. lib. 2.

progn.

mnis deiectio, omnisque vomitus spumans iniussa in vitio est: quia spumæ causa est flatus humoris glutinosi & contumaci permixtus, aut calor insignis, unde cruditaris significatio est, quæ nunquam fit καλῶς neque κρισίμως. Cernitur hîc retractio, atque detractio ante pepasium humoris glutinosi contumaciter ad lumbos adhærescentis, unde hydropsis & ischiadis metus adfertur. Extremum illud superest, cur elleborismo sit medicandum: quoniam inter cætera cathartica ἀγχι καλλίω καὶ κρισίμως, i. præstantius trahit atque validius, ut de nigro elleboro scripsit Hippocrates ad pleuritidem inferiorem. Hîc autem significatur albus absolute usurpatus, in quo tanta vis inest purgandi, ut priusquam ad tenuium intestinorum anfractus perveniat, humorem qui in vitio est, radicitus ab ima parte extirpet, ipsumque vomitione excludat. Valet igitur ad retrahendum & derrahendum. Sed plura de elleboro alias. Notabile est autem, quod elleborismum præscribit, non inopia, sed delectu catharticorum, ut idem scripsit de nigro ad pleuritidem inferiorem.

7 ΡάχιⓄ διαστροφῶν, καὶ δύσπνοιαν αἵματος ῥύσις λύει.

Distorsionem rhachis cum difficultate spirandi; sanguis proruptus exolvit.

V T LUMBORVM gibbera à tuberculo nata, varicibus & dysenteria per transitum humoris mor-
bifici facilliter exoluntur, non autem profluio alui per sympathiam concitato: ita reliquarum par-
tium rhachis, quæ sursum sunt inflammationes systrophicae, & distorsiones inde natae, liberali hæmor-
rhagia sanantur atque quiescunt.

Ergo. DISTORSIONEM] i. Peruersionem amissi naturali & καθαρτώματι contrariam, per inflexionem plurium vertebrarum, aut aliquarum luxationem. Ac sanè plurium vertebrarum inflexio cernitur in contentione & distensione systrophica musculorum cervicis & dorsi, aut antagonistarum paralyti & exolutione, iuxta preceptum anatomicum. Sed ea peruersionis causa hîc locum nō habet. Non enim per hæmorrhagiam tolleretur. Luxatio autem nequit existere, quin coniunctam habeat peruersionem, siue τὴ καθαρτώματος defectionem. Ergo. DISTORSIONEM] i. Figuræ naturaliter constitutæ mutationem, quæ tollit naturale ἰσοκύβητον rhacheos in longum exporrectæ. Atque in ossē quidem sacro ad magnam lumborum vertebram, τὸ ἰσχυρωμένον; in lumbis ad diaphragma τὸ ἰσχυρότερον; inde ad magnam cervicis vertebram, τὸ ἰσχυρόν; in cervicis autem connexionē, articulum λαρόν.

RHACHIS] i. Dorsi cuiusdam oblongi carinam referentis, ex vigintiquatuor vertebris constituti, quarum septem cervici, duodecim totidem costis attributæ, lumbis autem quinque in hominibus tantum reperitæ, præterea ne in simia quidem. Earumque connexio, parte antica per symphyfin, ubi vertebræ sunt ἀρτίαι; lateribus autem per ginglymum securitatis servantissimum, ubi sunt apophyseis ac spinis horridæ, in omnium animantium sceletro ad fidem conspicitur.

CUM DIFFICULTATE SPIRANDI] Parua & crebra, quæ semper denunciat laborem & inflammationem partium spirabilium. Ex quo efficitur cervicis & dorsi peruersionem ostendi, non autem coxarum siue lumborum. Ac de peruersione τὴ καθαρτώματος fidem illud faciet quod idem scripsit. Φυμάτια ὡς ὀπίσθεν καὶ τὸν πνεύμονα εἰσι. i. Iuxta pulmonem gibberes ut plurimum nascuntur. Deinde paulo post. Καὶ ἡ ζωῆταις τοῖσι πλείοσι δὲ τοιαύτας συστοφὰς γίνεται ὅσιν αὐτὸν κοινωθήσονται οἱ πόνοι οἱ σωέγγυς: ubi nomen πόνων, quod nervos medullares significat, usurpatur pro ligamenti quæ veniunt ab ossibus. De cervicis autem peruersione satis iam multa diximus ad illam prognosin. Si cui in dominatu febris repente cervix pervertitur, nec deorare potest, nullo apparente tumore; mortiferum.

SANGVIS PRORUPTVS EXOLVIT] Quoniam copiosa hæmorrhagia, vel eius loco, phlebotomia, vnicum est curationis ἡγεμονικόν ad omnia mala quæ vel à systrophe inflammatoria, vel à phlogosi, vel ab oppressione nascuntur. Qua de re permulta leguntur commentario nostro ad prognosin 24. cap. 11. huius secundi libri.

8 Εν ὀσφύϊ ἐπωδυνῶ καρδιαλγικὰ πρὸς ἐλδόντα σημεῖα αἱμορροώδη, ἢ καὶ πρὸς ἐγγρημύδα.

In lumborum dolore prægandi, qua inde veniunt cardialgia; signa sunt hæmorrhœica, aut etiam antegressa.

Coac. 2. & 3. huius cap. prorrh. 37. l. 3. l. H V I V S prognosews demonstratio est ab illa. Dolorifica in lumbis mala sanguiflua: & ab illa. Quæ ex lumborum dolore cientur hæmorrhagia, large. Et quia nomen cardialgiæ non est in illis, nos ex prorrhethico apponendum duximus, & ex Galeni commentario eius ipsius causam attulimus. Quamobrem in tam recenti memoria rerum haud ita pridem explicatarum; esset abuti otio & literis, denuo hîc scribere cogitationes nostras.

9 Ταύτα δὲ φέρεται εἰς πρᾶχλον καὶ κεφαλὴν ἀναδιδόντα, ὡραλύν-
σαντα, ὡραπληκτικὸν τρόπον ἀσασμῶδεα ὡρακρυστα. ἀρχὴ γὰρ καὶ
λύεται τὰ ποιαῦτα ἀσασμῶ; καὶ τῇ τριτάτῃ ποικίλως διανοστέοισι διὰ τὴν
αὐτῶν ἰόντες.

10 *Ex lumborum doloribus, qui propagantur sursum ad cervicem & caput; in paraplegia & convulsionis vicissitudine totum morbi tempus exigunt, nec sua mentis agro. An resolutio illa paraplegia propinqua, convulsione quiescit? Inde symptomatum multitudine sibi inuicem subeuntium, variè laborant agroti.*

SEQUITUR ut patefactis crisi-
bus coxariorum malorum, dorsali-
um & cervicalium conuenienter
naturæ patefactis; deinceps de
successione & accessione dicamus
eorum quæ ex dolore lumborum
principia causæque ducunt, habent
que in cerebro & à cerebro syn-
timoriam, crebramque, ut tem-
pestatum, ita symptomatum in
ægris miserrimis varietatem. Fuit
Hippocratis sæculo, dum ipse
floreret, mulier quædam grauida,
quæ trimestrem vtero foetum
gebebat. Hanc febris, quidem
celeritate, vehementia, & assidu-
itate prægrandis, quam veteres
πρὸς nominarunt, exercebat. In-
eunte morbo acerbissimus dolor
coxarum, acerbioris suæ vim
primum ostendit. Inde acerbioris
illius propagatio ad cervicem
propter iugulum, manum dextram,
& ad caput. Id accidit tertio
die morbi. Mox lingua verborum
nescia. Inde manus dextra
resoluta, atque conuulsa, eaque
resolutio fuit paraplegiæ
propinqua. Nullo modo fuit
apud se. Hæc varios casus experta
est, variæque discrimina. Sed
tamen liberali sudore & vomitu,
naturæ miraculo, defuncta est
morbo qui antè lethalis videbatur.
Ac salutarem illa crisin habuit
14. die. Sanè illius historię
decisio in hac prognosi continetur,
ad cuius enarrationem historia
suffecisset, nisi Galenus,
30 fortasse multum iam fractus
contentione & diuturnitate
scribendi, dormitum iuisset.

hist. 1. 1. Epid.

Ergo. *EX LUMBORVM DOLORIBVS*] Qui ex repletionē particulari orta cum effera
chymia, si nec varicibus, nec deiectione cruenta exoluantur. Nam in muliere
grauida sperabilis non est, nec tuta menstruorum purgatio.

QVI SVRSVM PROPAGANTVR] Sic enim rectè videmur conuertere τὰ ἀναδιδόντα, ut inde si-
gnificetur propagatio, quæ nunquam primigenium malum exoluit, quod facit
transitus; ut intelligamus perēnitatem symptomatum subnascen-
tium & subeuntium, vel, ut clariùs dicā, vicissim abeuntium & redeuntium.

AD CERVICEM ET CAPVT] Per excursum symptomaticum qui non habet exitum per li-
beralem hæmorrhagiam.

IN PARAPLEGIA] Bene quidem verti ad verbum: sed illud, ὡραπληκτικὸν ἔσπον, non satis ex-
30 pressi, quod inchoatam partis resolutionem significat, non firmiter fixam, nec absolutam, quæ coniun-
ctam habere solet τῷ ἀναδιδόντι καὶ αὐτῷ, i. sensus motusque priuationem. Hanc autem agnoscit tantum
Galenus δυνάμει, καὶ δυνάμει, i. obscure sentientem atque mouentem: ut idem plane sit hoc loco, paraple-
cticus modus, quod supra torpidæ manus. De paraplegia autem satis multa diximus
comment. ad illam prognosin. *Parotides prauæ sunt paraplecticæ*.

Coac. h. 1. cap.

ET CONVULSIONIS] Hic sequor, in vertendo, Galeni paraphrasin quæ hæc habet: Probabilius
erit, transeuntia mala ex lumbis ad caput atque cervicem, quæ repletionem paraplecticam attulerunt,
cessante ea, convulsionem inferre. Ergo paraplegia successione habet convulsionis, ut
Galenus visum est, non accessionem: quamuis in illa mulieris grauidæ historia,
symptomatis vtriusque coniunctionem expressisse videatur. Δεῖν γὰρ παρὲν μετὰ ἀσασμῶ, ὡραπληκτικὸν ἔσπον, i. resoluta est
30 paraplectico modo manus dextra. Quamuis enim paraplegia & convulsio simul existere non possint in eodem
subiecto, quod illius natura & ὑπαρξὶς ἐν τῇ λύσει, i. in resolutione; huius verò, ἐν τῇ πάσει, i. in tensione consistat,
quæ duæ contrariæ sunt: tamen quoniam paraplegiæ sedes in nervo est medullari,
convulsionis autem in musculo; sanè nihil ve-
tat quominus diuersitate causarum, variè afficiantur partes diuersæ, nervus & musculus.
Adde quod convulsionis vis consideratur in motu iniussu; paraplegiæ autem in impotentia
mouendi. Sit igitur convulsio paraplectica καὶ ἡ ἀσπασμῶ μετὰ τῆς ἀναδιδόντος, i. iniussus
motus cum sensus vacuitate, quæ in simplici convulsione nusquam est; sed
contrà, sensus acerrima rei molestia. Convulsionem sensus expectem
vidimus in viro D. Darmentieris 1575.

Coac. 4. cap. 4. lib. 2. proth. 26. f. 3. u.

NEC SVÆ MENTIS AGRO] Vti nec fuit grauida illa mulier de qua scriptum est, ὡραπληκτικὸν ἔσπον,
i. in omnibus delirabat. Etenim. Quibus ex dolore lumborum excussus sit ad caput, torpidæ
60 manus, cardialgia, status sonori, nisi hæmorrhagia veniat, è potestate mentis exeunt: quamuis
etiam alii profuse ferantur.

Coac. 4. lib. 2. cap.

*AN RESOLVTIO ILLA PARAPLEGIAE PROPINQVA CONVULSIONES ANE-
SCIT?*] Authoris δυνάμει ita vertendo videor consecutus: quamuis Græco sit, ἀναδιδόντα, quæ signifi-
cant talia, sine huiusmodi; qua voce convulsio & paraplectica resolutio continentur. Sed absurdum es-
set putare convulsionem exolui convulsione. Pertinet igitur illud, ἀναδιδόντα, ad paraplegiam
inchoatam de qua iam dixi. Ergo paraplectica resolutio convulsione sanescit. Sanè quidem si
70 si superuenerit, non

autem comitata fuerit; ut ratum habemus de febre quæ sanat conuulsionem cum superuenierit, nec ad-
de regnat. Sanescit autem resolutio superueniente conuulsione, ob eam sanæ causam, quia forti & con-
citato conuulsionis motu natura, quæ diuturna officij vacuitate facta est pigrior atque ignavior, nunc
excitatur ad exclusionem materiæ paraplecticæ, non secus atque iusta indignatio dædalum fecit verbo-
tum linguam filij Croesi qui ante semper fuerat *αἰαντός*. Præstat igitur conuulsionem resolutioni super-
uenire, quàm contrā. In promptu etiam causa est: quoniam transitus melior est intus foras, nempe à
neruis in paralyti, ad musculos in conuulsione.

INDE SYMPTOMATVM MULTITVDINE SIBI INVICEM SVBEVNTIVM] Ac si
diceret; crebra conuulsionis & paraplegiæ vicissitudo est: sicut in Thasia muliere, cui crebra erat con-
uulsionis & delirij successio febris initio; ac secundo febris die res eius iuerunt *ἡ δὲ αὐτὴ*, i. eodē gra-
da. Sic in Heropyto vicissitudo fuit surditatis, & doloris coxarij vel ischiadici. Quæ de re illud scriptum
est. *Contigit autem aut febres cum surditate incandescere: aut hæc quidem imminui ac leuari*, ad inferiora autem,
pote ad ischia, vehementiores dolores exurgere. Hic autem in crebra symptomatum vicissitudine, inof-
fenso cursu, eodēque modo ægroti res eunt: quoniam ad præparationem suscipientis causæ accedit
perennis morbosæ causæ generatio, & perennis per progressum excursus. Cæterum, *πολλὰς ὑστερίας*,
propriè ad eos pertinet quos varia exercent symptomata; tum per triplicem transitum, ut in phreniti-
de, priuationis scilicet & rei, intensiois & remissionis, omniumque cerebri mansionum peragrations:
tum per progressum: tum per variarū partium *ὑπερπαραδίδαν & ὑποπαραδίδαν*, i. affectū primarium, & proprium.

106. & 108.
Coac. n. lib.

10 ΕΞ ὀσφύος ἀναδρομῆς πόνος, ὀφθαλμῶν ἰλλωσις κακόν.

Ex dolorifici lumborum mali ascensu, oculorum peruersio; malum.

EST ILLVD verè iam positum ac demonstratum, quod omnis aduena causa cuius dominatu na-
tura præsidia collabuntur, mortiferum ægris malum adferre solet; idque cum aliàs, tum si ex ea cerebrū
in vitio sit insanabili per alienationem à forti & prægrandi alteratione contractam. Enimvero valde
mortiferus est omnis ascensus coxariorum dolorum, iis relictis transeuntium ad diaphragma & caput.
Hæc enim suo magisterio regit partes obsessas, nec vinci se patitur ab earum virtute nisi exitum habeat
subito, verbj causa, è capite per liberalem hæmorrhagiam. Porro autem cum anadrome caput repleat,
ac repleti capitis symptomata varia sint consuetaria, ex eorum diagnosi, comparanda prognosis futuro-
rum exituum. Nam si post illam terrificam coxariorum dolorum anadromen, signum appareat labefa-
ctati cerebri syllogisticum, ex illo ruit omnis cæptæ curationis fiducia. Signum autem syllogisticum ce-
rebri labefactati proponitur in hac prognosi.

EX DOLORIFICI LUMBORVM MALI ASCENSV] Vnde significatio fit cacochymiz ma-
lignæ & effera, per suam feritatem orgasmum facientis, cursumque ad superiora inflectentis; quasi mi-
ris esset, per inferiora expurgaretur, uti consentaneum est, natura deorsum viam affectate in lumborum
doloribus, quæque ex ea inclinatione artificium præbet medico ad imitationem sui comparandum.

aph 20 4. Quod faciendum præcepit, cum ait. *Si cui febris experti sormina sint, grauitas quoque genuum, & dolor lum-
borum; purgatione per inferiora opus esse testantur.*

OCULORVM PERVERSIO MALVM] Enimvero, ut sunt mala cerebri quæ ex translatione
symptomata oriuntur: ita subnascentium exitus atque successio esse solet. Quemadmodum enim reple-
tio capitis cataphorica & cephalalgica quæ venit ex lumborum vel hypochondriacorum viscerum ascen-
su, opinionem facit parotidum: ita quæ superuenit eidem repletioni oculorum peruersio, mortem sub-
esse testatur; si nulla sit excusatio perturbationis critica, ut in Dealcis hospite. Nam lacrymarum iniussu
profusio ex tali causa, non est terrificæ, quæ aliter mortem in propinquo esse testatur. Quoties enim ce-
rebri ex diuturna oppressione fatisceris, ut in subtillo sanguinis & sudatiuncula frigida; vel ex prægran-
di alteratione iam alienati, ut in hac oculorum illusi, ne longè exempla petantur, quoties, inquam, serum
illarum significatio fit, mortifera valde sunt. Dicam audaciùs, quod omnis afflictio cerebri alterati quæ
propagationem habet *εἰς τὴν προκείμεν*, i. in propäginem, metum adferre solet interitus, si febris adest acuta.

Quoniam igitur oculi proximè ab sunt à cerebro, mirum videri nõ debet si vicinitatis & societatis con-
tagionem primi ostendunt in colore, caractere, mole, tum visu & motu. Omnium autem defectionum
notas, earumque causas, iam ex professo aperuimus in historia symptomatum ocularium. Nam quæ hoc
loco cæterorum instar, malorum scribitur oculorum peruersio ex lumborum anadrome orta, non ma-
gis requirit *τὴν προνοίαν*, i. providentiam medicæ, quàm alia multa quæ cernuntur in oculis non tam proprio
vitio laborantibus, quàm alieno firmiter fixo. Quod autem pertinet ad *τὴν ἰλλωσιν*, certum est eam vsur-
pari pro ipsa peruersione oculorum, quam alibi vocat *καμπύλωσιν*: sicut extimarum palpebrarum; *καμπύ-
λωσιν*, i. curuaturam, pro ipsa peruersione. Nam *ἰλλωσις* & *καμπύλωσις* nomine *τῆς ἀστροφῆς* continentur. Sed
unica est curuatura quæ vitio, & musculorum qui sunt in angulis oculorum, & ad dimidium vsque tharsi
ambo feruntur quando æqualiter conuellantur. Oculorum autem *ἰλλωσις* varia est in omnem partem
quod se conuertunt oculi, quæ firmiter fixa & stabilis ex vitio cerebri facultatisque inde manantis, mor-
tifera est valde, ut in Oecetei uxore quæ septimo die interiit. Sin autem fugax & critica, non minus con-
solari nos debet quàm exterrere metu, ut in Dealcis hospite qui quadragesimo die salutarem habuit
crisin. Sed tamen in vitioque scripsit; *ἡ δὲ ἰλλωσις*, i. dextro peruersus oculo est. Lib. 1. *τῆς γυναικὸς* inter
symptomata quæ veniunt ex puerperiorum anadrome, commemoratur *ἡ δὲ ἰλλωσις*.

1. 2. 3. 4. 5.
Coac. cap. 6.
lib. 1.

part. 1. sect. 1.
6. Epid.

hist. 3. part. 1.
& 8. part. 2.
3. Epid.

11 Πόνος ἐς στήθος ἰδρωδεὶς σὺν νωθρότητι κακόν. ὅππυρετὴν οὗτοι ὀξέως ἀπολλύονται.

Melius sic in prorrhethico, 36. 2.

Οδυνη ἐς στήθος ἰδρωδεῖσα σὺν νωθρότητι κακόν. ὅππυρετὴν οὗτοι καυστικοὶ ὀξέως ἀποθνήσκουσι.

10 *Dolor affixus pectori cum torpore; pestiferus: superveniente acuta febre, crudeliter moriuntur.*

INTER Medicinæ leges quæ sancituntur de acutorum morborum natura, deque illorum causis atque symptomatis, nullæ sunt magis necessariae ad bene medendum, quàm illæ quæ ex insolentium rerum observatione nascuntur. Quid enim minus est febris acutæ quàm torpor, obliuio, coma? Sunt quidem hæc omnia crudi humoris flatulentique spiritus ἐκγονα, non autem sanguinis multa bile perfusi qui regnare dicitur in febre acuta: propterea quæ non sine causâ videntur mortifera; quatenus longissimè absunt à febre acuta. Omnia enim quæ fiunt, quæque apparent contra naturam morbi & ægri, terrifica esse debent, ac sæpe mortem subesse testantur. Sic enim in tempestate pestifera, febrium ardentium symptomata annouit quæ in paroxysmis ipsarum apparebant terrifica. Erant autem obliuio, exolutio, vocis carentia. Sic *bombus in acutus, & echo in aure, mortiferum*. Quæ cum ita sint.

DOLOR AFFIXVS PECTORI] i. Anteriori parti thoracis quam sternum vocant, non quidem per synecdochen vsurpatum pro cartilagine xiphoide, & per metonymiam, pro ventriculi osculo quod ipsa cartilago tegit: sed κωλύω pro anteriore tota parte thoracis, ossibus septem contexta, duodecimque costis accincta. DOLOR AFFIXVS] i. Quem facit phlegmone systrophica, ex sanguinis biliosi affluxu per venam mammariam. Tamen si firmitas illa considerari potest æquè in carne pectoris atque in membrana: tamen quæ periculi mentio fit atque crudelis interitus, non aliò referri potest quàm ad membranam, si Galeno credimus comment. ad illum aphorismum. *Inter dolores costarum, pectoris, aliarumque partium; an multum intersit, accuratè sciendum*. Galeni verba hæc sunt. Enimvero si in costa sit doloris acerbitas, certum est non nisi in membrana cieri, hinc scire licet eam periculo nō carere; tum celeri & fideli curatione opus esse. Ac si quidem ingulum dolor occupet, sanguinis detractione; sin hypochondria, purgatione medicandum, uti faciundum præcepit lib. 2. καὶ διαίτης ὀξέων. At si neque dolor ingens, neque punctorius, nec iugularis, nec hypochondriacus; scire licet eius focum esse in carnibus quæ adiacent costis, propterea quæ ipsum neque prægrandem, neque mortiferum, nec ita curationem requirere accuratam.

CUM TORPÖRE] i. Cum exolutione, ac veluti quadam paralyti totius corporis quod subinde ad pedes dilabitur: quam afflictionem Græci vocant ἡ νωθρότης, ἡ ἀφασία, ἡ πάρεσις, ἡ ἐπρίψις; quæ, ineunte quidem morbo, symptoma est madefacti & inebriati nervorum principij; affecto morbo, effecti & exoluti, mortemque in propinquo esse testatur.

SUPERVENIENTE ACUTA FEBRE] Id enim significare videntur ὅππυρετὴν οὗτοι καυστικοὶ, qui sunt eiusmodi ut vel ardentem febricitent, vel excrementa reddant perusta; cuiusmodi sunt, flava, viridia, & nigra sputa.

CRUDELITER MORIUNTUR] Febris ardore, difficultate spirandi, & doloris acerbitate. Cæterum, symptomata hæc sunt ἐπὶ τοῦ νόσου in morbis à diætâ: sed tamen non sunt αὐτοὶ in morbis à spiritu, ut in tempestate pestifera qui ardentem febricitabant cum comate, illorum quidem febris accendebatur à bile quæ in peculiari eorum natura redundabat; coma autem cæteraquæ iam descripta veniebant à tempestate austrina ventis placida & pluviosa.

12 Εξ ὀσφύος ἀλγήματος ἀναδρομαὶ ἐς καρδίαν πυρετῶδες, φρενῶδες, αἰεμέοντες λεπτὰ ὑδατώδεια, ὥρνευχθέντες, ἄφωνοι, ἐμέσαντες μέλαινα τελευτῶσι.

10 *Frequens è lumbis ad cor anadrome, unde febriunt agri, perhorrescunt, tenuia & aquosa euomunt, nec sua sunt mentis, voce capti, cum nigra vomuerint; moriuntur.*

QUÆ AD MODUM ea quæ ex anadrome symptomata nascuntur symptomata primigenia, sunt partis obsessæ & humoris morbifici propria: ita quæ inde veniunt consecutaria, prioribus dissimilia sunt, corruptione successiva humoris translati, & mutatione ipsius partis obsessæ. Ergo ut feri impulsu ad ori-

107. Coac.
1. lib.

ficiunt alui, primum cardialgia excitatur, inde vomitio cietur è fundo ventriculi tenuium & aquosorum: sic incidente acuta febre horrifera, delirium, & atri humoris vomitio ex ea frequenti anadrome, ad extremum ferè cōsequitur. Huiusmodi sunt illa iam explicata. *Qui è phreniticus cum perfrigeratione sputatores redduntur; vomitum illi nigrum prænunciant.* Et rursum, in dolore stomachi febriculoso, alius cum morfu protupia, deiectiones nigras denunciat. His ita constitutis.

FREQVENS E DOLORE LVMBORVM ANADROME] Sic enim de industria verti, vt ex ea frequentia, doloris firmiter fixi progressus ostendarur. Ergo frequens anadrome ad cor ex lumbis, ex quorum particulari repletione & maligna cacochymia tenue serum exprimitur, prorepitque ad ventrem, indeque ad orificium eius quod veteres καρδιάν nominarunt; ex cuius dolore cardialgiæ nomen inuentum est.

prorrh. 5.
1. 1. 1.

VNDE FEBRIVNT] Sic enim vertendo perspicuitati consulimus, dum afflictionis nomen, per metonymiam, ad ipsum afflictum conuertimus. Est autem obscura nimis in prorrhetico super hac prognosi metonymia, quæ afflictionem pro afflicto in omni voce vsurpat. Igitur ex dolorifici lumborum mali anadrome cardialgica febriunt ægri, quod venulæ arefactæ biliosos & acres ex aluo trahant ichores, eoque febris æstu corporis vniuersitas incandescit, visceraque conflagrant incendio, vnde noua exoriuntur priorum malorum & subnascentium symptomata.

PERHORRESCVNT] Vt in hemitricæ, qui dicitur horrifer, non febris quartanæ modo periodico, cuius horror paroxysmi discessionem prænunciat; sed symptomatico: quia sperabilem non facit vacuitatem repetitæ febris, sed magis accendit alternis; vt solet horror omnis & rigor qui frustra fit.

initio 1. Epid.
lib. 4. acut.

6. Epid. part. 2.

TENVIA ET AQVOSA EVOMVNT] Primo appulsu ichorosa, i. serola quædam biliosa & venenata: id enim significant ichores apud Hippocratem, vt in illo, ichores subnascebantur. Et. Gignuntur febres ardentes cum arefactæ venulæ ad se attraxerint biliosos & acres ichores. Id Galenus annotauit committ. ad illam sententiam. De sanguine ichoroso. Est autem vomitio illa omnino symptomatica, qualitate, copia, excernendi modo, & occasione.

NEC SVÆ SVNT MENTIS] Vt enim coxariorum dolorum symptomatica est cardialgia: sic febris inde nascens symptomaticum est ipsum delirium, anadrome facta ad cerebrum sanguinis multabile perfusi, nisi hæmorrhagia largiore delirij locus tollatur. Causæ sunt non ita pridem adductæ.

prorrh. 8. 1. 1.
lib. 4. acut. cap. 8. lib. 2.

VOCE CAPTI] Ab exolutione cerebri, vnde summa infirmitas facultatis motricis, & paupertate vocalis materiæ per extinctionem caloris natiui. Hic in propinquo mors est. Nam de aphonia satis iam multa diximus. Certum est omnem aphoniam venire *ή δ' ε' τω τένει σφοδρῶν, ή δ' ε' τω ένλυσιν ή δ' τω φηλῶ* 30 *ήραζμένον μυδι-καί τευράν, i. tensione forti, vel exolutione muscutorum neruorumque quibus editur vox.*

CVM NIGRA VOMVERINT, MORIVNTVR] Vomitus nigri ratio repetenda ex 107. 1. lib. tum ex prorrh. 30. f. 1. 1. Cui autem nigra vomitio citam mortem adferat; palam est id euenire incremento & dominatu morbi, materiæque morbosæ & viscerum exolutione, per aph. 21. 22. 23. lib. 4.

13. Τα κατ' όσφυῶ ή τ' λεπτόν χρόνια άλγήματα, ή πρὸς υποχόνδρια πόνοι δόποιοι άμα πυρετῶ. Τύτοι ειν ες κεφαλῆν άλγημα σῶπνον ελδόν κτείνει οξέως τρόπον απαισινώδεια.

40

Diurni circa lumbos & ilia, tum qui ad hypochondria prorepunt dolores cum febre & cibi fastidio; si inde transferit fortis dolor ad caput; crudeliter conuulsifico modo necat.

lib. 3. progn.

E O SPECTAT hæc prognosis, quod illa iam sæpe adducta. Dolores circa coxas & inferiores partes orti, si iis relictis ad viscera transferunt, moriferi valde sunt. Et verò, non ita pridem, quædam prognoses eodem scopo conscriptæ sunt & explicatæ.

DIVTURNI CIRCA LVMBOS] Quorum diurnitas consistit in vitio partium lumbis adiacentium, quorū repletio & cacochymia maligna propria vacuatione discessionem non habet; vt in hæmorrhoidicis viris, per hæmorrhoidas; in mulieribus vacuis, aut puerperis, per menstrua & puerperia.

prorrh. 37.
1. 1. & Coac.
4. huius cap.

ET ILIA] Sic enim τ' λεπτόν rectè videmur conuertisse: quod illa pars omnium abdominis partium tenuissima sit, proptereaque ipsam veteres κενόνα vocarunt: nisi quis fortè malit κοιλίαν νεαπλῶ intelligere. Nam tenue intestinum, & ieiunum, & sinuosum, in ea ilium metonymia continetur. Sic enim accepimus, tormina & cardialgiam excitari prorepente sero è lumbis in ventrem, & in orificium eius quod est acerrimi sensus.

prorrh. 8. 1. 1.

TVM QVI AD HYPOCHONDRIA PROREPUNT DOLORES] In prorrhetico legitur πρὸς υποχόνδριον περιέμενα, i. qui veluti aduncis unguitibus circumplectuntur & vellicant, piscarij retis modo quod nominatur ζείφος. Ac talis dolor symptoma est oppressionis prægrandis, & essetæ cacochymia quam vetus repletio illuc è lumbis expressit.

CVM FEBRE] Quam peperit hypochondriacus dolor, ob eamque causam terrifica est. Demonstratum est illud. *Quæ ex hypochondriorum doloribus febres nascuntur, terrifica: quamuis theorema illud non sit Galeno catholicum.*

Coac. 33, cap.
11, lib. 2.

Co2c.9.10.
&c. huius
cap.

Coac. hum.
cap.

Coac. 120.
lib. 1.
4. acut.
2. Epid.

proch. 44
C.I.

aph. 7.2.
promth. 35.
£1.1.
54. & 90.
Coac. 1. lib.
107: Coac.
1. lib.
promth. 30.
£1.1.

15 Οσφύς πόνος καρδιαλγικῶ μὴ βιάας ἀναχέμεν. ἔχῃ π
 πωασμῶδες.

Lumborum dolor cardialgico cum excreatione violenta; nonnihil præ se fert convulsificum.

HIC TRIA tantum leguntur prænnuncia convulsionis: in prorrhethico autem quatuor: nam cephalalgia nomen adscribitur. In hac prognosi examinanda, multum est ingeniosus Galenus, ut esse so-
 ler in cæterarum examine. Sed ipsum aduocabo tamen, faciamque ut sit mihi propicius aduocatus, si
 modò stare velit in eo quod ipse iam indicauit.

Ergo. LUMBORVM DOLOR] A prægrandi æstu vasa lumbaria incanduerunt, & repletio-
 nis particularis oppressione, tum etiam micantis arteriæ magnæ pulsu molesto.

CARDIALGICO] Cuius cardialgiam excitauit serum è valis expressum in ventrem, teste Galeno,
 indèque in orificium ventris quod est acerrimi sensus: & inde nomen habet ἡ καρδιαλγία, vnde cardial-
 gici homines nominantur.

CVM VIOLENTA EXCREATIONE] Quam facit nauseabunda proritatio quæ non liberali
 vomitione, ut consentaneum erat, sed tantum screatu finitur. Qua de re illud præceptum est. Diuturna
 in febre nauseabunda proritatio ἐς ἀνάχμεν πλενῶσα, i. screatu finiens; malum denunciat atque facit. Eandem
 sententiam his verbis expressam legimus in prorrhethico. Τὰ ἐμειπῶδες ἐκόμενα φλαῦρα. i. Quæ vomitorio
 modo nequicquam trahuntur, calamosa sunt. Quem locum enarrans Galenus, docet, proritationem alui
 crebram & irritam inflammationis metum adferre ubi frustra cietur; aut si iam fortè concepta sit in-
 flammatio, ut faciliè concipi solet ab humore prauo & effero, ipsam perducere ad summum suæ naturæ
 gradum. Nam proritationis irritæ signum est violenta excreatio à faucium proritatarum prægrandi
 contentione nihil screantium, propter feritatem humoris acerrimi & tenuissimi qui per continuitatem
 interioris tunicæ alui prorepat ad ipsas fauces. Hoc igitur spectat hæc prognosis ut intelligamus, cardial-
 giam ex anadrome lumborum ortam, si finem aut exitum non habeat per hæmorrhoidas aut mēstrua-
 le profluuium (vbi habere debet ex illa prognosi. In dolore lumborum prægrandi quæ inde veniunt cardialgia;
 signa sunt hæmorrhœica) ipsam, inquam, cardialgiam, nouorum symptomatum accessione & successione,
 damnisque quamplurimis ægros augere, quousque tandem eius maligna cacochymia cursum inflexe-
 rit, & vbiuncumque adhæserit.

NONNihil præ se fert CONVULSIFICVM] Hic ego libenter Galeno assentior sua-
 denti illud, ἡ πωασμῶδες, ut cætera omnia deriuatiua nomina quæ coniunctum habent illud π, vel affe-
 ctionis exiguæ, vel rarò incidentis significationem ostendere: propterea quæ rectè cōuertisse videor Ga-
 lenum secutus; nonnihil præ se fert convulsificum. Erit igitur nonnihil convulsificum ipsa vomēdi conten-
 tio irrita, quam demonstrauimus violenta excreatione finiri. Est igitur catholica & vera prognosis.

16 Ὑπόδειν ἄμα κρίσις πῖρος.

Cum crisi grauis est rigor.

SIC COACA 7.1. lib. Causarum rigores nonnunquam funesti sunt. Tum rutila cum sudore facies in his mala.

17 Οσφύος ἀλγίμα ἀνὰ πρῶτος πύνα Ἰπφοίτεον κακοήδεος
 ἀρρώστιας σημεῖον.

*Lumborum dolor nulla incidente causa crebrò reuertens; signum est
 terrifici morbi.*

QVI NULLA incidente præuidencia oriuntur morbi solent esse terrifici: quoniam inueteratio-
 nem arguunt causæ morbificæ tam efficientis, quam suscipientis, ut in phrenitico qui per initia è pore-
 stare mentis exiuit: ubi Galenus annotauit non esse repentinam causæ morbificæ generationem, sicut &
 morbi ipsius. Et quò diuturnior est generationis causa, eò firmiorem esse morbi repentinam impressio-
 nem. Quemadmodum igitur id locum habet in primigeniis morbis: ita multò magis in succedaneis &
 iis qui postliminio reuertuntur.

Ergo. LUMBORVM DOLOR] i. Dolorifica lumborum mala quorum acerbiteriam in singulis
 lumborum partibus iam patefecimus in illo. Quibus lumborum dolor, hi malo sunt loco; ut nomen doloris
 complectatur morbum qui est causa doloris.

NULLA INCIDENTE CAUSA] Manifesta scilicet quæ ingruat intus vel foris: sed repente
 quasi de cælo tactis incidat, nullo præeunte signo eius prænnuncio. Est enim πρῶτος causa prægressa quæ
 innotescit

innoscere aīas, & mōm. I. senjū & mente, & instituendā prognōseas artincium prāber experientissimo
medendi magistro. Est autem *aeīas* illa duplex, vna quidem *aeīa* *aeīas*, altera vero *aeīa* *aeīas*, i.
ab ijs quae intra sunt, vna; altera ab ijs quae veniunt extrinsecus.

CREBRO RECURRENS] Quoniam illi demum relapsibus crebri sunt morbi, unde manat perennitas causæ morbificæ, nouaque incidit afflictæ iam partis afflictio. Huiusmodi sunt periodici & erratici lumborum dolores hæmorrhoidici: tum etiam sanguinea renum mala quæ *αἰνιματός* incidunt & repente.

10 **SIGNVM EST TERRIFICI MORBI]** Id enim significat κακόν τε καὶ κακόν; morbi cuius-
que. Sic enim accepimus κακόν τε morbos dici, & qui exterrant nos metu sinistri iudicii, spem tamen fa-
luta non adimunt; & qui remediis non cedunt conuenienter præscriptis; & qui soboles sunt iidem-
que parentes venenaræ qualitatæ & cacochymię malignæ. Exempla sunt primæ significationis com-
ment. ad prorrh. 14. li. 1. secundæ, aph. 2. 6. tertiæ, lib. 1. & 3. Epid.

18 Οσφύος ἀλγῆμα μὲν πάμαχος ἀσπιδεὺς κακόν.

Lumborum dolor cum comate anxio; pestiferus.

20 ENIMVERO lumborum dolor omnis qui nulla vi in musculofum genus incidente oritur, vt in cernice dictum est, cum ipse per se malus est vbicunque infederit; tum vero pestiferus, ne dicam mortiferus si accessionem habeat grauiorum malorum. Iam vero si male res eunt in dolore lumborum, quidni peius ibit cu anxio aestu vel comate? quod sane symptoma homini necado ipsum per se satis est.

Ergo. LUMBORVM DOLOR] Vbiunque focum habeat in regione coxaria sine lumbari, modo ipsum nulla vis irruens in musculosum genus attulerit: sed tamen credibile est ipsum moueri, atque, ut ita dicam, cieri ab æstu repletionis particularis vasorum insignium, & pulsu molesto cum forti oppressione partium sociarum & vicinarum.

CUM EST VEL COMATE ANXIO] Nam in prorrhethico scriptum inuenio *μετὰ καύματος ἀσώδους*, vi hīc *μετὰ καύματος*. Vtrūque autem non rarò cernitur in ægrotis *ἀσώδεις*. Ac de comate quidem illud præceptum est. *Comatosi anxij, vnaque dolenter hypochondriaci, ac sæpe et parum vomentes; aurium abscessus habent.* Etenim comatosi non rarò ex aduena causa fiunt, quam mouet affectio partium inferiorum, quæ & sympathia & translatione adducunt cerebrum in partem & societatem sui laboris atque molestiæ. Ceterum tales comatosi redduntur *ἀσώδεις*, appusu bilis malignæ ventriculum & stomachum lacerantis, vnde nascitur *ἡ ἀσθη ναυλωδης*, non autem *ἀσέμπετος*. Nam de ardore *ἀσώδεις* dubitari non potest quin ita sit, *καὶ ἀσέμπετος* ab oppressione facultatis, *καὶ ναυλωδης* à morsu ventriculi: potissimum verò quando vasa insignia quæ adiacent lumbis replentur & incandescunt æstu sine vacuatione propria illius plethoræ. Sed de natura *τῆς ἀσθης* cum alibi multa, tū verò ad illam prognōsin. *Quibus lumborum dolor, hi malo sunt loco.* Tantum concludo ex illis causis esse PESTIFERVM.

Co2c.6;
cap.2.lib.2;

Coac. 14.
huius casus

40 19 Οσφύος ζώντασις ἐκ γυμνακείων πλήθους, ἐκπυηλκόν. καὶ τὰ ποι-
κίλως ἔοντα γλιχρά, δυσώδεα, πνιγώδεα ἔπ' ἑτοῖσι πρῶτοις ἰατροῖσι
ἐκπυηλκόν. οἶμα δὲ καὶ ὠρακρῆεν πταὺς τριαύτας.

*Lumborum tensio ex muliebrium abundantia, promouet suppura-
tum: sed & quae variegata pigro lapsu feruntur glutinosa, graueo-
lencia, strangulatoria; praeter illa, suppuratum denunciant. Huiusmo-
di autem mulieres arbitror nonnihil delirare.*

BREVIARIUM hoc est siue aphorismus eorum quæ scripta sunt ^{et} *diædoro*, i. differendo, de mulierum suppressione, deque symptomatis quæ ex illa suppressione apparent & fiunt, *ἐμπειρίωνα* Græci vocant. Contulerit autem legere & intelligere quæ super hac re fiunt accuratè à dictatore ipso disputata. Sed ea breuiter & appositè referam, quantum res ipsa exigit.

Ergo. LUMBORVM TENSIO] i. Partium omnium quæ sunt in regione lumborum, vicinarum item, & sociarum. Sic enim accipimus ex commemorata hoc loco tensionis causa; tertio quidem mense mulieres perhorrescere, incertis febrium paroxysmis exerceri, tum hysterica suffocatione laborare, & lumborum dolore vexari. Sed quarto mense, nisi exitum liberalem habeant & *expurgantur*, gravioribus malis exerceri, ac præter illa trimestria, urinas reddere crassas, ventrem habere durum atque maiorem solito, stridere dentibus, vigilare; nec posse capere cibos; eaque omnia mala ingrauescere quando ventum est ad menstruum tempus in ipsa periodo menstruali. Quinto mense malorum omnium prædictorum intolerabilem penè reddi calamitosam vim. Sexto summa esse omnia prædictorum symptomatum cum desperatione salutis, quòd nulla ex illo tempore sperabilis curatio esse possit. Ac

præter ea quibus mulieres exerceri diximus, ipsas iactari, seipsas torquere, crebro concidere & consecretari, pituitam difficulter vomere, inexplabilem sitim habere, incēdio conflagrante aluo ex repletis sanguine naturalibus, urinam vix reddi allabente vtero ad stomachum vesicæ, lumbis dolere, cervice, & dorso, linguam velut fræno compesci, nonnunquam etiam voce capi, stomachum vellicari atque morderi, spirationem elidi in faucibus, toto peruri corpore, ac tum urinas reddi cruentas cum vesica secum sanguinis ex vtero absorbuertit, ventrem intumescere, tibias quoque & pedes, indeque mortem venire latentibus in occulto menstruis per illud tempus semestri. Nam sexto mense desperata curatio est.

[EX MULIEBRIVM ABVNDANTIA] Quæ scilicet cohibetur in vasīs & naturalibus mulierum locis, nec liberum liberalēque exitum habet; tum propter fatiscētis naturæ ab oppressione infirmitatē, materiæ contumaciam, vasorum angustiam; tum propter vterini oris conniuentiam, aut cernicis peruerſionem. Hic enim & γυναικεία quorum multiplex significatio est, ad menstrualem & ad puerperialem materiam referenda esse duximus; sed potissimum ad menstrualem; quod hæc symptomata steriliū partus expertium, & fecundarum communia sunt; magis tamen steriliū propria: quoniam hæc grauius, faciliusque, ac periculosius ægrotant ex menstruorum suppressione, quàm illæ quæ grauiditatis & partus labores expertæ sunt; ob eam sanè causam quod illis suppressio cōsueſta fuit dum vtero gererent, quæ consuetudo & maiore vasī capacitatem conciliat, & suppressionis ipsius molestiam lenit ex minore oppressione, & tolerantia, vt cernere est in omni consuetudine laboris & oneris. Notum est illud. Οἱ εἰς διαμένοι τοῖς ἡμέτεροις πόνοις φέρειν, καὶ ὅσιν ἀδυνάτως ἢ χέροντες ἔσσι ἀσυνήτων ἰσχυρῶν τε & τοῖς ῥᾶν φέρουσι. i. Assuetos labores vterī senes robusti iuuenibus insueti ferunt facilius. Præterea in enixu & partu, fecundarum mulierum loci & naturalia, totiūque adeo corporis vniuersitas, & meabilia magis, & ad excernendum promptiora redduntur, magisque, vt ita dicam, suppressionis atque refluxus metuentia.

[PROMOVET SUPPURATVM] Præsertim mulieribus infructuosis, neque ob eam suppressionem habitioribus. Nam πολυδερνεία inde nata, non rarò arcet symptomata quæ suppressorum menstruorum, & in vtero, & ab vtero consecraria esse solent; qualia incidere docet Hippocrates. Præterea si ex lumbis & locis non fiat sursum ad pulmones excursus, qui si non educitur expurgando, aut per liberalem hæmorrhagiam, omnia secum adfert quæ phthifici experiuntur. Sed tamen hic nulla mētio fit suppurati illius tabifici: at eius quod promouetur in locis & naturalibus per alterationem materiæ menstrualis à febrili calore, si fortè inciderit, idque tertio mense suppressionis, quo & αἰσθητὴν ἰσχυρῶν τε, i. præexistētia bimestria exitum non habuerunt. Ac de suppurato quod inde concipitur, hæc sunt aduersaria. Existunt, inquit, mulieres quibus menstrua cunctando purulenta fiunt exactis duobus aut tribus à suppressione mensibus. Atque id potissimum accidit si aestu febris menstrua incanduerint. Ac signa hæc opinionem faciunt suppurati iam futuri; dolor prægrandis hypogastrij, micantium arteriarum pulsus molesti, tactus cuiuslibet etiam suspensio offensio in hypogastrio. Atque si melius illi futurum sit, prorumpunt menstrua per finem pudoris, exitque purulentus sanguis & graueolentior per septem, octo ve, aut etiam nouem dies. Antea verò laborat & exercetur, vt dictum est. Porro autem cui menstrua purulenta conuenienter fuerint expurgata, optimum sanè fuerit nullum restare vlcus. Nam si fortè supersit, longiorem & accuratiorem requirit curationem à medico, ne ipsum putrescat, fiatque admodum foedi odor. Ergo menstrualis materia cunctando in locis & naturalibus, fit purulenta, exitūque habet, quem antea non habebat, per finem pudoris: non secus atque lumborum tubercula quæ faciunt gibberos, non antè mouent dysenteriam per transitum materiæ ad intestina, quàm suppurari cœperint. Secus est de varicibus cruralibus inde obortis, & sanantibus ipsum κύημα. Nam sine pepasmo tuberculi oriuntur, propter amplitudinem venæ quæ adiacet lumbis. Commemorabile autem est pus expurgari à suppurato sine vomica & vlcere, & suppurabilem reddi materiam à febili calore, si fortè in tertium aut quartum suppressionis mensem inciderit. Non tamen efficitur putis laudabilis generationem tribuendam esse calori febrili, sed virali principio, & viuifico nectari quod à corde manat tāquam à fonte vberimo. Nam suppuratum laudabile nihil aliud est quàm ipse pepasmus.

[SED ET QUÆ VARIEGATA PIGRO LAPSV FERVNTVR] Ποικίλως εἶοντα sunt, quæ nec inoffenso cursu & statis periodis natura duce feruntur λόφῳ ἀκκείσεως, i. excretionis modo; & quæ coloribus variegata sunt à corruptione & putredine partis obsessæ humorisque morbifici, magisterio suo, vt ita dicam, naturam regentis. Atque id locum habet in suppurato quod liberam & liberalem sui expurgationem non habet intra septem aut nouem, ad summum, dies. Eorum enim menstruorum quæ purulenta fiunt, quædam statim à suppurato exeunt, de quibus iam supra; quædam verò sistuntur, aut certè variegata pigro lapsu feruntur: id enim significat ποικίλως εἶοντα, de quibus hoc loco. Nec tamen omnia per finem pudoris exeunt: sed multa per vomicas partium vicinarum & sociarum. Qua de re audiamus summum doctorem. Sin autem purulenta menstrua quæ pus concipiunt, & stabulantur in venis & arteriis circum locos turgentibus; per finem pudoris non exeant, exitusque finem habeāt intra nonum diem, eueniet vt ilibus supra inguen prorumpat sine tuberculo; pure scilicet confertim profluente: atque ita continenter fundentur purulenta & foedi odoris. Quod si acciderit, nunquam eo morbo mulier defungetur, neque superstes manebit. Quod si euascriit, reliquum vitæ tempus exigit in sterilitate. Sic enim comparatum est, vt semper, dum viuet, illac ferantur quod purulenta menstrua per finem pudoris non exeuntia, refluxere ad illa, indeque per ἑμμοὶν profluxere. Etenim os vteri ad illam partem illapsū peruertitur; illabitur autem potentia ligamenti quod habet à peritonæo tunica, consentiente opposito resoluta.

[GLVTINOSA ET FOEDI ODORIS] A putredine & colliquamento: cuiusmodi esse solent in omni ἑμμοῖν, i. in vlcere quod curim contra se afficit, de quo solennis est aphorismus ille. Ἡ ὑπερὶ ἐν τῷ ἰσχυρῷ ἐκ χειμῶν διασπύση· οὐδ' αὖ γὰρ ἑμμοῖν θύεται. i. Vterus si in ischium decumbat & suppuet; vlcus necesse est ἑμμοῖν fieri.

STRANGVLATORIA] Quæ faciunt vt laqueo larynx præstringi videatur; ob excursum terri vaporis, more hysteriarum quæ à suppressi feminis corruptione suffocari putantur.

SUPPURATVM DENVNCIANT] Vel ἔμμελον potius; vnde manat χυλὸν ὀσμυνοῦ, ἢ πλεῖστον, ἢ μέλαν, ἢ σπορμωδὲς, i. graueolens, aut liuidum, nigrum, grumofum.

HVIYSMODI AVTEM VLIERES ARBITROR. NONNIHIL DELIRARE] Ac si diceret; symptomatis gravissimis, & circa vterum, & ab utero exercentur; ob ea quæ sunt mala ἐν ἀλλοῖς ὁμαρίῳ, καὶ νευραῖς καὶ αἰσῶν. πολλά δὲ τὰ κατὰ τὸν σπλῆνα, σπέρμα, σῶμαχος, γαστρὴ αἰστανται. i. in ventre tenero, acutum sentienti, nervoso: cui multa præterea sunt quæ consensuunt, bregma, stomachus, & mens quæ succutitur. Sed plura de his aliàs.

10

20 Οἷον ὁσφύος ἀλγῆμα καὶ πλῆθος αἵματος ἰκτερίως δέεσθαι γινώσκουσι.

Quibus lumborum & lateris dolor caret evidente causa; icterici sunt.

HÆC PROGNOSIS colophonem imponit pulcherrimæ disputationi quam summus præceptor de dolorificis lumborum malis instituit, & feliciter ad hunc vsque locum perduxit.


20

QVIBVS LUMBORVM ET LATERIS DOLOR CARET EVIDENTE CAUSA] i. Dolorificum in lumbis malum quod præreperit ad hypochondria cum febre & cibi fastidio; neque transit ad caput, vnde crudeliter cõuulsifico modo necat: sed velut aduncis vnguibus viscera circumplectitur, piscarij retis modo quod nominatur χεῖρος. Est quod animo concipias, gibbis partibus hepatis inflammationem esse conceptam. Hanc μετὰ πωλεσμον non edere hypochondrij: & tamen diaphragma opprimendo cui adiacet, difficultatem parere spirandi; lateris dolorem facere sympathia: sic esse malum obscuram causam: quæ tamen est eiusmodi, vt per initia marasmi quem committit, sanguinem diffundat toto corpore biliosum multum, icteri materiam symptomatici, hydropum prænunciij ascitarum. In quæ verba prognosin terminauit. ICTERICI FIUNT.

13. Coac.
huius cap.

30

DE HAEMORRHAGIA.



I EN κρείμοισιν ἐκ τῆς αἱμορραγιῶν θεωρεῖσθαι CAP. XLIIII
νεανίας καὶ κῆμιν.

1 *Qua diebus criticis ex hæmorrhagia incidit persfrigeratio eximia; pessima.*

40

VT NIHIL paucum in crisi est criticum: sic omne nimium, quantumvis criticum, est periculosum. Quemadmodum igitur sanguinis substilla praua sunt, id quæ potissimum die critico, vt omnes iudicatoriæ causæ exiguæ: ita profusior omnis hæmorrhagia debet esse terrificæ. Eorum enim quæ faciunt corpus infirmum, & quæ infirmitatem eius denunciant; idem iudicium. Ac similis ratio est eorum quæ apparent & sunt pessimis ægri rebus. Neque enim minùs terrificum esse debet, nec minùs malum videri id quod eiusmodi est causa, quàm id quod signo. Pessimum autem id quod vtroque modo, prauitatis obrinet rationem; videlicet signo & causa. Quo in genere continetur profusior hæmorrhagia quæ frigidissimum corpus facit. Sed de natura hæmorrhagiæ priùs nonnihil dicendum. Est autem id nomen, κατ' ἐξοχὴν accommodatum profluuio narium. Nam cætera sanguinis profluvia vnde manant & quæ feruntur, tum etiam definitorum temporum nominibus explicantur. Huiusmodi sunt τὰ χυμαῖα, τὰ καταμύδια, τὰ κόχια, δυσανταῖα αἱματῶδεις, αἱμορροῖδες, αἱμορρυσίαι, ἄρῆσαι αἱματῶδεις, & quæ sunt huiusmodi. Sed hæmorrhagiæ narium multiplex ratio est, quæ cernitur in qualitate, copia, tempore, & ex eundi modo. Ex quarum notarum distinctione, critica aut symptomatica nominatur. Nam tertium genus est hæmorrhagiæ quæ naturaliter cadit in ephæbos cum venerem agnoscere, vocemque coeperint asperiores edere, οὐκ ἔστιν ἀσθενὴς, ἢ ἀφροδισιάζων αἱμορραγία. Sed hæmorrhagia critica est quæ iure & loco fit. Ac iure quidem, in febre ardenti, cuius propria crisis est hæmorrhagia: loco autem, quæ significata fuit antè pepasmo & erethismo proprio; vt hypochondriorum fugaci meteorismo sine borborygmo, rubore faciei, & oculorum, pulsu aspectabili temporalium arteriarum, cephalalgia, & marmyrgis. Tum autem in qua sanguis prorumpit liberè & liberaliter, non meracus, sed mixtus humoris seroso κατ' ἔξιν meteorismi fugacis in alterutro hypochondrio, ac die critico. Symptomatica autem est hæmorrhagia sanguinis meracioris, pauci, & stillantis, die infæcundo; vt ait in Philisco. Symptomatica est etiam in facie defædada, sanguinis dilutissimi, & quæ ἀπάτων fertur. Denique omnis quæ motu morbi, vel à viscerum exolutione cietur hæmorrhagia, symptomatica meritò dici potest. Exsunt etiam particulares hæmorrhagiæ critica, vt cephalalgia prægrandis, aurium inflammatarum quæ proreperat

propt. 7. c. 2. 2.
in Coac. lib.
& 2. Epid.

frontem & tempora, maximèque iuuenum: inflammationis item systrophica hypochondriorum: dolorificorum etiam in lumbis malorum quæ solent esse sanguiflua per menstrua aut hæmorrhoidas: dysenteria. cruenta in iis qui malè collocati fuerunt in curatione cruris perfracti, aut in iis etiam qui altero sunt crure mutili. Sed posteriora hæc duo, sunt quidem *αἱμορροϊκὰ*, ἢ *αἱμορροαγὰς* *δα*: non tamen veræ sunt hæmorrhagiæ. Est igitur hæmorrhagia critica, quæ iure & loco fit, tum vniuersalis, tum particularis. Omnis enim affectio *πληρωμὴ*, i. ex repletione, repletionis propria vacuatione conuenienter exoluitur.

30 Est autem propria vacuatio hæmorrhagia & sudor. Ac sanè tot vacuationes moliri necesse est, quot sunt repletionis affectionum foci & sedes. His ita constitutis.

QUÆ DIEBUS CRITICIS] Tamen si enim *τα κρίσιμα* verè dicantur & propriè, signa & causæ critica, tamen commemoratio causæ critica, i. hæmorrhagiæ; dierum *κρίσιμον* significationem ostendit: quemadmodum in illa prognosi. *Οἱ ἐν κρίσει μὴ σὺν δόξῃ τοῦ ἀνδρὸς πρὸς τὸν ὑπόχονδρον καὶ τὸν σπλῆν. 1. Quæ diebus criticis cum refrigeratione incidit anxietudo expers sudoris; mala.* Ergo quæ diebus criticis, paribus & imparibus, quibus certamen naturæ & morbi est in procinctu; maximè tamen primis periodis, quaternariis ante vigesimum diem, post quem sperabilis non est hæmorrhagia, quæ critica lege imparibus potissimum solet cieri, quod illis concitatio fiat bilis quæ regnare dicitur in morbis acutis quorum propria est crisis hæmorrhagia.

EX HÆMORRHAGIA] Ex *αἱμορροαγῶν*, quæ vox pluralis numeri, crebram ostendit sanguinis profusionē è naribus, cuiusmodi fuit in Metone quem scribit crebrò sanguinem profudisse post ipsam crisi; resipuisse tamen atque conualuisse. Sed hîc frequentem posuit hæmorrhagiam, quæ tantum recipit commendationem & laudem criticorum dierum: ipsa tamen reapse inutilis est, ac nihil opis adfert 10 ægroto; proptereaque peior censenda, quod omnia quæ fiunt quæque apparent diebus criticis bona aut mala, firmiora sunt, quàm quæ in alia incidunt morbi tempora. Est autem commemorata hoc loco frequens hæmorrhagia, vel etiam vnica, diu multumque prorupta, inutilis atque mala: quod accessiōnem habeat malignæ & efferæ cacochymiae qua sanguis multa perfusus transfertur ad caput, nec antè subsistit quàm prorepando appulerit ad extimas venarum oras quæ sunt ad imam frontem, vbi facta anastomosi, qua data porta, foras prorumpit, nec ampliùs dominatu naturæ tenetur.

PERFRIGERATIO INCIDIT EXIMIA] Ex qua fit corpus marmore ipso frigidius, vel toto habitu, vel extimis: id enim significat *παρὰ φύσιν ψυχρὴν*, i. refrigeratio fortis. Nam quæ simpliciter vsurpatur *παρὰ φύσιν*, non rarò temperationem ostendit ardoris febrilis. Sed illa vox, *ψυχρὴν*, frigoris eximiam vim, atque, vt ita dicam, iuueniliter fortem planè ostendit: quemadmodum & aduerbium *ψυχρῶς*, fortiter 30 validisque viribus morbum aliquem dominari, cum ait. *Τὰ φρενικὰ ψυχρῶς. Ἐμώδεα πλεοντῶ. 1. Vehementer phrenitici, tremuli moriuntur.* Ergo *ψυχρὴν παρὰ φύσιν* illa demum esse videtur quæ scribitur in ea sententia. *Extimarum partium cita in vtrunque mutatio, praua est: vbi Galenus agnoscit repentinam vicissitudinem prægrandis frigoris & ardoris, qualem disertè alibi expressit. Οἱ ἐν κατὰ φύσιν ἰσχυροῦς, αἰσθηματόμενοι καὶ τὸν 1. Qui à perfrigeratione subrosidi sunt; habent malè.* Iam verò ipsum nomen *τῆς παρὰ φύσιν*, refrigerationem exhibet considerandam, vel in extimis partibus, vel in toto corporis habitu. Sed huius refrigerationis eximiae causa est immodica sanguinis profusio, per exolutionem potentiae retentricis, & orgasmum efferæ cacochymiae quæ dissipauit nectar viuificum ipsius cordis, quo defraudatæ partes extimæ perfrigerantur. Tantum enim habent illæ caloris, quantum & sanguinis. Quinetiam quæ supersunt ab hæmorrhagia in hypochondriis *καύματα*, plurimum certè faciunt ad illam perfrigerationem quæ 40

PESSIMA EST] Propter infirmitatem summam & νέκρωσιν caloris natiui; quæ sanè Galeni ratio est ad illam sententiam. *Αἱ ἐν ῥήγῃ κατὰ φύσιν μὴ ἀναθερματόμεναι καὶ τὸν 1. Frigus ex rigore non incallescens; malum.* Verba Galeni sunt hæc. *Αδύνατον δὲ καὶ νέκρωσιν τῆς ἐμφυτοῦ θερμότητος ἢ διαπύρρυν κατὰ φύσιν. 1. Imbecillitatem arguit aut morticinium caloris insiti, hæc perfrigeratio.*

2 Τὸ ἀνὰ πάλιν αἱμορροαγεῖν· πονηρὸν· οἷον ἐπὶ σπληνὶ μεγάλῳ, ἐπὶ δὲ ξιῶν. καὶ κατὰ ὑποχόνδρια ὡσαύτως.

Sanguinem è diuerso fluere; malum est: vt in lienē magno, è dextris. Atque similiter in hypochondrijs.

HÆC PROGNOSIS dirimit litem omnium decertantium super loco detrahendi sanguinis ad retractionem rheumatis concitati, & detractionem consistentis phlegmonarum systrophicarum thoracis & hypochondriorū. Etenim si ea quæ conuenienter duce natura suscipiuntur, artificium præbenè medico ad imitationem ipsius naturæ comparandum; planè efficitur, vt si hæmorrhagia κατ' ἔξιν, hoc nomine in bonis ducatur, contraria autem in vitio sit; illius, non huius, in detrahendo sanguine imitatores esse debeamus. Ergo secare oportet venam κατ' ἔξιν, i. è directo, non autem ἀνὰ πάλιν, i. contra directum: quoniam omnis hæmorrhagia iniussa contra directum, praua est. Et si contrariorum contraria sunt 60 consequentia, efficitur quoque iniussam κατ' ἔξιν hæmorrhagiam bonam esse; proptereaque iussam iure & loco præscriptam: sicut præceptor alibi multis in locis & obseruandum & faciendum præcepit. Sed magna fuit contentio inter maiores nostros super illo κατ' ἔξιν, aliis ipsum esse directum, aliis contra oppositum & ex aduerso peruicaciter & pertinaciter sustinentibus. Sed hæc sententia, velut senatusconsultum,

fulrum, liem componet; modò ipsam medicamentissimis legerint animis & intellexerint, uti fore cō-
fido si cum benignitate ad discendum accesserint. Soleo sæpe dicere, quòd bona est inter medicos opi-
nionum dissensio, pessima voluntatum. Sed præstantissima est, rerumque omnium ab ægroto expeten-
darum præcipua, par studiorum & opinionum consensio, quæ quidem lucet splendetque in iis potissi-
mum qui sapientiæ Hippocraticæ studium diu attentissimè coluerunt. Hòc igitur spectat prognòsis;
omnem hæmorrhagiam malè cieri quæ non cietur κατ' ἔξω. Eadem ratio est in omni transitu; tum per
abscessum. Nulla omnino naturæ contentio, quantumvis iure & loco suscipiatur, sperabilem crisin o-
stendit, nisi κατ' ἔξω procedat. Denique nihil medicorum votis respòdet, si desideretur illud κατ' ἔξω, Hip-
pocratis illud est. Κατ' ἔξω & πλευρίων ὀδυνή, καὶ ὑποχονδρίων, καὶ ἀσθῆτος ἐπὶ τῆς, καὶ ὅκ' ἰνὸν ῥήξῃς. i. E di-
recto laterum dolor, hypochondriorum tensio, lienis tumor, eruptio è naribus. Sed huius sententiæ explicatio
mox adferetur, Hippocratem hic loquentem audiamus.

SANGVINEM E DIVERSO FLUERE; MALVM EST] Enimvero, τὸ ἀνέπαυτον, contrariū est,
τὸ κατ' ἔξω, quòd significat è regione: propterea; appositè dicitur, è diverso. Sed præter eā significationem,
τὸ κατ' ἔξω usurpatum legitur, ad perpendicularum: ut in illo, βόμβυκα μὲν οὐκ ἔστι τὸ ὀφθαλμὸν κατ' ἔξω τὸ ἔλκεος: quo
loco reprehendit Hippocrates suæ tempestatis chirurgos qui fascias iniiciebant hinc inde, ἔξω & ἔξω;
quæ voces Galeno visæ sunt propriæ ad indicandam rationem adhibendi laminam plumbeam, nò hinc
inde, sed ad perpendicularum super tumore. Itaque fortassis non temerè nec arroganter, τὸ ἀνέπαυτον, con-
trarium τὸ κατ' ἔξω, opinionem faciet illius ἔξω & ἔξω, i. hinc inde; si propriè referatur ut decet ad corporis
latitudinem. Nam κατὰ χεῖρας hinc refertur ad longitudinem; ut propriè τὸ κατ' ἔξω, quòd significat
semper τὸ ἐν ὑπερθεῖαι πρὸς μὲν κατ' ἔξω τὸ μῆκος τὸ σῶμα, πρὸς δὲ κατ' ἔξω τὸ πλάτος. i. rectitudinem in longum modò, modò et-
iam in latum. Quamobrem τὸ ἀνέπαυτον rectè videmur conuertisse, non ἔξω & ἔξω, quæ propria eius si-
gnificatio est; sed è diverso: quoniam hoc loco situs ostenditur in longum, non autem in latum: sicut
in Herophonte legimus; ἡλῆσεν κατ' ἔξω βόμβυκα τὸ ὤφθαλμον; ἀσθῆτος κατ' ἔξω, i. bubo illi doluit lienis è directo: prius
autem dixerat ἀσθῆτος ἐπὶ τῆς, i. lien intumuit; & oborto in bubone abscessu, paulò pòst ait, ἀσθῆτος ἐμῶν, i.
lien immutatus est. Eòdem spectat & illud quòd scriptum est de symptomatis calculosorum renum, ναφίη
μὲν κατ' ἔξω. Possem hinc ego, perinde acidoneum nactus locum, multa scribere super ea voce κατ' ἔξω,
quòd pertineret maximè ad demonstrandum quorsum dicatur: sed hæc sufficient testimonia quæ ve-
rè sunt παμύρεστα τῆς διαφόρας nostri authoris. Quæ cum ita sint, querendum videtur quamobrem malum
sit profluere sanguinem è diverso. In promptu causa est. quoniam hæmorrhagia nulla in bonis ducen-
da, quæ non fit è regione, siue κατ' ἔξω. Atque id longo vsu medendi expertum, & ab Hippocrate cor-
probatum, ac velut augustissima lege sancitum, ubi ait, Κατ' ἔξω & πλευρίων ὀδυνή, καὶ ὑποχονδρίων, κατὰ τῆς, &
ἀσθῆτος ἐπὶ τῆς, καὶ ὅκ' ἰνὸν ῥήξῃς. Ac si diceret; quemadmodum omnis inflammatio systrophica thoracis,
hypochondriorum & lienis, venit à rheumate consistente quòd prius concitatum fuit κατ' ἔξω: ita cu-
ratio eius tum iniussa, tum iussa, quæ sanguinis vacuatione κατ' ἔξω suscipitur, nec alio quouis modo;
perfici debet κατ' ἔξω retrahendo & detrahendo. Declarat illud, profluuium sanguinis è naribus quòd fit
sua sponte κατ' ἔξω. Est enim ratum illud, ἀκτία ἢ ῥέπει; i. ducendum quæ vergunt. Atqui omnia vergunt
κατ' ἔξω quæ faciunt phlegmones systrophicas hypochondriorum atque thoracis. Nam rubor cynan-
chicus facit lateris dolorem κατ' ἔξω. A lienis tumore obortus est bubonis abscessus κατ' ἔξω, in Heropho-
nte. In Heropyto crebra fuit vicissitudo furditatis & doloris in ischio dextro. Atque ita comparatum
fuit, ac ita res tulit, ut febris ingrauesceret cum furditate, quoties dolor ischij quiescebat; ipsa verò mi-
tesceret cum ischij dolor urgeret. Ne longum faciam; omnia quæ inferne sursum, aut superne deorsum
feruntur, κατ' ἔξω eò viam affectant ubi consistunt, aut vnde exitum habent; siquidem natura duce κατ'
τῆς ἀκταίας λόγῳ ferantur, non autem orgasmo. Ergo ducendum semper κατ' ἔξω: quando illud verissi-
mum esse constat, ἀκτία ἢ ῥέπει. Huius autem prognoseos dignitas Galeni testimonio illustratur ad lib.
ἀπὸ διαφόρων ὀφθαλμῶν. Etenim si verum ἰντὲρ φλεγμονῶν systrophicarum est hæmorrhagia κατ' ἔξω; cu-
rationis quoque ipsarum ἡγμονικὸν erit detractio sanguinis præscripta κατ' ἔξω.

UT IN LIENE MAGNO E DEXTRIS] Nam Bioni ad magnum lienem, i. ἐπαρτήνα κυρτώματι
ἐπὶ τῆς, profuit multum profundere sanguinem è nare sinistra. Si quis obiiciat sanguinem stabulari
tantum in venis & corde, alibi nusquam; propterea; quæ aliunde duci non possit; nullam autem venam
à liene produci in partes sinistras, quòd omnium origo sit hepar: sciat is velim natura bene constituta,
maximèque inchoato tumore lienosi pepasmo vnde fit sanguis tenuior, ipsum propelli & rapi in venas
maiores κατ' ἔξω lienis affecti: non secus atque in lumborum tuberculo quòd gibberum facit, ipsum
transferri in venam quæ adiacet lumbis, vnde varicibus in crure obortis, cum tuberculo gibberum sa-
nescit. Valeat igitur Vesalij arrogantia qui pertinaciter sustinet, ad omnem pleuritidem secandam esse
basilicam brachij dextri. Est enim maior vis posita in forti contentione partis obsessæ, quàm in venarum
siru, ad propulsandum. Sunt autem sinistris ὁμόφυλα & ὠμόσποννα, i. consociata sinistra: quemadmo-
dum dextra dextris. Sic fœtus mares dextro vteri sinu gignuntur atque geruntur, quòd illa pars è regio-
ne sit hepatis, eiusque gratiofro tepore fruatur. Et verò commemorabile est illud quòd fuit Hippo-
cratis de humorum exitu iudicium; naturam scilicet inuenire viam quæ se exoluit humore morifico:
quamvis & ipse crassior sit & meatus angustior, modò validè sint eius vires ad fortem in depellendo
& propulsando cōtentionem. Nec verò idem dubitavit scribere, naturam moliri abscessus per ossa; hy-
dropicorum aquas refluere in aluum, eadēque ferri per vrinæ ductus; expurgationem puris obser-
uari in purulenti rupta in thorace vomica, & quæ sunt eiusmodi. Notum est illud. Quibusunque inter
ventrem & diaphragma collecta pituita est, doloremque cohibet, denegato sibi in ventrem alterutrum exitu; his
conuersa in venas pituita morbum exoluit. Ex quibus efficitur; nec forti naturæ contentione, nec valida

eius virtute, nec patte consociali, nec preparato humore, factoque meabili corpore, non vnde, quod, quā, & quemadmodum oportet, hæmorrhagiam cieri ē naribus dextris in magno liene.

ATQUE SIMILITER IN HYPOCHONDRIIS] In hepate quod adiacet hypochondriis, eiusque mala per hypochondria metonymicè recēsentur: vt nuper explicauimus in historia tumorum hypochondriacorum. Nam in sententia illa de monendo *κατ' ἴκην*, non videtur complexus in tensione hypochondriorum, lienis tumores quos ipse separatim nominauit *αδλωὲς ἐπ' αἰσίνους*. Similiter autem dixit fieri in hypochondriis, vt in liene magno, si tenso hypochondrio sanguis fundatur ē nare sinistra. Non tamen peccata sunt paria. Multo enim grauius peccatur, si tenso hypochondrio, sanguis ē diuerso feratur, quā in liene magno: quia sunt acerbiores morbi, & systrophica inflammationes hepatis quā lienis.

3 Τὰ αἱμορραγέοντα ἐφιδρουῶντα τέρματα κακῆδια: διαλεξέ-
μοι λαθραῖως τελευτῶσιν.

Qui prorupto sanguine perhorrescunt in tremate, grauiſſimum habent malum: atque hi vitam finiunt differentes, nec opinatio.

EXPLICATA sunt duo genera hæmorrhagiæ symptomaticæ: vnum quod cernitur in nimia prorupti sanguinis abundantia; alterum verò in exeundi modo & loco, cum scilicet ē diuerso exitum habet sanguis. Hic tertium genus proponitur, vel melius, tertia eiusdem generis species quam facit viscerum exolutio, prauaque sanguinis conditio venenata qualitate infecta. Hinc summa virium infirmitas, ac dissipatio vitalis atque viuifici nectaris, vnde homines familiariter colloquendo cum suis familiaribus, moriuntur celerius opinione medicorum ipsorum, ceterorumque omnium qui præsens sunt. Quod sæpe accidit rupta in pulmone vomica, & afflatu pestiferæ auræ. Mihi verò, dum literis mandarem cogitationes meas in hanc prognosin, venit in mentem cum incundissima recordatione diuini beneficii quo superiore anno ex faucibus fari ereptus sum, cum differendo, ab hæmorrhagia, sine vlla sententia rei molestæ, in complexu liberorum meorum, charissimæque coniugis, penè animam exhalauit.

Ergo. QVI PRORUPTO SANGVINE] Vel; qui sanguinis copiam profundunt faucibus, aut ex vulnere recēns illato, aut ex vlcere cum pulsu forti & permolesto, quem facit naturæ contentio studens excludere quæ sibi noxia sunt, atque ita ciet hæmorrhagias. Ex quo efficitur verum illud esse quod scripsit. *Ἐπὶ ἰσχυρῷ σπυρμῷ ὡς τις ἔλκεσιν αἱμορραγίῃ*. A forti in ulceribus pulsu, hæmorrhagia. Nam & à vulnere, quod *ἑταιμοί* Græci vocant, non raro cietur hæmorrhagia conuulsifica, aut singultuosa. Sed illa symptomatica non sunt *λαθραῖως* mortifera: cuiusmodi memoratur hæmorrhagia proposita: sed *ὀξύως* potius, i. crudeliter & aperte. Quinetiam in iis qui à tremate multum emacruerunt, exolutis visceribus quæ iam tædet sui officij; hæmorrhagia sæpe fit, quibusdam supera, aliis verò infera, ferturque alius nigro admodum tæbo, vt ipsi vidimus in Polemarcho Brissacio, biduo antè quàm fato concessit. De trematis autem proprietate, quid scilicet ipsum significet, dicitur aliàs pluribus *ὡς ἂν ἐν τῇ κεφαλῇ πρὸς αἰσίνους*.

PERHORRESCUNT] Sic legitur in Coacis; in prorrhethico, CVM SUDATIUNCULA. Vtraque lectio tolerabilis atque vera, sed appositè magis sudatiuncula ad inopinatam mortem, quàm horror. Nam horroris frustra oborti translatio ad diaphragma & caput, non est sine doloris acerbitate, actionum læsione aspectabili. Sed sudatiuncula, præsertim particularis in capite aut thorace (nam cernitur etiam in toto corporis habitu sudatiuncula) vt ineunte morbo symptomatica est oppressarum virium: sic eo affecto, exolutarum, mortemque in propinquo esse denunciat, sine vlllo sensu molestiæ. Plurima iam super ephidrosi dicta sunt à nobis priore libro huius diuini operis, & alibi passim. Superest illud querendum; quid fiat vt à sudore horror hæmorrhagiam denunciet salutarem: contra verò ab hæmorrhagia horror terrificus esse videatur: id enim significat propriè *κακῆδια*. Hippocratis illud est, si cui cum perhorruerit atque sudarit criticè, rursus postridie horror ingruerit, ac iam à perasmo somni sit expertus, idque *ἄβελος*, i. immeritò; huic vèturam arbitror hæmorrhagiam. Sane haud parum nec modicè differunt inter se, illius & huius prognoseos argumenta siue *σημεία*. Huius enim horror est planè symptomaticus exacte profusioris hæmorrhagiæ, idemque frustra fit, & fractis iam viribus ægri: illius autem prognoseos à sudore horror nouum certamen instituit, quod scilicet à naturā perficitur. Hoc enim spectat illa prognosin; non raro varices esse morborum crises quæ ad salutem variè suscipiuntur pro vario humoris motu, naturæ impulsu, & partium obfessorum conditione. Docemur etiam varietatem illam criseon denunciari posse vna eadēque rigoris concussione. Est enim rigor idem criticus & sudoris & hæmorrhagiæ prænunciatus, aluūque ciet deorsum & sursum. Exempla variarum criseon in eodem morbo scilicet susceptorum leguntur historia; vniuersali i. Epid. Sed longius excurrit mea disputatio.

GRAVISSIMUM HABENT MALVM] Ne dicam mortiferum. Nam *τὸ κακῆδια*, verbum est *ἐπιπρόσπον* pro grauitate propositi mali. Significat enim *τὸ κακῆδια*, quod merum quidem adfert sinistri iudicij, nec tamen desperabilem vitæ salutem ostendit. Grauiſſimi autem mali atque mortiferi causæ sunt explicatæ. Nam quæ ab exolutione partium solidarum exudat sudatiuncula, mortem subesse testatur. Idem quoque facit hæmorrhagiæ symptomaticus horror, cum vires effecerat languent.

ATQUE HI VITAM FINIUNT] Quidā postridie quæ tæbo admodum nigro ducta fuerit aluus. DISSERENTES NEC OPINANTES] Quoniam moriendi sensum adimit viuifici nectaris vacuatio atque vacuitas, & partium solidarum exolutio, ipsiusque vitalis principij dissipatio.

4 Τὰ πεμπτήα αιμορραγῶντα λάβρος, ἐκτὴ ἡπέρηζώσαντα, ἐβδόμη ψευθύντα, διὰ δερμαίνετα ὀξέως· τοῦτοις κοιλία πονηρόνται.

Quibus quinto die larga est hemorrhagia, sexto rigor, septimo perfrigeratio, rursusq; praegrandis ardor; his in vitio sunt alui.

10 QVEM AD MODUM in vitio est omnis vndeunque manarit profusior hemorrhagia: sic ea quae confectarium habet symptoma, quod ipsius debuerat praenuncium esse signum, additione grauiorum malorum mortifera esse solet. Nulla est omnium vacuationum quae tam faciat corpus infirmum, quam liberalis hemorrhagia. Est enim sanguis vinificum nectar quo partium omnium fugax viuacitas recreatur atque reficitur, ad vitae & animalitatis conseruationem & diuturnitatem. Sed vt profuere sanguinem plus quam decet, malum est: ita pestiferum si illud profluuium successionem adferat rigoris, indeque profusioris alui: quae duo non minus terrifica sunt, quam ipsa profusior hemorrhagia. Est quidem spei plena quae ante rigorem vrina subsistit, siquidem ἡ ἄρα illa suppressio sit: terrifica est autem quae à rigore fit, ac citam mortem adducit. Eodem modo qui iure & loco rigent, hemorrhagia superueniente, febre ardente feliciter exoluuntur. Secus est à rigore qui post hemorrhagiam cietur, vt mox noster author docebit.

20 QVIBVS QVINTO DIE] Quo scilicet iure & loco cieri potest hemorrhagia, vt in Metone; nō autem quarto. Nam quartanae hemorrhagiae sinistri sunt iudicii. Pertinet autem diei quinti notatio, vt particulare prognoscens illius exemplum. Quae diebus criticis hemorrhagia cietur, &c. vbi demonstratum est, eò res peius ire ex mala crisi criticorum dierum, quod omnia firmiora sunt illis diebus quam quae in alia incidunt morbi tempora: quoniam certamen naturae & morbi tum in praecinctu est.

LARGA EST HEMORRHAGIA] Vndeunque & quacunque cietur, quod idem alibi scripsit ἀναδύνει. Cietur autem larga humoris tenuissimi & acerrimi, motu naturae; aut febris impulsu, & repletione particulari capitis aut lumborum, & locorum muliebrium. Ratum est illud. Quae ex dolore lumborum cietur hemorrhagia, larga. Vt enim fortis naturae contentio pulsus reddit micantis arteriae dolorificum: ita quae ex illa contentione in repletionem particulari cietur hemorrhagia, larga est & profusa. Similiter fit in pulsu aspectabili micantium in temporibus arteriarum, & cephalalgia praegrandi.

30 SEXTO RIGOR] Qui placidus esse debet, omnisque perturbationis expertus, maximèque ab hemorrhagia quinti diei; quae optima quidem esset si omnino morbum exolueret; bona autem, si efficeret vt aeger alacrius morbum ferret: quemadmodum de sudoribus praecipit Hippocrates. Hic autem notabile est quod sexti diei exacerbationem memorarit, in quo symptomatum remissio esse debet; tum quia dies ille tyrannus esse solet; tum quia dierum imparium meliores sunt paroxysmi quam parium. Est igitur illa prognosis aegro magis propicia & salutaris. Qui febrium initiis perturbantur, somni expertes; si quidem stillaris sanguis, indeque sextum diem agentes sint alacriores, sed noctem exigant molesticrem, post die autem perturbati sanguinem liberaliter profundant; malis omnibus exoluuntur. Ac talia denunciat aquosa vrina. Nam de rigore symptomatico sexti diei, solennia sunt illa. Qui sextum morbi diem agentibus sunt rigores; dyscriti, vt Dromeada vxori. Deinde verò cum rigor omnis criticus exciteretur cita exclusionem bilis flauae à venis in partes acerrimi sensus; consentaneum est vt id fiat virtute naturae quae hic locum non habet. Est igitur symptomaticus.

40 SEPTIMO PERFRIGERATIO] Hic tritaeophysae febris in paritatem mutatio est, quae paritas ex imparitate contumacissima est. Eius autem mutationis causa est rigor, iuxta illam prognosin. Tritaeophysarum febrium incerti rigores qui medio febris cursu exacerbantur, sunt terrifici. Hic autem perfrigeratio teporationem significat febrilis ardoris, vt idem videatur ὑπὸ ψυχῆς quod παύσιν dierum imparium in Nicodemio Abderita qui paribus diebus paroxysmos habebat.

INDEQUE PRAEGRANDIS ARDOR] Huius ardoris mentio fit ὅσπερ ὑπερπύρετος. Arque sic collocari debet in hac prognosi. Quibus ex ardore febrili quinto die larga est hemorrhagia, &c. Nam τὸ ἀναδύνει, ἀντὶ τοῦ, πῦρ ἔχον, vel ὑπὸ καύσου ἔχεται, non raro scriptum legitur apud Hippocratem, vt in illo praeter alia multa. Οἱ κοπιώδεις, ἀχλυώδεις, ἄρτυνοι, κοματώδεις, ἐπιδροῦντες, ἀναδερμαγόμενοι, κακόν. In qua prognosi complexio est symptomatum pessimorum quorum vnumquodque pestiferum est quando cum febre coniunctum est; vt nihil necesse sit ea simul existere ad exterrendum, vt ait Galenus. Quod si loco scriptum sit, τὸ ἀναδερμαίνετα, caecopragiam ostendit ipsum per se naturalis oeconomicae, quam facit tritaeophysa febris quae ex incerto rigore mutationem habuit imparitatis in paritatem, siue ἀεὶ ἀσθενὲς εἰς ἀρπασμόν.

50 ITS ALVI LABEFACIANTVR] Quoniam à profusiore profluuiio sanguinis, multum laborant ex paupertate caloris natui, vnde fatiscunt in officio coquendi, distribuendi, sanguificandi, & excernendi; maximèque cum refectioni studendum est, quo tempore ex diuturna officij vacuitate facta est ignior aluius.

5 Μετ' αιμορραγίην, μὲν γὰρ διαχώρησις κακόν. πονηρόν δὲ καὶ τὰ ἔξερυδρα ἰώδεα. τεταρτάτοις αἱ τοιαῦται αιμορραγίαι· κοματώδεις

ἐν τοιούτων, ἀπαδέντες ὀνηστικοί, μελάνων ἀρρυσθόντων, καὶ κο-
λίνης ἐν ῥείσει.

*Ab hamorrhagia, nigrorum deiectio; malum: pestiferum est etiam
prærubris & æruginosis ferri aluum. Quaternarijs huiusmodi sunt hæ-
morrhagia, indeque comatosi, convulsi, intereunt, nigris prodeuntibus,
alioque inflata.*

2. Epid.
aph. 14. 2.

IN OMNI excretionē prodest mutari excrementa, modò in peius illa mutatio non sit. Saluberrimum est ferri aluum dilutiore bile, quæ paulò antè meracior visā est; non è diuerso. Ne longum faciam, bona est hæmorrhagia quæ iure & loco fit, sanguinis suo sero diluti: pessima autem meraci, quem ἀκρατον Græci vocant, ut in Philisco. Ac sanè tanta vis est qualitatis prauæ, ut si quæ vacuatio in vitio sit tempore & ex eundem modo, ob eamque causam sinistri iudicij esse putetur; non tamen talis ipsa qualitate praua, vel hoc tantum nomine mortifera non sit. Existunt quidem sanguinis stillicidia mala, ut omnes iudicatoria causæ exigua; peiora etiam sunt critico die expressa; non tamè omnino funesta sunt. Sin autem nigra sint, desperatam salutem ostendunt. Sed illud spem adimit, cum post hæmorrhagiam, nigrorum deiectio est, unde significatio fit ingrauescentis morbi, & viscerum exolutorum. Ac tantò peior est illa hæmorrhagiæ symptomaticæ calamitas succedanea quàm profusioris alui, quantò ipsam iecur est aluo nobilius; vel quantò pars princeps, officij præstantia ministram præcedit. Terrifica est quidem alui præpropæ excretio, & in officio laborantis infirmitas quam peperit profusior hæmorrhagia: sed mortifera est illa planè, nec ullam salutem vitæ relinquit sperabilem, cuius consecutaria est nigrorum deiectio in qua ræder hepar sui officij cum incremento grauiorum symptomatum, & morbi acquirentis vires eundo. Postquam igitur alui laborantis in officio coquendi, appetendi, & excernendi incommoda largioris hæmorrhagiæ symptomatica explicauit; nunc effectorum viscerum ab eadem causa calamitatem proponit.

AB HÆMORRHAGIA] Scilicet larga, vndeunque & quacunque sanguis effluxerit, obtentiam & acrimoniam, febris impulsus, & repletionem particularem; quæ tres omnino sunt causæ profusioris hæmorrhagiæ, maximèque si eo conspirarit infirmitas potentia retentrix, atque principij sanguifici exolutio.

NIGRORVM DEIECTIO] Cuiusmodi sanguis est niger, ipsa quæ fæx sanguinis vel melancholicus humor: non autem bilis atra quæ tria illa secum habet coniuncta, τὸ σπυρρὸν, τὸ ὀξύδης, καὶ τὸ δειγερτικόν: quarum omnium qualitarum expertus est melancholicus humor, nec terram fermentat, sicut bilis atra, maximèque illa quæ gignitur ex bile flaua perusta, quæ homines facit fanaticos, & insanabiles cancos.

2. Epidem. &
comment. ad
propr. 35. f. 3. 1.
hist. nr. part. 3.
3. Epid.

MALVM] Quoniam critica esse nequit illa nigrorum deiectio: propterea quæ sinistri iudicij, ne dicam lethalis, ob prauam qualitatem excrementi quo ducitur aluus: quamuis διαχρησμοῖς non semper significet πλεονάζουσαν. Omnia enim iudicatoria non iudicantia quæ in contrarium naturæ vergunt, cuiusmodi esse dicuntur κακὴν καὶ διαχρησμοῖς, i. maligna excrementa, sine exceptione funesta sunt. Secus est de vrinis nigris quæ à menstruorum aut puerperiorum suppressione redduntur in morbis acutis: nihil enim mali præ se ferunt, sed contrà prodest sic ipsas reddi. Deiectio autem nigrorum, viscera multum in vitio esse, vel, ut Galenus loquitur, μέγαλον κίνησιν ipsorum denunciat. Existunt & aliæ deiectiones nigra, ipsa qualitate humoris funestæ, quas ab atra bile meraca fucari scribit Galenus: sicut & liuidas ab eadem atra bile modica & modicè tinctas, non exquisitè. Sed illæ soboles sunt bilis flauæ perustæ in morbis ardentibus acutis: sicut & nigra in vrinis nubecula. At tales illæ non sunt consecutaria profusioris hæmorrhagiæ.

22. lib. 2.
progn.

PESTIFERVM EST ETIAM PRÆRVBRIS ET ÆRUGINOSIS FERRI ALVVM] Enimvero proluuius alui prærubra certissimum est argumentum labefactæ naturalis œconomia, & hepatis multum effecti soboles. Omnis enim cruenta deiectio iecori accepta refertur: sed periodica & fugax, virtute illius fit; perennis autem, torminosa, carniūque lotura similis, exoluti visceris, penèque dixerim, emortui syllogisticum est signum. Sed æruginosa causa est deiectionis, non hæmorrhagia quidem sola, sed ardor febrilis qui facit bilem æruginosam, cuius in atram facilis mutatio est.

QUATERNARIIS HUIVSMODI SVNT HÆMORRHAGIA] i. Quartum morbi diem agētib, quos ego αἰνύρας quaternarios nominaui. Nam & quaternarij sunt qui septimum, vnde decimum, decimumquartum diem agunt. Iraque die quarto infelix ac sinistri iudicij est hæmorrhagia: quia non suscipitur neque perficitur λόγος τῆς φύσεως. Ergo symptomatica est à morbi impulsu, & sanguinis effecti multa bile perfusi, cuius orgasmo seu impetu, ἀναδρομή, i. ἐκκυσσις fit ad caput, cuius ἀναγωγή non est per anastomosis venarum & arteriarum quæ sunt ad imam frontem. Nihil autem bene fit quod critica lege non fit, imprimis quæ hæmorrhagia quæ citur morborum initiis, quo tempore natura morbiū causis opprimitur, est que humorū cruditas. Deinde infecundo die, ut quarto, qui est ἀσπύρας, & sine paroxysmo febris acutæ, cuius meliores sunt paroxysmi imparibus diebus quàm paribus. Est autem paroxysmus febris acutæ, cuius meliores sunt paroxysmi imparibus diebus quàm paribus. Est autem paroxysmus febris acutæ, cuius meliores sunt paroxysmi imparibus diebus quàm paribus.

part. 1 o. f. 2. 6.
Epid. & lib. 1.
Epid.
158. Coac.
1. lib.

Coac. 9. 217-
2:lib.1.

Córc. 9. cap.
12. lib. 2.

Coac. 4. cap.
12. lib. 2.

hist. 11. part. 36
3. Epid.

hist. 9. part. 30
3. Epid.

3. Epid:

4:25

4:25

4:25

4:25

4:25

Quæ post exiguam hæmorrhagiam & nigrorum deiectionem in acutis surditas venit; malum. Ibi deiectio sanguinis mortifera est: surditas autem exoluit.

VT MERITO aut immerito naturæ, symptomata se ostendunt: ita de illis verendum, aut bene sperandum. Τοῖς μὴ καὶ λόγον κοινῶς οὐκ ἐστι πιστεύειν ὅτι φοβέμεθα λίαν τὰ μικρὰ καὶ γινώμεθα ὀρθῶς λόγον. i. iis quæ immerito leuant non est fidendum: nec multum vereri ea quæ sine causa torquent. Quæ sententia notabilis est cum alibi passim, tum verò in iis qui à febre obsurduerunt. Est enim surditas signum terrificum aut salutare, vel potius desperatæ salutis aut sperabilis; prout iure & loco apparet; aut contrà: sicut in hac prognosi docetur.

QUÆ POST EXIGUAM HÆMORRHAGIAM] Quæ huiusmodi est copia & exeundi modo. Hic enim τὸ βραχὺ ἀπὸ τοῦ μικροῦ vsurpatur, cui opponitur τὸ πολὺ. Nam liberalis erit hæmorrhagia, quamvis exigui temporis, si affatim & cumulata sanguis prorumpat: sicut & ὕδατα πολλὰ quæ breui spatio densis pluunt nimbis. Contrà brevis erit & pauca diuturnior in substillio. Est autem huiusmodi quando humores maligni & multi naturæ imperio non reguntur: aut quando natura diuturna oppressione victa fatiscit: vt in iis qui à mixto comate sanguinis habent substillum, de quibus illud extat, μικτὴρ ἀποστῆζωρ ὁλέθριος, i. naris referatio mortifera.

ET NIGRORVM DEIECTIONEM] Qualia sunt διαχωρήματα πύλας ἀποεξιδώδεια, in quibus siccitas magna & ardor prægrandis, quo viscera & intestina conflagrant; vnde atra bile in totum fucatur. Pertinet enim illud ad eruendam, quasi è tenebris, huius prognoseos veritatem. Κοιλίᾳ ἀπολεαμένην, σμικρὰ δὲ ἀποεξιδώδεια πρὸς ἀνὰ γλῶττιν χαλῶσαι, μικτὴρ δὲ τῷ στόματι ἐρηγνόμενος ἑσπών. i. suppressa aluo, nec nisi pauca quadam pilulata coactio reddente; fluxus è nare malus. Omnino enim quibus ita exaruerunt interanea, nulla excretio quantumvis critica potest videri salutaris. Atque illam prognosin particularem Galenus ad hoc theorema catholicum reuocauit.

SURDITAS VENIT] Vel impedito appulsu τῷ ἀκουσῶν, vel exoluta virtute τῷ ἀκουστικῷ; labefacta scilicet parte illa cerebri vnde vis audiendi manat.

MALVM] Ac si diceret; quamuis ex surditate, cum scilicet aures obsurduerint, cum grauitate capitis, hypochondrij tensione, & splendoris offensione; quamuis, inquam, ex ea surditate affletur veluti quædam aura salutis, quatenus hæmorrhagiæ prænuincia est: tamen ex ea sperabilis nulla salus potest videri, cum nigris ac veluti caprarum pilulis coacta descendit aluus. Ipsa verò surditas futura fugax, firmiter fixa manet, vt cætera omnia hæmorrhagiæ signa: quoniam exolui non possunt, propterea quæ malis complent ægrotum. Et quæ primùm fuerat ab oppilatione nata meatus auditorij, succedaneam adfert causam surditatis funestæ quæ in virtutis ipsius audiendi exolutione consistit. Solenne est illud. surditas morbi acuti turbulentique consecraria; graue est malum. Hic autem scripsit. IN ACUTIS] Quorum excursus perfectam adfert læsionem auditus, quæ surditas nominatur, aut fugax, aut stabilis, quæ illum habet euentum secundi aut sinistri iudicij, quem ipsa μετέπλωσις vel ἐπιπλοή, iure & loco, secusve facta denunciat.

IBI DEIECTIO SANGVINIS PESTIFERA EST] Etenim si post nigrorum deiectionem aluus, quæ paulò antè non nisi coacta reddebat, nunc iniussa feratur proluuie quadam prærubra, mortem subesse testatur: ob eam sanè causam quòd talis deiectio symptoma est visceris exoluti, planèque effœti tum in coquendo, tum in distribuendo: quemadmodum exacta nuper nigrarum ac veluti pilularum capræ coacta deiectio, visceris & intestinorum incendio conflagrantium. Est autem mortifera omnis quæ alterationem diuturnam & vehementem excipit alienatio partium quarum officio vita carere non potest.

SURDITAS AVTEM TOLLIT] Verissimum quidem illud est. In febre surditas aluum sistit: sed ea surditas aluum sistit quæ incidit sine πρὸς αἶμα vt echus aut bombi; tum ea quæ in oppilatione meatus consistit, vnde prohibetur appulsus τῷ ἀκουσῶν; non in vitio principij, facultatisque ipsius. Hæc surditas aluum sistit non ratione sui, sed causæ suppressam aluum cientis. Est autem hæc, bilis excursus sursum ad caput. Quæ causa est etiam vt quemadmodum biliosæ deiectiones obducta surditate subsistunt: sic ipsa surditas exoluatur aluo prorupta biliosis excrementis. Sic in Heropyto surditas lenibat dolorem ischiadicum: sicut reuerso dolore redibat audiendi libertas. Sed hæc vicissitudo locum habet in anadrome & palindrome humorum sua sponte, aut etiam dominatu naturæ inclinatorum, non autem in vitio partium effœtarum. Non enim sperabilis est proluuiei prærubræ sursum translatio quæ surditatem obducatur, aliave pariat repleti capitis symptomata, aut cataphorica, aut paraphorica, aut cephalagica, aut catarrhoica.

7 Οἷον αἱμορραγίαν πλείους, περιόντος χρόνου κοιλίᾳ πονηρόνται· καὶ μὴ ἔρπον πέπον ἔλθῃ. ἀεὶ γὰρ τὰ οὕρα ὑδατώδεια, τοιοῦτόν τι σημαίνει;

Quibus hæmorrhagia profusior est, labentibus inde diebus labefactantur alui, nisi urina cocta reddatur. An verò aquosa quippiam tale denunciat?

EST QUIDEM

EST QUIDEM commune symptoma profusioris hæmorrhagiæ, tum iniussæ, tum iussæ, cruditas alui multum in officio laborantis atque quodammodo fatiscientis. Atque huius cruditatis causa firmiter fixa in complexione, temperamento, & habitu alui partiumque naturali œconomia dicatarum; non ita pridem literis mandata fuit.

QVIBVS HÆMORRHAGIA PROFUSIOR EST] Vndecunque sanguis profluxerit, vel affatim & cumulatè parumper, vel etiam diu multumque per vices; fuerit autem vel iniussa vel iussa hæmorrhagia per liberalem & nimiam sanguinis detractionem, qualis à carnifice non raro præscribitur.

LABENTIBVS INDE DIEBV] Vel exacto morbo ad quem præscribitur sanguinis vacatio, vel in quem incidit sponte sua. Est enim *περίων χρόνος* tempus succedens; in anno quidem, ver hyemi, veri æstas, æstati autumnus; in morbi historia quatuor morbi tempora; in diebus criticis quaternarij sex ante vigesimum, septenarij ante quadagesimum, vicenarij ante centesimum: in constitutione autem corporis & naturæ, prima quidem secundæ valetudinis; altera verò ab incunte morbo ad statum; tertia ad discessionem; & inde quarta ad pristinum naturæ statum, & secundam valetudinem qua ægrotus frui solebat. Ex quarum rerum distinctione ratio diatæ initur.

LABEFACTANTVR ALVI] In vitio sunt laborantque, vel etiam fatiscunt in officio coquendi, excernendi, & distribuendi; tum propter paupertatem caloris natiui, tum propter mutationem propriæ complexionis, temperamenti & habitus ex diuturna officij vacatione, vnde siccantur, collabuntur, & sui negligentes redduntur.

NISI VRINA COCTA REDDATVR] Quod signum est syllogisticum bene constitutæ naturalis œconomia in coquendo, distribuendo, & excernendo.

AN VERO AQVOSA QVIPPAM TALE DENVNCIAT?] Sanè quidem quæ cibo & portioni est concolor ex cruditate primæ & secundæ coctionis. Nam sæpe fertur aquosa, translatione, derivatione, aut etiam suppressione bilis. Quæ causa est cur de aquosis vrinis quæstionem haberi velit Hippocrates cum ait, *ὅρα ὅτι ἔρπον ὑδατώδεα οὐκ ἔστιν*, i. *considerandum quod vrinæ fuderunt aquosas*. De dysentericis autem agit. Cum enim multæ sint causæ talium vrinarum; ex earum causarum perspicacia intelligemus quæ spem salutis adferant, aut metu exterreant.

8 Οἷον ἔστι αἰμορραγία λεῖρα, πυκνῶς, μὲν δὲ συχνὴ διαχώρησις, ἔστι δὲ αἰμορροὶ ἔτοι, κοιλίας ὀδυνώδεις· ἀμα δὲ ὑπὸ φύσειν βύφοροι. ἄρα οἱ τοιοῦτοι ἐφιδρῶσι πολλοῖσι ψυχροῖσι; Τὸ ἀνατελεσμένον ἔρον ἐν τούτοις ἐπὶ πονηρόν, καὶ τὸ ἐφιστάμενον γονοειδές· ἔστι δὲ ὑδατώδεα οὐρέοισι.

Quibus ex crebra & profusa hæmorrhagia frequens nigrorum deiectio est, indeque suppressio; hæmorrhœici sunt hi cum alui dolore: sed tamen cum flatibus patientes doloris. Etiamne sic affecti sudatiunculam habent frigidorum multorum? Ibi tum perturbata vrina non est praua, nec verò id quod residit simile genitura: ut plurimum autem meiunt aquosa.

HIC EST complexio symptomatum omnium quæ profusioris hæmorrhagiæ consecutaria esse possunt. Quæ omnia cuiusmodi sint, & quamobrem quorsumve appareant, faciam sanè quantum potero ut primum ipse complectar animo, deinde scribam appositè iuxta mentem ipsius authoris.

Ergo. QVIBVS EX CREBRA ET PROFVSA HÆMORRHAGIA] Crebra quidem ex perenni ad caput anadroïne sanguinis tenuissimi multa bile perfusi anagogen habentis per anastomosis venarum quæ sunt ad imam frontem. Profusa autem, tum ab orgasmo, tum à repletione particulari, tum à forti naturæ contentione, ac debilescentibus continenter extrinis venarum oris.

FREQVENS NIGRORVM DEIECTIO] Non quidem pilularum veruccinarum atra bile fucatarum. Nam talia nigra non nisi aluo coacta redduntur. Non etiam bilis atræ quam genuit bilis æruginosa viscerum incendio perusta; neque enim talium nigrorum frequens deiectio esse potest sine intestinorum ulcere insanabili & implacabili. Sed frequens nigrorum deiectio est, velut sanguinis tabique; ut ita dicam, admodum nigri; quæ vocat Hippocrates *ποχρημάτα μύατα ἰόντα*, i. *quæ continenter non affatim & cumulatè, sed pigro lapsu feruntur*, quorum explicatæ sunt causæ ad illam prognosin. Ab hæmorrhagiâ, nigrorum deiectio; *grave est malum*. Itaque nihil necesse est de nouo illas in tam recenti memoria commemorare.

INDEQVE SUPPRESSIO] Quiescente scilicet hæmorrhagiâ, nec ita fatiscente vi retentrice visceris laborantis.

Coac. 2. cap.
12. lib. 2.aph. 21. 27. 23.
24. lib. 4.

aph. 25. 4.

aph. 24. 4.

aph. 11. 4.

Coac. 46.
lib. 1.Coac. 5.
huius cap.

aph. 37. 4.

HÆMORRHOICI FIUNT HI] Non quidem prorupto è naribus sanguine, sed ad inferas partes ducto, & hæmorrhoidas faciente; non secus atque *dolorifica in lumbis mala sunt hæmorrhoida*. Hæmorrhoides autem sunt deiectionibus nigris multo salubriores, vel ipso exeundi modo per ora venarum quæ sunt in extrimis oris τὸ ἄκρον. Atque salubritas hæmorrhoidum commendatur in iis qui iure habent, non autem ab ipsis habentur. Atqui iure habent omnes qui natura & valetudinis cura, τὴν φύσιν καὶ τὴν ὑγίαν, sunt melancholici. Damnantur & in vitio semper sunt deiectiones nigræ, quæ sponte sua, ut dictum est, pigro lapsu exeunt. Quæ causa est cur patefacta omni calamitate nigrarum deiectionum quæ variz sunt atque multiplices; tandem ita noster præceptor fanciuerit de inferis hæmorrhoidis. ἡμὲν δὲ οὐκ οἶον ἀπὸ τῆς κακίας καὶ τοῦ δὲ ἀκαθάρτου τοῦ σώματος ἵνα προέλθωσι. I. Sanguis supernè quidem qualiscunque, malus; infernè autem bonum est nigra deieci. Ac si diceret; ut omnis hæmorrhagia iure & loco per nares prorupta, salutaris: sic hæmorrhoides conuenienter ductæ sanant & arcant grauissima quæque mala. Et contrà; ut omne sanguinis profluuium, cuiusmodi tandem sit, per os, terrificum est: sic etiam omnis quæ per intestina ducitur nigrorum deiectio, calamitosa, ne dicam mortifera, esse solet; tum per se, ut signum; tum ex euentu, ut causa. Nam *dysenteria quam facit bilis atra, lethalis*.

CVM ALVI DOLORE] Quem facit distensio ab humorum & flatuum suppressione, vel feri biliosi, ex particulari lumborum repletione ad ventrem prorepentis, & ad stomachum ipsum, feritas & acrimonia.

SED TAMEN DOLORIS PATIENTES REDDUNTUR FLATVVM EMISSIONE] Qua nihil optari potest à medico quod ipse malit, ex eo quod intestina peristaltico motu naturali mouentur supernè deorsum: deinde verò quòd inde significatur vacuitas intemperiei heclicæ frigida intestinorum tenuium, vnde continenter gignitur τὸ πένθος φροσύνης quod exitu caret, tandemque facit hydropem siccum. Ex quo efficitur verum illud esse quod alibi iam demonstratum est. In febribus, alui inflata, si flatus non exit; graue est malum, ut signo & causa. Nam ventris inflatio stabilis, cum febre coniuncta inde sanè adest vnde abesse debuit. Scitum est illud. Quibus hypochondrium è dolore laborat, inflammationis expers; ijs superueniente febre, dolor exoluitur: incidendo, tenuando, & ad temperationem reducendo; siquidem inflatio nata sit vel ab oppilatione, vel spiritus flatulenti collectione, vel ab intemperie frigida.

ETIAM NESIC AFFECTI SVDATIVNCVLAM HABENT FRIGIDI EXVDANTIS:] Sanè quidem, quibus ex profusa & crebra hæmorrhagia, nigrorum perpetua deiectio est, nec loco subsistit, nec hæmorrhoidum successio est, manetque ab inflatione alui prærumida vnde intereunt nigris prædeuntibus. Sed & frigidorum ἐφιδρωσις mortem in propinquo esse denunciat; tum propter exhaustum nectaris viuifici; tum propter exolutionem partium solidarum, & vitalis principij, in quorum virtute natura ipsa consistit. Est enim raturum illud de frigida ephidrosi; quòd in mitioribus morbis, idque per injuria, ad diuturnitatem apparet; in acutis verò ad mortem.

IN HIS PERTVRBATA VRINA NON EST PRAVA] In hac syndrome est σπύγξις, i. confusio sententiarum de signis atque symptomatis crebræ & largæ hæmorrhagiæ. Nam quibus ex crebra & larga hæmorrhagia, nigrorum deiectio est, eundem sanè omnes non habent euentum. Quibus enim sistitur, & hæmorrhoidi inde fiunt, cum alui dolore, cuius patientes redduntur flatuum emissionem, iis vrina perturbata & genituræ similis, fortasse non erit praua. Iis verò quibus exudar frigidum, nulla salutis aura potest afflari. Ergo non in his qui sudatiunculam habent frigidorum, vrina perturbata, omni carebit prauitate: sed in illis qui subsistente nigrorum deiectione fiunt hæmorrhoidi. Nam si vrina sit eiusmodi ut nunquam residat, ex cruditate & prauitate à flatulento spiritu, cum calore contra naturam, quid boni adferet desperatis, quæ in incipiti morborum exitu mortifera esse solet? Sin autem eiusmodi sit inclinatio pepasmo, quæ apparere poterit in quibus vires effectæ languent?

9 Οἷσιν ἐκ ρινῶν ὀπὲ καὶ φώσφι καὶ νωδρότητι μικρὰ δόποσάδῃ· ἐχέει δὺσκολον. ἔμελος τούτοις συμφέρει, καὶ κοιλίης ταραχή.

Quibus ad surditatem atque torporem substillum accedit narium; si aliquid præ se fert mali. Profuerit autem hos vomere, aluique turbari.

Coac. 12. cap.
3. lib. 1.

OMNIA quæ apparent signa fatiscientis naturæ ex forti oppressione, cum ipsa per se terrifica, tum verò mortifera si magis exoluatur. Huiusmodi est substillum sanguinis quod ipsum per se metu exterreret, ut omnis iudicatoria causa exigua, ac mortem subesse testatur in sanguine prauo: maximèque si fractis naturæ viribus elabatur, ægrotis quartum morbi diem agentibus. Er quoniam prognosin hanc explicauimus comment. ad illam iisdem verbis iam pridem exaratam; præstiterit cogitationes nostras contrahere, quàm disputatione longa distrahere.

Ergo. **QVI BV S]** Acuta febre laborantibus, idque fortassis ardentem.

AD SVR DITATEM] i. Auditus interceptionem vel priuationem; illic quidem, ab oppilatione meatus qua impeditur appulsus τῶν ἀκουστικῶν, quæ surditas in febre alium sistit, quando incidit sine αἰτίᾳ, i. præiudicia echus vel bombi; hinc verò ab exolutione principij & facultatis: labefactata scilicet parte illa cerebri vnde vis audiendi manat.

ATQVE TORPOREM] i. Segniciem, ac veluti quandam *πάρεση* vniuersi corporis, quæ initio quidem morbi, symptoma est vitium oppressarum, madefacto neruorum principio, vt in tempestate austriana, & paroxysmis febrium pestilentium; prouecto autem morbo, symptoma virium effectarum, & principiorum ab exhausto laborantium, cordis & cerebri.

SVBSTILLVM ACCEDAT NARIVM] Siue stillicidium sanguinis guttatim & pigro lapsu euntis; ob eam sanè causam quòd natura dominatu suo non tenet malignos & multos humores; aut quòd ab iis diu multumque oppressa, tandem fatiscit.

ALIQVID PRÆ SE FERT MALI] *Εξ η δεικνόν*: humilis nimium est enunciatio in re tam grani rāmque difficili & periculosa, vt iam sæpe annotauimus. Nam *η δεικνόν*; authore Galeno, leue proth. 49. l. 3. l.
 10 malum ostendit: fortassis etiam contumacius. Præterea illud, *η*, vel affectionis perexiguæ nota est, vel rarò incidentis: quemadmodum rectè annotauit Galenus ad illud prorrhæici. *Lumborum dolor cardial-
 gico, cum excreatione violenta; nonnihil præ se fert conuulsificum.* In substilllo autem sanguinis cum torpore & proth. 74. l. 3. l. & Coac. 15. cap. 12. lib. 2.
 furditate, quis medicus toto corpore non perhorrescat, omnibûsque artubus præ metu non contremi-
 fcat? Est quidem substillum sanguinis ipsum per se, vt iam dixi, terrificum & sinistra admodum crisis, vt docetur illa prognôsi. *Perexigua stillicidia mali sunt ominis*: idem cum torpore & furditate *ἀλέσθων*, vt Coac. 62. l. lib.
 ait Galenus, i. mortiferum atque funestum. Sed excusatio esse potest enunciationis ironicæ, aut certè cuiusdam sarcasmi.

PROFVERIT QUIDEM HOS VOMERE, ALVOQVE TURBARI] Sanè quidem, si natura ab oppressione laboret in officio excernendi; vel potiùs profuerit sanguinem incisa vena de-
 20 trahere, vt affectioni *πληρωμένη*, i. à repletionem propria vacuatio præscribatur; vel etiam profuerit hæmor-
 rhagiam cire, foru & lotionem capitis: sicut in Metone Hippocrates facitauit. Sed fractis iam viribus,
 & collapsis naturæ præsiidiis, nulla esse potest vacuatio salutaris: sed contrà ægrotum potiùs ad exitium præcipitat, facitque vt celerius opinione moriatur.

10 Αἱ ἐν ἀρχῇσι μεγάλαι αἱμορραγίαι, ὡς ἐν ἀνακομιδῇ κοιλίας κα-
 τὰ φύσιν.

30 Quæ circa initia profusa sunt hæmorrhagia; in refectione aluos pro-
 fusè cient.

VNDÈ NATVRA com meatum parat, quo se tuctur & sustinet, inde eo defraudata labascit. Com-
 meatum parat ex sanguine, cuius copiam abundè suppeditat alui & iecoris bene constituta œconomia.
 Ergo defraudata sanguine labascit, ex vitio alui & iecoris; labefactata scilicet naturali œconomia in
 coquendo, distribuendo, & excernendo. Etenim geminatur opus coquendi, debilitata coquendi officina
 proprio coctionis instrumento, calore natiuo: cuius dissipationem pauperrarèque attulit profu-
 sior hæmorrhagia. Atque ita nō est par necessitati commoditas, proindèque inde labascit natura vnde
 40 com eatum parare solebat. Et quoniam prognoscos huius veritas non ita pridem patefacta est demon-
 stratione *φαῖλι καὶ φόνιν καὶ καὶ νόμον*; sufficit hoc loco explicare propalam, quidnam illud sit, & quamob-
 rem scriptum. CIRCA INITIA] Quid enim? an non idem faciet liberalior hæmorrhagia prouec-
 to iam morbo? Sanè quidem, sed ideo posuit *circa initia*: quoniam morborum acutorum initia ferè
 sunt crebra metaptoisibus & orgasmis, quod annotauit Galenus comment. ad illam prognôsin. In phre-
 niticis; quæ ineunte morbo symptomata sunt quæ satis *ἐν* crebrò huc illuc cientur; calamitosa sunt. Sic autem ait proth. 18. l. 1. l. & Coac. 97. lib. 1.
 Galenus. Cernuntur, inquit, morborum initis crebra symptomatum successiones, non autem cùm iam processerint,
 atque illas fieri verisimile est in affectionibus quæ in nimia humorum abundantia aut prauitate maligna consistunt,
 indeque adeo varios huc illuc cieri motus in partes principes, vnde corrumpitur *τὸ ὅπλον* acutorum morborum. Er-
 go quæ ab orgasmo & præpropere metaptois, morborum initiis cietur hæmorrhagia; haud faciliè mō-
 50 dum seruabit, aut retinebit moderationem quantitatis: quemadmodum illa quæ iure & loco, duce na-
 tura, critica lege suscipitur atque perficitur. At tam immoderata rāmque effranis hæmorrhagia *περὶ αἶμα
 κομιδῇ*, vel, vt idem loquitur in aphorismis, *ἐν τῇς ἀνὰ φύσιν*, præhumidas reddit aluos, facitque vt liqui-
 dis excrementis ferantur: propterea quæ ipsas *πονηρεύεται* non ita pridem scripsit, quod est, in vitio esse,
 vel potiùs labefactari: causæ sunt illic *ἀδύναμις* explicatæ. aph. 27. 4.

II Τὰ ἐν ῥινῶν λάβεα βίη δὲ πολλή φέρει, ὅτιν ὅτε σπασμὸν ἴηκα-
 λῆται φλεβοτομήν λυεί.

60 Profusa narium hæmorrhagia vi suppressa, nonnunquam adducit
 conuulsionem: sanat autem detractio sanguinis phlebotomia.

VVLGI opinio est, profluuium sanguinis ad interitum esse fatale: quoniam in sanguine focus

est vitæ. Quæ causa est quamobrem vulgo sistendi consilium sit quotiescunque sanguis protumplit, vel etiam cum substillio exit. Quàm conuenienter & rectè id fiat, docetur in hac prognosi.

PROFUSA NARIVM HÆMORRHAGIA] Qualem demonstrauimus sæpe cieri circa initia peracutorum morborum, ab orgasmo & præpropere *μετέπειτα*, i. *transiione* sanguinis copiosi multa & maligna bile perfusi, vnde repletio cerebri & fortis naturæ proritatio ad excernendum: qualis etiam potest accidere à prægrandi naturæ contentione quæ multò plus mouet ciérque proritata nimium, quàm inhibere possit, vnde *εὐφροσύνη*. Verba Galeni hæc sunt. *Patet oppressam copia sanguinis naturam excitatam fuisse ad excernendum; quod quia cum mediocritate obtinere non potuit, vocatam medicus fecit hypercrisim.*

proth. 33.
L. 3. 1.

VI SUPPRESSA] Non autem retractione rheumatis concitati, sed violenta repulsione per ea quæ Græcis dicuntur *ἀποκρητικά*, pittacia, motaria, perfusiones, & epithemata fronti, cernici, capitiq; admota, & in nares immissa.

NONNUNQUAM PROVOCAT CONVULSIONEM] Non ipsa quidem hæmorrhagia cumulatè prorupta, quæ potius parit exolutionem, *ἐκλύειν*, quàm spasmum siue conuulsionem: sed hæmorrhagiæ ipsius per ea quæ repellunt repentina suppressio, cuius plethoricum symptoma est ipsa conuulsio: plethora autem sit resluente sanguine ad partes propinquas & socias eius vbi fluxio inhibetur & sistitur. Atque vt hæmorrhoidium inconsideratè suppressarum, aut iure & loco non profluentium symptomata ferè consecutaria sunt tabis, melancholiæ, scirrhi, cancri, & elephantis, atque hydropsis: sic narium sanguis repulsus in cerebrum, conuulsionem & epilepsiam adducit. Hippocratis illud est. *Qui statim temporibus sanguinem fundunt, si non profundant, epileptici sunt.* Quæ causa est cur summus præceptor omnino repellentibus interdicens putarit ad inflammationem frontis arcendam, cuius ipsa sola est capax & particeps in tramatè capitis, sed lenientibus & anodynis vtendum censuerit.

proth. 39.
L. 3. 1.

SANAT AVTEM PHLEBOTOMIA] Retrahendo scilicet rheuma concitatum, & detrahendo consistens, incisa humeraria brachij *κατ' ἴκιν* partis conuulsæ: quoniam plethoricæ affectioni debetur propria plethora vacuatio. Est autem sanguinis detractio è propinquo.

12 *Ενδεκαταίοισι σαΐεις δίσκολοι· ἄλλως τε κ' ὡς δις ἡμισάξῃ, ἢ ὡς ἡμισάξῃ.*

Vndecimum diem agentibus substillæ sanguinis mala sunt: idque cum aliàs, tum si bis fiat, & redeat.

ENIMVERO res malè gestæ accessionem calamitatis adferunt, faciuntque vt ægri peiore sint loco, si rerum ipsarum malè gestarum causa sit & occasio, naturæ irrita & inanis contentio, quando certamen ipsius & morbi est in procinctu. Præstat enim naturam quiescere, quàm aliquid frustra moliri: ob eam sanè causam, quòd omnis irrita proritatio morbum alioqui sanabilem, ex euentu reddit insanabilem, aut certè sinistri iudicij. Sanè in substillio sanguinis res malè geruntur: quoniam noñ est potens natura nimix abundantix, qualitatique malignæ; aut quoniam victa iacet diu multum, & ne oppressa: pessimè autem geruntur quoties ab erethismo critico, morbi & materix dominatu res eunt, nec magisterio naturæ reguntur; idque cum aliàs, tum verò diebus criticis quibus fiunt ephodi & insultus. Ex illa enim proritatione irrita, fit acrisia cum accessione grauiorum malorum, maximèque si crebrò incidat illa priori similis proritatio, non secus atque rigor quisæpe in morbis acutis frustra cietur; ex cuius concussionem incredibile dictum est quàm multis & grauib; damnis obruantur ægroti. Sed hæc sunt alio loco fusiùs disputata. Quinetiam de substillii calamitate satis iam multa diximus. Quæ cum ita sint.

VNDECIMUM DIEM AGENTIBVS] Vndecimum quidem ab historia, septimum à *προσέτι*, i. *addimento*: qui finis est primarum periodorum quibus hæmorrhagia significatur atque excipitur, cum in febribus ardentè acutis, tum verò in viscerum phlegmonis per systrophem natis à rheumate concitato. Iraque die vndecimo, exactis tribus quaternariis ab historia, vel duobus ab ipsa prosthesis, quæ sunt periodi insultuum fortiorum ad ciendam excretionem liberam & liberalem, qua morbi acuti solent exolui.

SUBSTILLA SANGVINIS] Quibus guttatim pigro lapsu & parca manu sanguis exit, ab irrita contentione naturæ die vndecimo proritata.

MALA] Vt omnes iudicatoriæ causæ exigux: quia nihil paucum est criticum nec critica lege factum: sed exeundi modo multum exteret medicos ob nimiam abundantiam, qualitatèque malignam, potissimum die critico quo signa omnia iudicatoria non iudicantia, firmissima esse solent ad in-eundam prognosin. Nam in peiores abscessus conuersio fit, quæ vel doloris acerbiterem, vel acrisiam, vel diuturnitatem secum adfert. Desperationem verò salutis ostendit, ac citam mortem iamiam venturam denunciat sanguinis è nare substillum, si præter incommoda paucitatis exitus, atque temporis; accesserit quoque prauitas qualitatè, cuiusmodi cernitur in sanguine prorsus mero.

IDQUE CVM ALIAS, TVM SI BIS FIAT] Quò enim sæpius frustra proritatur natura, èstque irrita eius contentio & inanis; eò peius est ægro. Secus fuit Larissæ virginis, quæ post crisiñ etià sanguinis copiam profudit. Secus Metoni, de quo idem narrat quod de Larissæ: sed tamen pessimè illi fuisset,

illi fuisset, cum bis die quarto substillum sanguinis habuisset, nisi diuina Hippocratis arte per fortum capitis, die quinto liberalior hæmorrhagia prorupisset.

13 *Ἐπὶ αἵματος ῥύσι πολλοῦ, ἢ λυγμοῦ, ἢ ἀσπασμοῦ κακόν.*

Si largo sanguinis profluvio supervenerit convulsio aut singultus mortiferum.

10 QVICQVIBUS eiusmodi est ut propagatione & continuatione *ὑπερπλοῦτος*, aut etiam traumaticæ fluxionis, pro exolutione quæ propria esse solet profusioris hæmorrhagiæ, convulsionem adferat; mortiferum est atque funestum. Sed præstat in enarratione philologiæ, ipsam philosophiam aperire.

SI LARGO SANGVINIS PROFLUVIO] Quod fecit gargalisimus sanguinis incunte morbo effera bile perfusi, aut fortis naturæ contentio in repletionem particulari, unde *ὑπερπλοῦτος*; aut etiam venæ vel arteriæ in trêmâre sectio, siue erosio.

20 SUPERVENERIT CONVULSIO] Non quidem primò & per se ab hæmorrhagiâ nimis affatim & cumulatè prorupta, cuius proprium symptoma est ipsa exolutio, teste Galeno ad illam pronæsin. *Quibus hæmorrhagiâ largâ vi sistitur*, &c.: sed ex euentu quando in cerebrum refluit sanguis unde manabat, venis laborantibus ab exhausto, indeque succum alibilem reposcentibus à nervis quem ipsis nutriendi causa impertiverant. Est autem convulsio nervorum symptoma, præ siccitate nimia contractorum. Ac nimia siccitatis causa est succi affluentis defraudatio, affixi valida ductio à venis exhaustis.

AUT SINGULTVS] Ventriculi inanis convulsio, aut etiam convulsio quædam quam facit tunicarum ab inanitione contractio. Nam venulæ arefactæ prorsus exhauriunt quicquid erat in aluo humidi primigenij & succi assimilari, faciuntque ipsam ad singultum famelicam. Nam de singultu & causis ex quibus variè concitatur, satis iam diximus suo loco.

30 MORTIFERVM] Doloris acerbitate, viuifici nectaris dissipatione, & humidi primigenij seu viucitatis exhausto, quæ succum & facultatem non habet reficiendi sui. Quo fit ut omnis ab inanitione convulsio mortifera sit atque funesta, collapsis naturæ præsidij ab exhausto partium solidarum, quarum quidem virtus est ipsa natura; ut interim præteream trium principiorum *ἐκλυσι*, facultatūque non solum in officio laborantium infirmitatem, sed etiam priuationem unde cita mors venit. Ergo quicquid eiusmodi est ut pro comæatu quotidiano exhauriat partes solidas omni succo alibili, quod ipsum declarat convulsio; mortiferum est. Huiusmodi est hæmorrhagiâ convulsifica, quæ vel ipsa exolutione primū & per se ad mortem præcipitat, proindeque multò magis ad convulsionem usque progressa, desperabilem facit vitæ salutem.

14 *Τοῖσιν ἕως ἐπὶ τῶν ἐβδόμων δυνάμιν ἐχόντων μὲν ἀγχοίης, καὶ τούτοις πνεῦμα ἀλυσόμενον ἐν τοῖσι ὁδοῖσι, καὶ γῆς ἐπιθυμίᾳ αἱμαὶ φθορῶν καὶ ἐκλυσὶν σημαίνει.*

Quibus ad septimum usque annum vis lucet multum fœdatis, cum anxio spiritu progrediendo, & terræ concupiscentia; sanguinis corruptionem & exolutionem significat.

50 HÆC PROGNOSIS *πεμνόμεν* aperit vacuandi purgando & sanguinem detrahendo. Nam signa continet syllogistica repletionis & cacochymiae, quibus debentur; illi quidem phlebotomia; huic autem purgatio: quia non potis est aliter medicari. Talis enim cacochymia pepasum non recipit, facitque ut corpus impurum quò magis nutritur, eò grauioribus damnis augeatur. Hinc rerum alui malè gestarum cōsecraria esse solet vasorum impuritas, quæ facit ut partes suo genio defraudatæ sint frigidae, mactæ, & fœdi coloris; ipsa autem vasa appareant multo distenta sanguine. Sed ipsa *πεμνόμενα* cuiusmodi sint unde inquit *πεμνόμεν* bene & conuenienter medendi, suis quæque locis explicabuntur hoc modo.

QVIBVS] Omnis naturæ, sexus, ætatis; quorum corpora in vitio sint vel gentilitio, vel à diara in victuratione & vitæ instituto: sed præsertim pueris quorum morbi *καὶ πύττοι, καὶ συγχεῖς, καὶ ἐπαιζῶς*, i. nutriti, & congeniti, & con crescentes, ad septimum usque annum, & ad pubertatem protrahuntur & producantur. Qualem morborum in pueris diurnitatem Hippocrates commemorauit his verbis. *Puerorum morbi iudicantur quidam quadraginta diebus, quidam septem mensibus, quidam totidem annis, quidam ad iuuentutem producantur.*

AD SEPTIMUM VSQUE ANNUM] Ad verbum, ad septimos annos, vel ad septimum quemque annum, pueritiæ, adolescentiæ, pubertatis, iuuentutis, constantis ætatis. Nam de senectute hoc non ausim dicere. Etenim illud *ἐπὶ τῶν ἐβδόμων* idem planè significat quod in aphorismis legitur de diebus criti-

part. 1. sect. 3.
6. Epid.

part. 23. sect. 3.
6. Epid.

aph. 29. 3.

aph. 23. 2.

cis, ἡ ἑβδόμη ἡ τετάρτη ὁδὸς, i. septimi est quartus index. Sunt enim septenarii dies, septimus, decimus, quartus, & vigesimus; quorum indices numerantur; primi quidem quartus; secundi vndecimus; tertij decimusseptimus: vt verè sic explicari debeat aphorismus. *Septenorum quartus est index.* Sic & hoc loco sic enuntiandum. *Quibusunque ad septimum annum viget morbi.* Vt enim morbi acuti qui celeriter, continenter & vehementer mouentur, intra secundum septenarium iudicantur, iudèmq; ex irrito erethismo, acuti naturam amittunt, nomen tàm retinent, & ad quadragesimum vsque diem producantur: sic morbi natura diuturni, per vicenarios tantum à quadragesimo subeunt naturæ insultus, quos ἐπιδόας Græci vocant. Atque illorum diuturnitas in pepasmi difficultate consistit; pepasmi autem difficultas in humoris morbifici contrumacia & erethismi vacuitate. At verò qui morbi sunt diuturni ex vitio gentilitio vnde συγγενής nominantur, & ex vitiata complexione & temperamento, principiorum facultatumque ignauia; nō nisi ætatis successione curationem recipiunt: quoniam ætatum successio mutationem adfert complexionis, temperamenti, & habitus. Atqui ætatum successio cadit in septenarios annos. Sic puerilis epilepsia per ἐκλαμψιν, i. splendorem caloris natiui quiescit: ἐκλαμψις autem lucet in pubertate & adolescentia. Quamobrem verè subiunxit præceptor. *Quicumque manent affectus, nec aduentu pubertatis saluantur, aut mulieribus menstruorum profusio; longius producantur.*

part. 5. sect. 1.
6. Epid.

VIS LVCE[?] Διῶμαν referre possum ad malam valetudinem quæ lucet splendetque ad septimum vsque annum in signis & symptomatis mox explicandis. Possum etiam commemorare principiorum robur quod lucet in facultatum virtute ex copia & abundantia caloris natiui quantumvis obruti cacochymia, qua tandem euicta triumphatæque, sopiti fuscitantur ignes atque dant clara incendia lucem: vt verè illud videar esse dicturus, idem valere commemoratam hoc loco διῶμαν, quod ἐκλαμψιν, per quam solam pueros diuturnis morbis defungi, vt epilepsia, Hippocrates author est.

MVLTVM FŒDATIS] Omni genere fœdi coloris. Hic enim ἀργαία tollit in totum colorem genuinum quem veteres nominarunt χλωρότητα λαμπρὴν, i. colorationem decoram & viridem, vnde viuacitas planè ostenditur. Erit igitur contraria τῇ εὐχολίᾳ, ac genus omne continebit fœdi coloris ἀποχρωμαδαιών, ἐρυθροχλάρων, ὑποχλάρων: cuiusmodi sunt icterici pallidi siue ὑποχλοῖ, leucophlegmatia, turgiduli, subuirides, virulenti, vironigri; denique omnes qui natiuum colorem decorumque amiserunt: cuiusmodi sunt virgines fœdo liuore, atque, vt ita dicam, virulentia nigra fœdata. Atque ea decoloratio & defœdatio stabilem & fixam habet in naturalis œconomia vitio causam. Vt enim ventris ignauia & deprauatio, atque corruptio chyli, parit vasorum impuritatem, vel, vt interpretatur Galenus, μολυσμὸς πλεονέξιας, i. prauorum humorum nimiam abundantiam: sic illa superfluitas prauorum humorum qui sunt eiusmodi generatione & corruptione, defœdationem & turpificationem adfert cutis ipsius. Et enim τὸ χρώμα ὁμοίον τῷ χυμῷ, ὅτι καὶ ἀμύπητος ἐστὶ, i. coloratio similis est humorum refluxus expertum: quoniam consentaneum est vt alimento similis color cluceat.

CVM ANXIO SPIRITU PROGREDIENDO] Quid sit ἀνύστανον πνεῦμα, quamuis nusquam alibi legatur apud Hippocratem, per analogiam verbi ἀνύειν completi oportet, vt sit respiratio qualis cernitur in virginibus virulentia nigra fœdatis, quæ si aliquousque progrediatur, vel breue alioqui spatium conficiant; deficit illis spiritus, non tam necessitate inspirandi quàm expirandi: quoniam ex nimia vaporis fumidi abundantia, maior necessitas incidit expirationis quàm inspirationis, indèque non raro fit vt vaporis fumidi occurſu elidatur spiratio in faucibus dum aër ducitur inspirando. Ac talis respiratio nominatur πνεῦμα ὀπίσθιον καὶ κατεπύην, i. respiratio tarda & velox; tarda quidem & lenta in inspirando, cita & properata in expirando: quoniam omnes partes officiales maiore contentione excitantur ad exclusionem rei molestæ, quàm ad comparisonem necessariæ.

hist. 15. sect. 3.
3. Epid.

ET TERRÆ CONCVPISCENTIA] Concupiscentiam propriè voco, non ὄρεξις: quoniam reapse ὄρεξις rerum est natura εὐποροφύτων, i. consocialium appetètia, quæ posita est in suctionis sensu. Quod si ea sensio proportionè respondeat suctioni, & suctioni vacuationi; sanè par erit necessitati commoditas, ac tantum appeteret natura bene habita stomachi, quantum ipse potest mitificare & coquere. Sin autem in vacuatione & suctione pauca, sit inexplebilis edendi cupiditas; iam appetentia naturalis & simplicis nomen mutatur in famem & κωροξίαν. Quod si diu multumque suo defraudata genio natura sit ἀπὸς impuritatem alui ostendit, qua impeditur sensio suctionis; qua etiam deprauata nascitur κίτλα; vt profusus abolita, ἡ βυλίμα, quæ nihil aliud est quàm facultatis appetitiuæ casus, vt inter κωροξίαν & βύλιμα hoc interesse videatur; quod illa sit inexplebilis appetentia sine fame, hic verò fames sine appetitu edendi. Est igitur terræ concupiscentia ἡ κίτλα, qualis fortasse videri potest in iis qui ex pariete festucas auclunt, vt in prognostico sanciuir Hippocrates ex historia quam scripsit de vxore Dealcis.

cap. 6. lib. 4.
de caus. plant.

SANGVINIS CORRUPTIONEM ET EXOLVTIONEM OSTENDIT] Hic sanguinis corruptionem cuiusmodi sit planè aperit illud quod ipsi corruptioni adiunxit. Est autem exolutio quæ dissolutam αἵματι, i. complexionem sanguinis & coagmentationem ostendit, non solum per principia connata, sed etiam per aduentitia; vt sanguis in vitio sit, non tam corruptione propriæ substantiæ, quàm mixtione alienæ, ac sit corruptio secundum quid. Ipse autem præceptor generi statim subiecit ipsius corruptionis speciem, more magnorum philosophorum. Quod Theophrastum fecisse video, vbi de mutatione specierum agit in congeneres, aut in distantes. De seminibus autem loquens sic ait, ὅτι ἐκαστος ἢ ἐκαστος, i. corruptio quedam aut egressio. Ac si diceret; egressio omnis è natura, speciei est corruptio quedam. Sicut alienatio naturæ specificæ, est perfecta corruptio. Sic & hoc loco Hippocrates corruptionem sanguinis, nominauit exolutionem eiusdem.

15 *Εν τοῖσι μακροῖσι τὰ κτ' μικρὰ ὁπφαινόμενα αἱμορρώδεια ὀλέ-
σπια.*

*Quae in diuturnis exigua apparent sanguinis velut quaedam effluvia;
mortifera.*

OMNIA quae sunt quaeque apparent in morbis, effectus naturae nuncia & exoluentia; debent vide-
ri, ut sunt, mortifera. Sic Parium νεκρός alui tandem ad interitum ceterisimo & vigesimo die morbi per-
duxit. De sanguinis autem subtillo illud praeceptum est, quod eo prius res ire denunciat, quo sapius reddit.
Causae sunt explicatae. Quod igitur ad institutam prognosin attinet, haec mihi ratio videtur enarrandi.

Coac. 12. h2-
ius cap.

QUAE IN DIUTURNIS] Quorum diuturnitas posita est in mala complexione viscerum & vi-
tio temperamenti, & qui raros & leues habent ad crisin insultus, ipsamque acrisiam crebro experiuntur
ab irritis crethismis.

EXIGUA SUPERVENIUNT SANGVINIS VELUT EFFLUVIA.] i. Quae iterato appa-
rent & fiunt. Sunt enim τὰ ὁπφαινόμενα, ad verbum, *superapparentia*, i. quae praeter signa pathognomoni-
ca & epigenomena velut foras exeuntia, manifestò se produnt: cuiusmodi sputa sunt in pleuritide, pus
in vomica, deiectiones in morbis aluinis; ex quorum qualitate, copia, & excernendi modo, significatio
20 fit rerum aut bene, aut malè gestarum in partibus vnde manant; & ex quibus argumenta ducuntur bre-
uitatis aut diuturnitatis, secundi aut sinistri iudicii. Exigua autem velut effluvia sanguinis explicavi τὰ
μικρὰ αἱμορρώδεια, quae speciem praeseferunt haemorrhagiae cuiusdam; reipsa tamen non sunt, nec copia,
nec tempore, nec excernendi modo, quales esse solent quae critica lege prorumpunt.

MORTIFERA] Ut signo & causa. Atque ut signo quidem: quoniam nihil ακρίτως bene fit, nihil
autem paucum est criticum, ac nullum substillum in bonis ducendum: quia syllogisticum signum est
vel oppressae nimium, vel etiam fariscentis naturae, & principiorum collapsorum; quale substillum hoc
loco agnoscimus, quod etiam causa mortiferae rationem obtinet: quoniam ex irrita contentione na-
tura, frustra quae tentato sanguinis profluio, maior infirmitas comparatur; ipse autem morbus vires
acquirat eundo, vnde grauiorum symptomatum accessione natura iam effecta corrumpitur in totum,
30 & ad interitum cum certa desperatione perducitur.

16 *Τὰ σκοτώδεια ἔξ ἀρχῆς αἱμορροῖν πινὸς λυεῖ.*

Quae ab initio cientur vertigines; haemorrhagia exoluuntur.

INTER commoda haemorrhagiae non in postremis illud est, quod τὰ κρίσιμα μὴ κρίνεται prohibet ef-
se mortifera, aut certe sinistri iudicii. Quae res adduxit Hippocratem ut patefacta primum & explicata
rerum criticarum crisin non indicantium nec facientium difficultate, pro exceptione omnium theore-
40 matum catholicorum tandem illud quasi miraculo apposerit, αἱμορραγία λαύραι ἐκ πινὸν ῥύοντα πολλὰ, i. ha-
emorrhagiae multae difficilia multa dissolunt. Quae causa etiam mouit Galenum ut idem exclamarit super
Metone per haemorrhagiam defuncto praeter spem morbo qui paulò antè mortiferus videbatur, non
solum symptomatis grauissimis, sed etiam signis terrificis. Sed inter omnia κρίσιμα loco non apparentia,
principatum obtinet vertigo in morbis acutis. De cuius euentu certa est illa prognosin. Quibuscumque
autem circa initia vertigo est, ὅτι καὶ τοῦ κεφαλῆς τὰ κέντρα τῆς ψυχῆς τὴν ἐν τῇ σπινθὶ τῆς ψυχῆς
4. acut. & 26.
Coac. 1. lib.

QUAE AB INITIO CIENTUR VERTIGINES.] i. Quae circa initia morborum acutorum si-
ne ulla significatione crisis (ut nulla esse potest quo tempore natura morbificis causis opprimitur, est-
que humorum cruditas) cietur vertigo. Vnde illius theorematis veritas, τὰ κρίσιμα μὴ κρίνεται ὁπφαινόμενα.
Quae sententia demonstrandi facultatem Galeno aperuit super symptomatice rigore qui ineunte cau-
50 so cietur. Sic autem ait. Tamen si enim febris ardens rigore superueniente exoluitur: tamen non aequum est, neque
deceat ὅτι καὶ ὁπφαινόμενα τὰ κρίσιμα. Ut autem catholici theorematis veritas in vertigine proposita conspi-
ciatur, nemini sanè dubium est quin vertigo iure & loco appareat in certis quarundam criseon pertur-
bationibus. Nam τὸ ὁπφαινόμενον vomitionis est κρίσιμον: sicut ἀμβλυνοχμὸς haemorrhagiae. Sed ut morborum
initia nulla crisis: ita nulla perturbatio critica esse potest. Atque ut vertigo in sperabili febris discessio-
ne, bona est: ita in febris continuatione, pestifera. Ex quo efficitur distinctione temporum & causarum,
60 de symptomatis quibusque verendum, aut bene sperandum. De vertiginis autem natura & causis haec
fuit manetque omnium medicorum firma consensus: quod ea versatur in falsa imagine τὴν φαντασίαν cui
circumrotari circumagique videntur quae circumcirca sunt, quamvis immota; ex turbulento motu ac
veluti circumactu spiritus animalis à statulento spiritu atque maligno, non secus atque bombas & echo
in auribus, hallucinatio in oculis & caligatio. Flatulenti spiritus generatio & impulsus vel est indigena
cerebri, vel advena sursum inferne translata. Indigena est à repletione particulari, vel intemperie & ca-

part. 1. Epid.

lib. 7. 1. Epid.

4. acut. & 26.
Coac. 1. lib.

lib. 1. Epid.
part. 3.

lib. 3. progn.

Coac. 1. cap. 1.
lib. 2.

cochymia quadam maligna firmiter fixa, qualis esse solet tinctura lanarum veneno Assyrio fucararum qualis vertigo in cephalalgia sine febre & echus varietate, prænumcia esse solet vel apoplexiz, vel epilepsiz. Advena autem vertiginis causa est anadrome symptomatica aut critica sanguinis in febre acuta, tum vapor fumidus qui vel ab impuro stomacho, vel à pulmonibus inflammatis, vel ab viro fursum exhalat. Hic autem conuenienter accommodabimus hæmorrhagiz commoda; indigenæ quidem vertigini, ex plethora particulari; advenæ verò, ex anadrome vtraque, tum ex pulmonibus inflammatis. Secus est de vertigine ex cacochymia & cruditate stomachica, aut ex alia quavis tetri vaporis exhalatione. Huic enim debetur pepasmus, purgatio, & neoterismus.

HÆMORRHAGIA QUIESCUNT] Sanè quidem, si à plethoræ propria vacuatione nulla superfit inflammatio, nulla intemperies firmiter fixa, nulla etiam cacochymia maligna. Etenim parum prodest hæmorrhagia plethoricarum affectionum propria, si rerum illarum accessionem coniunctam habuerint, ut prudenter Galenus annotauit.

17 Τὰ ἐν πρὶνῶν συμφοῖς ἰδρῶσι περιψυγόμενα κακώδεα.

Quæ à profluuiio narium cum sudatiuncula incidit perfrigeratio, mala est.

Coac. 1. huius
cap.

EGO VERO arbitror pensum meum absoluisse super hac prognosi commentario nuper scripto ad illam. Quæ diebus criticis eximia incidit perfrigeratio ab hæmorrhagia; pessima. Superest tantum ut prætermissa illic sudatiuncula quorsum appareat, & quomodo adferat perfrigerationem, explicetur.

prorrh. 34.
f. 3. 1.prorrh. 12.
f. 2. 1.

Ergo. A PROFLUVIO NARIUM] Id enim significat ἐν πρὶνῶν, quod teste Galeno indicat per antonomasiam profluuium sanguinis; inter omnia narium epiphænomena. Verba Galeni sunt hæc comment. ad hanc prognosin in prorrhethico. Prorrupta hæmorrhagia siquidem erumpant sudores; aut superueniant qui perfrigerationem adferant eximiam; graue hoc malum est. Itaque à profluuiio sanguinis è naribus hypercritico aut symptomatico, illo quidem à forti contetione naturæ validoque in capite pulsu, hoc verò principiis morborum à gargalismo siue orgasmo sanguinis multa & effera bile perfusi; vnde fit anadrome ante diem ptincipiis acutorum morborum, non autem cum iam processerint, eaque anadrome profusam facit hæmorrhagiam quæ inhiberi non potest, tum propter affluxum perennitatem, tum propter vasorum perpetuam anastomosisin.

CUM SUDATIVNCULA] In qua scilicet exiguus humor & sudor miliaris exudar, vel è capite & thorace, vel toto è corpore rosido. Huius cum duæ sint causæ; vna quidem ineunte morbo, naturæ oppressio; altera prouecto iam morbo vel ab hypercriti, naturæ fatiscientis exolutio, succique alibilis partium solidarum exudatio; posteriorem causam hoc loco agnoscimus. Est enim sudatiuncula hæc ab ὑπερκρινοῦς, etiamsi inciderit circa initia morbi acuti. Quocirca bene præcipiunt qui vetant in sudore sanguinem detrahendum.

Coac. 1. cap.
huius.
prorrh. 42.
f. 3. 1.prorrh. 32.
f. 2. 1.prorrh. 34.
f. 3. 1.

INCIDIT PERFRIGERATIO] Eximia quidem illa, non levis & alioquin quæ moderationem caloris ostendit à falso credita febris discessione, ut in Pario & Pythione: sed quæ tangentiibus medicis & ægrotis sensationem exhibet frigoris glacialis, quam paulò antè noster author vocauit νανίλιον. De qua illud præceptum est. Ἐν κρίσεσι τοῦ περιψύξε(ς), ὅτε αἱμορραγίαν αἱ νανίλι καίεται. i. in criticis exacerbationibus, hæmorrhagia largæ; pessima.

MALA EST] Ne dicam mortifera: quoniam cum dissipatione viuifici nectaris à corde exhausto, infirmitatem summam denunciat, atque, ut ita dicam, νεκρὰν caloris natiui. Sed inter duo genera τοῦ περιψύξεως, periculosior est vniuersi habitus, quàm partium extimarum.

18 Αἵματος ἀφάρεσις ἐν κατὰ ψύξει νεκρωθαρμένη κακόν.

Detractio sanguinis in torpida perfrigeratione; mala.

VNDECUNQUE sanguis prorumpat aut stillatim fundatur in torpida perfrigeratione, idque vel sponte sua, vel artificio medici vena incisa; incommodo vertit ægri. Est enim, vix me contineo quin dicam, immanitatis omnem humanitatem fugientis, defraudare naturam eo commodo vnde sperabilis est eius recreatio, ex cuius paupertate ipsa torpescit, & efforta languet. Hic enim agnoscimus κατὰ ψύξιν νεκρωθαρμένην, quæ scilicet coniunctam habet τὴν ἑρπύην, vbi subinde ad pedes delabitur æger. Nec verò ἡ κατὰ ψύξιν quæ accessionem habet νεκρότης, aliò referri potest quàm ad summam imbecillitatem caloris natiui per exolutionem viuacitatis, & paupertatem humorum ac spirituum viuificorum. Nam quæ à retractione accidit refrigeratio per inflammationem systrophicam viscerum, aut etiam prægrandem ardorem, ut in iis qui ardent febricitant; illa ferè coniunctam habet δυσφορίαν αἵματος, i. iactationem sine vomitu, & difficultatem spirandi cum inexplibili siti. Ac talem complectitur illa iam verus oratio. Τὰ ἐν κατὰ ψύξει κακώδεα ἐν ὑποχονδρίῳ, περιτὸ περιψυγόμενος κακόν. i. Ardoris in hypochondrio reliquæ, febre perfrigerata; male. Ad eam igitur prodest sanguinem multum detrahere; ut fecimus in Generali Moner, cui refrixerant partes extimæ.

Meliùs sic in prorrhethico, 46. f. 3: 1.

Quibus aluo suppressa prorumpit sanguis è naribus, indéque rigent; etiámne fit aluus lienterica & pradura? an verò ascarides? aut utrumque?

ALVO SUPPRESSA.] Quæ non nisi eo acta ducitur excrementis admodum siccis & duris, peneque dixerim, causticis: cuiusmodi sunt *σκληρύνματα κορυφαίων*, quorum cohibitio est siccitatis, siccitas ardoris febrilis omnem succum exhaurientis, qui esse solebat vehiculo fecibus descendendis. Ex omnibus enim alui suppressæ causis quæ multæ sunt, hanc solam hoc loco agnoscimus, præter eam quæ communis est omnium quæ sursum fiunt, & foras, translationum.

INDEQUE RIGENT] Non quidem rigore critico, sed symptomatico. Omnia enim ^{ὅτι τὰ κρίσις} mala sunt in omni naturæ & morbi certamine. Ac malè res eunt quando ea succedunt quæ iure & loco debent præire. Tum certè omnia fiunt ^{ὡς λόγος} naturæ, & ^{καὶ λόγος} morbi. Quo fit ut nihil ad salutem appareat, bonisque fiat rebus ægroti. Ut enim nō rarò salutaris est vrinæ suppressio ante rigorem: sic ea quæ à rigore incidit, gravissimum ægri malum semper ostendit & facit. Eadem ratione rigor hæmorrhagiæ succedaneus, qui prænuncius esse debebat, signo & causâ pestiferus esse solet. Non enim lingua critica, & critica causæ, retro commeant in commoda ægri. Nisi quis fortè adferat excusationem variarum criseon quæ cadunt sæpenumero in morbos acutos, ex vario humoris motu, naturæ impulsu, & partium obsessarum conditione; ac dicat etiam varietatem illam criseon non rarò denunciari vna eademque concussione, qualis cernitur in rigore qui non minùs videtur hæmorrhagiæ prænuncius, quàm sudoris ipsius. Qua de re illud antè præceptum est, *sicui cum rigerit atque sudarit cruce, rursus possit* rigor sine causa ingruerit, tum à peccato somni sit expert; huic venturam arbitror hæmorrhagiæ. Sed in hac prognosi rigor frustra dicitur, estque omnino symptomaticus profusioris hæmorrhagiæ. Nam de natura rigoris dictum est alibi.

ETIAMNE FIT ALVVS LIENTERICA?] Sanè quidem ^{non sepius in his morbus videtur, i. pri-} aph. 1. 6.
ratione prima coctionis, à frigida intemperie ventriculi, & summa paupertate caloris nativi, tum vivifici,
 tum vivacis; non autem per citam & præproperam deiectionem quam ciet catarrhi prolapsus, aut facit
 ventriculus ipse ^{à seors.} Tot enim sunt causæ lientericæ, de quibus per Dei misericordiam loco dicitur
 ex professo. Ac talem lientericæ causam expressit prognosis hac de re iam scripta, nec ita pridem explica-
 ta, cuius verba hæc sunt. *Quibus à prægrandi ardore, quinto die largæ est hæmorrhagia, sexto rigor, septimo per-*
frigeratio; labefactantur alui: repetenda illinc ratio est quamobrem & quemadmodum in vitio sint alui. Coac. 4.
 ius cap.

60 **ΕΓ ΠΡΑΕΥΡΑ**] Non quidem à duritate cibi assumpti nullo modo substantia ipsa mutati, nec
verò à suppressione unde alui dicuntur duræ, vt in illo, *μῆτις πὶ χυ' πλο' γαστ' ex σκληρώσει*, i. mixtio ventrem in-
durat, & in illo, *τὸ δὲ ὀρεῖον καὶ αἰαὶ σκληραί*, i. sin spiravit Boreas, alui etiam duræ: sed à distensione cuius causa
est inflatio quam facit perennis generatio atque suppressio flatulenti spiritus à repentina dissipatione
caloris vitalis, non autem ab inueteratione causæ frigida: licentericæ quæ nullos edidit flatus. Itaque duri-
tatis causa distensio est, quæ facit hydropem siccum.

AN VERO ASCARIDES? AVT VTRVMQVE?] Sanè ascaridum causa est putris humoris in ano endelechia, quorum entelechia cernitur in vermiculis assidue proritantibus, vnde nomen habet. Nam lumbricorum materia est chylosa, quæ nusquam est nisi in ventriculo & tenuibus intestinis. Tæniarum autem generatio est in foetu dum gravis gestatur in alio, tantumque patent in longum, quanta sunt intestina, & à similitudine fasciarum tæniæ nominantur. Hi non sunt hoc loco intelligendi, nec lumbrici etiam: quoniam in lienteria nullæ sunt reliquæ chyli, ut nec chylus ipse. Reliquum est ut sine synecdoche, ascaridum nomen propriè usurpetur pro ipsis vermiculis qui stabulantur in ano, quorum matrix, principium & causa est privatio humoris melancholici aut pituitæ falsæ. Existere ergo possunt ascarides cum alio lienterica & prædura, non autem lumbrici, nec qui à fasciis nomen habent vermes admodum lati.

20 Τα τεταγμένοισι χρόνιοι αιμορρώδεα διψώδεα, μὴ αιμορραγῶσαντα. Ἐπιληπτικῶς θνήσκει.

Qui statis temporibus sanguinem profundunt, si loco non profuderint; epileptici moriuntur.

NON MINORA sunt mala quæ veniunt à cohibita hæmorrhagia immerito, quàm quæ ab immoderate & profusè prorupta. Ac inter mala hæmorrhagiæ immerito cohibita, vel à natura negligentiore sui, vel à medico imperito, principatum obtinet illud quod memoravit epilepsiæ funeste, cuius symptomatis ratio aperietur hoc modo:

QVI STATIS TEMPORIBVS SANGVINEM PROFVNDVNT] Ut feminae menstruales per Lunæ periodos; mutili per easdem; hæmorrhoidici autumno & vere, cuiusmodi sunt homines natura & diata melancholici; iuvenes ætate & vere; tum ij quos dolorifica in lumbis mala exercent, & qui à lumborum dolore sunt cardialgici. Hæc autem profusio sanguinis varia est, per uterum, per intestina, per hæmorrhoides, & per nares. Nam quæ cietur per os; omnino fit *ἡδὲ λόγον* naturæ. Statis autem ac definitis temporibus ob eam sanè causam exclusio illa fit: quoniam ita comparata est natura vniuersitatis & partium singularum, ut æqualia & similia quæ ab eadem facultate alterantur, prorsus æqualia faciant excrementa: quinetiam tempus collectionis eorum excrementorum ut sit æquale necesse est. Nam partes quæ aluntur quoad naturaliter constitutæ fuerint, ab eodem nutritæ alimento, æqualia quantitate, similia qualitate, eodémque temporis tractu colligent excrementa, eadémque periodo expellent.

SI LOCO NON PROFVDERINT] Absoluta periodo collectionis, vnde natura ab oppressione excitata & proritata colligit se ad exclusionem superuacanei sanguinis per loca ex instituto comoda, nec ex euentu incommoda. Hinc veniunt hæmorrhagiæ, purgationes menstruæ, hæmorrhoides & dysentericiæ cruentæ: quæ omnia certis quibusdam periodis suscipiuntur & absoluuntur, idque naturæ commodo, & cōtrà incōmodo si loco nō fiant cohibita & suppressa. Id autē accidit peruersa naturæ inclinatione, meatuū angustia, materiæque ipsius cōtumacia vnde refluxus & palindrome sursum infernè.

EPILEPTICI MORIVNTVR] Non quidem omnes, nec ab omni sanguinis profluxu superpressione & refluxu (nam hæmorrhoidici in hæmorrhoidum vacuitate accidunt phthises, hydropes, cancer, scirrhus & elephas, melancholia & insania.) Mulieres autem cohibitis mensibus, quarto mēse dentibus strident, quod est conuulsificum. Sed narium larga hæmorrhagia vi suppressa, non rarò est conuulsifica. Est autem epilepsia conuulsio, cuius apoplexia hîc succedanea esse solet, ut superiore anno vidimus in Episcopo Niuernensi, repleto sanguine cerebro.

21 Εξ αιμορροΐδος ὅσον Ἐπιφανείσης σκοτώδεα ἐλθόντα, ὄρα πλεγκτὸν μικρὸν, καὶ ἐπ' ὀλίγον σημαίνει λύει φλεβοτομία. καὶ πᾶν τὸ ἕτως Ἐπιφανόμην κακὸν τι σημαίνει.

Meliùs sic.

Εξ αιμορροΐδος ὅσον μικρὸν, καὶ ἐπ' ὀλίγον Ἐπιφανείσης, σκοτώδεα ἐλθόντα ὄρα πλεγκτὸν τι σημαίνει λύει φλεβοτομία. καὶ πᾶν τὸ ἕτως ἐπιφανόμην κακὸν τι σημαίνει.

Ex hæmorrhoidè quantumvis parum atque parumper aperta oborta vertigines; paraplecticum quippiam ominantur: sanat autē phlebotomia. Atq; in vniuersum quicquid ita se prodit; aliquid sinistri denūciat.

VT NIHIL optabilius quàm hæmorrhagia iure & loco prorupta: ita nihil expectendū magis quàm hæmorrhoides

hæmorrhoides cōuenienter ductæ. Est autem hæmorrhagia superarū partium vñica salutaris. Namque vomitio sanguinis, excreatio & anacatharsis omnino sunt mala. Sed hæmorrhoides inferarum partium esse dicuntur, vt menstrue purgationes & dysenteria αἱματώδης. Quæ tria suis quæque diorismis salutari-
bus definita, mirificos adferunt sanitatis fructus. Atque vt paucis complectar hæmorrhoidum commo-
da; scitum est illud. Αἷμα αἰσθεῖν μὲν οὐκ οἶσιν αἰεὶ κακόν. ἀγρὸν δὲ κατὰ τὰ μέρη αἱματώδης. Sanguis qualiscunque super-
ne quidem malus; infra autem bonum est nigra secerni. Ac si diceret; vt omnis hæmorrhagia lege critica salu-
tari: sic hæmorrhoides quæ fluunt merito, & κατὰ λόγον naturæ, grauissima quæque mala sanant & arcant.
Atque vt omne sanguinis profluvium per os cuiusmodi sit tandē, terrificum videri debet: sic omnis per
intestina nigro-
rum deieccio, calamitosa, ne dicam mortifera esse solet. Nam quæ ab atra bile incipit dys-
enteria est insanabilis. Sed hæmorrhoides per metaplasin obortæ, vacuando, retrahendo, & detrahendo
rheuma concitatum atque consistens, ipsamque morbosam cacochymiam & impuritatem valorem ex-
purgando; propugnationem & ἐπαύρωσιν adfert hæmoptoicis, peripneumoniacis, pleuritidis, melanco-
licis, sanaticis, nephriticis, & varicosis; vt vitia lienis & cutis prætereant: sed ea lege tamen vt per μεταπλά-
σιν, i. transitum vel sua sponte se prodant, vel artificio medici. Nam quæ per ἐπιπύρεσιν & sympathiam fe-
runtur, tantum abest vt aliquid opis adferant, vt grauioribus damnis augeant. Quæ cum ita se habeant.

EX HÆMORRHOIDE] Qua vel cacochymia lienis melancholica, totiusque adeo mesenterij & cauarū
hepatis partiū expurgatur per anastomosis venularū ex mesenterico venæ portæ ramo ad vltimas sedis
oras productarū; vel etiā qua depletur plethora venarū lūbis adiacētium (vnde dolorifica in lūbis mala
sanguiflua) per venas quæ ab hypogastria inferuntur in cutim musculosā hypogastrij & intestinū rectū.

QUANTVMVIS PARVM ET PARVM PER APERTA] i. Quæ parce, nec ita diu pro eo ac
merebatur cacochymia, aut plethora lumborū particularis, purgationi aut vacuationi concessa fuit; nec
verò quantitate ac periodo absoluta votis naturæ respondit, vt liberaliter olim respōdebat: sed cōtrā re-
fluxu ex peruersa inclinatione, aut denegato exitu per suppressionem, maiori oppressioni causam dedit.

OBORTÆ VERTIGINES] Vel potius tenebræ aut tenebricosæ vertigines, ex falsa imagine ac
veluti spectris quibusdam visorum mendacium πᾶσι φαντασίαις; per turbulentum motum spiritus animalis
impuri à fumido vapore qui ex recurso ipsarū hæmorrhoidum excursus habet ad caput, & exitu pro-
hibetur. Indigena quoque cerebri vapor fumidus esse potest, qui ne vim adferret cerebro, hæmorrhoi-
des liberales & libera prohibebant.

PARAPLECTICVM QVIPPAM OMINANTVR] Vel etiam multum. Nam illud, quippam
paraplecticum, est inchoatæ cuiusdam; non absolute paroplegiæ proprium: quemadmodum ex prorrhe-
tico nō ita pridem annotauimus. Est autem paraplegia, partis alicuius resolutio cum interceptione mo-
tus & sensus. De cuius natura & causis multa sunt à nobis adducta comment. ad illam prognosin. Para-
tides prauæ sunt paraplecticis. Hic autem videtur per ironiam aut etiam sarcasum dixisse; paraplecticum
quippam, quæ humilis nimium oratio prægrande malum dignè nō exprimit: quoniam vertiginis eius,
quam facit anadrome fumidi vaporis & sanguinis vitiosi, non raro apoplexia cōsecutaria esse solet, quæ
omnem paraplegiæ & paralyseos continet intra se calamitarem. Etenim quamuis ab Hippocrate nota-
ta sint duo tantum symptomata hæmorrhoidum cohibitarum ἐκρηξα, phthisis & hydrops, atque hydro-
pem nasci Galenus doceat ex recurso & refluxu cacochymia malignæ & melancholicæ, quæ vel scire-
thum gignit in hepate, vel ipsius visceris natium calorem exstinguit: tamen vt phthiseos consecutio est
per translationem ab hepate ad pulmones: sicut etiam videri potest apoplexiæ per eam quæ fit ad cere-
brum ipsum, cuius prænuncia esse solet tenebricosa vertigo.

ATQUE IN VNIVERSVM QVICQVID ITA SE PRODIT, ALIQVID SINISTRI
DENVNCIAT] Exempla sunt in ἐπιπύρεσιν, in subtillo sanguinis, in rigore frustra citato, in vrinis pau-
lis per coctis, non crudis. Et quoniam nuper admodum περὶ τῶν μικρῶν ἐπιφανομένων disseruimus super illa
prognosi, τὰ μικρὰ ἐπιφανόμενα ὀφέλεια, i. epiphenomena parua, praua; lectorem oratum velim vt referat se
ad commentarium nostrum.

SANAT AVTEM PHLEBOTOMIA] Huiusmodi est illa prognosis. Quæ ab initio cidentur ver-
tigines, hæmorrhagia quiescunt. Huiusmodi quoque illa. Profusa narium hæmorrhagia, vi cohibita; nonnunquam
adducit conuulsionem: sanat autem phlebotomia.

DE PALPITATIONE, TREMORE,

ET CONVULSIONE.

Ι ΠΑΛΜΩΔΕΕΣ δὲ ὅλῃς ἀεὶ καὶ ἀφῶνοι τελευ-
τῶσι;

1 Qui toto palpitant corpore, etiamne vitam finiunt
voce capti?

HÆTENVS hæmorrhagiæ leges examinamus, & ad medendi vsum conuertimus. Sequitur vt
quemadmodum illa venarum est: ita neruorum qui in vitio sunt symptomata expendamus in depraua-
to motu. Enimvero deprauati motus quatuor omnino genera statuuntur, palpitatio, cōuulsio, tremor,

prorrh. 26.
l. 3. 1.
Coac. 9. cap.
12. lib. 2.
Coac. 4. cap.
4. lib. 2.

aph. 13. 6.

Coac. 15. hu-
ius cap.

16. Coac.
huius cap.
11. Coac. hu-
ius cap.

CAP. XIII.

& concussio : de quorum natura & causis, tum autem quemadmodum inter se distinguantur, suo quoque loco dicentur. Hic certe sufficit scribere *πάλμος*, i. de palpitazione, quatenus ad institutam prognosin accommodari debet. Est enim difficilis ratio palpitacionis in hac prognosi descriptæ. Sed eam difficultatem hoc modo ad facilitatem conuertemus.

QUI TOTO PALPITANT CORPORE] Non quidem palpitacione subsultantium musculorum à flatulento spiritu cuius dominatu iniussi mouentur : sed deprauato motu in quo veriùs micat aliena sponte, quam nostra colligunt se ad opus faciendum. Nam flatulenti spiritus causa est frigida intemperies in crasso humore, quod certè hic locum habere nō potest : quoniā prognoscens huius veritas fuit in historia de Phrenitico, qui cū secundo morbi die palpitasset toto corpore, mox voce captus quartū morbi diem agens interiit : cuius tam citæ mortis causam Galenus acceptam retulit virulentæ qualitatē æruginosæ bilis cuius magisterio phreniticus regebatur. Ergo nec à flatulento spiritu *δὲ ψῦν* cumularo palpitauit, nec ab eodem factus est *ἀφώνος*. Etenim satis cōstat inde aphoniā venisse, vnde is primū ē potestare mentis exiit : exiit autem à cerebro inflammato. At nulla spiritus flatulenti cohibitio inducit *φλογὸς δὲ δὲ σπιν*, i. dispositionem inflammatoriam. Nec verò Galeni rationem libenter admitto, qui super delirio palpitantis vmbilici confectario philosophatur; palpitacionem quidē nasci à flatulento spiritu; delirium verò à diaphragmatis offensione illius palpitacionis socia. Namque vt cōcedam quod ipse adfert quo suam opinionem tueatur, *πῶς γεννᾷται μοῖρας ἢ ἀρχὴ συμπαγῆς εἶναι*, i. nervosis partibus principium consentit : tamen non efficitur aliam videri posse affectionem diaphragmatis paraphoricam, præter inflammatoriam. Atqui, inquam, nulla cohibitio spiritus inflammatoria est. Quod si quis obiciat palpitacionis nomine nihil aliud significari quàm subsultationem musculorum & membranarum à flatulento spiritu *δὲ ψῦν* cumularo; sciat is velim nomē illud non rarò vsurpari *αὐτὴ τὸ σπιν*. Declarat illud Sileni *ἡσυχία* *δὲ πάλμος* *ζωή*, quem paulò antè scripsit Galenus hypochondrij vtriusque tētionem habuisse oblongam, diaphragmate inflammato. Erit igitur palpitatio in hac prognosi arteriarū micantium pulsus medico aspectabilis, & ægro molestus ac dolorificus; vel ob repletionem arteriarū, vel ob angustiam spaziorum in quibus arteriæ olim micabant liberè; vel etiam ob fortem naturæ contentionem studentis excludere quæ sibi negocium & molestiam exhibent atque facessunt. Iam verò quemadmodum talis palpitatio pariat aphoniā, videamus in eo quod sequitur.

ETIAM NE VITAM FINIUNT VOCE CAPTI?] Sanè quidem: tametsi omnis res quæ interrogando proponitur, ancipitem adfert rationem iudicandi ex ancipiti iudicio eius qui quærīt, cui nihil abditum fuit, nihil abstrusum, & qui omnium primus admirationem sustulit, atque *ἀπυρμασία* inuenit: nisi fortè quis excusationem adferat eius qui hoc veluti breuiariū de historia Phrenitici desumpsit, negetque summum fuisse illum dictatorem Hippocratem; quod illi faciliè concesserim, modò persuaserim omnium theorematum quæ scripta sunt in hoc libro authorē fuisse Hippocratem. Enimvero phreniticus ille *πάλμος δὲ ὄλε*, factus est *ἀφώνος*, ac voce captus vitam quarto die finit; aut à tensione forti, aut ab exolutione summa neruorum & musculorum vocem edentium. Huiusmodi sunt musculi intercostales qui faciunt *ἐκφύσησιν* vocalis materiæ, quæ vapor est fumidus è corde expressus. Huiusmodi sunt etiam laryngis carnes modulandæ voci dicatæ. Eorum autem musculorum tensio accidit in convulsione, qualis cernitur in epilepticis; exolutio autem in paraplegia musculorum laryngis arque thoracis illa quidem ambientis appulsu, cuius vim nunquam expertus fuit sextæ coniugationis in larynge neruus, nisi nudatus: hoc verò ab intemperie cervicalis medullæ, & vertebrarum luxatione. Cernitur etiam in apoplexia: quemadmodum & valida tensio in ebrietate, quæ homines facit *ἀφώνους* conuulsos. Denique vndeunque valida tensio est musculorum atque neruorum *φωτισμένη*, aut laxitas & exolutio, vel proprio instrumentorum vitio, vel ipsius principij & facultaris; inde proculdubio accidit *ἀφασία*. Quod si ad eam laxitatem accesserit materiæ vocalis paupertas, tum in propinquo mors est, & qui conualuerit Hippocrates vidit neminem. Quineriam sunt interruptæ voces & elisæ in faucibus, occurſu catarrhi ad perpendiculum prolabentis, & materiæ vocalis fursum expressæ. Quæ cū ita sint, iam loco quærēdum quæ causa fuerit phrenitico palpitandi & obmutescendi. Sanè hic nulla est æquitas iudicandi à flatulento spiritu palpitasse, quem narrat Hippocrates incendio conflagrasse & æruginosa vomuisse. Nec verò credibile est ipsum voce captum fuisse à laxitate instrumentorum vocalium, quem scribit postera noctem illius diei quo palpitauit (palpitauit autem secundo) crebris conuulsionibus exegisse. Ergo visa est palpitatio in aspectabili pulsū micantium arteriarum; & à prægradi tensione instrumentorum vocalium factus est æger *ἀφώνος*. Nam laxitatis contraria est conuulsio quæ hominem derinuit ad vltimum vsque spiritum. Sic enim ait. *Πάλμος δὲ ὄλε τὸ σπιν, τὸ πᾶν τὸ σπιν, τὸ πᾶν τὸ σπιν, τὸ πᾶν τὸ σπιν*, i. Totius corporis palpitatio, noctu conuulsio, tertio die exacerbata sunt omnia, quarto interiit. Interiit autem crudeliter, vt sanè omnes intereunt qui ex dolore voce sunt capti, i. qui acerbissima cōuulsione intercostalium musculorū, quæ initis morborum firmiter fixa manet, nec intra eam quā incidit horam discutitur, alioqui febris medicatoria; qui, inquam, sic voce capiuntur denegata expressione & appulsu vocalis materiæ ad instrumenta *φωτισμένα*, & impedita eorum modulationē ad vocem edendam. Ex quo efficitur eos qui toto palpitant corpore, voce captos, crudeliter vitam finire: quoniam conuulsoria est aphonia, vel quæ conuulsificq̃ modo existit, iniussa videlicet, forti collectione partium vocalem materiam exprimentium, deductum, excipientium, & modulantium : qualis aphoniæ causa cernitur in ebriis & catalepticis qui voce capiuntur conuulsi. Nam quæ ab exolutione incidit aphonia per extinctionem caloris viralis, & summam infirmitatem potentie animalis; vt mortem in propinquo esse denunciat : ira moriendi sensationem adimit : ac tales *ἀφώνους κατὰ τὴν ἀποθνήσκουσι*, i. clam moriuntur.

Hic nolim me arguat momentorum auceps, vt qui negare videar à palpitacione flatulenti spiritus venire

hist. 4. pag. 3.
1. Epid.

4. acie.

georrh. pe-
suls. l. i. 1.

hist. 1. 1. Epid.

ap. 1. 1.

2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Coac. cap. 8.
lib. 1.

venire *τὴν ἀφρονίαν*. Etenim sciaris velim, non ignorare me à flatulento spiritu nasci convulsionem; & à convulsione *τὴν ἀφρονίαν*. Sed hæc in phrenitico locum non habet.

2 *Τὰ Τριμώδια, ἀσασμώδια γινόμενα ἐφιδρῶσι, Φιλνπόσφοφα, τῆτοις κρίσις ἐπὶ ῥιζώσασιν. ἐπὶ ῥιζώσας δὲ ἔτοι ἐπὶ κοιλίῳ καύματι περικληθέντες. ὕπνος πολὺς τῶτοις ἀσασμώδης, καὶ τὰ ἐς μέτωπον βαρεὰ, καὶ οὐρησις δυσκολαίνουσα.*

Omnes qui tremuli convelluntur sudatiunculam habent obnoxiam recidiuam. Atque iis rigore superueniente fit crisis. Superuenit autem ventris ardore lacestitis. Hic somni arctiores sunt convulsifici, grauitasque frontis, & mictio ipsa difficilis.

MALA MUTATIO est motus quodammodo iussi in eum qui omnino est iniussus, ac sua sponte in totum cietur, nostra autem ne minimum quidem. Est sanè mutatio τὸ μεταρρεπκὸς εἰς τὸ αὐτόματον καὶ ἀ-
30 *αὐτορρεπκόν*. Quæ quâta sit è natura egressio, declarat id ipsum difficultas ἐπαπορρώσεως & curationis ipsius: maximè verò quando cum instrumentorum contumacia principium & facultas in vitio sunt, vt in tremore & convulsione phanaticorum, quæ si quid aliud, desperationem salutis ostendit. Quæ salus enim vitæ sperabilis esse potest in alienatione cerebri ab exhausto, vnde venit illa convulsio atque tremor? Verum vt redeam ad propositum theorema de mutatione iussi motus in iniussum, & in quo cerni possit illa mutatio; decisione opus est huius prognoseos quæ sic habet.

QVICVNQVE TREMVLI CONVELLVNTVR] Vel qui toto corpore omnibusque artibus contremiscentes in vicissitudine motus iniussi & iussi, ex pari magisterio concertantium inter se facultatis & instrumenti; qui, inquam, sic contremiscentes, proindeque iullo prius motu fruenter, nunc prorsus iniusso laborant in convulsione, quæ est *ὡς ἀπὸ ἀσθενείας καὶ ἀσθενείας καὶ ἀσθενείας*, i. iniussus earum partium
30 *motus quæ non nisi nostro iussu mouentur*; idque per se, non ex euentu: vt scilicet partes quæ convelluntur, convulsione causam intra se habeant, repletionem aut siccitatem; nec antagonistarum congenerumve culpa in vitio sint, vt in tremate musculorum crotaphitarum, vbi partes oppositæ convelluntur. Qui sic igitur à tremate manent convulsi.

SUDATIUNCULAM HABENT OBNOXIAM RECIDIUAM] In prothetico legitur ἐφιδρῶ-
40 *σι, & quæ lectio ter aut quater à Galeno repetita. Sed legere malim ἐφιδρῶσι, vt sudatiuncula sit eorum qui sic convelluntur, vel ab oppressione expressa, vel ab exolutione partium solidarum exudans. Vtraque mala, hæc peior: neutra autem sudatiuncula recidiuæ tantum est capax, sed etiam mortis. Nam ea demum ἐκλυπτορφα, i. recidiuæ amica verè dicuntur quæ sunt ἀσθενήματα, ἢ ἀσθενήματα, ἢ ἐκλυπτορφα, i. lib. περὶ κριτῶν, quæ ante diem ingruunt, vel ante diem iudicantur, vel à crisi supersunt. Hic autem sudatiuncula vi expressa, vel*
40 *ab exolutione exudans in convulsione; mortifera esse solet.*

ATQUE IIS RIGORE SUPERVENIENTE FIT CRISIS] Non omnibus quidem convulsis: sed iis tantum qui à repletionem convelluntur. Est autem bonâ mutatio convulsione in concussione, nec contrà: quoniam triumphata natura iam triumphare incipit; & quæ dominatu causæ morbosæ tenebatur, iam nunc erecta, causæ ipsius potens est in concussione. Est autem rigor concussio.

SUPERVENIT AUTEM VENTRIS ARDORE LACESTITIS] i. Galeno interpretè, ventris ardor prænuncius est atque quodammodo præuius iis quibus à convulsione venturus est rigor: vnde fit vt prorepente ichore bilioso è vasis ad partes acerrimi sensus, forti naturæ contentione & motu, concutiantur ad exclusionem rei molestæ. Atque ira febris convulsionem exoluit. Scire autè licet multò melius esse iis qui à tremore rigent, quàm qui à rigore contremiscunt. Nec verò audienda prognosis
50 *illa quæ sic habet. Τὸς ἐπὶ ῥιζώσας τὰ Τριμώδια ἐπὶ ῥιζώσας καί τινι. i. Crebrò rigentes tremor superueniens necat: vbi legèdum videtur potiùs καί τινι, quàm καί τινι. Nisi quis prætexat eum tremorem qui circa initia, primòque morbi die obortus, ventris sectionem indicat necessariam: sicut in Pythione Galenus asseruit: aut etiam convulsione eius quæ primo die, aut postridie, aut etiam perendie superueniens febrem tollit, cuius prænuncia erat rigoris concussio. Sed hoc superstitiosum nimis est, ne dicam sophisticum.*

HIC SOMNI ARCTIORES SVNT CONVULSIFICI] Arctiores somnos improprie nominavit & ἀπερηνητός, τὰ κάματα ὅς ὑπνώδια siue ἀγρυπνία, i. comata non somniculosa, seu vigilantes, quorum scilicet κάμα tantum apparet in conuientia oculorum, quibus noctem illi accipiunt, cerebro autem vigilat. Nam cæteri omnes comatosi longè absunt à convulsione, quorum sanè ὑπὸς in laxitate consistit, vt convulsionis in tensione.

60 *GRAVITAS FRONTIS*] Ex qua significatio fit opprimentis causæ firmiter fixæ, non autem fugacis, & per sympathiam lacestentis.

ET MICTIO PERMOLESTA] Idem enim significat ὑπὸς διεκλαίνουσα, quod alibi ὑπὸς ἐπὶ πονοῖ, *καὶ διδασκάλιος*, vel etiam ἀφρώδεις ἐρήσεις: quæ sunt eiusmodi liquore aut hypostasi, & quò propius ab æqualitate abest spuma, eò peiorem vim spiritus flatulenti, aut colliquationis denunciat; quæ duæ sunt iniussæ convulsione causæ. Quæ de re illud præceptum est. *Convulsifici sunt etiam cervicis & dorsi perfrictiones,*

acutum urine spumantes. Sed maximè facit ad intelligentiam conuulsifici somni iam explicati, quod eius prognoscos initio scriptum est. *Qui cum feroci perturbatione somno excussus, è potestate sui exeunt; grauissimum habent malum & conuulsificum.* Sed hæc posterior pars de arctiore somno, deque frontis grauitate & vrinâ difficili, non legitur in prorrhethico.

al. ἀσθεν.

3 Οἱ σὺν ὑστερικοῖσιν ἀπείροι σπασμοὶ διχερεῖς.

Meliùs in prorrhethico, 27. f. 3. 1.

Οἱ σὺν ὑστερικοῖσιν ἀπύερος σπασμοὶ διχερεῖς.

Quæ cadunt in hystericas sine febre conuulsiones; faciles.

IN CONVULSIONE magna est è natura egressio, magna item naturæ offensio: proptereaque difficilis eius redintegratio, *ἐπιπρόσθιος* Græci vocant, ne dicam desperabilis, quando & firmiter fixa est, & partes veluti artissimum quodam vinculo constrictas tenet, quarum officio vitam carere non potest: ut prætermittam interim doloris acerbicatem, & causæ morbis inexpugnabilem contumaciam. At si conuulsio pressa est leuiter ad exigui prædicationem temporis, & causam habet fugacem, aut quæ naturam sequitur potiùs causæ fuscipientis, quàm intolerabilem vim efficientis; cuiusmodi esse solet puerulorum febricitantium infra septennium; sanè tantùm abest ut spem nobis adimat, ut ne leuissimo quidem metu nos terreat. Huiusmodi est conuulsio hysteriarum febris expertium. De qua exempli loco hæc prognos̃s videtur ad examinandum & philosophandum præscripta.

CONVULSIONES] i. Iniuissi motus principium versùs contracti, earum partium quæ nostro insu colligunt se ad flexionem, extensionem, & ad eum quem vocant tonicum motum. Atque illæ conuulsiones aut sunt reapse & verè cum vitio partium conuulsarum, aut ex euentu, vacantibus omni culpa instrumentis & partibus quæ sua sponte, non nostra, colligunt se veriùs quàm conuelluntur. Ergo conuulsiones cuiusmodi tandem fuerint.

QUÆ CADUNT IN HYSTERICAS] Quæ superueniunt hysteris dum suffocatione hysterica conflantur, siue illa venerit impeditis respirandi instrumentis ab oppressione diaphragmatis quam facit hepar ex utero sibi adiacente, qui eò cursum inflexit tanquam ad fontem gratiosi humoris, sitim explere cupiens in muliere grandiore & vidua nec ampliùs menstruali, cuique profusior alius colapso intestino recto, cum siccitatis & leuitatis accessione, occasionem dedit utero per locorum amplitudinem conuertendi se & affectandi viam ad illud *ἐπιπρόσθιος* hepar: siue illa suffocatio posita sit in dissipatione penèque dixerim extinctione caloris viuifici qui est in corde, appulsu venenatæ auræ quam semen corruptum è locis expirat; tollitque ad tempus in corde, respirandi vsum; in faucibus & larynge veluti quodam laqueo constrictis, opinionem strangulationis facit ab illaqueatione; in cerebro autem, melancholiæ aut epilepsiæ consecutionem adfert. Quæ tamen symptomata non cernuntur in iis qui cum frigore glaciali, sublato respirationis usu, nihil omnino respirant: sed sola transpiratione contentæ viuunt, donec excluso putri semine restitutæ fuerint.

SINE FEBRE] Sic meliùs quàm ἀπείροι. Quid enim ad leuationem facit insolita conuulsio quæ grauior esse solet quàm consueta? quemadmodum & menstruarum purgationum cohibitio, molestior mulieribus ἀπείροις quàm ἐπιπρόσθιος. Ergo sine febre legendum, & intelligendum de symptomatrica vteri per systrophem inflammari; aut de essentiali.

FACILES] Quæ & toleranter feruntur, & faciliè exoluuntur: quoniam fugax earum causa est, quæ proritendo potiùs quàm exhauriendo, per contractionem cerebri, conuulsionem facit. *ὠχρεῖς* autem vocauit eadè ratione qua homines dicuntur *ὠχρεῖς ἢ δυσχερεῖς*, quorù vlcera faciliè aut difficulter sanescunt.

4 Τὰ σπασμώδεια σὺ ἰδρῶν πύελα ὡς ἀρρέοντα, πυρετώδη ἐόντα, βήδεα. τέτοιον ἐν κοιλίᾳ καθυγραίνονται. Τέχνη δὲ πρὸς ἀνδρα ἀποσώζει.

Quæ in febrili sudore diffluit salina, leuis est: atque iis etiam profluunt alui: ac fortè quippiam in artus procumbit.

LIBENTER equidem Galeno assentior qui τὰ σπασμώδεια ex hac prognos̃i reiecit. Nulla est enim æquitas recipiendi, & opera perdita examinandi. Nec verò assequi possum quærendo & disputando quæ sint illa sputa σπασμώδεια: nisi fortè quis dicat ea videri quæ cum forti concussionem thoracis expectorantur. Sed hoc superstitiosum nimis arque sophisticum: alioqui non appositè nec cōsideratè scripta sunt illa *ὡς ἀρρέοντα καὶ ὠχρεῖς*, i. *diffluentia & facilia*, quæ nullo metu exterrant. Quo sit ut loco scripta non sit prognos̃is, ubi ex professo agitur de conuulsione. Sed ne quid intentatum relinquam, sic eam aggredior ad explicandum.

QVÆ IN FEBRILI SVDORE] I Qui à febre cietur & lege naturæ effunditur critica aut peridica, isque toto corpore, calidus, non autem sudatiuncula frigida vel ab oppreffione expreffa, vel ab exolutione partium solidarum exudans.

DIFFLUIT SALIVA] Sic enim τὸ πύελον significationem exprimendam putavi, ex perspicientia πύεος nostri authoris qui κατὰ χρυσικῶς usurpauit τὸ πύελον, ἀντὶ τοῦ πύουματος. Nam in πύελῳ verè & κυρίως dicto, quod expectoratum significat; diffluere os non legi apud Hippocratem, sed tantum humescere per ἀνακαταρσιν, i. expurgationem thoracis atque pulmonum. Solenne est illud. Πύελον χρὴ ἱσχεῖς πὶ ἀνακαταρσιν, i. sputum oportet citò expui & facili. Quod ut fiat, crassum esse decet, non tenue, nec glutinosum. Sed ea saliva diffluit vel à catarrhi prolapsu in fauces, vel ex nimia humoris abundantia qua natus alvus, prorepitque ad os per continuitatem interioris tunicæ quæ aluo, palato, ac toti ori cōmunis est.

1. acti.
lib. 2. progn.

LEVIS EST] Quæ scilicet toleranter fertur, & curatur ex facili, nec merum adfert grauioris mali. Vt enim κακότητες dicuntur quæ sunt terribila: sic εὐήθεια quæ sunt secura. Huiusmodi sunt febres εὐήθεις, quæ inoffenso cursu placide suam absoluunt historiam, nec vlla secum habent coniuncta ἐπιπρόμματα, nec vlla ante diem ἐπιφαινόμενα. Secura est autem saliva quæ liberum habet exitum, cum vacuitate qualitatis malignæ. Secus est de ferina destillatione, quæ sine excludatur, siue subsistat, graue malum ostendit & facit.

lib. 3. progn.

ATQVE HIS PROFLVUNT ALVI] Quod balbis vsu venit qui madescit lingua balburiunt. Nam proropente in aluum humore, ipsam laxari contingit, non secus atque mulieribus in graviditate aphthosis, quibus abortionem facit inde superueniens alui profluuium, sublata opportunitate nutriendi atque gerendi fœtum.

AC FORTE QVIPPAM IN ARTVS PROCVMBIT] Deriuata profluuij causa in artus. Sic enim & colici, & dysenterici, non raro sunt arthritici. Nec mirum videri debet si ex nimia humoris morbifici abundantia, prorogato iam morbo, ut prorogari solet à sudore frustra oborto; tandem ad eam diuturnitatem abscessus in articulis consequatur.

Οἷσιν ἐν ἀσασμῶδεσιν ὀφθαλμοὶ κίλεμπάνοισιν ἀτενέες ἔτε ὥς ἐωλοῖσιν εἰσὶ, διανοσέοισι τ' μακροτέρως.

Quibus in conuulsione scintillant oculi firmiter fixi; nec sunt apud se, ac diu eorum morbus producitur.

HIC SANE conuulsionis nomen loco non legitur: quoniam quæ scripta sunt in hac prognosi, prænuncia sunt potius conuulsionis, quam consecutaria. Nam oculorum fulgor intentæque acies, ut certe symptomata sunt paraphorica: sic etiam merito videri possunt conuulsifica. Ergo sic instituenda prognosis.

Quibus oculi scintillant valde inteti, nec sunt apud se, & conuelluntur.

QVIBVS OCYLI SCINTILLANT] Crebris micant ignibus; non quidem à lumine sibi conato, quod est instrumentum αὐτοῦδε visificæ facultatis, idemque cen portitor quidam traiciēs aspectabilia omnia sibi consocialia ab extimo lumine ad intimum animæ, per quod visio ipsa perficitur: sed à fulgore aduenticio, ac veluti quibusdam marmarugis ob oculos obuersantibus, à sanguinis tenuissimi appulsu multa bile perfusi ad nitentes pellucidāsque oculorum membranas, cum inflammatione quadam luminis atque fulgoris oculorum proprii, vnde nascuntur intus τὰ ἐξ ἐντὸς quæ non nisi extrinsecus percipi solent. Ac talia visa, sunt planè mendacia: sicut & ἀκουστέον in aurium echo & bombo.

VALDE INTENTI] Quorum acies, quocunque sit eorum coniectio, manet immota & fixa, idque τὸ παρὰ τὸν; non autem à pari contractione iniussa omnium ocularium musculorum; nec verò ab iniussa collectione antagonistarum, quam vocat κατὰ κράτος; nec ab æquali omnium contractione, quam πῶς πῶς, in illo, ὀφθαλμοὶ πεπηγότες, qui sunt eiusmodi; exerti quidem, à laxitate; concaui autem, à conuulsione. Ac talem intuitum nominauit ὁ μάλιστα ὁράσας.

De quibus in vniuersum sic statuam. Oculorum coniectio firmiter fixa, aut iussa est, aut iniussa; ac iussa quidem indecorè, à perturbatione animi cum febre; aut sine febre; iniussa autem recta, aut torua. Recta est quæ cernitur in oculis quos vocant πεπηγότες, qui sunt eiusmodi, vel à laxitate omnium musculorum exerti, vel ab eorundem contractione concaui: torua autem à musculorum antagonistarum laxitate, aut conuulsione.

NEC SVNT APVD SE] i. Non suæ sunt mentis: sed contrà è potestate sui exeunt, dissimilitudine morum, absurditate verborum, indecora corporis compositione, & corde oblioto laborum; quæ omnia sunt paraphorica atque phrenitica: per intolerabilem cerebri alterationem; quod effero humore teneatur, idque potissimum quando in morbis acutis ante diem apparent τὰ ἐπιφαινόμενα quæ citò apparere non debent, alioqui verè sunt ἐπιπρόμματα, propterea quæ funesta, aut certè sinistra iudicij. Atqui scintillantes oculi scintillis & marmarugis crebri esse debent ad hæmorrhagiam criticam, nec aliter. Ergo si contrà huiusmodi sunt phrenitidis focia; ὥς ἐκ λόγων naturæ, & merito morbi erunt.

ET CONVELLUNTUR] Prostratione neruorum principij, & cerebri alienatione, cuius conse-

catio cito est à prægrandi alteratione iam explicata, quæ cernitur in oculorum scintillis & fixa eorum coniectione. Quod autem sequitur de diuturna agrotatione, falsum est, tum reapse, tum Galeni iudicio & autoritate.

6. Τα σπασμώδεια πρόπον τὸ ροξινόμῳ κατόχως τὰ ὡς οἱ ἐπάρει.

Qui in paroxysmo attoniti quodammodo conuelluntur; q̄s assurgunt parotides.

[QVI IN PAROXYSMO ATTONITI] Dum scilicet exacerbatur febris intermissionis expert, cerebro multum prostrato verius quam oppresso; à mixta cacochymia pituitæ & bilis vnde nascitur monstrum biceps quod *πορομαίαν* veteres nominant, quæ non minus cernitur in catōche falso creditæ rigidi apertis oculis multum intentis; quàm in comate quod falso putatur soporatum, ex conuientia oculorum. Nam & phrenitici multi sunt catochi, vt etiam comatosi: quamuis inter coma & catōchen hoc intersit, quod illud sit ἐν τῇ λύσει, hæc vērὸ ἐν τῇ ῥύσει.

[QVODAMMODO CONVELLUNTUR] i. Fugaci artuum contractione, vel musculorum iniussa collectione leuiter pressa, non firmiter fixa: quamuis illud κατόχως non raro significet ἢ ἰδρυμένην βεβήως: quemadmodum sæpe annotauimus ex Galeno. Alioqui duo hæc, σπασμώδεια ἔπον & κατόχως, essent planè ἀόυσαντες.

[ASSURGUNT PAROTIDES] Aliam interpretandi viam securus sum, atque aliud demonstrationis fundamentum posui in enarratione iam scripta ad hanc prognosin. Sed illa pertinet tantum ad catōchē, nō autē ad parotidas. Sic enim legitur, τὸ παρεξινόμενόν σπασμώδεια ἔπον κατόχα. 109. Coac. i. lib.

7. Τρομάδῃσιν, αἰσώδῃσι, μικρὰ τὰ ὡς οἱ ἐπάρει ἀσπασμὸν σημαίνης, κοιλίης πονηρὸς μόνης.

Qua tremulis & anxii parua assurgunt parotides; conuulsionem denunciant cum in vitio est aluus.

[IN IVSSI] motus quàm iusti conditio peior est, terrificaque magis. Ergo tolerabilius malum tremoris quàm conuulsionis. Atque vt melius est delirium superuenire tremori, quàm tremorem delirio: sic melior est conuulsionis in tremorem meraptosis, quàm tremoris in conuulsionem. Sed caput est in hac prognosi discere & intelligere quemadmodum quæ ex tremore & anxitudine assurgunt parotides conuulsionis prænuntia sint, maximèque si aluus in vitio sit. Est quidem hæc prognosis ἐν τῇ ἀνομομασίᾳ instituta: efficiam tamē vt ea signorum complexio nihil à proposito inter se dissentiat.

Ergo. [QVÆ IKEMVLIS] i. iis qui contremiscunt in febre acuta, per transitum humoris moribifici ē venis in neruos, vnde per translationem & propagationem causæ illius ad cerebrum, symptomata paraphorica excitantur: quoniam facilis esse solet mutua principij & neruolarum partium sympathia. Quæ res adduxit Hippocratem vt ita scripserit: *Qui contremiscant in febre, non sunt apud se.* Est autem hic tremor ab oppressione, non ab exhausto.

[ET ANXIIS] Qui sunt omnis loci & figuræ impatientes, habentque alysmum virtutis grauata à corpore: qui *ἀσπασμὸς αἰέμενος* nominatur, quemadmodum alter *παρὰ δῆμις*.

[PARVÆ ASSURGUNT PAROTIDES] Non quidem parua symptomatum remissione, & periculi vacuitate; quales paruas dici ostendimus in illo, *Parotides in diuturnis parua*: cuiusmodi fuisse narrantur illæ l. lib. ἢ ὅτι δῆμι. quamuis amplitudine & circumferentia essent magnæ; at diffusæ tamen & molles ac doloris expertes, sed quæ in humoris maligni & efferi abundantia *αἰσώδῃσιν* ἢ *ἡμύρρῳσιν* assurgunt. Sunt autem rubræ, dolorificæ admodum, atque præduræ. Nam de natura parotidum satis iam multa diximus in earum historia.

[CONVULSIONEM DENVNCIANT] Quoniam ad præparationem suscipientis causæ, i. ad neruorum infirmitatem quam tremor ostendit, vis magna efficientis accedit: quia vel manet superflua multa in cerebro materia non ita pridem eò translata, quam parotis *ἡμύρρῳσιν* non exceperit; aut quæ ab eadem recursum habuit ad cerebrum vnde manauit. Quæ causa est cur ex parotide rubræ & vertiginosa non raro veniant conuulsionēs cum aphonia, vt supra iam demonstratum est. Sunt enim parotides rubræ exacti iam morbi superfluitates, in febribus ortæ; sunt, inquam, abscessus vt paruitare inutiles: ita symptomatum calamitosa vi intolerabiles.

[CVM ALVVS LABORAT] Melius fortè sic; nisi aluus laboret. Etenim quibus liberaliter biliosis excrementis ferrur aluus, parotidum mortifero periculo defunguntur quod in propinquo erat, quod Hermippo Clazomenio contigisse legimus. Quæ de re illud præceptum est. *Parotides in acuto funeste: sed forsan his alui feruntur.* Vulgata lectio sic defendi potest, quod anxietudo iam descripta nullam accipit leuationem: sed contra augetur quando laborat aluus, tum suo pte vitio, vt in henteria; tum alieno,

alieno, ut in dysenteria, per expressionem saturatæ bilis ab hepate, quæ abradendo & exasperando sedis & intestinorum ulcerifica esse solet.

8 Τὰ σπασμώδεια καὶ τετανώδεια πυρετὸς Ἰπποκράτης λύει.

Convulsiones & tetanos superueniens febris exolvit.

Huius prognoscos veritatem aperiet nostra enarratio in 12. huius cap. quæ continet diorismum, atque, ut ita dicam, fundamentum bene scientiæque demonstrandi omnia quæ continentur in hac prognosi. Cogitationes igitur nostras ad illam referuabimus.

9 Σπασμὸς Ἰπποκράτης θανάσιμος.

Convulsio trumati superueniens; funesta.

ILLA DEMUM symptomata citæ mortis iamiam venturæ sunt argumenta & causæ, quæ cum significatione fariscentis vitæ quæ naturæ offensionem quoque ipsi adferunt intolerabilem. Nulla autem vis maior naturæ *ἀντιπύρις*, quàm convulsione potest adferri. Huc accedit quod partium ab exhausto convulsarum redintegratio nulla sperabilis. Ac veritas quidem huius prognoscos confirmatur aph. 2. lib. 5. quem enarravit Galenus. Nec verò sperassem me aliquid opis allaturum lectoribus & studiosis Medicinæ, si ille diorismos omnes explicasset calamitatum & convulsificarum causarum quæ trumati superueniunt. Utile autem fuerit omnes quærere & examinare, ut ex earum perspicentia intelligamus in quo trumate, & quomobrem necessariò sit funesta convulsio, non semper, aut certe ut plurimum: sicut video placuisse Galeno, qui necessitatem moriendi non recipit à convulsione ex trumate orta. Nec mirum: quia unicam convulsione causam agnoscit in lauciata parte & trumate læsa, nempe inflammationem systrophicam particularum nervosarum ipsius partis. His ita constitutis.

CONVULSIO] i. Iniussa contractio artuum, vel eorundem iniussa collectio principium versus; illa quidem, in quâ pars convulsa convulsificam habet causam, si epilepsiam tantum exceperis, in qua principium, i. cerebrum in vitio est, non membra contracta, appareretque *ἡ σπασμώδης* verius quàm vera convulsio: hæc verò in quâ partes ipsæ sponte sua & iniussu nostro colliguntur versus quædam contrahuntur, omnis convulsificæ causæ expertes; alienoque vitio colliguntur, non suo: propter exolutionem & laxitatem musculorum oppositorum, magnitudine, numero, & robore parium.

SPERVENIENS] Per propagationem causæ morbosæ ad genus nervosum, vel à principio, vel ad principium, vel à lauciata parte in socias atque propinquas; tum naturali contentione partium lauciatæ oppositarum & parium virtute, numero, & magnitudine.

TRUMATI] i. Prægrandi capitis vel artuum offensioni extrinsecus incidenti, iactûve, iactûve, aut casu; unde partium illarum percussarum luxatio accidit, confusio, vulnus, fractura. Omnia enim partium extrinsecus offensarum vitia, si lacerata sit multum continuitas, trumata facit; quod illud *ἐν* satis ostendit, unde significatur *ἐν ἡμέρῃ*, quæ nunquam incidit nisi in magnas affectiones, easque quæ inter ipsas eximæ sunt. Declarat & libri inscriptio *ὅτι ἐν τῇ κεφαλῇ τραύματα*, ubi describuntur capitis mala percutiendo illata, quæ ex euentu per substillum sanguinis in duram meningem, aut per lauciati ossis corruptionem forent lethalia, nisi, convenienter medicando, ei fato per Dei gratiam occurreretur. Nec verò me mouet quod in aphorismis legitur in hanc sententiam; *ἐν τραύματι*, quod vulnus tantum significat. Nam & magnum vulnus est *τραύμα*. Sed non omne vulnus eiusmodi est, ut nomen trumatis mereatur. Omnis autem prægrandis in triplici genere partium lauciarum offensio, truma est. Possem hinc ego, perinde ac idoneum nactus locum, pluribus argumentis opinionem meam defendere & sustinere. Sed aliò festinat mea oratio.

Ergo. CONVULSIO TRUMATI SPERVENIENS] Idque per inflammationem partium nervosarum lauciatæ partis, aut per translationem systrophicæ inflammationis in propinquam vel sociam, vel etiam per exolutionem lauciatæ partis quæ convulsionem facit oppositæ. Ac talium causarum convulsificarum species & idea spectantur ex fractura calcis in chorda, quæ nata est musculis suræ primùm in ortu rotunda & crassa, mox explicata & in *σπινθέρων* diducta, firmiter fixa, ipsi calcaneo subtenitur & adhærescit. Hanc vocat Hippocrates *πύριον ὀπίσθιον*. Eius convulsio intolerabilem doloris acerbiteriam parit, unaque secum habet coniunctam febrem, assiduitate, feritate, singultu, tremore, delirio, & citæ morte funestam. Cernitur etiam convulsione calamitas à nimia prorupti sanguinis ex vulnere abundantia, cum scilicet vena insignis *αἰμορροΐς* telo incisa est. Ac talis convulsio non ita pridem his conscripta literis explicata fuit. Si largo sanguinis profluuiio supervenerit convulsio, aut singultus; mortiferum. Sed vulnery quoque magnorum atque pravorum, qualia esse solent musculorum quæ parte nervi *ἐμφορται*, aut iidem *ἐκφορται*; talium, inquam, vulnery confectaria est sæpe ipsa convulsio, si nullus tumor affurget, aut evanescat parte postica. Iam verò in trumate capitis, cuius decisio hæc propria esse videtur, convulsione utriusque causa & ratio, periculi locum habet. Etenim quæ lauciato partis alterutrius musculo temporali convulsio accidit, cernitur è diverso: tametsi convulsa pars caret omni causa doloris:

tamen officij vacuitate in comedendo; & signo grauitate fauciata partis nobilissimæ, terrifica esse debet. Nam fauciari temporalis musculi hæmorrhagia, cerebrique per societatem & viciniam sympathia, intra decimum diem funesta est. Superest vt conuulsionis mortifera præter cæteras, & quæ morituri mox hominis in capite fauciari signum ostendit, causam in occulto latentem propalam explicemus. Enimvero traumati omnes cephalici, cum in propinquo mors est, alterutra manu fauciata parti opposita, aut vtraque conuelluntur. Atque illud contigisse legimus cuidam pedisequa in Omilo, hoc verò eiusdem loci Autonomo, à cuius futuris deceptum se fuisse Hippocrates prodidit, exemplo magnorum virorum & magnarum rerum fiduciam habentium. Ac sanè pedisequa iactu fenestræ aut ianux, dextra parte ad futuram trama accepit; sinistra manu conuulsa est: Autonomus autem lapidis iactu percussus in medio bregmate super sutura, trama fissuræ & contusionis habuit, vnde iam proximus morti, vtriusque manus conuulsionem expertus est. Vtriusque conuulsionis tam è diuerso, quam è directo, causa est inflammatio neruorum principij quæ traumati superuenit; in pedisequa, è diuerso per transitum biliosi humoris; in Autonomo autem, per propagationem eiusdem maligni humoris. Atqui traumatica inflammationis consecutaria esse solet conuulsio è directo partis obsessæ inflammatione illa systraphica. Quod autem per translationem phlegmone oriatur quæ conuulsionem facit è diuerso caluariæ fauciata; planè illud declarat, quod vlcus in tramate tum exaruit velut sale conditum; caluaria verò quæ fuerat perpolita, nunc apparet vermiculata & flaua. Inflammationis argumenta sunt pustulæ sparæ in lingua exudante sero ab inflammatione, vt in phreniticis. Sed illa translatio non fit ab vna cerebri parte in alteram, verum per vasa quæ vtrique parti communia sunt.

Conuulsio vtraque traumati superueniens per contractionem aut collectionem iniussam, mortifera est: illa quidem à distensione nerui aut chordæ, in fractura calcis; ab exhausto, in vulnere per hæmorrhagiam; ab inflammatione, per epigenesin aut metastasin in tramate quadruplici capitis: hæc verò à resolutione musculorum partis nobilissimæ temporum. Mortifera est autem ob συνπνίαν symptomatis, quæ curationis tempus expectare non potest; ipsa verò doloris acerbitas, & actio intercepta nobilium partium, κατὰ τὴν ἐν τῇ κεφαλῇ πλεονάζοντα, & ὁξὺν ἵαταιν ὀνίφει. i. vires cito resoluit, & tuam mortem inducit. Galenus comment. ad aphor. 25. 2.

10 Σπασμὸς ἐπὶ πυρετῷ χρομόδμος· ὀλέθριον· ἥμισυ δὲ παιδίοισιν. Οἱ δὲ πρεσβύτεροι ἐπὶ αἰτέων· ἐν πυρετῷ ἔχ' ἀλίσκονται ὑπὸ σπασμοῦ· εἰ δὲ μὴ, ὀλέθριον.

Conuulsio febris superueniens omnino funesta; perraro autem puerilis. Qui vero septem annis prouectiores sunt, conuulsione non tentantur in febre: sin autem, desperati.

INTER symptomata συνυμνόμενα febrium acutarum, desperabilem maximè vitæ salutem ostendit conuulsio; cum scilicet tanta est eius per ardorem & siccitatem è natura egressio, vt nulla redintegratio sperabilis esse possit. Huiusmodi est dētium stridor fanaticis, oculorum ἰσχυρὰς, palpebrarum irem & labiorum peruersio. Huiusmodi sunt etiam deliria cum tremore & palpo coniuncta, quæ valde phrenitica esse dixit. Itaque talis conuulsio, & partium conuulsarum offensio, & causæ ipsius conuulsificæ cōtymacia citam mortem venire facit atque denūciat. Denique cōuulsio febris acutæ superueniens ab exhausto principiorum & partium solidarum, ad vltima ventum esse testatur. Secus est de conuulsione illa quæ febris finem adfert, quando & fugax est ipsa, & primo febris die, aut postridie, aut ad summum perendie incidit. Non enim hæc febris naturam sequitur, vnde viuacitas partium & principiorum assumitur, atque quodammodo liquitur: sed potius fortem naturæ contentionem, quæ multum oppressa, causam oppressionis, adiuta calore febrili, exprimit è venis in musculosum genus; eaque exclusio fit intus foras, & commodo agri. Sed in hac prognosi comparatio fit efficientis causæ & suscipientis, vnde conuulsio accidit in morbis acutis. Atque maiori periculo locus esse docetur ex calamitosa vi efficientis, quam ex naturali præparatione suscipientis. Docetur autem his verbis.

CONVULSIO FEBRI SUPERVENIENS] i. Quæ febris rabificæ incendio perurentis, aut bilis effera translationem ad cerebrum facientis consecutaria est. Nam febrium acutarum conuulsio prænūcia, fere habet symptomata paraphorica, vt Hippocrates annotauit in pueris grandioribus supra septennium.

OMNINO FUNESTA] Quoniam omnis conuulsio ab exhausto nata, semper idem facit atque significat. Cætera autem quæ ad crisin apparent, aut quæ ipsamet causæ sunt critica; non semper eodem spectant, faciuntve idem: sed vt sunt morbi tempora, sic illa bonis aut malis agri rebus apparent & fiunt. Atqui conuulsio superueniens cum exaruerint nerui à febre tanquam ab igne, non aliò spectare potest quam ad mortem, ipsamque nō rarò celerius opinione facit venire. Atq; vt talis conuulsio nunquam incidit, nisi pestiferum aliquod deterrimūque signum accesserit, qualia pleraque in phrenitide exoriantur; sic nulla vis maior naturæ, quam conuulsione potest adferri.

PERRARO, AVTEM, PVERVLIS] Quoniam ut omnium ætatum nulla est ad convulsionem tam prona quam puerilis infra septennium: sic omnium facillimè liberatur & expeditur virtute caloris nativi, qui tantus in ea est, quantus postea nunquam. Est quidem infantia triplicis natura convulsioni obnoxia propter nervorum infirmitatem. *Tois οἰκείois τοσῆμασιν εὐδαμοντέροι πάντες. i. Proprijs morbis facili omnes* aph. 32. *corripιονται.* Sed tamen illa ætas non ita periclitatur ob convulsivæ causæ magnitudinem, & symptomatis acerbicatem, quam cæteræ. Ac nusquam alibi locam magis habet aphorismus ille quam in puerili convulsione. Est autem aphorismus huiusmodi. *In morbis minùs periclitantur, quorum natura sunt illi congeneres, &c.* Etenim causi gravissimi sunt Æthiopibus, vehementia: Scythijs autem magnitudine & inueteratione concepti iam pridem ardoris. Iam verò illud *ἡ κίσα*, perraro vertimus, convenienter; ut esset antithesis prioris sententiæ qua convulsionem dixit omnino funestam.

QUI, VERO, SEPTEM ANNIS PROVECTIONES SVNT] i. Qui processerunt ætate ultra septennium; quò tempore finitur infantia, calor nativus lumen suum ostendit, facultas animalis lucet, firmiores sunt nervi; actum pueri certò pede signant humum.

CONVULSIONE NON TENTANTVR IN FEBRE] Quòd eorū natura febrium acutarum nondum sit capax, nec inflammationum sÿstrophicarum in thorace & hypochondrijs; ut esse solet post decimumquartum ætatis annum, iuxta illud. *Ἀπὸ ἰδ. μεγρί β. καὶ μ. ἐπὶ τῶν, πᾶμφορος ἡ φύσις τοσῆμασιν ἡ δὲ τῆς σῆμα-* infra *τῆς. i. A decimoquarto adquadagesimumsecundū, natura est morborum omnium ferax.* Huc accedit quòd nervos habeant succi plenos, multo nectare vivifico perfusos & illustratos; vnde nec tam faciliè absumuntur à febrili ardore tanquam ab igne, nec tam faciliè inflammantur.

SIN AVTEM, DESPERATI] Ac si diceret; si conuellantur pueri exacto septennio, nec vlla sit excusatio præhumidæ tempestatis, qualem descripsit hist. 2. vniuersali 1. Epid. accesserit autem pestiferum aliquod deterrimū que signum, qualia pleraque in phrenitide exoriantur; proculdubio sunt desperati, ex amplificatione causarum; inflammationem dico & consumptionem nervorum, quas naturæ bonitas in complexione & temperamento arcere non potuit, cum pari symptomatum acerbitate, quæ non minùs pueros exercet quam cæteros. Quò enim pueri post septennium sunt *δυσκολοί τεροι*, i. correpti difficiliore, eò quoque *δυσκολοί τεροι* & *ἀσθενέστεροι*, i. difficiliore curatu, & magis desperati, si fortè convulsionibus prehendantur.

30 **II** Σπασμοδ λυλικὸν πυρέλοσ ἐπιχούμνιοσ ὁξὺ μὴ πρετόρον γερονώσ
εἰ δὲ εἴη πρετόρον γερονώσ, ὄροξωδείσ. ὠφελές δὲ καὶ οὐρα διεξοδος
υαλθειδοῖσ πολλοδ, καὶ ῥύσισ κοιλίνσ, καὶ ὕπνοι.

Convulsionem sanat exorta febris acuta qua prius non fuit; quòd si prius fuerit, exacerbata. Quinetiam prodest. urinam fluere albumineam, alium ferri, & somnos inire.

40 **VETVS ILLA** dictatoris opinio est, τὸ θερμὸν, ἀσπασμὸν πεταλὼν τε παρηρεκλὼν, i. calidum convulsionem tepidam: que lenit. Et rursum, τυπείσι τὸ θερμὸν φίλον & κτείνον τὸ δὲ ψυχρὸν πλέμον & κτείνον. i. His calidum amicum est & iudicat: frigidum inimicum & necat. Sed magni refert atque interest scire quale sit illud θερμὸν. Sanè idem significat in aphorismis, quod in prognostico ἡρμασμα. Est autem id calidum, suavitate & moderatione caloris, vivacitati partium consociata, tensionem exoluens, intemperiemque mitificans: quæ duæ sunt dolorificæ causæ; proptereaque *δυσώδμων* nominatur: cuiusmodi præscripsit Hippocrates ad leuationem doloris pleuritici, & inflammationis sÿstrophicæ curationem. Sed moderationem illius caloris, vnde sit redintegratio partium è natura egressarū, declarat illud maximè, vbi docetur, perfusione multa frigida, convulsionem tetanūque exolui in corpore iuuenili, quadrato, solido, & succi pleno: si tale corpus ætate media perfundatur in vlcere vacuitate. Id autem fieri per *ἐπανέκλησιν τῆς θερμότης*, i. revocationem caloris, cui sanatio debet accepta referri. Sic enim ait, *Ἐρμην δὲ τῶντα ῥέεται*, i. hæc autem dissolvit calor. Sed multum interest inter illud θερμὸν, & febrè. Est quidè τὸ θερμὸν, vti iam dixi, φίλον & κτείνον: febris autem *πυλόμενον & κτείνον*. Enimvero maior sit iactura nostri à febre, septem diebus, quam ab illo calido septuaginta annis. Septem diebus moritur adolescens tabifica vi febris consumptus, qui septuagenarius erat facturus duce nativo calore. Quid igitur? nonne miraculo apponi debet sanatio quorundam morborum à febre? Sed tamen dictatoris auctoritate frangi debemus, qui ratum id esse voluit, persuasumque omnibus. *Febrem in convulsione oriri melius est, quam convulsionem in febre.* Et, *Si quis ebrius repente obmutescat convulsus, moritur, nisi febris exoriat.* Et, *Quartana epilepsiam sanat.* Et, *A convulsione habitum aut tetano superueniens febris liberat.* Et quia nusquam alibi sanata convulsionis à febre ratio distinctioque melius expressa legitur quam in hac prognosticè re maximè fuerit eam fideliter enarrare, ut ea sit nobis aliarum instar sententiarum hac de re conscriptarum.

Ergo. **CONVULSIONE]** Repentè exortam, qualis non ratio incidit, nervis à frigido & glutinoso humore distentis, vnde contractio iniussa partium affectarum; aut quæ laxatis musculis congeneribus vel antagonistis collectio partium oppositarum omni culpa vacantium, sua sponte accidit, non no-

lib. 5. aph.
lib. 2. prognos.
lib. 5. aph.

aph. 21. 5.

aph. 26. 2.
aph. 5. 5.
aph. 57. 4.

stra. Non enim hic locum habet conuulsio ab exhausto, vel ab inflammatione neruorum.

SANAT] Ad verbum, exoluit. Nam soluere & sanare idem sunt apud Hippocratem, si tantum ex-
ceperis sarcasum illum qui legitur in verbo *λύει*, aph. 26. 6. Et *λύει* in omni doctrina Hippocratis, sa-
natio est quæ cernitur in redintegratione corporis è natura egressi. Ergo. **CONVULSIONEM SA-**
NAT] i. Redintegrationem adfert partibus è natura egressis, facitque vt dominatu nostro & *κατα-
κλίσ* iam moueantur partes, quæ *ἀνασπέντες*, vi causæ morbificæ, contractæ manebant, & sua sponte non
nostra, ex euentu collectæ. Denique facit *ἐπανόρθωσιν* *τῶν μελῶν* *καὶ τῶν ὀστέων*.

part. 5. sect. i.
6. Epid.

EXORTA FEBRIS ACUTA] Dolorificæ conuulsionis & vigiliarum confectaria, ex collectio-
ne, motu, putredine bilis acerrimæ, quam genuit doloris acerbitas cum vacuitate somni coniuncta. Ni-
hil enim tā facit ad sanguinis corruptionē, quàm dolor & somni vacuitas. Hinc vomitiones æruginosæ
nephriticis. Et quemadmodū nihil æquē facit corpus infirmū atq; dolor: sic ad corporis infirmitatē ad-
iungit humorū corruptionem. Atqui de cōuulsione, quamobrem illa sit insanabilis à siccitate, sic phi-
losophatur Galenus. *Οὐκ ἀπαμείνεται χρόνον ἡ Καλονία τῶ νοσήματος· διὰ τὸ ἐξ ἡ καλονίας μὲ τὴν δύναμιν, ὅτι καὶ τὴν
ἐνέργειαν.* i. Mora in doloris cruciatu nulla est: sed citò vires exoluit, & citam mortem inducit. Ex quo efficitur
summa doloris esse omnia in conuulsione. Febrem verò dixit acutam, quæ celeriter, continenter, & ve-
hementer mouetur; quam ideo posuit vt sit par conuulsificæ causæ, nec frustra ciendo glutinosum hu-
morem conuulsificum, peius agatur cum ægroto. Nam quicquid humorem ciet, neque excludit aut
dissipat; oppressionem facit. Quod legimus contigisse Numenij filio, cuius apoplexia repente coorta,
alioqui sanabilis, exorta febre diuturna, facta est omnino funesta. Τὰ ἐξ αἰφνης ἀποπληκτικὰ λευκώματα, ὅτι καὶ
περὶ τὴν χρόνιον· ἀέθρια· ὅτι ἡ Νυμφίου υἱός. i. sanabilis alioquin apoplexia repente coorta, superueniente lenta febre,
enadit mortifera: exemplum in Numenij filio. Ergo febris acuta fortiter oppugnando; vtramque expugnat
conuulsionis causam; glutinosum humorem, & frigus. Idem quoque facit aduersus paralyzin muscu-
lorum congenerum vel antagonistarum vnde conuulsio accidit partis oppositæ per iniussam colle-
ctionem. Exhaustit enim serū quo madescabant partes quas docet Auicennas per ingressum currentem
resolui. Verū enim uero vt febris acuta bene meretur de neruis glutinoso & frigido humore distentis,
ipsam tensionem exoluendo, & intemperiem frigidam corrigendo: sic eorum naturæ bellum indixit
quando iis redintegratis, & sublatā conuulsione, vis eius calefaciendi & resiccandi, neruorum substan-
tiam labefactat.

prol. 50. l. 2. i.

QUÆ PRIVS NON FUIT] Talis enim frustra ciendo glutinosos humores, oppressionem facit
vnde venit tremor, vt Pythioni: aut neruos distendit, inde conuulsio; cuiusmodi multis exorta est tem-
pestate humida frigida & aquilonia secundæ vniuersalis historię primi Epid. Plurimis nata sunt conuulsio-
nes, præsertim autem pueris per initia: febricitarunt, inquam, & febricitantibus conuulsiones superueniunt. Et
rursum. Quibus toto capite grauitas erat, cordisque morsus & anxietudo; biliosa & pituitosa vomebant. Ac ferè
puerulus sic affectus, potissimum incidebant conuulsiones. Mulieribus autem præter illa mala prædicta, sum verò la-
bores hysterici: grandioribus autem, & quibus iam color languet effectus, paraplegia, insania, & cecitates. Ex
quibus apparet, omnia repleti capitis symptomata, in primigenia febre statim oriri. Sunt autem,
cephalalgica, paraphorica, cataphorica, & catarrhoica. Est enim magna vis in febre ciendi catar-
rhum cuius appulū grauissima quæque symptomata nasci solent. Atque vt in stillaritiis aquis chy-
mica arte factis, non nisi extincto foco stillandi finis sit: ita catarrhus in febre non prius subsistit,
quàm ipsa quieuerit.

AUT SI PRIVS FVERIT] Sed impar nimix humoris abundantix, quæ ab illa febre agitata
neruos distendit magis, & contumaciam auget conuulsionis, vnde acerbitas maior doloris quæ vires
exoluit, & cita morte atque crudeli funesta est.

EXACERBATA] Celeritate, vehementia, & assiduitate: propter feritatem bilis quam genuit
Καλονία cum vacuitate somni coniuncta.

QUIN ETIAM PRODEST VRINAM FLVERE ALBUMINEAM] Ac si diceret; triplex
est omnis ratio exoluendi conuulsionem quæ sit distentis humore frigido & glutinoso neruis, vna, cō-
sumptio quam facit exorta febris acuta quæ prius non fuit; altera, vacuatio materiæ conuulsificæ; ter-
tia, concoctio siue pepasmus. Ac vacuatio quidem materiæ cōuulsificæ natura & artificio ad imitatio-
nem naturæ comparato, suscipitur atque absoluitur perirrheæ & diarrhœæ; illa vesicæ; hæc verò in-
testinorum & alui. Perirrheæ cernitur in vrina multa crassa & alba, quæque plus habet mucosæ, vt ita
dicam, quàm liquoris. Vt enim talis vrina materiam præripit & occasionem abscessuum in articulis fu-
rurorum: sic eosdem sanat obortos, non secus atque suppuratum pulmonis cui denegata expurgatio
spem in angusto posuit. Est autem peræquē facilis à forti naturæ contentione translatio è neruis ad
venas, quàm ab iisdem venis ad neruos: vnde non raro in febribus exoriuntur tremores deliriorum
prænunciij. Albumineam verò dixi vrinam quam ipse vitream nominauit: qualis apparet in calculo-
sis vesicæ.

ALVVM FERRI] Pituitosis excrementis, tum à cerebro, totoque corporis habitu, tum verò à va-
sis & neruis lumbaribus in mesocolon & intestina crassa; vnde gibberosæ luxationes lumborum à tu-
berculo natæ curantur per dysenteriam, quemadmodum per varices.

ET SOMNOS INIRE] Arctiores quidem: sed tamen suaves, nec turbulentos & importunos
stertore & oris hiatu, aut stridore dentium infueto. Nam somni suauitas quæ dono diuinum gratissima
serpit in prima quiere, opportunitatem arguit somniferæ materiæ, temperatæque cerebri & mentis trā-
quillæ: nisi doloris acerbitate & *Καλονία* conuulsionis, dormiendi occasio præripiatur. Atque illa somni
suauitas potissimum in pueris. locum habet qui conuelluntur ex facili, & quorum à morbis redinte-
gratio com-

ratio comparari solet per somnum. Cernitur etiam somni benignitas in ebriosis qui obmutescunt repente conuulsi, quando ad eam ventum est horam qua exoluntur crapula, & vocem amissam recipiunt. Pertinet autem particula hæc decisionis propositæ ad distinctionem illius prognoscos. An sopor totum sit malum?

Coac. 1. cap. 2. lib. 2.

12 Τῶν δὲ ἐξαπίνης ἀποασμῶν λυλινὸν πυρετὸς, καὶ κοιλίης ρύσις.

Repentina conuulsionis remedium est febris, & alui profluvium.

10

HIC NULLÆ sunt meæ partēs nisi vt referam me ad commentarium superioris prognoscos. Quod certè sufficiet.

13 Ἐν τοῖσι ἀποασμοῖσι ἀναυδία ἴππολυ· κακόν. ὃ δὲ ἴππὶ μικρόν, ἢ πηγλώσεως ἀποπληξίῳ, ἢ βραχίονος, καὶ τῷ ἴππῳ δεξιά σημαίνει. λύεται δὲ ὕρσοισιν ἐξαπίνης ἐλθοῦσι πολλοῖσιν ἀφροῖσι.

20

In conuulsione diu obmutescere; malum. At verò parumper; aut lingua apoplexiam, aut brachij, partiumque dextræ sitarum denunciat. Exoluitur autem urinis repente multis & cumulatè proruptis.

EST QUIDEM dolorificæ conuulsionis *ἀναυδία* intolerabilis atque funesta, quando accessione habet intercepti officij ad vitam tuendam necessarij. Vt enim conuulsione nihil est naturæ acerbius, quodque celerius naturæ vires exoluit: ita nihil cita morte atque crudeli funestius, quando ad eam symptomatum calamitosam vim accedit musculorum & neruorum vocalium & dialecticorum firmiter fixa contractio, vnde homines voce capti & muti redduntur. Ibi tum manet ἡ ἀναυδία, & in propinquo mors.

IN CONVULSIONE] Quam facit neruorum tensio aut inflammatio, vnde iniussa contractio partium quæ naturaliter iussu nostro cum voluntate mouentur.

DIV OBMVTESCERE] Ob firmiter fixam contractionem distenti, vel inflammati nerui septimæ coniugationis in cerebro, vnæque musculorum nouem quos habet lingua motuum variorum ministros, & quorum ministerio ipsa verborum est dædala. Sic enim vertendum nomen putauit τῆς ἀναυδίας, quo significatur impedita loquendi facultas per interceptionem organorum dialecticorum: sicut aphonia per contractionem, aut resolutionem musculorum & neruorum vocalium. Qua de re alibi satis multa.

40

MALVM] Ne dicam mortiferum: propter contentionem conuulsionis, vnde conuulsificæ causæ accrescunt, ob generationem perennem humoris morbifici. Nam de silentio melancholico nihil necesse est loqui. Est igitur graue malum in conuulsione, loqui non posse. Nam & qui ex dolore voce sunt capti, crudeliter moriuntur.

Coac. 1. cap. 2. lib. 2.

AT VERO PAVLISPER] Non quidem vicissitudine garrulitatis & silentij ab excessu melancholico: vt in Dealcis vxore, quam & nugarum garrulitate, & silentio pertinacis animi, eximie phreniticam & fanaticam fuisse narrat Hippocrates: sed libertate nerui septimæ coniugationis in cerebro, quam fortis attulit naturæ contentio excussa materia conuulsifica.

3. Epid.

AVT ILNGVÆ APOPLEXIAM] i. Resolutionem musculorum nouem linguam mouentium, & ipsam verborum dædalum facientium; quorum alij à styloide, alij ab hyoide & cornibus eius, alij à maxilla inferiore & mento exorti, optima conspiratione linguæ inseruiunt. Nec ramen hæc linguæ apoplexia tollit ἀναυδίαν, & fandi potestatem linguæ restituit: sed tantum ipsius conuulsionem exoluit tenuiata conuulsionis materia crassiore, quæ facta tenuior, per quendam veluti ingressum currentem, vt loquebatur nuper Auicennas, contractionem vertit in laxitatem. Est autem paralyseos & conuulsionis par & æqualis ἀκίνησις, i. immobilitas, quæ certè in lingua parit ἀναυδίαν. Atque notabilis hoc loco est significatio apoplexiæ, pro resolutione partis, quæ alias toto corpore resoluta ipsam tollit animalitatem per motus & sensus priuationem.

AVT BRACHII PARTIUMQUE DEXTRÆ SITARVM DENVNCIAT] Per materiæ abscessum qui fit κατ' ἴξιν. Quemadmodum enim rheuma concitatum ad caput quod hæmorrhagiam ciet, vel paraphorica edit symptomata, cietur κατ' ἴξιν hepatis quod ἰκμάλεον vocat Hippocrates: ita con-

lib. 2. πρὸς γυναικίαν.

lib. 2. & 6. Epid.

Coac. 1. cap. 13. lib. 2. hist. 3. part. 3. 3. Epid.

hifl. 8. part. 2.
3. Epid.
hifl. 5. part. 3.
3. Epid.
hifl. 9. part. 3.
3. Epid.

dextro illoſus fuit. Ac de Oecetæ vxore ſcriptum illud eſt. Τετάρτη παρέκρουσε, φέβει, δυνάμειαι, δεξιῶ ἰσχυρῶν. i. die quarto deltrauit, metus, infractio animi, oculi dextri peruerſio. Lariffæ Caluus dextro femore doluit, tertio die dolor quicuit, non fuit apud ſe, quarto crudeliſſima morte interiit. Heropyto ab hæmorrhagia cum ceſſaſſet, iſchio dextro acerbus dolor obortus eſt. Herophonti lien intumuit, inde bubo ſiniſter, mox in crure κατ' ἴσιν factò abſceſſu, præter ſpem cōualuit. Eſt enim maior vis poſita in forti contentione nature partis obſeſſæ ad faciendum & ad propulſandū κατ' ἴσιν, quàm in venarum ductu & ſiru. Sunt autē ſiniſtra ſiniſtris ὁμοφυλῶς & ὁμοφύσιν, dextra dextris. Erit igitur illud ratū, quòd vnde μελίστασι, i. translatio, ibi κατ' ἴσιν ἀποδύσιν ἀποδύσιν, i. p. decubitiū abſceſſus duce natura: ſicut ἀποδύσιν κατ' ἐκρολῶν, i. per excretionē fieri ſolet κατ' ἴσιν.

EXOLUITVR AVTEM] i. Saniatur ἐνχεῖτως & ἐνσώμως, cum certis ſignis & iuſtis cauſis: vnde cetera ſit atque ſtabilis redintegratio partium ē natura egreſſarum.

VRINIS] Quarum prima laus eſt ſanandi ſymptomata catarrhoica, vt demonſtratum eſt ſuperiore prognōſi.

REPENTE] i. Αὐτομάτως καὶ ἐξαίφνης.

MVLTIS] Quia nihil paucum eſt criticum. Omnis autem abſceſſus, cuiusmodi eſſe debet, vt neque ſit paucitate inutilis, nec magnitudinē intolerabilis.

ET CVMVLATE PRORVPTIS] Qui excretionis modus verē eſt criticus: vt in ſudore & hæmorrhagia, in quibus damnantur ſudatiuncula & ſubſtillum; vt nihil prætermiſiſſe videatur quod ad legitimam & verē criticam excretionem pertinet in qualitate, copia, occasione, & excretionis modo.

14. Ἰδρῶτες δὲ αἱ μὲν καὶ μικρὸν ὠφελέουσιν. αἱ δὲ ἀφροί, καὶ αἱ τῶν αἱμάτων ἀφαίρεσις βλάπτοι.

At verò sudores qui sensim exudant, prosunt: confertim autem prorupti nocent, & larga detractio sanguinis.

PARTICULA δὲ, huius prognōſeos cum ſuperiore dioriſmum oſtendit. Eſt autem huiusmodi. Quemadmodum reſolutio partium dextrā ſitarum, conuulſionis aphoniam facientis conſectaria; vrinis repente multis & cumulātē proruptis exoluitur atque ſaneſcit: ita ſudoribus confertim manantibus, & larga detractio sanguinis ruit in peius, vnde paralyticus homo læditur, cuiusque paralyſis redditur planē ἀρίατος. Secus eſt de acutis febribus, ac de ſyſtrophicis viſcerum inflammationibus. Huiusmodi enim morbi & liberali hæmorrhagia, & sanguinis profuſa vacuatione, ſudoribus item iure & loco multis, & quibus diffluit totum corpus: curationem recipiunt. Et verò nihil neceſſe eſt huc aduocare ſalutarium illarum criſeων argumenta quæ vocant inſita & aſſumpra. Quæ cum ita ſint.

AT VERO SVDORES] Ac ſi diceret; ex omni excretionum genere, vrinarum profluencia in bonis ducenda ad curationem paralyſeos quam faciunt in adfecta neruorum fibræ à corrente ingreſſu. Nam ſudor cumulātē proruptus nocet. Idem quoque facit larga detractio sanguinis, vt mox docebitur. Ergo ſudores qui ſunt excluſio intus foras humoris ſuperuacanei tenuis, qui facit in venis febrem, in habitu corporis κόπιν & phymata. Excluditur autem vel expreſſione, vel excretionē, vel exolutione partium ſolidarum.

QUI SENSIM EXVDANT] Non quidem ab oppreſſione venarum humore nimio diſtectarum quæ facit expreſſionem & ſudatiunculam quæ iniriis febrium ad diuturnitatem apparet; nec verò ab exolutione partium effectarum & viuacitate carentium, p̄r irritam aſſimilationem ſucci alibilis, vnde ſalutis deſperatio eſſe ſolet; ſed ab excretionē particulari quam virtus nature ſuſcipit atque abſoluit καὶ λόγον materię mitificat & partis obſeſſæ: non tamen ea lege critica quæ cernitur in criſi febrium acutarum, in quibus nihil paucum eſt criticum. Ibi enim repletionis affectiones, eius propria vacuatione tolluntur, ſi nulla ſit inflammatio, nec cacoehymia maligna. Ac ſæpe accidit vt tot ſint vacuationum genera, quot ſunt repletionis foci & domicilia.

PROSVNT] Quia morbiſicus humor exitum habet, vnde, quòd, quā, & quam obrem decet; idque ſuperſtite partium vnde manat integritate.

CONFERTIM AVTEM PRORVPTI] Sicut prorumpunt in febre ardente, exorto prius rigore critico, vnde cita febris curatio: ſicut etiam toto morbi decurſu, qui faciunt vt æger alacrius ſerat morbum. Huiusmodi ſunt periodici febris tertianæ, qui omnes veniunt vnde cietur rigor; cietur autem ἐκ τῶν ἀγρίων, non vbi ſit ipſa rigoris concuſſio.

NOCENT] Quoniam illi veniunt ἀπὸ τῶν ἐκρολῶν, i. per exolutionem partium afflictarum: ſicut & illi quos mouet intus foras rigor ſymptomaticus ἀπὸ ἐνέων. Ergo reſolutæ iam partes, omnino effictæ reduntur. Valeant igitur qui ſudorificis paralyticos faciunt deſperatos. Explodendi ſunt etiam qui neſario guaiaci vſu contra virulentiam ē viſcerum inflammatione ſudores eliciunt, vel potiùs expriment. Sed vtroque modo ij faciunt καὶ ἐλθιν, καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν, i. attrahendo & impellendo. Omnes autem ſudores malè cieri dixit præceptor ἢ ἀπὸ τῶν ἐκρολῶν τῶν θυμαίων, ἢ ἀπὸ τῶν ἐκρολῶν φλεγμονῆς, i. corporum exolutione, aut inflammationis contentione.

ET LARGA DETRACTIO SANGVINIS] Quæ ſacultatem retentricem reſoluit, neſar viſificum diſſipat, καὶ τὴν ποτῆσιν παρὶς, i. ventris labem.

15 *Εν τοῖσι τετανοῖσι καὶ ὀπισθοτόνοισι χύμεις λυόμεναι θανάσιμον. θανάσιμον δὲ καὶ ἰδρῶν ἐν ὀπισθοτόνῳ, καὶ τὸ σῶμα διαλύεσθαι, καὶ διεμεῖν διὰ ῥινῶν, ἢ ἐξ ὀφθαλμοῦ ἀφῶνον εἶναι βοᾶν, ἢ φλυηρεῖν. ἐς γὰρ τὴν ὑπεράλω θάνατον σημαίνει.*

In tetano & opisthotono maxillas luxari; funestum: funestum est etiam sudare in opisthotono, & corpus resolui, & per nares reuomere, ipsumque qui ab initio voce captus erat clamare, nugari: hac enim ad mortem postridie venturam apparent.

OMNIS conuulsio affectionis modo, idea, & causa, partium conuulsarum natura & officio, symptomatum inde venientium accessione & successione; omnino ad prognosin debet adduci. Sunt autem symptomata quæ vocant *ἐπιχρύματα*, & *ἐπιφαινώματα* cum affectionis idea, partiumque obfessarum natura & officio, his verbis descripra.

IN TETANO] In contractione qua ceruix obriguit, rectaque & intensa manet immobilis; æquali contentione violenta & iniussa musculorum congenerum & antagonistarum ipsam quoquouersus mouentium. Sunt autem transuersarii duo, toridem spinati extendentes; longi duo sub œsophago, flectentes; & scaleni duo à prima thotacis ossea costa in omnes apophyses ceruicis transuersas. Tetanum Celsus vocat rigorem: sed quàm bene & appositè viderint sapientes. Nam si bene vertit, quo nomine exprimet Græcum illud *ῥῖγος* ex illo aphorismo? Τὸ ψυχρὸν ἀπαισιμαῖον, πῦρ, ῥῖγος, πυρετὸς δὲ αἱ. *Frigus conuulsiones facit, tetanos, nigrores, rigores febiles. Quæ locum ipse Latinum fecit his verbis. Frigus modò neruorum distentionem; modò rigorem infert (illud ἀπαισιμος, hoc verò πῦρ Græcè nominatur) nigriciem in vlcerebus, horrorem in febribus excitat.* Sed vnde religio illi fuit nominare Græcum *ῥῖγος*, Latine *rigorem*? quoniam tetano explicando id nomen iam vsurpauerat. Sed vt reuertar ad tetanum. Est quidem tetanus emprosthotoni & opisthotoni velut neutrum quoddam, æqualiter vtriusque particeps, & ex vtroque consistens; vt neque mentum pectori, neque caput scapulis annectatur; quod fieri solet, illud quidem in emprosthotono, hoc verò in opisthotono: sed rectam & immobilem ceruicem intendit, quamuis etiam in dorso & lumbis exoritur tetanus.

ET OPISTHOTONO] i. In illa conuulsione ceruicis quæ scapulis caput annectit. Quod sanè accidit contractis à morbo tendinibus partis posticæ, quorum cerè afflictio venit vel ab angina, vel ab vna, vel à tonsillis inflammatione obfessis: nonnunquam ex febre à capite propagata, conuulsio venit.

MAXILLAS LUXARI] *Τὴν κατωτέρω, maxilla inferiorem intelligit. Est enim sola hæc luxationis capax quamuis ægrè, nec nisi contentione forti & contractione musculorum maxillam aperientium. Nam superior maxilla, vt ait Hippocrates, ἀπρεμεῖ. ὀλιγώρηται γὰρ τῇ κεφαλῇ, & ὡς διήρδεται. ἢ ὡς κατὰ γὰρτος κινεῖται ἀπὲρδεται γὰρ τῆς ἀπὸ γὰρτος, καὶ ἀπὸ κεφαλῆς, i. quiescit: innectitur enim capiti, sed non insinuatur vt articulus. At maxilla inferior mouetur, vt quæ articulorum modo cum superiore & capite committatur. Ergo maxillam luxari, vi luxatur in conuulsionibus & tetanis prima omnium, contractionem tetani & opisthotoni indicantibus. Hippocratis verba sunt hæc. Διότι μὲν οὐκ ἐν ἀπαισιμαῖον καὶ τετανοῖς τὸ πρὸς τὸν ὀπισθὸν ὀπισθιμαίναν σιωπᾶμεν. Ac illa fortis contentio non minùs coarctationem facit maxillarum inter se, quàm inferioris à superiore auulsionem. Nam & Hippocrates author est huiusmodi ferè symptomata esse tetani. Αἱ χύμεις πηγνύται, καὶ τὸ σῶμα διαίρειν & διαύρται. i. Coalescunt genæ, nec possunt os diducere. Quinetiam suprà iam demonstratum est ceruicem quæ obduruit siue obriguit, hæc posse adferre incommoda. Ceruicis duritas & dolor prægandus, maxillarum item coarctatio, venarumque iugularium pulsus fortis, vnàque chordarum distensio; mortifera sunt hæc. Nec minùs mortifera est coarctatio, quàm ipsa luxatio. Sed vtriusque mortifera vis aperitur in eo quod sequitur.*

MORTIFERVM] Nam tetano peracuto citissima crisis est ad crudelem interitum, ob eam sanè causam quòd acerbiter emprosthotoni & opisthotoni simul natura diutiùs ferre non potest. Itaque citò victa dolore & grauissimorum symptomatum concursu, citæ etiam mortis atque crudeli succumbit. Nulla enim crisis ad salutem fit vbi ad calamitosam vim morbi accedit summa naturæ infirmitas. Sed inter symptomata in tetano exorta nullum citæ morte atque crudeli funestius quàm maxillarum coarctatio, luxatio, & cibi per nares exclusio. Nam si luxatio simplex & sola per se ipsa mortifera est, nisi continuò reponatur; cuiusmodi esse illam iudicandum est, cuius redintegratio nulla sperabilis esse potest in tetano? Vt enim tetanus maxillam luxauit: ita luxatam in eo virio continet quandiu manet. Atqui prolapsæ maxillæ, nec dum repositæ & restitutæ sunt hæc. Nam *κίνδυνος ἀπὸ ψυχῆς ἐπὶ πυρετῶν ἔχουσιν, καὶ τοσούτης καρδίης, i. periclitatur anima à febre continua, & seignicie veternoſa.* Est enim consentaneum vt distensione & alteratione grauiter afflicti muscoli, proptereaque inflammati, vicinia & societate ce-
 60 rebrum similiter quoque afficiant, quod sic affectum consecutionem adfert acutarum febrium, vnàque deprauatarum animi actionum. *Comatosi sunt hi muscoli aliterati & distenti contra naturam.* Igitur sic affecto cerebro & exorta febre, solet venter deijcere biliosa, syncera, pauca: & quæ vomunt, syncera sunt. Quæ omnia cuiusmodi sint & vnde fiant appereant, vtile est discere ex doctissimo Galeni commentario ad hunc locum. Sequitur autem. Οὐτοι οὐκ ἐν ἀπαισιμαῖον δεικνύται μάλιστα. i. Atque hi moriuntur ad circiter decimam morbi diem. Sed quod initio posuimus non minora esse mala, nec minùs mortifera maxillarum

sibi inuicem fortiter annexarum inuitis nobis, quàm eadem ratione pariter diductarum; palam fit ex contractione & conuulsione propria musculorum crotaphitarum, quorum sic affectorum distentio & alteratio maior est quàm attractorum in luxatione inferioris maxillæ, virio & contractione musculorum duorum exilium qui à styloide apophysi eò feruntur & inseruntur vt os aperiant. Hic etiam cerebrum similiter affligitur, vt inflammatione afflicti crotaphitæ musculi. Hinc præter cætera symptomata quæ sunt in cerebro, aliud duci solet bile panca syncera. Hinc etiam syncera bilis vomitio. Etenim dominatu acutissimarum febrium, biliosa meraca gigni in corpore nouum non est: siquidem pinguis humor, tenera caro, & recens pressa liquitur ab huiusmodi febribus, & sanguis assatur, conflaturque incendio. Quod autem colliquamenta hæc confluant quoque in aluum & intestina; id sanè proprium est partium nervosis condolentium, cuiusmodi est præter cæteras nervosissimum ventriculi orificium quod esse solet lipopsychiæ obnoxium quando experitur vim acrium tenuiumque excrementorum, qualia multa confluunt quando nervosæ partes inflammatione & febre tentantur.

MORTIFERVM EST ETIAM PVDSARE IN OPISTHOTONO] Hic legere malim, **RIGERE**, ex illa prognosi. Cum opisthotono rigor necat. Enimvero nulla est æquitas opinari sudorem in opisthotono esse mortiferum. Etenim contractio nervorum, sudore exoluitur, quando sudor sensum exudat virtute naturæ partis oppressæ, & λόγον materiæ distendentis & conuulsificæ. Sed ipsa rigoris concussio, tamen si transitum bonum habere videtur à conuulsione ad concussionem: nihilominus tamen quia concussio illa sensationem excitat frigoris conuulsifici partium posticarum, vnaque cum necessitate spirandi summam infert difficultatem; efficitur vt tantorum accessione malorum rigor ille cum opisthotono sit planè mortiferus.

ET CORPVS RESOLVI] Vt enim melior est resolutionis in conuulsionem transitus, quàm contrà: sic virium à contentione conuulsionis exolutio, vt cita est; ita crudeli morte funesta. Atqui iam demonstratum est quod ipsa conuulsio, maximèque tetanus & opisthotonus, & vna vires citò efferas reddit, & acerbissimam infert mortem.

ET PER NARES REVOMERE] Quod est symptoma cynanches veræ quæ tria hæc secum habet coniuncta, gutturis intolerabilem dolorem, orthopnoeam, & cibi atque potionis per nares expressionem, quando ad vltima ventum est. Hippocratis illud est super hac re proposita. Οὐτως δὲ παραδίδης ἢ, πὸ πόνον, καὶ τὰ βρώματα διὰ τὰς ρίνας ἀνέρχεται. i. Instante morte cibis potusque naribus effluebat.

IPSVMQVE QVI AB INITIO VOCE CAPTVS ERAT, CLAMARE, NVGARI] Huc pertinet illa prognosis. Cervicis dolor cum in febre omni terrificus, tum verò pestiferus iis qui sunt in metu insania. Et illa. Quæ in febre conuulsoria sunt aphonia, si fanatica fiant; mortifera. Atqui clamare, nugari, signa sunt hominis è potestate sui exeuntis. Hæc autè symptomata phrenitica & fanatica, veniunt per translationem aphoniæ cynanchicæ & opisthotonicæ; idque per sympathiam musculorum crotaphitarum & cerebri.


HÆC ENIM AD MORTEM POSTRIDIE VENTVRAM APPARENT] Leguntur multa prognostica salutis & mortis postridianæ. Ac salutis quidem in illo. Lingua ad medianam lineam velut alba salua peruncta, discessionem febris denunciat, idque postridie, si quod superinducitur, crassum est. Mortis autem argumentum certum est in aphorismo. Qui vndeunque à morbo multum emacruerunt, si aliud ducatur atra bile, aut sanguine nigro; postridie moriuntur. Hic autem cerebri iam pridem inflammati tanta est à translatione bilis cynanchicæ & furentis è natura egressio, vt geminata phrenitide & insania, cum breui exaruerit, tum pro clamore silentium; pro iactatione segnicies veteriosa; pro artuum contentione levis tremor, indeque cita mors veniat.

16 Πυρετώδεια ὀπισθοτονώδεια, γυνώδεις ἐρήσεις λύοισι.

Quæ speciem febris & opisthotoni præ se ferunt, vrina genituralis exolunt.

VRINA genituralis, i. genituræ similis, in febricula & leui opisthotono quem angina non facit, nec vna, nec febrium exortarum translatio ad cerebrum, & rursum è cerebro propagatio in ceruicem; talis, inquam, vrina commodo ægri profluit: cuiusmodi beneficium paulò antè iam acceptum est in illa prognosi. Quinetiam prodest vrinam fluere albumineam. De conuulsione autem loquitur à distensione nata humoris glutinosi & frigidi. Consultò autem vertimus τὴν πυρετώδεα & ὀπισθοτονώδεα, i. quæ speciem febris & opisthotoni præ se ferunt: vt reapse nō sit febris acuta, nec opisthotonus firmiter fixus cum forti maxillarum annexione, aut diductione coniunctus: sed lenis & leuiter pressus, ipsa verò febris sepulta & lenita. At enimvero quomodo talis vrina febres exoluit, quæ in acutis mortifera est, in aliis ad diuturnitatem apparet? Historia Philischi nota est, qui cum vrinis genituralibus obiit sexto die: non obscurus est aphorismus ille. Si cui febricitanti vrina reddantur χερμώδεις, i. γυνώδεις, ad diuturnitatem febris apparet. Nec mirum quia in Philisco colliquamenta erant pinguis humoris, carniūque tenerarum & recens pressarum, ipsiusque adeo sanguinis incendio perusti, atque quodammodo assati. Hic verò nimiam ostendit pituitæ abundantiam. Sed quomodo exoluntur? quia cumulatè feruntur atque prorumpunt, vti nuper iam diximus. Atque ita veritatem eruunt quasi è tenebris illius aduersarij verè Hippocratici. Εἰς Περὶ τῶν γυνώδεις ἔστιν ὅ, πὸ χερμῶν. i. In Perintho genituralis vrina nonnihil indicatoria facit.

DE ANGINA.



Α ΚΥΝΑΓΧΙΚΑ μήτε ἐν τῷ τραχήλῳ, μή- CAP. XV.
 τε ἐν τῇ φάρυγγι μηδὲν εἰδηλὸν ποιεόντα, πνιγμὸν δὲ
 νεανικὸν καὶ δύσπνοϊαν ὀρέχοντα· αὐθημέρους καὶ τρι-
 ταίους κτείνῃ.

1 Ea demum angina quæ nec in ceruice, nec in faucibus manifestum quid exhibet, sed fortem strangulatum & dyspnœam infert; eodem ipso die, aut tertio certè interimit.

QVICOQVIO respirationem omnino adimit, vitam tollit: si tantum ὑστερικὸν πάθος, i. hysterica affe-
 ctionem exceperis vnde superstites manent mulieres spiratione amissa. Respirationem omnino adimunt
 20 apoplexia fortis, angina vera, & syncope. Apoplexia quidem, intercepto motu: angina, meatu spirabi-
 li: syncope autem, sublatō spirandi vsu. Quæ causa mouit Hippocratem vt tria illa morborum genera
 instar omnium funestorum, & repentino interitu mortiferorum posuerit in aphorismis. Hic de angina
 dicendum quæ inter cæteras principem locum obtinet mortalitatis. Et verò iure & loco, à terano &
 opisthotono transitus esse debet ad ipsa gutturis & faucium mala. His ita constitutis.

EA DEMVM ANGINA] Ac si diceret. Inter cynanchica mala quæ multa scrupulosè narrantur,
 duo autem suis distincta locis atque symptomatis reuera sunt in omni doctrina Hippocratis; vnum in
 hac prognosi descriptum, vt in prognostico; alterum mox describendum & distinguendum suis quo-
 que diorismis. Nam quæ ab illaqueatione, aut à luxatione ceruicis extrinsecus illata venit angina, cum
 30 illa etiam quæ in febre acuta sine vlla præuidentia exoritur; demonstrationem hic nullam à nobis re-
 quirat. Hic nostræ sunt partes eam cynâchen examinare quam facit inflammatio. systrophica faucium,
 aut muscutorum propriorum laryngis. Ergo. **ANGINA]** i. Dolorifica strangulatio & ὀρθόπνοια, quam
 facit phlegmone systrophica muscutorum propriorum laryngis, à rheumate acris & tenui concitato è
 capite ad venulas vsque laryngis, vbi ex ὀρμημένῳ fit ῥέσμα σπυρσάμενον, i. consistens è concitato; vnde prohibe-
 tur aditu spiritus quem ducendo viuimus, & fumidus vapor exitu.

**QVÆ NEC IN CERVICE, NEC IN FAUCIBVS MANIFESTVM QVIO EXHI-
 BET]** i. Quæ vnà secum non habet coniunctum ruborem atque tumorem faucium, ceruicis, & sterni,
 vt certè habere non potest. Atque hæc signa sunt & argumenta veræ anginae, quæ ducuntur ἐκ τῆς αἰσθη-
 σιτικῆς, i. ex illis quæ absunt: quemadmodum illa quæ sequuntur ἐκ τῶν παραχρηστικῶν, i. ex iis quæ adsunt.
 40 Quasi ita velit. Angina vera quæ posita est in phlegmone systrophica muscutorum gutturis propriorum,
 nihil exhibet aspectabile, nihil tractabile in qualitate corporis, in colore, caractere, & mole partis ob-
 sessæ, partiumque circumiacentium vicinarum & sociarum.

SED FORTÈM STRANGVLATVM] Hæc signa sunt veræ cynanches propria & syllogistica,
 quæ sunt eiusmodi vt sine angina non fiant, neque appareant; ipsa verò angina sine iis non possit exi-
 stere. Ac primum fortem strangulatum infert angina, quæ cum intolerabili dolore libertatem mean-
 di adimit spiritui, inspirando; & fumido vaporis, expirando. Hic enim nulla mentio illaqueationis, nec
 dentis in ceruice luxati: quamuis idem faciant duæ illæ cynanchicæ causæ.

ET FORTEM DYSPTNOEAM INFERT] i. Summam difficultatem spirandi, frequentem &
 paruum: qualis denunciat laborem & inflammationem partium spirabilium. Sed in angina vera, diffi-
 cultas illa spirandi eximia est, ac certè talis vt μεταπεισμοὶ καὶ ὀρθόπνοια, i. sublimem rectamque spirationem in-
 50 ferat, in qua cynanchici non nisi recta ceruice, ac si terano obriguerit, spiritum possint ducere.

EODEM IPSO DIE] Quæ scilicet venit per μεταπνοίαν, i. transitum faucium prius inflammatarum,
 quarum scilicet tumor euauit ἀκεταῶς & ἀσπυρῶς, i. sine suppurato, ac sine ceruicis & sterni rubore; talis,
 inquam, eodem ipso die interimit: quia sunt acerbiora omnia morborum succedentium quam pri-
 migeniorum.

AVT TERTIO CERTE INTERIMIT] Est enim peracutus morbus qui intra primam perio-
 dum crisi habet acerbissima morte funestam, quæ tam citò venit quàm citò vires languent effactæ.
 Quò fit vt natura diutius non sit ferendo, & præter eam doloris acerbitatem; officij pernecessarij va-
 cuitate corruat, extincto & suffocato nectare cordis viuifico δὲ τῷ ἀπνοίᾳ, i. respirationis cessationem, aph. 10. 1.
 60 nisi forte angina mutetur in peripneumoniā quæ intra septimum diem mortifera esse solet.

*2 Τὰ δὲ ὀρμαία καὶ ἔρδθος ἐν τῷ τραχήλῳ λαμβάνοντα· τὰ μὲν
 λοιπα ὀραπλήσια, χρονιώτερα δὲ.*

Meliùs sic in prognostico.

Ονόσαι δὲ κυνάχαι ὡραπλησίως πόνον ὡρέχουσιν, ἐπαίρονται δὲ καὶ ἐν τῇ φάρυγι ἐρυθήματα ποιεοῦσιν· ὀλέθρια μὲν κάρτα, χρονώτερα δὲ μάλλον τῇ περὶ τὸ ἐρύθημα μέγα χύηται.

Qua vero angina similiter ut illa sunt dolorifica, sed intumescunt, ruboremque faucibus inferunt; pestifera quidem admodum, sed longiores predictis, si maior assurgat tumor & rubor.

HIC GENVS alterum cynanches describitur quæ in systrophica faucium inflammatione consistit. QVA VERO ANGINÆ] Quæ sunt eiusmodi, non quidem ὡς πρῶτον καὶ κυνάχαι, i. primò & propriè, ut prior iam dicta & explicata: non enim hæc fortem strangulatum adfert primò & per se, ut illa quæ inde nomen habet cynanches, i. angina veræ: sed καὶ συμβεβηκός, i. ex euentu per μεταπίπτειν huius in illam, aut per vim & oppressionem difficulter deglutiendo ipsi laryngi illatam.

SIMILITER VT ILLÆ SVNT DOLORIFICÆ] Ob inflammationem systrophicam faucium acerrimi sensus, quæ habet tensionem duram, & intemperiem firmiter fixam catarrhi nitrosi è capite concitati. Ergo similiter pariterque ut illæ, sunt dolorificæ: quoniam in parte sensus exacti non minor sensio excitari solet rei molestæ similis & æqualis. Hic nos πόνον ad ipsum dolorem duximus referendum, non autem ad partis laborem in officio faciundo. Ut enim deglutiendi nō tanta urget necessitas quàm respirandi: sic difficultas illius non tam periculosa quàm huius. In angina autem quæ hic docetur, nulla est ὁρμήσις ut in prædicta. Hic difficultas deglutiendi magna est, exigua respirandi.

INTVMESCUNT AVTEM] In faucibus tumor assurgit tractabilis & aspectabilis, à rheumate consistente, quod è capite cietur in fauces, orgasmo, exclusione, & partium obsessarum labore. Sic enim memoriæ proditum est ab Hippocrate, multos qui vocē contenderant clamando ad rauim vsque, anginosos fuisse; alios qui manibus diu multumque laborarant in opere faciundo; multos etiam qui citatis equis longum iter fecerant.

RUBOREMQUE FAUCIBVS INFERVNT] Vnde significatur idea tumoris, videlicet ex rubore qui proprius est phlegmones quæ semper apparet suffusa colore humoris unde assurgit: assurgit autem à sanguinis rheumate consistente. Est enim consentaneum ut qualis est humor, talis & color luceat in parte obfessa. Itaque non rarò nomen τῷ ἐρυθήματι usurpatur ὡς τῷ ἐπάρματι ἐρυθρῷ, ut in illa prognosi, καὶ παρ' οὗ ἐπάρματα, i. paratides rubra. Et verò descripta hoc loco cynanche, dicitur à præceptore κυνάχαιον ἐρύθημα, vbi docet transferri in latus κατ' ἔξω. Καίτοι & τὰ κυνάχαια ἐρύθηματα, καὶ πλευρῶν ὀδυμήματα κατ' ἔξω. Nam vera cynanche non aliò quàm in pulmones descendit, si antè mors cita non venerit.

PESTIFERÆ QVIDEM ADMODVM] i. Plurimos quidem ad exitium præcipitant doloris acerbitate, perenni affluxu catarrhi nitrosi è capite concitati, præterea laryngis ipsius oppressionem quam deglutiendi vis infert, postremò successione veræ cynanches per transitum huius in illam. Sicenim perit quinto die Bythonis cynanchica; quæ priùs verè non erat in rubore ceruicis & sterni: ἀπὸ τῆς φάρυγος, inquit præceptor, κυνάχαι, hist. 5. part. 2. lib. 3. Epid.

SED LONGIORES PREDICTIS] A quibus non tam citò vitam finiunt sic anginosi, quàm à prædicta, nec semper omnino sunt desperati. Nam spūto purulento multo & transitu morbificæ materiæ ad ceruicem & pectus, multi sic anginosi periculo & morbo defunguntur. Quinetiam medicinarum locus est detractio sanguinis è brachio, sub lingua, clysteribus, gargarismis, litu, hapsō, cucurbitulis. Quod faciundum præcepit, ipseque adeo facitavit. Sunt autem longiores in desperatis quàm prædictæ: quoniam intercepti officij dignitate & necessario vsu vincuntur ab illis. Non enim tam in propinquo mors est deglutiendi vacuitate, quàm respirandi.

SI MAIOR ASSVRGAT TVMOR AC RVBOR] Ac si diceret; si nulla sit propagatio, nec vlla translatio faucium inflammatarum ad ipsam laryngem: tunc enim si fiat, celerius moriuntur quàm à primigenia vera angina. Nam qui successione faucium inflammatarum sunt κυνάχαι anginosi, eodem ipso die τῆς μεταπίπτειν crudeliter moriuntur. Sed omnem τῆς ὀρθήσεως & τῆς μεταπίπτειν opinionem tollit faucium insignis tumor cum rubore coniunctus.

3 Οσοιοι δὲ σῶνεξερθεῖν ἤτε φάρυγξ, καὶ ὁ αὐχλὺς, καὶ τὸ στήθος· χρονώτερα· & μάλιστα δὲ αὐτῶν σῶζονται, καὶ μὴ παλινδρομεῖ τὰ ἐρυθήματα.

At verò quibus una rubent & fauces, & ceruix, et pectus; longiores quidem sunt illa: maximèq; ex ijs euadūt, nisi rubores intrò recurrāt.

Hic ego libenter Galeno assentior qui tertium anginae genus in hac prognosi constituit distinctum à duobus praedictis, erysipelate cervicis & sterni, quod nusquam in illis apparer. Reuera enim primum anginae genus, nullum exhibet erysipelas quod sit tractabile & aspectabile. Secundum genus, tantum in faucibus tumorem ruboremque excitat. Tertium verò erit anginae illius in qua cum faucibus una etiam rubent ceruix & pectus. Sed tamen cervicis & sterni erysipelas non facit anginam, cuius reapse ὑπαρξ; inest in phlegmone systrophica laryngis aut faucium. Nam si quis obiciat cervicis & sterni erysipelate minui acerbiter faucium inflammatarum, ut illud concedam: tamen non efficitur speciem inflammationis mutari quandiu manet in faucibus. Huc accedit quod saepe ex illo tumore foris exorto nulla doloris remissio est, nulla laboris faucium phlegmone obsessarum: ut in cynanchica illa Bythonis. Sed omnem difficultatem eximet huius prognoseos enarratio quam sic instituimus.

10 AT VERO] Patefacta utriusque cynanches natura, perspectis etiam paroxysmis & crisisibus; sequitur ut ea dicantur quae sunt utriusque tam ἐπιχρῶμενα quàm ἐπιφατόμενα, unde scilicet aut salus spectabilis, aut eius desperatio esse solet.

QVIBVS] In forti contentione naturae, meatuum libertate, & humore meabili.

VNA RVBENT] Non per propagationem causae morbosae: sed per citam exclusionem intus foras, nō expectata inueteratione morbi qui facit partem obsessam, totumque adeo corpus infirmum; idque non minus doloris acerbiter, quàm officij difficultate.

ET FAUCES] Quae primum excepto rheumate concitato intumescunt & rubent. Sunt autem fauces, amplitudo illa quae in ore cernitur interiore, seu spatium illud quod sitū est ante guttur & gulam.

20 ET CERVIX] Per μπάσιν (ἢ καὶ διαδοχῶν) erysipelatis ad musculos qui à ceruice feruntur circumplectentes gulam, ad latera cartilaginis scutiformis.

ET PECTVS] i. Ad supremam sterni partem, unde prorepunt duo muscoli ad basin cartilaginis scutiformis.

LONGIORES QVIDEM SVNT ILLAE] Quoniam toleranter feruntur, nec tantus in officio deglutendi labor, ac penè nullus in respirando, nec tanta doloris crudelitas, quae citò vires exoluat, & citam miseramque adferat mortem; ipsa verò erysipelatis materia manescit pepasmo & expurgatur, modò per ἐπιχρῶσιν non exoriatur cervicis & sterni erysipelas ut in cynanchica illa Bythonis, sed per μπάσιν firmam & stabilem intus foras, quaeque nullam habeat πάλινδρομῶν foris intrò.

30 MAXIMEQVE EX IIS EVADVNT] Pepasmo, expurgatione, & opportunitate adhibendi remedia conuenienter praescripta, περιφρόμενα Graeci vocant. Nā medicinae locus est, tum quia in promptu sunt partes obsessae, tum quia induciæ dantur à morbo.

NISI RVBORES INTRO RECVRRANT] i. Nisi denuo concitentur eò unde venerunt: id enim significat πάλινδρομεῖν. Ac sanè talis recursus plus adfert mali, estque omnino periculosior prior affluxu. Nam prior concitatio est saepe humoris mitificabilis, palindrome autem coniunctam semper habet feritatem humoris: qui refluit: quoniam is semper corruptione propriae substantiae in vitio est. Fit autem palindrome, superstitie adhuc phlogosi & empyreumate venenato partis obsessae, unde cita attractio & impetus materiae substantia tenuis, qualitate acris, & temperamento calidae.

40 4 Ην δὲ ἀφανίζηται, μήτε φύματ' οὐ συρραφέντ' ἔξω, μήτε πύξαια χειρὶ μολύβδου πρηνέως, καὶ ἀπόνως, μήτε ἐν ἡμέρησι κρίσι μνησιν ὀλέθρια γίνεται. ἄρα γὰρ ἐμπυοὶ γίνονται; ἀσφαλές αὖτον δὲ, τὸ ἐρῶδες, καὶ ταῖς ἀποστάσις ὅτι μάλιστα ἔξω τρέπεσθαι.

50 Sin autem cynanche faucium evanescit nullo erysipelate foris exorto, nec excreato pure facile & indolenter, neque diebus criticis; mortifera est. Etiamne purulenti redduntur? Tutissimum autem fuerit, erysipelas ceterosque abscessus quàm maximè foras conuerti.

DISTINCTIO hæc pertinet ad secundam cynanchen, quæ ut doloris acerbiter non est prior minor: ita moriendi necessitate & celeritate inferior, nisi ea sequantur quæ in hac prognosi docentur. Sunt autem huiusmodi.

SIN AVTEM] Correctio est eius quod posuit in secunda cynanche, videlicet eam longiorem esse prædicta in desperatis, nec tam citò mortiferam. Nec verò desperabilem esse omnino vitæ salutem si is qui assurgit tumor in faucibus, crisis habeat per expurgationem, aut per transitum intus foras.

SIN AVTEM CYNANCHE FAUCIVM] Quam facit erysipelas in eo spatio quod situm est inter guttur & gulam. Sic enim repetendum illud putauimus, πικνωστικὰ, in quibus assurgit faucium tumor & rubor. Ergo si faucium descripta cynanche.

EVANESCIT] Græcè ἀφανίζηται, subaudi ἐπ' αὐτῇ ἢ ἐπὶ τῇ μέρει, i. si faucium tumor qui secundam infert cynanchen, evanescit sine signis ac sine crisi. Id enim significat ἀφανίζεσθαι.

NULO ERYSIPELATE FORIS EXORTO] Non quidem per progressum & cingulum bilis effera prorepentis ad ceruicem & sternum: sed per transitum erysipelatis, forti naturæ contentione susceptum è faucibus in ceruicem & sternum, vicinia & societate partium; per quem transitum plurimi defunguntur illa cynanche alioqui valde pestifera, nisi erysipelas intro recurrat.

NEC EXCREATO PVRE FACILE ET INDOLENTER] Quod est *αἰσθητός* evanescere. Ibi tum suspecta debet habere sua bona cui restituta est deglutiendi libertas sine manifesta expurgatione humoris in faucibus phlegmonem systrophicam, proptereaque cynanchicam, facientis. At vera expurgatio perficitur excreatione sputi purulenti. Vt enim suppuratum est pepsimus tumoris: ita excreationis, faucium propria est. Itaque sic purgantur *αἱ δὲ καὶ διὰ τῆς συμφορῆς τοῦ πύου*. Ergo bene & convenienter, proptereaque salutariter. Facile autem & indolenter adiecit, sicut in *αἰσθητός*, i. expurgatione *ἰσθητός*, vt nulla ratio desideretur excreationis perfectæ & criticæ. Si talia purgantur qualia decet purgari, confert & leuiter ferunt: sin autem, contrā.

NEQUE DIEBUS CRITICIS] Quibus omnia quæ sunt quæque apparent bona malæ, firmiora sunt quàm quæ in alia incidunt morbi tempora. Est autem præceptoris hæc *δύσκολα*; si nulla lege critica euanescent faucium erysipelas, celerrima morte funestum est. Hæc itaque lex critica sancitur, vt phlegmonem systrophicam faucium pepsimo & excreatione residat, aut certe *μετέπλησιν* habeat ad ceruices & pectus, idque diebus criticis.

MORTIFERA EST] Mortem infert celerrimam & crudelissimam cum forti strangulatu & *ὀσπρία*, per translationem humoris è faucibus in laryngem, vnde fit cynanche *κωλύει*, dicta non *περὶ τοῦ*, quæ primigenia vera crudelior est, ac citatiore morte funesta, cum eodem ipso die quo venit interimar.

ETIAMNE PVRLENTI REDDVNTVR?] Sensus est; nullane hic salus vitæ sperabilis: nulla quidem, aut certe in angusto spes est, si fortè natura expediat se illa crudeli angina. Notum est illud,

aph. 12. 5. *Quæ angina periculo defunguntur, in conuertitur ad pulmones, & intra septimum diem moriuntur: quod si euaserint, purulenti redduntur.* Etenim *κατὰ τοὺς ἐπὶ τὴν αἶσαν κοιλίαν, ἐκπύουται ἐν ἡμέρῃ σὺν ἑξήκοντι*. i. Fluxiones in superam alium, suppurant intra viginti dies. De purulentis autem illud tenendum est, naseo nomine expressisse

aph. 38. 7. *πὺς ἐμπύου* qui semper significant eos quibus collectum pus stabulatur inter pulmones & thoracem:

aph. 44. 7. *πὺς ἐμπύου* pro omni suppurato vsurpetur apud Hippocratem.

TVTISSIMVM AVTEM FVERIT, ERYSIPELAS, &c.] Est quidem abscessuum criticorum naturaliter instituta hæc ratio, vt procul abscedant à morbo intus foras, & exoriantur in parte quæ sit totius materiæ morbosæ capax. Ac de angina *μετέπλησιν* per abscessum, illud præceptum est. *Ἦν*

aph. 47. 7. *κινδύνους ἐχόμενον οἴδημα καὶ ἐρύθημα ἐν τῇ στήθι ὀδυνηρόμενον ἀγρόν*. i. Ab angina periculanti ruborem in pectore exoriri; salutare.

Ἦν *κινδύνους ἐχόμενον οἴδημα καὶ ἐρύθημα ἐν τῇ στήθι ὀδυνηρόμενον ἀγρόν*. i. Ab angina periculanti ruborem in pectore exoriri; salutare.

Vide quæcumque interlit inter hanc lectionem & vulgatam.

Ἦν *Ερυσιπέλας γὰρ ἐσώθεν ἔξω πρέπεται· χρησίμων· ἔξωθεν δὲ εἰσὼ θανάσιμον· πρέπεται δὲ εἰσὼ, ὅταν ἀφανίζομεν τῆς ἐρυθρήματος βαρυώπαι τὸ σῆθος, καὶ δυσπνοώτερον γίνεται.*

Nam erysipelas intus foras conuerit; commodum: ac foris intro; mortiferum. Intro autem conuertitur, cum eo vanescente pectus opprimitur, ac difficilior spirat aeger.

SUPERIORIS prognoscos ætiologia est, & indicatio. Non enim omni ex parte catholicum est hoc theoremata, vt illud in aphorismis. *Erysipelas foris intro conuerit non est bonum: sed intus foras bonum.* Nam vt concedam omnino commodum esse intus foras conuerit: at certe contrarium, non est semper mortiferum: sed in hac tantum hypothesi anginae descriptæ. Ergo vt ostendat primum tutissimum esse tam erysipelata quàm abscessus quàm maximè foras exire, subiunxit.

NAM ERYSIPELAS] i. Cynanchicam phlegmonem systrophicam, quam generali nomine vocauit *οἴδημα καὶ ἔπαρμα*; mox in specie & idea *ἐρυσιπέλας, ἐρύθημα, ἐρύθος*: quorum nominum iam explicata est ratio.

INTUS FORAS CONVERTI] Per *μετέπλησιν* (i. *δυσπνοία*), i. successionem ex transitu, quæ sit relicto priore foco, à forti naturæ contentione cum libertate mearum, & humore meabili; non autem per propagationem humoris morbosæ, cuius est perennitas generationis & affluxus, superstitie semper foco priore & morbo.

COMMODYM] Vt signo & causa: ac signo quidem, victoris naturæ quæ sponte sua deponit ad cutem capax, materiam quæ sibi negotium facessabat: vt causa autem, vacuitate symptomatum intolerabilem, & restituta libertate spirandi & deglutiendi: quæ duo sunt officia ad vitam tuendam necessaria.

AT FORIS INTRO, MORTIFERVM] Etenim grauissimus esse solet omnis refluxus, vt signo & causa. Ac signo quidem, superstitis empyreumatis in foco vnde prorupit humor, cuius etiā maacet vis effera in tenui substantia, & qualitate acri, vnde attractio & impulsus: causa autem, quoniam humoris

humoris feritas, patris ipsius quod cursum inflectit substantiam labefactat. Sed in respirationis œconomia mortifera est talis palindrome: propter excellentiam præstatiâque partium spirabilium quarum officio, penè dixerim, ad punctum temporis vita carere non potest. Talis palindrome respirationem adimit. Quicquid autem respirationem adimit, vitam tollit. Sed commoda conuersi erysipelatis, omniumque abscessuum intus foras, ut cætera omittam, leguntur in trãmæ capitis, & in iecoraria phlegmone intus foras.

INTRO AUTEM CONVERTITVR] Ac si diceret; signa sunt hæc syllogistica palindromes foris intrò, ne fortè ipsa *δυσφορία* quæ propria est erysipelatis, opinionem tibi adferat *τῆς παλινδρομῆς*, & metum sinistri iudicij.

CVM EO VANESCENTE] Restituta scilicet colli & cervicis æqualitate, in colore, charactere, & mole; non quidem per *δυσφορίαν*, quæ ratio redintegrandi, primas obtinet in curatione tumorum omnium contra naturam. Nam suppuratio aspectabilis omnem auferret suspicionem *τῆς παλινδρομῆς*.

PECTVS OPPRIMITVR, AC DIFFICILIVS SPIRAT ÆGER] Labore scilicet & inflammatione partium in spirando deducentium & excipientium, unde dyspnœa tam parua & frequēs ut ideam exhibeat orthopnœæ mortiferæ, & crudelissimi strangulatus.

6 Οἷσι δὲ κυνάγχῃ ἐς τὸ πλῆθμονα ῥέπεται· οἱ μὲν ἐν τῇσιν ἐπὶ αὐτῶν ῥῆσιν ἀπολλύονται· οἱ δὲ διαφυγόντες, ἔμπυοι γίνονται, μὴ γινομένης αὐτοῖς ἀναγωγῆς φλεγματώδεος.

Quibus autem cynanche ad pulmonem inflectitur, alij quidem intereunt septem diebus; alij cum evaserint, purulenti fiunt, nulla expurgatione sursum pituitosa.

QVIBVS AUTEM CYNANCHE] Quæ in strangulatu forti & orthopnœa cynanche non fuit citò morte funesta prima periodo.

AD PVLMONEM INFLECTITVR] Ibique facit peripneumoniam, quæ significatur pectoris oppressione, & ea difficultate spirandi quam vocant metecorismum, ubi non nisi residendo spiritus duci potest.

ALII QVIDEM INTEREVNT] Suffocatione & extinctione vitalis caloris, siue nectaris viui-fici cordis.

SEPTEM DIEBVS] i. Primis periodis: ob feritatem humoris, prægrandem peripneumoniam facientis, & virium iam pridem infirmarum exolutionem, unde cita mors venit.

ALII CVM EVASERINT] Validarum virium beneficio, thoracis amplitudine, & mansuetiore materia: quæ sunt maximæ opportunitates defungendi tam citò periculo iamiam future mortis.

40 PURULENTI FIUNT] Quoniam pulmonum rheumata anagogen non habentia, intra vigesimum diem in pus mutantur, eoque pure in spatium thoracis effuso *ἐμπυοι* nominantur, ut iam demonstrauimus: quamvis etiam dicantur *ἐμπυοι* quibus nondum rupta est pulmonum vomica; ut in illo, *πύριος ἀφ' ἐλέως*.

NULLA EXPURGATIONE SVRSVM PITUITOSA] Putri & purulenta. Sic denegata pleuritico *ἀνακαθαρσίς*, intra 14. diem ipsum facit purulentum. Quod autem *ἀναγωγή* pro anacatharsi usurpetur, quæ propria pulmonum expurgatio est, palam fit ex illo aphorismo. *Οἱ κοῖτοι αἵματι ἀφροδῆδες πύριον* *πύριος* *ἢ ἐν τῷ πνεύμονι ἢ ἀναγωγή γίνεται*. Hæc autem explicata prognōsis legitur aph. 10. §. nulla mentione facta *τῆς ἀναγωγῆς*, quam vix adducor ut credam fieri posse; labefactata scilicet parte ab illo humore qui corruptione propriæ substantiæ in vitio est.

7 Οἷσι διὰ σφοδρότητα πνιγμῶν, κόπειται ἡ ἀπὸ τῆς διαπύνης διαχωρῆς· ἀναγόμενοι.

Quibus à forti strangulatu repente stercus excernitur; desperatio est.

ENIMVERO strangulari ut specie ipsa mortiferum est: ita mortem ipsam in propinquo esse denunciat, nullamque salutem vitæ sperabilem, quando strangulatione forti stercus excernitur sponte sua. Eodem spectat & illud quod scriptum legitur in aphorismis. *Eorum qui strangulantur ex exoluantur*, *ἀφ. 42. 2.* necdum tamen interiere, nunquam illi restituuntur qui edunt spumam in ore. Vtriusque autem signi fatalis ad interitum ratio sic explicanda.

QVIBVS] Verè cynanchicis, idque *σφοδρῶς ἢ δυνάμει*, nihil refert, modò huiusmodi sint *κωλύει*, à phlegmone systrophica muscutorum propriorum laryngis.

A FORTI STRANGVLATV] Quod est symptoma & signum ἀχύνειν veræ cynanches, καὶ πλὴν καὶ μάλλον; ac si diceret, si eò processerit strangulatio.

proth. 46.
L. 1. 1.

REPENTE] Sponte sua, nec iussu nostro, idque tum propter mentis laborem in officio, tum propter αἰαθησίαν & resolutionem partium per quas excretio fit.

STERCVS EXCERNITVR] Forti obstructione laryngis, & epiglottide firmiter arytenoidis rimæ affixa; unde fumidus vapor deorsum prorumpens diaphragma comprimit, vnaque musculos transuersos abdominis: quæ ratio egerendi cernitur quoties iussu nostro durior alius ducitur.

DESPERATIO EST] Collapso principatu animalitatis, & vitæ, in offensione cordis & cerebri: unde naturalis œconomia labefactatur.

8 Εν τοῖς κυναγχικοῖς τὰ ὑπόξηρα πύσματ' ἐχνῶν κακόν.

Anginosis cum equalitate faucium sputa subarida; malum.

OMNIS angina per se ipsa quidem pestifera est: sed illa demum habetur mortifera & desperata salutis, quæ accessionem habet signorum lethaliū: cuiusmodi sunt erysipelatum foris intrò pάλινδρομε; stercoris repentina & sponte sua non nostra, i. sine voluntate, ac sine sensu excretio; faucium quæ prius intumuerant repentina æqualitas sine transitu erysipelatis intus foras, ac sine purulenta excretionē: cuiusmodi est etiam signum in hac prognosi descriptum sputi subaridi.

Ergo. ANGINOSIS] Iis qui sunt χυλῶς & verè cynanchici.

CVM ÆQUALITATE FAUCIVM] Id enim significat ἰσχυόν, atque non raro φάρυγξ ἰσχυρή legitur apud Hippocratem, i. fauces æquales quæ nullo modo intumuerunt, nec villo modo mutatae sunt à se, in colore, charactere, & mole. Sed illa faucium æqualitas, siue sit ipsarum κατάρωμα naturaliter constitutum, siue τὸ ἐπιπόρρωμα, i. restitutio per translationem humoris à faucibus in laryngem, nihil interest, modò cynanchicus homo sit ab ea cynanche quæ nihil exhibet aspectabile, nihil tractabile in faucibus ipsis.

SPUTA SVBARIDA] i. Glutinosa, rotunda, quæque difficulter admodum excreantur, & quæ plus detrimenti adferunt in excreando quàm adiumenti.

MALVM] Vt signo & causa: ac signo quidem, materiæ contumacia, & prægrandi ardore: causa autem, quoniam difficultas excreandi auget ardorem atque tumorem. Hinc maior dyspnœa, unde fit etiam materia contumacior. Atque hæc tria, difficultas excreandi, spirandi, & glutinosus humor; αἰνιωμένους ἀλλήλους ἐς κακόν, vt loquitur Hippocrates lib. 1. de morb. acut. i. mutuas tradit operas in perniciē agri.

9 Τὰ κυναγχικά ἐν γλώσσῃ οἰδήματα, ἀσήμεως ἀφανίζοντα ὀλέθρια. ἢ τὰ ἀλγήματα ἀφανίζοντα χωρὶς περφόσιθ' ὀλέθρια.

Anginosi in lingua tumores clam euanescentes; mortiferi. Quinetiam dolores sine causa sedati; mortem subesse testantur.

MAGNA VIS est τῷ ὀπθαισμένῳ καὶ τῷ ὀπθαίνοντι ad præensionem interitus aut salutis. In hac prognosi, ne longius abeam, τὸ ὀπθαίνοντι anginae gutturalis est linguæ tumor, qui cernitur in qualitate partium vicinarum & sociarum: sicut sputum subaridum in proprio excremento. Est autem propria hæc τῷ ὀπθαίνοντι conditio, vt morbos in quibus apparēt, breues aut longos, tum autem sinistri aut secundi iudicii esse denuncient. Quæ cum ita sint.

ANGINOSI IN LINGVA TVMORES] Qui assurgunt vicinia & societate muscutorum noxam linguæ cum faucibus & larynge; tum autem repletionē particulari venarum linguæ subiacentium; quas ὑπογλώσσιδας Græci vocant.

CLAM EVANESCENTES] i. Sine propria expurgatione ac sine successione intus foras; tum autem sine vsu τῷ περφόσμενῳ, i. remediorum conuenienter præscriptorum.

MORTIFERI] Propter translationem & recursum in laryngem, qui fortem infert strangulatum, fortemque dyspnœam: quibus symptomatis nulla vis naturæ maior neque acerbior potest adferri.

QVINETIAM DOLORES] Qui sunt acerbissimi tam in faucibus, quàm in larynge, tum à distensione prægrandi, tum ab intemperie firmiter fixa catarrhi nitrosi.

SINE CAUSA SEDATI] i. Nulla expurgatione critica, nec artificio medici remedia conuenienter adhibētis ad retractionem rheumatis concitati, atque ad detractionē & pepasum cōsistentis.

proth. 17.
L. 1. 1.

MORTEM SVBESSE TESTANTVR] Quoniam τὰ ὀλέθρια ἀσήμεως ρασιωνίσαντα. ἴνα πὴν σημάει. i. Lethalia quæ sine signis quiescunt; mortem significant. Eadem est ratio restitutæ libertatis deglutiendi sine crisi, & transitu intus foras anginae secundæ. Atque illa doloris falsò putatur esse leuatio; tum propter symptomaticam translationem à faucibus in laryngem; tum quia mens laborat, & sensus amissio est in parte afflicta.

10 Εν τοῖσι κυνάχκοις ὁ μὴ ταχὺ διαπίπτοντες πέποναι ὀλέθριοι.

Inter anginosos qui cocta cito non expiunt; desperati.

ENIM VERO morborum omnium quorum ὑπάρχει in humoris cuiusque putredine, collectione & motu consistit, cuiusmodi sunt febres; tum etiam illorum quorum symptomata sunt humoris mor-
bifici & partis obsessae propria; omnium, inquam, sanatio & naturae redintegratio perficitur pepasmo,
& vacuatione propria per loca eommoda, & abscessu critica lege facto. Oἱ πεπασμοὶ ἔχουσι ἢ εἰς τοὺς πέποιοντες, ἢ ἄλλῃ lib. π. τοῖς χορδαῖς
10 ὅπῃ δὲ. i. Pepasmi foras vel intro, aut aliud fluunt quod decet. Et alibi. Πεπασμοὶ τῶν ἀπόντων πᾶσι τοῖς ὁπτικαῖς, ἢ lib. 1. Epid.
καὶ ἐν κριτικῇ σκοπίᾳ. i. Pepasmos considerare iubeo, omnes undecunque laudabiles; tum bellos
abscessus ex criticos. Ut autem nihil optabilius pepasmo in omnibus acutis febribus, atque illis etiam
morbis qui coniunctam habent symptomaticam febrem; quoniam pepasmos ad celeritatem & securi-
tatem crisis apparet: ita nihil aequè merum adfert sinistri iudicii quàm ἀπίστα & cruditas. Haec enim ma-
los infert abscessus, & acrisias, & grauiore casus, & mortem. In peracutis autem quorum acerrimi ce-
lerrimique sunt motus, propterea quae celerrimae mutationes ad interitum vel ad salutem, nisi pepasmos
breui appareat; breui quoque vitam finiunt aegri. Nam solo pepasmo & excretionem, peticulo defun-
guntur. Quae omnia cuiusmodi sunt in anginosis, docetur in hac prognosi.

INTER ANGINOSOS QVI CITO] Non quidem expurgandi celeritate, & spatio quo spu-
tum expurgationi coniunctum est: sed initio morbi, quod in aphorismis scripsit ἀπὸ πρῶτου, sicut & lib. 6. aph. 11. et
τῶν ὁπτικῶν. idem dixit ἀπὸ πρῶτου πελεῖν, ἀπὸ πρῶτου καλεῖν, ἀπὸ πρῶτου τέρμιν, i. cito ferrare, urere, secare. 6. Epid. part. 7.

COCTA NON EXPVNT.] Graece dixit τὰ πέποναι, i. pepasmo mitificata. Est autem pepasmos,
πέψις τῶν φούρων, i. rerum est natura egressarum concoctio. Ut enim vera πέψις, i. coctio verè dicta, est τῶν εἰσόν-
των, i. rerum ingredientium (ingrediuntur autem τὰ προσφθιμένα καὶ ἐν προσφύται, i. natura consentanea ex con-
socialia:) sic ὁ πεπασμὸς seu mitificatio, est τῶν ἀπόντων, i. exeuntium, siue rerum exitui praeprataurum. Sed v-
triusque, videlicet τῆς πέψιας καὶ τοῦ πεπασμοῦ, causa effectrix est, partium solidarum vitale principium, & vi-
nifica vis quae manat à corde. Distinctio est tantum materiae: quoniam, ut iam diximus, πέψις ἐστὶ τῶν εἰσ-
όντων πεπασμὸς δὲ τῶν ἀπόντων. Et, πέψις ἐστὶ τῶν πεπαισμένων εἰς τὴν τῶν πέποιοντος εἰσὶν ἀρχὴν ὁ δὲ πεπασμὸς, πέψις τῆς φού-
ρας, i. Coctio ductus est eius quod coquitur, in substantiam eius quod coquit: pepasmos autem quadam coctio eo-
rum quae sunt prater naturam. Atque ita πέψις perficitur assimilando, πεπασμὸς alterando. Non minor au-
tem virtus naturae lucet in alterando contraria, quam in assimilando consentanea & consocialia. Ex quo
efficitur spes certam salutis adferri pepasmo: quoniam victrice natura triumpharus morbus excludi-
tur. Ergo. QVI COCTA CITO NON EXPVNT] Nam expuendo tenuia nihil proficiunt:
quoniam expressione feri à phlegmone fit praelisimus: glutinosa aut subarida expuendo laxantur, ut
iam demonstratum est. Superfunt τὰ πέποναι quae sunt crassiuscula, virtute caloris mitificantis, propterea
que ad expurgandum facile & indolenter idonea. Sed illa πέποναι nisi appareant cito, cita mors venit.
Causae sunt explicatae. Nam in peracutis morbis, aut cita mors venit, aut victoria laeta. Sed victoriae de-
speratio est nisi à pepasmo sputa πέποναι cito expuantur: quoniam in morbis partium spirabilium fru-
stra pepasmos fit nisi expurgatio consequatur, quam ἀνακαταρτίζει, ἢ ἀνὰ πύλιν, ἢ καὶ ἀνὰ χεῖρας Græci vocant,
40 ut est natura & collocatio partium spirabilium obsessarum. Exempla sunt in senibus quibus latera non
sunt firma ad expectorandum.

II. Εν κυνάχχῃ ἀσήμεως ἐς κεφαλὴν ἀλγήματα μὲν πυρετῶν ὀλέθρια.

*In angina qui abs re prorepunt dolores ad caput cum febre; sunt de-
sperata salutis.*

10 INTER symptomata epigenomena cynanches consuetaria per propagationem causae morbigicae,
principatum obtinet cephalalgia cum febre coniuncta.

IN ANGINA] Κυνάχχης dicta quae in systrophica phlegmone laryngis consistit.

QVI ABS RE] Graece ἀσήμεως, i. infecta redintegratione partis obsessae, ac sine ullo signo illius
redintegratae, & superstitie foco priore cum pari doloris acerbitate, tum aequè forti strangulatu & or-
thopnoea. Id enim significat hoc loco, ἀσήμεως. Ac si diceret; si nulla sit anginae levatio, superueniat au-
tem cephalalgia praegravanda, ac superueniat καὶ τὴν ὁπτικὴν, non autem καὶ μετὰ πύλιν, ut per sympa-
thiam, non autem per diadochen accidere videatur.

PROREPUNT DOLORES] Κατὰ τὴν ὁπτικὴν, idque per expressionem feri à phlegmone gut-
turis in venas iugulares internas & arterias carotidas quae secundum asperam arteriam procedunt ad
60 caput, prius largitae furculos laryngi & linguae cum fauces attigerint, indeque subeunt caluariam per
foramen lacerum, choanae propinquum; atque ita prorepunt dolores appulsu morbifici humoris quo
distenditur dura meninx, & prorituratur, vnde cephalalgia praegravanda cum forti strangulatu coniuncta,
manente semper aut verius crescente angina.

CUM FEBRE] Quam excitat cephalalgia praegravanda ab inflammatione meningis & cerebri. Est

enim consentaneum, sicut nuper exposuimus in offensione temporalium musculorum, ut inflammatum cerebrum ab inflammatione laryngis, consecutionem adferat febrium acutarum, vnaque depravatarum omnium animæ actionum. Quod fit ut productio angine ad caput, symptomata edat paraphorica & cephalalgica.

SVNT DESPERATA SALVTIS] Propter σωπημαίαν laryngis & cerebri, vnde perpetuum rheuma concitatum è capite; tum propter colliquamenta pinguis humoris & carniū recens pressurum; tum quod eò res ægri peius eunt, quò plures partes & plures principatus in vitio sunt.

12 Εν κινδύνῃ ἀσήμεως ἐς σκέλη ἀλγήματα μὲν πυρετῶν ὀλέθρια.

In angina qui abs re prorepunt ad crura dolores cum febre; mortiferi.

IN ANGINA dixit, non ex angina: ut nulla opinio sit μεταπτώσεως superne deorsum: sed potius ἐν-
 ἡμέσεως angina superstire; quod quemadmodum fiat non hercle intelligo. Id locum habet in peripneu-
 monia quæ ex angina prolapsu exorta mortem infert intra septimum diem, aut purulentum facit æ-
 grum intra vigesimum. Solennis est illa prognōsis. Abscessus qui per vehementes & periculosas peripneumo-
 nias in crura erumpunt; viles quidem omnes: sed illi multò salubriores sunt qui spūto iam mitificato exoriantur. Et
 paulò post. Quod si bilioso adhuc spūto, necdum purulento exorti resuunt eò vnde sunt concitati, nec spūtum liberè
 & liberaliter expurgetur; ingens malum: nam tum agrotus in metu delirij est atque mortis. Sed rerum earum de-
 cisiones breui legentur. Nam de anginosa quod scribitur in Epidemiis, dolore in dextra manu & crure
 excitato, ipsam habuisse χεῖρα καὶ τὴν πρὸς τὴν καρδίαν, i. laxitatem strangulatus, indèque septimo die morbi conuulsam,
 voce captam cum stertore, stridore dentium, & rubore genarum; quinto & sexto abhinc die crudeliter
 periisse; ut concedam pertinere omnia ad præsentem prognōsin, ex eaque historia videri desumptam, &
 in breuiarium quoddam siue aphorismum contractam: tamen si quis attentè consideret, profectò repe-
 riet non in angina, neque ex angina primū fuisse oborta, sicut in hac prognōsi docetur; palindromen
 verò paulò post habuisse sursum, quæ tantorum symptomatum consecutionem attulit. Nam à crure
 dextro anadrome Caluum in citam mortem coniecit. Ac suprā demonstratum est crurum terrificos ef-
 se dolores in febre, manuumque labores & pedum esse pestiferos. Et verò in anginosa muliere annota-
 uit σημεῖον ὅτι χεῖρα ὑποπλύνει, i. notam in manu liuidam.

13 Εκ κυμαγχανῶν ἀκρίτως, ὑποχονδρίαις ἀλγήματα μὲν ἀκράσιος καὶ
 νωθεότητος γνώμην ὅτι κτείνει λαθραίως· εἰ καὶ πάνυ δοκοῖεν ὀππαικῶς ἔχιν.

*Ex anginosi hypochondrij dolor irrita crisi cum infirmitate summa
 & exolutione abortus; clam necat: tamen si admodum videantur esse
 in tuto.*

H V I V S prognōsis non est certa nec firmiter fixa hypothesis, quæ statuit ex anginosi ob irritam
 crisin, hypochondrij dolorem oriri μετὰ ἀκράσιος καὶ νωθεότητος. Quæ tria symptomata cuiusmodi sint, &
 quorsum appareant, in enarratione dicitur. Etenim tamen si particula, ἐν, planè ostendit τὴν μετέωρον
 materiæ anginosæ: tamen affirmare non ausim eam fieri posse ad hypochondria primū & per se. Nam
 gutturalis angina metaptōsin habet vnicam in pulmones, vnde peripneumonia quæ vel intra septimum
 diem mortifera est, vel intra vigesimum in pus mutatur. At faucium angina quam præceptor vocat
 κυμαγχανὸν ἐρύθημα, conuertitur in latus κατ' ἔξω. Quænam igitur conuersio est angina in hypochondriū?
 Sed eam difficultatem clariùs explicabit nostra enarratio.

EX ANGINOSIS] Quorum angina successionem habet alterius morbi, vnde non sunt ampliùs
 anginosi.

lib. 1. progn. HYPOCHONDRII DOLOR] Translata ad hypochondrium dextrū, quod κατ' ἔξω ita nomi-
 natur, materia: qualem excitare solet dolorem peripneumonica transmissio ad crura, dum eò peripneu-
 moniæ causa morbificā cursum inflectit: quemadmodum dyspnœam fugacem, quando ad parotidas
 viam affectat.

IRRITA CRISI] Quod neque significata fuerit spūti pepasmo, nec eò vsque peruenierit ἀνίσ-
 τας ὅτι δει, procul in partem capacem; cuiusmodi est crurum conditio: sed in hypochondrio substitu-
 rit, i. in visceribus hypochondriacis quæ per metonymiam hypochondria nominantur, ibique dolo-
 rem excitat qui citam mortem infert. Ut enim peripneumonica metaptōsis quæ sursum fit ad parotidas,
 prænuñciam habet parotidum futurarum dyspnœam fugacem quæ sine nota præcedente quiescit: sic
 illa quæ deorsum ad crura viam affectat, sensationem excitat φλέγματος, i. φλογώσεως in hypochondrio; quæ
 si in via subsistat, firmiter fixam & stabilem parit affectionem hypochondriacam, venenatā qualitatis &
 malignæ cacochymiz participem; atque ita peripneumoniæ fit actiua per irritam prorixationem, pro-
 ptereaque

pretereaque dolor merito iudicatur ἀκρίτως obortus ab irrita crisi, cuius perfectio expectanda expectabatur in abscessu crurali.

CUM EXOLUTIONE] Μετὰ ἀκράσις, quæ idem significat quod ἡ ἀκράτεια, quam interpretatur Galenus δῆλυσιν τῆς ἐσίας, i. exolutionem cuiusque substantiæ, quæ in complexione & temperamento consistit; quæ labefactata, in promptu est ἀπνία, ἀδυναμία, καὶ ἐκλύσις: quæ nomina sunt eiusdem rei synonyma. Ego verò exolutionem hanc referendam arbitror ad dissipationem nectaris viniifici cordis, quam propriè veteres τὸ ἐκλύειν nominarunt.

ET LAXITATE] Καὶ τῷ ὀρότῃ, quæ propriè & verè pertinet ad principatum cerebri: quemadmodum ἐκλύειν ad principatum cordis. Vtriusque tamen eadem ratio est & causa formalis, nempe δῆλυσιν: quemadmodum Galenus annotavit in illo, νέρων ἀκράτεια, καὶ νάρκωσις γῆρας, i. perunum imbecillitas, & segnicies mentis. Est autem τῷ ὀρότῃ, illa segnicies & exolutio quæ cernitur in iis qui subinde delabuntur ad pedes, quam ἐρρίψαν καὶ πέρευν Græci vocant. Ac sanè τῷ ὀρότῃ, ineunte quidem morbo, symptomata est oppressio; affecto autem, exolutionis, ut alibi demonstratum est.

CLAM NECAT] Extinctione caloris vitalis, & stupore animalitatis, unde nulla sensio excitatur causæ mortiferæ: sicut in ἀπνίᾳ quam facit exolutio vtriusque principatus, vitalis & animalis. Hæc enim moriendi sensum adimit: quemadmodum & illis qui prorupto sanguine multo in τῷ ὄρει, vitam finiunt differendo, nec opinantes.

QUAMVIS ADMODUM VIDEANTUR ESSE IN TVTO] Falsò credita leuatione ex αἰσθησίᾳ laborum atque dolorum: quia sunt illis eorum corda oblita δὲ τὸ τῷ ὀρότῃ καὶ ἀκρασίᾳ: quod ipsi vidimus in quodam adolescente cui, extracto calculo, per vesicam corruptam tanta repente incidit exolutio, ut ludendo chartulis pictis animam exhalaret. Denique sic omnes à syncope moriuntur.

14 Ἐκ κυναρχικῶν ἀσθμῶς ἰγχανθέντων, ἐς σῆδος ἀλγυμῶν καὶ ἐς κοιλίᾳ ἐλθὼν σῶτονον ποιεῖ πυῶδες διαχωρεῖν. ἄλλως δὲ οὐ λυομένη τῇ τοιοῦτῃ.

30 Ex anginosis immerito adequatis, dolor pręgrandis cum ad pectus & ad ventrem transierit, excretionem puriformem molitur: si quidem aliter non exoluatur.

INSPERATA salus miraculo apponi solet, quando natura sui diligens & conservatrix invenit viam qua deducitur ad exclusionem morbi, & ad conservationem sui, & crisin exhibet salutarem infuerum periret & nobis ignotum. Sed illud miraculum quamvis in hac prognosi primo aspectu sit admirabile: tamen perpetua non erit admiratio, quam ἀθανασία studiosè quaerita, & in animis nostris infixa profligabit.

Ergo. EX ANGINOSIS] Qui faucium & laryngis phlegmone systrophica, multum in deglutendo & respirando laborarunt.

IMMERITO] Non autem frustra, uti nuper diximus; i. quibus restituta est deglutendi & respirandi libertas sine crisi propria per excretionem purulentam, & facilem atque citam; aut sine diadoche in ceruicem & sternum; aut sine vlu καὶ πρὸς ὀφθαλμοῦ, qualia iam recensuimus.

ADEQUATIS] Quorum æqualitas repentina cernitur in faucibus nihil à se mutatis, quæ paulò antè visæ sunt multum mutata; in larynge autem per σπυγδατήριον ex libertate spirandi, & vacuitate strangulatus atque doloris. Nam tumor laryngis non habet ἀφανῆ aspectabilem in qualitate corporis: bene in actionibus, & symptomatum vacuitate.

30 DOLOR PRÆGRANDIS] i. Sensio acerbissima rei molestæ, quam facit humoris anginosi translatio per distensionem & intemperiem.

CUM TRANSIERIT] i. Relictis partibus ubi phlegmonem faciebat systrophicam, rheuma cynanchicum μετὰ τὴν habuerit, vel potius μετὰ τὴν.

AD PECTUS] Vbi sensio est grauitatis cum difficultate spirandi, per oppressionem partium spirabilium, i. pulmonum qui in pectore continentur; eaque pulmonum oppressio quæ facit peripneumoniam, accidit aut anginosi humoris prolapsu & translatione è larynge ad pulmones, aut ex refluxu erysipelatis in sternum exorti post anginam, ad ipsos pulmones.

ET AD VENTREM] i. Ad spatium illud quod est inter diaphragma & ventrem. Est igitur præceptoris hæc δῆλυσιν si angina transitus fiat ad spatium illud quod est inter diaphragma & ventrem.

30 EXCRETIONEM PURIFORMEM MOLITUR] Quæ iter habet per venas ad intestina, vel ad vesicam: iuxta illud, πούτοις καὶ τὰς φλέγας ἐς κόπιν ἀπέπται τὸ φλέγμα. i. His in vesicam per venas pituita conuertitur. Nam δὲ διαχωρῖος nomen non semper significat deiectionem quæ fit per aluum. Excretionem verò puriformem diximus, non purulentam, quæ pus refert, quamvis reuera non sit. Huiusmodi erant Perinchi vrinæ ποιοῦντες criticę. Natura autem molitur puriformem excretionem, tum per deiectiones, tum

per urinas. Exempla sunt in hydropicis qui alui profluuiio sine cruditate, & urinarum peritrocha, sanantur αὐτομάτως. Sic umbilici dolores cum pulsu coniuncti adueniente crisi, pituita multa per alium protupta quiescunt.

ALITER AVTEM NON POTIS EST IPSVM EXOLVI] Fortè sic melius. SI QUIDEM ALITER NON EXOLVATUR. Ut illud, ἄλλως δὲ, legatur ἄλλως δὲ, & adiciatur ἔ, ut sit contextus talis; ἄλλως δὲ ὑλόμενα τὸ πικρὸν. Nulla enim est æquitas legere in vulgata scriptura, λόμενα τὸ πικρὸν. Illud verò, si aliter non exolvatur, pertinet ad id quod scriptum est in aphorismis, ἐκ ἔχον ἐξόδον οὐδὲ εἰς ἐπίπλυνον κοιλίαν. Eodem spectat etiam quò illa quæ in prognostico leguntur de varia crisi pleuritidis & peripneumoniz.

aph. 54-7-

15 Ἐκ κυναγχικῶν πάντα ὀλέθρια ὀκῶσα μὴ ἐκδήλων ἐποίησεν ἀλγυμα. ἀτὰρ ἢ ἐς σκέλεα ἀλγύματα χροῖα φοιτᾷ, ἢ ἐκπύεται δυσκόλως.

Ex anginosi mortifera omnia quæ dolorificum malum foras non edunt. Quinetiam ad crura procedunt diuturna mala, quæ difficulter & molestè in pus vertuntur.

Q V O R V M morborum cita mutatio est siue crisis, ut peracutorum: sic ad interitum certa esse solet, si nulla citò edunt critica epiphænomena in excretionem vel in abscessu foris conspicuo. Huiusmodi est angina: cuius pestifera seu mortifera vis in hac prognosi explicatur, non ex iis quidem quæ adsunt, sed quæ absunt.

EX ANGINOSIS] Non quidem angina correptis: sed ex iis quæ pertinent ad anginam, κυναγχικά Græcis dicta.

MORTIFERA OMNIA] i. Desperata salutis, quæque citam inferunt mortem doloris acerbitate, virium exolutione, fortique strangulatu & orthopnoea.

QVÆ DOLORIFICVM MALVM FORAS NON EDVNT] Sic enim τὸ ἀλγυμα verti debet, quo significatur dolorifica ipsa phlegmone anginosa, i. si nihil sit aspectabile, nihil tractabile in qualitate partis obsessæ, vicinarumque partium & sociarum, nulla item transitio ad pectus & ad cervicem sine recursum, nulla excretio purulenta & citò cocta: denique si omnia mancant ἀσήμενος καὶ ἀκρίτως.

QVINETIAM AD CRURA PROCEDVNT DIVTVRNA MALA] Ac si diceret, tam necessaria est erysipelatis quàm maximè intus foras conuersio, ut quamvis ad crura quàm longissimè cursum inflectat, quod est in bonis ducendum: tamen nec tutò semper id fiat, propter hypochondria in quibus irrita crisi subsistit, & quia quæ in cruribus exoriuntur mala, sunt dyscola; tum propter materiæ feritatem vnde claudicant ægri, tum propter recursum facilem ad pulmones, vnde salutis desperatio est. Causæ sunt explicatæ.

Coac. 12. huius cap.

QVÆ DIFFICVLTER ET MOLESTE IN PVS VERTVNTVR] Sed commemorata inferunt mala, nec ad securitatem crisis apparent.

16 Τὰ ἐκ κυνάγχης πύαλα γλίχρα, παχέα, κίλδικα, βιαιῶς ἀναζύμια κακόν. ἢ πᾶς ὁ τοιοῦτος πεπασμὸς, κακόν. καθαρσις πολλὴ κἄτω τοῖς τοιοῦτοις ὥρα πληκτικῶς δὲ πόλλυσιν.

Ex angina spurta glutinosa, crassa, multum alba, vi expurgata; malum: atque omnis pepasimus huiusmodi; malus. Purgatio multa deorsum, tales paraplectico modo necat.

Q V O R V M morborum peracutorum fixa est ὑπαρξίς, eorumque symptomata sunt humoris morbifici & partis obsessæ propria, ut angina in forti strangulatu & orthopnoea; profectò eorum crisis perficitur impulsu nature, & meatuum conditione, cum humore meabili. Quæ tria sunt ad criticam expurgationem, & periculi defunctionem necessaria. Secus est in eorum ἀπυρία, i. frustratione ex desiderio. Anginosi in æqualitate faucium spurta subarida; malum. Et. Inter anginosos qui cocta citò non expiunt, desperati. Quæ cum ita sint.

Coac. 3. & 10. huius cap.

EX ANGINA] Cum æqualitate faucium κωέως dicta.

SPURTA GLVTINOSA] i. Tractu δυσκλυστῆ, quæ sunt eiusmodi; in pituita quidem albuminea ob crudorem, sicut albumen oui & coryza; in perusta, ob feri compunctionem & lentorem crassi humoris à calore contra naturam.

VI EXPRESSA] Quæ difficulter admodum excreantur, habentque violentam, difficilem, & molestant *αισθησις*; qualis est τὸ ἐκκρισθῆναι τὰ κατὰ γαστρονομία, i. glutinosa cum difficultate screantium. Ea verd difficilis excretio causam habet, spuri glutinosi & crassi contumaciam, cum imbecilla contentione naturæ coniunctam.

ATQUE OMNIS PEPASMVSVS HVIVSMODI, MALVS] i. Malè res eunt in tali pepasmo; siquidem pepasmus verè dici debet, non per antiphrasin. Nam verè pepasmus semper ad salutem præclare apparet & facit, vnde significatur naturæ integritas, humoris æqualitas, & virtus caloris nativi. Hic autem pepasmus est cruditas & corruptio, quæ nunquam bene fit neque apparet. De virtute autem pepasmi abundè scripsimus ad prognosin 10. huius cap. Quod sequitur.

PVRGATIO MVLTAE DEORSVM, TALES PARAPLECTICO MODO NECAT
Hoc certè non adfert causam interitus à paraplegia. Neque enim facit hæc paraplegiam, nec paraplegia
interitum. Sed crudor cerebri, paraplegiæ causa est, sicut anginæ, & quæ inde venit paraplegia, lethalis:
cuiusmodi erat illa I. 78m. cuiusmodi est etiam quæ facit parotidas. De qua nos multa scripsimus ad
illam prognosin. *Parotides pravae sunt paraplecticae.*

Co2c.4.c2p.4
4.lib.2.

17. Εκ κυνάγχης ὑπόξηρα πυκνά πλῦελα, βηχῶδεα, πλῦρξ ὀδυώ-
δεα ὀλέθρια. ἢ τὰ ἐν τοῖσι ποτοῖσιν ὑποβήσοντα, ἢ κατὰ ποτὶς βιαῖα πο-
νηρόν.

30 *Ex angina, subarida, crebra sputa, tuſſifera, dolorifica coſtis, mortifera. Quinetiam ex potione tuſſi expreſſa, omniſque adeo violenta deglutitio; peſtifera.*

ILLA DEMUM cynanches mortifera sunt *ἄνθρωποις*, quæ & qualitate, & excretionis modo, & grauiorum symptomatum accessione in vicio sunt. Huiusmodi sunt hæc.

Ex ANGINA] Non in angina. Ex angina igitur quæ sua edit *ἐκ τῆς ἀνγίνης* in proprio excremento, & propria excretionē. Est enim angina propria excretio, sputi excretio.

SVBARIDA] Non quidem sufficula & excreatione frustra omnino citata, ut in pleuritide & peripneumonia quæ ob eam causam siccæ dicuntur: sed glutinoso crasso atque rotundo spuito, & albo, quale iam descriptum est.

CREBRA Qui crebram cient *αια* *πυρ*, faucibus proritatis ex crebra concussione.

TVSSIFERA] Ex contentione naturæ studentis excutere quod sibi molestum est, sed frustra: vti in hepatica inflammatione, & laterali cruda.


DOLORIFICA COSTIS] A forti & irrita concussione, tum à spitatione sublimi, *πνευματική*
 ὀδύνη *Græci* vocant.

MORTIFERA] Quoniam omnia commemorata, sunt desperata salutis in συντροφία malorum,
& vitium exolutarum cum συντροφία doloris.


QUINETIAM POTIO TVSSI EXPRESSA] Per ora & nares, in vtraque angina qualis ex-
50 pressio legitur in angina lib. 3. Epid. & lib. 6. eiusdem operis.

OMNISQUE ADEO VIOLENTA DEGLUTITIO, PESTIFERA] Vt signo & causa.
Nam multi deglutiendo, violenter intereunt. aphor. 35. 4. & lib. 2. & 6. Epidem.

DE PLEVRITIDE, ET PERIPNEVMONIA. CAP. XVI.


ΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΩΝ οἷσιν ἐν ὄρχῃ πάντοτε αἱ
 πύσεις τελῆς θήσκοιοι, ἢ πεμπῆς. φυζόντες ὃ ταύ-
 ρας, ζ, ἢ θ, ἢ ια ἀρχονται ἐμπυξάται.

al. ἐκλυπται.
Sic legitur
lib. 3. αἰετὶ νέ-
σται. ὁ ἴσας διὰ
κρίσεως ἐνδὺς
καταδύεται εἰς
θαλάσσης, καὶ τὰ ἄλλα
ἐκλυπται καὶ
ἐκείνη δέ.

 Inter pleuriticos, quibus initio varia sunt expuitiones; ij tertio moriuntur, aut quinto: quos si evaserint, nec dum multo il-

lis sit melius, septimo, aut nono, aut undecimo incipiunt suppurari.

ORDINIS ratio iure à nobis requirit, ut patefacta omni cynanches historia, deinceps dicamus de morbis cæterarum partium spirabilium quæ tum mouendo, tum excipiendo, respirationi dicatæ sunt: quemadmodum larynx & arteria deducendo. Ac primum occurrit pleuritis exorta in parte spirabili. Cæterum explicata sunt omnia signa & symptomata quæ cernuntur in respirando, eorumque omnium patefactæ causæ, vnde scilicet, & quorsum fiat atque appareat omnis difficultas spirandi. Sed earum causarum quæ nascuntur & stabulantur in partibus quæ respirationi deducendo; excipiendo, & mouendo inferiunt; historia recensenda in affectionis cuiusque natura, eadem methodo examinanda qua in angina vsi sumus: ut nihil omnino prætermisisse videamur quod ad cuiusque naturam pertinet in essentia, causis, parte obfessa, periodis, paroxysmis, & crisi bus.

INTER PLEVRITICOS] Quorum scilicet ita pleuritidis comparata est ratio. Arguit verò pleuritidem dolor lateris punctim laceffens, cum spiratione difficili, sicca tussis, & assidua febre coniunctus. Quorum symptomatum hæc mihi ratio esse videtur ad inueniendam morbi vnde illa veniunt existentiam, ὑπαρξίν Græci vocant. Nam primum doloris punctiorij causa est distensio cum intemperie magna partis acerrimi sensus, qualis est membrana costis intexta; difficilis spirationis, contumacia thoracis qui necessitati non responder; sicca tussis, concussio thoracis frustra concitati; febris assidua, cordis vicinia & societas cum thorace afflicto. Ex quibus necessariò efficitur, thoracis inflammationem systrophicam, esse pleuritidem. Est igitur pleuritis, Phlegmone systrophica tunica costis intextæ, quæ consecrariam habet doloris punctioriam acerbitatē, siccam tussim, & febrem assiduam. Hæc enim symptomata non nisi à phlegmone systrophica eueniunt, atque omnino sunt humoris morbifici & partis obfessæ propria, cum sympathia partium sociarum & vicinarum, ut pulmonum & cordis; vnde sicca tussis & febris. Nam dolor punctiorius & difficultas spirandi, sunt propria tunica costis intextæ, vnde contumacia thoraci infertur, & impeditur libertas spirandi. Atque hæc signa sunt reapse pathognomonica inflammationis pleuriticae. Nam inflammationis ipsius, ut inflammatio est, inseparabilia sunt, rubor, calor, pulsus, renixus, & dolor. Iam verò systrophicae omnis phlegmones duæ omnino sunt causæ, vna rheuma cõcitatum siue ῥευματισμὸς, altera autem σπυρσίνος, i. consistens. Cõsistens est humor ex affluxu collectus qui tumorem facit in parte obfessa, cuius consecraria sunt prædicta symptomata, magis ac minus molesta in specie, magnitudine, more, & motu; pro varia idea morbi exorti cuius natura in phlegmone ipsa consistit. Est enim phlegmone illa systrophica quibusdam verè φλεγμονώδης, quibusdam ἐν σπυρσίνος, nonnullis etiam οἰδηματώδης. Existit præterea phlegmone illa εὐήθης ἢ κακήθης, tum εὐκρίτης ἢ δύσκριτης; pro varia quam accepit forma ἢ σπυρσίνος καὶ ῥευματισμοῦ, i. efficientium & suscipientium, ex varia hominum natura in temperamento, complexione, habitu, & conformatione; tum ex cuiusque diætæ, in victus ratione & vitæ instituto, tum ex temporum defectionibus in tempestatum alteratione, & alienatione. Nam morbi omnes veniunt, nascuntur, principia causasque ducunt, ἢ ἀπὸ τῆς ἑξωδου, ἢ ἀπὸ τῶν ἐντέρων, i. aut ab iis quæ extra sunt; aut ab iis quæ intra inuilia. Quæ duæ sunt causæ τῶν νόσων, quod in quibusque morbis accuratè discendum & præuidendum magister præcepit, non admirandum, ut quidam neoterici censuerunt. Nihil enim minus est philosophi quàm admirari, & consensescere in admiratione. Sed ut redeamus ad propositum.

lib. 1. de
morb.

Enimvero rheumatis concitati vnde consistens exurgit ad faciendam pleuritidem, triplex omnino causa considerari solet; humoris feritas & orgasmus, exclusio partis potentis, & dolentis attractio. Ex verò ex earum causarum notitia indicationes in promptu sunt in retrahendo, reuellendo, & deriuando: quemadmodum ex perspicientia rheumatis consistentis vbi & cuiusmodi sit, in vacuando & detrahendo. Sed illa differuntur post. Nunc rheumatis concitati causas propalam explicemus. Ac primum organici causa est feritas humoris substantia tenuis, qualitate acris atque maligni, & temperamento aut corruptione calidi. Exclusionis autem, partis quæ continet magisterium in eam quæ continetur. Nam partis dolentis attractio cernitur in vtraque αἰσθησίν. Omnium autem causarum rheumatis concitati affluxus consideratur per venam iugularem, αἰσθησίν, mammariam, & thoracicam. Hinc veniunt, pleuritis superior, inferior, antica, postica siue dorsalis: quæ cuiusmodi sint vnaquæque in specie & idea, tum autem quænam habeant ὑποφαινόμενα & ὑπερφαινόμενα, demonstrabitur in decisionibus singularum. Hoc igitur sit veluti pleuritidis proœmium. Nam cætera quæ pertinent ad διαγνωσίν & ἀντιφασίν pleuritidis, loco dicentur.

Ergo. INTER PLEVRITICOS, QVIBVS INITIO] Quando natura morbificis causis opprimitur, ac tum pleuriticus tumor primum assurgit, necdum pepasmo mirificatus est, necdum etià liberalem habet nec liberam à forti naturæ contentione αἰσθησίν, i. expurgationem sputi panca bile, aut sanguine pauco exquisitè permixti.

VARIÆ SVNT EXPVITIONES] Vulgata scriptura legit πύμποι, nos autem legendum putamus πύμποι: quoniam scripturæ affinitas est in vocibus πύμποι & πύμποι, facilisque ex alterutra in alteram lapsus. Quæ autem affinitate vocum πύμποι πύμποι pro πύμποι hic annotandæ visæ sunt; alibi leguntur πύμποι in hanc sententiam. Atqui πύμποι πύμποι, καὶ πύμποι πύμποι eadem significatio est, idemque sensus. Et verò cur πύμποι, non autem πύμποι πύμποι, legendum duxerimus, causæ in promptu sunt. Nam primum τὸ πύμποι, i. omnino purulentum, non præ se fert ideam puris corrupti & fædi odoris, cuiusmodi est αἰσθησίν καὶ σπυρσίνος, i. amurcosum & cænosum, quod in omni phymate nobilium partium, & quolibet morbi tempore, mortem subesse testatur, nec vllum promittit aut recipit alleuamentum.

lib. 1. de
morb.

Mors in

Mors in propinquo est. Suppuratum autem laudabile, neque tam citò fit, ut sit & appareat incurre morbo: & cum apparet omni ex parte purulètum, non magis metum adfert sinistri iudicii quàm spem secundi. Quinetiam suppurati laudabilis hæc prima lex in arte sancitur, ut omni ex parte sit purulètum, i. æquale & album. Nam inter suppurationes thoracis atque pulmonum illæ sunt perniciosæ admodum quæ spurto adhuc bilioso suppurant, siue biliosum sputum atque pus inter se diducta, siue etiam mixta expurgentur. Sunt igitur *πυρρίαι πύσσης* seu variæ exspuitiones, colore & consistentia multum variegatæ, ex perenni affluxu rheumatis concitati, & ab excursu viscerum hypochondriacorum, tum ex afflictione partis obsessæ à rheumate consistente in qua ex eo affluxu fit *απιδωρ* ή *ρήγες*. Huiusmodi sunt expurgationes cruentæ, liuidæ, flauæ, nigræ, & fædi odoris, quæ quidem incurre morbo procedunt *δυσπνœα*, i. *ruptione venulæ*, cum laxatus est *απιδωρ*.

lib. 2. progn.

lib. 1. de morbo.

aph. 47. 4.

lib. 2. progn.

Coac. 12. cap.

7. lib. 2.

10 **II TERTIO DIE MORIUNTUR, AUT QUINTO**] Sic 3. lib. *περὶ νόσων* vnde vulgatam scripturam correximus. Ergo tam citò moriuntur, tamque cita mors venit: quoniam à ruptura venulæ sanguis effusus corrumpitur, bilis à iecore affusa ex labore hypochondrij tum ex feruore sanguinis, pro expurgatione inchoata, spadonæ infer thoraci, vnde homines suffocantur. Est etiam periculosa febris, & affluxus perennis syntimoria. Sic enim *ὑπὸ ἀπιδωρὸς καὶ σπυγνῶς* ad exitum præcipitantur. Multum etiam facit ad citam mortem, doloris acerbitas & dyspnœa. Nam desperatæ salutis propter *ἀπιδωρ* & corruptionem signum est sputi varietas, vnde plurium affectionum significatio fit, indeque peiùs res enit.

QVOS SI EFFUGERINT] Validarum virium beneficio, & partium spirabilium amplitudine; vnde minora omnia suppressionis, corruptionis, & dyspnœæ. Sic enim lib. 3. *περὶ νόσων*, *ταύτας δὲ διαφυγόντες, ὑγιαίνουν*, i. *hos qui effugerint, sanantur*.

NECDVM ILLIS MVLTQ SIT MELIVS] Ut nondum morbo defuncti sint per liberalem & liberam expurgationem, vnde restituta sit libertas spirandi, ac dolor quicuerit; maneat autem *δυσπνœα*, καὶ ἡ σπυγνῶς.

SEPTIMO, AUT NONO, AUT VNDECIMO INCIPIVNT SVPPVRARI] Huc pertinet quod scripsit 1. lib. de morbo. Ex quo apparet *πύσσης* malè hîc legi *πυμύοις*, incurre morbo. Ac suppuratum quidem illud, ab interitu semper non vindicat purulentos. Distinctiones infrâ positæ sunt.

30 2. Οἷσι δὲ ἀνω ὡπὸς ἐρύθδος τῆ πλθρεπικῶν, καὶ ὁμοίως δερμαίνονται, καὶ κοιλίη τεταράσσεται χολώδεα καὶ δυσώδεα· εἰκοσαῖοι καὶ τεσσαρακοσαῖοι κινδυνώουσι. φυγόντες δὲ ταύτας· σωζονται.

Meliùs sic, ex lib. 3. *περὶ νόσων*.

40 Οἷσι δὲ τῆ πλθρεπικῶν τεταράσσεται· τῇ κώτον ἐρυθρίαν, καὶ τοὺς ὁμοίως δερμαίνεσθαι, καὶ ἀνακαθίζοντας βαρυώεσθαι, καὶ ἡ γαστήρ ἐπτατάσσεται· χλωρῶ καὶ δυσώδε σφόδρα· ἔτοι διατλήναι ὑποχώρησιν τῆς γαστρός, εἰκοστὴ δὲ ποθνήσκουσι. ταύτας δὲ διαφυγόντες· ὑγιαίνοσι.

50 *Quibus autem pleuriticis illud accedit etiam ut multum rubeat dorsum, incandescant humeri, & ipsi residendo grauentur, aluus autem perturbata viridi & multum fætida bile feratur; ÷ sanè propter eam subductionem vigesimo die intereunt: quos si effugerint; periculo defunguntur.*

PLEVRITICORVM hæc sunt accessoria mala, dorsum rubere, humeros incandescere, residendo grauari, & aluum ferri viridibus excrementis ac fædi odoris.

QVIBVS AVTEM PLEVRITICIS ILLVD ACCEDIT ETIAM] Præter communem pleuriticorum conditionem & statum qui cernitur in dolore punctorio, spiratione difficili, sicca tussi, & febre assidua.

60 **VT MVLTVM RUBEAT DORSVM**] Ab erysipelate illie exorto, quod fecit rheuma concitarum pervenam thoracicam, vnde fit pleuritis illa quam vocat dorsalem. Ergo non sine causa, sed merito, legendum duximus *ἐρύθδος ὡπὸς*, non *ἀνω ὡπὸς*, ut in vulgata scriptura. Non enim video quid sit, rubere superius aurium partes, nec quorsum appareat illa coloratio ad *μετὰ πύσσης* pleuriticæ materiæ per *ἀπιδωρ* ad parotidas, quæ sub auribus oriuntur, non supra aures. Nec verò *δυσπνœα* est authoris dicere de pleuritidis ad parotidas *ἀπορρίν*. Nulla enim est æquitas ad comminisci dum cœpta pleuritidis assurgit: sed cum iam maturuerit, & anagogen copiosam non habuerit. Verùm hîc nona quædã pleuritidis idea & forma statuitur, quæ accuratè scripta legitur lib. 3. *περὶ νόσων*. Ergo rubet dorsum ab erysipelate seu erysi-

lib. 3. de morbo.

pelatosa phlegmone, quæ à coloratione rubra quam habet, non raro *ἔρευθος ἢ ἐρύθημα* nominatur; vtsu-
prà posuimus in angina.

INCANDESCANT HYMERI] Vicinia, contactu, suppressione & corruptione humoris *ἢ κα-
τ' omnium calidissimi*: nunc autem *ἰσὺς ἀσπιδώτος καὶ σιτηδωτός* calidioris & acrioris.

lib. 1. progn.

ET IPSI RESIDENDO GRAVENTVR] Ac si diceret; si residendo maior oppressio sit
quàm leuatio, in difficultate spirandi; quamuis in residendo vnicum sit allucamentum, etiam in peri-
pneumonia. Sic enim fatentur peripneumonici omnes, maiores angustia thoracis atque pulmonis op-
primi se in declini decubitu, quàm in acclini. Ergo si vnde leuatio esse debet, maior sit oppressio. Id au-
tem accidit propter *ἀσπιδώτα*, & contractionem musculi ferrati maioris qui ex omoplatæ basi tota inte-
riore fertur in costarum nouem superiorum ossa, longiùs quàm in ipsarum spatia; & eius musculi qui ex
inferioribus tribus colli spinis, & prima metaphreni, fertur in tria spatia costarum quatuor superiorū:
contractionem autem illi musculi patiuntur dolorificam à rheumate concitato venarum & arteriarum
thoracicarum, quibuscum viciniae & societatis sympathiam habent musculi nouem omoplatæ ducto-
res, qui omnes residendo magis laborant quàm decumbendo in contractione iniussa. Sed ea incommo-
da spirationis sic describuntur ab Hippocrate. *Ἡ δὲ ἐς τὸν ὀστέον πλευρίτις ποσὶν δὲ διαφέρει τῆς ἀλλοῦ τὸν ὀστέον δυνά-
ται ὡς ἐκ τῆς πληγῆς, καὶ συνῇ, καὶ ἀναπνέει ἀσπρόν. 1. Pleuritis dorsi à reliquis sic differt; dolor est dorsi, ciulatus, & spi-
rationis oppressio.*

lib. 3. de acut.

ALVVS AVTEM PERTVRBATA] 1. Proritata morfu excrementorum subeuntium, ipsaque
multum laxata: id enim significat *παρὰ τὴν καλὴν*.

Coac. 15. cap.
24. lib. 2.lib. 3. c. 15. rē-
sur, lib. 3. c. 15.
σφίγας, &
Coac. 12. cap.
20. lib. 2.

VIRIDI ET MVLTVM FOETIDA BILE FERATVR] Quæ corruptione propriæ sub-
stantiæ in vitio est, quam genuit febris acuta vnde liquitur pinguis humor, & caro recens pressa, ac fan-
guis aduritur, vt supra positum est in cerebro inflammato à musculis crotaphitis. Nec solum hoc facit
pleuritis dorsalis: sed etiam mictionem ciet cruentam quæ refert *τὸ ἰχθυώδες*, quod è carnibus assis exudat,
eodem planè vitio renum quo ipsum iecur fundit per aluum proluuiem saniosam. Omnino autem
sympathicæ sunt illæ duæ pleuritidis dorsalis excretiones: proptereaque morbum non leuant. De vini-
dibus autem & foetidis deiectionibus loco dicitur.

II SANE PROPTER EAM SVBVCCTIONEM] Quæ toto genere symptomatica est dys-
entericâ, colliquamenti soboles, vnde non minùs laborant ægri quàm à dorsali pleuritide.

VIGESIMO DIE INTERVNT] Qui finis est acutorum morborum. Intereunt autem *συντομία*
morbi atque doloris, & virium exolutione, collapsis naturæ præsidiiis. Quorum enim morborum *συντο-
μία* est cum excretionem symptomatica; ipsæ & citò vires labefactant, & citam inferunt mortem.

QVOS SI EFFUGERINT] Validarum virium beneficio, propria crisi, & ope eorum quæ exhibetur.

PERICVLO DEFVNGVNTVR] Restituta libertate spirandi, & æconomia naturali vnde peri-
clitabantur dum in vitio erant. Ex quibus efficitur, symptomatum etiam fugacium calamitosa vi ho-
mines mori, nisi illa breui quiescant: tamen si eorum causa non firmiter fixa sit, sed leuiter pressa in prin-
cipatu animalitatis aut vitæ.

Hæc pleuritis descripta legitur lib. 2. *ἡ δὲ νόσος* his verbis. Febris detinet cum stridore & sicca tussi, expuunt
viridia; nonnunquam liuida; latus dolore corripitur, dorsum rubet, calet caput, pectus, venter, pedes, cruræque; re-
sidendo æger grauius tussit, difficilius spirat: aluus turbata fertur viridibus & graueolentibus excrementis: hic mo-
ritur intra viginti dies, quos si effugerit; sanatur.

3 Αἱ ξηραὶ τῆς πλευρίδων καὶ ἀπλυστοὶ χαλεπώταται. Φοβεραὶ δὲ
ἐν οἷσιν αἰὼν τὰ ἀλγύματα.

*Sicca pleuritides & sputi expertes; grauiissima: terrifica autem in
quibus dolorifica sursum sunt mala.*

IN MAGNA pleuritide, salutis desperatio esse solet si nihil fiat, nihil appareat, quod systrophicæ in-
flammationis laxitatem adferat, vnde remissio sit grauiissimorum symptomatum quæ ab ea inflammatione,
dum viget, nascuntur & oriuntur. Systrophicæ inflammationis laxitatem adferunt fomentum, detractio
sanguinis, & liberalis ac libera sputi expurgatio; per quam ipsa pleuritis non raro *αὐτομάτως* quiescit.

Ergo. SICCA PLEVRITIDES] In quibus non humescunt ora pleuriticorum: sic enim præceptor
loquitur lib. de morb. acut. Ad quem locum hæc scripsit Galenus. Sicci, inquit, morbus cognoscitur mul-
tari: quamuis in vniuersum communis ratio sit cognoscendi. Nam peripneumonia, pleuritidis, omniumque adeo mor-
borum thoracis, pulmonum, & arteria, siccitas innotescit quando ex affectis partibus nihil spendo excluditur. Hepatis
autem, mesaræ, ieiuni, lienis, cæterarumque alui partium; quædo vel ipsa in totum suppressa aluus est, vel non nisi co-
acta *ἡδὲ ἀνάγκη* excernit, eaque dura & pilularum veruecinarum similia. Venarum & arteriarum percipiuntur
sicci morbi, asperitate linguae, & cutis squalore. Sic vlcera sicca sunt ex quibus nihil exudat ichoris: sic ophthalmie
sicca, &c. Sunt autem sicca pleuritides: quia nihil ab inflammatione exudat, vnde humescat os in sputando.

ET SPVTI EXPERTES] Sputi vacuitas non separatur nec distinguitur à sicca pleuritide, lib. 3.
ἡ δὲ νόσος. Hippocratis verba hæc sunt, *εἰσι δὲ καὶ ξηραὶ πλευρίτιδες ἀπλυστοὶ*, i. sunt etiam sicca pleuritides sputi ex-
pertes. Sed parum refert. Enimvero sputi expertes sunt quando debent esse participes: quia crassa &
firmiter

firmiter fixæ; aut quia pleuriticus non satis habet animi ad ciendam thoracis concussionem, doloris metu; aut quod peius est, non sunt illi validæ vires ut fortiter concutiendo excuriat *πύελος*: quibus accedit quod materia sæpe non est expectorabilis, tum propter contumaciam glutinosam ab ardore, tum propter cfferam tennitatem quam fumidus vapor complecti non potest, nec alæ pulmonum satis explicatæ ad liberum exitum. Atque hæc incidunt sua sponte, & prohibent *ἀνακαταρσις*. Non minora autem sunt mala quæ veniunt à diæta inconsideratè præscripta, si fortè nec iure, nec loco ptisana quamvis reapse optima, exhibeatur, quæ ex eo præpostero vsu pleuriticos primùm facit *ἀπύου*, mox *πνευματίας*; vnde septimo die, aut etiam celerius moriuntur.

GRAVISSIMÆ] In quibus periculi summa sunt omnia. Nam *χαλεπώταται & ὀδυνηρόταται* idem sunt. Sunt autem gravissimæ & periculosissimæ: quoniam in laxitatis vacuitate accessio fit maioris tensionis, vnde difficultas spirandi maior augeat contumaciam humoris expurgandi, quemadmodum hæc rursus difficultatem spirandi; quæ duo *ὡς ἀνακαταρσις διήκους ἐς τὸ κακόν*, i. *mutuas tradunt operas in perniciem ipsius pleuritici*, quæ paulò post suffocat orthopnoea & stertor. Vt enim beneficio *τῆς ἀνακαταρσιος* pleuritides ipsæ sua sponte quiescunt, earumque redintegratio comparatur simplex & facilis, perfectæ, & sine metu relapsus: ita si careant *τῇ ἀνακαταρσὶ*, nihil opis adferri potest à medico quin vel illæ ad exitum præcipitent ægros, vel ipsos faciant purulentos, vel transferantur ad pulmones & ad cerebrum ipsum, vel successionem abscessuum habeant tum ad parotidas, tum ad crura; nisi eorum abscessuum vindices viinæ sint purulentæ, abradentes, stranguriosæ, & confertim proruptæ. Quæ omnia sæpe sunt eiusmodi, ut qui habet, periculum mutare, non effugere videatur.

TERRIFICÆ AVTEM] Quæ metum adferunt citæ mortis, aut certè sinistri iudicii, cum accessione & successione graviorum malorum.

IN QVIBVS DOLORIFICA SVRSVM SVNT MALA] Enimvero dolorifica sursum sunt mala quæ firmiter fixa sunt in supera regione costarum, à rheumate concitato per venam iugularem quæ alit tria spatia costarum quatuor superarum. Atque hæc pleuritis omnino terrificæ est, tum specie ipsa, tum sympathia nobilissimarum partium sociarum & vicinarum. Hæc enim consortem habet sui doloris claviculæ: propterea quæ sanguinem liberaliter detrahendum præcepit Hippocrates, incisa vena interiore cubiti, tum ad retractionem rheumatis concitati, tum ad detractionem consistentis. Sed dolorifica mala sursum esse dicuntur etiam, quæ habent translationem supra iugulum. Qua de re iam supra illud positum est. Dolorus acerbitas paulisper affixæ iugulo, si sursum proreperit, vel ad superiora veritur; *75. Coar. lib.*
 mortiferum infert malum: infert enim phrenitidem; sicut pleuritis infera peripneumoniam.

4 Πλευρίτιδες αἰνὰ σπασμάτων χαλεπώτερα τῶν μὲν σπασμάτων.

Pleuritides anulsionum expertes, graviores ijs quæ sunt participes.

IN OMNI phlegmone systrophica nobilium partium bona est transitio quæ & laxitatem adferat partis obsessæ, & inoffensas relinquat nobiliores; neque recursum faciat humoris velut postliminio revertentis eò vnde cursum inflectit. Ac transitio quidem in pleuritide obuiis, quod aiunt, vlnis excipienda quæ fit intus foras, tum expellendo, tum attrahendo. Hoc illud est quod spectat instituta prognos-
 40 sis. Est autem huiusmodi.

PLEURITIDES] Quarum natura iam supra est posita in phlegmone systrophica tunica costis intertæ; nunc autem aliam præ se ferunt ideam in hac prognosi expressam.

AVULSIONVM EXPERTES] Sic Græcum illud conuerit, *αἰνὰ σπασμάτων*: quatenus non ita bene, donec meliora Dominus. Est autem hæc *ἀφύσιος* præceptoris. Quæ vigent pleuritides sine vicinarum carniū spasmate, aut venarum spadone; siue illa faciat exclusio phymatis pleuritici à forti naturæ contentione, siue ipsa carniū & venarū attractio. Etenim spasma ipsum fit *ὡς τὰς ἰσας τῆς μὲν ὀδύνης πλεονεξίας*, i. *cum scilicet musculorum fibra plurimum distendantur*, adeo ut nonnullæ disrumpantur: quam affectionem recentiores medici propriè *σπῆγμα* nominarunt. Hæc sunt Galeni ad librum Hippocratis *κατὰ τὴν ἐν τῇ φλέβῃ*, quāquam nihil erat necesse huic aduocare recentiorum medicorum auctoritatem super nomine *τῆς σπῆγματος*, quod primus Hippocrates ei affectioni verè imposuit. Sed ea prægrandis fibrarum distentio accidit sua sponte, vel præuisa. Ac sua quidem sponte, ab iis quæ intra sunt inutilia, vel quæ adveniunt extrinsecus. Sua sponte intrinsecus accidit, quando à phymate pleuritico exudat tenuior humoris portio, sicut ab omni phlegmone systrophica exudare solet, modò partis densitas non impediatur, ut in cute; ipsam verò portionem exudantis atque quodammodo expressi humoris caro ad sese attrahit, unde fibrarum distentio quam veteres nominaverunt *σπῆγμα*. Quinetiam venarum circumiacentium vi attractice quæ ipsas carnes præcedunt, fit *σπῆγμα* in ipsis, & varicosæ redduntur. Sed eadem *σπῆγμα* extrinsecus veniunt, sicut Hippocrates posuit. Nascuntur autem *σπασmata*, tum à laboris contentione, tum à lapsu *et casu*, tum etiam si quis pergrauē onus leuare conetur, tum à cursu *et luctu*, *et quæ sunt eiusmodi omnia*. Sed idem præceptor in catalogo symptomatum à *τρώματι* exortorum, spasma recenset his verbis, *σπῆγματος, contusiones, distentiones σπῆγματος, tumores sine inflammatione, à τρώματι sunt*.

Ergo. PLEURITIDES DISTENTIONVM EXPERTES] Quæ carent omni distentione venarum & carniū vicinarum, nulla expressione facta è phymate, nullaque venarum & carniū attractione.

GRAVIORES] Periculosiores: præsertim si pleuritides siccae maneant, & sputi expertes. Sunt autem periculosiores: quoniam in sputi vacuitate, quæ propria est crisis pleuritici, nihil est quod citam adferat laxitatem partis obsessæ, qualem adferre solet spasma vicinarum partium per transitionem exortum. Rationi autem consentaneum est ut expurgatione denegata pleuritico, in qua spes omnis vitæ consistit, retractio fiat rheumatis concitati, & consistentis detractio: quæ duo auxilia nisi præstò fuerint, tum in angusto spes est. Sed eorum auxiliorum commoda secum adferunt spasmata illa quæ in pus vertuntur; modò sint analogæ pleuritico phymati. Nam de exiguis illud præceptum est. *Nonnulli cum spasmata venarum aut carniū exigua surrexerint; non suppurat phlegmone, sed diu manet.*

IIIS QVÆ SVNT PARTICIPES] Contraria contrariorum sunt consequentia. Nam de pleuritidum exitu cum spasmate coniunctarum, hæc fuit sententia præceptoris. *Quòd si ad humerum transi dolor, cum gravitate manus, stupore & segnitie; vel si sese in venam obfirmat ad humerum dorsumque pertinens; latus repensè liberatur.* Eò spectat igitur hæc diuina prognosis ut intelligamus, pleuritides siccas & sputi expertes, tum autem in quibus dolorifica sursum sunt mala; quamvis alioqui mortifera videantur, ipsas tamen reddi sanabiles exorto spasmate foris in vicinis partibus, per transitum phymatis pleuritici, quem fecit attractio & impulsus. Quanquam & aliam in partem sic accipi potest.

Quod quoniam siccarum pleuritidum & sputi expertium multæ sunt causæ cur ita sint, ut suprà posuimus; nunc eam proponit quæ infert desperationem salutis, ex denegata thoracis concussione ad excussione humoris pleuritici cum mirificatus fuerit. Non enim bona est omnis concussio. Nam sternutamenti noxia est in pleuritide. Sed ea sic habetur optima quæ loco fit, & sponte nostra ruffiendò κατ' ὄρεσιν, ἢ κατ' ἀνάγκην, i. impetu aut voluntate. Atque inter systrophicas nobilium partium inflammationes, illa quæ facit pleuritidem, privilegio exoluitur partis obsessæ, cuius magna vis est in concutiendo ad ruffiendum & extruffiendum. Sed illa concussio si denegetur, ex illo concidit omnis spes medici & ægroti. Hinc senum pleuritides ob eam sanè causam sunt insanabiles: quia illi non habent firma latera ad expectorandum.

ς Τῶν πλευριτικῶν οἷσιν ἐν δερμὶ γλῶσσαι χολώδης γίνετ'· ἐβδομαῖοι κείνονται· οἷσι δὲ γ, ἢ δ, πρὸς πλὺθ.

Quibus pleuriticis continuò lingua bile suffusa est; septimo iudicantur: quibus autem tertio aut quarto; ad circiter nonum.

ACTORVM morborum citæ sunt crises in propria cuiusque specie & idea, unde cita mors venit, aut victoria lata. Causæ suprà sunt positæ. Nunc in pleuritide signum citæ crisis docetur, quod cernitur in lingua pleuritico humore fucata.

QVIBVS PLEURITICIS, CONTINUO] Simulatque dolere cœperunt ex latere, sterno, thorace: quoniam pleuritis est erysipelatosa, facilèque prorepit & exudat humor pleuriticus à rheumate consistente. Hic enim nomen τῆς δερμὶς significat πλὺ πρὸς πλὺ ἐβδομαῖοι.

LINGVA BILE SVFFVSA EST] Non quidem per sympathiam τῶν πρὸς πλὺ, i. partium vicinarum & sociarum incendio conflagrantium, quibus est γλῶσσαι ὁμόχρους, i. lingua concolor: sed per μετὰ τὴν vel ἀπὸ τῆς bilis pleuritice prorepentis ab inflammata parte secundum membranam quæ à larynge exorta, lingue obducitur: sicut eadem gemina ligamento inde nato coniungitur, acerrimi sensus; atque illud ligamentum facit linguæ τὸ δερμίδιον, i. lineam medianam. Ergo lingua sic bile fucata uti fucatur facilè; tum propter opportunitatē τῆς πρὸς πλὺ, tum propter ipsius mollitudinem & raritatem. Non enim hæc bilis suffusio referri debet ad saporem bilis amarum, sed ad colorationem ipsam. Sed illa coloratio maneat ipsa per se, neque coniunctam habeat ullam characteris aut molis mutationem; ut neque sit rigidiuscula, neque aspera, neque sicca, neque hiulca.

SEPTIMO IUDICANTVR] Quoniam quorum morborum cita mutatio est, cita quoque fit crisis. At cita mutatio cernitur in celeritate τῶν ὁπαραγμένων quæ iure & loco apparent. Iure & loco apparet quæ continuò fit anagoge phlegmonarum systrophicarum, tam hypochondriacarum, quam præcordialium. Sic inflammatio hepatis quò citius venit hæmorrhagia liberalis, eò res ægri melius eunt. Sic in pleuritide cita expurgatio libera & liberalis sputi boni, citam quoque infert crisin & simplicem & perfectam, & meruentem reuerti. Neque obstat quod alibi sancitum est ab Hippocrate. *Crisis non statim appareant.* Distinctiones suprà sunt positæ. Sed quaeritur utrum ea crisis quæ secundo incidit quaternario, lingua in pleuritide continuò bile fucata, sperabilem faciat vitæ salutem, an contrà sit desperata salutis. Enimvero κείνη & τὸ κριμον, secundi aut sinistri iudicii esse dicuntur; prout accessionem habent bonorum aut malorum signorum. Nam oculorum nitor eorum qui antea colorem genuinum decorumque amiserant, est κείνη, i. salutare. Lingua autem quæ multum nigrescit, intra decimum quartum crisin fore ostendit funestam, si maneat in tali colore. Ergo si lingua bile dilutiore fucata sit, non saturata, ut æruginosa & nigra; neque κατὰ τὴν πύονος, quod liquitur à febre acuta; sed à laxitate & scro πρὸς πλὺ, i. tunice costis intextæ, ex qua per ipsos pulmones exudat serū biliosum quod prorepit ad linguam secundum membranam laryngis unde ipsa vestitur; indeque os humescat, & sputum modica bile acurate permixtum procedat: lingua, inquam, sic fucata salutarem fore crisin denunciat. Non enim minora

minora sunt argumenta futurarum criseon in qualitatibus corporum, quam in pepasmo humorum morbosorum. Sin autem lingua æruginosa bilis & tetri vaporis, à pingui humore qui liquitur, infectione sit multum fœdata, eadēque liccior facta, primum sit rigidiuscula, mox aspera, postremo hiulca; mortiferam fore crisin denunciat.

QVIBVS AVTEM TERTIO AVT QVARTO, AD CIRCA CIRITER NONVM] Quoniam similiter sit à primo die ad septimum, sicut à tertio aut quarto ad circiter nonum. Nam quæ citò humescit *lib. 1. de acut.* παρὰ πρῶτον, citam quoque crisin promittunt; tardiores quæ feruunt. Illud autem πρὸς τὴν ἀνάπλω, verti, ad circiter nonum, secutus illud quod alibi scriptum est de luxata maxilla. ἔπειτα οὐδὲ θηροκοιοὶ δεκατῆροι μάλιστα. i. Atque *lib. 2. de feb. 3. 4. 5.* hi moriuntur ad circiter decimum diem, i. nono vel vndecimo, vt ex illo μάλιστα, interpretatur Galenus. Itaque talium pleuriticorum crisis erit nono vel vndecimo, vt apparebit lingua facata tertio ad nonum, quarto ad vndecimum. Tales autem pleuritici, omnes iudicantur septimo die.

6 Πομφόλυγος δὲ ὑποπελὺς γινομένης ἐπὶ τῆς γλώσσης ἐν δερμὶ, οἷον ἰσθητὴς βαφύπος ἐς ἔλαγον· χαλεπωτέρη ἢ δόπολυσις· καὶ ἡ μὲν κείνη ἀφικνεῖται ἐς πλὴν ἰδ', αἷμα δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πύοισι.

Subliuida autem bulla continuò in lingua tumescens, qualis est ferri candentis in oleum immersi; difficulter exolutum iri morbum ostendit. Atque ipsa crisis decimoquarto venit. Ac ferè sanguis expuitur.

HIPPOCRATIS fuit iudicium, argumenta peti ex lingua ad δόπολυσιν καὶ πύον πνεύματι pleuritidis, *lib. 3. de feb. 3. 4. 5.* Præter commemorata signa in vnaquaque pleuritide, hæc etiam spectare oportet in lingua. Deinde subiungit propositam prognosin.

SYBLIVIDA AVTEM BULLA] Ac si diceret; secus est de lingua bullata quàm de fucata, præsertim si bulla subliuida sit quæ inter phlyctænas & omnia exanthemata principatum obrinet malignæ *lib. 4. acut.* cacochymia; vnde assurgit. Est autem bulla in solido corpore, phlyctæna siue pustula velut ambusta, ποικίλων vocat Hippocrates: quemadmodum in humore ex eo circumtenso à spiritu flatulento. Excitantur enim pompholyges in liquido circumtenso à calore & flatu; stabiles quidem in crasso & glutinoso; fugaces verò in tenui. Hinc generatio spumæ. Corporum autem pompholyges, ἢ φλυκταίναι, ἢ φλύκταινα, nihil refert, exoriuntur & assurgunt ex collectione venenatorum ichorum, corporis superficiei amburentium aut erodentium. Nam de ichoribus à tempestate austrina cum densis nimbis & rapido æstu natis atque collectis, illud memoriæ proditum est. Ὑπερθερμὸν μὲν ἐν τῇ δέρματι ἰχθῶρες· ἐγκαταλαμβανόμενοι *lib. 3. de feb. 3. 4. 5.* δὲ, ἐδηρμαίνοντες, καὶ κηροῖαν ἐν ποικίλῳ, εἴτα φλυκταίνιδες ὡς πρὸς ποικίλῳ δόπολυσιν. i. Ichores suberant sub cute, qui conclusi incalcescebant, pruritiūque faciebant, inde pustula assurgebāt ambustis similes. Sed tamen eorum ichorum, atrabilarij cæteros feritate & omni qualitate maligna præcedunt. Hinc pustulæ illæ liuentes, quæ vt *lib. 3. de feb. 3. 4. 5.* πλὴν ἰδ' οὐκ ἀφικνεῖται ἐν τῇ γλῶσσῃ primū eiusmodi sunt: ira non multò post, magis liuent *lib. 3. de feb. 3. 4. 5.* πλὴν ἰδ' οὐκ ἀφικνεῖται ἐν τῇ γλῶσσῃ partis ambustæ bullatæ. Sic oculi liuent suggillatione, aut extinctione caloris viuifici.

Ergo. SYBLIVIDA BULLA CONTINVO IN LINGVA TUMESCENS] Ineunte statim pleuritide quam excitauit *lib. 3. de feb. 3. 4. 5.* ἀπὸ πύον siue contractio lateris velut ab ictu aut iactu impressa; vnde pleuritici apparent βλητῆ, i. de celo tacti, quibus liuentes bullæ assurgunt in lingua, exudante sero atrabilario per membranam laryngis quæ superinducitur linguæ, ipsaq̃ue circumtenso linguam facit bullatam atque fucatam feri colore.

QUALIS EST FERRI CANDENTIS IN OLEVIM IMMERSI] Nam ferrum fornacarium, necdum lima perpoliturum cū incanduerit, si oleo perfundatur, aut immergatur; eo circumtenso quod pingue est, bullam edit stabilem arque liuentem.

DIFFICVLTER EXOLVTVM IRI MORBVM OSTENDIT] i. Spem in angusto esse testatur, difficilēque morbum, seu periculosum (id enim significat τὸ χαλεπὸν) tum propter humoris morbosifici feritatem quæ partium substantiam labefactat, tum propter denegatam distento lateri laxitatem, vnde maioris tensionis accessio quæ auget difficultatem spirandi: quemadmodum hæc rursū matetiz contumaciam; quæ duo afficiunt se mutuò, certantque ex æquo in ægroti perniciem.

ATQVE IPSA CRISIS DECIMOQVARTO VENIT] Non quidem simplex, nec tuta, nec recidiuæ metuēs, qualis esse solet in expurgatione liberali & libera sputi boni. Decimoquarto, inquam, venit, aut inflammatio hæc systrophica in gangrænam potius quàm in suppuratum mutatur. Atque dies *lib. 4. aph.* ille, terminus est inchoandæ expurgationis.

AC FERÈ SANGVIS EXPVITVR] Διὰ τὴν ῥῆξιν τῆς ἀπὸ πύον, *lib. 1. de morbis.* Ac talis expurgatio non est bona in qualitate sputi, *aph. 4. 7.* lib. 4. quod etiam mox infra ponetur.

7 Πτύαλον δὲ ἐν τοῖσι πλινθεῖκοῖσι τελεῖσθαι μὲν δερχόμηνον πεπαλνέσθαι, καὶ πύεσθαι· θάλασσι ποιεῖται δόπολυσιας· ὑπερον δὲ βραδυτέρας.

At verò sputum in pleuriticis, tertianum quidem inchoatum mitigari, & expui; citas facit discessiones: serius autem; tardiores.

BENEFICES enim pleuritici cui valedicit pleuritis. Vale autem dicit à forti naturæ contentione in mitigando, & expurgando inflammationem systrophicam tunicæ costis intextæ. Expurgatio fit per liberam & liberalem expuitionem, unde pleuritis ipsa sponte naturæ quiescit, crisisq; habet simplicem, perfectam, minimèque consciam recidiuæ. Ergo quicumque pleuritici costæ citò expuunt, sperabilem vitæ salutem, & certò & mox futuram ostendunt. Atque fuit illud iudicium dictatoris de discessione pleuritidis. Sic autem scripsit in hanc prognosin quæ illinc desumpta est. *Εἰ δὲ ὅπως τοῖς ἀπαλλάξας. εἰ μὴ περὶ τῆς ἀρχῆς περὶ τῆς ἀρχῆς. ἡ δὲ αἰτία αἰτία. εἰ δὲ ὅπως περὶ τῆς ἀρχῆς. εἰ μὴ περὶ τῆς ἀρχῆς. εἰ μὴ περὶ τῆς ἀρχῆς.* De discessione ita res habet. Si tertio die incipiat coqui & expui; cita discessio erit: sin tardiùs coquatur; serior quoque futura est crisis. Omnis igitur ratio defungendi pleuritide, posita est in pepasmo & anacatharsi inflammationis pleuriticæ. Sed opportunitas pepasmi & anacatharsis, ad facilem, citam, & tutam curationem; in celeritate laudem habet. Nam in pleuritide celeritas etiam mora est: à quâ, dum viget, natura periclitatur, & intolerabili doloris acerbitate, & summa difficultate spirandi. Sic in angusto spes est. Cum igitur pleuritica tensio & proritatio laxari debeat citò, & temperari, ad libertatem spirandi, & doloris vacuitatem; laxitatis & temperationis commoda secum adferunt, pepasmus, & anacatharsis: quæ quò celerius veniunt, eò est ægri maior securitas.

AT VERO IN PLEVRITICIS SPVTVM] Scopus est; patefacta pleuritide in specie & idea, tum autem quemadmodum veniat, vbi stabuletur & ægrum exerceat: sequitur vt exoluendæ ipsius rationem, & redintegrandi lateris è natura egressi rationem indicemus. Ratio autem sic est.

SPVTVM] Excrementum illud quod è pulmonibus & thorace tussiendo per os excluditur, quod propriè dici posset expectoratum: non enim hoc loco *χαλκιδόν* superne aut inferne diffluentem agnoscimus, nec verò excretionem è faucibus; illud *πύσμα*; hanc verò *ἀπὸ χειρὸς* Græci vocant: tamen hæc nonnunquam pro *ἀνακαθάρσει* legitur. Nam quòd *πύσμα* idem significet atque expectoratum, declarat illud Hippocratis. Porro autem oportet sputum in omnibus laterum, pulmonumque morbis citò & faciliè expui. Idem absolutè scriptum laudabile sputum indicat, spei plenum, & in bonis ducendum. Tæstis est illa sententia. In pleuriticis sputum statim ab initio apparens; morbum corripit: sin autem tardiùs, producit. Laudabilis autem sputi descriptio mox infra ponetur.

IN PLEVRITICIS TERTIANVM INCHOATVM MITIFICARI] Quod rudimentum edit pepasmi in bile sputo accuratè permixta; in crassitudine meabili, in exitu facili, & minore doloris & tussis molestia. Hæc enim sunt pepasmi commoda: partis afflictae laxitas; materiæ præparatio; meatuum libertas; & fortior naturæ contentio. Nam de pepasmo non ita pridem multa scripsimus in angina. *Τετάρτον* porro legendum duxi, non *τέττον*; vt sit pronomen denominati à die tertio sputi, non autem numerati: sic in historiis Epid. *τετάρτοι ἄρρωστοι*.

ET EXPVI] Vnde significatur vtriusque principatus integritas atque robur, naturalis in coquendo, & animalis in expurgando. Vnde igitur vis naturæ apparet, morbiq; remissio, inde salus vitæ sperabilis esse debet.

CITAS FACIT DISCESSIONES] Citò excludit pleuritidem cum certis signis, & iustis causis: signis quidem, in pepasmo qui semper celeritatem & securitatem crisis ostendit, ac semper exoptatus apparet quotiescunque inciderit, modò vicissitudinem non habeat cruditatis aut prauitatis. Causis autem, per liberam & liberalem expurgationem, cuius commoda sunt explicata.

SERIVS AVTEM TARDIORES] Vt enim cita concoctio & cita expurgatio citam adfert crisis: sic tarda difficilem, inchoaram, relapsus capacem, variam, nec ita securam: quoniam illa tarditas opportunitatem adimit humoris meabilis, naturæ expellētis, & liberorum meatuum. Inde pleuritis manet non solùm difficilis, sed etiam sinistra iudicij. Exigua quædam spuebant, crassa, paulatim cocta, vi educta. Quinetiam quibuscum violentissimè agebatur; illis ne paulisper quidem aderat concoctio, sed cruda perpetuò spuebant. lib. i. Epidem.

8 Τὰ δὲ ἀλγήματα. τοῖσι πλῆθει τοῖσι χεῖσιμον κοιλίῳ μαλασσειν, πύσμον χρωμαλίζεσθαι, ψόφοις ἐν τῷ στήθεϊ μὴ γίνεσθαι, τὸ ἔργον δύσδεν. τὰ δὲ τούτων ἐναντία δυσχερῆ, καὶ πύσμον γλυκανόμηνον.

Atque hæc sunt dolorifica mala. Pleuriticis autem prodest aluum mollescere, sputum colorari, strepitus in pectore nullos edi, urinam placidè ferri: eorum contraria difficilia sunt, & sputum dulcescere.

HACTENVS de pleuritide quatenus exercet ægrotum. Nunc opportunitates pleuriticorum dicendæ quæ adferunt, quæque iuvant discessionem pleuritidis, ac tollunt obsidionem ipsius, faciuntque commemo-

ATQUE HÆC SVNT DOLORIFICA MALA] i. Arque hæc in vniuersum dicta sint de natura plenitudinis. Quæ scribendi ratio familiariter vsa est ab Hippocrate, quoribus cuique historię colophonem imponit. Sic lib. 3. *ἡ δὲ βίη* in tempestate pestifera & pestilentium morborum catalogo. *Τὰ μὲν βίη* *μάλιστα ποιοῦνται πῦμα*. i. Tot & tales fuere morbi qui populabantur. Et alibi passim huiusmodi multa leguntur. Sed tamen in hac prognosi loco non scripsit author. Arque hæc sunt dolorifica mala. Id enim debuit suprâ positum esse ante illud quod in superiore prognosi adduximus ex lib. 3. *ὅτι πέρας, ἔχθρὸν δὲ ἔσται ὅτι ἀπαιδεύει*: vbi sententiæ scopum aperuimus.

PRODEST] Ad consequendam opportunitatem liberandæ obfidionis pleuritica, & redintegrandæ partis obfessæ.

Coac. 73
lib. 1.

lib. 2. progn.

7.Epid.

Coac.67.82
101.lib.1.

Pleuritides autem biliosa simul & sanguinea, ut plurimum nono aut undecimo indicantur: ac ferè saluti concedunt.

n aph.12.10

2- Coact.
huius cap.

BILIOSÆ SIMVL ET SANGVINÆ] i. Quæ continuò, aut circa initia, sive intra primum

quaternarium expurgationem habent bilis exacte sputo permixta, aut sanguinis unde illa pleuritidis ex-
orta est per systrophicam phlegmonem tunica costis intexta: quanquam illud *ἀμα* non legitur lib. de
morbis. Sed in prognostico, bilis & sanguinis exactam mixtionem commendat. *Αἷμα δὲ συμμεικται*
μὴ πολλὰ πύελον ἔχον, & τοῖς περιπνευμονικοῖς ἐν ἀρχῇ μὲν τῆς νόσου πύελον ἔχον, καὶ ὅτε ἀφελεί. i. sputum verò
flauum pauco permixtum sanguine in peripneumonico inter initia morbi editum; cum spe salutis multum prodest.
&c. Ut enim ab omni phlegmone tenuior exodat portio humoris phlegmonici, modò partis obfesse
densitas non impediat, vt in cute: sic pulmo systrophica inflammatione correptus, humiditatem quan-
dam effundit in spatia sua interna quæ sunt arteriæ asperæ, *βρόγχα* Græci vocant, eamque tussiendo sub-
latam expurgat & excreat; quæ sanè indicio est fluxionis & rheumatis concitati quod peripneumò-
niam excitauit. Est enim serum illius. Itaque si admodum biliosus humor est; ea flaua tantum erit; sin
autem sanguineus, rubra; quòd si ex utroque mixtus, rubra simul & flaua. Ac talis humiditas in bonis
ducenda, si facilem habet copiosumque exitum, cum accessione laudabilium vrinarum. Tale sputum
promoueri debet iis quæ expurgationem iuant, molliendo, leniendo, & sputum ciendo: non autem
sanguinis detractione retrahi & impediri, quod vsuuenire videmus, non sine mœrore & nemesi, ab illis
* pragmaticis vulgò dictis, qui omnem pleuritidis curationem exigunt in sanguinis detractione sæpius ite-
rata quandiu pleuritidis huiusmodi sputa expurgat cum spe salutis prædiuite. O homines Reipublicæ
calamitosos atque funestos! Ipsam pleuritidem quæ sua sponte nullius operis indigens cum tali sputo
quiesceret, ex euentu reddunt mortiferam.

VT PLVRIMUM NONO AUT VNDECIMO IUDICANTVR] Quorum enim morborum
cita ex moru mutatio est, eorum etiam cita crisis esse solet ad interitum vel ad salutem.

AC FERRE SALVTI CONCEDVNT] Hic legitur, *ὕμεινονται μάλα*; in lib. de morb. *ὕμεινονται*
μάλλον γίνονται, i. sanescunt potissimum tales pleuritici ex anacatharsi commemorata sputi quod sit *ἀφελεί*
in copia & excernendi modo: sicut in qualitate bonum est, partim ob citam expurgationem à bile, par-
tim ob facilem pepasum à sanguine. Ac si diceret; talium pleuriticorum salus comparatur à simplici
crisi perfecta, sine metu relapsus. Hæc autem opportunitas defungendi morbo, accidit aut sponte na-
turæ, aut comparata primum laxitate partis & humoris, pepasmo, fotu, litu, & sanguinis detractione.

10 Οἷσι δὲ τῶν πλευρετικών, ἔξ ἀρχῆς μὲν ὁ πόνος μαλθακός, ἐν
5, ὁξυώνηται· μάλλον πρὸς τὰς 16 ἀφινέονηται, καὶ ἐπ' αὐτὴν σώζονται.
κινδυνύουσι δὲ μάλα ἐβδωμάοι ἢ δωδεκαίᾳοι. τὰς δὲ δις ἐπὶ 4 Φυ-
ζόντες σώζονται.

*Quibus autem pleuriticis initio quidem dolores sunt mites, ingraue-
scunt autem quinto aut sexto; facile ad duodecimum usque perueni-
unt: ac rarò illi seruantur. Periclitantur autem potissimum septimo
aut duodecimo. Qui verò bis septem euaserint; periculo defunguntur.*

ENIMVERO sicæ pleuritides quæ alioqui ob eam causam videntur mortiferæ, adhuc sperabi-
lem vitæ salutem ostendunt, si accessionem habeant auulsionum siue *αποσπάτων* per transitum phymatis
pleuritici intus foras. Lingua bile fucata continuò; discessionem morbi fore denunciat septimo die, aut nono: ea-
dem linore bullata; mortem subesse testatur: pleuritides continuò biliosæ simul & sanguinæ; vt plurimum nono
aut vndecimo feliciter iudicantur. Secus in illis fit quæ cum per aliquot dies in occulto latuerint, ingraue-
scunt sexto die, sine vlla spe laxitatis quæ per anacatharsin maximè comparatur. Hæ sunt decisiones
quæ animis nostris infixæ, difficultatem iudicij ad facilitatem conuertunt super ineunda prognosi de
futuro pleuritidis euentu, in discessione illius aut vitæ, necnon de tempore quo euentura est illa disces-
sio. Quæ cum ita sint.

QVIBVS AVTEM PLEVRITICIS] Quorum pleuritides continuò non sunt biliosæ simul &
sanguinæ, unde laxitas comparatur phymatis, materiæ facilis concoctio & excretio, aut principatus
vtriusque, naturalis & animalis integritas denunciatur cum libertate meatuum, & explicatione alarum
pulmonis. Quibus, inquam, pleuriticis hæc commoda non sunt in promptu ad exoluendam pleuriti-
dem (id enim significat disiunctiua particula, AVTEM, vt iam sæpe suprâ posuimus.)

INITIO QVIDEM DOLORES SVNT MITES] Quia non est efferus humor, nec tensio for-
tis, nec inflammatio magna. Sic febrium aliarum quidè mordaces, aliarum verò mites; ac mites quidè, aliarum incre-
scètes, &c. Atq; ex eo loco, τὸ μαλθακὸν diximus esse *μεῖον*: vt quemadmodum febres illic leguntur *μεῖον*,
eadem ratione dolores hic *μαλθακὰ* nominentur. Nam & τὰ μαλθακὰ inter ἀσθένια numerantur, & phy-
mata *μαλθακὰ* sunt ferè ἀσθενή: quemadmodum parotides Thasiorum, quas idem vocat *ἐπάρματα χυτὰ*,
i. vt interpretatur Galenus, *μαλθακὰ*: sicut in illo aphorismo. Τὰ χυτὰ χεστὰ, τὰ ἐννομα· καὶ: vbi ἐννομα vo-
cat *ἀσθένια*. Est igitur consentaneum vt si in tensione, doloris acerbitas posita sit; in mollitudine, remis-
sio eius consistat: proptereaque phymatum *μαλθακὸν πόνος* quoque sint *μαλθακοί*.

INGRAUESCUNT AUTEM QUINTO AUT SEXTO] i. Quæ symptomatum graviorum accessione per *ἐξορτήν* exortorum sunt eximie atque prægrandes, in dolore punctorio, spiratione difficili, sicca tussis, & febre exacerbata; idque nulla comite anacatharsi, nulla in vicinis partibus anulfione, nec lingua bile fucata, fortassis etiam liuore bullata. Ingrauescere autem diximus, non exacerbari: quoniam in motu dierum imparium exacerbari ordinatio paroxysmo nouum non est neque terrificum: sicut neque in parium motu. Quæ paribus diebus aut imparibus exacerbantur; ipsæ etiam indicantur. Sed ingrauescere malum est in omni paroxysmo, pari aut impari. Sic febres continuæ tertio quoque die ingrauescentes, cuiusmodi sunt tritæophyæ quæ semper in paroxysmis aliquid mali adferunt; supra modum periculose. Sic in dierum paritate, magna semper fuit tyrannis sexti diei; ut in Philisco. Ergo si pleuritidis quæ initio fuit mitis ingrauescat quinto die, non quidem paroxysmo crisis prænuncio per anacatharsin à forti naturæ contentione, sed incremento symptomatum pleuriticorum, & accessione grauiorum malorum, ut alysmi, suffocationis, atque delirij, aut cephalalgia. Aut si eadem sexto die proritationem magnam habuerit contra naturam pleuritidis cuius exacerbatio fieri debet diebus imparibus, ut morborum omnium quorum materia bilis est. Talium enim morborum naturæ sunt *ἀδυναμία*, i. quæ impari dierum numero exacerbantur, vel quæ certamine ipso naturæ & morbi, diebus imparibus fiunt, uti iam dixi, eximie & illustres. Hic autem sexto die vires acquirunt & ingrauescunt, feritate comparata veteris & succrescentis cacochymia: quoniam harum pleuritidum materia non est vniuersi modi, nec tantum bilis dominatu exortæ sunt; quod fit ut corruptionis incremento & irritamento, lacessitarum partium complexio alteretur & immutetur, ipsa quoque *ἀδυναμία* vertatur in *ἀπασμὸν*, i. imparitas in paritatem. Sed in hac dierum paritate, calamitosa vis est sexti diei. In quo nihil *ελπίου*, nihil *ελπίος*, nec vlla sperabilis vitæ salus apparet: nisi alacrior forte sit æger ante perturbationem criticam, nocte diei sexti futuram. Quæ de re illud præceptum est à dictatore. Qui febrium initium perturbantur animo, somni expertes, siquidem stillarit sanguis à naribus, indeque die sexto alacriores noctem exigant molestiorem, postdie autem cum sudatiuncula soporati, non sint apud se, ac sanguinem liberaliter fundant; malis omnibus defunguntur. Talia denunciat aquosa urina. Ac sanè tyrannis sexti diei declaratur in historia Nicodemi. Abderitæ, cuius cum *παροξυσμοὶ* & *πύροι* paribus diebus fuerint exactum ad morbum, *πάσων* autem, i. leuatio diebus imparibus, eaque omnia cuiusmodi apparuerint per singulos *ἀπασμῶν* memorarit Hippocrates; ne verbum quidem vllum fecerit sexti diei, quo prætermisso, subiecit, *ἐξ ὧν πάσων*. Atque is feliciter morbo leuatus est 24. die. Ergo tyrannis declaratur *ἐκ τῆς ἀσυνέτητος*: quod eo die nullus fuerit paroxysmus, nec labor, nec dolor; sed ipsa leuatio, ut septimo die sequenti. Quod sanè magnum attulit Nicodemo adiumentum.

Coac. 114. lib. 1. & aph. 43. 4.

hist. 1. lib. 2. Epidem.

Coac. 91. lib. 1.

hist. 10. 3. Epid.

FACILE AD DVODECIMVM VSQVE PERVENIUNT] Quo experiuntur crisin mortiferam, aut certè sinistram: Facile autem perueniunt, quod tantum exegerint septem dies in paroxysmis atque laboribus; renocando numerum ad *ἑξάδεκα*, i. ad incrementum, non ad historiam. Ac duodecimi quidem numerum ob eam sanè causam apposuit, quod exacerbata pleuritis quinto die, *πύροι* habuerit sexto, indeque periodis parium dierum ingrauescèdo, finem vitæ adferat, quam oppugnat duodecimo tanquam pari. Ut enim sexto die Philiscus interit: sic & tales pleuritici duodecimo: quoniam eadem ratio est duodecimi ad sextum quo ingrauescere cœpit pleuritis, quæ sexti ad primum. Etenim pariter similiterque fit crisis hebdomade altera, sicut prima; ex quo scilicet morbus, ex miti factus est sæuius atque prægrandis. Sic enim dierum criticorum rationem inire oportet in morbis acutis, à quo die celeriter, continenter, & vehementer moueri cœperunt, non autem quo sunt exorti.

AC FERRE NON SERVANTVR] Primum quia illi commoda non habuerunt defungendi pleuritide per anacatharsin sputi sanguinei simul & biliosi: deinde quod sine spasmate, in sputi vacuitate prouecta est ipsa pleuritis: tum quia præter paroxysmum quinti diei, *πύροι* venerunt sexto, quo die nihil bene fit, & quem nulla res commendare potest præter quietem, siue *πάσων*, ut in Abderita ostendimus. Huc accedit quod inueteratio causarum morbosicarum quod diuturnior est, eò sæuiiores adfert labores cum infirmitate coniunctos. Hic enim repente cooriuntur intolerabiles paroxysmi, & sæui dolores: ut in phrenitico legimus, ac videmus quotidie in iis qui à morfu canis rabiosi seriùs efferantur magis, quam ocyus. Postremo veterum opinio est quod *αἱ ἀπῆται*, i. pares sunt *δυσμετέωπεραι* & *ἀδυναμία*, i. difficultioris iudicij quam impares. Quod sanè si verum est in iis quorum historia recensetur in paribus ab exortu, sicut in Philisco & Pythione: multo magis veritas lucet splendètque in iis qui ex imparibus in pares mutantur. Qua de re scripta est illa prognosis, & commentariis nostris iam pridem illustrata. Tritæophyæ febres errant in pares mutata: sunt contumaces. &c.

hist. 4. sect. 3. 3. Epid. pror. 17. lib. 1. lib. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Coac. 39. lib. 1.

PERICLITANTVR AUTEM POTISSIMVM SEPTIMO AUT DVODECIMO] Sic legitur lib. 3. *ἀδυναμία*. *Κίνδυνος ἡ μάλιστα μέγιστος ἐξ ὧν ἀπῆται* & *ἐξ τῶν δωδεκάτην*. *μέγα δὲ τῶν πύρων ὁ κίνδυνος*, i. Periculo locus est ad septimum vsque, quinetiam ad duodecimum: quibus exactus sanescunt. Ex quo apparet septimum hic numerandum ab incremento, non à principio quod leniter exactum fuit ad quintum vsque, quo die cœpit exacerbari pleuritis, & ingrauescere sexto. Nam septimus à principio, tertius est ab incremento: duodecimus autem à principio, septimus est ab incremento, quo maxime in angusto spes est. Nam quod Galenus ait exacerbationes quinti diei, non duodecimo sed decimoquarto finiri; quod duodecimus quamuis à quinto septimus, nullam iudicandi vim habeat; pertinet id propriè ad morbos acutos qui exacerbantur diebus imparibus. In *ἀπασμῶν* autem morborum, quorum *παροξυσμοὶ* & *πύροι* cadunt in pares, penes duodecimum ins est non tam vitæ quàm necis: quemadmodum penes decimum: cui tamen iudicandi vim tollit Galenus à paroxysmo tertij ac diem criseos dici vndecimi: quod verum est in paroxysmis imparibus. Sed Pythion Thalys decimo die vitam finiuit, de quo illud narrat præceptor ad finem historiae, *ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δέκατῃ πύρον ἔλαβεν*.

lib. 3. progn.

QVI VERO BIS SEPTEM EVASERINT; PERICULO DEFUNGUNTUR] Lib. 3.
 τῶν ἐκ τούτων ἰτα scriptum reperio. Αἱ δὲ ἐξ ὧν μὴ μαλιστα, ἀπὸ τῆς ἐξ ὧν καὶ ὁ γόνης ὁξείας· τὰς πρὸς τὰς παρασκευα-
 δέας κείνους τε καὶ ὑμῶν τε. i. Quæ vero circa initia quidem mites, à septimo et octavo acuta sunt; ad decimum-
 quartum feliciter indicantur. Ac decimi quarti magna laus est in crisi secunda. Tumque pleuritides obrinet
 anacatharsin, aut vertuntur in suppuratum. Quod autem in hac prognosi positum est, exactis, quatuor-
 decim diebus, qui manent superstites, periculo mortis defungi; verum quidem illud est etiam: quia cum
 illi validarum virium beneficio, symptomatum calamitatem pertulerint, sanosque insultus fregerint;
 credibile est superstiti adhuc virium robore & symptomatum remissione, qualis esse solet post decimum-
 quartum, ipsos triumphare de morbo, ac tandem sanescere cum salutaribus signis & causis.

II Οσοιοι τῶν πλεριτικῶν ψόφος τῆς πινάλου πολις ἐν τῷ στήθεϊ, καὶ
 πρὸς ὥπον κατηφές, καὶ ὀφθαλμὸς ἰκτερῶδης καὶ ἀχλυνῶδης ἀπὸ λυωται.

*Quibuscumque pleuriticis multum in pectore sputum perstrepat, unaque
 facies plena mœroris, & oculus ictericius atque caliginosus; moriuntur.*

SEQUITUR ut patefacta omni pleuritidis causa terrifica, deinceps dicamus de signis quæ certam
 desperationem vitæ ostendunt, ac mortem in propinquo esse denunciant. Firmiora sunt argumen-
 ta scissionis vitæ aut morbi quæ ducuntur à signis quàm à symptomatis. Nam è symptomatis crebra sæ-
 pe nascitur, ut tempestatum, sic opinionum varietas. At certè signorum cōstans & firma debet esse pro-
 gnosis in alterutram partem. Nec vlla excusatio medici accipienda qui de signis erravit in prænoscen-
 do. Est igitur catholicum theorema huius prognoseos. Si ad desperationem curationis ex vacuitate
 anacatharses, accesserint quoque signa trium principatum collapsorum, naturalis, vitalis, & animalis;
 nulla salus vitæ sperabilis esse potest, cum ipsa morbi calamitas ad inferendam mortem sufficiat, etiam
 firmis adhuc naturæ præfidiis.

QVIBUSCUNQUE PLEURITICIS] Qui expurgationem facilem & copiosam non habue-
 runt; aut si habuerint, tandem substitit ab infirmitate laterum per nimiam detractionem sanguinis, vel
 alias ob causas quæ sunt explicatæ in sicca pleuritide & sputi experte.

Coac. 3.
huius cap.

MULTUM IN PECTORE SPUTUM PERSTREPIT] Vel multus auditur in pectore stre-
 pitus atque; ῥέγχε, à fumido vapore qui nō expirat liberè, materiā verò agit, nec eam tussiendo sublaram
 expurgat & excreat: sed illa in via subsistit, feruētque & strepitum edit in ima larynge, vbi cumulara suf-
 focationem infert. Ergo idē pleuritici moriuntur ἀπὸ τῆς ὀρθοπνοίας, καὶ τῆς ῥέγχεος ἀποπνεύματος, i. à spiratio-
 ne recta & stertore necati. Atque in hac strepitus & stertoris afflictione nulli remedio locus est, ne oxy-
 meliti quidem: quamvis accommodatissimum sit expurgandæ pleuritidi. Hic enim sputum ciendo,
 nec excludendo propter infirmitatem lateris, oppressionem facit unde pleuritici celerius opinione mo-
 riuntur. Id autem cernitur in iis οἱσὶν ἐ δὴ ἄλλοις εἰσι, καὶ ἀδύναμι βῆσταιν τῆς ἀποχρῆματιδεαίας ἐκ τῶν χρέμα-
 τος, i. qui cum aliis mortiferè habent; tum tussendi & excreandi quæ continentur, sunt impotentes. Sed inter commo-
 da pleuriticorum quæ adferunt aut iuvant discessionem pleuritidis, iam illud suprā positum est, ut nul-
 li strepitus edantur in pectore. Quod beneficium τῷ ψόφῳ ἀσυμβεβηκός, faciliè perniciem indicat τῷ πρὸς
 χερσος. Hoc autem pertinet ad infirmitatem principatus animalitatis; quæ cernitur in thoracis concus-
 sione multum imbecilla.

lib. 1. acut.

lib. 3. acut.

Coac. 8.
huius cap.

VNAQUE FACIES PLENA MŒRORIS] Cui contrarium est πρὸς ὥπον ἐπρωμένον, i. facies suc-
 ci plena atque decora. Est autem plena mœroris, aut quia miserationem adfert amicis atque propinquis,
 quod sit cadaucrosa, qualis in cadauere cernitur pallida & collapsa & omnino à se murata in colore,
 caractere, & mole; aut quia mœstiriam pleuritici arguit demissa facies & vultuosa, qualis est eorū qui
 sibi malè sunt conscij & quos pudet malè gestæ rei, aut melancholicorum esse solet, ut Thasæ mulieris
 quam Hippocrates vocat δυσάριον ex atræ bilis magisterio & dominatu, quæ facilem habuit generatio-
 nem ex sanguinis æstu quo multum incanduit, unde primum facies visa est egregiè colorata. Quæ de re
 illud iam suprā positum est. Egregiè colorata facies & vultuosa; pestifera. &c.

Coac. 3. cap.
5. lib. 2.

ET OCULVS ICTERICVS] i. Qui suum nitorem decorēque amisit, fuscatus flauo colore,
 & multum fœdatus; quæ coloratio fœda, primum apparer in oculis, quod illi puritate nativa cæteris
 partibus antecellant. Sunt enim margaritarum & gemmarum apertiores maculæ quàm filicum obscu-
 rorum.

ET CALIGINOSVS] Ab ipsa caligine quam facit impuritas & obtenebratio vel spiritus visfici
 & proprii oculorum luminis, vel humorum τῆς ἰερπῆς, i. aspestabilia excipientium, ut in iis velut caliginis
 quædam suffusio esse videatur tum ipsis ægrotis, tum medicis atque propinquis oculos intuentibus.

MORIVNTUR] Per theorema quod suprā posuimus. Nam desperatio est curationis in strepitū
 pectoris. Collapsorum autem principatum & virium effectarum signa sunt, animalitatis quidem mo-
 tritricis, in concussionē thoracis imbecilla aut nulla; sensificæ, in caligatione & obscuritate visus; natu-
 ralis, in ictero; vitalis, in facie mœsta, demissa & vultuosa, ex paupertate viuifici nectaris quod à corde
 tanquam ab vberissimo fonte procedit, unde partes omnes colorem genuinum atque decorē teneatur,
 vel amissum recipiunt.

12. Οἱ ἐκ πλευρελικῶν ἐμπυοὶ γινόμενοι· ἐν τῇσι μὴ ἡμέρησιν δὲ ἀπύουσι· ἀπὸ τῆς ῥήξεως.

Qui è pleuriticis facti sunt purulenti; quadraginta diebus à rupta vomica expurgantur.

10 **QUI È PLEURITICIS]** Quorum pleuritis neque diata, neque fomentis; nec sanguinis detractione, nec alio prorupta quieuit, caruitque libera & liberali anacatharsi. Atque illud fuit præceptoris iudicium super mutatione inflammationis pleuriticæ in suppuratum, quod scripsit Galenus, μέσον πῶς ἔστι πῶς τοῦ μέτρου, καὶ τὸ ἀνάπτω, i. medium esse quippiam sanabilem & insanabilem. Cum enim phlegmonarum omnium systrophicarum quadruplex omnis mutatio, partim καὶ λόγῳ τῆς φύσεως, partim καὶ λόγῳ, i. conuenienter naturæ aut contra naturam suscipiatur & fiat; ac conuenienter quidem naturæ, diaphoresi & suppurato; contra naturam autem, gangræna & scirrho; ut concedam verè illud positum esse: tamen interiorum phlegmonarum suppuratio, ancipitem habet euentum salutis aut mortis. Notum est illud quod supra positum est. *Quibus hypochondriorum aut thoracis mala suppurant; pestiferum.* Nam suppuratum venit nisi morte præueniatur, quando pleuritice phlegmones vacuatio deest. Ac suppuratum illud, 20 suffocationis aut etiam tabis metum adfert nisi expurgetur cum febris & sitis vacuitate, & cum accessione bonorum omnium signorum naturalis œconomix; alioqui paratides oriuntur vel abscessus cruales, nisi profluuium alui, aut perirrhœa vrinæ, periculi causa tollatur. Ergo periculo locus est in suppurato: præsertim si fiat sputo adhuc bilioso, siue illud sputum biliosum atque pus inter se ducta, siue etiam mixta expurgentur. Atque id locum habet cum aliàs, tum si à tali sputo suppuratum fiat, ægrotò 30 septimum morbi diem agente. Hunc enim talia expuerem credibile est decimoquarto die interiturum, nisi quid interea boni obtigerit.

Coac. vii. cap. 1. lib. 2.

lib. 2. progn.

FACTI SVNT PURULENTI.] Quod expurgari non cœperint intra decimumquartum morbi diem, qui finis est acutorum morborum in viscerum phlegmone systrophica positorum, ut aliorum etiam. Purulentos autem fieri dixit, per trāsitum phlegmones in suppuratum. Sic enim loquitur, εἰς ἐμπύημα μεταστῆται. Ac μεταστῆσις quidem illa fit in iis qui validarum virium beneficio, pleuritidis paroxysmos 30 atque labores, siue vlla ope vacuationum pleuriticarum, ad eum vsque diem pertulerunt. Sed illud empyema duobus modis considerari solet. Primus suppurati modus est, pure intra vomica concepto, quod statim febrem habet cum rigore coniunctam qui antè non fuit, & pro dolore punctorio & acerbissimo sensationem infert gravitatis in ea parte obfessa quæ laborat. Illa sunt empyemata quæ scripsit Hippocrates rigorifera. *Qui aliunde cientur rigores, fortasse ab vlcerebus veniunt, sicut à vasis.* Ac si diceret; quemadmodum in febribus essentialibus rigores critici & periodici exoriuntur à vasis: ita quoque symptomatice ab vlcerebus; vbi Galenus docet, non solum ab vlcerebus: sed etiam ab apostematis in pus mutatis rigores excitari. Idem Galenus author est, phlegmonas omnes nobilium partium, nisi præliis digerantur, sed in suppurationem vertantur; horrorem ciet: quoniam nascentis puris acrimonia mordens vicina corpora, horrorem producit eodem planè modo quo solent acria medicamenta. Nos quoque id iam demonstrauimus ad prognosin illam. *Frequens sudatiuncula & horroris vicissitudo; pessima.* &c. Sed alia quoque occurrit distinctio empyematis καὶ ἐμπύου, i. purulentorum. Huiusmodi enim sunt etiam quibus effusum pus est in spatium thoracis, rupta vomica. Tales memorantur in illa prognosi. Omnes quidem purulentos ita deprehendi oportet; primùm si febris non dimittit, eaque interdum leuior est, noctu 40 crescit; frequens sudor, tuſis & cupiditas tuſiendi, vbi tuſiundo penè nihil extuſitur; oculi caui sunt; mala rubent; vngues adunci; calor extimorum digitorum pedum; œdemata; cibi fastidium; pustula toto corpore sparsa. Tales etiam legere & intelligere oportet in illo aphorismo. *Quicunque purulenti vruntur, siquidem pus album & purum fluat; seruantur.* &c. Vbi Galenus annotauit, empyema nomen esse commune omnium corporis partium suppuratarum; τὸ δὲ ἐμπύον, propriè ad eos pertinere quibus inter pulmonem & thoracem 50 collectum pus stabulatur.

aph. 8. f.

lib. 2. progn.

part. 3. 6. Epid.

lib. 2. progn.

Coac. 10. lib. 1.

lib. 2. progn.

44. 7.

10 **QUADRAGINTA DIEBUS EXPURGANTVR]** Sic in aphorismis. *Quicunque ex pleuritide purulenti facti, siquidem expurgandi sui finem fecerint; quadraginta diebus quiescunt, à quo die ruptio fit: sin minus, in tabem vertuntur:* quoniam puris diu stabulantis acrimonia, quam ipsi putredo intulit, erosi pulmones vlcerantur, in quorum vlcere nascitur phthoë quæ phthisin facit, vlceris edacitate, febris corruptionis assiduitate, & spiritus quem ducimus infectione, & tabifica vi quam ipsi pulmones impertiunt. Terminum autem posuit anacatharsis, quadagesimum diem: quia hic finis est acutorum morborum 20 ἐν μεταστάσει. Est autem μεταστάσις ipsius pleuritidis in suppuratum.

A RUPTA VOMICA] Siue illa rumpatur vigesimo, siue trigesimo, siue quadagesimo, siue etiam sexagesimo. Ruptionis autem signa iam dicta sunt ex Hippocrate in prognostico.

13 Πύελον ὃ χρηὶ πᾶσι τοῖσι πλευρελικοῖσι καὶ περιπνευμονικοῖσιν, ἀπὸ πύεως τῆς καὶ τῆς χεῖρας ἀναπύεως, μεμῖχθαι ὃ τὸ ξανθὸν ἰσχυρὸς τῷ πύελῳ.

Verum enimvero sputum oportet pleuriticis omnibus & peripneumoniacis, tum ex facili; tum citò expurgari, ac flauum sputo exactè permixtum.

Coac. 15. cap.
15. lib. 2.

QVEMADMODVM in angina demonstratum est nuper: sic in pleuritide & peripneumonia nunc demonstrandum; quòd in iis etiam mortifera sunt omnia quæ dolorificum malum foras non edunt, nec aspectabile faciunt. Enimvero dolorificum malum anginae, foris apparet sciretu; & erysipelare in sterno atque ceruice; pleuritidis autem, anacatharsi & spasmate. Atque ut inter anginosos, qui costæ citò non expuunt, pro desperatis habentur: sic inter pleuriticos, qui carent anacatharsi libera sputi boni, grauiissimum habent malum, sicut præceptor supra iam posuit his verbis. *Sicca pleuritides & sputi expertes; grauiissima.* Ne longum faciam; in magna pleuritide, sicut in angina, salutis desperatio est si nihil fiat, nihil appareat, quod systrophicæ inflammationis laxitatem adferat, vnde remissio sit grauissimum symptomatum.

Ergo. VERVMENIMVERO] Ac si diceret; ut pleuritis grauiissima discessionem habeat, & re-dintegratio fiat lateris inflammatione obfessi, per simplicem & veram crisin perfectam minimèque obnoxiam recidiuæ; ac sine metaptosi empyematis, parotidum, abscessus cruralis, aut stranguriæ a purulenta yrina.

Coac. 8.
huius cap.
aph. 12. 1.

SPVTVM] i. Excrementum illud quod è pulmonibus & thorace, tussiendo, per os excluditur, quod propriè dici posset expectoratum. Id sanè κατ' ἐξολὴν absolutè vsurpatum, sæpe in bonis ducitur, ut supra iam scripsimus ex aphorismis.

OPORTET PLEURITICIS OMNIBVS ET PERIPNEUMONICIS] In prognostico ita scripsit. *Ἐπὶ πᾶσι πνεύματι τοῖσι κατὰ τὸν πνεύμονα & τὰς πλευράς.* i. in omnibus malis dolorificis quæ latera & pulmones infestant. Hæc autem dolorifica mala sunt pleuritis & peripneumonia: pleuritis, costarum seu tunicae costis intextæ: peripneumonia, pulmonis, ut infra dicitur; de pleuritide dictum est supra.

TVM EX FACILI] i. Liberè & liberaliter, sine tussis molestia, ac sine doloris acerbitate: comparato sputi pepasmo, virtute caloris natui; vnde crassiusculum factum, meabile fir, & morem gerit thoraci concorrenti se ad exclusionem. Nam in sputo tenui nulla expurgatio critica, sed ptyelismus tantum: in glutinoso tussis & doloris molestia, & irrita thoracis concussio. Pepasmi autem commoda sunt hæc, partis afflictæ laxitas, materiæ preparatio in crassitudine meabili & exitu facili, tum ipsa libertas meatuum, & fortior naturæ contentio. Ergo ex libera & liberali anacatharsi, vtriusque principatus integritas planè ostenditur; naturalis in coquendo; & animalis in expurgando. Vnde igitur virtus naturæ apparet, morbi que remissio; inde salus vitæ sperabilis. Apparet autem in eo expurgandi modo quem fieri scripsit *ὡπρετός*, i. ex facili.

aph. 12. 1.

Coac. 7.
huius cap.

TVM CITO EXPURGARI] Non quidem citò, in actione cita, & spatio tussis coniuncto dum expurgatio ipsa cietur: sed morbi ipsius principio, quod primo absoluitur quaternario; ut idem sit hoc loco *ῥαχέως*, quod in aphorismis *αὐτίκα*. Quæ cita expurgatio cuiusmodi sit, declarata iam fuit in illa prognosi. At verò sputum in pleuriticis, tertianum quidem coarctum mutificari & expui; citas facit discessiones: serius autem; tardiores. Ex quo apparet, illud *ῥαχέως* in hac prognosi positum, non quidem expurgandi celeritatem & spatium quo sputum expurgationi coniunctum est: sed definitum morbi principium indicare. Debet igitur citò expurgari pleuritis, ut tensioni & proritationi laxitas & temperatio compareretur, ad libertatem spirandi, atque doloris, & febris vacuitatem; quæ quò celerius veniunt, eò res ægri melius eunt. Expurgari autem vertimus, quod scripsit author *ἀναπνεύειν*; quoniam expurgationis & expuitionis eadem ratio est. Ac τὸ ἀνακαταίρειν idem est quod ἀναπνεύειν. Sic enim Galenus in aphorismis. *τὸ δὲ ἀναπνεύειν καὶ τὸ ἀνακαταίρειν, τὸν τὴν πλερίαν ἐργαζομένων χυμὸν ἀνακαταίρειν εἰς αὐτὸν ὁνομαζέται ὁ ἰατρικὸς.* i. Vacuationem per sputa, expurgationem humorum pleuritidem facientium Hippocrates appellauit.

aph. 8. 5.

Quod sequitur. AC FLAVVM SPVTO EXACTE PERMIXTVM] Pertinet ad qualitatem sputi laudabilis, cuius commoda iam sunt explicata in tempore & expurgandi modo. Est igitur sputum laudabile, & spei plenum, cui flauum exactè permixtum est. Ergo sputum mixtionis expers, natura non est flauum, sed albū: cuiusmodi esse debet quicquid expuitur cum integritate partium vnde manat; cerebri, oris, faucium, palati, gutturis, pulmonum, atque thoracis. Ac sputum ἀπαλὲς dictum, saluum, πύσμα, & πύλον; significat pituitam albam quæ vel spurando, vel excreando, vel extussiendo purgatur: παρὰ τοῦ μὲν verò dicitur flauum, cruentum, viride, nigrum, &c. Flauum autem sputo exactè miscendum præcepit: quia inde significatur humoris morbifici vacuatio, & inchoata coctio, viatrice natura, cuius proprium munus est coctio atque mixtio.

14 Πομπρὸν δὲ καὶ τὸ ξανθὸν ἀκρήλον, καὶ τὸ γλίχρον, καὶ λευκὸν, καὶ τὸ σρογύλον, καὶ τὸ χλωρὸν σφόδρα, καὶ τὸ ἀφρώδες, καὶ τὸ πελιῶδες, καὶ ἰῶδες. χεῖρον δὲ ἢ τὸ ἔπος ἀκρήλον ὥστε μέλαν φαίνεσθαι.

Prauum est autem & flauum syncerum, & glutinosum, & album

arque ro-

atque rotundum, & viride multum, & spumofum, item liuescens & æruginosum. At peius illud quod ita merum est ut nigrum appareat.

ENIMVERO medicus nunquam errat in prænoscendo, qui ex perspicientia *ἡ ἐμπειρία τοῦ ἐκείνου*, cau-
 farumque cur sic appareat, prognosin instituit. Nec minùs in bonam partem cognoscitur qui ex iis, tan-
 quam è specula, prævidet futuros morborum exirus, quamvis parum secundos, quàm qui natura duce
 medicinam adhibet ad præuisam ægri salutem. Sanè in pleuritide & peripneumonia sputum flavo ex-
 acte permixtum, quòd citata & facilem habet anacatharsin, recreat medicum & consolatur spe certa
 salutis; ac tum iuvat, medicum spei plenum videre, celerem multum atque fidelem, alacriter & vultu
 sereno medicinam pleuritico facientem. Sed triste est etiam, eundem intueri metu exterritum sinistra
 10 iudicii, simulatque viderit & intellexerit quæ in hac prognosi leguntur.

PRÆVVM EST AVTEM] I. Affectionis malæ signum & causa, ut certè vacationes omnes præ-
 næ, prauarum quoque affectionum signa sunt: ut rectè Galenus posuit ad aph. illum. *Expurgationes in*
febre liuida, nigra, biliosa, cruenta; omnes omnino male: quæ verò conuenienter ducuntur; salubres: ac nulla sa-
lubritas videri potest in expurgatione sputi meri, nec vnquam conuenienter expurgatur. Omnia verò hîc scripta,
 in prauis ducuntur: quoniam prauarum affectionum, ne dicam lethaliū, signa sunt, ut in singulis de-
 monstrabitur.

ET FLAVVM SYNCERVVM] Quod scilicet expectorabili pituitæ non est permixtum, idemquæ
 ceter naturali sero quo naturaliter vnusquisque humor diluitur. Non enim solùm id merum est excre-
 20 mentum quod aliis non permiscetur: nam & pituita mera, & bilis mera, ex eodè foco, eodèmq; tempore,
 excludi potest: sed illud verè est merum, quod est *ἡ μικτὴ ὑγρὴ τοῦ ὕδατος οὐδὲ τοῦ αἵματος*: qualis fuit sanguis Philisci, quæ
 vocat *ἡ ἀπὸ τοῦ αἵματος*. Fir autem bilis mera exhausto sero à febrili ardore, cuius quidem seri participatione
 fuerat antea *ὑγρὰ*; nunc eo destituta, redditur flaua & vitellina. Sic enim Galenus bilem suo sero dilu-
 tam naturaliter constitutam agnoscit, eamque nominat bilem *ἀπλὴν*, qualis *ὑγρὰ*. Cætera bilis genera
 idem *παρὰ τοῦ σπυγίου* appellat, ut bilem flauam, vitellinam, porraceam, æruginosam, &c. quæ omnia habent
 exhaustum sui seri *ἡ δὲ ἡ σπυγία καὶ ἡ μᾶλλον*.

ET GLVTINOSVM] Quod est commune omnium excrementorum crassorum quæ fiunt *γλίσσα*
ἢ δέχματα; in morbis quidem acutis, à febrili ardore; in frigidis, à crudore. Sunt autem praua glutinosa:
 propter contumaciam qua & difficulter excreantur, & plus adferunt detrimenti in excreando, quàm
 30 adiumenti. Non enim hæc dolorificum malum foras adducunt: sed augent damnis ægrotum. Talia
 autem vocat præceptor *καὶ ἀσπυγγομένη ἀσπυγία*, & *ἡ ἐν κέρχοντι*.

ET ALBVM ATQVE ROTVNDVM] In prognostico coniunxit glutinosum cum albo atque
 rotundo. Præritas ergo sputi albi, rotundi, & glutinosi, cernitur primùm in summa difficultate spuendi,
 vnde maior est doloris & tussis molestia, cum cœunte vitio contumacis materię, & spirationis difficilis
 quæ tussiendo augetur. Tum illa descripta sputi huius conditio, opinionem facit perusti humoris ab æ-
 stu & ardore quo pars ipsa, vnde sputum venit, conflagrat. Quæ causa est cur alibi de sputo rotundo
 prognosin ita scripserit. *Τὰ σπορὺν ὑλόμενα πύρετα ὡς ἀκροστικά. σπυγία rotunda, inquit, deliria indicant.* Ad quem
 locum scripsit Galenus; talium sputorum causam materiale, esse crassitudinem & lentorem humoris in bronchiis
 pulmonum cumulatè collecti; efficientem verò, immoderatum calorem. Ex quibus efficitur, sputi huius prauita-
 tem considerandam in signo & causa.

ET VIRIDE MULTVM] Non quidem *ὑγρὸν*, quod est bilis pallidæ & multum dilutæ, ut existi-
 mauit Galenus ad illam prognosin. *Γλαστοὶ χλωραὶ χλωδότες*, quod supra iam castigauimus. Nec verò bilis
ὑγρὰ multum diluta, est mera, nec expuitio eius terrificæ (sicut neque lingua in pleuritide, illa bile fuca-
 ta) sed læta & salutaris, ut iam possumus est in illa prognosi. *Quibus pleuritibus, continuo lingua bile fucata est;*
septimo indicantur. Sed illud *κέρτα χλωρὸν*, i. multum viride, idem est, quod æruginosum, ut ipse fatetur Ga-
 lenus in prognostico. Atque huius bilis multum viridis & æruginosæ causa materialis, flaua est; effi-
 ciens verò, calor adurens, & serum exhaustiens. Ex quarum causarum perspicientia, prognosin illam scri-
 psit Hippocrates. *Τὰ ἐν κερτάχρῳ ἐν ἰσθμῷ ἐμείματα, μετὰ κερτάχρῳ ἀνευπνῶδες. ἡ γὰρ ἐν κερτάχρῳ. i. Vomitiones æru-*
ginosæ cum vigiliis & surditate; insaniam cito venturam ostendunt. Vbi Galenus docet, excrementum illud
 40 *ἰσθμῷ*, vnde cunque veniat & quacunque excrenatur, humoris vnde gignitur, & partis vnde manat, ardo-
 rem denunciare. Quam sanè prognosin idem præceptor expressit ex historia de Philista, cui cum primo
 die talis vomitio contigisset, secundo sub meridiem è potestate mentis exiuit. Sic phreniticum legimus
 quo die primùm phrenitis emicuit, *ἰσθμῷ* vomuisse.

ET SPV MOSVM] I. Bullatum, obortis bullis in circumtenso humore, vi caloris contra naturam;
 & quò minores sunt bullæ, propiusque illud sputum ad æqualitatem accedit; eò peius. Nam vetus
 illud præceptum est; æqualitatem in rebus naturaliter constitutis, optimam; in aliis verò quæ contra
 naturam sunt, pessimam.

ITEM LIVESCENS] Liuet enim perfrigerata parte, perfrigeratur emortua; emoritur autem per
 extinctionem viuacitatis in vitali principio, & paupertatem viuifici nectaris à corde exhausto; atque
 50 illud liuescens, est foedi odoris ab ea causa liuoris.

AT PEIUS ILLVD QVOD ITA MERVM EST, VT NIGRVVM APPAREAT] Sensus
 est. In eo demum sputo prauitatis summa sunt omnia, quod est quàm maximè merum. Huiusmodi est
 nigrum. Sed alia partium ratio est nigrarum & liuidarum, quas nonnunquam præstat nigrescere, quàm
 liuere. Nam illa nigricies in morbis acutis sæpe accidit ex abscessu, liuor nunquam, sed à *νεκρώσει* vniuer-
 sitatis. Arque in nigricie, periculi locum tollit partis exectio.

15 Τὸ δὲ ὑπερον πολλὰ τῆς ὀδυώσης ἀναγόμενον ξανθὸν, ἢ μὴ ἰσχυρῶς μεμιγμένον, καὶ πολλὰ βῆχα ὄρεζον· κάκιστον γίνεται.

Quod autem multò post quàm dolor cœperit, flauum educitur, aut non exactè mixtum, quòdque multam exhibet tussim; peius est.

ΤΟΤΥΜ Η ΟΣ, pars est prognoseos decimatertiaz quæ omnem continet rationem sputi laudabilis in qualitate, copia, tempore, & excernendi modo. Est autem veluti antithesis notarum omnium prædictarum. Quod enim serò expurgatur, contrarium est eius quod citò: flauum opponitur pallido: mixtum exactè, parum & leuiter: quod item multam exhibet tussim, ei quod ex facili expurgatur, sine vlla tussis molestia, & sine maioris doloris accessione. Iam verò si nota sunt nobis perspectæque commoda expurgationis citæ, facilis, & sputi exactè permixti; profectò in promptu sunt incommoda tardioris, difficilis, & sputi impermixti, aut certè non accuratè, nec fortiter & exactè. Contraria enim contrariorum sunt consequentia, vt author est Plato in Eutyphrone. Sufficiet igitur explicasse rationem notarum sputi laudabilis, & expurgationis naturaliter constitutæ. Nam πὸ φύσιν, καὶ τὸ κατὰ φύσιν, i. quod secundum naturam est & quod rectum, scopus est omnium quæ in medendo sunt. Inde enim comparatur ἀφ' ἑαυτοῦ ἐκπύρισμα πρὸς ἀφ' ἑαυτοῦ, i. cognitio & redintegratio rerum è natura egressarum. Ergo nihil necesse est plura de his scribere.

16 Αἷματι δὲ μὴ πολλὰ συμμεμιγμένον τὸ ξανθὸν, ἐν ὄρεξῃ μὲν σωτήριον. ἐβδομάτῳ δὲ ἢ παλαιότερῳ· ἥσων ἀσφαλές.

Meliùs sic in prognostico.

Αἷματι δὲ συμμεμιγμένον μὴ πολλὰ πύελον ξανθὸν ἐν τοῖσι πνευμονικοῖσιν, ἐν ὄρεξῃ μὲν τῆς νόσου πύεον, πνευμονικὸς· κάκιστον ἀσφαλές. ἐβδομάτῳ δὲ ἑόνῃ, ἢ παλαιότερῳ· ἥσων ἀσφαλές.

Sputum verò flauum pauco permixtum sanguine, peripneumoniacis ineunte quidem morbo editum; salutare est, multumque confert: septimum verò diem agenti, aut prouectioribus; securitatis minus est.

Descriptio
peripneumoniae.
lib. 3. tit. 1.

VTRAQUE lectio vera est & Hippocratica; tum anacatharsis commemorata æquè pleuriticis atque peripneumoniacis accommodata. Sed quoniam illius commoda iam suprâ in pleuritide sunt demonstrata, consentaneum est vt parem commoditatis rationem in peripneumonia ostēdamus, eodem duce in prognostico. Quæ cum ita sint, ad peripneumoniam, huius prognoseos philologiam & philosophiam conuertemus exorſi ab hoc theoremate. Omnis anadrome quæ liberam non habet exclusionem, ibi morbum facit vbi subsistit. Sic enim sanguis multa & effera bile perfusus, translatus ad caput, nisi exitum citò habeat per hæmorrhagiam; paraphorica in cerebro edit symptomata. Idem in pulmonibus de cursu subsistens peripneumoniam facit per inflammationem systrophicam quæ partis ipsius quam infestat nomen sibi adoptat. Cuius descriptio sic legitur apud Hippocratem. Huiusmodi sunt, inquit, quæ faciunt peripneumonia. Nam febris acuta exercet æγροῦ, ac spiritum crebrò ducit, calidumque expirat, infelix animi & incertus, nec sui compos, & stare loco nescius. Ac dolor sub omoplata qui prorepat ad iugulum & ad mammam. In pectore grauitas, nonnunquam delirium quoque ipsum. Quæ omnia symptomata sunt inflammationi pulmonis consecutaria. Inflammationis autem systrophicæ rheuma consistens, est sanguis biliosus cumulatè collectus, vnde tumor assurgit. Ergo si repletionis, & inde affectionis natæ remedium est repletionis propria vacuatio: si conuenienter vacuatur id quod systrophien facit, laxitatem adfert, doloris remissionem primùm, indeque vacuitatem & partis obsessæ redintegrationem: si denique morbi & periculi locum tollit quicquid dolorificum malum in occulto latens, foras adducit & euocat: sanè descripta hoc loco anacatharsis, mirificos adfert sanitatis fructus in peripneumonia, cuius hæc proprium & salutare est ὁππότερον, sicut & ipsius pleuriticis.

Coac. 9.
huius cap.

Ergo. SPVTVM VERO FLAVVM PAVCO PERMIXTVM SANGVINE] In quo apparet morbificus humor vnde assurgit phyma pulmonis quod peripneumoniam facit. Est enim suprâ iam positum ex Galeno, quòd vt ab omni phlegmonē systrophica tenuior exudar portio humoris phlegmonici, modò partis obsessæ densitas non impediatur, vt in cute: sic pulmo inflammatus, humiditatem quandam effundit in spatia sua interna, quæ sunt arteriæ bronchia, eamque tussiendo sublatam expurgat & excrat; quæ sanè indicio est fluxionis & rheumatis concitati quod peripneumoniam excitant. Est enim

Est enim serum illius. Itaque si admodum biliosus humor est, ea tantum flava erit: sin autem sanguinens, rubra: quod si ex utroque mixtus, rubra simul & flava.

PERIPNEUMONICIS] Qui eiusmodi sunt & nominantur à peripneumonia, i. ab inflammatione pulmonis quam fecit rheuma ibi consistens sanguinis multa & effera bile perfusi, proptereaque temperamento calidissimi, substantia tenuissimi, & qualitate acerrimi: quibus ex causis anadrome ceteri solent, omnisque orgasmus; tum eo maxime ubi ad concitaram vim efficientis causæ, accedit suscipientis preparatio.

INEUNTE QUIDEM MORBO EDITVM] Virtute scilicet utriusque principatus, naturalis & animalis; unde anacatharsis opportunitas, in celeritate laudem habet. Hic enim ubi sævus est dolor, unaqueque difficilis respiratio; celeritas etiam mora est: quia morbus vires acquirit eundo, corpusque facit infirmum.

SALVTARE EST] Superstitem fore ostendit ægrotum morbo defunctum, ut per metonymiam idem sit *ἀπὸ τοῦ ἀπεθανός*, quod alibi scripsit *ἀπεθανός διαχειμένῃ τῷ αἵματι*. Est autem id sputum citò & ex facili expurgatum salutare: quia repletionem particularem vacuat, ipsumque rheuma consistens exhaurit, ac dolorificum malum quod intus abditum est, foras educit: proptereaque periculi locum tollit. Huc accedit quod sputum, est proprium pleuritidis & peripneumonix τὸ διαφανόμενον, per quod earum inflammationum crises, & simplices & perfectæ, natura duce, suscipiuntur & fiunt.

MVLTVMQVE CONFERT] Quia systrophes laxitatem adfert, indeque doloris, omniumque symptomatum leuationem. Ipsam verò difficultatem spirandi conuertit in libertatem; ut nihil sit optabilius tali spuro in morbis qui pulmonem & costas exercent, i. in pleuritide & peripneumonia. Ac de spuri huius commoditate iam instituta sunt & explicata tres prognoses, 7. 9. 13. huius cap.

SEPTIMVM VERO DIEM AGENTI] Sub finem secundi quaternarij ab initio morbi, non autem ab incremento.

AVT PROVECTIORI] i. Undecimum aut decimum quartum diem agent.

SECVRITATIS MINVS EST] Causæ sunt explicatæ: quia ubi sævus dolor est, & summa difficultas spirandi cum sympathia & syntimoria nobilium partium, vicinarum & sociarum; aut citamors venit, nisi morbificus humor exitum citò habeat; aut suppuratum manet, in quo etiam periculo locus est. Huc accedit quod tardior expurgatio, neque simplicem edit crisis, neque perfectam: sed variam, incertam & obnoxiam empyemati aut recidivæ.

17 Αἵματῶδες δὲ λίαν ἢ πέλιον, βδέως ἐν δόχῃ· κινδυνῶδες. ποτὲ δὲ καὶ τὰ ἀφρώδια, καὶ τὰ ξανθὰ, καὶ μέλανα, καὶ ἰώδια, καὶ ἰζώδια, καὶ ὅσα τεχέως χρωματίζεται. τὰ δὲ μυζώδια καὶ λιγνῶδια· χρωματίζεται τεχέως, καὶ ἐστὶν ἀσφαλέστερα. τὰ δὲ ἐν τῷ πέμπτῳ εἰς πέψιν χρωματίζόμενα· βελίω.

At verò cruentum nimis aut lividum initio statim, pestiferum: prava sunt etiam spumantia & flava, & nigra, & aruginosa, & viscosa similia, & quaecunque citò sic colorantur. At tamen mucosa & fuliginosa, citò colorata, plus habent securitatis. Quæ verò intra quintum coctioni fucantur, meliora.

50 HIC MEAM scribendi operam denegarem libenter, & lectorem remitterem ad 14. istius cap. Sed quoniam meæ sunt partes indicare scopum authoris in hoc repetito pravorum sputorum catalogo; faciam sanè ut potero, ne quis à me quippiam sibi deesse conqueratur, in hoc præsertim ditissimo veræ, i. Hippocraticæ medicinæ thesauro. Ac sanè instituta prognosis eo spectare videtur ut intelligamus, omnia διαφανόμενα quæ dolorificum malum foras exire testantur, proptereaque bona sunt; meliora videri cum citò apparent; & minùs bona ac securitatis minùs esse, cum serò. Et contrà; quæ idem malum minime foras exire, sed intus perennitatem habere denunciant, & signa sunt affectionis pravae, ob eamque causam, prava quoque ipsa nominantur; eo peiora esse, quod citius illa se produnt. Sed in laudabili spuro, veritas patefacta est theorematibus huius catholici. Nunc verò in omni pravorum sputorum genere, quamobrem citò edita, sint prauitatis eximiae; & seriùs edita, minùs mala; considerandum.

60 AT VERO] Quemadmodum sputa flava paucò permixta sanguine, ineunte morbo edita, sunt valde salutaria; prouectiore autem, minùs habent securitatis: sic è contrario quæ multum cruenta sunt, proptereaque prava; & citò eduntur; ex ea expuitione cita, in grauioribus malis ducenda.

CRVENTVM NIMIS] Nullo dilatum neque permixtum sero: sed merum nigrescens, rupta, exesa, vel aperta vena pulmonis: quæ ratio expurgandi omnino prava est, quando fit sursum, οὐκ εἰς ἀπὸ τοῦ αἵματος, i. qualiscunque tandem sit sanguis.

Lib. 2. progn.

AUT LIVIDVM] Vnde significatio fit putredinis fœdæ, & partis vnde manat emortuæ, vt in vomitione linida quæ citam mortem denunciat, de qua sic ait Galenus. *Σηπιδὴν ἐν δέχουσινται μετὰ παύσεως, ἰ. corruptionem indicat cum morticino.*

INITIO STATIM] Simulatque quis ægrotare cœperit & iacere in lecto, quod inueterationem arguit morbificæ causæ quæ partem obsessam labefactauit prius, quàm signa dederit eius obsessæ.

PESTIFERVM] Sive *mortiferum*: quod signum sit affectionis prauæ & insanabilis, partisque sic è natura egressæ, vt eius redintegratio nulla sperabilis esse videatur. Talis calamitas cernitur in iis qui acriter febricitant, si fortè signorum atque symptomatum terrificam vim circa initia spectandam exhibuerint, tam per epigenomena, quàm per epiphænomena, siue hæc toto genere praua sint, siue *ἐν τῇ φύσει* naturæ appareant *ὡς ἐξ ἐσθνης*. Locus est apud Hippocratem lib. 1. *τῷ ὀνείδῃ.*

**PRAVA SVNT ETIAM SPVMANTIA ET FLAVA, ET NIGRA, ET ERV-
GINOSA, ET VISCO SIMILIA, ET QVÆCVQVE CITO SIC COLORANTVR]** Causæ sunt explicatæ in commentariis nostris ad 14. huius cap.

AT TAMEN MVCOSA ET FVLIGINOSA, CITO COLORATA, PLUS HABENT SECVRITATIS] Ac si diceret; mucosa & fuliginosa pepasmi capacia sunt: illa verò prædicta, planè expertia. Multum enim differt mucosum à glutinoso viscido & tenaci, qualia sunt illa prædicta: Multum etiam fuliginosum, à nigro. Nam à fuligine superficies tantum fucatur; à nigricie totum corpus, tam intrà, quàm extrà. Nigriciei causa est, ardor quo humor conflagrat; fuliginosus autem coloris, vapor & anathymiasis, quo superficies humoris fucatur. Sic lingua fuliginosa, læuis est; nigra verò, aspera. Præterea sputi mucosi & fuliginosi facilis est exitus, facilisque expurgatio: cæterorum verò difficilis: quia sunt *καταχυροχρόματα ἀσπιπίας*. Ac sputum mucosum, pepasmo fit crassiusculum & meabile: cætera verò prædicta maiorem contumaciam acquirunt à febrili ardore, cuius magisterio illa reguntur. Ergo mucosa sputa quæ citò eduntur fuliginosa, & citò sic colorantur, plus habet securitatis quàm cætera.

QVÆ VERO INTRA QVINTVM COCTIONI FVCANTVR, MELIORA] i. Quæ principio morbi exacto; sub quintum diem, sine contumacia colorantur ab exudante sero, & materia systrophicæ phlegmones, vnde ipsius tensionis dolorificæ laxitas, vnâque liberior spiratio, & doloris remissio comparatur; meliora sunt iis omnibus quæ posita sunt in hac prognosi: quamuis paulò scûs dolorificum malum foras exire videatur. Pertinet autem prior pars huius prognoscæ ad id quod initio positum est disputationis de Pleuritide. Inter pleuriticos, quibus initio *varia sunt expuitiones; ἢ* tertio die moriuntur, aut quinto.

18 Πᾶν δὲ πύραλον μὴ λῦον τι τὸ ὀδυώλω· πονηρόν· λῦον δὲ· χρησίμου.

Omne verò sputum quod non sanat dolorem; prauum est: quod autem sanat; beneficium.

Lib. 3. progn.

HAUD FACILE est prognoscere huius difficultatem, ex abdita eius causa, ad facilitatem conu-
tere. Est enim propter causæ ipsius obscuritatem, pluribus obstructa difficultatibus, quàm multi homi-
nes arbitrantur. Quid enim? sputum quod citò liberè & liberaliter expurgatur, pepasmi particeps, aut
certè capax; proptereane prauum est quia dolorem non sedat, vt i sedare debet expurgando inflamma-
tionem systrophicam tunicæ costis intextæ? Est enim suprà iam positum, quod per anacatharsin com-
paratur doloris vacuitas, ex acerbitate; spirandi libertas, ex difficultate; ac denique lateris redintegra-
tio, ab egressione naturæ. Quid igitur? tale sputum specie ipsa bonū, ob eam causam prauum erit, quia
finem doloris non adfert per causæ morbificæ amotionem, & redintegrationem partis è natura egres-
sæ? Atqui duo illa commoda veniunt à tali sputo quod planè dolorificum malum foras exire testatur.
Quid igitur obstat quò minùs finem doloris adferat? In promptu causa est, rheumatis concitati peren-
nis affluxus, tum à perenni prolapsu catarrhi, tum à perenni anadrome sanguinis multa bile perfusi, cuius
perennitas posita est in vitio hepatis & febre assidua quam prærubra vrina denunciat, siue sit eius-
modi ab inflammatione seri in venis, siue etiam multa sit bile saturata. Ergo vetus manet sententia di-
ctatoris qua frangi debemus, quod syllogistica signa, *πικρύνειν*, nunquam à se mutantur siue ad malum, si
bona sint; siue ad bonum, si praua. Secus est de symptomatis. At *πυελισμὸς*, *πικρύνειν* est in morbis co-
starum atque pulmonum. Hippocratis verba hæc sunt. *Εὐ μὲν γὰρ καὶ εἰδέναι πᾶσι τὸ πικρύνειν, καὶ τὸ ἀλγόν σπ-
μειν, καὶ μὴ λαβεῖν ὅτι ἐν παντὶ ἔστι, καὶ πῶς ὅρῃ· πᾶσι γὰρ κακὸν σημαίνει, καὶ τὸ χεῖρ ἀναγόν. ἰ. Ratum fit illud per-
spectumque omnibus de signis syllogisticis, quod in quouis tempore ac tempestate; mala quidem, sinistri sunt ominis;
bona autem, secundi. At bona sunt illa; in signis quidem, quæ ad celeritatem & securitatem crisis appa-
rent, sicut pepasmi in propria cuiusque morbi dolorifica causa; in causis autem, quæ morbum omnino
tollunt, aut certè faciunt vt alacrius ferant morbum ægroti. Ex quibus efficitur, commemoratum pleu-
ritidis & peripneumoniz sputum, salutare quidem esse, omnique culpa carere: quamuis dolorem non
sanet, aut eius vacuitatem non adferat; nisi fortè paulisper, & vt dici solet, ad tempus, vacuando rheu-
ma consistens. Sed ideo cum salutari signo & causa non concedit pleuritis, nec vale dicit pleuritico, sed
crebrò succrescit & inualescit, vnde spes in angusto: quoniam ad nobilissimæ partis oppressionem ac-
cedit perennis morbificæ materiz generatio, & perennis affluxus. Iraque repetenda crebrò rheumatis
concitati*

concitati retractio. Arqui tam sæpe itur aquarum, vt tandem aqualis anſam relinquat. Eodem modo in paratidibus purulentis, adhuc periculo locus eſt ſi cruditas adſit vrinæ, vt in pictoris ancilla: quoniam fruſtra humoris in parte aliqua ſuſcipitur concoctio dum viger febris, manentque cruda in vniuerſitate corporis excrementa. Ergo verè illud videor eſſe dicturus, quod ſuprà iam demonſtraui. *Quæ cum ſalutaribus ſignis nihil cōcedunt, periculo locum eſſe teſtatur: quemadmodum et illa quæ prauis cum ſignis miteſcunt.* Coac. p. lib. 2.

Pars huius prognōſeos altera mihi reſtat de ſputis quæ ſanant dolorem, proptereaque bona vulgò putantur, cuiuſmodi tandem illa procedunt. Enimvero ſputa praua nunquam in bonis ducenda: quoniam dolorificum malum foras non edunt, ſed omnino ſemper ſigna ſunt prauarum affectionum. Nota eſt illa prognōſis. *expurgationes ſputi in febre, liuida, nigra, bilioſa; omnes omnino mala.* Atenim, dicet quiſpiam, ſubiunxit dictator. *Quæ autem conuenienter ducuntur; ſalubres.* Sed quænam ſunt iſtæ: quarum materia cernitur in ſputo pauca bile permixto exactè, nec ea materia tenuitate ſit fugax, nec glutinoſa contumax; tum ſi liberalis & libera ſit anacathariſis, idque circa morborum initia; nec vlla ſit perennitas *τῆς ἀνακαθαρτικῆς* quæ irritam faciat anagōgen. Nunquam enim tuta leuatio eſt quæ prauis cum ſignis adfertur; nec verò prauis eſt ſignis quæ ſalutaria eſſe non poſſunt, vnquam veniſſe credendum *τῶν ἐνφοβίων*, i. alacritatem ferendi morbum, neque ex falſo credita *ἐνφοβία* iudicandum *τὸ οἶα δεῖ*, i. qualia decet. Sed ex *οἷον* quæ ſunt *καλὰ καὶ κρισταῖα*; ſperabilis, & firma, & ſtabilis *ἡ ἐνφοβία*. Ac ſanè talis fuit falſo credita leuatio duorum adoleſcentum: quoniam alter febrè deſunctus videbatur cum vrinis tenuibus atque nigris; alter cum prærubra ventris proluuie, & vrinis aqueis, curationem febris lentæ foeliciter receperit: vterque tamen interiit quòd in vitio partes eſſent, quarum potentia corpus adminiſtratur. proth. 7. lib. 2.

19 *Ὅσα δὲ τ' ἀλγυμμάτων ἐν τοῖσι τοποῖσι τούτοις μὴ παύσονται, μήτε πρὸς τὰς ἀναπλύσεις, μήτε πρὸς τὰς φλεβοτομίας, μήτε πρὸς τὰς φαρμακείας τ' καὶ διαίτας ἐμπνέται.*

30 *Jam verò dolorifica partium iſtarum mala quæ non quieſcunt nec expurgatione ſputi, nec ſanguinis detractiōne, neque pharmacia ſimul atque diætā; in ſuppuratum vertuntur.*

HACTENVS leges *τῶν παθόντων* ſancitæ ſunt pleuritidis & peripneumoniæ, in ſputi expurgatione, quæ vel ad ſalutem certò apparet, vel ſpem in anguſto eſſe teſtatur, prout illa bene aut malè ſit in qualitate, copia, tempore, & exercendi modo. Nunc ineunda *πυμνός*, i. regula ſcienter prædicendi & conuenienter cuique medendi ad eam mutationem pleuritidis & peripneumoniæ, quæ media eſt inter citam & ſimplicem earum diſceſſionem, & deſperationem ſalutis. Eſt autem ſuppuratio quæ ſyſtrophicarum inflammationum thoracis & hypochondriorum ſuccedanea eſſe ſolet, quando illarum dantur induciæ, nec ocyùs ad exitiũ præcipitantur ægroti. Ac de ſuppurati ſucceſſione in malis hypochondriacis dictum eſt ſuprà, de quæ illius curatione. Idem nunc faciundum in ſuppurato pulmonum atque thoracis.

Ergo. IAM VERO] Ac ſi diceret; quando ita comparatum eſt in omni morborum hiſtoria, maximèque in iis qui principatùs naturæ exercent, vt eorum ſucceſſiones *καὶ μετὰ τὴν καὶ καὶ μετὰ τὴν*, tanquam eſt ſpecula, proſpiciendæ ſint & arcendæ.

DOLORIFICA PARTIUM ISTARVM MALA] i. Quæ pulmonem & coſtas exercent, indeque pleuritis & peripneumonia nominantur.

QVÆ NON QUIESCUNT] i. Non exoluntur vacuatione libera & liberali rheumatis conſiſtentis, & redintegratione partium obſeſſarum.

50 NEC EXPURGATIONE SPVTI] Quoniam aut mala prædicta fuere ſicca & ſputi expertia, idque *ἀνὰ ἀπομάκρυν*, i. ſine auulſione doloris intus foras; aut quoniam anacathariſis tantum fuit *ἡμίρροπος*, i. inchoata, non copioſa & perfectæ; aut quia in libertate & copia ſputi, perennitas fuit rheumatis concitati, vel à prolapſu catarrhi, vel ab anadrome ſanguinis bilioſi.

NEC SANGVINIS MISSIONE] Ad retractiōnem rheumatis concitati, & ad vacuationem ſeu detractiōnem conſiſtentis, quorſum mitti debet ad mutationem coloris, incifa vena interiore cubiti eſt directo, ſi ad iugulum vſque dolor, & ad brachium atque mammam prorepat ipſa grauitas. Nam illa coloris mutatio, vt rubro ſuccedat liuidus ſanguis, in pleuritide inferarum coſtarum, expetenda non eſt nec expectanda. Hic enim tantum prodeſt venæ ſectio ad retractiōnem rheumatis concitati, & ad temperationem ſanguinis æſtu incandefcentis; non ad detractiōnem conſiſtentis.

60 NEC PHARMACIA] Ad pleuritidem coſtarum inferarum quæ ſub diaphragmate non raro aſurgit, nec vllam ſui exhibet ſignificationem circa iugulum. Hic enim pharmacia eſt opus pharmaci, vt ita dicam, mochlici; quale eſt verarum nigrum & peplium, quæ mixta ſimul conſocialia ſunt ad bene conuenienterque purgandum; illud quidem vacuando; hoc verò diſcutiendo ſpiritus flatulentos: quæ dores perfectæ cognitæque à præceptore, ipſum mouerunt vt ea medicamenta præſcribendæ putarit, quòd præſtantiſſima eſſent pharmaca omnium quæ ipſe nouiſſet, nouerat autem plurima; vt non ino-

lib. 4. acut.

pia, nec ignorantia meliorum, quod vulgus medicorum existimat: sed prudētia singulari atque delectu, ipsa præscripsisse videatur. Eò autem præscripsit pharmaca illa mochlica, quòd malum dolorificum firmiter fixum, sit *μολχέας δόμενοι*; non secus atque tuberculum gibberosos faciens lumbos, quod tandem vel dysenteria exoluitur, vel abortis in utroque crure varicibus. Nec verò prætermissa id fecit detractio-
ne sanguinis, quam idem præceptor statuit *ἡμμοτον* inflammationum omnium systrophicarum, quas negat sanari posse, si quis antè purgationi operam dederit, quàm venam secuerit. Idem præceptor au-
thor est, auspiciandam curationem à sanguinis detractio-
ne, quotiescunque duorum remedium solen-
nium, purgationis dico & phlebotomizæ, necessarius usus incidit. At verò pharmacizæ cathartica locus non est in expurgatione sputi. Nam à cathartico sistitur anacatharsis, unde pleuriticis suffocantur septi-
mum aut nonum morbi diem agentes. Ergo si cathartico non concedat pleuritis; aut si fortè oppugna-
ta iure & loco non fuerit; aut si non quieuerit anacathartica pharmacia, ut foru, melicrato & oxymeli-
ce; aut si ea remedia sputi *ἀναχρησά*, fuerint prætermissa.

NEQUE DIETA] Cuius hæc ratio esse debet, ut si validæ sint ægri vires cum securitate & sine ullo infirmitatis metu, prius in curam morbi sit incumbendum, quàm refectioni studendum, donec hu-
mescere cœperit os ægroti, & sputum edatur: & contrà si vires infirmæ sint, ita se compareret medicus ut
locum habeat deducendi potius alimentum, quàm necessitatem exhibendi cum minimè decet, instante
crisi. In utraque autem naturæ conditione, iure & loco cibum exhibeat meabilem, coctu facilem, imbe-
cillum, minimèque sitiferum; cuiusmodi est prissanarium, quod illis quatuor dotibus principatum ob-
tinet inter omnia *περὶ σφοδρόμενα*.

lib. 2. progn.

IN SUPPURATVM VERTVNTVR] Est enim hæc mutatio succedanea systrophica inflam-
mationis quam vacuatio propria non sanavit, nec gangræna & partis obsessæ corruptio, ad *τέκνον* &
vniuersitatis interitum, occupauit. Vértuntur autem in suppuratum intra 14. diem, ex lib. 5. aph. aut in-
tra 20. ex lib. 7. aph. *καὶ παρὶς ἐς τὴν αἰῶν καὶ λίαν ἐν ἡμέρῃ* *ὅτι ἐκαστὸν ἐμπύεται*.

20 Οσοι μὲ τῆ χολώδε πύωδες ἀνάγρουν, ἢ χολεῖς, ἢ μεμιγμέ-
νον ὡς ἔπιτο πολὺ πικραρεσκιδνεταῖοι θήσκοισιν. ὡ μὴ π ἀγαθὸν ἔπι-
γρήται ἢ κακὸν τῷ περὶ γεγραμμένον. εἰ δὲ μὴ, καὶ λόγον μάλιστα δὲ οἱ-
σιν ἐβδόμαίοισιν ἀρχεται τὸ τοιοῦτον πύωϛ.

Ergo qui cum sputo bilioso purulentum expurgant, diductum ve fue-
rit aut permixtum; ὃ ferè moriuntur decimum quartum morbi diem a-
gentes: nisi quid boni malive acciderit prædictorum: sin minùs, ex pro-
portione: potissimùmque iis qui septimo tale sputum cœperint expurgare.

QVONIAM ita comparata est ratio suppurationis per *μετάστασιν* phlegmonarum viscera occupan-
tium, ut medio statuatur loco inter citam earum sanationem, & certam desperationem salutis: hinc pri-
mùm docetur, in utram spectet partem illa suppuratio quæ cum sputo bilioso expurgatur.

ERG O] Inter purulentos qui ex pleuriticis huiusmodi sunt: quoniam nec lege critica, nec artificio
medici, pleuritide primigenia defungi potuerunt cum redintegratione partis obsessæ, i. tunica costis
intextæ.

QVI CVM SPVTO BILIOSO] Meræ bilis flauæ aut viridis quæ caret pepasmo, cuius qui-
dem capax non est, nec vinci se patitur à natura: sed prauæ affectionis verum est *ἐμφανόμενον*, quæ fo-
ras non exit.

PVRVLENTVM EXPVRGANT] Non quidem à pure quod cum æqualitate candidum & læ-
ue apparet; unde significatur partis unde manat integritas, materiæ bonitas, & virtus caloris natui sese
in omnes materiæ partes æqualiter insinuantis: sed à pure fusco; amurcofo, cœnofo, & inæquali: qui
certè pepasmos est omnino pestiferus. Non enim sperabilis est bona suppuratio quæ ex mera bile con-
ficitur, nec verò illa etiam quæ in laudabili materia laborat ex paupertate caloris natui, & infirmitate
aut corruptione partis afflicta; quod cernitur in suppurato partium aspectabilem semper vitioso, ubi
paria non sunt omnia caloris atque humoris coquendi.

DIDVCTVMVE FVERIT AVT PERMIXTVM] Nihil refert: ambo enim certant ex æquo
in prauitate, ac pariter æqualitèrque mali sunt ominis. Ex quo efficitur, quæ toto genere praua sunt &
primigenia prauarum affectionum signa, metaptosin bonam habere non posse. Ut enim spurum merè
flauum, est prauum, & signum affectionis prauæ: sic alteratio eius, mutationem in melius habere non
potest; proptereaque nec suppurationem bonam: quoniam in affectione maligna, & à corruptente
verius quàm mitificante causa conficitur. Ergo siue diductum, siue permixtum excludatur; parem no-
bis exhibet noxæ opinionem.

II FERÈ MORIVNTVR] Per extinctionem & suffocationem caloris vitalis, ab oppressione
partium

partium afflictarum, quarum ea vis est atque potentia, ut earum officio diu vita carere non possit. Tacebo interim sympathiam & syntimoriam partium sociarum & vicinarum.

DECIMUM QUARTUM MORBI DIEM AGENTES] Quoniam dies ille finem adferre solent acutorum morborum, aut vitæ, quoad longissima esse potest eorum discessio: nam multi celerius increscunt aut conualescunt: rari admodum, serius. Versatur in perüagato medicorum sermone aphorismus ille. *Acuti morbi intra quatuordecim dies indicantur*; recensendo numerum vel à principio morbi, vel ab incremento ipsius.

NISI QUID BONI AUT MALI ACCIDERIT PRÆDICTORVM] Ac si diceret, semper aut celerius moriuntur ægroti, supra aut infra decimumquartum diem: ut cætera erunt signa bona aut mala, quæ cernuntur in qualitate corporis, actionibus, & excrementis. Prædicta autem sunt mala quæ cum strepitu pravi sputi apparent in facie tristi, oculis ictericis, & visu caliginoso: ubi demonstratum est, mortem in propinquo esse, quando ad desperationem curationis, quam strepitus ipse denunciat pravi sputi, accedunt quoque signa trium principatuum collapsorum, naturalis, vitalis, & animalis. Prædicta sunt etiam bona signa quæ iuvant, non faciunt discessionem pleuritidis. Sunt autem; alium duci mollioribus & figuratis excrementis, sputum colorari, nullos in pectore strepitus exaudiri, urinam bene ferri, somnos iniri, &c. Sed plura mox describentur.

Coac. II. huius cap.

Coac. II. huius cap.

SIN MINVS EX PROPORTIONE] i. Pro funesta vi morbi & virium statu, sine accessione bonorum aut pravorum signorum quæ plures aut pauciores principatus & partes in vitio esse, proptereaque mortem celerius aut serius venturam testentur.

AG SANE POTISSIMUM IIS QVI SEPTIMO TALE SPVTVM COEPERINT EXPVRGARE] i. Firmissimum illud est cui proculdubio moriuntur, & decimoquarto, quibus tale sputum septimo primùm die apparet: quoniam quæcunque apparent & fiunt diebus criticis, maximèque septimo, firmiora sunt ad interitum vel ad salutem, quàm quæ in alia incidunt morbi tempora. Est autem analogia septimi indicantis ad crisin decimi quarti, per quam vitæ aut morbi discessio cõparatur.

21. Ἐστὶ δὲ ἀγαθὸν μὲν καὶ τούτοις, καὶ πᾶσι τοῖς πρὸς πλῆθον, φέρειν ῥηϊδίως τὸ νόσημα, τῆς ὀδυνῆς ἀπὸ ἡλλᾶχθαί, τὸ πύαλον ὑπετέως αἰνᾶν, ὑπνοὸν ἔχειν, καὶ ἀδύφον, τὸ σῶμα ἅπαν ὁμαλῶς θερμαίνεσθαι, καὶ μαλακὸν ἔχειν. καὶ πρὸς τοῖσιν, ὕπνοις, ἔρεα, διαχώρησιν, χεῖρας γίνεσθαι κακὰ δὲ πάντῃς τούτων. Εἰ μὲν ἔν πάντα πρὸς ἄλλοις τῷ πύσματος πύπτω τὰ χεῖρσιμα σῶζοιτο αὖ. εἰ δὲ τὰ μὲν, τὰ δὲ μὴ, ἔπλείους τῶν ἰδ. βιώσας ἀπόλλοιτο. τῶν δὲ ἄλλων σημείων σιῶσώτερον.

40. Est autem perinde his atque peripneumonicis salutare, alacriter morbum ferre, doloris vacuitatem habere, ipsum verò sputum facile expurgari, spirare ex facili, sitim nullam, corpus aequaliter molle & calidum. Ad hæc somnos, urinas, deiectiones, salubres. Contraria horum terrificæ. Atque hæc omnia si coniuncta fuerint cum sputo predicto, utique morbo defungi poterit. Quod si alia quidem accesserint, alia verò secus; non ultra decimumquartum protrahetur vitæ discessio.

INTER commoda epiphænomena quibus vtuntur pleuritici & peripneumonici, alia quidem adferunt discessionem morbi πρὸς τὴν καὶ κρείων, alia verò ἀντίρροια: quæ tamen ita iuvant quando in sua quæque statu sunt bona; ut secus apparentia, irritum planè faciant medici & naturæ studium in oppugnando morbo. Sanè pleuritidis & peripneumonix discessionem adferunt sputa bile modica aut sanguinea paucò permixta, quæ citò, & liberè, & liberaliter expurgantur. Iuvant autem quæ triplicis principatus integritatem ostendunt, naturalis, vitalis, & animalis in cæteris actionibus, qualitate corporis, & excrementis. Sed quoniam illa lex in prædicendo sancita est, ut pluris esse debeat ad præscensionem interitus vnum prauum κρείων, ὁποῖα φαινόμενον, cuiusmodi est hic sputum, quàm alia multa communia; difficilis erit quæstio super iis quæ in hac prognosi, fati necessitatem impediunt in suppurato fatali ad mortem, quale superior prognosis examinandum proposuit. Sed infra lis dirimetur.

EST AUTEM] Pertinet hoc ad id quod supra dixit; suppuratum quod cum bilioso adhuc sputo expurgatur, mortem venturam testari intra decimumquartum morbi diem, nisi quid interea boni malive acciderit unde celerius aut serius moriantur ægroti, aut ipsa desperatio in spem vertatur. Hic autem signa scribuntur & explicantur rerum purulenti descripti, melius aut peius euntium.

Cosc. 16. hu-
sus cap.

PERINDE HIS] i. Pleuriticis, quorum historia patescens transiit ad metapneumoniam suppuratorem.
ATQUE PERIPNEUMONICIS] iam descriptis, qui etiam, sicut pleuriticis, redduntur purulenti, quando sine interitu phlegmone non quiescit, nec sputi expurgatione, nec phlebotomia, nec diata.

SALVTARE] Quod multum adfert adiumentum vel ad usum atque dulcedinem diuturnioris vitæ, vel ad spem adhuc retinendam salutis.

ALACRITER MORBVM FERRE] Omni carere alysmo, & regi trium principatum magisterio quorum virtute atque potentia corporis vniuersitas administratur.

DOLORIS VACVITATEM HABERE] Non falso creditam per metastasin pleuritidis ad peripneumoniam, & huius ad phrenitidem, unde nulla sensio quantumvis excitata percipitur causæ morbosæ: sed comparata leuatione, ex tensionis laxitate, & temperatione proripantis humoris, per concitati rheumatis retractionem, & consistentis vacuationem; tum etiam per metapneumoniam phlegmones in suppuratum, unde *ἡ ἀλγὴν* & merito sedatur ipsa doloris *συνένια*, pure confecto.

IPSVM VERO SPVTVM FACILE EXPVRGARI] i. Liberè & liberaliter, sine doloris ac tussis molestia, in sputo meabili quod thoraci morem gerit, firmisque lateribus; unde significatur animalis principatus integritas, & morbi remissio comparatur.

SPIRARE EX FACILI] Restituta libertate spirandi per laxitatem partis afflictæ, i. tunicæ costalis intertæ quæ nimium distenta erat, & liberum sputi meabilis exitum.

SITIM NVLLAM] Non quidem falso credita sitis vacuitate in causâ sitifera cuius nulla sensio excitatur, ob deprauatum *φασμασίων*, vel propter infirmitatem & *νέκρωσιν* partium sitis capacium quæ sunt ventriculus & pulmones: quanquam sua est etiam sitis vtero, sua renibus ipsis.

CORPVS ÆQUALITER MOLLE ET CALIDVM] Quod alibi scripsit, *τὸ σῶμα σῶμα ὑγρὸν καί μεν*, quod molliter decumbit, totòque habitu mollitudinem quandam edit suauem, ab humido primigenio in quo sita est partium solidarum viuacitas, & à liberali ac libero viuifici nectaris, i. spiritus & caloris vitalis appulsu cum sanguine.

AD HÆC SOMNOS, VRINAS, DEIECTIONES, SALVBRES] Somnos quidem suaues, non turbulentos cum visis terrificis: sed quorum benignitas dono diuinum gratissima serpit, quando ipsa dormiendi necessitas parem habet commoditatem causarum somniferarum, suaui & copiosæ anathymiascos, cerebri naturaliter constituti, & mentis tranquillæ. Urinas verò huiusmodi esse decet in qualitate, copia, tempore, & excernendi modo: ut proba significetur coctio tum alui, tum hepatis, cum integritate partium unde veniunt, i. venarum; quæ feruntur, i. renum; & ubi excipiuntur, i. vesicæ. De ipsis autem deiectionibus id ratum esse debet, ut in pleuritide iam affecta quæ transiit ad suppuratum, non ferantur humidæ (quamvis subrubræ, & raræ, & liberales, quæ incurre morbo laudantur) sed molles & figuratæ, quæ nullam opinionem faciant partium aluinarum in officio laborantium, aut quas iam tædeat sui quamque officij, ut in diarrhœa & lienteria: nec verò siccæ & pilulatæ appareant, quæque non nisi coactæ ducuntur. Sunt enim signa siccioris alui, & incendio conflantis.

CONTRARIA HORVM PESTIFERA] Quæ cuiusmodi sint & quorsum appareant, facile notitia comparatur ex antithesi causarum cûr ita sint atque fiant; iuxta illud, contraria contrariorum consequentia sunt.

ATQUE HÆC OMNIA SI CONIUNCTA FVERINT CVM SPVTO PRÆDICTO] Ut œconomiz vtriusque, spirationis & nutritus, ratio sit naturaliter constituta, ac trium principatum se virtus ostendat.

VTIQVE MORBO DEFVNGI POTERIT] Ob vitæ & animalitatis firma præsidia, tum autem quia rheumatis biliosi nulla est ab hepate concitatio. Ipsum verò rheumia consistens, quantumvis inæquale: tamen suo exitu liberali & libero, libertatem adferat spirationis quæ antea fuit difficilis, cum redintegratione partis obsessæ.

QVOD SI ALIA QVIDEM ACCESSERINT] i. Bona quædam heterogenea.

ALIA VERO SECVS] Præsertim mala *ὑποκρίνεται* cum specie ipsa morbi.

NON VLTIA, &c. Causæ sunt explicatæ.

22. Οσοις δὲ ἐν τῇ πνευμονίᾳ ἀποσπασίῃς ὡρᾶ τὰ ὠτὰ, ἢ τὰ ἡπατοχώρα ἰνώνται, καὶ ἐν πύσσι τὴ καὶ ἐν οὐρῇ οὖνται· οὗτοι θεωροῦνται.

Quibus autem ex peripneumonia sub auribus, vel inferis partibus, nascuntur abscessus, ibique suppurant & fistulantur; hi defunguntur morbo.

MAGNA VIS est pepasmi in omni abscessu quem primigenij morbi metapneumonias, in partibus procul à priore foco excitauit: quando ipsa prioris foci calamitas, laudabili suppurato exploditur. Ac suppurati quidem prima laus debetur abscessibus partium superarum, ut aurium, sub quibus exorta paratides hinc nominata, si rubræ sint ac dolorificæ; omni ex parte videntur pestiferæ: quod illæ sint *ὑπὸ πύσσι καὶ ἀδύπνοισι*, i. semisua & sursum delata. Quæ duo vitia principem locum obtinent maleficentiz in omni abscessu. At tamen suppurato & fistula, periculi locus tollitur. In partibus autem inferis, procul à morbo assue-

morbo assurgunt tumores *αἱμας τῆς ἀσθενείας*, i. pro dignitate & copia humoris morbifici. Ac si forte rheuma illud consistens, non sit puri simile, sed noua quædam putredo exciteretur pro veteri; partis ipsius iactura, ab interitu vindicabit ægrotum, si nullus sit recursus. Quod accidisse legimus iis quibus in tempestate pestifera *πύμα σωστέμενον* cruris erysipelatosi *ἐν τῷ πύμα ἵκελον ἀλλὰ σπιδῶν τῆς ἀλλῆ*, i. non erat puri simile: sed alia quædam putredo. Secus fit in abscessibus partium superarum. Secus etiam in metaprosi pleuritidis ad suppuratum quod cum bilioso adhuc sputo expurgatur. Hoc non est *πύμα ἵκελον*, vt præceptor loquitur; sed *σπιδῶν τῆς ἀλλῆ*: proptereaque mortiferum in parte nobili & officiali.

QVIBVS AVTEM] Nondum sanatis & morbi periculo defunctis, nec sputi expurgatione, nec sanguinis detractone, nec diæta conuenienter præscripta, nec aliis naturæ conatibus mox explicandis.

10 EX PERIPNEUMONIA.] Inflammatione pulmonum systrophica, cuius consecutaria hæc sunt; febris acuta, difficilis respiratio parua & frequens, calida expiratio, dolor sub omoplatâ qui prorepat ad ingulum & ad mamam, pectoris grauitas, anxietudo, delirium quoque ipsum. lib. 3. cap. 1. r. 6.

SUB AURIIBVS NASCVNTVR ABSCESSVS] Per expressionem humoris morbifici à phlegmone in venas iugulares & carotidas quæ secundum asperam arteriam procedunt ad caput, prius largitæ surculos laryngi & faucibus, vnde parotides eructantur, opportunitate glandulæ quæ iacet ad aures, faucibusque adiacet, cum numerosa riuulorum propagine vnde partes illæ, fauces dico & aures, affluxus & refluxus incommoda vicissim & mutuo facili experientur. Assurgunt autem præterea & dolorificæ, à tensione magna humoris firmiter fixi, nec exudantis ob densitatem cutis; tum à prægrandi calida intemperie quam secum attulit sanguis multa bile perfusus. Sic enim Galenus parotidum dolorificarum causas esse dixit *τὸ πᾶν ὅτι σπιδῶν, καὶ δεκράσιαν σποδράν*. Atqui iam supra positum est, quod parotides quæ dolenter assurgunt, mortiferæ sunt: primum quia *ἡμύρροπος καὶ ἀναρρόπος* assurgunt: deinde verò cruciatu acerbi doloris: tum etiam sympathia & syntimoria nobilium partium sociarum & vicinarum. In hac igitur peripneumoniæ metaprosi, periculum quidem muratur, non autem vitatur. Vitandi ratio mox dicetur. lib. 1. Epid. 1. r. 68. 1. 1.

VEL INFERIS PARTIBVS.] Intelligit crura, quorum alia longè conditio est quàm aurium: quia sunt morbifici humoris capacia, & *κατάρροπον* humorem excipiunt procul à morbo. Quæ duo maxime ponuntur in laude & commendatione abscessuum criticorum.

IBIQUE SUPPURANT] Parotides quidem, suppurato laudabili quod visu & olfactu percipitur album, æquale, & læue, minimūque fecdi odoris. Sin minus, *parotides illa purulente, nec albo exacte pure, nec nihil olente, intermunt*. Nam suppurati expertes in acutis mortiferæ sunt; nisi fortè alii ferantur: quod legimus scilicet contigisse Hermippo Clazomenio, cui cum in angusto spes esset à desiderio suppurati in parotide rubra & dolorifica, exacti iam morbi superstite; alui profluuium periculi locum sustulit. In cruribus autem claudicatio est in metu, suppurato non exquisito. Coac. 3. cap. 4. lib. 2. lib. 1. Epid.

ET FISTVLAM EDVNT] Rupta vomica pus effundente, cuius effusi quoniam longa est via, ob eam sanè causam ductus ille fistula nominatur: sed crassa, vt ita dicam, & pingui Minerva. Nam fistulæ *κωχίας* dictæ, in angusto vlcere, calloso, & sanioso, planèque fistuloso, generatio, causa, & curatio infra exponetur.

HI DEFVNGVNTVR MORBO] Peripneumoniæ atque parotidum; beneficio suppurati iam descripti, quod vnicum naturæ perfugium est in omni phlegmone systrophica, multum coacta, multumque dolorifica, vbi dolorificum malum, propriam vacuationē habere, & foras exire non potest. lib. 1. Epid.

23 Ὑποσκέπτεσθαι δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα ὧδε· ὡς ὅτε πυρετὸς ἔχη, καὶ ἡ ὀδυμὴ μὴ πεπαυμένη ᾖ, καὶ τὸ πτύον μὴ ἐκχωρήσῃ λόζον, μήτε χολώδεις αἱ τῆς κοιλίης διαχωρήσεις, μηδὲ δύλυτοι καὶ ἀκρητοὶ γίνωνται, μήτε τὸ ἔσρον κάρτεα πολὺ ἢ καὶ ταχὺ, καὶ πολλὰ ὑπόσασιν ἔχον. Ὑπηρετεῖται δὲ ὡς εἰσηνηκῶς ὑπὸ τῶν ἄλλων παντῶν ὡς εἰσηνηκότων σημείων· τούτοις καὶ ἐλπίζειν τὰς τοιαύτας διαποσάσεως ἔσσεσθαι.

Attendere autem sic decet ad ista; si febris detinet; si dolor nondum quieuit; si conuenienter sputum non editur; si aluus non fertur liberaliter biliosis deiectionibus; si vrina nec admodum multa & crassa est, nec multi particeps sedimenti. Cetera autem salutaria signa, salutariter suffragantur; abscessus eiusmodi certò sperare oportet.

ENIMVERO peripneumonia omnis non habet *μετῆλθε* abscessus partium superarum vel inferarum. Impedimenta sunt; mors quæ cita venit; perfecta crisis & simplex per liberam & liberalem sputi

expurgationem; deriuatio & vacuatio humoris morbifici per diarrhoeam vel perirrhoeam vrinar. Sed ea demum peripneumonia sperabilem facit abscessum, quæ in vacuitate anacatharicæ & aliarum excretionum, accessionem habet signorum salutarium quæ opinionem faciunt secundæ valetudinis & salutis. Quæ cuiusmodi sint omnia, loco scribentur. Ac primum signa docentur peripneumoniz sanabilis migraturæ in abscessus, deinde quod viam affectet sursum deorsumve, præuidendi & excipiendi ratio indicabitur, quæ duce medicus nunquam aberrabit à scopo. Quæ cum ita sint.

ATTENDERE AUTEM SIC DECET] i. Ne in hoc iudicio, cuius magna expectatio est, labatur medicus, erret, decipiatur, quod est sanè turpissimū; diligenter attendat, mentisque conuertat aciem ad ea signa hic posita, quæ omnem iudicij, quantumvis difficillimi, difficultatem adimunt.

SI FEBRIS DETINET] i. Si continenter quidem, sed non ita vehementer, ægrum exerceat, superstitite causa eius, i. inflammatione pulmonum systrophica cuius ipsa febris pathognomonica esse solet.

SI DOLOR NONDUM QUIEVIT] Si manet adhuc scapularum & iuguli dolor, pectoris gravitas, difficilis spiratio, calida expiratio, sed sine magna anxitudine, ac sine meteorismo spiritūque sublimi: quoniam nondum explicata sunt alæ pulmonum, nec tensionis comparata laxitas quæ dolorem minuat atque adimat, propter anacatharicæ vacuitatem, aut certè paucitatem.

SI CONTINENTER SPVTVM NON EDITVR] Non paucum permixtum sanguine, nec citò, liberè, & liberaliter editum.

SI ALVVS NON FERTVR LIBERALITER BILIOSIS HUMORIBVS] Vnde materia & occasio præripi possit futurorum abscessuum, non quidem lege critica quæ statuit rarò abscessus fieri in dominatu biliosi humoris: sed à contentione forti naturæ, cui cum in anacatharsi molienda irritus labor fuerit, aliam inuenit viam qua deducitur ad conseruationem sui, crisinque exhibet infuetum per iter & multis ignotum. Talis insperata salus, anginz tributa est in illa prognosi. *Ex anginosi immerito adequatus, dolor prægandus cum ad pectus ex ad ventrem transierit, excretionem puriformem molitur, si quidem aliter non exoluitur. Quamobrem facere non possum quin à Galeno dissentiam, qui negat ex peripneumonia oriri abscessus, cum biliosus est humor, quem manet excretio, potius quam abscessus. Hoc enim locum habet in febribus articularum & cordis quæ dicuntur essentielles, de quibus verè & appositè illud posuit est. Abscessus rarò iis fiunt quibus rigores tum critici, tum periodici.*

SI VRINA NEC ADMODVM MVLTÀ ET CRASSA EST, ET MVLTÆ PARTICES HYPOSTASEOS] Cum scilicet peripneumonia mitigari iam cœperit, & in suppurationem conuerter, vinarum fit perirrhœa crassarum, multaque hypostasi præditarum; quod iter sæpe tenet natura ad exolutionem & vacuationem phlegmonarū, cæterorumque morborum pulmonis. Eius diadoches multæ leges, multa exempla leguntur passim apud Hippocratem, quæ loco scribentur. Omnis autem abscessus futuri spem adimit vrina multa crassa & alba.

CÆTERA AUTEM SALVTARIA SIGNA, SALVTARITER SVFFRAGANTVR] Quæ spem adferunt discessuri morbi, & vitæ superstitis, quæque iuuant discessionem morbi, & ægrum spe consolantur in remissione peripneumonicorum symptomatum; febris, doloris, dyspnœæ, anxitudinis, cum benignitate somni, & vrina laudabili, deiectionibus item naturaliter constitutis: quibus accedit corporis vniuersi laudabilis qualitas in colore, calore, & mollitudine succi plena.

ABSCESSVS EIVSMODI] Crurum vel aurium.

CERTO SPERARE OPORTET] Inferos quidem aut superos; pro humoris motu, namque impulsu; meatuumque partis afflictæ, sursum deorsumve spectantium, conditione & situ. Inclinationis vtriusque signa syllogistica, in proxima decisione continentur. Certo autem sperabiles duxit abscessus: quoniam nihil bene fit *ἀσπύτως*, nihil *ἀσπίτως*. Ac suspecta esse debet omnis leuatio quæ crisin non habuit, etiam in spe certa salutis. Ergo denegata hic propria crisi per anacatharsin, reliquum est vt natura molietur abscessum per metaplasin, vel intra, vel extra partem afflictam, qui medium tenet locum inter citam crisin & desperationem salutis. Sed melior est metaplasin extra quam intra: nisi forte paratidum sit irrita suppuratio, qualem descripsi.

24. Γίνονται δὲ αἱ μὲν ἐς τὰ κάτω, οἷσιν αὖ πρὸς ὑποχόνδρια, φλεγμονὴ γίνηται· αἱ δὲ ἐς τὰ ὀψώ, οἷσιν αὖ τὸ μὲν ὑποχόνδριον λαπαρόν τε καὶ ἀνώδυνον ἢ, δύσπνοοι δὲ πᾶσι χρόνῳ παύσονται χωρὶς πρεφάσι.

Exoriuntur verò ad inferas quidem partes, quibus hypochondria incandescunt; ad superas autem, quibus hypochondrium quidem molle est, dolorisque expers; ipsi verò paulisper suspiriosi quiescunt sine causa.

EST SANE tecmaris exacta in superiore & in hac prognosi, quæ de abscessibus peripneumoniz sanabilis, bene scienterque prædicendi ratio continetur, quando & ubi sint excipiendi. Ac certè superior prognos,

rior prognosif, metapneusin ostendit peripneumoniam in abscellum. Hæc verò, quibus in moliendo abscellum natura sursum deorsumve viam affectet. Hoc demum verè docet, τὴν ἀσθενίαν ἐν τῷ ἀσθενίᾳ, i. prudentiam comparare et confectari. Hoc facit peritum medendi artificem atque magistrum. Fremant licet omnes, dicam tamen quod sentio; maiorem scientiæ & praxeos vbertatem comparari à studioso Hippocratis vno die, quàm ab istis pragmaticis vno sæculo. Sed ad institutum reuertamur.

EXORIVNTUR VERO] Peripneumoniam abscellus quorum prævisio tradita est superiore prognosi; exorivntur per metapneusin humoris morbifici deorsum aut sursum, cum redintegratione & solatio partis afflicte, cui vale dixit rheuma consistens, quod virtus naturæ explosit.

AD INFERAS QUIDEM PARTES] Ad crura scilicet, ut mox dicitur, eò natura cursum inflectente καὶ ἔστιν ἐκ τοῦ ἀσθενίᾳ, non autem ἀπὸ τοῦ ἀσθενίᾳ ἐκ τοῦ ἀσθενίᾳ ab humoris orgasmo. Naturæ autem fortis contentio viam affectat καὶ ἔστιν, qua duce semper ibi sit apostasis, unde facta est primum metastasis. Est autem consentaneum ut in utrumque crus, vel in alterutrum fiat abscellus κατὰ τὴν φύσιν; obscello pulmone, vel utraque parte inferiore, vel alterutra tantum. Nam inflammatorum pulmonum, partiumve illius superiorum, mediarum, & inferiorum, signa syllogistica docentur.

QUIBUS HYPOCHONDRIA INCANDESCUNT] Rursum accensa quæ prius deferbuerant; metastasi facta sanguinis ad pulmonem, antè quàm scilicet metastasin, ipsa cum calore discenta erant; oborta verò peripneumonia, subsistente in pulmonibus anadrome sanguinis anagogen non habentis, ac restituta proinde hypochondriis æqualitate; rursum à palindrome humoris eò unde primum erupit, æstu incandescent ac tument tantisper, dum cursus ad inferas partes inflectitur. Sic Herophonti cum in angusto spes esset, lien primum intumuit, inde bubonis tumor & cruris abscellus, æqualitatem lieni restituit. In Heropyto crebra erat doloris ischiadici & surditatis vicissitudo. Atque ita res tulit ut febris ingrauesceret cum surditate, quoties dolor ischij quiescebat; ipsa verò mireturer cum ischij dolor vigeret. Ac de fugaci phlegmone hypochondriorum, sic, meo quidem iudicio, statuendum; primigeniam quidem, nunciam esse τῆς ἀσθενίᾳ, ut in acuta febre, ad hæmorrhagiam vel ad phrenitidem; secundariam verò, τῆς κατὰ τὴν φύσιν, ut hinc ad cruralem abscellum.

AD SUPERAS AUTEM] Vbi tumores dolenter ad aurem assurgunt, parotides scilicet rubræ & dolorificæ, ex qualitate & copia humoris morbifici, partem acerrimi sensus, nimium distendētis ac pruriantis, vicinæque cogentis in contagionem & sympathiam afflictionis suæ. Assurgunt autem, opportunitate glandulæ quæ iacet ad aures, faucibusque adiacet: proptereaque faucium eructantium suscipit excrementa.

QUIBUS HYPOCHONDRIUM MOLLE EST, DOLORISQUE EXPERS] Ut omnis tollatur occasio tensionis hypochondriacæ, quam facit, vel hypochondrij intro sursum retractio, quæ diaphragmatis propria est inflammata atque phrenitica; vel ipsa perennitas flatuum ab intemperie hectica tenuium intestinorum; vel quæ assurgit à phlegmone viscerum per systrophem nata. Nam tensio fugax, unde irrita sanguinis anadrome ad hæmorrhagiam, palindromen facit ad aures, ibique parotidas excitat; tantum in acutis febribus locum habet.

IPSI VERO ÆGRI PAVLISPER SVSPIRIOSI] Quos frequens & parva exercet respiratio, non quidem labore & inflammatione partium spirabilium firmiter fixa: sed leviter pressa & fugaci oppressione, tantisper dum via fit sursum; non secus atque hypochondriorum tensio dum itur deorsum.

QUIESCUNT SINE CAUSA] Sine dolorifici mali exitu manifesto; restituta scilicet libertate spirandi sine anacatharsi libera, ac sine erysipelate foris exorto. Erit igitur vera hæc ratæque decisio. Quemadmodum hypochondrij meteorismus fugax, dolorisque expers qui caret borborygmo quo debet exolui, superveniente parua & crebra spiratione immerito quiescente; κατὰ τὴν φύσιν denunciat sursum ad caput. Sic respiratio difficilis quæ sine causa quiescit, exorto hypochondrij meteorismo fugaci; abscellum in cruribus fore ostendit. Huc etiam pertinet illud quod iam supra positum est. Tumore hypochondriorum vanescente, spiratio frequens, biliosis quidem in febre acuta; parotidas vomit. Nam quotiescunque denunciata sursum inclinatio, repletionem adfert capitis comatosam & cephalalgicam; tum expectari debent parotides. Arqui tensio hypochondriorum recens oborta, inflammationis expers, quæ sine borborygmo exoluitur in acuta febre quæ succedaneam habet difficultatem spirandi; τῆς ἀσθενίᾳ certissimum est argumentum. Ergo si translatio illa repletionem faciat cephalalgicam & comatosam, parotidas fundit.

Coac. 10. cap.
11. lib. 1.
et
et
et

25 Αἱ δὲ εἰς τὰ σπλένα τ' (ἀποστασίων) ἐν τῇσιν ὀπτικῶν οἰοῖσι τοῦ
πνέμονος· λυσιτελέες μὲν πάσαι. βέλπειαι δὲ αἱ ἐκ πνέλας πνώδεος αἱ
πὶ ξανθοῦ χρομῶς. μὴ χωρέοντος δὲ τῆς πνέλας καὶ λόγον, μὴ δὲ ἔρου χρη-
60 σίω ὑπόστασιν ἔχοντος· κινδυνὸν ὅτι χαλῶσθαι τὸν ἄνθρωπον, καὶ πολλὰ
πράγματα ὀφθαλμοῖς.

malè legeba-
tur ἀποστασίων.

At verò qui ad crura descendunt abscellus in peripneumonia multum

periculosa, utiles quidem omnes: sed optimi demum illi qui purulento iam sputo pro flauo, abscedunt. Sin autem sputo non edito conuenienter, nec vrina hypostasim bonam habente; periculum est ne vel homo claudicet, vel multum facessat negotij.

lib. 6. Epid.
part. 2.

ILLA DEMVM vera est abscessuum omnium commendatio ad salutem, quando apparent & sunt αἱ δει, καὶ οἱ α, καὶ ὅτι, καὶ ὅτι, καὶ ὅτι δει, i. quemadmodum, qualiter, quò, quando, & quantum oportet. quarum circumstantiarum ratio in hac prognosi feliciter explicatur.

AT VERO] Distinctio est peripneumoniae sanabilis in abscessum cruralem migrantis, in quo tenenda est illa regula quae iam praescripta est.

QVI AD CRURA DESCENDVNT ABSCESSVS] Per metapneumonia, quam liberalis & libera sputi expurgatio non sanauit, nec biliosa deiectio, vrinae multa multi particeps sedimenti, ab ea tumorum, & superiorum, & inferiorum, inclinatione reuocauit: ipsa verò signis comitata spei plenius, medicum consolatur.

IN PERIPNEUMONIA MULTVM PERICVLOSA] Specie magis quam indiuiduo, cui salutaria signa salutariter suffragantur: quanquam periculo locus esset nisi dolorificum malum foras exirer, ac tum in pectore multi strepitus exaudirentur, vnde suffocatio in promptu esset.

VILES QVIDEM OMNES] Quoniam illi procul sunt deorsum perfectè, vt certè omnes fieri videantur, quemadmodum, quò, & quantum oportet. Ac primo aspectu recreare nos debent, non autem metu terrere sicut paratides quae sunt αἱ αῖρτοι, καὶ ἡ μύρτοι: proptereaque terrificae.

SED OPTIMI DEMVM ILLI] Ac si diceret; est quidem in cruris capacitate & loci intervallo, sperabilis ex peripneumonia salus, eoque facta metapneumoniae periculi locum tollit: sed tamen si sine incommodo partis excipientis fiat ille abscessus, ac nihil capiat detrimenti, optimus iure dicitur.

QVI PURVLENTO IAM SPVTO PRO FLAVO ABSCEDVNT] Purulentum dixit sputum, πύρρως, non πύον, i. quod à pepasino factum est πέπον, ac mitificatum est. Sic enim coquendo pituita & bilis puriformes euadunt, & ὁππότες praecptori dicuntur. Purulento sic sputo abscessus & decubitus facti in crura, praeter commoditatem capicis loci, remotissimi à morbo & visceribus, laudantur à materia. Abuentium namque pepasmi, opportuni & critici omnes.

SIN AVTEM SPVTO NON EDITO CONVENIENTER] i. Non cocto: sed retinente cruditatem & feritatem propriam humoris biliosi.

NEC VRINA HYPOSTASIN BONAM HABENTE] Vt cruditas vniuersi ad cruditatem accedat partis afflictae.

PERICVLVM EST NE VEL HOMO CLAUDICET, VEL MULTVM FACESSAT NEGOTII] Ea namque materia in articulum defluens, intraque eum collecta, cur distendendo & proritando, molestiae plurimum exhibeat, arbitrò requiri à nemine qui ratiocinari sciat. Tanta autem putredo saepe est, vt ligamentum corrumpat: vnde claudicatio immedicabilis. Nec erit mirandum si qui sunt quibus membrum ipsum totum computrescat, gangranam concipiat, sitque extirpandum: quale fatum eos manebat in pestilentia, quorum in membra defluebat, non abitura in pus, sed aliam quandam in putredinem, materia. Cruda, nec cocta, vt in malos abscessus conuertantur, primus liber ὁ δὲ παλαιός docuit esse necesse.

lib. 3. Epid.

26 Ἡν δὲ παλινδρομέωσιν αἱ ἀποστασεις, πυρετὸς ὀρθακολουδοῦντος, καὶ πύελος μὴ χωρέοντος· κίνδυνος δὲ θανάτου, καὶ ὀρθαφρονήσου.

Sin autem recurrant abscessus, & febris consecutaria sit, nec sputum foras exeat; hinc mortis & delirij metus adfertur.

QUEMADMODVM in spe angusta salutis, naturae contentio tanta est vt mortis periculo defungatur, sicut in angina & peripneumonia iam vidimus: sic etiam saepe fiducia curationis debilitatur ex palindrome seu recurso. Sanè in angina, cum strangulatio fortis, saeuique doloris cruciatus & orthopnea, citae mortis venturae causas in promptu esse testentur; desperatio vertitur in spem, si erysipelas in ceruice & sterno per metapneumonia exortu, laryngis dolorem minuat, vnaque liberiores faciat spirationem. Eadem spes rursus desperationis habet successionem, si erysipelas intro reuersum, peripneumonia faciat, vel anginae relapsum. Est igitur operae precium πῶς παλαιὸς ὁππότες δεικνύει, i. prudentiae studium exercere, ac tanquam è specula futuras tempestates prauidere.

Ergo. SIN AVTEM RECVRRANT ABSCESSVS] i. Si à peripneumonia exorta paratides, vel abscessus crurales non suppurent nec fistulentur, nec villo modo exitum foras habeant; nec vacatione propria; nec deriuatione per diarrhoeam aut perirhoeam: sed intro cursum eò reflectant, velut possilimio, vnde venerunt; quod proprie dicitur παλινδρομέωσιν (quanquam & illud verbum reperio usurpatum pro recidina sine relapsu exacti iam morbi, vt in illo. ὁ δὲ παλαιὸς δεικνύει ὁππότες, παλινδρομέωσιν αἱ ἀποστασεις.

etiam. I. Hydrops qui medicina concessit, si quidem recurrat, desperatus.) Est igitur palindrome duplex, una reflexus, altera recidiva. Ac recidiva quidem, ut ceteras omittam causas; si morbi exacti supersint reliquiae, si causa morbifica perennis generatio sit, ut in hydrope per alienationem facultatis sanguificae, qualis est hydrops supra iam positus. Palindrome autem refluxus, quae & verè dicitur, & hic appositè scripta est; retractione & orgasmo perficitur. Ac retractionis quidem causa est, partis empyreuma superstes, cum amplitudine venarum & arteriarum, quae vi attractrice carnes ipsas praecedunt; lib. 1. *retractionis*: orgasmi autem, materiae exclusae feritas, quae temperamento & corruptione calida est, substantia tenuis, & qualitate acris; maximè verò si tum exoriatur abscessus cum adhuc flava expurgatio sit peripneumoniarum, necdum purulenta. Ibi palindrome est in metu. Ibi non raro vaneſcunt tumores immenſi; quod propriè *ἀφαιρῆν* vocat Hippocrates.

ET FEBRIS CONSECUTARIA SIT] i. Nouam systrophem ipsius pulmonis consequatur, quae, facta metaptosi humoris, & oborto abscessu, quieuerat: id enim significat *πυρετὸ ἀφαιρῆν τοῦ πνεύματος*. Consequitur autem febris, tanquam symptoma inseparabile systrophicae inflammationis quae nouam excitat peripneumoniam, concitato iterum rheumate in pulmones, ab humoris refluxu exitum non habentis. Est enim ratum illud; quod omnis anadrome ibi morbum facit ubi subsistit, casusque infert partis obsessae, humorisque morbifici proprios.

NEC SPUTUM FORAS EXEAT] Denegata scilicet anagoge rheumati concitato, ex quo in pulmonibus consistente, affurgit phlegmone peripneumonica: quod certè non fieret si liberalis & libera esset expurgatio, unde tensionis laxitas, spirationis libertas, febrisque remissio comparatur.

HINC MORTIS ET DELIRII METVS ADFERTVR] Mortis quidem, per suffocationem caloris vitalis; delirii autem, per propagationem humoris maligni & efferi, cerebrum occupantis, nec haemorrhagiam cientis. Inde phrenitis super peripneumonia nasci solet. Ac talis peripneumoniae crudelitas, eleganter his verbis describitur à præceptore. *Ἐβδομαῖοι καὶ ὀλιγημερότεροι θνήσκουσιν οἱ μέντοι καὶ τὸ πρὸς τὸν βλαβέντες οἱ δὲ ὑπὸ τῆς ὀρθοπνεύσεως, καὶ τῆς πέχους ἀποπνεύστες*. i. Septimum diem agentes, aut etiam celerius moriuntur; mente nonnulli laesa; nonnulli ab orthopnea & steriore suffocati: ut ratione utraque, fatalis ad interitum esse videatur, extinctione caloris & suffocatione ab orthopnea. Scire autem licet, quod omnis affectio per geminam palindromen perque metastasin nata, grauius infert malum quam primigenia. Quae cum ita sint; calamitosa est omnis palindrome, quam feritas malignaque facit cacochymia.

27 Οσοι δὲ τὸ περιπνευμονικῶν μὴ ἀνακαθάρθῃσαν ἐν τῇσι κρείσσιν ἡμέρησιν, ἀλλὰ ὀρακόμεναι διέφυγον τὰς τεσσαρεσκαίδεκα κίνδυνος ἐμπύους γινέσθαι.

Qui autem peripneumonici, diebus criticis non expurgati sunt, sed eos cum delirio exegerunt, tandem exactis quatuordecim morbi diebus, periculum est ne purulenti fiant.

Huius prognoseos demonstratio repetenda videtur ex illa iam posita & explicata, cuius verba haec sunt. iam verò dolorifica partium istarum mala quae non quiescunt nec expurgatione spuiti, nec sanguinis detractione, nec pharmacia, neque diata; in suppuratum vertuntur. Sed nobis ex officio incumbit appositè quaedam scribere ad ea quae diebus criticis incidunt epigenomena, loco τὸ ἐπιφαινόμενον peripneumoniarum priorum.

Coac. 19. huius cap.

Ergo. QVI AVTEM PERIPNEUMONICI] Qui sauis peripneumoniarum iam descriptae symptomatis exercentur, quae sunt; meteorismus in spirando, calida expiratio, dolor sub omoplata qui prorepit ad iugulum, pectoris grauitas, febris acuta, anxietas atque iactatio, delirium quoque ipsum.

NON EXPURGATI SUNT] i. Qui liberalem & liberam anacatharsin non habuerunt spuri flauo perfusi sanguine, in quo apparet morbificus humor, unde affurgit phyma pulmonis quod peripneumoniam facit, ex qua peripneumonici nominantur, & cuius expurgatio repletionem vacuet particularem, ac dolorificum malum foras educit.

DIEBUS CRITICIS] Itaque ut citò inciperit mitigari & expui: diebus autem criticis liberè & liberaliter expurgetur; ut scilicet illis diebus quibus natura cum morbo decertat, victoris naturae signa edantur per propria epiphænomena, nec vlla sit accessio τῆς ἐπιφαινομένης per propagationem causae morbificae, perque sympathiam nobilium partium sociarum & vicinarum. Singularis est autem criticorum dierum notatio in nomine principum siue κρείσσιν: quia dominatu & magisterio dierum criticorum, morbi omnes reguntur & exiguntur. Sunt autem pleuritidis & peripneumoniarum dies critici 3. 5. 7. 9. 11. 14. Huc spectant illae prognoses. At verò sputum in pleuritico; tertianum quidem ceptum mitigari & expui; citas facit discessionem morbi: serius autem, tardiores. Et, pleuritides autem biliosae simul & sanguineae; ut plurimum nono aut undecimo indicantur: ac ferè saluti concedunt. Et, sputum verò flauum, paucum permixtum sanguine, peripneumonici, inuente quidem morbo editum, salutare est; multumque confert: septimum verò diem agentis, aut pronectori, securitatis minus est. Ergo diebus criticis commoda sunt epiphænomena quae faciunt aut iuuant discessionem morbi; facessant epigenomena.

Sic lib. 1. *ἀφαιρῆν* alt. καὶ τὸ πρὸς τὸν βλαβέντες οἱ δὲ ὑπὸ τῆς ὀρθοπνεύσεως, καὶ τῆς πέχους ἀποπνεύστες. Coac. 7. huius cap. Coac. 9. huius cap. Coac. 16. huius cap.

SED EOS IN DELIRIO EXEGERVNT] Denegata scilicet anacatharsi, & irrita contentione naturæ quam præstat quiescere quàm aliquid frustra moliri. Ex ea enim molitione irrita, translatio fit ad caput, cuius repletio, paraphorica edit symptomata, si nulla sit hæmorrhagia ex prostratione calidorum vaporum & acrium. Παρενόψαις autem dixit appositè; non φρενιτικός: quoniam scitum est, quoddam pituitæ & bilis affectiones quæ cerebrum in sympathiam adducunt, non habent illud πόνος, i. perpetuum, quod in phrenitide esse solet, non in paracope, quam alibi scripsit in phrenitidem non raro transire, ut sæpe sympathia vertitur in idiopathiam. Est igitur illud notabile, quod in vacuitate propriorum & commodorum ἐπιφαυμένων, solent incidere πόνος mala: quemadmodum in hac videmus peripneumonia, quæ pro anacatharsi commoda criticorum dierum, paracopen edit terrificam.

TANDEM EXACTIS QUATUORDECIM MORBI DIEBUS] Ut vita supersit, validarum virium beneficio exacti sint quatuordecim morbi dies, intra quos pleuritici & peripneumonici morbo aut vita solent defungi: ut cæteri omnes qui acutorum morborum dominatu tenentur, quos docet præceptor intra quatuordecim dies indicari.

PERICVLVM EST NE PVVLENTI FIAINT] Causæ sunt explicatæ in commentario ad lib. 2. progn. 19. prognosin huius cap. Est autè suppuratio media quædam res inter sanationem, & desperatam salutem.

28 Τῶν πνευμονιῶν αἱ ἐκ πλευρικοῦ μεταστᾶσαι, ἢ ἐξ ἐξχῆς ὑποδύων ἀσφαλές ἐστι.

Peripneumonia pleuritidis succedanea; tutior est primigenia.

ILLA DEMVM successio morbi quæ, fractis iam viribus, ex maligna cacochymia ortum habet, grauissimum infert malum, ne dicam mortiferum. Sic enim statuit summus præceptor, cuius præceptum attulimus ex lib. πνευμον. Sed illud theorema potissimum lumen suum ostendit in metastasi pleuritidis in peripneumonia, & huius in phrenitidem. Ac de illa successione extant quæ idem scripsit hæc breuiaria. Ἐπὶ πνευμονίᾳ πνευμονίᾳ κακῇ. i. Pleuritide superueniens peripneumonia; mala. Et, Ἐπὶ πνευμονίᾳ φρενίτις κακῇ. i. Peripneumonia phrenitidem succedere; malo est: quoniam in utriusque morbi successione, metastasis fit humoris indomiti, efferi; fractis iam viribus à primigenio morbo; in partem nobiliorem, cuius afflictio calamitosior est quàm eius vnde per metastasin exorta successio est. Nemini enim dubium est quin pulmo sit costis nobilior, & cerebrum ipsum pulmone. Ac nemo inficias iuerit quin primigenij morbi materia sit mitior, quàm secundarij per metastasin nati, non per diadochen. Quinetiam credibile est, tolerabiliorem esse morbum qui validis venit viribus, quàm qui effertis. Quæ cum ita sint, legatur ita prognosin.

Τῶν πνευμονιῶν αἱ ἐκ πλευρικοῦ μεταστᾶσαι· χαλεπώτερά ἐστι ἐξ ἐξχῆς.

Peripneumonia pleuritidis succedanea; grauior est primigenia.

DE alterutrius autem morbi in alterum mutatione; rara est, imò nulla peripneumoniz in pleuritidem: huius autem frequens in illam: sicut Galenus annotauit comment. ad aph. 11. lib. 7. Est igitur corrigenda scriptura quæ legitur ad finem pagina primæ lib. 1. πνευμον.

29 Τῶν σωματίων τὰ γεγυµνασµένα ἢ πυκνά· διασόν δὲ τὸ πλευρικοῦ, καὶ πνευμονικῶν δὲ πολλῶν, τῶν ἀγυµνάτων.

Exercitata corpora & coacta, celerius à pleuritide & peripneumonia intereunt, quàm quæ in otio conflantur.

HACTENVS de malefica vi pleuritidis & peripneumoniz, in efficiente causa rheumatis concitati, & consistentis: nunc de suscipientis affectione dicendum. Ac primum ponatur hoc theorema. Quoties ad præparationem suscipientis causæ accedit vis magna efficientis, tum facilis morborum generatio est, difficilisque discessio. Sic tabidi omnes quorum vitiata conformatio perennitatem suscipit catarrhi è capite prolabantis; & facile corripuntur tabe, & difficulter exoluntur: sed medicorum opinione celerius moriuntur. Sic exercitata corpora & coacta, celerius intereunt quàm quæ in otio conflantur. Cuius prognosin veritas ita lucebit, si ad propositum theorema, tanquam ad Momii lucernam, examinetur.

EXERCITATA CORPORA] Non quidem exercitatione $\kappa\tau' \phi\upsilon\lambda\iota\varsigma$: sed ea quæ fit $\delta\iota\sigma\beta\iota\alpha\varsigma$, quæ & labore ipso, & continuatione, & repentina mutatione vnius in aliud genus laboris, naturæ molesta est; ac primum difficultatem magnam spirandi parit, quæ cernitur in spiratione sublimi; mox rheuma concitatum edit $\kappa\alpha\tau' \delta\iota\sigma\beta\iota\alpha\varsigma$ sanguinis æstuantis & orgasmum habentis, deinde $\kappa\alpha\tau' \epsilon\lambda\epsilon\gamma\gamma\iota\sigma\mu\epsilon\upsilon$ partium afflictarum, nempe thoracis atque pulmonum, idque per venas interiores, quarum vis maior est attrahendi quàm carnium, in corpore denso atque coacto.

ET COACTA] Cuiusmodi sunt lænia, glabra, & crassa, minimùm perspirabilia, quæque thoracis angustiam præ se ferunt. Vt enim amplificatio caloris nativi nectarisque viuifici, coniunctam ferè habet thoracis amplitudinem, nisi caput in vitio sit; unde vox plena editur atque sonora: sic frigidior temperatio cordis, angustiam secum adfert partium spirabilium. Ac tales naturæ sunt $\lambda\epsilon\iota\sigma\chi\epsilon\omega\pi\epsilon\varsigma$, i. cutis polia, $\lambda\epsilon\iota\sigma\chi\epsilon\omega\pi\epsilon\varsigma$, cutis alba, $\mu\epsilon\lambda\epsilon\iota\sigma\chi\epsilon\omega\pi\alpha\lambda\mu\omega\iota$, nigritum oculorum, $\mu\epsilon\lambda\alpha\iota\sigma\chi\epsilon\omega\pi\epsilon\varsigma$ i. $\delta\upsilon\sigma\chi\epsilon\omega\pi\epsilon\varsigma$, rectorum nigritumque capillorum, $\iota\sigma\chi\epsilon\omega\pi\epsilon\varsigma$, acutè vocales, $\delta\epsilon\gamma\gamma\iota\sigma\mu\epsilon\upsilon$, iracundæ, sicut Hippocrates tradidit.

CELERIUS A PLEURITIDE ET PERIPNEUMONIA INTEREUNT] Magnitudine morborum in causa: quoniam eius naturæ nō sunt congeneres, nec vnquā sua sponte venirent à sanguine multa bile perfuso, nisi vis inferretur ab exercitatione immōdica & violenta. Nam acidum eructantes, $\tau\alpha\tau\omicron$ pleuritide infestantur. Intereunt etiam symptomatū vehementia. Nā & spiratio difficillima est, & sæui dolores, & febris acuta, & tussis molesta; vt interim raceā $\epsilon\kappa \delta\iota\sigma\beta\iota\alpha\varsigma$, quorū numerosa productio esse solet in vacuitate cōmodorum $\epsilon\kappa\theta\epsilon\alpha\iota\sigma\mu\epsilon\upsilon\omicron\upsilon$, vt mox diceretur. Postremò talibus naturis ferè ad interitum fatalis est peripneumonia & pleuritis, difficultate ipsa curandi. Nam in iis ferè sicca est peripneumonia, sicca item pleuritis & sputi expers, nec facile cieri potest commoda expurgatio: quia nō explicatæ sunt $\alpha\lambda\alpha$ pulmonum, in contumaci materia & thoracis infirmitate. Huc accedit quòd neque diæta, neque sanguinis detractione, nec pharmacia cathartica & anacathartica, tam conuenienter, & loco, & iure oppugnari possunt pleuritis & peripneumonia crassorum natura hominum, quàm ipsorum gracilium. Nec verò tanta esse possunt naturæ & artis officia quæ faciant aut iuuent discessionem eorum morborum in crassis, quàm in gracilibus: vt verum illud esse videatur quod scripsit. $Q\upsilon\alpha$ natura sunt crasse, celerius ($\epsilon\tau$ fato $\epsilon\tau$ casu) moriuntur, quàm graciles.

QVAM QVÆ IN OTIO CONFLICTANTVR] Aut certè in exercitatione $\kappa\tau' \phi\upsilon\lambda\iota\varsigma$, cuiusmodi est deambulatio quæ nullam infert dyspnœam. Est enim dyspnœa frequens & parua in crassis, nimium exercitatis, periculosa, quæque non facile in iis exoluitur; tum propter vaporis fumidi abundantiam, tum propter meatuum spirabilium angustiam; tum quia $\delta\epsilon\delta\iota\sigma\chi\epsilon\omega\pi\epsilon\varsigma$, i. vix perspirabile est corpus eorum, quod intus foras quicquam expirare non sinit, nec exudare. Est autem in expiratione corporis perspirabilis atque meabilis, magna opportunitas exoluendæ pleuritidis & peripneumoniz. Sit igitur illud rarum; quòd sanabilior est pleuritis quæ cum otio & facili spiratione cadit in crassos, quàm cum exercitatione violenta quæ infert spirationem sublimem, & spirabiles partes fatigat & labefactat, cum fumidi vaporis abundantia in corpore minimùm perspirabili.

30 Κορύζας ἢ παρμύδας τοῖσι περὶ τὸ πνέμονα νεσθήμασι, ἢ περιπνευμονίᾳ, καὶ ἐπιπνευμονίᾳ. πονηρόν· ἀλλ' ἐν τοῖσιν ἄλλοις νεσθήμασι τοῖσι θανάτωδεσάτοισιν, ἢ πάλιν λυσιτελέοισι.

Coryzas & sternutamenta in morbis pulmonum præcessisse, aut consequi; calamitosum: in aliis verò morbis maximè exitialibus; adiumentum adferunt sternutamenta.

60 VT CORPORIS temperamentum, complexio, & conformatio, $\epsilon\upsilon\pi\alpha\iota\sigma\tau\epsilon\varsigma$ ἢ $\delta\upsilon\sigma\kappa\alpha\iota\sigma\tau\epsilon\varsigma$ præ se ferunt excipiendorum morborum vel arcendorum, eadēque facilitatem in promptu habent, aut difficultatem & contumaciam exoluendorum: sic in natura existunt peculiare quædam affectiones, quarum ope aut vitio, vel grauiorum malorum secuta est, vel iis multum & periculose obnoxia. Sic quartanary magno morbo non corripiuntur: quòd si correpti fuerint, superueniente quartana liberantur. Contrà homines $\pi\epsilon\pi\epsilon\iota\sigma\tau\epsilon\varsigma$ à destillatione ferina, & facilius tabem concipiunt, & sanescunt difficilius quàm cæteri. Ne longam faciam; theorematum propositi veritas, in hac prognōsi lumen suum ostendet hoc modo.

CORYZAS] Ac si diceret; superiore prognōsi patefacta est facultas aut difficultas posita in temperamento, complexione, & conformatione excipiendi pleuritidem & exoluendi: nunc de affectionibus inritis vel aduentitiis, quæ idem faciunt, differendum. Ergo. CORYZAS] i. Catarrhos & ferinas destillationes è capite prolabentes, quæ homines tussiculosos faciunt atque raucos, quas fundit caput repletum; vel à tempestate austriua quam excipit aquilonia; vel ab vsu vini generosi & vaporosi; vel à perennitate vaporum quæ posita est in contraria temperie partium nobilium & humorum, videlicet iecoris æstu incandescentis cum sanguinis orgasmo, & capitis densi atque coacti minimùmque perspirabilis. Sic enim visum est priscis medicis magistris; quòd illæ demum naturæ valetudinariæ sunt per catarrhos, quarum partes nobiles temperie constāt dissimili, nec consociali. Consilium autem fuit,

6. Epid.
part. 2.

coryzae nomen Graecum usurpare, & nomine catarrhi explicare (non autem grauedinis, quae tamen propriè dicitur de coryza) ex perspicientia τῆς ἀφροδίας nostri authoris, qua duce, verborum aucupia sectari debemus. Etenim non me latet coryzam dici propriè humorem illum tenuem crudumque qui per nares exprimitur: sicut Galenus annotauit in prognostico ad hanc prognosin ex praeceptoris doctrinae, qui grauedinosos ait raro fieri lienosos. Hippocratis verba haec sunt. *Ἦσαν τις ἀπὸ κεφαλῆς καρυδάσων. i. Rarius is qui sunt è capite grauedinosi.* Quem locum enarrans Galenus, Rufi & Sabini autoritate adductus, ideo grauedinem, lienosis materiam & occasionem ait præripere, quòd ea sanguinem faciat puriorem, cuius impuritate lien tumescit, ex cuius tumoris inueteratione homines lienosi dicuntur. Sed quorsum grauedo pleuriticum damnis auget? immo leuat potius deriuatione catarrhi per nares. Quòd me adducit etiam theorema illud Galeni quod posuit ad demonstrationem symptomatum *ἀσυστάτων*, lienis praetumidi, & capitis grauedinosi. Est autem huiusmodi. *Παύ γὰρ ἐστὶ ἀσύντων ἐν ὅλῳ τῇ σάρματι, δύο τὰ μέρη ἀσύντων ἐστὶν ἐν αὐτῇ. i. Pervarò sit in vniuerso corpore vt dua certa partes, pariter similiterque infirmæ sint.* Est quidem grauedo symptoma catarrhoicum cerebri humorem tenuem exprimentis. Sed tamen ea expressio nihil de pectore, nihil de pulmonibus malè meretur. Consultò igitur nomen coryzae, non grauedinis usurpandum, & catarrhi nomine vertendum putauit.

ET STERNUTAMENTA] Quae sunt fortissimae & sonorae concussiones cerebri studentis excutere quod sibi molestum est, fiuntque calefacto & proritato cerebro, vel humectata parte ipsius inani.

IN MORBIS PULMONVM] Asthmate, peripneumonia, phthoe.

PRÆCESSISSE] Vt in iis qui exacto vere in tussi, necdum secuta aestate, finem tussendi fecissent; tabidi iacuerunt, cum spe salutis angusta.

VEL CONSEQUI] Ex fumido vapore pulmonis & cordis, caput replente; ex qua repletione symptomata oriuntur quibusdam cephalalgica, paraphorica nonnullis, cataphorica & comatosa mixta: quemadmodum & his catarrhoica, vnde pulmo & caput mutuò se afficiunt, mutuasque tradunt operas in aegri perniciem; ille quidem, caput replendo; hoc verò, perennem catarrhum fundendo & opprimendo.

CALAMITOSVM] Siue pestiferum: quoniam concussione fortissima sternutamenti, lacerantur pulmones & inflantur, vnde noua trahendi & absorbendi occasio: deinde à perenni prolapsu catarrhi replentur; vnde symptomatum graniorum accessio; sputi anacatharsis nulla, certè aut inanis atque inutilis, quia spuendo nihil proficiunt aegri, nec sputa dolorem sedant, proptereaque praua. Est igitur pestifera vis catarrhi & sternutamenti, omnibus qui ex pulmone laborant: quoniam accessio sit causae morbosae, & partis obsessae maior infirmitas comparatur; illa quidem à catarrho; haec autem à sternutamento.

IN ALIIS AVTEM MORBIS] Vniuersi corporis & partium singularum; vt in febribus cum pepasmo; in apoplexia, paralyti, paraplegia, epilepsia, lethargo, & comate tum vigili, tum veterioso: quinetiam in δυστοκίᾳ siue partu difficili, & puerperiorum suppressione.

ADIVMENTVM ADFERVNT STERNUTAMENTA] Hic enim natura potens est causae morbosae, quam concutiendo excutit; sed ea temerè cienda non sunt, nec antequam purgationi & vacuationi operam dederis, atque quodammodo mitigari coeperit humor, maximè in cerebri symptomatis cataphoricis & catarrhoicis. Nam & conuulsio paraplegiam sanat. Est autem salutaris mutatio conuulsionis in concussionem, vt paroxysmi epileptici in sternutamentum quod in concutiendo ceteros omnes concussiuos motus praecedit, qui cernuntur in rigore, singultu, & tussi. Ac sternutamenti tam fortis est concussio, vt mulieres hystericas velut ex faucibus Orci ereptas restituat, bonique signi & causae rationem obrineat, parturientes à difficili partu expediat, reliquias puerperiorum excludat, quae ὑστερα Graeci vocant. Atque in iis primo quoque tempore sternutamentum παραμικτὴν ciere oportet, ac spiritum cohibere, vt fortior concussio sit, apprimendo nares & ora.

31 Τοῖσι πεπνυμονικοῖσιν, οἷσι γλῶσσαι πᾶσα λεβήκη καὶ τρήχῆα γίνεαι· ἀμφοτέρω φλεγμαίνε τὰ μέρη τῆ πνύμονος. οἷσι δὲ τὸ ἥμισυ ἐν κατ' ὃ φαίνεται. καὶ οἷσι μὲν πρὸς πλεῖν μίαν κληίδα ὁ πόνος γίνεαι· ἢ δύο πτέρυγες τῆ πνύμονος ἢ μία νοσέει. οἷσι δὲ πρὸς ἀμφω τὰς κληίδας ὁ πόνος γίνεαι· αἱ δὲ δύο πτέρυγες τῆ πνύμονος ἀμφω νοσέουσιν. οἷσι δὲ καὶ μέσση πλεῖν πλυρυν· ἢ μέσση. οἷσι δὲ πρὸς πλεῖν διάτασιν· ἢ κατὰ πλεῖν. οἷσι δὲ τὸ πᾶν ἐν μέρει πονέει· πᾶν τὰ καὶ τῆ τῆ το μέρους νοσέει. Ἦν μὲν οὖν σφόδρα φλεγμαίνωσιν αἱ αἰσούται, ὥστε πρὸς καθεύδαι πρὸς τὸ πλυρυν· ὥρα- 60 λύνονται τὰ καὶ τῆ τῆ το μέρους ἐ σώματος, καὶ πελιδνία; πρὸς πλεῖν ἔξω πλυρυν γίνεαι· τῆ τοις δὲ ἐκάλειον. ὁ δὲ χαῖοι βλήνους. ὡς δὲ μὴ σφό-

δρα φλεγμαίν-

ἡ φλεγμῶν ὥστε μὴ θεωρεῖσθαι ἀληθῶν μὲν γίνεσθαι ὥσ-
 10 λον, οὐ μὲν ὁραλύνει γὰρ, οὐδὲ πελώματα ἔχουσιν.

Quibus peripneumonicis tota lingua fit alba & aspera; pulmonis
 ambae partes inflammantur: quibus autem dimidia; tantum illa pars
 10 que spectatur: & quibus ad unam claviculam dolor est; una supera
 pulmonis ala agrotat: quibus autem ad ambas claviculas dolor urget;
 ambae supera pulmonis ala laborant: & quibus circa mediam costam;
 ibi & media; quibus autem circa septum transversum; infera quoque
 ibi: at verò quibus dimidia pars tota pulmonis obsessa est phlegmone;
 omnia quae adiacent ei parti laborant. Ergo si vehementer inflammen-
 tur aorta ut in latus incumbant; & corpus ea parte resolvitur, & costa
 20 exterior liuore tegitur, huiusmodi autem peripneumonicos prisci voca-
 bant syderatos: sin autem non praegrandis inflammatio sit, ut lateri non
 insidant aorta, tota quidem parte haec facit dolorem, non tamen resol-
 uuntur, nec habent liuores.

PRIMA EST medico ad bene scienterque medendum commedatio, ut primum notitiam habeat
 affectionis & partis afflictæ. Hanc autem notitiam ex hoc theoremate comparabit. Quemadmodum
 30 actio laesa, partiumque vicinarum & sociarum sympathia, partis affectæ certissimum est argumentum:
 sic laesionis species, affectionem ipsam cuiusmodi sit planè ostendit. Ac ne feramur extra oleas, ut in
 Græcorum proverbio est; peripneumoniæ quidem affectio, partisque affectæ ratio, supra non ita pri-
 dem posita est in inspiratione sublimi, expiratione calida, pectoris grauitate, scapularum dolore qui pro-
 prepit ad iugulum, febre, iactatione, delirio quoque ipso. Atque symptomata hæc omnia sunt affectionis
 ipsius & partis affectæ propria, i. inflammationis & pulmonis: ut dubitari non possit quin peripneu-
 monia sit, quando ea fiunt atque apparent. Sed quia pulmonis non una tantum est regio, partiumque
 circumiacentium, nec una peripneumoniæ idea sed multiplex, posita in humore morbifico, & natura,
 loco, atque situ partis obsessæ; tum quia peripneumoniæ non semper fit crisis per anacatharsin, sed fre-
 quens mutatio in empyema quod facit ἐμπύρις, quibus expurgandis si desit anacatharsis, vltio necessa-
 40 ria est; ut conuenienter & commodè medicina fiat, non solum καὶ ῥῆσις, sed καὶ πόσις; tenenda est regula
 quam in hac prognosi posuit summus præceptor ad comparandam diagnosin, & inde natam curandi
 rationem, & scopum ad vacationem humoris morbifici ac redintegrationem partis obsessæ.

Ergo. QUIBUS PERIPNEUMONICIS] Dum manet peripneumonia, cuius pathognomoni-
 ca paulò ante sunt posita, cum iis quæ sunt epigenomena per sympathiam partium sociarum & vicinarum.

TOTA LINGVA] Pars illa, sermone dædala & gustatus, quæ duabus expleta est partibus quas li-
 nea mediana coniungit: vtraque autem spongiosa, triplici contexta fibrarum genere, tenui membrana
 obducta quam accipit partim à gula, partim à gutture; quæque præter côm memorata signa, plurimum
 valet ad comparandam diagnosin & prognosin pleuritidis & peripneumoniæ: sicut in lingua fucata &
 bullata iam ostendimus ex lib. 3. καὶ τὸν τόπον.

Cosc. 5. & 6.
huius cap.

FIT ALBA] Vel potius rubra & flava, vel æruginosa, malis ægri rebus fucata; non quidem per
 50 metamorphosin, sed per sympathiam partium vicinarum & sociarum, i. pulmonum incendio conflagentium,
 idque per epigenesin seri prorepentis ab inflammata parte secundum membranam quæ à larynge ex-
 orta, linguæ obducitur. Consultò autem pro alba, rubram aut flavam legendum putavi: quoniam si
 lingua cit ὁμοχρῶς τῇσι πύρεσσις, i. concolor partium adiacentium; ipsa pulmonum πύρεσις in peripneumo-
 nia, non est alba, sed rubra & flava; de qua iam illud proditum est. sputum verò flavum paucò permixtum
 sanguine, peripneumonicis, ineunte quidem morbo editum; salutare. At qualis humor est πῦρ πύρεσσις, tali co-
 60 lore lingua fucatur. Nullam autè peripneumoniam agnoscit præceptor, nisi quam facit phlegmone sy-
 strophica ex rheumate concitato nata, sanguinis multa & effera bile perfusa. Qualia igitur sunt epiphæ-
 nomena in expurgatione: talia in colore apparent partium fucatarum. Sed epiphænomonon in expur-
 gatione, flavum est paucò perfusum sanguine. Quò sit ut coloratio linguæ sit flava & rubra: quoniam
 peripneumonica epiphænomena lucent in lingua, sicut in sputo.

Cosc. 16.
huius cap.

ET ASPERA] Glandularum salivam effundentium, venarum hypoglottidum, tunicaeque gut-
 turalis linguam vestientis nimia siccitate: quia pulmonibus velut incendio conflagentibus exaruerunt,
 iuxta illud. Lingua & voces pariter una exasperantur. Ut autem coloratio signum est linguæ suffusa: sic
 asperitas resiccata & ab exhausto laborantis. Ac primum percipitur visu & tactu πρηνύα, i. rigidiuscula;
 inde πρηλωμένη, i. exasperata; postremò πρηγνύα, i. huiusmodi: non secus atque huiusmodi pinguis terra quæ

lib. 2. Epid.

solibus perusta exaruit atq; diuulsa est. Nec verò tam graue est linguam fucari, quàm exasperari: modò nigra non fiat, inter quam & fuliginosam hoc interest, quòd illa semper sit comes asperitatis; hæc verò læuitatis & æqualitatis.

PVLMONIS. AMBÆ PARTES.] Quibus expletur pulmo, totusque absoluitur; dextra scilicet atque sinistra, mediana quadam linea intersepta, duabúsque fibris velut alis instructa, ac tribus intertextæ vasis; antè quidem, arteria venosa; post, vena arteriosa; inter quas media decurrit arteria aspera: omnibus in totum pulmonem ramosè distributis vsque ad ipsius tunicam à subcostali ortam, nervulosque à sexta cerebri coniugatione sortitam.

INFLAMMANTVR.] Phlegmone quidem systrophica, quæ dicitur phyma pulmonis, quod facit rheuma in vtramque pulmonis partem, pariter æqualiterque concitatum, ibique consistens: vnde significatio sit necessariz in vtroque brachio phlebotomiz, ad retractionem rheumatis cõcitari, & ad consistentis detractionem, dum manet phyma pulmonis crudum, nec liberam habet nec liberalem anacatharsin: quod si in empyema vertatur, nec expurgatione propria vacuetur, nec etiam diarrhœa, nec perirrhœa; nec item exoriantur parotides, nec abscessus crurales: sed rupta intus vomica suffocatio circa citò arcenda sit, vt certè citò arceri debet; parte vtraque thoracis vstio adhibenda, modò supera, modò infera, vel inter has media, pro vario situ doloris, vt mox dicitur.

QVIBVS AVTEM DIMIDIA.] Pars alterutra linguæ quam diximus esse geminam, duabúsque expletam partibus: sicut ceteræ omnes quæ facultatum ministræ sunt, morus, procreationis, & sensus; nam principatus viuifici non sunt diuisi, vt cor & hepar.

TANTVM ILLA PARS QVÆ SPECTATVR.] Pars scilicet illa pulmonis quæ iacet è directo alterutrius partis linguæ fucata & aspera: non enim fucatur, nec exasperatur linguæ pars è diuerso inflammari pulmonis; vt admirabile illud sit quod sit κατ' ἑξῆς, ex impulsu naturæ, humoris motu, & partium afflictarum loco & situ. Est enim consensaneum vt omnia per metaptosin & epigenesin, fiat κατ' ἑξῆς, nihil ἀνάπαλιν. Scitum est illud. *Hæmorrhagia quæ sit ἀνάπαλιν, i. è diuerso; praua est: vt in liene magno è dextris. Quæ igitur sunt κατ' ἑξῆς, fortem naturæ contentionem denunciant, cui morem gerunt meatus & humor: quæ verò ἀνάπαλιν, orgasmū cacoehymiz venenata, & qualitatis malignæ, cuius magisterio regitur ipsa natura. Ergo verè dictum est, quòd linguæ pars altera spectat in illam partem inflammari pulmonis vnde ipsa fucatur & exasperatur. Est autem inflammationis proprium; colore turpi fœdere, & perurendo atque siccando, partium vicinarum & sociarum æqualitatem vitare. Sed tamen ea fuit opinio eius qui scripsit librum de locis in homine, vt peripneumonia dicatur, lateris vtriusque inflammatio; pleuritis verò, tantum alterius. Verum descripta in hac prognosi, partibusque suis distincta peripneumonia, Hippocratem sapit veriùs, quàm liber ille. Est enim consentanea doctrinæ prognostici, quam nemo nisi amens negarit esse Hippocratis summi medicinæ dictatoris.*

ET QVIBVS AD VNAM CLAVICVLAM DOLOR EST.] Ad illud os tortuosum & inæquale, omoplatam cum sternò alligans, quod iugulum appellatur; cuius dolorem firmiter fixum, in supera pleuritide annotauit præceptor. De quo idem scripsit hoc breuiarium. *Doloris acerbitas, paulisper ad iugulum fixa, si ad superiora vertatur; mortiferum adfert malum.* Hic enim trāsitus sit peripneumoniz in phrenitidem, si dolor paulisper ad iugulum fixus, repente ad caput vertatur atq; vaneſcat ἀσπυρτος ὁ κριπτός è iugulo, nouumque incidat symptoma paraphoricum. Exoritur autem hic dolor per inflammationem propriam, & sympathiam vicinæ membranæ, partiumque circumiacentiū oppressionem. Aprior autem fuerit appellatio πῆς ὀδυνης, quàm πόνου: quoniam concitati & consistentis sanguinis, omnino signum est ipsa doloris grauitas, quam nimia intulit abundantia. Sed crebrò sit sensio atque perceptio πόνου, per sympathiam continuarum inflammationi partium, sine vlla sanguinis collectione, ac sine affluxu: quemadmodum Galeno visum comment. ad lib. 2. πῶς ὀξείων. Hic autem non fit eiusmodi πόνος, sed βασίς: quoniam in peripneumonia dolor iuguli, dolorificum malum ibi, non alibi subesse testatur.

VNA SUPERA PVLMONIS ALA EGROTAT.] Ergo non omnis peripneumoniz symptoma, est iuguli grauitas & oppressio: sed eius tantum quæ adiacet iugulo; adiacet autem superarum alarum phlegmone systrophica, non mediarum, nec inferarum. Tot enim fuerunt alæ parte vtraque pulmonis dum vixit Hippocrates atque Galenus, vt mox dicitur. Cuiusmodi autē sint alæ, paucis aperiam. Est quidem pulmo instrumentum spirabile & vocale. Est igitur sic efformatum à Deo, vt respirationi & exufflationi commodè morem gerat. Ac respirationi morem gerit securus motum thoracis ad inspirandum & expirandum, tumescendo & residendo: exufflationi verò, materiam vocalem excipiendo, quam exprimit fortis contentio intercostalium musculorum. Ergo vt follis cuiusdam instar, spiritu, quem ducendo viuimus, citò & affatim repleatur; fumidòque vaporì pariter viam muniatur ad expirandum & efflandum; necessarìò ipsum constare oportuit carne molli & spongiosa, quam, ne collaberetur atque fatisceret (quoniam longa est via thoracis à iugulo ad diaphragma, quò vsque producit pulmo vtraque parte thoracis) Deus in tres lobos vtraque parte dinisit, & ligamento firmauit. Et quia hi lobi, alarum more, dilatantur, facillè explicantur & colliguntur; ideo per metaphoram alæ dicuntur. Nam & Hippocrates scripsit *ὁ ξανθὸς τὸν βράχυν*, quem oxymelitis vsus dilatauit & explicauit.

QVIBVS AVTEM AD AMBAS CLAVICVLAS DOLOR VRGET.] A tensione valida, & intemperie forti tunicz, pulmoni, clauiculisque intextæ; cuius tensionis & proritationis signum est doloris acerbitas.

AMBÆ SUPERÆ PVLMONIS ALÆ LABORANT.] Ab inflammatione systrophica quam facit rheuma consistens sanguinis multa bile perfusi, cuius concitatio facta est per orgasmum è dextro sinu cordis, per venam arteriosam, ramosè vtrique alæ superæ, totique adeo pulmoni distributam.

ET QVI-

Coac. 2. cap.
13. lib. 2.

lib. 2. acut.
Coac. 76.
1. lib.

lib. 3. acut.

ET QUIBUS CIRCA MEDIAM COSTAM] Quæ sexta est è duodecim.

IBI ET MEDIA] Quoniam anadrome sanguinis ibi dolorem facit, ubi subsistit: subsistit autem ad mediam pulmonis alam quæ adiacet mediæ costæ; vel quia sanguis est crassior; vel copiosior. Nam superarum alarum phlegmone; ut alterutrius tenuitatem: sic utriusque copiam cum tenuitate ostendit. Vbi autem grauitas, ibi & morbus.

QUIBUS AUTEM CIRCA SEPTVM TRANSVERSVM] Diaphragma, quod à colloca-

tione & situ, *διὰ τὴν* nominauit: quemadmodum alibi *διὰ πρὸς τὴν καὶ τὴν*.

INFERA QVOQVE IBI] Quæ attingit diaphragma, quod obliquo ductu extimas oras cingit notharum costarum. Notabile est autem, inferam pulmonis alam hîc recenseri præter eas quas iam recensuit; videlicet superam atque mediam: ut parte vtraque pulmonis, mediastino distincta, tres alas constituere videatur: quamuis hoc sæculo binæ tantum vtraque parte appareant. Sed priscorum hominum thoracis amplitudo maior fuit ex amplificatione caloris viuifici, & capitis magnitudine. Tum erant in pectore septem ossa quæ nunc tria videntur.

AT VERO QUIBUS DIMIDIA PARS TOTA PVLMONIS OBSESSA EST PHLEGMONE, OMNIA, QUÆ ADIACENT EI PARTI, LABORANT] Pariter similiterque ut in aliis iam supra posuimus.

ERGO SI VEHEMENTER INFLAMMENTVR AORTÆ] *Αορτῆς, αορτῆς αἱ, αορτῆς δὲ, αορτῆς αἱ*: pulmonum bronchia; quæ sunt cartilaginosa propagines ab arteria aspera in totum pulmonem distributæ: ut illi, alioqui spongioso & molli, firmamento essent. Pollux in secundo. *Ὁ δὲ βρόγχος τῆ κοιλίας περιέχων, εἰς πνεύματα πύων, τὴν γλῶττιν & τὴν κοιλίαν περιεσφίγγει. ἐν ἑρρίξεται ὅ ἐστι μέση πνεύματι, τῇ μὲν χεῖρὶ ἐπὶ τοῖς λοβῶν ἑκατέρωθεν εἰς τὴν κοιλίαν περιεσφίγγει, τῇ δὲ χεῖρὶ ἐπὶ τῶν στήθεσιν. ἔχεται γὰρ εἰς πλείους ἀποφύσεις, αἱ καλοῦνται σπείρες π, & βρόγχος, καὶ αἰσθηταί. i. At verò bronchus præpositus gulæ, in pulmonem tendens, linguae ac ipsi gulæ adherescit: radices agit in totum pulmonem, partim in posticos lobos qui dorso incubant, partimque in eos qui sterno subiiciuntur: sanè enim in varias & multiplices propagines agitatur quæ appellantur tubi, bronchia, aortæ. Quibus verbis explicantur illa lib. de locis in homine. *Αορτῆς* (sic enim Iones efferunt) *αἱ* *ἀνέχουσαι τὴν πνεύματα καὶ τὸ ἑρρίξαι, i. quæ continent pulmonem & guttur. Nec aliud erat quod Galenus voluit in dictionario Hippocratico, τὸ ἀπὸ πρὸς τῆς ἀρτηρίας πνεύματος μέρος ἀναχέουσαι, i. pulmonis pars utrinque ab arteria deducta. Neque verò non idem illud; pulmonis substantiam, præter id quod carnosum est, persimile spongiæ, confluere ex triplici; arteria venosa, vena arteriosa, & arteria aspera. lib. 3. & 6. de usu part. Hæc enim illa est quam arteriam absolutè dixit ἐν γλῶττι, ut erat in usu primum: sed eam asperitatem postea ab reliquis separauit; cum esset omnibus inditum nomen vel *ἀεὶ τὸ αἶμα τρεῖν*, quod est *aërem ducere*, vel *ἀεὶ τὸ αἶμα*, i. *collere*, cuius præteritum perfectum in tertia persona habet *ἄρται*, vnde & per pleonasmum *αορτῆ* vel *αορτῆς*. Nā in plusquamperfecto Homerus vsurpauit *ἄρται*. Hoc eò dico quòd verisimile videatur, ut si arteriis omnibus sit commune nomen aorta; ei profectò κατ' ἐξοχὴν tribuatur, quæ ipsum sic possedit arteriarum. Est autem aspera, quam diffundi in pulmonem scimus: cui quæ dicantur medicamenta dicta sunt iccirco *ἀρτημαχά*. Sic quia arteria aspera βρόγχος vel βρόγχος vocabatur, eius quoque propagines, βρόγχος vel βρόγχος appellata. Quò fit ut cum nominis prærogatiuā dederò propaginibus istis, eius postea usum concedam ei quam in pulmonem cor transmittit arteriarum. Eam Aristoteles *νευροειδέσιν* cum dixit: tamen æquè nervosam esse nō putauit atque aspera arteria est: sed venis in eo prætulit, quibus cum longè duriorum dissecta cadauera obtineant, nuncupata est *αορτῆ*: quod Græcis conceptaculum quidem omne, sed vaginam præsertim sonat; quam ipsa arteria, ut figura, sic duritate refert: hinc *παχὴ, μεγάλη*, pulsatis nervus, Arabum doctoribus arteria audax.**

ERGO SI VEHEMENTER INFLAMMENTVR AORTÆ, UT IN LATVS INCUMBANT] i. Costis adherescant, hoc est, si inflammatio pulmonem intus extraque ita occupet ut vniuersum peruadat, donec membranam inuadat costas succingentem, cum qua exudantis per summum ardorem sanguinis concretionem conglutinetur. Ab æstu sanguinis inde magis inflammari pulmones incipiunt, ubi sunt maxima eius conceptacula in quibus, quasi in lebere, feruet. Diffunduntur autem per pulmones medios: ut non nisi ardentissima inflammatio attingat superficiem eorum extimam, quæ aortarum ductus oculis ad videndum exhibet, & manibus ad contrectandum.

ET CORPVS EA PARTE RESOLVITVR] i. Spirandi vis in thorace exoluitur: impeditis à pulmonum adhæsa intercostalibus musculis, quorum id officium fuit.

ET COSTA EXTERIOR LIVORE TEGITVR] Qui color est subtilissimi sanguinis, cuius natium calorem inextinguibilis feruor extinxit. Nam crassior inde nigrescit. Est porro nigro proximus lividus.

HOS PRISCI VOCABANT ICTOS] *Βλητοί, ὅς ἐστι βλήναι, i. iciri; ἀσπολήνεις, de celo tactos*, dinina virgula ictos: qualis eorum à morte color quos fulgor absumpsit: qualis vitium, quas gelu rigentes adhuc, summo mane, intempestiuus Solis radius nulla ne leuissima quidem aura commoto aëre, præcepit: dictum vitium *σπαχίσιμος*, carbunculatio, Gazæ radicatio apud Theophrastum quinto de causis. De quo vide II. cap. 1. huius lib. & lib. 3. de morbis per initia. Sed iis quæ leguntur part. 33. & 34. de dicta acut. nulla verba accommodatiora sunt (loquitur autem de pleuritis quos importuna priscorum exhibitio suffocat *ὑπὸ πύων καὶ ὀδυνῶν, i. stertore & spiratione sublimi*) *μάλα τὸ ὄντως εἰ ἀρχαῖοι βλητοί ἐσμεν, &c. i. Hos maxime antiqui ictos opinabantur, eam ob causam præsertim (i. propter celeritatem interitus): sed etiam quia mortuorum costæ livide conspiciuntur, velut diuerberatorum. Ab his eorum quæ subiiciuntur perceptio est, ex proportionem causæ ad effectus, καὶ ἡ τὸν ἐμῶν ductα.*

32. Ἡν δὲ ἅπας ὁ πνέμων φλεγμὴν μὲν τῆς καρδίας, ὥστε καὶ προσ-
οεῖν πρὸς τὴν πληρὴν· ὥραλύεται πας ὁ νοσέων, καὶ κείται ψυχρὸς ὁ νοσέων
ἀναμάθης· θνήσκει δὲ δευτέρῳς ἢ τεταῖρος. Ἡν δὲ καὶ χωρὶς τῆς καρδίας συμ-
βῇ, καὶ ἥσων· πλείονα χρόνον ζῶσιν· ἐνίοι δὲ καὶ διασωζόνται.

*Quod si totus pulmo inflammetur cum corde, ut in latus procidat, re-
solvitur totus ager, iacetque frigidus, & sensus expers: moritur autem
secundum aut tertium diem agens. Sin autem sine corde contigerit, id-
que minus; serius vitam finiunt, & quidam evadunt.*

PARTIVM officialium quæ distinguuntur sepro quodam, vel mediana linea, propterea que sunt
geminæ; ut omnes ministræ morus, procreationis, & sensus; raliū, inquam, partium grauior & pec-
culosior est, vtriusque in officio laborantis aut eo carentis, quàm alterutrius; dextræ videlicet, aut fini-
stræ afflictio. Sic apoplexiæ, totius cerebri vitio; quàm paralyseos, alterutrius partis, grauior offēssio esse
solet. Atq; ut in paralyfi paralyticus manet superstes, superstitē adhuc respiratione quæ cordis voto re-
pondeat; in apoplexia autem forti quæ totum prohibet spiritus commearum, cita mors venit: sicro-
lērabilis est illa pulmonis alterutrius phlegmone, quæ parti oppositæ libertatem non adimit qua morē
gerit thoraci ad inspirandum, expirandum, & efflādum. Intolerabilis autem est illa quæ totum obsider,
& summam infert contumaciā inspirationis, expirationis, & efflationis. Hinc meteorismus primū in
respirādo, mox orthopnœa, indeque apnœa mortifera. Quod si ad grauissimum illud malum totius in-
flammati pulmonis; accesserit quoque inflammatio cordis obfessi; quæ salus vitæ sperabilis esse potest
certē nulla. Est enim magna pulmonis & cordis sympathia & syntimoria, in locietate, vicinia, & spira-
bilis atque vocalis materiæ commearu. Hic sanē in summa principatus offēssione, pars illa consocialis
cordi grauius multūque laborat, cuius officio vitam ipsam carere non potis est, & cuius vitio ipse
principatus vitæ collabatur.

Ergo. QVOD SI TOTVS PVLMO INFLAMMETVR] Pariter similiterque pars dextra at-
que sinistra, phlegmone sit obfessa; idque tribus vtriusque dimidiæ alis, supera, media, & infera; vnde
non solum tota lingua fit rubra & aspera: sed etiam thoracis omnia quæ illis adiacent partibus inflam-
matis, æquē laborāt; videlicet iugulum vtrumque, media vtrinque costa, & regio vtraq; septi trāuersi.

CVM CORDE] Viscere nobilissimo, quod naturaliter ipsum per se micat; fontēque habet na-
tīui caloris, nectarisque viuifici: vnde partium omnium solidarum, spirituumque fluxa viuacitas recrea-
tur atque reficitur. Id autem pulmonum fibris ira circumuoluitur, ut iis quasi sepulchrum esse videatur.

VT IN LATVS PROCIDAT] Distentis nimium ab inflammatione aortis, prætumidisque to-
to pulmone, & varicosis venis; vnde laryngis ima, & circumiacentium laterum tota regio ab oppres-
sione, venarūque micantium appulsu laborat.

RESOLVITVR TOTVS ÆGER] Eadem ratione qua superiore prognosi demonstratum est
corpus ea parte resolui, qua vehementer inflammantur aortæ, ut in latus procidant, & qua exterior
costa liuore fucatur. Id autem fit per eam speciem apoplexiæ in qua spiritus vitalis aditu prohibetur ad
cerebrum; & per oppressionem neruorum, à phymate partium adiacentium: non autem per epigene-
sin causæ in cerebro firmiter fixæ, quæ libertatem meandi adimit spiritui animali. Talis est torpor ne-
phriticorum è directo renis afflictī. Talis eorum quibus ex anadrome lumborum ad caput, manus tor-
pescunt. Hæc autem resolutio vniuersalis, respirationem adimit, propterea que vitam tollit.

IACETQVE FRIGIDVS] Recreatione caloris natiui ab inflammatione foris intrō, & impedi-
to eius appulsu ab oppilatione aortarum: ut interim taceam faciem, citāque τέρμασι vitalis caloris, p
ex qua partium extimarum frigus, ferē coniunctum habet liuorem cum in propinquo mors est.

ET SENSVS EXPERS] Tum quia impeditur facultas sensifica, intercepto spiritu animali; tum
quia refrigeratæ, penēque dixerim, extinctæ partes sensificæ; facultatis iam multū languentis, & in
officio laborantis non sunt capaces.

MORITVR AVTEM] Per extinctionem & suffocationem caloris viuifici, sublata respiratione
per resolutionem siue paralyfin vniuersalem; & exhausto fonte spiritus animalis, ex paupertate vitalis.

SECVDVM AVT TERTIVM DIEM AGENS] Quoniam in peracuto morbo celeritas
morus cum principatu vitæ collapsio; celeritatem quoque interitus mutationem infert.

SIN AVTEM SINE CORDE CONTIGERIT] i. Si pulmonum inflammatio systrophica,
nullam ex corde mali accessionem habeat, maneatque æger cum signis inflammati totius vtrinque pul-
monis, sine vlla palpitatione & syncope.

IDQVE MINVS] Ut summa nō sint omnia inflammati pulmonis, quæ cernuntur in magnitudine
& vehementia symptomatum παρρηγομενῶν & ὀπρηγομενῶν.

ET SERIVS VITAM FINIVNT] i. Ad decimumquartum diem protrahitur vitæ discessio.

ET QVIDAM EVADVNT] Quibus apparent signa epiphænomena quæ faciunt discessionem
morbi in

aph. 65. 4.
part. 8. lib. 2.
κει ἀγμῶν.

part. 5. sect. 1.
6. Epid.
Cosc. 4. cap.
et lib. 2.

morbi in expurgatione propria, per spiriti anacatharsin; aut in laudabili quodā abscessu, vel etiā laudabili suppurato: presertim si cetera signa salutariter suffragentur, quæ paulo antè sunt tradita & explicata.

Coac. 21. &
23. huius cap.

Τοῖσι ἐμπύοις γινόμενοι, μάλιστα ἢ ἐκ πλευριτικοῦ ἢ περιπνευμονικοῦ, δέρμα ὡρακολουθοῦσι, πλὴν μὲν ἡμέρην λεπτὰ, πλὴν δὲ νύκτα σκωδονώτῃται, καὶ πύοισιν ἐδὲν ἄξιον λόγου, ἰδρῶσί τ' ὡδε τράχηλον καὶ κλῖδα, καὶ τὸ μὲν ὀφθαλμοῖς κοιλαίνονται, τὰς δὲ γνάθους ἐρβύδονται, χερσὶν ἢ δερμαίνονται τὸν δακτύλοις ἄκροις, ἢ τρηχύνονται, χυποῦνται ἢ οὐχας, ἢ κατὰ ψυχῶναι, ὡδε τ' τὸν πόδας ἐπάρματα ἐχθροῖν, ἢ καὶ τὸ σῶμα φλυκταίνεσθαι, ὅτων τ' ἀφίσταται. Τὰ μὲν οὖν χρονίζοντα τ' ἐμπυμάτων ἔχει τὰδε σημεῖα.

At verò purulenti qui ex pleuritide aut peripneumonia huiusmodi sunt, febres habent interdii leues, de nocte fortiores, ac nihil expiunt, commemorabile, sudant circa collum & ingulum, cauantur oculi, male rubent, manuum verò extimi calent digiti, & exasperantur, ungues adunci sunt, pedes refrigerantur & tument, pustula toto erumpunt corpore, cibos iuvent faceffere: atque hac suppurati signa sunt inueterati.

morbi
nec spiritus sunt laudabiles

sic legendum

Sic sunt nota diuturni
orū suppuratiōnū

EST ILLUD iam positum, quod pleuritidis & peripneumoniz mutatio fit in suppuratum, si concessa fuerint ægris induciæ, nec antè perierint; ipsi verò prædicti morbi, nec anacatharsi, nec phlebotomia, nec pharmacia, nec diæta, curationem receperint: nunc suppurati quod verustate in tabem migravit, signa docentur.

AT VERO PURULENTI] Qui sunt eiusmodi, proprièq; dicuntur, quibus vel in vomica costarum, pus latet, siue pulmonum: vel ea rupta effusum pus in thoracem, ibi stabulatur, & fluctuat. Atque inter empyema & empyon hoc interest, quod empyematis nomen, omni cuiusque partis suppurato apponitur: empyi autem non nisi purulento à pleuritide & peripneumonia.

lib. 1. progn.
& aph. 44. 79

QUI EX PLEURITIDE AUT PERIPNEUMONIA EIVSMODI SUNT] Supernacatum hoc, satis erat dixisse ἐμπύοις: quemadmodum in prognostico dixit præceptor. Τοῖς δὲ ἐμπύοις γινόμενοι καὶ τῶνδε σημεῖοις. i. Empyicos omnes his oportet signis cognoscere. Ratio autem metapneumonicos peripneumoniz in suppuratum, non ita pridem explicata fuit in illa prognosi. Qui autem peripneumonicus, diebus criticis non expurgati sunt; sed eos cum delirio exegerunt: tandem exactis 14. morbi diebus, periculum est ne purulenti fiant. Idem quoque scriptum legitur lib. 1. ὡδε τὸν σῶμα.

Coac. 27. huius cap.

FEBRES HABENT] Ab horribus quibus creberrimum est empyema costarum atque pulmonum. Non enim sunt illæ febres natura horrifera: sicut inter continuas hæmorrhæas; intermittentium verò, quartana. Nec verò illi horrores veniunt ἀπὸ τῆς ἀγρίας, ut in febribus: sed ἀπὸ ἐκείων, ut in purulentis. Et verò Hippocrates horrorem posuit signiferum suppurati, quod fieri tum primum docuit cum pleuriticus ceperit perhorrescere, quod antè non fecit. Atqui de rigore & horrore illud præceptum est; nunquam sine febre cieri, propter afflictionem caloris vivifici cordis: atque ipsos cum frustra fiunt, ut ceteri hic fiunt, metastasio facere ad diaphragma & caput. Notabile autem quod ait, πλὴν δὲ νύκτα σκωδονώτῃται; ut alia sit febris ideæ, quam eius quæ fuit dum peripneumonia ipsa manebat.

lib. 2. progn.

lib. 1. cap. 100.

INTERDII LEVES] Tum propter lucis appulsus, quæ nativæ calori maximè est consociata; facitque ut suppurati feritas infringatur; unde non tam fortes, nec tam crebri horrores, faciliorque vaporis fumidi exspiratio, transpiratio, & efflatio: tum quia partes solidæ nativæ calore magis fruentur & recedantur; ut interim taceam cetera lucis commoda. Sic ischiadicis melius esse solet.

DE NOCTE FORTIORES] Tum quia frequentior est horrescendi & calefcendi vicissitudo; tum quia fumidus vapor non tam liberum habet exitum, quam interdii: maior est item puris vellicatis molestia & importunitas; nec interim omittendū quod in tenebris nocturno somni vacuitas, ipsa per se morbus est. Omnium autem phlegmonarum systrophicarum, indeque nascentium suppuratorum, graviores sunt morbi, appulsu tenebrarum, quam lucis. Nec verò libenter Galeno assentior proflentem purulentorum molestiam quæ nocturno augetur, non vitio noctis accidere: sed partium solidarum hæctica febre laborantium, unde à cibis sub noctem exhibitis, incandescunt caloris instar quæ incendium concipit aqua superfusa, & fumat. Quidni facit idem cibus diurnus? Sed interdii febris mirefcit. Ergo mirefcit à causâ diurna: sicut exacerbatur à causâ nocturna. Contrariè autem sunt causæ diei & noctis.

AC NIHIL EXPVNT COMMÉMORABILE] Idque nocturno potius quam interdii. Hinc prima mali labes quæ paroxysmos infert nocturnos. Tum enim fetura est symptomatum quæ vocant

βρωμυρα, cum cessant propria cuiusque morbi epiphænomena, nec dolorificum malum foras exit. Hæc labes miseris ad insanabilem tabem deducit. Denegatæ autem anacatharticos puris, causæ in promptu sunt; materis contumacia, tunica dēfita pulmonum circumtexta, alarum collapsarum oppres-
sio; & imbecilla nimis concussio in rursuendo: quoniam lacerata sunt infirma.

SUDANT CIRCA COLLVM ET IVGVLM] Quæ sudandi ratio dicitur ephidrosis, quam alibi demonstravimus fieri; incunet quidem morbo, ab oppressione: sicut eo affecto, ab exolutione par-
tium solidarum, quæ succum alibilem sibi assimilare non possunt, sed exudare sinunt. Hic autem causæ
variusque ratio locum habet. Nam illa quæ incessit frustra & crebro, tussendi cupiditas, materiam ex-
pectorabilem, vaporemque humidum eo trudit & sistit, ubi est focus morbi. Est autem ferè in superis
pulmonum alis quæ iugulo adiacent, vnde succus exprimitur & exudat: ut verum illud sit quod dici so-
let. *Vbi sudor inest, ibi nuncia morbum esse.* Cuius aphorismi veritas, cum alibi, tum hic potissimum lumen
suum ostendit. Ac de sudore posita sunt à nobis theotemata omnino catholica, quibus docetur, sudoris
triplicem esse causam; excretionem, expressionem, & exolutionem. Nam quod in prognostico scriptum
est, *ἰσφαις πῶτοι βρωμύρας*; non ad sudoris confertim prorupti abundantiam referri debet: sed ad suda-
tiunculam continenter exudentem.

CAVANTVR OCULI] Quia multum emacruerunt; emacruerunt autem cum tota facie cada-
verosa per exhaustum humidi primigenij, atque, ut ita dixerim, colliquamentum quod attulit febris
tabifica, cuius ardore partes liquuntur. Multum etiam facit nectaris viuisici defraudatio quæ venit à
paupertate sanguinis & cordis infirmitate. Sed illud colliquamentum, vnique defraudatio quotidiani
pabuli; primum apparet in oculis, qui ut molliores, liquuntur facilius quàm ceteræ faciei partes; tum
autem spiritus animalis multi participes in secunda valitudine; simulatque eo defraudari cœperint,
collabuntur.

MALÆ RUBENT] Ecce quod monstri simile est, cum ad extrema ventum est maciei; malæ rubet.
Atqui pars omnis pallefcit quæ multum emacruit; aut etiam cum primum cœpit macrescere: & contrò,
suaue rubet cum sit habitior. Sunt igitur *αὐχμηρ*, rubor & macies. Attramen hic ponuntur in eodem sub-
iecto, nec mirum: quoniam in secunda valitudine; pars omnis, vnde capit *εὐχμηρ*, inde suaue rubet: sicut
in aduersa inde pallefcit vnde contrahit cachexiam. Secus fit in morbis acutis atque tabificis, in quibus
per propagationem causæ morbificæ, partes quædam rubent, quæ paupertate alimenti sunt pallidæ: sic-
ut nonnullæ calent. quæ per *εὐχμηρ* caloris natiui, sunt glacie frigidiore. Iam verò malæ rubent: quo-
niam pulmonum anathymiasis tussiendo expressa, ibi subsistit propter angustiam venularum, maiorū
excipientiū quæ nō expirat. De faciei autē rubore critico & symptomatico, alibi multa scripsimus.

MANVVM VERO EXTIMI CALENT DIGITI] Calere hic digitos ait, non quidem calore
vitali & sanguine illustratos, quorum inopia sunt hic magis frigidiore: sed qui appulsu caloris fe-
brilis incandescunt æstu; tum etiam ab hecticæ febre firmiter ibi fixa, vnde magis ardent: quia multum
habent humoris parte interna. Est igitur idem *ὑπερμαρτυρ* quod *πυρετ*: sicut modò vidimus, idem *ὑπερ*
quod *πυρετ*; quanquam illud verbum *ὑπερμαρτυρ*, & nomen ipsum *ὑπερ*; secundum naturam dicuntur.
De nomine autem *ὑπερμαρτυρ*, pro calore natiuo; solennis est ille aphorismus. *Τὰ αὐτὰν ὁμαρτυρὰ καὶ ἐν τῷ
ὑπερμαρτυρ*. i. *Quæ increscunt corpora; plurimum habent caloris innati.*

ET EXASPERANTVR] Signum hoc syllogisticum hecticæ febris atque tabificæ: ut enim sua-
uitate vitalis principij, nectarisque viuisici partium solidarum viuacitas manet illæsa in corpore solido
& succi pleno: sic à febrili ardore pars vnaqueque, suo genio defraudata, tū paupertate succi alibilis, tum
spiritus appulsu tabifici; nō solum rigidiuscula fit siue *περὶ τὸν*; verum etiā siccitatis intentione, maiorem
concipit inæqualitatem, & exasperatur. Atque hoc documentum est phthisicos quam facit *ἡ*, per vi-
ceris edacitatem, febris corruptionem, & spirationem tabificam.

VNGVES ADVNCI FIVNT] Absumpta carne qua firmatur utrinque. Ut enim laxitas cum pal-
lore, inchoatam denunciat extenuationem: sic tensio absolutam. Scitum est illud. *Πᾶς νεκρὸς χαλὰ τὸ
ὑπερμαρτυρ*, *ἐν τῷ* *εὐχμηρ*. i. *Omnis extenuatio laxat cutem; tum deinde intendit.* Extenuationis autem perfectæ
signum iam posuit, digitorum asperitatem. Atque talis character vnguuium, sicut extenuatio ipsa, *ὑπερμαρτυρ*
nomen dedit, quod phthisicos causa est atque signum. Ac signum quidem, quia phthisici vnguui-
bus sunt, more cuiusdam feræ, vncinati; causa autem: quoniam pulmonum vlcera tam sunt edacia morte
ferarum, ut sanguinem totum è corde exhauriant.

PEDES REFRIGERANTVR ET TVMENT] Quia non habent *εὐχμηρ* febris hecticæ,
sicut manus & digiti; nec verò incandescunt æstu febrilis ardoris eo diffusi, quod longo intervallo se-
iuncti sint à foco suppurati, natura autem frigidi atque sicci, quia non ferè sunt ossa, nerui, membranz
& cartilagines, *ἡ* *αὐχμηρ* *περὶ τὸν* *αὐχμηρ*: ideo nunc ex euentu, frigidiore apparent; nectare viuisico de-
stituti. Eadem ferè ratio est tumorum qui assurgunt in pedibus ex peculiari eorum natura, collocatio-
ne, situ, & humoris morbifici dominatu, cum infirmitate summa, penèque dixerim, extinctione caloris
viuisici, cuius ne minima quidem portio prorepat ad pedes.

PYSTVLA TOTO ERVMPVNT CORPORE] Faciuntque corpus velut bullarum. Quales
enim sunt bullæ in humore ex eo circumfuso à spiritu flatulento; vel à calore: tales phlyctanz, phly-
ctenidia, phlyzacia, exanthemata, echymata (nihil enim refert quomodo dicantur) ex collectione icho-
rum venenatorum, corporis superficiem erodentium, vel amburentium; vnde *εὐχμηρ* *περὶ τὸν* *αὐχμηρ* *περὶ τὸν*
minantur. Ichores autē venenati colliguntur, vel *αὐχμηρ* *περὶ τὸν* *αὐχμηρ*, i. à spiritu & diæta; vel *αὐχμηρ* *περὶ τὸν* *αὐχμηρ*, i. à mor-
bidis causis, quæ vitio cuiusque nascuntur. Atque ichores extrinsecus veniunt à tempestate austina,
cum densis nimbis; & rapido æstu coniuncta. Sic enim de illa tempestate scriptum reliquit præceptor.

Coar. 17.
huius cap.

procr. 7. 1. 1.

aph. 3. 4.

6. Epid. part. 3.

procr. 31. 1. 1.

aph. 14. 6.

6. Epid. part. 3.

6. Epid. part. 3.

lib. 1. progn.

aph. 34. 7.

lib. 4. acut.

lib. 1. cap.

lib. 2. de nat.

T. 1. 1. 1.

Τῶν τούτων, inquit, ἐν τῷ δέρματι ἰχθῆρες· ἐκασταλαμῶνται δὲ διὰ δερματίτητος, ὥς κηλοῖται ἐν τοῖς αἵματι φλυκταινίδες ὁμοίως πο-
 10 εἰσὶν αἱ διαίσεις. i. Subnascebantur ichores, qui conclusi incallescant, & pruritum faciebant; deinde pustula exo-
 nebantur ambustus similes. Intrinsecus autem nascuntur ichores, ex visceribus malè moratis: quemadmo-
 dum hic ex pulmonum & capitis mutua syntimoria, cordis exhausti sympathia, suppressi puris contra-
 pctione, partium solidarum spiritu & sanguine, omnique calore viuifico defraudatarum. Nam denega-
 re anacatharticos mala hæc sunt. Si cui spuma salsa & tussis quiescent; iis rubet corpus velut exanthematis obfi-
 20 cium: sed ante interitum exasperantur. Carnium autem quæ suppurati vitio sunt, ut ita dicam, μωδῶσαι, i. mu-
 fide, facilis est ad ichorum collectionem, unde manant & exoriuntur phlyctænides, affectio. Sic enim
 præceptoris visum est ita scribenti. Πᾶν γὰρ τὸ ἀσύμφορον, ὡς τὸ δέρματι, ὡς τὸ σπέρμα καλὸν καὶ κακόν· καὶ οὕτως ἐστὶν. πληροῦνται
 δὲ, ὡς καὶ τὸ πνεῦμα. ἀδύνατον δὲ ἰχθῆρος. i. Quicquid est incohibile sub cutim, aut carnem; cauium est: repletur au-
 tem, sanum quidem, spiritu; morbidum autem ichore. Loquitur autem de interstitiis muscutorum quæ causa
 sunt, & ventres dicuntur. Atque si ventres illi cum musculis bene habeant natura & valetudinis cura,
 spiritu salubres replentur: sin autem morbidi sint, malo ichore. Cæterum ichores illi, qualitate sunt acres,
 temperamento calidi; proptereaque amburendo & erodendo idonei.

2. Epid. lib. 1.

Coac. 15. cap. 7. lib. 2.

lib. 2. cap. 7.

AC CIBOS IVBENT FACESSERE] Quia execrantur: quæ affectio, dicitur ἀποσπῆ. Fit autem,
 labefactata naturali œconomia per τὸν σπῆν vtriusque partis, ventriculi dico, & iecoris; unde ipsos tædet
 sui officij. Ac talem ἀποσπῆν, eiusque causam Hippocrates observavit in Pario, quem scribit, exactum ad
 morbum, fuisse ἀποσπῆν, & 120. die interiisse: qui tamen non erat purulentus. Sed alibi multa nos de
 ἀποσπῆν quæ in morbis omnibus, si quid aliud, gravissima esse solet: quanquam existunt aliæ causæ τῆς
 20 ἀποσπῆν, quæ non sunt insanabiles, ut hæc:

hist. 1. sect. 1. 3. Epid.

ATQUE HÆC SUPPURATI SIGNA SVNT INVETERATI] Causæ sunt explicatæ. Nunc
 aliorum signa examinemus, quæ in proxima continentur prognosi.

34 Τὰ δὲ βρῆμα ὡς ῥηγνύμενα, σημεῖα δα, τοῦτων ἔ τοῖσιν ἐπιγνο-
 μῶσι, καὶ τοῖσιν ἐν δερμὶ πόνοισιν· ἀμα δὲ καὶ ὡς δις πνοῶντος ῥηγνύται.

At verò quæ breui rumpuntur, significari, & iis quæ superueniunt,
 et iis quæ initio apparuerunt: simul autē, et si quid difficilius spiret ager.

et primis solo cibis

EMPYEMATIS inueterati signa explicata sunt, certè tam certa, ut firmiter illis credendum præ-
 ceperit summus dictator; quod sint eiusmodi, authore Galeno, tantæque vi prædita ad persuadendum,
 40 ὡς μετὰ τὴν ἀμφιβολίαν ἐκείνην ἀποδείκνυται. i. ut nullus omnino restet dubitandi locus. Nunc ineunda τὸν χρόνον eius
 quod statim, & continuo ruptum est. Eius autem ineundæ ratio, difficilior erit in quærendo, quàm in
 recensendo syllogistica signa: quæ omnia, superuenientium & apparentium nomine complexus est no-
 ster præceptor: ipsa verò quæ sint non posuit, præter vnum, ad finem prognoscens. Non idem illi consi-
 lium fuit superiore prognosi, quæ catalogum habet omnium signorum empyematis inueterati. Quæra-
 mus igitur, quando quærendi defatigatio turpis est, cum id quod quæritur pulcherrimum sit.

lib. 2. progn.

AT VERO QUÆ BREVI RUMPVNTVR] Nec tamdiu cunctando, vtramq; spiritus & nu-
 40 tricus œconomia labefactarūt, partibusque solidis λεπτυσμὸν & μδρασμὸν intulerūt. Breui autē rumpun-
 tur: quia phlegmone systrophica, breui conuersa est in suppuratum, quod medium esse diximus inter
 citam crisin, & desperatam salutem: nec tamen illud suppuratum in pulmone conceptum, liberalem
 habuit anacathartin. Quando autem rumpantur vomica pulmonum, ut breuissimè, & ut longissimè;
 mox infra ponetur. Cæterum ὁληρηγνύμενα vocat empyemata, quæ hic dicuntur σωτῆρος ῥηγνύμενα; ut rectè
 & consulto videat conuertisse, quæ breui rumpuntur: non tamen numerum singularem continuauit,
 quem loco pluralis vsurpauit superiore prognosi. Sed parua res est.

in prognosi.

SIGNIFICARI] Certò denunciari: signis quæ nullam relinquunt ἀμφιβολίαν: ut occasione nacta
 curandi, ratio instituat quæ foras exeat empyema; primum quidem, si potis est, anacathartica phar-
 50 macia: sin minus ad sectionem vel ad vitionem veniendum, sicut faciendum præcepit Hippocrates, id-
 que ἀσπῆν; ut idem docet alio loco ubi trium morborum curationem citò ineundam suadet; hydropis,
 secundo; empyematis, adurendo; & τραumatismὸν capitis, terebrando. In talibus enim, ipsa celeritas mora
 est, ipsa quoque dilatio periculosa. Sic autem ait. Ὑδατώδεις θάλασσιν ὅμοιον· φθινοῦται καὶ ἐν αὐτῇ· ὡς καὶ ἐν τῷ σπέρματι.
 60 αὐτῇ. Et quoniam empyema thoracis, non vno in loco stabulatur; ex triplici foco alterutrius partis
 pulmonum per alas distinetur, vel ex vno tantum, eoque partis alterius aut vniuersi, ut non ita pridem
 supra positum est, ne quis vrendo vel secando aberraret à scopo; iussit præceptor, linteam eretriadis terræ,
 calido diluto imbutum circumponi purulento thoraci, ut qua parte id primum resiccare cœperit, noua-
 cula aut pyratiscu adhibeatur. Interea resiccandū caput, præsertim si eoryzæ & sternutamenta præcesse-
 rint, aut cōsecuta fuerint in morbis pulmonū: ne dum vacuando puri das operā, catarrhi prolapsus ne-
 gotiū tibi exhibeat. Qua de re bis idem scripsit his verbis. Ἀρχὴν τὸν πνεῦμα τοῦ σπέρματος· ὡς καὶ ἐν τῷ σπέρματι.
 60 ὡς τὸ σπῆν. i. Primum incipito caput leuare, ne quid in pectus decidat. Et, ὡς καὶ ἐν τῷ σπέρματι, ὡς καὶ ἐν τῷ σπέρματι.
 Exsiccare caput, ne desillat. Omnia autē quæ illic posita sunt de vacuando pure, locū habet in empyemate
 statim factō & rupto, nō in eo quod in vetustate incidit, eaq; mala intulit quæ paulò antè sunt explicata.

lib. 1. cap. 7.

6. Epid. part. 7.

Coac. 11. huius cap.

lib. 2. cap. 7.

ET IIS QUÆ SUPERVENIUNT] Hic tria docentur signorum genera, quibus deducimur ad
 cognitionem & scientiam empyematis confestim facti & rupti. Ac primum genus nominavit eorum
 quæ inflammationi superueniunt, dum in pus mutatur, nec antè fuerunt, phlegmones pathognomonici.

ca; sed puri adiuncta sunt: quæ quia præceptor speciatim non posuit, contentus genere & ὁρμητικῶν
 stræ sunt partes ea veluti per præconem citare ab Hippocrate ad ipsum Hippocratem, tanquam ad ve-
 ritatis tribunal. Sed præstò sunt illa duo πυμύματα empyematis inchoari & facti, quæ diè vadimonij obi-
 re non recularunt. Sunt autem; rigor qui antè non fuit, dum inflammatio seu phlegmone systrophica,
 cruda maneret; & grauitas loco doloris. Hic enim rigor cietur, non quidem ἀπὸ τῆς ἀσθένειας, i. à cacochy-
 mia è valis expressa: sed à pure in vomica concepto, vt annotauit Galenus. Idem Galenus auctor est,
 phlegmonas omnes nobilium partium, nisi præliis digerantur, sed in suppuratum vertatur; horrorem
 ciere: quoniam nascentis puris acrimonia mordens vicina corpora, eodem planè modo ciet horrorem,
 quo acria medicamenta. Grauitas autem, doloris acerbi succedanea, signum est syllogisticum mutatæ
 phlegmones in suppuratum: quoniam suppurati non tanta est tensio, quàm phlegmones crudæ. Sed
 grauitas ibi manet: quoniam morbosus humor, velut in ergastulo quodam conclusus, foras non exit.
 Iam verò rupti continuò suppurati ratio ineunda ex celeritate confecti ab ineunte phlegmone. Nam
 cita puris confectio, citam quoq; habet rupturam: nisi aliò cursum inflectat, & per anacatharsin vacue-
 tur. Ac tum grauitatis & febris leuatio est: quod signum imprimis narrat Hippocrates puris in thora-
 cem effusi. Μία δὲ ῥήξις δακρύς ὕλης ἐστὶν ὅτι ἐκ στενωπέως εἰς τὴν ἐκτεταμένην ἦλθε τὸ πῦρ. Ἐπὶ πρῶτον δὲ ἀναπνεύσει, ἐπὶ δὲ
 ῥήξει τὸ πνεῦμα. i. Rupta vomica sanus esse videtur sibi ægrotus: quòd ex loci angustia, pur abijt in amplitudinem:
 ac spiritus quem spiramus, in pulmone sedem inuenit. Est igitur signum syllogisticū puris in thoracem effusi,
 & ruptæ pulmonum vomicæ; fugax leuatio grauitatis. Nam ea non multò pòst, longè percipitur gra-
 uior, & molestior: vt rectè Hippocrates obseruauit.

lib. 6. Epid.

lib. 1. progn.

lib. 1. vici
vici.Coac. 19. &
27. huius cap.

ET IIS QUÆ INITIO APPARVERUNT] Hic genus alterum ponit signorum phlegmo-
 nes in empyema mutatæ, quæ πνευμονία Græci vocant, Latini antecedentia. Sūt autem; peripneumonia
 iam descripta in sæuo dolorum cruciatu scapulæ atque iuguli, pectoris oppressione, meteorismo spi-
 ritus, & calida expiratione, febre continua, cum anxitudine quæ diebus criticis anacatharsin nullam ha-
 buit: sed eos cum delirio exegit ad decimumquartum vsque diem; eadèque nec phlebotomia quieuit,
 nec pharmacia, nec diaeta, nec parotide, nec abscessu crurali. Hæc demum signa sunt πνευμονία, quæ
 opinionem faciunt phlegmones affectantis viam ad empyema, si antè non fuerit ad mortem fatalis, nec
 ægrum intra decimumquartum diem ad exitum præcipitarit.

SIMVL AVTEM ET SI QUID DIFFICILIS SPIRET ÆGER] Hoc signi genus vide-
 tur ἀμφιδόξον antecedentis & consequentis. Est enim antecedens vomicæ iam iam rumpendæ: sicut re-
 perio traditum à præceptore qui ait. Προσγινάσκον ἀνάγκη ἐπὶ πύρεσι, & διπνοίαις, & πνευμονίᾳ πρὸς τὴν ἐκτεταμένην ῥήξιν. i. Ac-
 cedere necesse est dolorem, dyspnœa, & πρυελισμόν, ante puris eruptionem. Vbi Galenus super dyspnœa hæc scri-
 psit. Δυσπνοῖσι δὲ ἐπὶ ὅλῳ μὲν τῷ νοσήματι καὶ καταστροφῇ, ἐξαίρετος δὲ ἐστὶν ἡ πνευμονία ἐπὶ ὁδῶν. i. Difficiliter toto morbi
 decursu spirant: maximè verò vbi dolor accesserit. Sed non est firmiter fixa difficilis hæc spiratio: sicut ea quæ
 rupturam consequitur. Sic autem fit. Rupta vomica, ægro sibi melius esse videtur, vt suprà iam diximus:
 πνευμονίας δὲ ἔχοντα, τὰ σημεῖα πῦρ πληρύνεται, & βίχας, & πυρετὴν, & τὰ διὰ δυνάμειν πάντα μείζονα μέγιστα αὐτῶν. Ἐν ἑστέῃ δὲ ἡ δύναμις.
 i. Labentibus inde diebus pectora pure implentur, indeque iussus & febres, atque adeo cæteri omnes dolorū cruciatūs;
 ipsum magis lacescunt & opprimunt. Ac morbus ipse, tum maximè innotescit. Est igitur difficultas aucta spirandi,
 signum ἀμφιδόξον prægressæ rupturæ, aut iam iam futuræ. Ac prægressæ quidè; firmiter fixa & stabilis quæ
 vires acquirit cūdo: futuræ autem fugax & leuiter pressa ad exiguum tempus. Quod ipsum planè illud
 ostendit. Ἐν τῇ διπνοσίᾳ πῦρ ἥσσον, i. si aliquantulum, & aliquantisper, difficilius spiret æger.

lib. 1. vici
vici.

35 Ρήνυται δὲ τὰ πλεῖστα τῶν ἐμπυηματίων· τὰ μὲν εἰκοστῆ· τὰ δὲ
 τεσσαρεσξοστῆ· τὰ δὲ πρὸς τὰ ἐξήκοντα.

Plurima autem suppurationes rumpuntur, alia quidem vicenūm die-
 rum, alia verò quadraginta, nonnulla etiam sexaginta.

HIC SUMMA esse debet medico ad res ægri attentio. Nec vlla excusatio accipienda, si quid forte
 acciderit quod ab eo præuisum non fuerit. Est enim circa multum & præceps occasio in medendo. Sed
 tamen sic medicus & πνεύματι exercebit, vt eā præterire non sinat, hospite, quod aiunt, in salutato. Iudiciū
 adhibebit explosa fallaci experientia. Quod vnum arripiendæ occasionei cōmendat Hippocrates. Nec
 verò iudicii difficultatē petrimescet, quæ magna est, modò adhibeat tempus & diligentia ad consequen-
 dam πικρὸν dictatoris, qua bene iudicandi ratio comparatur. Ergo ne occasio medendi præcipiatur in
 suppurato & expurato, eius arripiendæ opportunitatem adferet dierum criticorum observatio, præter
 ea quæ modò sunt posita de empyematū peripneumoniarū natura & causis, vnde illa celerius aut serius
 gignuntur, & rupta vomica effunduntur, cum signis antecedentibus, adiunctis, & consequentibus, in-
 choaræ vomicæ factæ & ruptæ.

lib. 1. progn.
& Coac. 20.
huius cap.

PLURIMÆ AVTEM SUPPURATIONES] Plurimas eò dixit, quòd alia quædam sūt alte-
 rius generis, quæ non seruant legem dierum criticorum hīc præscriptorum: sed multò antè rumpuntur.
 Ac sanè tales edunt, qui, cum spūto bilioso, purulentum expurgant; diductūve id fuerit, aut permix-
 tum: ac ferè moriuntur, decimumquartum morbi diem agentes; maximèque ij qui septimo tale spūtum
 coeperint expurgare. Ergo. PLURIMÆ SUPPURATIONES] i. Cæteræ omnes: sicut præceptor
 scripsit in prognostico, αἱ δὲ διὰ δυνάμειν: quarum scilicet primigenia phlegmone, inoffenso cursu mo-
 tationem habuit humoris phlegmonici in empyema, nō in gangrænā, vita superstiti, & cum spe salutis.

RUMPUNTUR

RVMPONTVR] Et pus in thoracem, vomica rupta, effundunt, quod inde citò vacuari debet, scissione vel risione, si anacatharsis desit.

ALIE QUIDEM VIGINTI DIERVM] i. Vigesimo die à phlegmone systrophica pulmonis aut laterum, quam demonstratum est purulentam fieri, nisi intra decimumquartum diem coeperit expurgari. Nō enim verisimile est, vigesimo die rumpi ex quo pleuriticus aut peripneumonicus, in vacuitate anacatharses, gravior febricitavit, inchoato pure; inde perhorruit; mox loco doloris, gravitatem percipit pure confecto: quæ omnia ferè accidunt sub decimumquartum diem inflammationis pleuritice aut peripneumonice; si, cum eò ventum est, dolorificum malum foras exire spuendo non coeperit. Sic enim viginti dierum numerus produceretur ad 34. totius historię. Atque ita pus in vomica stabulando ea mala inferret quæ diximus in empyemate inueterato; vt nemo iam defungi posse, sed in omni empyemate, presenti periculo locus esse videretur. Quod falsum est. Nam multi euadunt, de quibus infra dicitur. Ergo nos duce Hippocrate, quem si sequamur, nunquam aberrabimus; vigesimum diem reuocandum statuimus ad primum historię totius morbi, vnde scilicet primum æger decubuit; eundemque ipsum diem vigesimum, septimum esse vel nonum à quo febris exacerbata est cum horrore, indeque percepta gravitas pro sæuo dolore: prout illa celerius, i. vndecimo; aut serius, i. decimoquarto, exoriūtur. Ac si quis ab horrore statim novos labores experiatur partium afflictarum, in increto rismo spirationis, in tussi & ptyelismo, idque continenter & fortiter; vomice ruptionē habebit, quoad longissima esse potest, intra septimum horrores diem: quibusdam enim fit eo celerius. Quod igitur celerius fit empyema; eò celerius quoque rumpitur. Nam celeritas in pure conficiendo, posita est in calore humoris & parris obsessæ: tarditas contra: quod spectant ægri vires, ætas, natura, regio, anni tempus atque tempestas. Atqui celeritas aut tarditas empyematis, celeritatem quoque aut tarditatem adfert ruptionis. Celeres quidem motus, celeres mutationes edunt.

ALIE VERO QVADRAGINTA] i. Dierum vigintiseptem ab horrifero empyemate, si exortū fuerit decimoquarto: vt exoriri solet cum intra illud tempus libera nō sit anacatharsis, aut nulla omnino sit. Quod si verum est, derogāda fides theoremati meo, vel aphorismo Hippocratis. Sed vtriusque veritas ita lucebit. Ac primum sic aphorismi. Quod quatuordecim dies, quibus in sputi vacuitate fit empyema; numerandi sunt, non ab historia pleuritidis aut peripneumonice adhuc mitis: sed ab incremento exacerbate; vt decimusquartus ab incremento, fit vigesimus ab historia totius morbi. Atq; ad eam legem examinandi sunt quatuordecim dies quibus iudicantur omnes morbi acuti. Sic igitur empyema fiet vigesimo die, post quem exolefcit vis acutorum morborum. Itaq; factum empyema vigesimo, non amplius naturam retinet morbi acuti: sed nomine tenus, huiusmodi esse dicitur *ἐκ μελαγχολίας*. Est enim metapneus peripneumonice in empyema. Cæterum vt acuti reapse morbi, duobus septenariis iudicantur infra vigesimum: sic tres vt minimum exigunt septenarios supra vigesimū, qui nomine tenus acuti sunt *ἐκ μελαγχολίας*. Atque illi tres septenarii, quadragesimo absoluuntur, quo empyema in thoracem effunditur, si per anacatharsin totum expurgatum non fuerit. Totum ideo dixi: quoniam Hippocrates author est; quod si quā celerimē phyma pulmonum coquatur, ac sursum pus viam affectet, totūque spuendo expurgatum fuerit, ipsaque vomica sit exhausta; inde salus vitæ comparatur. Quod si quid reliquiarum supersit, aut si noua subinde fluxio cooriatur in partem afflictam; semper periculo locum esse. Theorematis autem mei defensio in eo versatur, quod ex Hippocrate posui; non, antè pus è vomica erupturum, quā exorta fuerit noua quædā species doloris, tussis, dyspnœæ, cum ptyelismo: vt si hæc omnia simul non fiant, neque appareant; empyematis ruptura longius, & medici opinione serius protrahatur.

NONNULLIS ETIAM SEXAGINTA] Quibus non cadit ruptio in quadragesimū: quo exalto, sperabilis non est ante sexagesimum; vt neque alia crisis expectari debet post quadragesimum. Atq; id locum habet in omni conditione contraria celeritatis in motu & mutatione morborum, quam infert; in natura quidem, complexio & temperamentum frigidius; in ætate, senectus; in tempore, hyems; in tempestate, frigida pluuiosa, & aquilonia constitutio; in humore, crassities & contumacia. Eadem ratione tumores abdominis molles, ac doloris expertes; præsertim qui sub vmbilico sunt, etiam cum febre; nō ante sexagesimum diem in pus vertuntur: sicut nec hypochondriorū duri ac dolorifici, ante vigesimum. Ergo suppurati omnis ratio ineunda; tum ex humore morbifico; tum ex parte obsessæ. Plurimum valet etiam ad suppurandum ipsa curatio, quam medicus instituit quo iure quaque iniuria. Scitum est illud, si fouendo nihil profeceris ad ipsum dolorem sedandum, fouendi finem facito: *ἐν πνεύματι τοῦ πνεύματος τοῦ πνεύματος* lib. 2. acui: *ἐκ πνεύματος*. i. id enim pulmonem exsiccat, & suppuratum accersit.

36 Οἷσι μὲν οὖν ὁ πόνος ἐν δεξιῇ ἐγκέλει σιῶτονός, καὶ δὲ πνοία, καὶ βῆξις
μὲν πνευλισμοῦ. πρὸς τὰς εἰκοσιν, καὶ σιῶτομώτρων πρὸς δέχου ἢ πῆξιν.
60 οἷσι δὲ ἐλαφρότερον τὰ πάντα ὅτιν· ἐς ὑπερον καὶ λόγον.

Ergo quibus initio dolor est fixus & contumax, vnāque difficilis respiratio, ac tussis cum ptyelismo; ad vigesimum diem, eoque celerius, ruptionem expecta: quibus autem hæc leuiora, serius pro ratione.

VT EMPYEMATIS inchoati signa sunt; febris exacerbata, horror, & dolor prægrandis: perfecti autem, febris remissio atque doloris, sed horror increfcens, & grauitas pro cruciatu sæni doloris: ita eiusdem celerius aut ferius è vomica erupturi *πυμῆμα* sunt in hac prognosi posita, quæ *αἰσθητά* Græci vocant, Latini *antecedentia*.

ERG O] Vt scilicet prudentiam compares, atque prævideas quando empyema sit erupturum, & eo erupto remedia conuenienter ac loco adhibeas quæ pus exire faciant, nec sinant ipsum cunctando tabificum fieri.

QVIBVS] Empyicis pure adhuc concluso in vomica, & quod omni caret anacatharsi.

INITIO] Suppurati confecti, per metapneusin pleuritidis aut peripneumoniar.

Coac. 1. cap.
1. lib. 2.
lib. 3. progn.

DOLOR EST FORTIS ET CONTYMAX] Distenta multo pure, dum exitum quaerit, membrana & proritata. Nos autem consultò hîc, *ποῖον αἰσθητόν*, vertimus, *dolorem firmiter fixum et fortem*; exemplo adducti cephalalgia, vbi *πῶτον αἰσθητόν* esse dixit, quem in prognostico super eadem, *ὁ δὲ αἰσθητός* nominauit. Nam quod obiicitur; sæuos dolores inchoati puris, mîscere in confecto; sanè quidem in stabulando & residendo, vbi sensu grauitatis percipitur loco acerbi doloris. Secus fit in erumpendi contentione. Tum enim distentio membranae est maior, & proritatio item molestior.

Coac. 1. cap.
9. lib. 2.

VNAQUE DIFFICILIS RESPIRATIO] Eadem planè quæ cernitur in phlegmone systrophica, dum ipsa manet thoracis atque pulmonum, scilicet parua & frequens: vt ex hoc loco facilis perceptio sit illius prognoscens quam sic expressimus. *Respiratio parua et frequens, inflammatione et labore denunciat partium spirabilium*: vt inflammatio ad pleuritidem & ad peripneumoniam pertineat: labor autem ad empyema; præsertim verò cum ad eruptionem viam affectat.

AC TVSSIS] Ab irrita contentione & concussionem thoracis, quem ichor laceffit exudans ab empyemate.

CUM PTYELISMO] Quia tum empyicus finem sputandi non facit, laceffitus ab ichore cuius tenuitas, per densitatem circumtextæ membranae transmittitur & exudat.

AD VIGESIMUM DIEM] Ex quo laborauit prægrandi pleuritide, aut peripneumonia.

EOQUE CELERIVS] Ad decimumseptimum; si empyema celerius factum sit: vt saepe fit ob causas in superiore prognosi adductas.

RUPTIONEM EXPECTA] Non expurgationem puris quæ sursum fit spuendo. Nam empyema turgens, dum in tali ferocitate, foras exire nequit; & quia minùs coactum est, & membrana densior circumtexta pulmoni: quod reliquum est in tensione tam forti & *αἰσθητός* doloris, cum in angustio spes est & suffocatio in propinquo; naturæ fortis contentio ruptionem molitur qua pus effunditur, vnde laxitas atque doloris remissio.

QVIBVS AUTEM LEVIORA] *Ελαφρότερα* dixit per metonymiam afflicti pro afflictione.

SERIVS PRO RATIONE] i. Pro merito remissionum signorum ruptionem indicantium: vbi ad septénarios & ad vîcenarios dies criticos attendendum.

37. Λογίζεσθαι δὲ τὸν χρόνον ἀφ' οὗ παρὰ τὸν ἡλμισεν, ἢ ἐβαρύνθη, ἢ ἐπύρεξεν· εἰ ποτὲ ῥήγος ἐλάβε. παρὰ γίνεσθαι τὸ ἀνάγκη, καὶ πόνον, καὶ δίσπνοιαν, καὶ πτυελισμόν παρὰ τῆς ῥήξεως.

Sed ratio ineunda temporis à quo primum fuit saeuus dolor, aut grauitas, aut febris exacerbata; si forte tum rigor inuasit. Accedere autem necesse est dolorem, dyspnœam, et ptyelismum ante ruptionem.

lib. 1. cap.
2. lib. 3. progn.

VT A MOTU sit omnis mutatio: sic motus à tempore quo paroxysmi, periodi, & crises morborum suscipiuntur & sunt per decertationem naturæ & morbi. Solenne est illud. *Οἱ παρὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους*. i. *Pepasmi tempore sunt*. Et, *Febres iisdem numero diebus iudicantur, quibus homines intereunt aut exoluantur morbo*. Quæ cum ita sint.

RATIO INEVNDA TEMPORIS] Ad memoriam renocanda, & acri iudicio expédenda occasio temporis, qua motus & mutationis signa eduntur in omni certamine morbi & naturæ; idque cum aliàs, tum hîc potissimum, vbi comparanda est notitia empyematis, tum in vomica, tum in ruptione, simulatque mutatio illa sit, ne ipsa medendi occasio præripiatur, sed singulari iudicio arripiatur, quamuis admodum præceps & fugax.

lib. 4. 6. 2.

A QVO PRIMVM FVIT SÆVVS DOLOR] Noua species doloris oborta in puris pepasmo, quod dum conficitur, grauiora sunt omnia doloris & febris, quàm confecto: quia tum maior est membranae tensio & proritatio ab in temperie calida, & prægrandi sanguinis alterati, in parte inflammata sensus acerrimi. Non enim hæc sunt incunris peripneumoniar: sed iam empyematis metapneusin habentis.

AVT GRAVITAS] Facto puris pepasmo, & pure collecto quod breui circumscriptum est loco parium

partium circumiacentium, optima conspiratione ipsum pus undique propellentium. Illa enim de-
 mum est bona suppurati conditio, quod, ut brevissimè; sic acutissimè est collectum. Secus fit in phy-
 mate crudo, quod ut latissimè est diffusum: ita melioribus ægri rebus apparet, nec ita dolorificum est,
 nec ita corruptioni & gangræne obnoxium.

lib. 1. progn.
 & Coac. 8.
 cap. 11. lib. 1.

AVT FEBRIS EXACERBATA] Exacerbatur autem feruore sanguinis dum fit pepsimus, &
 doloris acerbitate.

SI FORTE TUM RIGOR INVASIT] Quod signum est ἀχρεῖαν empyematis inchoati atque
 confecti: ut non ita pridem ostendimus.

ACCEDERE AUTEM NECESSE EST DOLOREM, &c.] Ac si diceret; ut occasionem
 arripas in puncto, quod aiunt, empyematis è vomica erupturi; nouissima conferre oportet cum pri-
 mis: ut si perspectum habeas cum phlegmone in pus transierit, idque quàm citò aut serò; & ex perspi-
 cienza præuideris quando incidet ruptio empyematis; eam prognosin confirmabunt descripta hîc si-
 gna quæ sunt πικρὺν empyematis iamiam è vomica erupturi. Quæ sit autem ratio & causa horum si-
 gnorum, dictum est in superiore prognosi.

38 Οἷσι μὲν ἐν ὅτε πυρετὸς βύδεως ἀπογίνεται μὲν ἢ ῥῆξιν, καὶ κρίων
 ἐπιδυμέοισι, καὶ τὸ πῦον ἀνάγεται ῥηϊδίως, λευκὸν ἐόν, καὶ ἀοσμον, καὶ
 20 λείον, καὶ ὁμόχροον, καὶ ἀφλέγμαντον, κοιλίῃ τε σμικρὰ στυγεσμήνῳτα ὑπο-
 χωρεῖ· ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ σῶζονται στυλόμεως.

Quibus igitur & ipsa febris statim à ruptione discedit, & concupi-
 scunt cibos, ipsum uero pus educitur facile, album, nihil olens, laue &
 aquale, nec feruidum, atque tum alius pauca & figurata excernit; ij
 30 ferè confestim seruantur.

HACTENVS sancitæ sunt leges prædicendi empyematis inchoati atque confecti, quod in pleuri-
 tidem cadit & in peripneumoniam; siue id stabuletur in vomica; siue in spatium thoracis ruptionem
 molitur. Nunc vomica ruptæ, purisque in thoracem effusi, commoda & incommoda videamus.
 Enimvero commoda hæc sunt:

QVIBVS IGITVR] Vomica rupta empyicis, pure in thoracem effuso.

ET IPSA FEBRIS] Quam puris feruor accendit, & ipsa ruptionis in thoracem molitio.

STATIM A RUPTIONE DISCEDIT] Extincto febris foco, nec vlllo superstitute empyreuma-
 re, per vacuationem humoris morbifici in thoracem effusi, qui cum in vomica incanduisset æstu; nunc
 40 planè deferbuit, liberumque habet exitum per anacatharsin, ut mox dicitur. Ergo discedit febris εὐσί-
 μως καὶ εὐκρίτως: quæ propria & vera est febris discessio sine metu relapsus: quoniam empyema pus edi-
 dit in membrana collectum, non in viscere ipso diffusum: ut nulla suspicio sit exulcerati pulmonis ne-
 que corrupti. Qua de re illud præceptum est in empyemate hypochondrij. Suppuratorum, inquit, quæ
 sursum sunt; alia quidem in tunica stabulantur collecta; alia uero in visceribus ipsis diffusa. Huius autem colle-
 ctionis signa adferunt in pure descripto, non amurcoso. Huc accedit, quod rupta vomica magnam ægro
 leuationem adfert, quod ex loci angustia pus abiit in amplitudinem, ac spiritus quem spiramus, in pul-
 monibus, unde prius arcebat, sedem inuenit. Nec uero inde amplius metuenda est noua oppressio,
 cuius Hippocrates meminit: quia puris effusi non est longa in thorace mansio, sed cita expurgatio per
 liberam & liberalem anacatharsin, ut mox infra ponetur.

Coac. 7. cap.
 11. lib. 2.
 aph. 45. 7.

lib. 3. περὶ
 τῶν σπλν.

50 CONCVPISCUNT CIBOS] Quorum paulò antè summa fuit abominatio, ἀποσιτία, non qui-
 dem labefactata per νέκρωσιν alio; sicut iam vidimus in suppuratis vetustate tabificis (nam talis abomi-
 natio est planè mortifera & insanabilis:) sed à perenni affluxu ichoris maligni qui ab empyemate con-
 cluso exudabat, & perennitatem suam à febre habebat, unde liquitur caro recens pressa, & sanguis bi-
 lescent. Nunc ea dimissa, eodem planè modo, quæ prostrata erat appetentia excitatur: quod euenisse nar-
 rat præceptor iis qui febre laborabant τριτάρφῃ, de quibus ita scripsit. Ἐν δὲ χρεστὴν καὶ μέγιστον εἶδος ἡγομέ-
 ται σημεῖον, καὶ πλείους ἐρρύσσει το εἶδος ὅντων ὅτι πῶς μεγίστοις κινδυνώσι, οἷσιν ὅτι πῶς σπαραγμωδὲς ἐστὶν αὐτοῖς. i. Vtile vnum
 τῶν σημεῖων, καὶ πλείους ἐρρύσσει το εἶδος ὅντων ὅτι πῶς μεγίστοις κινδυνώσι, οἷσιν ὅτι πῶς σπαραγμωδὲς ἐστὶν αὐτοῖς. i. Vtile vnum
 maximūque eorum quæ accidebant signorum, quibus conuersio fiebat ad stranguriam. Et paulò post. Γεύματα
 πᾶσι εὐδὲς εἶναι. i. Cibos omnes suauiter gustabant. Suprà autem dixerat. Μέγιστον μὲν σημεῖον καὶ κάκιστον εἶδος πλεον
 ἐπιμένει πῶς πλείους, ἀποσιτίας εἶδος πᾶσι γυνάτω. i. Maximum deterrimūque signum plurimos circumuenit; ci-
 60 borum abominatio.

Coac. 13. huius
 cap.

lib. 2. περὶ
 ἀνθρῶν.

1. Epid. par. 2.

IPSUM VERO PVS] Rupta vomica in thoracem effusum.

EDVCITVR] i. Sursum expurgatur spuendo. Id enim significat verbum ἀνάγειν, unde nomen
 deducitur πῶς ἀναγωγῆς, quod usurpauit præceptor in illo aphorismo. Οἱ σπλν αἷμα ἀφρῶδες πῶσι· πυτῶσιν ἐκ
 τοῦ πνεύμονος ἢ ἀναγωγῇ γίνεται. i. Quicunque spumantem expuunt sanguinem; ius de pulmone sursum expurgatio fit.

aph. 13. 5.

FACILE] i. Citò, liberè, & liberaliter. Ac citò quidem, ne mora in vitio sit; liberè & ex facili, ne

dolor ex irrita concussione, cum tussis molestia, rheuma concitatum inferat in partem afflictam, & parti afflictæ noua inferatur afflictio; liberaliter autem, ne quid reliquiarum supersit purulentæ materiæ, vnde vel noua sit pulmonum oppressio ad interitum vsque fatalis, vel consecraria sit tabes mortifera.

ALBUM] Quod partis, vbi consecratum est, integritatem arguat.

NIHIL OLENS] Tantum abest vt sit fædi odoris: vnde significatur prædictæ partis integritas, & suppurabilis materiæ nulla putredo siue corruptio, ex dominatu caloris natiui, cuius virtute sit omnis pepasimus, maximèque in suppurato.

LEVE] Ex magisterio caloris viuacis atque viuifici, quo pariter æqualitèrque materia suppurabilis mitificatur.

ET ÆQVALE] Tum in substantia, tum in colore; ex quo significatur humoris ad suppurandum benignitas & obedientia. Est igitur æquale in substantia, quod nulla sui parte est crassius neque tenuius, in colore autem, quod expuendo non cernitur, exempli causa, bilioso, pituitoso, vel atro permixtum.

NEC FERVIDVM] Quia feruor eius, dimissa febre, deserbuit, nec vllum calorem edit in sputo, neque exhibet parti contactæ.

ATQVE TVM ALVVS PAVCA ET FIGVRATA EXCERNIT] Bene constituta naturali œconomia, in coquendo, distribuendo, & excernendo.

II FERE CONFESTIM SERVANTVR] Quia fruuntur commodis quibus vita hominum sustentatur; respiratione libera, & inculcata nutritione. Est autem perperam hîc scriptum, *ferè*, pro *certo*, aut *sine dubio*: sicut legitur in prognostico.

39 Οἷσι δὲ πυρετοὶ τὸ ὀφθαλμοῦ δοῦσι, καὶ δίψα, καὶ ἀποσιτία, καὶ τὸ πῦρον πέλιον, ἢ χλωρόν, ἢ φλεγματῶδες, κοιλίη τε ἐφυζαίνεσθαι τελευτῶσι.

Quibus autem veniunt inde febres, & sitis, & cibi fastidium, atque pus exit liuidum, aut viride, spumans & feruidum, aliisqueli- quida est; moriuntur.

QVA hic ponuntur signa, eiusmodi sunt, vt desperationem salutis ostendant.

QVIBVS AVTEM VENIUNT INDE FEBRES] i. Quæ ruptionem vomica consequuntur: quia pus effusum, quod prius erat in pulmone diffusum, horrorem ciēt, qui febrem accendit per afflictionem caloris natiui. Atque hîc frequens rigor, & consecraria febris, tabifica; vires iam multum infirmas, omnino reddunt efferas. Notum est illud. *Crebrò citatus rigor, nec febris discedens, ægro iam infirmo; lethalis.* Ac nihil naturæ grauius, quàm frequens rigendi & calefendi vicissitudo.

ET SITIS] Concepra in pulmonibus causa sirifera, quam febris efficit importunam.

ET CIBI FASTIDIVM] Ab ichore maligno qui prorepat in aluum, ciúsque virtutem coquendi & appetendi labefactat, vnde grauissimum infertur malum *τὸς ἀποσιτίας*, qualem in omni morbo agnouit Hippocrates, vt suprà tangebamus.

ATQVE PVS EXIT] Sed frustra, & naturæ immerito. Frustra enim malignæ cacoehymiz vacuatio fit, quam fouet nobilissimi visceris praua affectio. Ratum est illud; quod omnis excretio praua, signum est affectionis prauæ.

LIVIDVM] Liuioris qui cernitur in aliqua parte, vel in humore, duplex omnino causa est; *καυσία* *ἢ νέκρωσις*: hîc autem sputum liuet perfrigerata parte, perfrigeratur emortua; emoritur autem per extinctionem viuacitatis in vitali principio, & paupertatem vitalis caloris ab exhausto corde. Est autem hoc liuidum fædi odoris.

AVT VIRIDE] Nondum emortua parte, sed incendio conflagrante, & bile accensa. Nam quicquid æruginosum est, quod in prognostico dixit *χλωρόν καίεται*, vndecunque veniat; humoris vnde gignitur, & partis vnde manat, ardorem denunciat.

SPVMANS ET FERVIDVM] i. Bullatum & æstuosum. Est autem sic, obortis bullis in circumtenso humore, vi caloris contra naturam.

ALVVSQVE LIQVIDA EST] Quia rædet iam partes nutritias, natiuo calore & spiritu defraudatas, sui quamque officij: atque imprimis iecur in attrahendo, ventriculum in coquendo; vnde in summa infirmitate, noua subinde fit infirmitatis accessio.

MORIVNTVR] Collapsis omnibus naturæ præsidij, & sæuiente morbo; quæ salus vitæ restat sperabilis? mors in propinquo est: notæ sunt causæ interitus & salutis.

40 Οἷσι δὲ πὲρ μὲν ὀφθαλμοῦ δοῦσι, τὰ δὲ μὴ ἐκ τῶν περιεργημένων ὁ μὲν ἀποθνήσκεισιν ὁ δὲ ἐν πολλῷ χρόνῳ σώζονται.

Quibus

*Quibus autem signa quadam adsunt prædicta, quadam verò ab-
sunt; alij moriuntur; alij post longum tempus seruantur.*

MAGNA SÆPE incidit signorum controuersia, cùm alia medicum spe consolantur salutis, alia verò metu exterrant interitus. Ac tum difficillima est tecmarfews ineundæ ratio ad prædicendum certò quid euenturum sit. Sed ea sic ineunda ex doctrina Hippocratis. Ac primùm *πικμεία*, i. signa syllogistica, plus conferre ad *πικμύσις*, quàm πειρίστα, i. *verisimilia*. Deinde πειρῶσις, i. *quæ sunt eiusdem speciei*, & inter se consocialia, maiorem habere vim quàm ἐπιδόσις, i. *differtanea*, quæ sunt alterius speciei: præsertim cùm agitur de comparandâ cuiusque morbi notitia. Nam in prædicendo, sæpe non minùs iuuant discessionem vitæ aut morbi, quàm ipsa *πικμεία*; vt alui profluuium in laudabili, aut certè non mala anacatharsi. Postremò certa comparatur *πικμύσις*; ad vitæ quidem prælagium, si cum remissione *πικμύσις* appareant commoda epiphænomena, vt in pleuritide mitescence, sputum flauo permixtum, citò & copiosè editum; interitus autem, si pathognomonica signa prægrandia, nimis opprimendo accessionem adiungant eorum quæ à propagatione morbi epigenomena nominantur, indeque faciant epiphænomena praua quæ principatum obtrinent in prædicendo de morbis acutis; maximè verò praua. Nam bona, sæpe irrita sunt ex euentu, vt sputum laudabile quod dolorem non sedat, propter perennitatem rheumatis concitati. Sed vt ad praua redeam, quorum vis maior est quàm bonorum in eodem morbo ad præfensionem interitus aut salutis; prauorum calamitas potissimum cernitur in prægrandi peripneumonia quæ habuit phrenitidis accessionem, per epigenesin; tum epiphænomena editur praua in sputo, qualitate, copia, tempore, & expurgandi modo, quale pessimum edi potest. Sic in comate vigili cernuntur pathognomonica cerebri multum oppressi, ex pari magisterio pituitæ & bilis, vnde nascitur monstrum biceps quod *πυρομαρία* Græci vocant; inde per epigenesin dolor ceruicis atque lumborum: quoniam facilis est sympathia facilisque syntimoria *πικμύσις ἀρχὴν καὶ τὴν περικύπτωσις*; mox epiphænomenon sequitur mutaræ oppressionis in exolutione, sanguinis substillum è naribus, idque quarto die. An non hæc omnia ab eodem fonte nata, conspirant ad mortem? Sed in controuersia signorum hîc descriptorum, eius dirimendæ mea sic ratio est; vt si pessimum epiphænomenon sit inemendabile, cuiusmodi est liuidum pus à necrosi, cum accessione febris, & liquidæ alui; desperata sit omnino salus ægroti: quoniam ad mortiferam vim morbi, collapsis iam omnibus naturæ præfidiis, continenter accedit & crescit virium summa infirmitas. Quod si in tâta puris & febris calamitate, adhuc supersit æconomiz naturalis integritas, & firma vis partium nutritiarum; valet id quidem plurimum ad vsum atque dulcedinem diuturnioris vitæ: sed non ad spem certò retinendam salutis. Nam vitium illud contumax, tandem aliquando partes nutritias in contagionem adducet. Sin autem prauum pus domabile sit, vt spumans & feruidum, ac cætera mala remissiora, nec alius liquidæ; spes quidem affulgere, ac velut salutis quadam aura potest afflari. Est enim sperabilis ægri salus, post longum tempus triumphaturi de morbo.

41 Οἱ δὲ μέλλοντες ἔμπυοι γίνεσθαι, πύοισι περὶ τὸν μὲν ἀλμυρὸν,
40 εἴτα γλυκύτερον.

Qui futuri sunt purulenti, primùm quidem expuunt salsa, mox dulciora.

HOC THEOREMA non est catholicum, nec verum καὶ ὅτι ἔλεγε, sed καὶ ὑποθέσειν. Non enim peripneumoniæ omnis quæ empyematis metaprasin habet, falsum aut falsilaginosum est sputum. Sed si qua in peripneumonia tale sputum editum est, id simulatque dulcescere cœperit, empyema succedit. Ergo non omnis purulētus à sputo falsilaginoso, dulcius expurgare solet. Vt certè illa sputi falsi in dulce mutatio, non sit *πικμείων*, i. *signum syllogisticum* omnis empyematis in peripneumoniam, vel in pleuritidem incidentis. Nam sine illo signo, sæpe fit empyema. Nec verò semper commodo ægri falsum mutatur in dulce: quia præstaret falsum liberaliter expurgari, quàm in pus conuerti. Est enim melior anacatharsis, quàm empyema. Quod autem sputi dulcedo in malis ducenda sit, iam suprà positum est inter aduersa pleuriticorum signa. Et verò Hippocrates empyema scripsit fore annuum sputi dulcis; nisi ad quadragessimam diem vacuum fuerit.

Ergo. QVI FUTURI SUNT PURULENTI] A peripneumonia quæ in tumore consistit, à pituitæ falsæ prolapsu, & collectione exorto; ad cuius curationem, auspicandum præcipit à remediis caput siccantibus & repurgantibus; purulenti autem futuri sunt ex longa pituitæ mora in pulmōnibus, vnde nec citò, nec liberè, nec liberaliter expurgatur.

PRIMUM QUIDEM EXPVUNT SALSA] Expuunt autem serò, parca manu, & difficulter; atque illam falsilaginem facit pituitæ putredo, vel feri biliosi & pituitæ permixtio.

MOX DULCIORA] Sic enim à pepasmo salsa & amara dulcescant mirificata: sed frustra fit pepasmus ad empyema quod foras non exit. Propterea nuper voluit, parotidas non solum suppurari, sed etiam fistulari, i. fistulam edere rupta vomica pus effundente. Alioquin, denegato exitu, nouam inde pus

Coac. f. h. v. ius cap. lib. 3. mei r. ius.

cod. lib. 3. mei r. ius.

Coac. f. h. v. ius cap.

Coac. 15. cap.
7. lib. 2.

illud dulce concipit salilaginem, planè tabificam: de qua illud præceptum est. Si cui spūta salsa & iussu quiescunt, huic rubet corpus velut exanthematis oblitum: sed ante interitum exasperantur. Nam spūtum illud, dulcius factum è salso, foras non exit liberè: quia morbus iam in vetustatem incidit, quando tale percipitur. At fera expurgatio nunquam medici & ægri votis responderet, in copia, & expurgandi modo.

malè legeba-
tur φημετα.

42 Οἱσι δὲ ἐν πνέμονι ἐμπύματα γίνεται, τὸ πύϕιν ἀνάγκη εἰς μ. ἡμέρας μὴ ῥῆξιν, πάντας δὲ ὑπερβάλλοντες, ὡς τὰ πολλὰ φθισκοὶ γίνονται.

Quibus in pulmone fit empyema, ὃ quadraginta diebus à ruptione, pus expurgant: sed iis frustra exactis, tabidi ferè redduntur.

Coac. 17. hu-
ius cap.
Coac. 19. hu-
ius cap.

PERIPNEUMONIAE in empyema metapneumoniae habentis conditio explicata fuit ad illam prognosin. Qui autem peripneumonici, diebus criticis non expurgati sunt, sed eos cum delirio exegerunt; tandem exactis quatuordecim morbi diebus, periculum est ne purulenti fiant. Eòdem spectat & illa. Iam verò dolorifica partium istarum mala, quæ non quiescunt nec expurgatione spūti, nec phlebotomia, nec pharmacia, nec diata, in empyema mutantur. In hanc sententiam solennis est aphorismus 8. lib. 5. de mutatione pleuritidis in empyema. Sed empyematis facti, & vomica ruptæ, vel puris in thoracem effusi vacuatio per anacatharsin, quæ vel diebus absolvitur quadraginta, vel transit ad phthisin; cur ita fiat, ratio iam adducta fuit commentario ad illam prognosin. Qui è pleuritide facti sunt purulenti; quadraginta diebus à rupta vomica expurgantur. Exemplum legitur in Metone, cui quadragesimo die pleuritidis in empyema mutata, ipsum pus, rupta vomica, expurgationem absolutam sui habuit trigintaquinque aliis à ruptione diebus. Atque ita periculo & morbo defunctus est. Iam igitur sit satis monuisse, malè hic legi φθμα, ἀνὰ τὴν ἐμπύματις. Nam phyma pulmonis usurpatur lib. 2. de ratione, pro systrophica eius phlegmone, in quam non cadit expurgatio purulenta, dum ipsa manet. De phthisi autem, quæ & cuiusmodi sit, loco dicitur. Hac de re solennis est aphorismus. Qui ex pleuritide facti sunt purulenti; si quidem quadraginta diebus à ruptione, fuerint expurgati, quadragesimo tertio quiescunt: sin minus, transeunt ad ipsam tabem. Vide Galeni commentarium.

Coac. 11. hu-
ius cap.
7. Epid.

aph. 15. 5.

43 Ἐπὶ πλευρῇ ἀλγήματι, σαΐξις ἀπὸ ρινῶν αἱματὶ κακόν.

Si lateris morbo substillū incidat sanguinis è naribus; graue malum.

OMNIA QUÆ apparent & sunt ἀκρίτως; i. non lege critica, lethalia sunt, aut certè sinistri iudicii: maxime verò cum præter speciem ipsam τὴν ὁπιοφρομένην, quo nec dolorificum malum foras exit, nec exiturum ostenditur; in vitio sunt etiam, excrementi ipsius qualitas, quantitas, modus excernendi, & tempus. Omnia enim τὰ κρίσιμα, μὴ κρίνοντα, qualitate quidem non aliena, sunt δύσκολα, i. sinistri iudicii, eoque magis, quò plura conspirant ad δύσκολον, quantitas exigua, dies non criticus, & pigra excretio: quæ autem iudicatoria non iudicantia, qualitate in vitio sunt, mortifera esse dicuntur; eoque magis, quò plura huc spectant. Arque ut theorematum veritatem intueamur.

SI LATERIS MORBO] i. Pleuritidi quæ consistit in phlegmone systrophica membranz costis intextæ, vel etiam lateris morbo, i. empyemati collecto, vel effuso. Nam de utroque dicitur lateris morbus, i. de phlegmone, & empyemate: præsertim hoc loco ubi agitur de empyemate, quod etiam est dolorificum lateris malum. Neutrius autem epiphænomenon est substillum è naribus, ut mox dicitur.

lib. 3. cap.
2. 1. 1. prorrh.
Coac. 2. cap. 2.
lib. 2.

SUBSTILLVM INCIDAT SANGVINIS E NARIBVS] Quod specie ipsa non est pleuritidis epiphænomenon, nec empyematis: nisi fortè sit epigenomenon; illius quidem, per metastasim ad cerebrum, quæ paraphoricum edit symptoma, unde substillum, sicut in comate vigili: huius autem, per exolutionem potentie reëtrici ab inueteratione suppurati tabifica. Nec verò substillum sanguinis, in bonis vnquam ducendum, nisi fortasse id vnum quod hæmorrhagiæ liberalioris opinionem facit: cuiusmodi est illud quod cum viræ pepsimo incidit in quartum diem, apparètque ad hæmorrhagiam septimo die venturam; incidit autem sternutatione oborta. Nam de Metone quod scriptum est, bis die quarto substillum sanguinis habuisse: pessimè quidem illi fuisset, nisi fouendo caput, Hippocrates quinto die profluvium sanguinis excirasset.

Coac. 155.
lib. 1.
7. Epid.

1. Epid.

prorrh. 56.
lib. 1.

GRAVE MALVM] Quia non est proprium epiphænomenon, & quia parca manu & pigro lapsa fluit: quod signum est proritationis irritæ, quæ non rarò, sanabiles morbos, ex euentu facit insanabiles. Fit enim ex irrita proritatione κακὴ ἀπίστασις, quæ infert acrisiam, dyscrisiam, malorum accessionem, relapsum, mortem quoque ipsam. Hinc verus illa opinio; melius multò esse, naturam quiescere, quàm aliquid frustra moliri. Sed irrita fit proritatio in substilllo: quoniam potè non est natura nimis abundantiæ, qualitatique malignæ, vel, ut scripsit Galenus; natura suo dominatu nequit regere multos vel malignos humores, aut ipsa iacet effusa diu multumque oppressa. Illud verò malum, prauitate ipsa multò fit

multo sit peius, si sanguis qui stillat, qualitate sit merus, ut in Philisco; si fluat è diuerso mali dolorifici, ac si undecimo die; nec etiam in paroxysmo, ut quarto aut quinto; sine delectu periodorum, ut paribus aut imparibus diebus morbi exacerbantur; postremo si bis die fiat, & redeat, quod exploditur in illa prognosi. Undecimum diem agentibus, substilla sanguinis mala sunt; idque cum aliis, tum si bis fiant & redeant. Quod enim sepius frustra prorituratur natura, eiusque contentio irrita manet atque inanis; eò res agri peius erit. Sic in rigore vidimus; sæpe & frustra concitato.

hist. 1. Epid.
Coac. 2. cap.
13. lib. 2.
in Philisco.
Coac. 12. cap.
13. lib. 2.

44 Οἷον ἐμπύοις, Πιπνέσῃ ἐχοῖσι, δυσωδία ἢ πύσματων πα-
10 ραυλουδουσι· τέτοις ἰσοθρηπὴ κτείνει.

Quibus purulentis mitiora sunt omnia, si postea pus edunt fædi
odoris; iis recidiva mortifera.

sputa ne pu
πύσματι, εμπτύει

20 ILLA DEMVM leuatio empyicorum fluxa est atque obnoxia, recidiva, in qua supersunt reliquie morbi exacti. Supersunt autem reliquie; aut veteris cacochymie, aut succrescentis. Ac veteris quidem, in pure concluso, vel in thoracem effuso, quod foras non exit: succrescentis autem, à vitio pulmonum exorta, in quibus diffusum pus, non in membrana collectum, rupta vomica, vlcus ferinum reliquit, unde perennis generatio puris maligni.

Ergo. QVIBVS PURULENTIS] Qui propriè dicuntur empyici, & sunt eiusmodi, vel pure in vomica pulmonum collecto, vel in thoracem erupto.

MITIORA SVNT OMNIA.] Dyspnæ, doloris, & febris, eaque pathognomonica, quæ dum pus conficeretur, maiora erant quàm confecto; non tamén omnino quieuerunt: quoniam τὸ ὀπνέειν eam moderationem significat, de qua versatur illud in sapientum sermone, μὴ δὲν ἄγαν, i. ne quid nimis: quemadmodum supra iam è prothetico annotauimus. In effuso autem pure, quod vomica ipsa vo-
30 mit, mitiora sunt omnia epigenomena, dyspnæ, tussis, ptyelismi, febris, doloris: quorum acerbiras magna erat dum ruptionem natura moliretur. Iam enim pus rupta vomica, è loci angustia transit in amplitudinem, & spiritus ipse quem ducimus, in pulmonibus, unde prius arcebat, sedem inuenit.

Coac. 97. lib.
proth. 67.
13. 1.

30 SI POSTEA PVS EDVNT FOEDI ODORIS] Cuius fæditas putredini accepta refer-
tur, ab extinctione vitalis principij, in qua fixa erat viuacitas partis nondum corruptæ. Talis autem fæ-
ditas sepen ab Hippocrate nominatam ostendit.

6. Epid.

IIS RECIDIVA] i. Noua symptomatum, paulò antè remissorum, fœtura; ab oppressione pul-
monum atque thoracis, quam facit puris collecti, & continenter ab vlcere succrescentis nimia abun-
dantia, cum perenni affluxu catarrhi è capite. Hæc autem recidiva cernitur in reuersione & molestia
symptomatum grauiorum quàm fuerint in ruptione propinqua, nempe doloris, febris, dyspnæ, me-
tæonismi, & anxiodinis.

lib. 2. cap.
12.

40 MORTIFERA] Quia deinceps nulla erit remissio, sed incrementum, & vires effectæ languent
cum accessione maioris infirmitatis, & sympathia partium omnium sociarum & vicinarum.

45 Οἱ αὖ πλὴν ἐπικλοῖσιν ἀναπύοντες πυώδεια ὑπόχολα, σφοδύλα, ἢ
πυώδεια, ὑφαίμα, ὡρακολεδοῦσι χρόνῳ· ὀλέθριοι δὲ καὶ ὅττα μέ-
λανα λεγυνώδεια πύοντες, ἢ οἷον ἀπὸ οἴνου μύσαν· γίνεται πύσματ᾽.

οὐδέποτε

10 Qui è pleuriticis purulenta expuunt biliosa, rotunda, aut purulenta,
fusca; labetibus inde diebus, desperati: desperati sunt etiam qui nigra
& fuliginosa expuunt; aut quibus, velt nigro vino, sputa sunt tincta.

EXISTIT pepasmus omnino pestiferus, ut quodam loco scripsit Hippocrates (per nomina ita
loquutus, quia hoc, quicquid est, corruptionis potius quàm pepasmi nomen meretur:) ubi paria non
sunt omnia caloris natui, & mitificandi humoris, ut si humor prauitate sua sit indomabilis, aut si nati-
uus calor effectus languet in pepasmo materiz, alioqui natura mitificabilis. Ac prioris vitij exemplum
hic ponitur in expuitione purulenta & biliosa: alterius verò in purulenta ὑφαίμα. Quoniam autem plen-
30 titudo & peripneumonia mortifera sunt omnia, sicut de angina præceptum est; nisi dolorificum ma-
lignum foras exitu, & liberè ac liberalitè; quale in utroque morbo descriptum est: aut si careat bene-
ficio anacatharticos, illud cerè obtineat quod medium esse diximus inter veram crisin & desperatam sa-
litem; videlicet empyema, cuius quoque vacuatio experenda per facilem spumæ anagogen, nihil olentis
vndiquaque libè exiis, & æqualis. Ac talis anagoge, verum & certum est signum mali dolorifici, ex-
cans cum redintegratione partis obfessæ, omniumque symptomatum vacuitate. Ac si non fuerit talis,

Coac. 16. cap.
15. lib. 2.

Coac. 15. cap.
15. lib. 2.

Coac. 3. lib.
1. cap.

sed qualis hoc loco & suprà iam posita est; non certè hæc, malum exire, sed intus ad ægri pestem perniciemque subesse testatur; unde perennis manat puris maligni soboles & propagatio, quæ finem habitura non est, donec ægrotus animam exhalarit. Sed huius prognoscas demonstratio petenda erit ex aliis quæ in hanc sententiam scriptæ sunt, ac demonstratæ.

Ergo. **QVI E PLEVRITICIS**] Pleuritide sæua correptis, quorum anacatharsis nec cita fuit, nec liberalis & libera, spuri exactè flauo permixti, unde pleuritis non rarò sua sponte quiescit, crisinque habet simplicem perfectam, recidiuæ & suppurari expertem; eadèmq; nec phlebotomia, nec pharmacia, nec dicta curationem recepit; & tamen virtute naturæ, empyemati locum dedit; cuius confectio & eruptio celeritate præcedit reliqua empyemata quæ cadunt in pleuritidem & peripneumoniam: sicut non ita pridem annotauimus ex Galeno ad illam prognosin. *Plurimæ autem suppurationes rumpuntur, alia quidem viginti dierum, &c.* Vbi demonstratum est, plurimas eò dici, quòd aliæ sint alterius generis quæ non seruant legem dierum criticorum in ea prognosi traditorum; sed multò antè rumpuntur, ac septimo die non rarò tales eduntur, quales in prognostico, & suprà, & hîc leguntur.

PVRVLENTA EXPVNT BILIOSA] Intra decimumquartum, nulla præeunte salutari anacatharsi quæ dicta est. Nam cætera empyemata non fiunt, aut certè vix ante 14. nec rumpuntur ante 20, quàm breuissima esse potest eorum confectio, & consecuta ruptio. At purulenta & biliosa expuitio empyematis tam citò confecti, sæpe cadit in septimum, indèque mors venit intra decimumquartum. Tam citæ mortis causa est morbi ferocitas, & summa caloris natiui infirmitas, quæ cernuntur in bilioso pure, diductumve id fuerit, aut permixtum; maximèque cum ipsa natura, rei malè gestæ arguitur septimo die: tum enim malè res eunt, atque spes omnis retrò sublapsa refertur. Est autem, vt iam diximus, analogia septimi indicantis, ad crisin decimumquarti. Sed satis iam alibi de iis qui purulenta expuunt biliosa, & quare moriantur.

R OTVND A] Quorum prauitas consideranda in signo & causa. In signo quidem, quo denunciat crassitudo & lentor humoris in pulmonum bronchiis cumulatè collecti, & ab immoderato calore tam glutinosi atque rotundi: pars enim unde manat, ardore conflagrat. In causa autem: quoniam difficilis est talium excreatio; eaque difficultas excreandi, auget materiæ contumaciam, auget quoque ardorem: hinc maior dyspnœa. Atque hæc tria; difficultas spirandi, excreandi, & glutinosum pus, multas tradunt operas in ægroti perniciem, vt alibi docet præceptor.

AVT PVRVLENTA SVBVRVLENTA] Vnde significatio fit effecti multum caloris natiui, qui materiam, pepasmi capacem, mitificare non potest, colorémque solidarum partium, quarum minus est ipsa concoctio, puri, vt decet, omni ex parte inducere.

LABENTIBVS INDE DIEBVS] Vnde prauitatis & infirmitatis accessio fit. Nam & corruptio maior in dies accrescit, & virtus exoluitur partium quarum officia necessaria sunt ad conseruationem vitæ.

DESPERATI] Quorum desperatio posita est in vitio inemendabili partium obsecrarum, calorem cordis vitalem suffocantium, vel extinguentium cum spiratione difficili atque tabifica.

DESPERATI SVNT ETIAM] Calamitosa vi ardoris quo peruruntur atque conflagrant partes spirabiles, unde *μεγαλὴς ἀσπυρῆς*, & priuatio, ex qua denuo habitus comparari non potest.

QVI NIGRA EXPVNT] In quibus summa sunt prauitatis omnia, quæ in cuiuslibet meri humoris vacuatione cerni possunt. Nam huius nigri humoris, atque, vt ita dicam, atrabilarij, non melancholici, materialis causa est bilis multum viridis & æruginosa; efficiens verò, prægrandis calor adurens, & serum exhaustiens, unde tam merus est vt eo, nihil magis: iuxta illud. *Εἰ δὲ μὴ ὕψος ἀκραιῶν, ἀπὲρ μίλαν φέρειται.* &c. Atqui nihil merum in bonis ducendum, ne ipse quidem sanguis. Ergo desperati sunt illi qui cum sputo nigro, purulentum expurgant.

ET FVLIGINOSA] Damnantur hîc fuliginosa, quæ tamen plus habere securitatis alibi scripsit, quàm cætera praua: multum enim differt fuliginosum à nigro. Nam à fuligine superficies tantum fucatur: sed ab ardore totum corpus omni ex parte nigrescit. Atque vt nigriciei causa est ardor quo humor conflagrat: sic fuliginosi coloris vapor & anathymialis, qua superficies humoris fucatur. Sed in sputo vera est fuliginosi commendatio, præ cæteris malis. In empyemate vituperatio, postquam naturæ frustra conatus capti sunt in coquendo.

46. Οκόσοι αἷμα ἀφρώδες πύοιοι, πονέοντες ὑποχόνδριον δὲ ἐξ ὧν ἀπὸ τῆς ἥπατος πύοιοι, καὶ πολλοὶ ἀπὸ λυωται.

Quicumque spumantem expuunt sanguinem, dextròque laborant hypochondrio; à iecore spuumt, multique intereunt.

ECCÈ QVO in errore versantur, qui omnem diagnosin pleuritidis aut peripneumoniz ponunt in sputo cruento. Non enim hoc pathognomonicum est illorum morborum; sed epiphænomenon potius: nec vnquam inter diagnostica recensetur à præceptore; sed inter prognostica: nisi quis diagnosin indè comparari putet humoris morbifici: quod illi cōcesserim facile, modò inde prognosin incundam esse fateatur. Epimucro dubitari non potest quin sputum spumosi sanguinis, illinc veniat, aut illac feratur, vbi

1

Bb

nem perennem prauorum humorum. A loco autem vacationis indebitæ; propter excellentiam patris afflicta, i. pulmonis, valorum *αἰσθητικῶν, ῥητικῶν, καὶ ἀσθητικῶν*, i. diductionem, tapturam, erosionem; quæ non sanescunt facile; tum propter viuifici nectaris paupertatem quam infert sanguinis è sinu cordis exclusio. Postremo *φθίσις ἀπὸ τῆς πύσης*, i. phthisis à sputo, de qua illud præceptum est. Τοῖς δὲ *κατακλίειν*, aph. 9. 3. *αἷματις πύσης* φθίσις. i. luuenibus, sanguinis spuitiones; phthises: vnde & illud. *Tabes potissimum in eam cadit*, aph. 9. 5. *aiatem quæ est à 18. ad 35.* Et rursum. *Ἐπὶ αἷματις πύσης, πύς πύσις καὶ πύς*, i. A sanguinis sputo, puris sputum; malum. Vbi Galenus ait, non omnem sanguinis expuitionem, tabis consecutionem adferre: sed eam solum quæ à maligno fit.

47 Οἷσιν ἐν στήμοϊσιν, πῦρ βορβορώδες ἔρχεται, καὶ δυσώδες δόλω-
λιωται ὡς τὰ πολλά.

Quibus concutiendo pus editur cænosum, & fædi odoris; ut plurimum moriuntur.

QVEMADMODVM naturæ vis atque integritas in motu & pepasmo, consolatur medicum spe-
certa salutis: ita segnicies & infirmitas in vtroque, desperationem; in alterutro, metum adfert sinistri
euentus. Hic autem comparatio fit vtriusque facultatis, vnde prædicendi ratio iniri debet interitus aut
salutis. Ac naturalis quidem validæ in pepasmo; contrā effectæ, in corruptione humoris morbifici: ani-
malis verò firmæ in substantia, robustæ in officio expurgandi sputum aut pus; infirmæ & languidæ, in
interceptione & impedimento exitus, vnde suffocatio, indeque mors venit. Est igitur prognoscos hu-
ius quæstio, vtrum purulenti peiore sint loco à puris corruptione, quàm à difficultate & contumacia
excundi. Quæstionis autem hæc erit decisio.

QVIBVS] Empyicis, quorum parefacta iam ratio est in generatione suppurati, & vomica ruptio-
ne 20. 30. 40. aut 60. die.

CONCVTIENDO] A forti contentione musculorum intercostalium, idque voluntatis imperio,
tum ab electione, tum ab instinctu. Est enim natura in concussione potens causæ morbificæ: quemad-
modum in conuulsione impotens. Excitatur autem concussio, vel sponte sua, vel nostra in tussu; quod
est κατὰ ὄρμη, ἢ κατὰ βεβαίειαν. In sternutamento, singultu, rigore; tantum κατὰ ὄρμη, i. ab instinctu partis
afflicta, nec voluntatis imperio. Est igitur fortis concussio, lignum τῆς ἰσχύος in substantia; τῆς δὲ δυναμῆος
in officio.

PVS EDITVR COENOSVM] Quamuis liberè & liberaliter, à forti contentione thoracis, mea-
tum libertate, & pure meabili. Est autem cænosum βορβορώδες, colore fuscum, & substantia ἀμορβώδες, i.
amurcam referens. Ex quo significatio fit corruptæ partis vnde manar, effecti caloris, & materię proflus
indomitæ.

ET FOEDI ODORIS] In quo putredinis summa sunt omnia, vnde vis tabifica nectar viuificum
cordis planè corrumpit, & vnde partium omnium solidarum viuacitas labefactatur, corrupto vitali
principio cui tabifica vis infertur à corde, loco viuifici nectaris. Est autem putredinis fætidæ corruptio
inemendabilis, nec vnquam redintegranda, quæ per syntimoriam, partem vbi concepta est, ad extre-
mum corruptionis perducit, & insanabilem gangrænam inducit.

VT PLVRIMVM MORIYNTVR] Vel potius necessariò: quoniam mortifera est gangræna
cùm cæterarum corporis partium, tum verò spirabilium, quarum officio vel ad punctum tēporis vitam
carere non potis est: & quarum vitio, naturæ omnia præsidia collabuntur, cum ἀδυναμία omniū facultatum,
& vacatione omniū officiorū, eadē in sympathiā & cōtagionē adductorū nobilissimæ partis corruptæ.

48 Οἷσιν ἀπὸ τοῦ πυρὸς ἡ μήλη χρωμαίνεται, καὶ ἀπὸ πυρὸς
δολωλιωται ὡς τὰ πολλά.

*Quibus à pure coloratur specillum, tanquam ab igne; maximam il-
li partem intereunt.*

ENIMVERO benè res eunt, & bono sunt loco empyicorum, quibus vel confecto statim pure dum
stabularur in vomica, vel ea rupta in thoracem effuso, ipsum liberaliter & ex facili educitur per os; nihil
olens, æquale, læue, & album. Tales enim pro certo euadunt, si bene constituta sit naturalis œconomia:
quoniam ab expurgatione puris, fruuntur omnibus naturæ commodis quibus vita hominum susten-
tatur, nempe spiritu & nutrimentu. Sin autem eo careant beneficio citæ, liberalis, & liberè anacatharsis;
ibi tum citò puris vacuatio moliendæ per vstionem aut sectionem: sicut faciendum præcepit Hippo-
crates, & supra iam aperuimus. Ac superusto latere κατὰ ἔξω empyematis vacuandi, quod vel pleuritis, vel
peripneumonia, vel ipse lateri affixus pulmo inuexit (quod erat in more positum, instirutoque vete-
rum medico-

rum medicorum, ut Galenus ex Platone comico annotavit: si in quibus, perusto latere, pus exeat, quale descriptum est bonum, bene sit agro: sin autem cernosum & fœdi odoris; mortiferum. Ac sanè pus illud alia probatione non egebat suæ qualitatibus mortiferæ; quàm prædicta odoris atque coloris, nec erat necesse aliam subiungere in hac prognosi traditam, cum illa sufficeret. Cur autem id factum sit, plannum facit prognoscos explicatio.

QVIBVS] Empyricis qui perusto latere pus edunt foras, quod erat in thorace diffusum.

A PURE] Non eo solum quod expurgatur per os, in quo fœdi odoris, & cernosi coloris argumenta sufficiunt ad præfensionem interitus & desperationem salutis; ut alia probatione hic tradita, nec specillo sit opus: quia nullum arte sit vlcus, nec vulnus in libera puris expurgatione.

COLORATUR SPECILLVM] Scilicet vulnerarium, quod in sinum immittitur, siue in fistulam expurati: ne, quia longa est via, decipiatur medicus pure quod in propinquo est partium circumiacentium; tum autem ut pus quod in abdito latet, exitum habeat, quo sæpe impeditur vel sua crassitie, vel ipsius fistulæ sinuoso anfractu. Coloratur autem à pure quod in profundo est, unde tali colore inficitur, qualis est eius coloratio.

TANQVAM AB IGNE] Ut scilicet immissum, pro candido & argenteo, velut plumbum & igne perustum extrahatur; indicio puris, feritate acerrimi.

MAXIMAM ILLI PARTEM INTEREVT] Causæ sunt explicatæ in superiore prognosi.

49 Μετὰ πλῆρῆς ἀλγέματος, μὴ πλῆθεικῶν δὲ, καὶ ταραχῶδων λεπῶν, ἢ φρενικῶν ὕπνι φρενιτικοὶ ἀποβαίνοισι.

Quibus cum dolore lateris, non tamen pleuritico, levis adest aut modica perturbatio; euadunt phrenitici.

MAGNA VIS est ad ea quæ cuique accidunt suscipienda, in præparatione τῷ ἐπιδερμικῷ, i. excipientis causæ, vel affligendæ partis. Ecce dolor lateris, nec tamen pleuriticus, transit ad phrenitidem: quia coniunctam habet τῷ ταραχῶ, i. animi perturbationem. Huiusmodi est illa prognosis. Qui cum perturbatione, vrinas mittunt claras & albas, vel enæoremate nigro prædatis; ipsos manet phrenitis. Sed præstat examinare institutam prognosin.

QVIBVS CVM DOLORE LATERIS] i. Dolorifico lateris malo. Sic enim dolorem pro morbo, sæpe iam diximus vsurpari. At cuiusmodi sit ille morbus, quia non docetur ἐκ τῶ ἀρχόντων; nostræ partes erunt quærere ἐκ τῶ ἀσυμβεβηκότων, ex eo scilicet quod adiecit.

NON TAMEN PLEVRITICO] i. Minimè nato ab inflammatione systrophica membranæ costis intertæ. Quæramus igitur super eo dolore lateris ad phrenitidem transeunte, quem ipsa pleuritis non facit. Sed quid dixi, super dolore? illud enim, super, ad methodum pertinet examinandæ rei quæ in quæstionem vocatur. At nondum constat quænam sit illa res, nisi ἐκ τῶ ἀσυμβεβηκότος, quod posuit in vacuitate pleuritidis. Quænam igitur tanta vis esse potest exorti doloris in latere, nec tamen pleuritici, unde inferatur phrenitis? Enimuero diaphragmatis non est, nec umbilici palpitantis, nec mediastini vulgò dicti. Etenim diaphragmatis inflammatio, quam vox acuta, quæ fuerat antè grauis, & hypochondriorum intrò sursum ostendit reuulsio; est planè phrenitica. Umbilici autem palpitatio, non est phrenitica, quam inflammatio non excitauit, pæce Galeni dixerim. Nam ut concedam quod ipse dixit, paraphoricam esse diaphragmatis offensionem lege contagionis & sympathiæ quam habet cum cerebro: tamen offensionis causam probare non possum, quam idem scripsit oriri ex flatulento spiritu, frigoris vi cumularè suppressio. Est enim ratum illud theorema ipsius. Οὐδέποτε ἢ τῷ πνεύματι ἀποληφίς, ὅτι φέρεται τῷ φρονίῳ. ἢ δὲ δὲ τὸν ἐκ τῶ ἀρχόντων. i. Flatuum interceptio, nunquam hypochondriis infert dispositionem inflammatoriam. Sed illa offensio non est lateris, nec morbo, nec sympathiæ. Mediastini autem quæ ratio esse potest, cartilaginei: quod si concessero inflammari, pleuriticus erit dolor, qualem demonstrauimus verè dici & esse à phlegmone sterni, costarum superarum, inferarum, & dorso. Erit igitur lateris dolor, non tamen pleuriticus, qui per metastasin facit phrenitidem; is ipse de quo illud extat perceptum. Ἐ δὲ ἄρα καὶ πλεονὲς ἐν πύπνισι δὲ μαλακῶν τῶν φροσύνων σημαίνει. i. His variè per latius oborti dolores; delirium fore testantur. Hic enim raros dolores credibile non est dici, quos excitant flatus, quorum subita dissipatione ipsi dolores subinde quiescunt. Illud enim quod supra posuit de biliosis & meris deiectionibus; non admittit collectionem spiritus flatulenti. Deinde verò à dolore lateris inde oborto, non fieret ipsa phrenitis: quia spiritus flatulenti ut nulla suppressio inflammatoriam parit affectionem; sic nulla eius translatio. Quamobrem si, vel Galeno teste, rari dolores lateris, eò dicuntur, quod sint fugaces: huiusmodi esse possunt à bilis orgasmo, quam demonstratum est metaplasin crebram huc illuc habere, sicut in cerebro: sic in thorace, modò infera, modò supera; modò dextra, modò sinistra; modò antica, modò postica illius regione. Atque dolor talis, non est verè pleuriticus: nisi forte ὁμοιότητι dicatur & κατὰ χεῖρας; quia non habet secum adiuncta pleuritidis pathognomonica & συνεδρεύοντα. Sed tamen ille dolor facilè transit ad cerebrum, ibique paraphorica edit symptomata: sicut iam per orgasmum, metastasin habuit ex alio in thoracem. Paraphorica autem symptomata, facilè in cerebro excitantur.

proth. 4.
f. r. i. & alibi
passim.

51. AD SIT. LEVIS AVT MODICA PERTVRBATIO] Nam *μετά* absolūtē dicta, mentis est propria, qua itur ad omne genus delirij; maximē autem phrenitidis & insaniz, cum effecta bilis, eō proreperit, ibique feritatem suam exercet.

50. Εν τοῖσι καὶ πνέμονα αἱ λίαν ἔξερυνθαι δόποσάξινες πονηρόν.

Quæ cadunt in peripneumoniam prærubra multum stillicidia; mali sunt ominis.

Coac. 45. lu-
ius cap.

hist. r. i. Epid.

SATIS TAM de stillicidio sanguinis, quod cadit in peripneumoniam; aut etiam nimis multa ad illam prognosin, si lateris morbo sub illud incidat sanguis e naribus; grane malum. Nunc autem sufficit explicare quid sit prærubrum valde stillicidium. Est illud sanguinis meri, suo sero nimis exhausti à febrili ardore, proptereaque pessimi. Ergo si ad vitium stillicidij, quod ipsum per se magnum est, & crisis aduersæ, accesserit quoque præiuras eximia sanguinis multum e natura egressi, qualis est meri, ut in Philisco; non dyscrisia solum stillicidij simplicis, quæ ipsum semper manet: verum etiam mortis consecutio adferetur homini desperato. Vide comment. ad illam prognosin, & quæ adducta sunt illac ex alijs aphorismis, de stillicidio accuratissime scriptis & explicatis.

51. Μετὰ βραχὺ πύελα γλίχρα, ἀλμυρώδεια κακόν. ὡς δὲ πᾶσι πύεται καὶ σῆδος· ὅπῃ πύτοις κακόν. τὰ ἐς τράχηλον ἀλγήματα, πύτων ἰσχυρανθέντων ὀλέθρια.

Cum rancitate sputa glutinosa & salislaginosa; malum: quod si quid præterea in pectore assurgat; malum. Ac sanè cervicis dolores tumore vanescente; sunt desperata salutis.

6. Epid. part. 3.

2. Epid. part. 1.

6. Epid. part. 3.

3. Epid.

2. Epid.

lib. 6. Epid.
part. 3.

1. Epid.

CATARRHI ferini prolapsus, & vbi insederit, & vnde, & quā exierit; sæpe insanabilem morbum facit. Quod ipsum docere viderur illa sententia. *Επὶ τοῖσι κατάρροις (τοῖσι κακὰ ἔχουσιν, καὶ ἐκκρίνουν εἴη, καὶ μὴ εἴη κακόν. i. Destillationes malignæ (in pulmonem prolapsæ) exitum ne habeant, aut non; semper sunt male.* Scripta est autem de iis qui thorace angusto sunt, dorsoque alato: quorum vitiosam conformationem referendam esse docet præceptor *πῶς τὴν τῆς ἀφορμῆς ἀδυναμίαν, i. ad imbecillam vim efformandi;* cuius imbecillitatem ponit in paupertate caloris natui, ex paruitate cordis, quæ facit thoracis angustiam: sicut amplificatio amplitudinem. Scitur est illud. *Σπινθηρὶς καὶ πλάσματος· ἀπὸ τῆς ἐναιτίας, i. angustia & amplitudinis contrariæ sunt causæ.* Huiusmodi autem naturæ quæ sunt angustii thoracis & dorsi alari, propterea que dicuntur *πνευμοναί;* sunt omnes *φθώδεις, i. obnoxie tabi:* præsertim si ad illud vitium formatæ accesserit perennis catarrhi ferini generatio, ex contraria temperie nobilium partium, & impuritate ipsius hepatitis & aortæ, tum à tempestate austrina, vêtis placida, & pluuiosa. Tum enim periclitantur & *πνευμοναί;* a phthisi, quos potissimum destillatio ferina e capite facit ruficulosos & rancos. Cum igitur catarrhi ferini vis erodendi (est enim *δυσέρωπτος*, propterea que dicitur *πνευμοναί;*) metum adferat *πνευμοναί;*, i. ferini ulceris, in parte capacissima rosionis, i. in raro & spongioso pulmone; periculosa est eius mansio diuturnior, vbi non potest pepasium habere: sicut catarrhi alij feritatis expertes, quos verant inde cieri pharmacia anacathartica, priusquam mitificati fuerint. Et si fortè natura, sponte sua, ipsum tussiendo extussire conetur; & irrita eius contentio, & inanis catarrhi expressio per fumidi vaporis efflationem, ipsa tussiendo assiduitate, valis alicuius inferet rutionem, & caput ipsum replebit, cuius repletio erit catarrhoica, per syntimoriam sæuiens in pulmonem. Nec solum catarrhi ferini prolapsus in pulmonem, cum insederit, ipsum corrumpit; & vnde foras exire tentat, vasa distrumpit cum irrita tussiendo assiduitate: sed etiam quā prolabitur, & quā effertur; damnis augeat ægrotum. Sic enim præceptor annotavit in illo. *Φάρυγγες τοῖσι πλείοσι πύτων ἐξ ὀφθαλμοῦ, καὶ δὲ τέλος ἐπὶ τῶν εἰσὶν ἐχόντων ἐν τῇ φάρυγγι φλεγμονῆς. ῥύματα σικκρά, δριμέα, λεπτά, παρὰ καυομένοι καὶ πύονται. i. Eorum verò plurimis ex astum ad morbum fauces erant dolenter affectæ, quarum affectio cernebatur in rubore & phlegmone. Lacescebant eos fluxiones exiguæ, acres & tenues, citò maleficæ atque tabificæ.* Nunc ostendamus quā spura sint mala, glutinosa & salislaginosa, cum rancitate coniuncta.

Ergo. CUM RANCITATE] Quam edit asperitas tunice arteriam succingentis, imbutæ catarrho primū acri & tenui, mox glutinoso & salso.

SPUTA GLUTINOSA] Lenta & viscida: non à crudore, sed à calore contra naturam perusta, vnde nominantur *κατὰ γλίχρα ὀνόματα ἀσπείως, i. glutinosa & coctionis expertia.* Nam coctione fiunt crassiuscula & meabilia; quæ putria vulgò dicunt: sicut ex vulgari consuetudine loquendi scripsit Hippocrates, *ἀσπείως.* Hic igitur spura sunt *ἀσπείως, i. ἀπείως glutinosa;* propterea que *ἐνέπληρον, i. creatum admodum difficilia:* quoniam contumaciter adhærescunt fancibus & arteriæ, vnde non exit facilè catarrhus ferinus in pulmonem prolapsus, quamvis eō delatus fuerit ipso vapore fumido, per tussim expresso; sed ibi di-

lib. r. & 3. de
acut.

sed ibi dispergitur, & vt Galeo placet, αἰματωφέρεται, i. rursus præcipitat, cuius inchoata fuit αἷσος, Gal. ad par. 18. sc. 3. i. solum elatio, nec tamen transeundi celeritate per arteriam, præuenit dispersionem sui per cam, atque relapsum. Quæ causa est cur in arteria glutinosum fiat, quod prius acre fuit & tenue.

ET SALSILAGINOSA] i. Dilutum salem referentia, idque vel propria corruptione catarrhi unde fit pituita salsa, quemadmodum à concretionem gypseâ, & à resolutione aquea, vel à permixtione bilis & pituitæ. Sunt autem amari & salsi affines sapores.

MAIUM] Quia raucitas cum tussi coniuncta, phthisicos prænuñcia est vel consecutaria: prout catarrhi feritatem sentit arteria; vel appulsu qui fit superne deorsum; vel eo qui inferne sursum, quando ibi dispergitur, ex eo quod ἡ αἷσος celerem non habet διεξοδόν. Deinde quia sputum glutinosum, difficili excreatione plus adfert detrimenti, quàm adiuuenti. Hinc maior doloris & tussis molestia, cum syn- timoria contumacis materiæ, & spirationis difficilis, quæ frustra tussiendo augetur: vt interim præter- tam signum quod edunt sputa glutinosa perusti humoris ab incendio & ardore quo pars incanduit, unde sputa illa procedunt. Atque vt glutinosum nocet contumacia, & partium, vt sic dicam, laceratio- ne: ita salsilaginofum, erosione. Nam signo terribila sunt κατ' ἡλίον καὶ μάλλον.

QVOD SI QVID PRÆTEREA IN PECTORE ASSVRGAT] Cuiusmodi est λόρδος, à phymate duro pulmonis, partiūmve anticarum, thoracis vertebram, dorfi auulsis ligamentis, sternum versus abducenre; aut etiam sterno expulso ab oppressione partium spirabilium quæ adiacent ipsi, tum à propagatione rheumatis concitati & consistentis.

MAIUM] Quia vis magna denūciatur mali quod foras non exit, sed acquirendo vires, distor- sionem & luxationem adfert rhacheos, ipsamque facit κεκόλωρον, κεκόκωφον, & κεκοσκόλιον; quæ olim na- turaliter constituta erat ἰσχυρόλος, ἰσχυρόδης, καὶ ἰσχυρός. Vulgata est illa sententia. Qui ante pubertatem, gibberosi fiunt ex asthma, vel ex tussi; moriuntur. Vide doctissimum Galeni commentarium.

AC TVM CERVICIS DOLORES, TVMORE VANESCENTE, MORTIFERI] Ratio huius mortiferi symptomatis arque signi, repetenda ex illa prognosi. Sin autem cynanche faucium evanescat, nullo erysipelate foris exorto, nec excreatio pure ex facili & sine dolore, idque diebus criticis; mortifera est. Nam erysipelas intus foras conuerit, commodum: at foris intro, mortiferum. Intro autem conueritur, cum eo vanescente pectus opprimitur, ac difficiliter spirat ager. Pertinet enim pars vltima huius prognoscens ad phlegmonem & ruborem faucium dolenter afflictarum à feritate catarrhi, vel prolabentis, vel αἷσος sine διεξοδῷ habentis.

52 Βεαρχῶ μὲν βηχὲς, καὶ κοιλίης ὑγρῆς· πῦρ αἰάλα.

Raucitas cum tussi, & liquida aluo; pus edit.

VT RAUCITAS inæqualitatem ostendit arteriæ catarrho imbutæ: sic tussis, præsertim sicca, perennitatem catarrhi prolabentis, quando raucitatem secum habet coniunctam. Et quia catarrhi vis effera est quæ cernitur in raucitate, & faucium phlegmone, atque rubore; periculum est ne tabem inferat, erodendo pulmonem. Fuit illud iudicium præceptoris, quod qui à catarrho diu vexati sunt, tabificam vim eius tandem experiuntur, ac tabidi iacere coguntur. Iudicium aperit præceptoris, diuina obseruatio sic expressa. Πρῶτ' δὲ τῷ θέρει ἀρχαίμεν, καὶ δευτέρως, καὶ τρίτ' ἐν χυμῶνα· πολλοὶ γὰρ ἡδὴ πολλὰ χρόνον ὥσπερ φθιμένοι, φθινούσιν κατεκλίσθηται. i. Ante æstatem, & per ipsam, atque per hyemem, eorum multi qui iam diu consuebantur; phthisici iacere. Ad quem locum hoc theorema catholicum scripsit Galenus. Οσα δὲ πρὸ κεφαλῆς ῥέματα, βηχῶδεις μὲν καὶ βεαρχῶδεις κατ' ἀρχαί· ἐργάζεται τοὺς αἰσθητικούς, ἐν δὲ τῷ χρόνῳ περὶ ὅλην μὴ καδίσταται· ταῦτα δ' ἐπὶ ἐσχάτῳ δευτέρως τὸ φθιστικὸν ἐργάζεται. i. Desillationes è capite, quæ statim initio tussiculosos homines faciunt, atque rancos, nisi labente proxima anni parte quiescant, ac velut redintegrationem habeant; profectò alteram tabis inferunt differentiam. Est autem tabis altera differentia quæ in vlcere pulmonis consistit; sicut altera in ruptione vasis: illa quidem πνευμονόδεον, i. hominum alaiorum; hæc verò iuuenum, hæmorrhagiæ com- modis carentium à 18. ad 35. ætatis annum. Ac tabis vtraque differentia, sic expressa legitur in illa pro- gnosi. Φθίσεις ὁπποῦνδυνάται, αἵτε δὲ τῷ ῥήματι φθιστικὸν ὄντι παχέων, καὶ δὲ κατὰ τὸν τῷ χρόνῳ κεφαλῆς. i. Ibi demum in- metu sunt maximo tabes, tum à ruptione venarum crassarum, tum à catarrho è capite. Ex qua prognosi Gale- nus distinctionem attulit causarum tabificarum, ad locum prædictum: vt satis mirari non possim tanti authoris pertinaciam in deroganda fide prognoscen Coacarum, ex quibus tot flores collegit unde sua scripta ornauit, & immortalem doctrinæ singularis gloriam comparauit.

Ergo. RAUCITAS] Initio statim catarrhi oborta, sicut Galenus rectè annotauit, κατ' ἀρχαί: quoniam ferina destillatio, statim malefica esse solet, & statim tabifica; iuxta illud, ὡχρὺ κακοῦμενοι καὶ πνέμεν.

CVM TVSSI] Ferina, pertinaci, & sicca; in qua tussiendo, nihil, aut certè parum, excluditur; id- que crudum, aut certè parumper coctum, mox crudum à nouo prolapsu, atque iis tantum qui meliore sunt loco. Nam qui peiore sunt, ne quidem paulisper villo gaudent pepasmo: sed continenter pauca ex- puunt cruda, exactum ad morbum.

ET LIQUIDA ALVO] Cuius præpropere excretio est ac licenterica, non quidem per sympa- thiam partium nutritiarum quas tædeat sui quamque officij, ab inueteratione tabis, mox affutura mor- te; nec verò deriuatione catarrhi in aluum, qui oxyregmiam primum, mox parit licenteriam. Sed à feri-

tate catarrhi quæ facit aluum *αφθώδης*, obortis scilicet aphthis in aluo, unde labefactatur facultas eint-
 3. Epid. part. 3. reatrix, ut cibos etiam suauissimos, aliquantisper continere non possit. Credibile est autem, catar-
 rhum idem facere in raro & molli pulmone, quod in densiore & solidiore, aluum: sicut Galenus anno-
 tauit ubi docet Hippocrates, ab eodem catarrho eisdem homines tabidos fieri, & aluo turbata. Est au-
 tem hæc *ἀφθώδης* ut intelligamus, inde phthisin nasci, unde vlcuscula, quæ sunt aphthæ, in ventriculo ex-
 citantur. Talis consecutio symptomatum legitur in illa prognosi. *Σπύματα ἀφθώδεια τῶν ἐν τῷ στομάχῳ ἔχοντα
 ἀεὶ καὶ κωλύει καὶ συρραίνονται*; i. Ora grauidarum aphthosa; terrifica. Num etiam perliquidas reddunt aluos? Nam
 causa vlcerifica, per continuitatem interioris tunicæ prorepat ab ore ad aluum, ubi facit idem quod fe-
 cit in ore, nempe vlcuscula, unde liquidis excrementis fertur aluus; quæ causa, nutriendi & gerendi op-
 portunitatem adimit: proptereaque locus est abortioni.

lib. 1. cap. 34-5.
 3. Epid. part. 3.

P V S E D I T] Non primò & per se, sed interuentu phthisis. Cuius quidem facilis generatio est à
 tali catarrho, maximè verò in homine angustii thoracis & dorsi alati, idque tempestate austrina, ventis
 placida & pluuiosa. Eiusmodi esset prognos, si quis prædictionem ederet futuræ aborti-
 cæ mulieris ore aphthoso. Tale est illud adagium. Oculus domini habitio-
 rem facit equum. Non ocu-
 lus domini *ὀφθαλμὸν* per se parit in equo: sed equisonis diligentia quæ ad nutum domini adhibetur in
 equo conuenienter fidelitèrque curando.

53 Οἷον ἐν περιπνευμονίᾳ ἔσται παχὺ ἐν δὲ χρόνῳ, εἴτα πρὸ τῆς τετρα-
 δος λεπυνέται. Δανδσίμων.

*Quibus in peripneumonia, urina continuò crassa, mox ante quar-
 tum diem tenues fiunt; mortiferum.*

H V I C demonstrandæ prognosi aduocanda sunt nobis hæc duo catholica theorematum. Prius est.
 2. In morbo acuto malè res eunt, quando perehnis accessio fit causæ morbificæ. Alterum. Malo sunt loco
 2. res ægri in morbis acutis, quando naturæ præsidia collabuntur. Ac theorematum utriusque veritas ostendit
 Coac. 7. cap. 4. lib. 2. in hac prognosi, sicut in illa. In *παρωιδίῃ*, *urina citò & paulisper coctæ; pestifera*. Videamus igitur
 quantum lucis adferant theorematum illa catholica, huic explicandæ prognosi quæ omnem ferè conti-
 net rationem prædicendi de morbis acutis, quæque suo particulari exemplo, de more & instituto præ-
 ceptoris, percepta edit singularia incundæ *πικρῶς* ad scienter & certò prædicendum quid cuique sit
 euenturum.

Q V I B V S] Conuenienter curatis, & in quorum commoda nihil peccatum est: ut nulla sit excusa-
 tio culpandi medici, eorumve qui præstò sunt.

I N P E R I P N E U M O N I A] Inflammatione pulmonum systrophica, iam suis omnibus signis de-
 scripta & explicata.

V R I N A] Non quidem colliquamenta, nec *ἔσται ὁμοῦ καὶ βρώματι καὶ πόματι*, i. *urina concolores potioni
 6. Epid. part. 5. & cibo*: sed quarum materia est, ut ait Galenus, *ὁρὸς ὅβρις καὶ πικρὸς καὶ χυμῶδης*, i. *serum quatuor qui stabulan-
 3. Epid. hist. 2. tur in venis humorum*. Est enim triplex urina materia, præter *τὰ ὑφιστάμενα*.

C O N T I N V O] Incunte morbo, simulatque venit peripneumonia, atque, ut dici solet, *τὴν ἀφθῶν
 εἰσοβολήν*, i. *primo appulsu, vel aggressionem*.

C R A S S A] Non quidem grumosa ex affluentia crudorum *ὑφισταμένων*; nec verò crassa, i. turbata
 ac iumentorum similes, quæ diu depositæ non residunt, quæ *ἔσται γολεῖς* nominantur: sed crassa, hoc est
 lib. 2. progn. mediocris consistetia, nec spissa nimis, nec tenues. Sic enim crassa dicuntur quæ à pepasmo spissescunt,
 iuxta illud. *Παχύνεται δὲ καὶ τὸ δειχθέντα πρὸς τὴν κρίσιν ἵσος τῆς ῥέας*. i. *Excrementum spissari oportet dum itur ad
 aph. 69. & crisin*. Ac tales urina crassa leguntur in illo aphorismo. *Qui cum urina crassa, meunt furfuracea; scabiosa
 70. lib. 4. est iis vesica*. Vbi Galenus rectè annotauit, urinam tenuem & furfuraceam, scabiosarum esse venarum:
 lib. 2. progn. crassam verò, ipsius vesicæ. Ac de his aliàs.

M O X A N T E Q V A R T V M D I E M] Quo prima periodus morbi absoluitur, & *πρὸς τὴν ἑπομένην
 lib. 3. progn. nominatur*, i. *primum certamen naturæ & morbi*: à prædonibus ducta metaphora, qui viatores innadunt.
 Notabile autem est quod scripsit, *M O X A N T E Q V A R T V M D I E M*: quoniam primis illis morbi
 diebus ante primam *ἐφοδὴν*, crebri sunt metapnoeis morbi acuti, ac tum humoris morbifici efferi sit
 prom. 13. L. 1. 1. orgasmus; non autem cum iam processerint quaternariis, ut in phrenitide obseruauit præceptor.

T E N V E S F I V N T] In substantia, ex vacuitate coctionis quæ paulò antè specimen ediderat suæ
 virtutis in crassa urina: quod est argumentum fatiscientis naturæ & officij malè gesti à partibus nutri-
 tiis; maximè verò iecore & venis: ac tum urina sunt tincturæ biliosæ expertes, ex translatione bilis ad
 superas partes; quæ quia critica esse nequit ad futuram iuuenum hæmorrhagiam, sicut eius deriuatio
 ad senum dysenteriam (non enim critica spes affulgere potest pepasmo ante quartum diem) efficitur
 planè ut sit omnino symptomatica ingrauescentis peripneumoniz, aut etiam mox in phrenitidem mi-
 2. Epid. part. 3. graturæ. Atque huius metapnoeos opinionem facit repentina mutatio crassitudinis in tenuitatem an-
 te quartum diem, quo tempore, ut iam diximus, frequentissima esse solet metapnoeis morborum peracti-
 torum, & humoris orgasmus. Hic locum habet illa sententia præceptoris. *Ὅσα πικρὰ, ὅθεν κρίσιμος, ὅθεν
 2. Epid. part. 3. ῥέας*. i. *Urina tenues, criticum nihil, & vile nihil præ se ferunt*. Sed de urinis loco dicetur.

MORTIFERVM] Quoniam si ad nobilissimæ partis oppressionem, continenter fiat noua morbificæ causæ accessio; vel, si in morbo calamitoso & peracuto, partium spirabilium κακοποιήσῃ sit, & vis efficiat languere partium nutritiarum; profectò, labefactata spiritus & nutritus æconomia, necesse est vitam effluere.

54 Οἱ ἐν ξηροῖσι διεπνευμονίῃσιν ὀλίγα πύονα διὰ ζῶντες· φοβεροί.

De peripneumonia sicca iis verendum qui pauca expuunt, & cocta paulisper.

SICVT periculosa est anadrome rheumatis concitati, quæ peripneumoniam fouet & auget: ita consistentis contumacia in coquendo & expurgando. Ac rheumatis concitati pertinacia, superiore prognosi tradita est in vrina quæ citam mutationem habuit crassitudinis in tenuitatem. Hic traditur contumacia consistentis, cum pertinacia concitati. Vtriusque autem ratio sic innotescet.

DE PERIPNEUMONIA SICCA] In qua sputum flauum paucò permixtum sanguine non editur circa initia, nec diebus criticis liberaliter expurgatur: talis enim dicitur sicca, i. sputi expers, in qua dolorificum malum citò, per anacatharsin, foras non exit. Ac siccitatis causæ omnes propalam explicatae sunt ad illam prognosin. *Pleuritides sputi expertes; grauisima.* Ergo qui sæuis peripneumoniæ symptomatis exercentur, nec vllam edunt vacationem propriam phymatis in pulmone oborti.

lib. 2. progn. & Coac. 16. huius cap.

Coac. 3. huius cap.

IIS VERENDVM] Quia non laxatur phyma pulmonis, vnde nulla symptomatum grauissimorum remissio, sed grauiorum accessio ex tensione maiore, vnde spiratio difficilior auget humoris expurgandi contumaciam: quemadmodum hæc rursus, difficultatem spirandi, donec ventum sit ad stertorem & orthopnoeam suffocantem & strangulantem. Atque in vniuersum mortifera sunt omnia peripneumoniæ, si dolorificum malum foras non exeat citò. Est enim, vt dici solet, celeritas mora ipsa, quædo cum sæui doloris cruciatu coniunctus est in spirando meteorismus. Et verò in vacuitate commodorum epiphenomenon, scutura est subnascentium prauorum symptomatum, quæ vocant & ὀπὸς φθόρον.

QVI PAUCA EXPVNT] Idque serò: ob materiæ contumaciam, vasorum siue meatuum angustiam, & imbecillam concussionem. Nihil autem paucum est criticum: maximè verò id quod difficulter exprimitur veriùs quàm expurgatur.

ET COCTA PAVLISPER] i. Parca manu & aliquantisper cocta. Hæc autem vicissitudo est pessima, cruditatis & pepasmi.

55 Τὰ ἐν τοῖσι στήθεσιν ἐρυθήματα ὑποπλατὰ· γίνεται τοῖσι τοξόποισιν ὀλέθρια.

Pectora rubris maculis supersparsa, talibus mortem subesse testatur.

QVÆ PER metaptosin nata, spem adferunt bonæ crisis, & bona spe consolantur medicum; eadem per epigenesin, meru exterrere sinistri iudicij. In strangulatu forti cum sæui doloris cruciatu, & orthopnoea, quæ angina vera est, exortum in ceruice & sterno erysipelas, periculi locum tollit, si ex anginæ foco egressum fuerit per metaptosin, nec intrò recurat. Idem per epigenesin diffusum veriùs quàm effusum, quod indicat symptomata ingrauescèria, vana spe lætat medicum imperitū. Nā cita mors venit.

ERGO. PECTORA] Dorsum quoque ipsum, & latera quibus adiacent inflammati pulmones.

RUBRIS MACVLIS SVSPERSA] Vel maculis quibusdam obstita; rubris quidem, sed minimè tuberosis, ab expressione feri, cuius nimia abundantia pulmo distentus est, penèque oppressus. Exudat autem serum illud, potissimum iis qui carent libera & liberali expurgatione humoris morbifici, & quibus vrinæ primùm crassæ, mox tenues ante quartum diem redduntur: maximè verò densis corporibus quæ ab exercitatione violenta peripneumoniam contraxerunt.

TALIBVS MORTEM SVBESSE TESTANTVR] Non secus atque sputum quod strepitum edit in pectore, vnde curatio desperata. Non secus atque pulmo qui multum repletus, nihil edit, sed feruet in ima larynge. Quæ sanè afflictio peior est, quàm si ederet sputum nigrum, sicut docet illa prognosis. *Εἰ δὲ μὴ ὅπως ἀκριβοῦς ὅσπερ καὶ ῥῆμα φαίνεται, δεινότερόν ἐστι τοῦ θανάτου. κακὸν δὲ καὶ ἡν μηδὲν ἀνιχνεύεται, μηδὲν ὁ πύονος, ἀλλὰ πλήρης ἐστὶν τοῦ φάρυγγος.* i. Quod si sit ita sincerum, vt nigrum appareat, prius hoc est prædictis. Malum item, si nihil expurgetur, neque progrediatur pulmo expurgando, sed plenus adhuc ferueat in faucibus. Est igitur illa rubrarum macularum in pectore superspersio, & τὴν ὀπὸς φθόρον, causæ morbificæ ab ingrauescente peripneumonia, & à pulmone, feri putrescentis æstu fluctuante, cum stertore ad imam laryngem.

lib. 2. progn.

56 Πλευροῦ ἀλγῆμα ἐν πύονι χολώδῃ ἀλόγως ἀφανισθὲν· δείκνυται.

Lateris dolor in sputo bilioso quod immeritò vanuit ; insaniam facit.

prol. 17. f. 2. i.

Coac. 51. lib. 1.

aph. 26. 2.

VETVS ILLVD scitum est. Τα δὲ ὅλα ἐστὶν ἀσήμερος βασιμῆσται· δάκρυον σημαίνει. i. Mortifera omnia quæ abs re mitescunt ; mortem in propinquo esse testantur. Et, Quæ prauis cum signis mitescunt ; mortifera sunt. Multa sunt alia præclare scripta de insidiosa leuatione morborum. Quæ omnia his literis continentur. Quæ immeritò lenantur & leuant ; iis non est credendum, nec conuiescendum. Ecce pleuritis, ipsa per se formidabilis, cum signo terrifico, nempe sputo bilioso mitescit, atque omnino vanescit, vt iam nulla amplius superesse videatur. Est igitur insidiosa eius leuatio. Quas autem faciat & parer insidias, in hac prognosi docetur.

LATERIS DOLOR] i. Pleuritis lateri dolorifica per inflammationem systrophicam membranz costis intextæ, & ab ea doloris molestia, hîc & alibi nomen habet.

Coac. 7. huius cap.

lib. 3. me

reor.

& Coac. 10.

huius cap.

Coac. 14.

huius cap.

CVM SPVTO BILIOSO] Non quidem à bile sputo exactè permixta, quod tertio die cœptum mitificari & expui, citas facit discessiones ; nec verò in pleuritide biliosa simul & sanguinea, quæ vt plurimum nono vel vndecimo iudicatur, ac præter ceteras sanescit perfectè atque simpliciter. Sed cum sputo bilioso flauo & mero, quod scilicet pituitæ non est permixtum, nec sanguini ; atque idem caret suo naturali sero quo naturaliter vnusquisque humor diluitur. Vnde significatur pleuritici humoris prauitas, eiusdemque cruditas, cum perennitate rheumatis concitati ab hepate, & hepatitis impuritate.

prol. 22. f. 2. i.

QVI VANVIT IMMERITO] Non critica lege quieuit, cum expurgatione cita, liberali, & libera, sputi boni & laudabilis, quale iam diximus : id enim significat, δόρυς, ἀσήμερος, μή κ' ἴδω, ἀσήμερος, vt in co. Δίψα ἀσήμερος λυγίστη ἐν ὀξείῃ· κακόν. i. Situs sedata immeritò, in acutus, malo est. Vbi Galenus author est ; sitim abs re sedari, manente scilicet causa sitifera, quam vacuatio critica deiectionum, sudoris, hæmorrhagiæ non sedauit, nec artificium medici ad imitationem naturæ comparatum. Sic & hoc loco, pleuritis in sputo bilioso, sine causa vanescit, cui natura nihil opis attulit, nec adiumenti, nec etiam mitior diligentia & industria medici, quam adhibet vacuatione & neoterismo ; per phlebotomiam, forum, dietam, & pharmaciam tum catharticam, tum anacatharticam.

Coac. 99.

1. lib.

prol. 5. f. 3. i.

INSANIAM FACIT] Hæ sunt insidiæ quas facit & parat lateris dolor, sine causa, & prauo cum signo vale dicens. Nam biliosus & efferus humor, per orgasmum ciet anadromen, quæ non anrè subsistit, quàm ad cerebri arcem peruenerit, vbi mortifera edit omnia, si exitum citò non habeat per hæmorrhagiam. Ac primùm bilis flaua ad caput translata, ibique fluctuans æstu ; phrenitidem parit, mox insaniam : quod eius in atram facilis mutatio sit. Sunt autem aciores morsus bilis atræ, quàm flauæ. Nota est illa prognosis. Phrenitici, sputatores, fanatici, vel insani ; etiãne tremuli ? Quid autem inter phrenitidem & insaniam interfit, dictum est alibi multis in locis. Hîc pensum meum absoluisse videbor, si nonnulla scripsero super philologia huius prognoseos. Primùmque, quod verbum ἐξίστημι, per metonymiam legi debet, nempe afflicti pro afflictione, quod Galenus nimium auceps verborum, solœcismo tribuit explodendo. Sed tales solœcismi sexcenti leguntur apud Hippocratem, qui tamen non sunt explodendi, sed ex diancæ præceptoris fideliter & religiosè interpretandi ; ne optimarum rerum sic traditarum fructu opratissimo careamus. Alterum est super illo participio ἀφανίζω, quod quidem, sicut verbum ἀφανίζω & ἀφανίζω, vnde venit, accommodatur semper leuationi, vel insidiosa, vel etiam falsò creditæ : sicut πάντες, πάν, & πᾶν ; leuationi veræ quæ sit εὐσήμερος, καὶ κ' ἴδω. Sed inter ἀφανίζω & καταμολυνέω, quorum vtrumque dicitur de iis quæ tum insidiosè, tum falsò leuantur, hanc differetiam ponit Galenus ; quod illud sit repentinæ & subitæ leuationis ; hoc verò tardæ & lentæ. Atque hæc Galeni distinctio legitur comment. ad illam sententiam, quam tamen codex Græcus Galeni ad Hippocratis opera, distinctam non habet : sed commentarij literis minutionibus excusam, in eoque confusam. Est autem hæc. Τα ἐπὶ δύνα, ἀκρίτως καταμολυνέωτα· φλαῦρα. i. Quæ dolorifica sine crisi residunt (loquitur enim de parotidibus) praua sunt.

comment. ad prol. 76. f. 3. i.

57 Οἱ διὰ ἐμπύησιν πυρελοὶ διαλείποντες· ἐφιδρωῦντες οἱ πολλοὶ εἰσιν.

Quæ à suppurato febres quiescunt, sudatiunculam multa habent.

Coac. 38. & 39. huius cap.

ENIMVERO spei plenum est empyema vnde febris ægrum dimittit, ipse autem cibos concupiscit : ac pus educit facillè, nihil olens, album, æquale, & læue. Mortiferum autem quod febrem infert, sitim, & cibi fastidium, atque pus edit liuidum aut viride, spumans & feruidum. In incerto res est, quando ab empyemate, ipsa quidem febris quiescit, sed inde sudatiuncula exudat circa iugulum atque pectus. Quemadmodum autem sic fiat, iam ad demonstrandum aggredior.

aph. 46. 47. 48. 49. 50. lib. 4.

QVÆ A SUPPURATO FEBRES QUIESCUNT] Græcè est, δι' ἐμπύησιν, i. propter suppurationem vt suppuratione causa fit febris vale dicentis, & quiescentis. Quiescit autem : quoniam symptomatica erat systrophica phlegmones dum manebat ; nunc ea concocta, & in suppurationem conuersa puris admodum mitis, quale suprâ descriptum est ; & laxitate comparata dolorificæ tensionis ; mirum videri non debet si proritatione omni sedata atque restincta, febris ipsa cum dolore discedit. Ac participium illud, ἐφιδρωῦντες, verbumque ipsum ἐφιδρύνω, non est hic intermissæ febris periodicè accedentis, sed quæ perfectam habet discessionem. Talis obseruatio est cum alibi passim, tum in multis aphorismis libri quarti. SVDATIVNCVLAM MYITÆ HABENT] Non illæ quidem exactæ, sed quæ post exoriantur ab empyemate

ab empyemate quod liberè, citò, & liberaliter foras non exit: sed intrus cunctando putrefcit: ut quamvis confectione sit optimam; corruptione fiat pessimum; causamque inferat sudationculæ & horrois quæ vicissim apparent, eaque vicissitudo iam in indicatum transit prænitaris, initio statim huius diuini operis. Ac sudationculæ & horrois causæ vnde veniant, non ita pridem sunt explicatæ. Est autem sudationcula, ἡ δερματίτις, quæ vel toto corpore manat exigua, vel circa iugulum & pectus exudat. Posteriori significationem hîc retinendam duximus: quia vbi sudationcula, ibi morbus: & è conuerso.

Coac. 10.
lib. 1.
protr. 7. f. 2. 3.
aph. 18. 4.

58 Τοῖσιν ἐμπύοις κώφωσις γινώσκει· αἱματώδεα διαχώρησιν σημαίνει. Τούτοις πρὸς τὴν τελευτὴν, μέλανα διαχωρεῖ.

Surditas quæ cadit in empyicos, cruentam excretionem denunciat. Atque his sub finem vite, nigra ducuntur.

QUONIAM sine studio & ardore quodam amoris, nihil in vita sit egregium, atque, ut præclare Xenophon, ἡ δὲ κατὰ δαίμονα τὴν τῆς νίκης, i. victoria nihil fructuosius: tantum adhibui temporis & diligentia, ut, per Dei gratiam, inuenisse me putem abditam nimis & abstrusam veritatem huius prognoscos. Est igitur sic eruenta veritas, & propalam explicanda.

20 SURDITAS] Auditus priuatio, vel interceptio; illa quidem, cessante ab officio facultate, propter exolutionem τῆς ἰσχύος quæ posita erat in firma & solida substantia partis illius cerebri vnde vis audiendi manat; altera autem surditas ab interceptione auditus, sit impedito appulsu τῷ ἀκουστικῷ, i. audibulum, vel, eorum quæ cadunt sub aures; non quidem vitio τῆς ἰσχύος neque δυνάμει; sed eius quod dicitur ἀκουστικόν, per oppilationem meatus auditorij. De qua illud memoriz proditum est. In febre surditas aluum sistit. Multa sunt alia super hac re scripta multis in locis.

Coac. 1. cap. 3. lib. 2.
In Epid. aph. & protr.

QUÆ CADIT IN EMPYICOS] Per afflictionem partium vicinarum, in empyematis sympathiam adductarum, & per propagationem causæ morbificæ ad cerebri arcem preceperis, vnde surditatis vtriusque causa & ratio in mentem venire potest medici disputantis.

CRUENTAM EXCRETIONEM DENUNCIAT] Vellem dixisset αἱμορραγίας ἢ αἵματι ἐκ τοῦ κεφαλῆ, i. profluuium sanguinis, aut stillicidium eius è naribus. Nam surditas non est πικρὴ δεικτικὴς cruentæ: quamvis non sim nescius, nomen τῆς διαχωρήσεως, non pro deiectione semper usurpari, sicut usurpatur διαχωρήσκει. Nam significat etiam quodam loco τὴν ἀπορροήν, quæ toto corpore fit, potionis & cibi. Sed intolerabile esset verbi aucupium, significationem deiectionis cruentæ conuerrere ad hæmorrhagiam, vel ad stillicidium. Sed vt concedam hoc in philologia, quamvis absurdum; inde manabit philosophia longe absurdior, vel sophisma potius, siue sophistica ratio explodenda. Non enim descriptæ surditatis, vel succedanea, vel consecraria esse potest hæmorrhagia: sed parotis potius, quæ cum peripneumoniz, tum empyemati succedanea esse solet, & cuius prænuncia est cum comate surditas. Nam si quis obiciat quod alibi ratum & persuasum esse voluimus. Quibus aures obsurduerunt cum gravitate capitis, hypochondrij tensione, & splendoris offensione; sanguis è nare prorumpit. Sciat is velim, surditatis huius principia causasque duci, vnde signa veniunt ὁμοίᾳ hæmorrhagiæ iamiam futuræ, quæ ceruntur in hypochondrij tensione, & splendoris offensione; quorum illud, sanguinis ad cerebrum concitati; hoc verò consistentis, quod hæmorrhagiam ciet, certissimum est argumentum. Ac surditas quidem cita est quæ aluum sistit, retractione sursum bilis quæ aluum ciebat, indeque surditas venit per oppilationem meatus auditorij, qua impeditur appulsus τῷ ἀκουστικῷ ad sedem & domicilium τῆς αἰσῆς. Hanc verò surditatem exolui docet præceptor, vel hæmorrhagia, vel aluo biliolis excrementis prorupta. Sed ea signa eduntur in ἐφόδῳ naturæ & morbi, saluis adhuc & integris ægri rebus: hæc autem viribus iam effertis vnde incommoda possunt incidere, vel stillicidij sanguinis continenter pigro lapsu euntis, vel dysenteriz diurnioris hepaticæ quam ἐπὶ τῇσι ἐξερσέσιν alibi vocat Hippocrates; illud quidem ab impuritate, & prauorum succorum abundantia in hepate; hæc verò ab hepatis infirmitate & malè gesto officio, quando ipsum tædet sui officij, ἀρρώστῳ vocat Galenus.

comment. ad
aph. 12. 2.

lib. 2. progn. & Coac. 22. huius cap. protr. 7. f. 1. 3. Coac. 7. cap. 3. lib. 2.

aph. 60. 4. & Coac. 13. lib. 1.

protr. 2. f. 1. 3. 6. Epid. part. 7. 4. τῇσι ἀρρώστῳ.

ATQUE HIS] Qui ab empyemate obsurdescunt, & qui deiectionis cruentæ incommoda sentiunt, vel sanguinis è nare stillantis; ab hepatis infirmitate, & hepatis impuritate.

SUB FINEM VITÆ] Mox effluxuræ, quam diutius manere non potis est cum exolutione partium spirabilium & nutritiarum, & cum symptomatica excretionem cruenta, quam refrigeratio sæpe adfert caloris nativi, non secus atque lienteria; cum ab hæmorrhagia profusiore, vel sponte sua, vel aliena, ex æto iam morbo, refectioni operam dare incipiunt conualescentes.

60 NIGRA DUCUNTUR] Vt sæpe fit ab hæmorrhagia, vel ab omni excretionem cruenta; vnde significatur μάλα κακάς τις ἀπαίρων, i. ingens viscetum è natura egressio, nec amplius redintegrandæ. Sed illa nigrore deiectionis, cuiusmodi sit, quæque sint illius causæ, multarum prognoscon argumenta dedit in tractatu περὶ αἱμορραγίας, quem adornauimus ex præscripto authoris. Sed omnium nigrarum deiectionum distinctio diuina est in aphorismis. Quorsum autem fiat commemorata hîc nigrorum deiectionis, planè aperit aph. ille 23. lib. 4. Quibus à morbo acuto, vel diuturno; vel à traumate, aut aliter, multum macrus; bilis atra, aut melancholicus humor subijt, cuiusmodi est sanguis niger; postmodum moriuntur. Vide Galenum.

Coac. 7. cap. 13. lib. 2. in aphor. & protr. Coac. 1. 6. & 2. cap. 13. lib. 2. aph. 21. 22. 13. 24. & 25. lib. 4.

59 Πλευρὸς ἀλγῆμα μὲν πυρετὸς ἡσυχίας σημαίνει πῦρον διὰ ζῆν.

Lateralis dolor cum febre diuturna; pus eductum iri significat.

LATERIS dolor & pleuritis, tametsi frequenter apud Hippocratem, sunt nomina eiusdem morbi; differunt tamen in hac prognosi, quemadmodum in aphorismo illo. Τὰ δὲ χυμῶδες πνεύμαδες, τὴν στήθων, πλευρῶν. i. Hyeme pleuritides, dolores item pectorum atque laterum. Cuiusmodi autem illi dolores sunt extra pleuritidem, considerandum. Enimvero certum est, causam eorum positam esse in tensione & proritatione partis obsessæ. Est autem hæc musculus respirationi vel efflationi dicatus, tum etiam is qui per σωστήριον, connexionem & symphyisin perficit scapularum cum ceruice, dorso, & sterno. Vnde autem veniant causæ dolorum, caput est intelligere ad explicationem huius prognosticos.

LATERIS DOLOR Quem fecit tensio & proritatio musculorum intercostalium, dorsaliū, & scapularium; vel à catarrho, vel à spadone, vel ab utroque spasmate. Nam à catarrhi prolapsu tantavis infertur carnibus, ut sæpe adferat distortionem rhacheos, quæ tollit ipsius naturale ἰσχυρότητος, quo recta sinuoso ductu progreditur à ceruicibus ad os sacrum, facitque ut in alterutram partem, dextram aut sinistram, se inflectat, & σκολίωσι edat contra naturam. Idem catarrhus non raro vitiat τὸ ἰσχυρὸς δὲ ossis sacri ac dorsii, & τὸ ἰσχυρὸς δὲ lumborum atque ceruicis; unde fit patium illarum est sua statione foras vel intro egressarum, κίψωσις & λόρδωσις, ut ita dicam, monstroræ. Sed à spadone dolores laterum foris exortuntur, cum venulæ partium circumiacentium, emulgendo distentæ sunt humore prauo, & varicoso. Nam venæ, attrahendo carnes ipsas præcedunt: vel quando excipiunt τὴν ταυσίωσι crassarum venarum, & fit ἐκχρόσις. Vtriusque autem spasmatismis ratio hæc est, unde lateris dolor infertur. Ac primum fit spasma, indeque nomen habet, quando musculorum fibræ plurimum distenduntur, adeo ut nonnullæ disrumpantur, ac tum à spasmatismis ἐν γὰρ nascitur. Sed ea prægrandis fibrarum distensio accidit ἢ αὐτοματως, i. sua sponte, ἢ μὲν παρὰ φύσιν, i. incidente aliqua foris causa. Ac sua sponte fit, ἀπὸ τῶν ἐνόντων, idque κατ' αὐτὴν ἢ κατ' ἐκτὴν, i. appulsu vel tractu. Atque appulsu quidem, quando exudar alicunde inutilis humor, ipsum verò exudatē, vel etiam expressum caro excipit, atque distenditur. Tractu verò distensio ipsa perficitur, quando ipsarum carniū, venarūque circumiacentium vi attractrice, fibræ musculorum vnà cum venis, ad nauseam vsque replentur, apparētque illa Græcis dicta ταυσίωσις. Quinetiam spasmatismata extrinsecus veniunt, sicut iam posui ex præceptore cuius verba hæc sunt. Nascuntur spasmatismata, tum à labore, tum à lapsu ex casu, tum etiam si quis prægrauē onus lenare conetur, tum à cursu ex lucta, &c. Sed idem præceptor in catalogo symptomatum quæ à τρώματι incidunt, spasma recenset.

CUM FEBRE DIUTURNA Ex quo efficitur, non esse pleuriticam, i. pleuritidis symptomatice: proptereaque dolorem hunc lateris non esse pleuritidis consecutarium. Nam pleuriticorum febris est brevis, ut ipsa pleuritis quæ suo statu non manet ultra 14. diem, sed mutatur in empyema, si careat anacatharsis. Diurnam autem hinc vocat, tum quia longi est temporis, tum quia mitis & lenta: quæ significatio est diurnæ febris, in illo. Τὰ ἐξ αἵματος ἀποπληκτικὰ λευμῶδες, ὅτι πυρετὸς ἡσυχίας ὀλέσθαι. i. Apoplexia quæ citò incidit, alioqui sanabilis, à diuturna febre, mortifera fit. Vbi diurnam intelligit, mitem & lentam, nec apoplecticæ causæ potentem.

PUS EDUCTUM IRI SIGNIFICAT Quoniam à febre illa, suppurabilis humor fit: non tamen suppuratio ipsa, quæ tantum natiui caloris virtute perficitur. Suppurabilis autem fit in spasmatismis magnis. Nam de exiguis illud præceptum est. Εἰς τὸ δὲ ὁπότε ἀδυνάτη γίνηται ἡ σπασματική ἐν τῇ στήθι φλεψί, ἐκ ἐκπύσεως: ἀλλὰ γίνεται φύματα πολυχρόνια. i. Nonnulli cum imbecillia spasmatismata sunt in carnibus aut venis, non suppurantur: sed sunt tumores diuturni.

60 Οἱ φρεκώδεις πυκνὰ, ἐς ἐμπύησιν ἔρχονται: ἀπὸ καὶ πυρετὸς τῶν τοιούτων, ἀλλ' ἐς ἐμπύησιν.

Qui perhorrescunt crebrò, ad suppurationem deueniunt: quinetiam talium febris, ipsos ad suppurationem ducit.

QVOD PLEVRITICI omnes horriduli, fiant & sint empyici per metaplasin pleuritidis in empyema; dictum est abundè suprâ. Hic odiosa esset repetita causæ horrifera commemoratio. Ergo non est dubium quin pleuritici ad suppurationem deueniant, & sint empyici, quando ex insolentia horrore iam perhorrescunt crebrò.

QVINETIAM Præter crebros horrore insultus, unde pus editum significatur, atque dum editur. **TALIVM** Qui perhorrescunt crebrò ἀπὸ τῆς καὶ ἀδείας, sine paroxysmo periodico, & sine vlla dissectione febris: quoniam talium horror cietur ἀπὸ ἐλκῶν, i. ab ulceribus purulentis, non ἀπὸ τῶν ἀγνῶτων, i. à vasis cacochymia febrilis, ut in tertiana, quartana, & ardentè acuta, quæ abeunt periodicè aut criticè, quoties in iis rigor cietur.

FEBRIS Vel ea quæ ultra 14. diem protrahitur in pleuritico cui febris finem non attulit anacatharsis libera

lib. 3. cap. 23. & 24.

lib. 1. cap. 2. & 3. ad lib. 1. cap. 2. & 3.

lib. 1. cap. 2. & 3.

ead. lib. 1. cap. 2. & 3. ad lib. 1. cap. 2. & 3.

aph. 8. & 9. & 10.

procr. 50. & 51.

lib. 1. cap. 2. & 3. ad lib. 1. cap. 2. & 3.

Coac. 37. huius cap. & 2. progn.

aph. 8. & 9. & 10. lib. 4.

charis libera & liberalis. Vel febris, quam nuper legimus ab authore nominatam *ἡγμένην* & *καρδιακήν*. Coac. 33. huius cap. ut alia sit febris idea, quàm eius quæ fuit dum ipsa pleuritis maneret, aut peripneumonia. Est autem hor- roris cōfectaria, non ipsa tamen horrifera. Nunquam enim sit horror quin veniat inde febris per affli- ctionem caloris vitalis qui est in corde. Vbi enim caloris vitalis domicilium, ibi per eius afflictionem à putri humore febris accenditur. lib. 1. epid. visus lib. de febribus & 2. med. 27. 1. 1.

IPSOS AD SUPPURATIONEM DVCIT] Quoniam ad generationem puris necessaria est materia suppurationis preparatio. Efficitur autem talis, à febre; in cuius vacuitate nullum sit suppu- ratum: quia sine febre nihil est suppurabile: quamvis suppuratio ipsa dono febris non fiat; sicut nec vl- lus pepsanus: sed tantum virtute caloris nativi partium solidarum à necesse cordis viuifico recreatarum. Sic in omni suppuracione febrem requirit Hippocrates, ut iam sæpe vidimus tum in hoc tractatu, tum in eo quem scripsit de tumoribus hypochondriorum & ventris.

61 Οἷσιν ἐκ πλῆθους ἀλγήμελος ἀσπλία ὀρθοκλουδοδοὶ ὑπὸ τῆ καρδι- αλγικοί, ἰδρωδέες, ἐχόντες δὲ πρὸς τὴν ἀνδρῶν καὶ κοιλίης ὑγρότερης ἐμ- πύματα καὶ πνύμματα ἰχνοῖσι.

20 Quibus à dolore lateris collapsa fit appetentia cum cardialgia; ac- tum sudores cum facie rubicunda exudant, & aluo liquidiore; iis em- pyemata sunt in pulmone.

HIC ETIAM signa sunt empyematis in pulmone confecti, quæ suprà iam vidimus in illa prognō- si. Quibus, in febre, lateris dolor incidit, siquidem liquidus & biliosis feritur aluus; mitescit: sin autem collapsa ma- neat appetentia, ac tum sudores cum saturato rubore faciei exudent fluente aluo, & manente cardialgia; hi cum diu- tius à peripneumonia agrotarint, moriuntur. Itaque mihi religio esset animum denuo ad scribendum appel- lere super eodem argumento: nisi quædam me inuitarent quæ in commentario proferentur. Coac. 73. lib. 1.

30 QVIBVS A DOLORE LATERIS] Ad vnam vel vtramque claviculam, vbi supra vna, vel v- traque pulmonis ala ægrotat. Aut qui ad mediam costam urget, vbi media pulmonis ala; idque tho- racis parte altera, vel vtraque. Aut qui circa septum transversum exercet, vbi & infera. Aut si dimidia pars tota pulmonis obfessa est phlegmone, omnia quæ adiacent ei parti laborant. Denique lateris do- lor symptomaticus, & signum *καρδιακῆς* inflammari pulmonis: sicut lingua rubra & aspera. Coac. 31. huius cap.

COLLAPSA EST APPETENTIA] Non aliunde quàm à dolore lateris per metonymiam dicto pro ipso pulmone afflicto. Non enim reuera hæc ἀσπλία est *καρδιακή*, i. cōfectaria lateris dolentis: sed dolorifici ipsius pulmonis, peripneumonia laborantis. Ταπεινότης autem scripsit ἀσπλία, i. vacuitatem appetentia, pro cibi fastidio: cum scilicet ægri δυσκόλως καὶ αἰσχροῖς πρὸς τὰ προσφερόμενα, vel, ut alibi scripsit, πρὸς τὰ χυμὰ ἔχουσιν ἀποτροπήν, i. fastidio & contumacia efferuntur in cibos & medicos. Hoc autem cibi fa- stidium propriè ἀσπλία nominatur: de qua satis iam alibi. Sed huius causam agnosco in hac prognōsi πνύματα ἰχνοῖσι alui. 3. Epid. part. 2. lib. 2. Epid.

40 CVM CARDIALGIA] Quam facit impuritas hepatitis, unde prorept serum fenitate pessimum, ad ipsum ventrem, indeque ad orificium eius quod est acerrimi sensus: quod quia veteribus καρδια no- minatur, inde afflictio eius nomen habet τῆς καρδιακῆς. Quorsum autem scripserit τὸ π, vnica in prom- ptu causa est; quod vbi est aliqua sensus infirmitas, ibi tanta sensus sensifixa causæ excitari non potest. Quoties enim, teste Galeno, deriuatiua nomina coniunctum habent illud, π; vel affectionis exigua, vel raro incidentis opinionem faciunt. Sed quorsum τὸ π? etiamne ad maiorem ταπεινότητα? Huiusmo- di est illud. Τὰ καυμάτω δαίρηται, τὸ π ὀλέσθαι. i. Astuosi rigores nonnihil sunt mortiferi. Vide commentarium. 3. Epid. part. 2. lib. 2. Epid.

AC TVM SVDORES] i. Sudatiuncula circa pectus & iugulum: quia vbi sudor, ibi & morbus. lib. 1.

CVM FACIE RUBICUNDA] Quoniam malæ rubent.

ET ALVO LIQVIDIORE] Per cacopragiam ventriculi & hepatis.

EMPYEMATA SVNT PER PVLMONEM] Dextra, sinistra parte, dimidia, vel supra, me- dia, & infera; pro situ doloris: Empyemata sunt cum his signis quæ iam vetustate in tabem transierunt. Vide comment. ad 33. Coac. huius cap. vbi signorum ratio explicatur.

62 Τὰ ὀρθοπνοῖα ποιεῖ ὑδρωπώδεια σπληνέ.

60 Orthopnoeam faciunt hydropiformia dura.

EXTREMVM illud erat de costarum atque pulmonis empyemate, ut eius mortifera signa dice- rentur iamiam futuræ mortis. Nam tabes empyemati succedanea, non est tam citæ mortis quàm ortho- pnoea. Quæ cuiusmodi sit, & quemadmodum incidat, sic ad docendum aggredior. ORTHOPNOEAM] Spirationem illam difficile in qua difficultatis summa sunt omnia: quoniam

spiritus quem ducendo vivimus, nec à larynge & arteria com meatum habet, nec in pulmone multum oppressio sedem inuenit vbi excipiat; ipse autem vapor fumidus, citò expulsi, difficillima expiratione, omni puncto temporis metum adfert suffocationis. Quæ causa est cur non solum residendo, vt in asthmate: sed etiam ceruicem arrigendo, spiritum trahere, quod alibi vocat *ἀνελκυσαι*, verius quam docere cogantur ægroti, quibus ne sic quidem spiritus liberè, sed difficulter admodum per angustias venarum suadit, ob eamque causam orthopnoici nominantur, ab orthopnoea cui nomen dedit ille spiritus modus, cum recta & nullo modo inflexa ceruice. Ac talem spiratione iam vidimus in angina. Quoniam autem natura iustissima est, sui que diligens, viam inuenit qua deducitur ad conseruationem sui, ea collocaione recta thoracis atque ceruicis, vnde fit vt arteria è larynge ducta explicetur, vnaque apophyses eius in pulmonem diuisa.

FACIUNT] Ab oppressione primùm pulmonis, quam facit puris effusi suppressio, mox fistularum arteriarum, pus excipientium, nec expurgantium, repletio; vnde per continuitatem arteriarum distenta larynx vocem edit *πρησθῆναι*, eadem prorsus ratione qua ex pristana inconsideratè exhibita (dolore scilicet nondum laxato, nec spuro sua sponte liberaliter exeunte, sed contrà contumaciter glutinoso, necdum etiam secta vena, foru, clystere, diatra conuenienter adhibitis) homines moriuntur strangulati à stertore & orthopnoea, vel, vt verbis vtar præceptoris, *ὑπὸ τῆς ὀρθοπνοίας καὶ τῆς ἐν τῇ ἀσπληνίᾳ ἀποπληξίας*, i. orthopnoea & stertore suffocati.

HYDROPIFORMIA DVRA] Quæ sunt hydropis similia, i. *τὴν ἀσπληνίαν*, vitem aqua repletum vel inflatum referencia: quæ similitudo nomen dedit hydropi, tam tympaniæ, quam ascitæ, vt docet Galenus. Hic autem quæ similitudo esse potest in thorace sicut in ventre, vtris vel inflati, vel aqua repleti? Summa nimirum distentio ex nimia humoris abundantia, quæ latitudinem tollit thoracis in dorso & præcore, ipsumque totum facit teretem, vtris modo distenti. Ac talem infert distentionem *πνεῦμα πληθύνει*, i. pulmo repletus: de quo hæc leguntur apud Hippocratem: *Ἡ πληθὺς ὁ πνεῦμα, βῆξ ἐξ ἧς, καὶ ὀρθοπνοία, ἔσθλαμα*. i. Quoties oppletur pulmo, tuus habet, & orthopnoea, & asthma. &c. Illic memoratur etiam pulmonis hydrops, quem appositi vocat *ὕδρωπις*, non *ὕδρωπις*, vt in hac prognosi. Est autem durum illud *ὕδρωπις*: tum quia siccum à spuri vacuitate, vnde laxitas nulla doloris, nec partis afflictæ; tum quia distentum nimis atque prætumidum. Nam à concreione, nulla suspiciò duritatis, nisi *καὶ συμβεβηκός*. Ac tales moriuntur ad circiter quartum diem agentes. Illud enim significat. *πρωτῶν μάλιστα*. Sicut nos ex Galeni commentario annorauimus ad illum locum Hippocratis de luxata inferiore maxilla. *Οὗτοι οὐκ καὶ θνήσκουσιν, μάλιστα δεκάτῃ*. i. Moriuntur ad circiter decimum morbi diem, hoc est, nono vel vndecimo. Sic & hic, ad circiter quartum videlicet tertio, vel ad summum quinto. Illud enim significat *μάλιστα*.

63 Τὰ ἀσπληνία μὲν πάντα ὀχληρὰ γίνεσθαι, καὶ πόνοις τ' ἐν δόρχει σπληνόνις ὀρέχει, καὶ ἔξ ὑπέρβηνις ὑπομιμνήσκῃ. δυσκολώτερά δὲ τὰ ἐν δώρχει· μάλιστα ὅταν κινδυνώουσιν.

Omnes quidem auulsiones infesta sunt, doloresque inferunt circa initia sauos, ac nonnullorum memoriam de integro renouant: grauiissima autem circum thoracem, omniumque maxime periculosissima.

ERAT ex illis quæ primùm in pleuritide sicca præcepit, nū sine spasmate, an verò cum spasmate maneat sicca pleuritis. Ac melius ire res ægri, si pleuritis sicca coniunctum habeat spasma, quam si eo careat. Hic prudens correctio adhibetur illius prognoseos.

OMNES QUIDEM AVVSIONES] Quas facit fortis fibrarum tensio. Sic enim Galenus. *Τὰ ἀσπληνία*, inquit, γίνεται ἐπὶ τῇ ἰσχυρῇ μὲν, ὅταν πλεονέχῃται. i. Auulsiones sunt, musculorum fibrarum plurimum distensio. Atque illa tensio fortis accidit vel à tramatè, labore, lapsu, casu, & si quis graue onus levare conetur; vel *ὑπὸ τῆς ἐνδότητος*, i. ab humore prauo, ichare, & flatu; idque *κατ' ἀσπληνίαν*, i. appulsu vel stractu. Quæ omnia non ita pridem fufius disputata sunt, vt ea tantum attingere sufficiat, quæ huc pertinerent maxime videantur.

INFESTÆ SUNT] Tum propter negotium quod faciunt parti auulsæ, tum propter *σπασμὸν* doloris quem ipsa prægrandis tensio excitauit.

DOLORES INFERUNT SAUOS] Quorum *σπασμὸς* nisi exolueretur breui, vt certè à flatu exoluitur; & citò vires ipsas exolueret, & citam quoque mortem adferret atque crudelem, ex offensione partium officialium. Vetus est illud. Nihil æquè facit corpus infirmum atque dolor, & ad infirmitatem corporis adiungit etiam humorum corruptionem: vnde *συντιμία* perennis malorum.

CIRCA INITIA] Similiterque exortæ sunt auulsiones: citò autem exoriuntur sua sponte: quoniam cità venit tensio illa prægrandis: quod cernere est in musculorum suræ auulsionibus, quæ vulgò dominant (guttas crampas) quæ cruciatu sæui doloris sunt, penè intolerabiles.

AC NONNULLORVM MEMORIAM DE INTEGRO RENOVANT] Idque vel superflue partium auulsarum querela, quæ semper à spasmatè manent infirmæ; ac dolent; vel etiam *ἀπὸ τῆς ἐνδότητος*

Coac. 2. cap.
12. lib. 2.

tionem, à diatræ vitio in victus ratione & vitæ instituto : præsertim verò iuuenibus à 18. ad 35. ætatis annum. Cæteris autem, ab oppressione quam fecit suppressio familiaris & solita vacationis. Huiusmodi sunt præter cætera, dolorifica lumborum mala quæ non sunt ampliùs, vt solebant, per vterum menstrualibus, aut hæmorrhoidis per anum, sanguisua.

hist. 12. part. 3.
3. Epid.

VNA QVE FEBRIS MVLTÀ] Quæ motus edit celeres, continuos, & vehementes; nata è sy-
strophica phlegmone ipsius pulmonis, quam fecit anadrome ibi subsistens, vel repletio particularis, vnde affectio illa; cuius tamen si propria est sanguinis vacuatio per hæmorrhagiam pulmonis; tamen nõ
adimit febrem: quia inflammationem non tollit. Est enim ratum illud ex historia de Larissæ virgine;
quod etsi plethoræ propria vacuatio est hæmorrhagia: tamen ea plethoricam affectionem non tollit,
si cum inflammatione, vel cum maligna qualitate coniuncta sit. Atque huius theorematris veritas sæpe
iam patuit.

AC DOLOR EST CIRCA MAMMAM, THORACEM, ET DORSVM] Hæc sunt argumenta cum febre *ῥοιδῆ* inflammationem pulmonis superatum & mediarum alarum quæ adiacent
mammis, thoraci, & dorso: quarum inflammationem non sustulit profusa per os hæmorrhagia; vt symptomata
esse videatur sanguinis à febre catullientis & orgasmum habentis. Est autem iam illud positum,
quod omnis anadrome ibi morbum facit, vbi subsistit.

QVIBVS HÆC OMNIA QV IDEM ADSVNT] Hæmorrhagia, febris, dolor circa mammam,
thoracem, & dorsum.

CONTINVO MORIVNTVR] Profluvio nectaris viuifici, & cordis exhausto, per hæmorrhagiam;
marasmo viuacitatis & humidi primigenij, à febre. Tum vacatione officij quo vita carere non
potest, per afflictionem partium spirabilium, thoracis atque pulmonum: vt interim taceam cruciatum
sæui doloris nobilium partium, qui & citò vires exoluit, & citam mortem infert atq; crudelem. Enim-
vero pestifera est omnis quæ non iuuat hæmorrhagia. Nam vnde natura commecatum parat quo se
tuetur & sustinet, inde eo defraudata labascit. Atque in sanguine focus est vitæ. Sed illa demum funesta
est hæmorrhagia, quæ causam post se relinquunt mortiferam; videlicet inflammationem & febrem
acutam; vnde maior consumptio fit humidi primigenij septē diebus, quàm à calore natio septuaginta
annis. Cæterum, quæ vis maior vitæ adferri potest ad citā mortem, quàm ea quæ tollit vitale officium,
respirationem scilicet? Quod facit pulmonis inflammatio, & thoracis oppressio. Ergo non sine causa
continuo moriuntur.

QVIBVS VERO NEC OMNIA, NEC VEHEMENTIA; SERIVS] Pro analogia causarum mortiferarum.

aph. 3. 2.

QVAM LONGISSIME AVTEM, QVATVORDECIM DIES INFLAMMANTVR] Nõ
vltra quatuordecim dies vitam ducunt, nec seriùs vitam finiunt morituri: quoniam acutorum morborum
finis fit intra decimum quartum.

malè legebat
ur, ἁποτομῶν.

65 Τοῖσιν αἷμα πύοισιν· ἀπυρέτοιςιν ἐὶ συμφέρει, καὶ βήσαςιν, καὶ
πυνέειν ἐλαφρότερον, καὶ τὸ πύελον παχύνεσθαι πρὸς τὰς δὲς ἐπὶ α. πυ-
ρέσαςιν δὲ, καὶ βήσαςιν, καὶ πυνέειν σπυγνῶς, καὶ αἷμα πρὸς φάλλον αἰ-
πύειν· ἀσύμφορον.

*Sanguinem expuentes iuuat esse febris expertes, ac tussire leuiter, at-
que dolere; ipsum verò sputum crassescere ad dies bis septem. Sed febricitare multum, itémque tussire atque dolere, tum sanguinem subinde nouum expuere; calamitosum.*

1578.

HÆC PROGNOISIS desperato iam mihi ab hæmoptysi, velut salutis auram afflavit, per gratiam
misericordis Dei qui noluit seruum suum immisericorditer ægrotare. Sed vt aggrediar ad enarrandum.
Commemorantur hic signa sanabilis aut insanabilis *αἱμοπύωσις*, quæ ipsa per se nihil valet: sicut præcep-
tor monuit in illo aphorismo. *Αἷμα αἰσθεῖται μὲν, ὁ καὶ οὐκ ἔστι κακόν. i. Sanguis superne, qualiscunque fuerit, malus.*
Antithesis autem signorum quorum iam ratio patefacta est superiore prognosi, planum faciet quò
deuentura sit ipsa hæmoptysis.

aph. 13. 3.

Ergo, SANGVINEM EXPVNTES] Qui tussiendo expurgant, non spurando, nec excreando
è faucibus, vel è palato, aut gingiuis. Expurgant autem tussiendo, sanguinem non spuro permixtum, sed
floridum, spumantem, copiosum: qualis esse solet quæ ex pulmonibuseductio fit, non ex arteria.

I VVAT] Prodest, confert, i. multum opis & adiumenti adfert, tum ad vsum atque dulcedinem diu-
turnioris vitæ, tum verò ad spem retinendam salutis.

ESSE FEBRIS EXPERTES] Quia febris vacuitas non facit marasum & consumptionē vitalis princi-
pij in humido primigenio; nec verò corruptionē inducit ac paupertatē viuifici nectaris: quæ omnia sunt
febris incōmoda: ipsa verò febris vacuitas nullā subesse testatur exulcerationē, nec phlegmonem: quæ
duo imprimis

duo imprimis terrifica esse solent. Denique talis hæmoptysis nullam post se relinquit mortiferam causam, nisi forte ipsam venarum anastomosis, vel etiam *πύλιν*: quarum tamen credibilis est redemptio cum cessat hæmoptysis.

AC TVSSIRE LEVITER] Græcè est *ελαφρῶς*, i. alacriter, ut nulla sit tussis molestia, quam facit assidua fortisque contentio siue concussio, & irrita prostratio quæ sursum deorsumve intruit.

ATQUE DOLERE] Vel potius, ne minimum quidem: si tantum exceperis *ἀσπασίαν*, & quandam segnicieci artuum totiusque corporis, quæ homines facit *ἀσπασίαν*, unde Latinis nomen inuentum est ægri.

IPSUM VERO SPUTUM CRASCESCERE] *Παχύνεται* legendum duxi *ἀπὸ τῆς λεπιδώσεως*, i. tenuari: in cuius verbi examine nulla occurrit æquitas ut sic legatur. Crassescit autem vel crassiusculum fit atque mitescit, ad exitum faciliorem, & exethisimum minorem, aut nullum; permixta exactè sanguini pituita, virtute caloris natiui coquentis & permiscantis. Necessario autem sputum crassescit, feritate domita, & pituita exactè permixta.

AD DIES BIS SEPTEM] Vel quatuordecim, quorum historia omnis exigitur in expurgando spuro cruento, ne quid, stabulando in bronchiis, corrumpatur. Ipsum verò sputum paulatim exiit colore sanguineo: quia quò longius abest ab hæmoptysi, eò pauciore sanguine perfusum apparet, donec ventum sit ad 14. quo cessat omnis expurgatio spuri cruenti in dies diminuti.

SED FEBRICITARE MULTUM] *Ἄστυ* incandescere, cum siti, vigiliis, iactatione, micantium venarum inæquali pulsu, & urinis rubentibus.

ITEMQUE TVSSIRE] A prostratione perenni, sursum deorsumve irrupta; quæ fortem infert, assiduam, atque permolestam thoracis concussionem.

ATQUE DOLERE] A perceptione velensione tot rerum naturæ grauium, & aduersarum.

AC SANGVINEM SVBINDE NOVVM EXPVERE] Patefacta de integro via exitui, per erosionem, *καὶ ἀγέρωσιν*, aut etiam *καὶ ῥήξιν*, ἢ καὶ ἀσπασίαν; sanguinem autem merum, i. alienæ mixtionis experem, floridum, & spumantem, qualis apparuit circa initia.

CALAMITOSVM] Quoniam pessima est consuetudo effundendi sanguinem per os, quantumvis optimum; præstatque pessimum nigrum per sedes inferas vacuare. Est autem calamitosa, ne dicam funesta, sanguinis sursum prorupti exclusio; quæ præter summam, quam infert, virium infirmitatem, adhuc relinquit mortiferas causas, febrem, inflammationem, vel vlcus. Animaduertet autem studiosus, idem esse multum febricitare, quod, superiore prognosi, multa febris, & inflammari ad dies 14.

66 Οσοισι τὸ πλεῦρον μετέωρον, καὶ θερμότερον, ὅταν ἐγκεκλιμένοι σιν ἐπὶ δάττον, βάρος ἐξηρτηῖται δοκέει. Τύτοι σιν τὸ πύον ἐκ τῆς ἐνὸς μέρεος ὄσιν.

40 Quibus intumuit latus atque incaluit, si cum in oppositam partem decumbunt, graue quippiam suspensum esse videtur; pus ab una parte collectum est.

SEQUITVR ut empyemate factò à pleuritide (nam hîc peripneumoniz locus non est) quàm primum pus exeat; conclusumve sit in vomica, vel in thoracem effusum. Exit autem vel sua sponte per anastomosis quam facit thoracis concussio & fumidi vaporis efflatio, per interiora pulmonum spacia quæ sunt arteriæ bronchia: vel qua data porta foras, medici artificio pyroticum adhibentis. Eiusmodi sit artificium, ut ne quid in commoda ægri peccetur: sed *κατ' ἔξιν* puris, i. è directo, non *ἀνὰ πάλιν* è diverso, pyroticum adhibeatur: prout dextra aut sinistra, & utrobique, supera, media, aut infera scite, pus abditum stabulatur. Eius inuenienti ratio præcipitur in hac prognosi. Nam cognitionis & scientiæ *περὶ μετέωρον* suprâ sunt posita; cum scilicet mitatio sit, aut etiam facta est; inflammationis pleuritice & peripneumonice in empyema. Hîc tantum argumenta ponuntur, quibus, tanquam odora canuta vis, eò deducimur ubi iacet lepus.

Ergo. QVIBVS INTVMUIT LATVS] Copia puris oppressum atque distentum, unde alterius lateris inæqualitas in quantitate: quemadmodum vniuersi thoracis æqualitas contra naturam, ex nimia humoris collecti abundantia quæ latitudinem ipsius tollit in dorso & pectore, ipsumque totum facit teretem, utris modo distentis speciem quandam exhibet hydropis duri, cuius consecutaria est orthopnea. Illud autem *μετέωρον*, ad lateris tumorem accommodaui, exemplo illius. *Οκώσισιν ὑποχόνδρια μετέωρα*; ubi Galenus author est, *μετέωρα* dici, ἐν ὅποις μείζονι καὶ πλείονας αἰτίας γηγρόμενα, i. quæ scilicet in mole maiorem, multis de causis, assurgunt. Sed tamen aliud est *περὶ μετέωρον*, quod significat *μετέωρον αἰετίζον*, i. spirationem sublimem, vel è sublimi ductam, quam quisque vel eminens in alio cernit, multum explicato sursumque adducto thorace & scapulis. Aliud est autem meteorismus in illo. *Χρητὴν αἰετίζον*, i. oportet ægrotum alacrem esse assurgendo, vel residendo: idque sua sponte, non autem à spiritus meteorismo coactum, ut in peripneumonia.

Galenus lib. 2. progn.

Coac. 6. lib. 2. huius cap. aph. 74. 4.

progn. 6. lib. 2. progn. 29. lib. 1.

ΑΤΩΕ ΙΝΑΛΥΤ] A pure recens confecto quod impressionem adhuc retinet caloris febris, vel ab eo quod vetustate putrescit, unde ardoris cuiusdam sensio excitatur in socia parte atque vicina. Vetus est illud. Τα σπύα καὶ τὰ ἐγγύς πορρωτά καὶ μάλιστα κακοῦται. i. Quae socia sunt atque vicina, primum et maxime mutantur. Atque in lateris calore febrili cernitur inaequalitas in qualitate, quam esse docuit tumens partis afflictæ. Notum est illud. Ολον ἐν τῷ σπύματι τὸ θερμόν, ὡς αὐτὸν ἢ ὕδωρ. i. Vbi multus calor firmiter fixus inest ibi et morbus. Sed eam τὴν μὲν inaequalium partium in substantia, quantitate, & qualitate, iam pridem vidimus in hypochondrio.

ΣΙ CVM IN OPPOSITAM PARTEM DECUMBUNT] Sic illud τὸ πρῶτον, consulto vertendum duxi, ut sana pars intelligatur, ac nihil à se mutata, quæ afflictionis alterius partis particeps non sit, obstante recto septo ipsius thoracis, quod mediastinum vulgò dicunt. Galenus membranas esse dicit, ut ipsa quoque docet anatomie, quæ recta thoracem intersepiunt, peruaduntque à sternò ad dorsum; atque ipsum thoracem diuidunt in duos veluti sinus.

GRAVE QUIPIAM SVSPENSVM ESSE VIDE TVR] Tanquam è parte afflictæ propendens, quod super septo illo recto thoracis incumbit: ut non minùs graue sit decumbere in sanam partem, quàm in eam quæ adiacet morbo; illic enim suspensione dolorifica; hîc autem oppressione suffocata, vis morbi augetur: propterea quæ decubitus grauis est ac permolestus. Facilior est autem qui sit in dorsum, & quo supini iacent ægroti. Ac talis collocatio est in hac valetudine quidem, κατὰ λόγον naturæ iustissimæ, sui diligentis; in alia verò, ὡς ἐξ λόγον. Naturaliter enim tam sani quàm ægri decumbunt, suo commodo, in alterutrum latus. Notabile est autem quod scripsit, *grauē quippiam*: primum quia grauitas succedanea doloris acuti, signum est syllogisticum pleuritidis in empyema conuersæ. Deinde verò: quoniam semper ibi focus est morbi reapse, ubi excitatur sensio grauitatis. Nec idem spondere ausim de cæteris dolorum generibus, quorum perceptio sæpe fit per contagionem siue sympathiam.

PVS AB VNA PARTE COLLECTVM EST] De qua dubitandi locus non esset in hac empyematis perspicientia, si medicus exactæ pleuritidis historiam tenuisset. Nam ubi regnauit pleuritis, ibi abstrusum quoque succedaneum empyema.

67 Τοῖσιν ἐμπύοισι τὸ πνέμονα καὶ κοιλίῳ πῦον ὑποχωρεῖν, θανάσιμον.

Empyicis à pulmone; pus duci per aluum, lethale.

QVÆ IN ANGVSTO spes erat dum peripneumonia regnabat, nondum planè occidit; sed affulget melior, quando succedaneum est empyema quale iam demonstrauius esse bonum. Id enim medium est inter citam perfectamque crisin, & desperatam salutem. Ac sanè quibus ab empyemate, statim ipsa febris discedit, & concupiscunt cibos, ipsum verò pus editur album, æquale, nihil olens, & læue; atque tum aluus pauca, mollia, & figurata excernit; confestim seruantur. Sed in empyemate bono, ut ipsum suo pepasmo, & grauiorum symptomatum remissione nos consolatur: sic metu exterrēt, periculi que locum subesse testatur, si vacuationem sui non habeat citò & liberè ὅς τ' ἀσμερόντων χρεῖται, i. per loca lege natura commoda, nec ex euentu incommoda. Sic nuper vidimus peripneumonicum morbo defungi, si parotis inde nata suppuret fistulamque edat rupta vomica pus effundente. Idem quoque vidimus in abscessu phlegmones hypochondriacæ. Quia nō minor cautio est in puris exitu, quàm in suppuratione ipsa. Malum pus, quacunque foras exeat, desperationem adfert. Idem penè facit bonum descriptum, si per incommoda loca exitum moliarur. Qui certè scopus est prognoscos instituitur.

Ergo. EMPYICIS] Quibus à phlegmone, facta est puris vomica intra thoracem. Tales enim soli dicuntur empyici.

A PVLNONE] Quem tenuit systrophica inflammatio, quæ inde nomen sibi adoptat, & peripneumonia nominatur. Ipsa verò, nec sua sponte quieuit per anacatharsin, nec artificio medici curationem recepit; & tamen validarum ægri virium beneficio, qui antè non occidit, exacto 14. die mutationem, vel potius metaplasin habuit in empyema.

PVS DUCI PER ALVVM] Eodem planè modo quo ex peripneumonia, dum ipsa regnat, fertur aluus biliosis excrementis, unde materia & occasio præripitur futurorum abscessuum qui sæpe ex peripneumonia oriuntur, vel sub auribus, vel in crure. Nam si phlegmonicus humor peripneumoniz ad inferas alui sedes cursum inflectit, & illac excernitur; quidni faciet idem, pus empyematis in pulmone concepti? Est quidem insuetum iter, fateor: sed non tamen ignotum: sicut nec illud etiam per quod vrinæ redduntur stranguriosæ, purulentæ, abradentes, nec sunt tamen nephriticæ; ut fortasse quispiam existimaret: sed tales reuera ex morbo quarundam partium diaphragmate superiorum, ut secundum Hippocratem rectè Galenus annotauit, viamque aperuit quæ illæ ferantur. Quid verò? nonne huc spectat quod scripsit Hippocrates? *Maximum et visiosissimum signum affulxisse salutis in spe angusta, ob febris absinthiatem, eximium cibi fastidium, et malignam alui proluuiem; quibus repente in stranguriam conuersio facta est*: unde homines illi symptomatis omnibus periculosos defuncti sunt. Vbi Galenus author est; viria vniuersi corporis æquè per vrinas atque per aluum expurgari. Ac fuit profectò illud iudicium præceptoris, auctore Galeno, naturam scilicet viam inuenire qua se expediat humore morbifico, quamvis & ipse crassior sit, &

hor sit, & meatus angustiores: modò validæ sint eius vires, ad fortem in depellendo & propulsando contentione. Et verò idem scripsit, naturam moliri abscessus per ossa: hydropicorum aquas refluerere ad intestina: empyicis, anacatharsin fieri puris in thoracem effusi. Quæ omnia sunt fusiùs disputata ad illam prognosin. Quæ sit è diverso hæmorrhagia, prava est: ut in liene magno, è dextris: eoque similiter in hypochondrio. Cuius sententiæ authorem statuit Galenus Hippocratem: quamvis prorrhethico & Coacis belum indixerit, ubi tantum legitur; alibi nusquam, quod sciam.

2. Epid. part. 2.

Coac. 2. cap. 13. lib. 2. comment. ad 31. progn. lib. 1.

10 **LETHALE**] Siue mortiferum. Tum ex peruerso conatu naturæ, cuius irrita fuit contentio ad anacatharsin. Hic enim commodior esset faciliorque ad exitum via per vrinas, quæ tantum stranguriæ fugacis molestiam exhiberet; nihil autem negotij faceretur naturali œconomix: sed contrà, multum opis adferret ad perfructuosos cibos, quod illis Thasiis contigisse modò scripsimus. Tum verò puris ductus per alnum, coquendi vim labefactat in ventriculo, distribuendi in ieiuno; excernendi naturaliter in crassioribus intestinis. Hinc maligna venir alui proluuias, ac dysenteria: quæ, fractis iam viribus, immisericorditer ægrum exercet. Denique afflicto iam multum empyico, omni spelabi contingit: quando œconomia naturalis labascit. Ac talis adducta est ratio ad illam prognosin. Abscessum hypochondriacorum, lethales sunt illi qui pus effundunt intrò, &c.

lib. 1. progn. & Coac. 8. cap. 11. lib. 2.

68 Οσοι τρανέντες ἐς τὸ θώρακα, τὸ μὲν ἐκτὸς τοῦ τραύματος ὑγιάνουσιν, τὸ δὲ ἐντὸς, μὴ· κινδυνώουσι ἐμπυοὶ γίνεσθαι. ὅσοις δὲ αὖ ἀδενῆς ἐνδοθεν ἢ ἐλὶ γλῆλαι· πνιδίως διαρρήγνυται.

Quibuscunque sauciatis thorace, foris quidem truma sanescit, intus verò non; periclitantur empyici fieri. Et quibus tenera est intus cicatrix, disrumpitur facile.

30 **HACTENVS** sancitæ sunt leges super empyemate cuius origo est pleuritis aut peripneumonia: sicut suprà ostēdimus. Ecce nunc aliud quod venit extrinsecus à trumate ipsius thoracis. Ergo ex quinque generibus nozarum corporis, duo hīc sunt posita: vnum à τὸ ἐξ ὀστέων, quod reuera quatuor illa continet; cum quid intra se corruptum est, ut cancer, abscessus, humor; cum quid innatum est, ut calculus in vesica & renibus; cum quid increuit, ut vena transiens in varicem; cum quid deest, ut ren vel testis. Hæc enim reapse omnia sunt ἐξ ὀστέων, pertinentque ad illud perceptum Hippocratis quo statuit omnes morbos nasci partim à τὸ ἐξ ὀστέων, partim à τὸ ἐξ ὀστέων. Sed ex illis quatuor generibus τὸ ἐξ ὀστέων, illud proponitur; cum quid intra se corruptum est. Quod in empyemate, pleuritidis succedaneo locum habet. Nam à τὸ ἐξ ὀστέων fit etiam empyema, videlicet à τὸ τραύματι, ab ictibus: cuiusmodi hoc est quod legitur in hac prognosi. Ictus enim qui vulnus facit in thorace, collisumve id fuerit aut discissum, si non rectè curetur, mortiferi empyematis causam infert. Atque scopo eo quem initio posui, scripra hæc decisio est à præceptore 1. lib. de morbis; quam scholæ Coæ magistri huc transtulerunt. Sed aliæ sunt αἰτίαι ad bene curandum necessarie, quæ proferentur in philologia & philosophia huius prognoscæ.

Cels. lib. 4. cap. 26.

lib. 1. cap. 1. videri.

QUIBUSCUNQUE SAUCIATIS THORACE] Quibus in thoracem vulnus illatum est, amplitudine diuisionis magnum; collisumve id fuerit, tantumve discissum; & quod non in summa tantum est parte, sed penitus penetrauit. Atque ut loquitur Hippocrates, ἢ ἀπὸ δόρατος, ἢ ἐκ χειρὸς, ἢ ὀπίσθας, ἢ ἐξ ὀστέων, i. vel hasta, vel pugio, vel telo intrò sauciati fuerint.

ibidem.

FORIS QUIDEM TRUMA SANESCIT] Obducta cicatrice, unde non amplius ipsum vlcus διαπύλω, ἐκ δὲ αὖ τὸ ἀρχαῖον τραύμα, i. spirationem edit vltro cutroque per primigenium vulnus quod ictus fecit; neque illac frigidum foris ad se adducit; neque foras calidum vaporem fumidum à seipso excludit; nec verò pus ipsum expurgat ἐν πύλω, ex facili. De trumate autem, quid sit, & quemadmodum intelligi debeat apud Hippocratem, dictum est suprà ad illam prognosin. A trumate, conuulsio exorta, mortifera. Hic certè significat diuisionem cutis, membranæ, & carnis, quam medici vulnus dicunt.

ibidem.

Coac. 9. cap. 14. lib. 2.

60 **INTUS VERO NON**] Ad superficiem inter nam tunicæ costis intextæ, quæ difficiliter coalescit quàm caro, ac ne vix quidem: quoniam difficilior est membranarum συνέκρσις, quàm συναρρώσσις carnis: ubi facillè succrescit caro quæ interuentu suo cicatricem cuti obducit; constantem mixtionem membranæ & carnis, & adhærescit ad carnem, cui non est coibilis membrana costis intexta. Hinc difficillima membranæ illius vulneratæ coitio. Nam si coiret vulnus pariter æqualiterque, tam intus, quàm foris; ipse vulneratus & saucius, omni ex parte sanesceret, essetque in tuto, ac redintegratus omnino parte, non esset illi verendum de malo proposito. Est autem hoc.

lib. 1. cap. 1. videri.

PERICLITANTUR EMPYICI FIERI] Sic Hippocrates loco prædicto. ἢ δὲ τὸ μὲν ἐξ ὀστέων, ἢ δὲ αὖ τὸ ἐξ ὀστέων, i. si vulnus foris quidem sanum sit, intus verò non sanum; purulentus fit saucius. Magna hīc certè morbi metastasis, ex qua periclitantur magis de vita sauciati, quàm ex vulnere ipso, quamvis amplitudine magno, & officij præstantia partis vulneratæ: ut verum illud sit quod Hippocrates memoriæ prodidit. Τα μὲν ὅτι κακὰ, αἰτία κακὰ γίνεσθαι. i. Omnia quidem è malo exorta, ipsa quoque ne-

lib. de locis in
hominib.

cessario mala sunt. Ac lauciati sic, malè sanè purulenti redduntur, confluyente vlceris pure in sinum thora-
cis, quod exitum habebat foras per ἀρχαίον πύμα, priusquam foris occalluisset, aut certe, & verius, coa-
luisset. Inde adeo fit vt stagnante pure in sinu thoracis, quicquid eò confluit, in pus venturatur. Hinc no-
ua malorum multiplicatio per sympathiam & syntimoriam partium sociarum & vicinarum : quàmvis
hoc ab vlcere factum empyema, quod facit empyicos, facilius esse dicatur cæteris quæ intus veniunt à
pleuritide aut peripneumonia. Nam significatio τὸ ἐμπύον dicta est sæpe suprâ.

ibidem.

lib. 1. cap.
11. v. 1.

ET QVIBVS TENERA EST INTVS CICATRIX; DISRUMPITVR FACILE] Ac
si diceret; si vlcus exactè non fuerit expurgatum pure & sanie inter vitramque oram, tamen si vitraque si-
mul coaluerit cicatrice obducta : tamen eueniet vt accrescente pure, & sanie, in eo intervallo quod est
inter vitramque oram ; facile interioris laceretur cicatrix : quia tenerior est quàm exterior, idque tum
propter acrimoniam puris & sanici quæ parva est in cunctando ; tum propter vulneratæ partis tensio-
nem : quibus accedit motus perennitas quæ cernitur in thorace, cuius vulnerati hoc esse incòmodum
scripsit præceptor, quod ἐλκεα κινούμενα ἐπὶ πύμαρ ἔχοντα, i. agitata vlcera perenni motu, insuper disrumpuntur.
Hæc autem pars altera instituta prognoscens ex 1. lib. de morb. desumpta, pertinet ad correctionem eius
quod paulò antè scripserat : quòd si coalescit vulnus omni ex parte, tam intus, quàm foris, ipse vulne-
ratus in tuto est : quoniam suspecta esse debet vlceris non bene mundati & repurgati coitio. Hippocra-
tis verba hæc sunt. Καὶ ὡς ὑμᾶς μὲν ἔμοδ καὶ τὸ ἔσω καὶ τὸ ἔξω, ἢ δὲ ἐν τῷ ἔσω αἰσθητὴς ᾗσθηται, καὶ πύμαρ
ἀνελκόμεναι εἴσιν, καὶ ὡς ἐμπύον γίνεται. ἀνελκόμεναι δὲ καὶ ὡς πύμαρ, καὶ ὡς λεπιδωτὴ, καὶ ὡς φλέγμα, ἢ γὰρ αὐτὸς τὸ
ἐν τῷ ἔσω αἰσθητὴς, καὶ ὡς ἔσω ἐπὶ τῇ λεπιδωτῇ λεπιδωτῇ. i. Quòd si redintegratio simul facta sit tam intus, quàm foris, ipsa vtrò
intrâ cicatrix tenera sit, aspera, debilis, atque luida ; nonnunquam denuo exulceratur, & purulentus fit. Rursum
exulceratur etiam si quis nimium laborarit, aut emacuerit, aut si pituita vel bilis ad cicatricem adherescat, firmiter
ibi fixa. Tum si alio correptus morbo, multum extenuatus fuerit. Ergo permagni refert scire vbi sit vulnus,
& quæ sit conditio vulneratæ partis. Imprimis autem providendum ne quod iam ipsum per se ma-
gnum est vulnus, curantis negligentia vel imperitia fiat maius, grauiorūque malorum consecutio-
nem adferat.

69 Απόλλυνται δὲ ἐκ μὲν τῶν πεπνευμονικῶν ἐμπυημάτων ὁ γε-
ραίτεροι· ἐκ δὲ τῶν λοιπῶν, νεώτεροι.

*Intereunt autem ab empyematis, peripneumonicis quidem, seniores:
ab reliquis autem, iuniores.*

comment. ad
aph. 4. 4. 7.lib. 1. progn.
& Coac. 16.
huius cap.
Coac. 27.
huius cap.lib. 1. cap.
11. v. 1.

IN OMNI morbo acuto, tum per se, tum ὅκ μετέπειτα, futuri exitus præsentio comparatur, tum
ex ipsius morbi specie & idea ; tum ex ægroti cuiusque communi & priua natura, ætate, viribus, ac diz-
ta. Ætatis hæc mentio fit, quæ in cuiusque natura mutationem adfert temperamenti, & habitus : vnde vi-
res validæ, vel imbecillæ. Quæ causa mouit Hippocratem vt scripserit ; ab empyemate quidem peri-
pneumonico facilius sanescere iuuenes, quàm homines ætatis affectæ : à cæteris autem seniores. Quod 40
cur ita sit, eò conuertamus animum vt sciamus.

INTEREUNT AUTEM] Suffocatione & extinctione caloris vitalis, quem virulenti puris antea
disperdit : copia autem puris cor obruit, sanguinisque appulsi prohibet, vnde cessat prouentus viuifici
nectaris, indeque mors venit.

AB EMPYEMATIS] i. A phymatis purulenti, vel quæ alterando in pus conuersa sunt qualibet
parte corporis. Sic enim Galenus. Empyemata, inquit, nominare consuevit Hippocrates, non ea quidem solum
quæ in thorace, sed etiam qualibet parte corporis ἀποσπένται ἐς πύμαρ, i. alterando in pus mutata phymata. Id
ipsum docet quod sequitur.

PERIPNEUMONICIS QVIDEM] Per metaplasin peripneumonici phymatis in empyema,
quândo ipsum phyma nec sua sponte quiescit per anacatharsin liberam & liberalem sputi flani, sangui-
ne pauco exactè permixti ; nec artificio medici curationem recipit ipse verò egroratus, intra 14. diem non
occidit ; quo exacto, nonnihil à metu respirat per succedaneum empyema.

SENIOR E] Homines iam ætate grandes, vel ætatis prouectæ (quos in hanc sententiam vocat
ἀφηναιότεροι, i. ingrauescentis vel fugientis ætatis, quos vulgus nominat declinantes) non tamen decrepiti se-
nectutis, quæ ipsa per se morbus est. Senioribus igitur maior periculo locus est quàm iuuenibus : non
solum in peripneumonico empyemate : sed etiam in peripneumonia quoque ipsa, tum in pleuritide :
quòd ætas eorum præcipuam opportunitatem ademerit anacatharsicos salutiferæ ; fortem thoracis cõ-
cussionem, meatuumque ipsorum libertatem. Nec verò in senibus curatio artificiosa iure & loco
perficì potest ex sententia ; tum propter præsentem ; tum propter eam, quæ in metu est, virium infirmi-
tatem. Agitur enim de vacuando per sanguinis detractionem. Hic autem qui ad vacuandum accedit, 60
caucat ne id modò consideret, quàm vires sint validæ : sed vtrum eiusmodi sint cum securitate, an verò
cum infirmitatis metu. At senioribus & iam infirmiores sunt ipsæ, & in maioris infirmitatis metu post
vacuationem. Quæ res adduxit Hippocratem vt in capiendò delectu phlebotomiz, ad hæc tria præce-
perit attendendum. Ἡ γὰρ ὁρὴ φαίνεται τὸ νόσημα, καὶ οἱ ἐχρονες ἀκμαῖοι τῇ ἡλικίᾳ, καὶ ἢ ῥά μιν παρ' αὐτοῖσι. i. Si præ-
grandus sit morbus ; si ætate florent qui ipsum habent ; tum si adsint vires. Sanè in peripneumonico empyemate,
seniorum

lib. 1.200
1.200.

20

AB RELIQUIS AVTEM IUVNIORES] Non enim φύματα εἰς πῦρ ἀλλοιεύονται, sunt graviora: sed ipsa phymata inflammata, καὶ ἡ φυματὴν ἀλλοίωσις, dum scilicet pus ipsum conficitur. Tum enim gravior est iuvenum febris, quàm senum, & cruciatus seu doloris. Ergo sufficiat scopum indicasse, meámque scribendi operam conuertisse ad mentem authoris, cuius hæc enarratio est, non mea.

30

40

Coac. 66, hgt-
ins cap.

sed quatuor eius autem significatio sit propter costas. exemplo ibi locare oportet. vel prae. Sin autem nec expuatur. nec ^{sub}.

60 *emphyica. Præterea in hydropetum vniuerſali, tum particulari pulmonis & vteri. Sed intus foras eduntur ſtrepitus in crepitu ventris, quem vocat *πύκναι ψόας*: in ructu: in ſibilo aurium: in defectione ſtr.*

Cc: mij

Coac. 11.
huius cap.
lib. 1. et
etior.

nullus fluctuandi locus est : proptereaque nec fluctuatio vlla sonora. Percipitur autem multus hic strepitus in supera regione thoracis, vbi concussio fit humerorum. Nam quod in sedibus inferis stabulatur ab empyemate inferarum pulmonis alarum, explorari etiam debet appresso hypochondrio, diaphragmate quoque ipso. Eadem ratione multum in pectore sputum perstreper, feruereque ad imam laryngem, quando ab efflatione sublatum, ibi subsistit, nec expurgatur ; vnde pleuritici moriuntur.

MODO SPIRENT FACILIS] Hic non sine causa codicem Græcum emendavi, & pro *δυσπνοία* legendum duxi *εὐπνοία*. Nam in fluctuatione libera, indeque sonora, ex loci amplitudine à puris copia non occupati nec distenti, nulla est æquitas opinari maiorem dyspnœam, congenetem & consocialem esse multi strepitus qui concutiendo auditur ; vnde significatio fit puris exigui. Est enim hic maior libertas partium spirabilium, quàm in nimia puris abundantia, vbi nullus, aut certe parvus excitatur strepitus ; & cui strepitus vacuitati rectè adiunxit fortem dyspnœam, vt signum *δυσπνοίας*. Ergo spiratio facilior est in strepitu multo ex paucitate puris effusi è loci angustia in amplitudinem, vnde spiritus ipse quem ducimus, in pulmone sedem inuenit, quàm spirat liberius & expirat.

Coac. 31.
huius cap.

ET MELIUS SINT COLORATI] Vt coloratio hæc non tantum pertineat ad faciei malas saturato rubore suffulas, quod ipsum vt reliqui vultus, non raro significat *ἰσχυρία*, quam non omisit in signorum catalogo empyematis inueterati. Nam in multo strepitu empyematis, non ita rubent maxillæ, quàm in exiguo. Sed ad colorem quoque pertinet cæterarum & extimarum corporis partium suave rubentium. Id enim planè indicat, quod in contraria parte scriptum est de liuidis vnguibus. Atque ex hoc colore suave rubenti, sperabilis est vitæ salus : quemadmodum ex liuore omnino desperata. Quòd si quis obiciat, in strepitu multo sputi subsistentis, pleuriticis interire ; in promptu est mihi responsio ; talem strepitum excitari pleuriticis, ab irrita efflatione, vbi feruet ad imam laryngem, ibique cumulatam, suffocationem infert. Hic autem strepitum puris parciore multum cieri à concussione concutientis medici, vnde suo non excedit loco, nec subuehitur per arterias ad imam laryngem : proptereaque nec illic periculo ægri subsistit.

Coac. 18. lib. 1.

AT QVIBVS NE MINIMVS QVIDEM INFERTVR] Ob nimiam abundantiam puris, cui vix sufficit ipsa thoracis amplitudo, ac totum occupat à iugulo ad ventrem vsque, iuxta illam prognosin. Ex pulmonis empyemate, si dolor adiugulum & ad ventrem proripit, & cum anxietudine sessor adsit ; expectoranda materia vis magna ostenditur. Sed huius prognosin partem explicat illa disputatio Hippocratis, quam sic instituit ; mox autem dicitur. Pergamus.

ET FORTIS DYSPNOEA] Quoniam thoracis amplitudo vertitur in angustiam, à puris collectione ; pulmonis explicatio & libertas, in oppressionem, à circumfuso pure : vnde spiritus exploditur, nec amplius sedem habet quàm ducatur, & fumidus vapor expiret. Inde asthma & orthopnoea.

LIVIDIQVE VNGUES] Ab extinctione caloris vitalis, & paupertate viuifici nectaris. Cernitur autem primum liuor in vnguibus : quia longè absunt à fonte *πῆς αὑτῶν*, & quia pellucidi. Opponitur autem hic liuor coloris suave rubenti, de quo iam diximus.


PLENI SVNT ILLI PVRE] Vnde à nimia repletionem, nulla fluctuatio excitari potest, proindeque nec strepitus exaudiri. Vt igitur empyematis notitia comparatur *ἐκ τῆς ἀσπυμνεύου* peripneumoniz ; videlicet ex nulla aut modica expurgatione sputi, tum ex infecta medici curatione intra 14. diem : deinde verò *ἐκ τῆς ὑπαρχόντων* ; ex rigore qui antè non fuerat, & ex grauitate loco doloris. Sic copia & abundantia puris innotescit ex vacuitate strepitus, à concussione ; & forti dyspnœa, cum cæteris signis quæ suprà sunt posita & explicata.

Coac. 33.
huius cap.

AC DESPERATI] Causæ adductæ sunt desperatæ salutis, in superiore prognosi, & suprà. Altera restat causa non exaudiri strepitus in concutiendo, quam eleganter scripsit præceptor his verbis. Si ob crassitudinem pus non fluctuat, nec strepitus fit in thorace, ac frequens respiratio est, citraque expurgatio ; tum verò pedes tument, ac tussicula quædam adest : ne erres ; sed certò scias thoracem pure repletum. Deinde rationem & modum subiungit explorandæ partis in qua pus abditum later, per cataplasma ex cretæ terræ luto confectum, vt, ea deprehensa, pyreticum statim adhibeatur, aut nouacula incidatur. Atque hic finis esto prognosin pleuritidis, peripneumoniz, & empyematum, ex quibus empyici propriè nominantur. Deo sit honor & gloria qui mihi affuit. Nunc transeamus ad phthisin, capitis primum à Deo scribendi primordiis.

DE PHTHISI.

CAP. XVII.



ΣΟΙ ἀφρώδες αἷμα ἐμέοις, πόνος μὴ εὐόντος καί τῃ διαφράγματι. Διὰ τῆς πνέουσης ἐμέοις. καὶ οἷσι μὴ ἡ μεγάλη φλέψ ἐν αὐτῷ ῥήνυται. πολὺ τε ἐμέοις, καὶ εἰσὶν ὀπκίνδυνοι. οἷσι δὲ ἡ ἐλάσσων, ἐλάσσον τε ἀνδρῶσι, καὶ εἰσὶν ἀσφαλέστεροι.

Qui san-

I Qui sanguinem vomunt spumantem, omnique dolore carent sub diaphragmate; à pulmone vomunt. Et quibus in ipso rupta est magna vena; & multum illi vomunt, & periculose admodum. Quibus autem minor, & parciorem educunt, & magis in tuto sunt.

HÆC SUNT primordia phthificos, de qua mox dicturi sumus. Quoniam autem phthisis primigenia omnis, non empyematis consecraria; causas ducit vel à catarrho ferino, vel à rûptione venæ pulmonis: atque rûptionis illius notitia comparatur è sanguinis purpurei spumantis, per os effusi copia: ne vitiosa sit ipsa recmaris atque fallax in prædicenda phthisi de sanguinis vomitu siue copiosa reiectione; distinctionem artulit spumantis illius sanguinis, copiose & quasi vomendo prorupti, quæ docet num illac per pulmonem, an verò illinc exclusio illa fiat. Nam à pulmone ipso, cum rupta vel exesa vena cumulare expuitur, periculum maius est atque certius futuræ phthificos, quàm si aliunde duceretur illaeductio. Arque hic locum habet, cum scilicet à pulmone sit anagoge, paronomasia illa qua ludit præceptor in aphorismis. Τοῖς δὲ νεανιοῖς, αἱματὸς πύσσης, φθίσις. i. iuuenibus, spuma sanguinis, phthisis. aph. 29. 3. Tum illud, Phthisis potissimum in eam cadit ætatem quæ est à 18. ad 35. annum. Ac de spumante quidem sanguine qui aliunde ducitur per pulmonem, dictum est supra ad illam prognosin. *Quicumque spumantem expuunt sanguinem, dextròque laborant hypochondrio, à iecore illi spuumt.* &c. sed hæc repetenda erunt necessariò in hac prognosi.

QUI SANGVINEM VOMUNT.] i. Pleno ore profundunt: quale est illud Virgilianum, — Foribus domus alta superbis, — Manè salutantum, totis vomit adibus vnam. Et. Purpuream vomit ille animam: — accepto vulnere in thorace. Vt nemini dubium sit, vomitum illum sanguinis, esse pulmonum, quod ipse præceptor mox dicit. Ergo. *SANGVINEM VOMUNT.]* i. Plena, quod aiunt, manu effundunt; rupta, exesa, vel aperta vena pulmonum, ubi sanguinis copia est, quam abundè suppeditat cor, ipsum per se micans, per insignem venam arteriosam.

SPUMANTEM.] In quo cernitur αἰσθητὸς ἐν πύσσει, i. spuma fulua efflorescens, minutissimis bullis oblecto, ex eo circumtenso à spiritu & calore pulmonis, continenter, spirandi causa, follis modo, agitati; natura mollis & spongiosa. Est enim spuma nihil aliud, quàm minutissimarum bullarum generatio in circumtenso humore, vel à spiritu, vel à calore. Sed inter omnia viscera vtriusque œconomix, spiritus & nutritus, multum spumifera est pulmonis conditio, atque natura. Est enim fuluus & spumans qui è pulmone sanguis erumpit, iuxta illud catholicum theorema, ὁμοίαν τῇ δυνάμει τὸ ἐκείνου τὸ ἐκπορεύμενον, i. effluentia similis esse debet substantiæ unde quid effluit. De sanguinis autem exclusionem per os, vt intelligatur unde, quamobrem, & quæ fiat; notæ sunt explicatæ supra, ex qualitate, copia, & excernendi modo: vt superstitio sit vel ostentatio toties ista repetere.

OMNIQUE CARENT VITIO SVB DIAPHRAGMATE.] Nec sunt colore flauo, subuirdi aut fusco foedati, habentque hypochondria bene morata, benèque constituta in omni beneficio æqualitatis; in substantia quidem, mollia, solida, & succi plena; in quantitate, *λαμπρὰ*, i. in mediocritate posita contractionis & tensionis; in qualitate verò, æqualiter suauiterque calida. Denique à norma & præscriptione naturæ nusquam egressa. Tum nulla est vmbilici palpitatio, nec vlla micantis arteriæ cœliacæ perceptio.

A PULMONE VOMUNT.] Quoniam nihil opinionem facit sanguinis anadromen facientis; non suppressa iuuenum, familiaris olim, hæmorrhagia; non hæmorrhoides hominum hæmorrhoidicorum; non menstrua menstrualium. Effluentiam verò hanc, pulmonis esse testatur sanguis ipse fuluus & spumans, qui nusquam talis apparet, nisi à pulmone primùm exceptus fuerit. Hic autem nusquam venit ad ipsum pulmonem. Deinde copia effluentix, tum effluendi modus qui tanquam vomendo fit, ac sine dolore. Quæ omnia sunt sanguinis à pulmone manantis *πύσσης*: unde vera illa *πύσσης* quam præceptor posuit super hac re in aphorismis. *Qui spumantem expuunt sanguinem; iis de pulmone fit talis educitio.* Et verò ille aphorismus eodem planè scopo enarrari debet, vel recenseri, quo hæc prognosin. Vtraque enim sententia spectat ad phthisim, cuius origo est illa pulmonum hæmoptysis, vel hæmorrhagia. Nam altera phthificos causa, quæ est catarrhi feritas, loco dicitur. Illa enim prior est ordine apud Hippocratem & Galenum: hæc verò secunda. Ergo non sine causa orsus est à priore, quam statuit pulmonum hæmoptysin, vel hæmorrhagiam.

ET QUIBUS IN IPSO RUPTA EST MAGNA VENA.] Non quidem in tranco venæ arteriosæ, qui est ad basin cordis (nam cita inde mors venit) sed in maioribus ramis quæ venas edunt *αἱμώδεις*, quas vocat præceptor in hac prognosi magnas, sicut alibi magnas *αἱμώδεις*: quoniam, teste Galieno, iis diuisis, hæmorrhagiæ accidunt, quæ non cadunt in paruas. Rumpitur autem *αὐτομάτως*, i. sua sponte, vel *ἐκ παλαιότητος*, i. incidente causa aliqua, tum intus, tum foris. Ac sponte quidem sua, *ἐκ παλαιότητος*, distenta nimium crasso, vel multo humore, nec ita pulmone affixa: verum suspensa, unde ruptio; qualis in iis fit qui sanguinem merum repente meciunt, & sponte. Id autem fit inopinato sanguinis appulsu, vel attractione à venis. At verò rupta venæ *ἐκ παλαιότητος*, i. prænuncia causa & occasio, vel intrà certitur, vel extrinsecus. Intrà quidem, ex illa prognosi. *Quibus pleno ore, tanquam vomitu, sanguis prorumpit, vnaque febris multa, ac dolor est circa mammam, thoracem, & dorsum, &c.* Extrinsecus autem, in iquene, cui casu, ictu, iactu, lapsu prorumpit: vel diatræ vitio in victus ratione, & vitæ instituto.

lib. 2. cap.
de humoribus.

ET MULTVM ILLI VOMVNT] Quoniam hæmorrhagia, magnarum venarum propria est, non paruarum.

lib. 1. cap.
de locis
lib. de locis
in homine.

ET PERICVLOSE] Profluuium nectaris viuifici vnde cor exhauritur, tum autem superfluite causa mortifera, crebro hæmorrhagiæ memoriam renouante. Est autem ruptio magnæ venæ, difficulter sanabilis. De qua illud præcepit Hippocrates, φλέψαι μὲν ῥοῦς ἔσμεν, ἢ συνάψαι, ἢ non coire. Tum illud. Τὰ κενύματα ἐκ πύλων ἀπὸ τῆς ἀρτηρίας. i. Agitata viscera perenni motu, denuo lacerantur. Sed causas interitus ab hæmorrhagia pulmonum, recensimus non ita pridem.

QVIBVS AVTEM MINOR] i. Venula in quam fieri solet magnæ τανυσίαι: quemadmodum in magna, spadon & varix.

ET PARCIOREM EDVCVNT] Quoniam hæmorrhagia largæ non cadit in venulas.

ET MAGIS IN TVTO SVNT] Quia defraudatio minor naturæ, & quia facilis est venularum coitio, pulmone affixarum. Sunt igitur magis in tuto ad vsum & dulcedinem diuturnioris vitæ, & ad spem retinendæ salutis; modò adhibeatur medici diligentia, cum pari industria, qua phlegmone, & omnis corruptio propulsetur.

2 Τῶν φθισικῶν, οἷσιν ἔτι τὸ πύλον κινᾷ βαρὺ, καὶ αἱ τείχες ἐκ τῆς κεφαλῆς ῥέουσιν. ὀπὸ λλωται.

E phthisicis, quibus ad ignem sputum olet grauiter, ac tum capilli fluunt è capite; moriuntur.

lib. 2. cap.
de humoribus.

AB EMPYEMATE transeundum est ad phthisin, quod ei proxima sit, non tamen vnus empyematis succedanea. Nam ipsa quoque primigenij iuris est, è catarrho nata, vel ab hæmoptysi quam fecit venæ ruptio in pulmone. Nam ea quam intulit empyema, eiusmodi sanè est vt omnem explodat medici diligentiam atque industriam. Ac certè prudentis est medici, eum, qui fernari non potest, non attingere; nec subire suspicionem occisi, quem fors ipsius peremit. Quæ causa est cur ipse præceptor hanc indicasse contentus fuerit, attingere autem noluerit. Ad alia verò genera primigeniæ phthisis, quam vel catarrhus intulit, vel ruptio venæ, tantùm remedia duxerit præscribenda. Nec tamen omisit eam quæ dicitur φθίσις τῶν πύλων, quam scribit accidere incontinentia τῆς νεφροῦ καὶ φρενός. Sed explicanda phthisis natura, vt intelligatur quid sit quod in quæstionem vocatur. Ac primùm scire licet, communi appellatione, phthisis nomen significare omnem cachexiam, atrophiam, & marasimum quoque ipsum quem hæctica febris inuexit. Sed phthisis per antonomasiam, pertinet ad vlcus pulmonis; cum scilicet vel à catarrho, vel ab hæmoptysi per venæ ruptionem, huic exulceratio accedit. Ac nunc vsucapio est phthisis, pro eo quod propriè Græci omnes, maximèque Athenienses, olim vocabant φθίσις, si Galeno credendum. Tamen si reperio nomen τῆς φθίσεως ab Hippocrate vsurpatum pro eo pulmonis vlcere vnde pus editur grandinosum, quod appressum digitis, virus exhalat fædi odoris. Sed vsucapit phthisis pro ipsa phthoe, vbi symptoma locum occupat morbi; ac morbus ipse, symptomatis nomen sibi adoptat, hæc ratio est: quoniam vlcus pulmonis, emaciandi facultate, & vi tabifica, ceteros omnes morbos præcedit. Est autem triplex in eo vis emaciandi. Prima, ipsius edacitas quæ fontem exhaurit viuifici nectaris. Altera, febris hæctica, quæ humores vitiat, ipsamque partium solidarum substantiam labefaciat, viuacitatem extinguit marasmo humidi primigenij. Tertia, spiritus quem ducimus tabifica qualitas, quæ ipsi de corruptela & vlcere prauo pulmonis accedit, à quo excipitur. Est igitur phthisis, vlcus malignum pulmonis, quod vi tabifica, morbis omnibus antecellit. Iam verò ab ea phthisi, homines dicuntur φθισικῆς, καὶ φθισικοί, quorum valetudo penes est phthisin; & φθισιδες etiam, quorum natura vergit e. Epid. ἐπὶ τὸ φθισιδες. Huiusmodi autem sunt πτερυγιδες, i. alati scapulis, quorum scapulæ dorso exactè non adiacent: quia non habent dorsum, vt decet, ἰσχυροί, sed paulum inclinans ad ἰσχυροί; & contra ceruicem ad ἰσχυροί, quam tamen natura voluit esse ἰσχυροί. Talium natura hominum, si perennis catarrhi generatio sit, vel aliunde fiat, eius prolapsum tussiferum experitur in ipsos pulmones. Atque hæc pertinent ad vnum genus τῆς φθισιδικῶν φθισιδων. Alterum mox dicetur in recensione causarum efficientium.

comment. ad
aph. 16. 7.
lib. 2. cap.
de humoribus.

e. Epid.

lib. 1. cap.
de humoribus.
Coac. 6. hu-
sus cap.

aph. 19. 3.

aph. 15. 7.

aph. 9. 5.

Ergo causarum phthisim primigeniam efficientium, duo sunt genera (nam φθίσις τῶν πύλων non attingo, nec eam quæ consecutaria est empyematis;) vnum catarrhi vis effera: alterum venæ ruptio in pulmone. Est enim consentaneum, vt vndecunque vlcus nascitur in pulmone, id causa sit phthisis. Sed quantum animo complecti possum, duo illa tantùm reperio à præceptore posita. Ac duo illa genera complexus est breuiter infra, quæ pluribus alibi explicauit. Est autem super hac re prognostis hæc. In meo sunt maximè phthises, tum à ruptione venarum pulmonis crassarum, tum à catarrho è capite. Quemadmodum autem rumpatur vena, tum intrà, tum extrinsecus, dictum est superiore prognosi ac demonstratum; ruptionem crassioris venæ ex difficili coitione, & facili disruptione, subinde memoriam hæmoptyseos renouare, ac lacerando & erodendo, vlcus inferre. Hinc veniunt illa. Αἱματις πύλων, φθίσις, i. sanguinis exuitions, phthises. Et, ἐπὶ αἱματις πύλων, πύλων, i. à sputo sanguinis, sputum puris: vbi Galenus author est, non omnem sanguinis exuitionem, pus edere: sed eam tantùm quæ maligna est, qualis de pulmone omnino est. Tum illud quod est vtriusque causæ cōmune. ἐπὶ πύλων, φθίσις καὶ πύλων, i. Ad sputum puris, phthisis & effluencia; videlicet capillorum, aut ventris. Huius autem tabificæ causæ τὸ φθισιδικόν, notabile est in ea etate

60

in ea etate quam definiunt anni à 18. ad 35. Est enim hæc ætas, potissimum ruptionis capax præter cæ-
teras, tum *αἰματώδης*, tum *μυττωδής*, idque vel casu, vel à dicta. Causa restat altera quæ *κατὰ φύσιν*
erodendo, facit vlcus. Est autem catarrhi feritas, in pulmonem prolapsi. Ac talis causa sic legitur
apud Hippocratem. Si caput repletum sit pituita, simulatque laborare caperit; tum rheuma in pulmonem concit-
atur, quod simulatque pulmo complexus fuerit; statim ægrotat, morsu laceratus à catarrho putri, et salsa pitui-
ta. Est enim ferina destillatio, statim malefica, atque tabifera, iuxta illud. Ταχὺ κακούμεται, καὶ πνέμεται, i. Epid.
i. statim vitiatur, ac tabescentes. Quæ res adduxit Galenum vt hæc scriberet. Destillationes è capite, quæ statim
in ruficulo/os homines faciunt atque raucos, nisi labente anni parte quiescant; profecto alteram phthisis adfe-
rent differentiam. Est autem altera phthisis differentia, quam parit catarrhi vis erodens: sicut altera quæ
fit à ruptione vasis. Atque hæc quidem iuuenum est, succi plenorum, hæmorrhagiæ commoda non
habentium. Illa verò *κατὰ φύσιν*, i. hominum alacriorum & angusti thoracis, idque tempestate austriua
quam excipit aquilonia. Quæ cum ita sint, iam tempus est examinare fideliter omnia quæ phthisi acci-
dunt, exordiendo ab iis quæ posita sunt in hac prognosi.

E P H T H I S I C I S] Quorum patefacta omnis ratio est, ducta è causis phthisiferis, & ex morbi na-
tura, cur ita sint, & ita vocentur. Sed tamen ex iis qui nondum eò venerunt, vt ad vltima ventum esse
testentur; cuiusmodi sunt qui vnguibus, more cuiusdam feræ, sunt vncinati, atque sic emaciati vt nihil
aliud sint quam syphar hominis; tuncque iis est spiratio parua & rara, cum diarrhoea. Sed qui statim initio
phthisis hæc edunt de quibus hîc agitur. Cuiusmodi feræ sunt illi phthisici, quorum phthisis nata est
per exulcerationem pulmonis, appulsu ferini catarrhi, putris & falsi; quem simulatque pulmo comple-
xus est, *πνέυμα* concipit: iuxta illam sententiam præceptoris. Τα μὲν ὅτι κακὸν ἐστὶ, αἰεὶ γὰρ κακὰ γίνονται. i. O-
mnia quidem è malis orta, ipsa quoque necessariò mala sunt.

Q V I B V S] Phthisicis factis è catarrho ferino & putri, qui iam inde à priore foco, videlicet capite,
in vitio est, minimèque pepasmi capax, in pulmone molli & spongioso quem miserè lacerat.

S P U T U M] Quod est proprium & vnicum phthisis epiphænomenon, cuius effluentia similis esse
debet substantiæ vnde manat. Est autem puris expulsiō quam vlcerata pars edit per efflationem qua
pus attollitur & subuehitur secundum arteriæ bronchia ad ipsum bronchum.

A D I G N E M] Quo periculum sit optimè, sputi omnis tam purulenti, quam saluæ multæ, putris,
& falsæ; quæ à pulmonibus educi solent: quod etiam innuit aphorismus ille. ὅ, π αἰ πνέυμα ἀποχέεται, i.
quodcumque sputum extulerint. Vt igitur periculum fiat olfactu, qualiter sputum olet. A D I G N E M]
Superfluum, vel in vitro, aut pelui admotum, siue sputum sit pus, siue salua falsa & putris. Quod rectè
Celsus expressit cum ait. Quicquid excreatum est, si in ignem impositum est: nam quod sequitur, mali odoris
est, non sapit Hippocratem, nec viri mentem assequitur. Non enim iudicium est præceptoris; omnia
phthisicorum sputa in ignem imposita, mali odoris esse: verum quæ ita sunt, omnia planè testari, etiam
phthisis initio, ægrum seruari non posse. Cur autem explorandi odoris causa, præcepit sputum in i-
gnem imponi, mea sic ratio est quam ex Theophrasto hausi: quoniam cum odor sit corporum mixto-
rum & succidorum, non autem ἀμικτῶν καὶ ἀγύλων, quæ nullam edunt anathymiasin per quam fit odor,
inde adeo accidit corpora mixta & succida, tam *εὐώδεια*, quàm *κακώδεια*, si fortè nimis coacta fuerint, vel
alieno humore perfusa, *πρὸς δὲ τὰ πυρρῶτα μαλακῆς, ἢ καὶ μικρὸν ἐκχυρμαίνοντα πύρρον πῦρ αἰσθάνονται, δι' ὃ γίνονται*
i. molli flamma indigeant, quæ calefaciens sensum, vaporem excitabit, per quem fit odor. Sed eam anathymia-
sia odoriferam, eorum corporum succidorum quæ intra se abditum habent odorem, non solum igne
blando & lento, sed etiam terendo excitandam præcepit; vt in radicibus: sic in sputo grâdinoso *πρὸς φθόνος*,
quod scribit, attritum digitis, expirare virus fædi odoris. Ergo præscripta hîc *πύρρον*, humorè perfusum
dissipâdo, & faciêdo *αἰεὶ τὸ πύρρον*, i. diducendo meatu subiecti corporis, anathymiasin excitat odoriferâ.

E S T F O E D I N I D O R I S] Nam propriè nidor, est anathymiasis quæ suffiendo editur. Talis
autem nidor, est cerebro gratiosus, qui recreat ipsum suo appulsu suavi, ac salubriorem locum efficit vbi
excipitur; intemperiem frigidam temperando: quandoquidem calida est odoris natura. Sed gratiosior
odoris causa est, rerum succidarum *εὐώδων*, naturæ *εὐωσφόρων*, i. consocialium, perfecta mixtio & pepa-
smus. Hinc *εὐώδεια* stirpium, aromatum, rerū denique omnium succidarum. Nam lapides & aurum odo-
re carent. Vt autem à pepasmo rerum *εὐώδων*, ἢ *εὐωδία*: sic ab illarum corruptione & putredine, tum et-
iam à mixtione *κακῶδων*, ἢ *δυσωδία*. Præclare igitur Aristoteles, vt cætera omnia, *σαρωδὲς* odores (sic
enim vocat fædos & graueolentes) proportionem quadâ respondere ait saporibus multum amaris: pro-
pterea quod vt saporis amari sunt *δυσκατάποτοι*, i. *δευοταῖς* amari: sic & ipsa *σαρωδὲς*, *δυσωσπνεύοντα* *ὄζει*, i. putres
odores, *ἀγρὲ* admodum spirando ducuntur. Est igitur *σαρωδὲς* idem quod *κακώδεις*, *κακὸς μωρὸς*, *δυσώδεις*, *ὀσμνηκαρῶδεις*,
vel, vt hîc loquitur, *κρίων* *σαρὸς*, quod est humilior. Atqui *σαρωδὲς* illud sputum, non erit nouum in phthisi
quam genuit empyema, quod, multò ante phthisin, tale sputum edidit fædi odoris. Nec verò, vt iam di-
xi, hoc pertinet ad omnem phthisin primigeniam, statim exorta. Nam quæ à venæ crassioris ruptione
oritur, tale sputum non expuit, nisi mox affutura morte. Sed illud est proprium phthisis quam fecit ca-
tarrhus *φλέγματις ὀνίκοδ*, καὶ *σαρωδὲς*, i. pituita falsa et putris. Ergo mirum videri nō debet si cōcitatum rheu-
ma, iam *σαρωδὲς*, faciat etiam rheuma cōsistens *σαρωδὲς*, idque in pulmone quem vocat præceptor *ψαφάριον*.
Vbi enim sperari nequit pepasms, neque *διαφόρως*, ibi necessariò sit *σαρωδὲς*, *gāgrazna*, & sphacellismus.
Nam quæ omnino praua sunt, & primigenia prauarum affectionum signa, mutationem in melius ha-
bere non possunt. Vt autem pituita putris, est praua in rheumate concitato: sic alteratio eius in consi-
stente, absolutam edit corruptionem: quoniam in affectione maligna, & à corruptente causa verius
quàm à mitificante, alteratio illa suscipitur atque perficitur.

A C T U M C A P I L L I T I V N T È C A P I T E] Est hoc sanè *πικρὸν* prauum rheumatis concit-

lib. de pñt
in pulm.

i. Epid.

lib.

lib. de locis
in homine.Gal. cōment.
ad aph. 14. x.lib. πρὸς τὸς
ἀρτ. πρὸς
aph. 10. 5.Cels. cap. 22.
lib. 3.Theophr.
πρὸς ἰορμ.lib. 2. mel
vltim.Arist. de
sensib.
Theophr.
πρὸς ἰορμ.Arist. de
sensib.lib. πρὸς τὸς
ἀρτ.

lib. 1. de caus. plant.

lib. 1. de caus. plant.

tari: sicut sputum *σπυον*, rheumatis consistentis. Notum est illud; quòd omnis excretio prava, signum est syllogisticum affectionis pravae. Nam fluunt Galeno capilli è capite, sicut è plantis folia; aut propter inopiam succi alibilis à siccitate; aut propter affluentiam corruptentis ipsos humoris. Hic tamen Galenus agnovit *τὴν ἐνδεῖαν ἐν τῷ σπύγι, καὶ ἐν τῷ χυμῷ*, i. summam penuriam succi alibilis: nonnamquam *ἐν* eiusdem corruptionem. Quod parum appositè scriptum est *καὶ τὴν δέσποιναν πρᾶξορος*, qui parem agnoscit pravitatē *τῷ ἐν τῷ σπύγι, καὶ τῷ σπύγι, καὶ τῷ σπύγι, καὶ τῷ σπύγι*, i. fluenti aut cōcitati è capite, ac cōfisi in pulmone.

MORIVNTVR] Non tamen fortassis repentina morte quæ in propinquo est: sicut accidit cum accessio fit diarrhœæ: sed quòd servari non possunt in tanta corruptione humoris morbifici, & partis oblesæ: quoniam à priuatione habitus denno comparari non potest. Ac si diceret; pro desperatis habendi sunt, quorum desperatio posita est in vitio inemendabili nobilissimæ partis, cuius vitale officium est atque viuificum; ipsa verò corrupta, putri halitu vitalem cordis calorem suffocat, tum vlceris edacitate extinguit, cum spiratione ipsa rãbifica; ac tandem fit syndrome causarum omnium mortiferarum.

3 Τῶν Φθισικῶν, οἷσιν Ἰπὶ θάλασσαν πύξις, ἐς τὸ πυθμῆνα βαδίζει τὸ πύον ὀλέθριον σιμύομωσ. ἔσω δὲ ἐν χελκῷ ἡ θάλασσα.

E phthisicis, mare conspuentibus, quorum pus abít in fundum; brevi mortiferum: sit autem mare ahenò.

Hic **D V C E** iudicio, & comite experientia, proponitur alia nota qua nobis utendum præcepit, in eundæ causâ recurrens, ad prædicendum de sputo phthisicorum. Atque inter notam hîc positam, & illam quæ huic citima est, hoc interesse video; quòd illa est phthisis, periculosè quidem, sed tamen diutius eos quos inuasit malè habentis: hæc verò cum adest, mortem in propinquo esse testatur. Nec mirum: quòd illa sit cuiuscunque sputi graueolentis ab igne: hæc verò tantum puris, contra naturam, sponte in fundum maris demersi. Quod quamobrem ita sit, videamus.

E P H T H I S I C I S] Qui à pulmonis vlcere tres intra se fouent emaciandi causas, vnde sic emacruunt, vt, pristino caractere amisso, vultus eorum cadauerosi esse videantur.

4. simpl. & lib. 2. meteo- rolo.

M A R E C O N S P U E N T I B V S] Ex præscripto medici ad certam prognosin, ac stabili fundatam iudicio, attendentis. Mare autem vocat aquam marinam è mari haustam, vel eius loco, si desit, muriam, cuius faciundæ modum tradit Galenus, vt vel cum ipso mari asphaltite conferri possit grauitate sua: quamuis illud mare tantò sit ponderosius Oceano; quantò hic fluuiis, lacubus, atque stagnis. Vt mare amplius non sit expetendum, ne ipsum quidem asphaltites, explorandi causa, cum muria ipsa sufficiat. Ergo pus phthisicorum excipi debet aqua marina, vel muria quæ, grauitatē, asphaltiti mari non cedat, quæque ouo natari possit.

Q U O R V M P U S] Efflando cum tussi per bronchia sublatum, & excreando editum, quod naturaliter constitutum, est *ψαδύρον*, i. friabile, in læuitate & æqualitate: sicut pituita tenax & *δυσλινής*, etiam misficata atque quodammodo purulenta.

6. Epid. part. 3.

A B I T I N F U N D V M] Grauitate parva, & leuitate amissa, cunctando in bronchiis, ob infirmam nimium cōcussionem, & irritam crebrò efflationem, vnde crassescit, ac fit rotundum, eodem modo quo sputa rotunda in pleno, dementiæ prænuncia. Vbi Galenus ait, rotunditatis eius causam materialem esse, crassitudinem humoris in pulmonum bronchiis cumulatè collecti; efficientem verò, immoderatum calorem, quem hic non tam agnoscimus phlegmones, quàm extremæ *σπυγῆς* sobolem. Ac talem puris ideam descripsit nobis in phthoe, de qua sic ait. *Τὸ πύον δὲ χάλια, & δεικνύμενον ἐν πύσι διακρίνεται ἐν χελκῷ γίνεται*, i. Pus velut grando, ac dignu auritum, fit durum *ἐν* facti odoris. Cur autem pus exiguum demergatur in fundum aquæ marinæ, quæ magis inuecta sustinet quàm fluuiialis; planum faciet quod subiecit.

B R E V I M O R T I F E R V M] Signo & causa. Ac signo quidem: quia rei mortuæ & fœtida nihil esse potest consociale quod integrum sit. Atque omne viuens, consortis mortui impatiens esse solet. Est autem sputum hoc mortuum, natum à *τεκράσει* pulmonis, non ab eius virtute natum: sicut pus albū, æquale, nihil olens, & læue. Tale pus non petit fundum aquæ marinæ, sed etiam fluuiiali, & omnium leuissima pluuiali aqua, sustinetur. Submergitur autem *σπυγῆς*, *ἀμωρῶδες καὶ βαρὺρῶδες*, i. fluidum, amicosum, cænosum: cuiusmodi esse solet soboles *τῆς τεκράσεως*, non autem naturæ. Ac tale pus, cunctando & incallescendo, fit durum & graue, nec amplius retinet suam *ψαδύτητα*. Vt mirari desinam, quòd & morticinum & ponderosum pus submergatur, vel in fundum etiam grauissimæ aquæ marinæ. Iam verò, causā etiam, tale pus ad citam mortem fatale est: quoniam pereunte vitali pulmonis officio, ac viribus iam effectis, pus cumulatè collectum, nec facilem habens exitum; vitalem cordis calorem pestifera aura disperdit, ipsūque cor opprimit: sicut vlcus, edacitate sua calorem extinguit. Tum ab oppressione puris, in thorace fit asthma, in gurgure orthopnoea. Atque ita phthisici vitam finiunt suffocati.

Arist. lib. de sensib. Theoph. lib. 1. de caus. plant. Plato 1. de Repub.

S I T A V T E M M A R E A H E N O] Quia vel mari seruando accommodatissimum est, societate ipsa quam vas ahenum habet cum aqua marina & salsa & amariuscule. Est enim *χάλιας ὁμοῦδος*, quia *ἐχρῶς*: sicut aurum *ἄσμοτος*, quia est *ἀχολος*. Succus autem *τῷ χάλει* consocialis est aquæ marinæ. At *ὁμοῦδος* *ἐν* *τῷ* *χάλει* *ὁμοῦδος* *ἐν* *τῷ* *χάλει*, & *ὁμοῦδος* *ὁμοῦδος* *ἐν* *τῷ* *χάλει*. Vel ideo mare iubet esse ahenò, quod mariæ conficiendæ aptissimum

aptissimum sit. Ac si diceret: intelligo autem mare quod in aheno factum est, muriam scilicet, quæ ubique terrarum, instar sit maris ubi non suppetit aqua marina, quando ubiuis gentium, explorandi paris hæc ratio necessaria est. Erit igitur ahenum, per metonymiam mare ipsum: muria autem marina: sicut in sacris literis, amplissimum & capacissimum vas ahenum in templo Salomonis, nominatum est mare. Verum hoc nomen habuit ab amplitudine. Illud verò ab aqua salia, qualis marina est, dicitur.

4. Ὅσοις ἢ φθισικῶν αἱ τεῖχες τῆς κεφαλῆς ῥέουσιν· ἀπὸ διάρροιας ἀπολλύονται. καὶ ὅσοι φθισικοῖσι ἐπιγίνονται διάρροια· θνήσκοσι.

E phthificis, quibus defluunt capilli è capite; pereunt à diarrhœa: & quibus phthificis diarrhœa incidit; moriuntur.

ENIMVERO phthisis, ut periculose omnis malè quidem habet quoscunque inuasit: tam verò illa mortiferè, quæ vel coniunctam habet causæ morbificæ perennitatem, cum accessione grauiorum symptomatum; vel eorundem infert. consecutionem per propagationem malignæ cacoehymix, vel infirmitatis in partes vicinas quarum virtute constat nutritus œconomia. Ergo è phthificis, mortiferè continuo ac circa initia pro certo ægrotant, quibus vnà cum phthisi accessio est causæ morbificæ, i. catarrhi putris & salis: tum autem symptomatis grauissimi, i. diarrhœæ; quam vnà cum phthisi excitaui catarrhi prolapsus in aluum, qui eam fecit aphthosam. Ac certè catarrhi maligni perennitas declaratur ipso defluuio capillorum. Quæ autem phthisis, ipsa per se manet postquam exorta est, periculose quidem phthificos malè habet: sed tamen diutius; donec superueniente alui profluuiò, mortifera breui reddatur. Hæc, meâ quidem sententia, præceptoris διγίονα est in hac prognosi: ut planum faciet ipsa glossa.

Ergo. **E PHTHISICIS**] Nondum ita multum emaciatis, & quorum ἡλικία nondum percipitur in aduncis vnguibus, & facie cadauerosa: sed tamen quorum sputa in ignem imposita, nidorem expirant sædum, καὶ δυσωδιά πύον: quoniam continuo παρὰ sunt in rheumate consistente: sicut παρὰ fuerunt in concitato.

QUIBUS DEFLEVNT CAPILLI E CAPITE] Non quidem à tam citra paupertate humoris spermatici, nec verò à densitate cutis quam ex euentu fecit inopia viuifici nectaris, periclé ex-
 30 rinctio caloris vitalis: quæ omnia ut κατ' ὅαν verè dici concedam; hic tamen κατ' ἐπιπόσει appositè dici non possunt. Nondum enim ad vltima ventum est effcæ naturæ, nec dum principatus naturæ collapsi sunt, nec πυκνὴ ipsa. Sed quibus capilli defluunt, ut suprâ modò attingebamus, à corruptione humoris in capite stabulantis. Id autem comperio euenire, tum κατ' ἐπιπόσει ipsius capitis, vnde phthisis accidit; tum κατ' ἐπιπόσει eiusdem capitis à phthisi exorta. Nam capitis & pulmonum facilis est συμμω-
 40 εία, per quam mutuas tradunt operas in eorum perniciem quos phthisis inuasit, aut pituita putris primum in capite occupauit. Multum autem facit ad eam causarum. vicissitudinem ipsa thoracis ac dorsii conformatio πύονος, vnde homines fiunt φθισικοί.

PEREUNT A DIARRHOEA] Ergo nec asthma suffocati, nec orthopnoea strangulati: sed virium exolutione, quæ ἐκλυσις dicitur, & caloris vitalis extrinsectione per inopiam viuifici nectaris. Eius autem diarrhœæ quæ simul cum phthisi coniuncta est, idque continuo; causam attulit catarrhi maligni prolapsus in aluum, sicut iam posui, qui eam fecit aphthosam, quemadmodum exulcerauit ipsum pulmonem. Ut ab eodem fonte hic pariter equalitèrque principia causasque duxisse videantur φθισίς καὶ
 50 ῥοίσις capillorum & alui. Non enim phthisi huic diarrhœa succedit: sed penè dixerim comes accedit. Secus fit in altera diarrhœa mox explicanda. Ac talem symptomatum consecutionem, & causarum vicissitudinem, tum à phthisi, tum à catarrho, præceptor sic docuit. Si quidem capilli iam inde ab initio defluere cæperint (id enim significat ἦδη) atque iam nudari cæperit caput, tanquam à morbo; tum si conspuenti prunam, sputum edit sædum nidorem; hunc dicito intra exiguum tempus moriturum. Ac moriendi causam & occasionem fore diarrhœam, vel ipsum πύον. Quandoquidem pus ipsum quod putrescit circa cor, in prunam effusum fiet, indeque calefactum cerebrum salilaginem fundit, quæ ciet aluum, facitque ut liquidus excrementis feratur. Signum id
 60 ita esse, quòd è capite fluant capilli. Efficitur ergo phthisim καὶ ῥοίσις capillorum & alui; tum per sympathiam simul, tum per syntimoriam vicissim accidere. Quòd mihi spectare videtur etiam aphorismus ille. Οὐδὲν
 65 σι φθισίσι διάρροιασιν αἱ τεῖχες ἀπὸ κεφαλῆς ἔπι, διάρροιας ἐπιγίνονται, ἀποθνήσκουσιν. i. Quibus phthificis defluunt capilli è capite; diarrhœa superueniente; moriuntur.

ET QUIBUS PHTHISICIS] Quibus nec fluunt capilli è capite; quia non est salilago nec pituita putris: nec sputum in prunam impositum sædi odoris est. Sed qui sic manent phthifici, postquam exorta est phthisis, ac cessante causa quam fortasse intulit iuuenum hæmoptysis, vel sanguinis vomitus è pulmone prorupti, quem edidit ruptio crassioris venæ. Quibus, inquam, sic phthificis, à pulmonis vl-
 65 cere vel ἡλικίας quod vires acquirit eundo, vicinasque & socias partes in sui contagionem adducit.

DIARRHOEA INCIDIT] Non autem penè comes fuit & sociâ initio statim morbi, nec ita multò post, ob salilaginem quam fundit caput, tum κατ' ἐπιπόσει pituita putri obsessum; tum κατ' ἐπιπόσει & συμμωεία, à foetido pure calefactum, & nidore putri repletum: sicut prædictis accidere vidimus. Sed diarrhœa quæ incidit per ἐπιπόσει morbi prægrandis, nutritus œconomiam in conta-

aph. 17. 6.
& 11. 7.

gionem & sympathiam adducentis. Et cum sympathia nulla leuationem morbi adferat unde venit, sed potius accessionem malorum adiungat; tum certe partium aliarum sympathia non fit, nisi gravior affligatur ea pars quæ primùm laborat. Ergo qui phthisis dominari tenetur, & penes quam valetudo est vniuersi corporis, sicut de pleuritide & peripneumonia scripsit præceptor; facile transire eius & propagationem experitur in partes nutritias, quas tandem sui tædet officij, cum suo, vt ita dicam, genio defraudata fuerint, ex paupertate spiritus & caloris, quam ipsum *πνεῦμα* pulmonis inuexit. Ergo sic affectus, diarrhœa incidit, propter cacopragiam hepatis & ventriculi, quorum illud nec chylum trahere à ieiuno; nec ipsum, si quem forte attraxerit, in sanguinem mutare potest: hic autem non raro alimentum corrumpit.

lib. 2. cap.
12. lib. 2.
aph. 12. 5.

MORIVNTVR] Est enim diarrhœa sic, multum iam phthisicis nata, & firmiter fixa illius causa; ipsum *πνεῦμα*, vt ait præceptor, i. illud ipsum quod mortem infert: quoniam, auctore Galeno, tale symptoma & signo, & causa mortiferum est. *γίνεται μὲν δὲ, inquit, ἐπὶ ἀρρώστια τῆς διωάμειας, αὐτὸ δὲ πάλιν ἀρρώστια ἐστὶν αὐτῷ ἀσθενέειαι.* i. Nam tale symptoma, ex natura ipsius, partiumque quarum potentia corpus administratur infirmitate natum; ipsam denuo infirmiores facit. Ergo si ad calamitosam & inexpugnabilem vim magni morbi, accessio fiat causæ mortiferæ; vt si labefacta spiritus œconomia, nutriticus præsidia collabantur; cito mors venit.

Αἰὲν Φθισῶσιν Ἰππάρχους Πυλάων, Ἰξίσανται ληρωδῶς αἰμορροΐδα τούτοις ἐλπίς Ἰππανείδα.

Quæ phthisicis accidit sputorum suppressio, dementiam infert nugacem; his hæmorrhoidem spes est apparituram.

Coac. 1. cap.
12. lib. 2.Coac. 20. cap.
13. lib. 2.

6. Epid. part. 3.

ECCE PENES phthisin valetudo est corporis vniuersi, de norma & præscriptione naturæ multum per eam egressi, partiumque nobilium quarum imperio regitur corporis vniuersitas. Atque illius quidem egressionis notas primùm aperuit symptoma; efficitur virtutis à phthisi nutritiorum viscerum, diarrhœam; tum vitiatæ nutritionis, defluuium capillorum. Nunc aliud symptoma proponitur phthisis consecratum, à vitio cerebri ac deprauatæ principis facultatis quam *ληρωδῶς* Græci vocant; quod cernitur in nugaci dementia, cuius tamen leuatio sperabilis est per hæmorrhoidas inde apparituras. Quæ omnia sintne ita, & cur ita sint, videamus.

QUÆ PHTHISICIS] Quorum phthisis orta est, non quidem à destillatione ferina putri & salsa: sed à ruptione crassioris venæ pulmonum, quam fecit, exempli causa, dolorificorum in lumbis malorum & sanguifluorum anadrome, inhibita vacuatione solita; hæmorrhœicis quidē, hæmorrhoidum; & menstrualibus, menstrualium. Nam vt omittam cætera quæ super his multa sunt antè posita. Qui statim ac defunctis temporibus sanguinem profundunt, si loco non profuderint; symptomata cerebri exercentur. Omnia enim suppressæ immeritò hæmorrhoides symptomata inferunt, quæ ab ipsis, dum conuenienter fluunt, arcentur & abiguntur.

ACCIDIT SPVTI SUPPRESSIO] Non solum puris fusi ab vlcere, per efflacionem secundum arteriæ bronchia ad bronchum sublatis: sed etiam à perenni anadrome rheumatis cōcitati, cuius per anacatharsin fiebat anagoge, nunc autem subsistit. Subsistit autem cohibita in pulmone, vbi cunctando putrescit materia expectorabilis, unde grauiorem scœdumque magis nidorem expirat ad cerebrum, caput inficit atque replet, ibique symptomata edit paraphorica. Vel aliò quàm ad pulmones anadrome illa cursum inflectit, & pro hæmorrhagia dementiam excitat nugatoriam, vt mox dicitur.

DEMENTIAM INFERT NVGACEM] i. Nugarum garrulitatem ridiculam, qualem dementiam scripsit præceptor de Thasia muliere vultuosa & iracunda, quæ à menstrualibus non de more proruptis sic delirauit; *παρέλετο, inquit, καὶ αἰσχρομύθη*; vel, vt legitur in vulgato codice, *ιχθυόμυθη*. Vt enim deliria quæuis sunt alterati, & quasi morsu quodam lacerati cerebri atque repleti symptomata: sic varia est deliriorum idea, pro varia suscipientis & efficientis causæ natura. Sic lethargicorum deliria sunt caraphorica, & cum cita obliuione coniuncta, ex pituita putri. Comatosorum vigilum typhomania, ex pari magisterio pituitæ & bilis. Phreniticorum perpetuæ cum vigiliis & febre dementiæ, à prostratione bilis flauæ in cerebro stabulantis. Fanaticorum insaniz summa sunt omnia, vt qui omnino de potestate mentis exierint à bile atra quam genuit flaua: quod illius quàm huius multo sint aciores morsus. Nugigerulorum dementiæ sunt à sanguine non ita multum acri, nec multa bile perfuso. Melancholicorum silens est ipsa dementia, vt phreniticorum garrula: quod illa sit ab humore melancholico, mœroris & merus parente. Quæ omnia propriis quæque nominibus & proprietatibus distincta sunt tractatu proprio quem scripsimus de sententia præceptoris, i. lib. huius diuini operis. Ergo nugigeruli sunt, nugisque garrunt, qui à sputi prædicti suppressione delirant: quod genus dementiæ *καταρρηκτικῶς* nominauit *ἐκείνη* 60
14. & 15. & 9.
proch. l. 1. 1.
vel etiam *φρενιτικῶς καταικτικῶς*; quibus ad vltima ventum est insaniz & furoris.

hist. 10. part. 3.
Epid.

HIS HÆMORRHOIDEM SPES EST APPARITVRAM] Quoniam in omni morbo per metastasin humoris nato, si fortis naturæ contentio sit in expellendo, ibi merito *καὶ ὅτι λόγος* fiet *ἀποσταλέν*, unde primùm venit ipsa *μετάστασις*. Sic mulier illa vultuosa, dementiæ garrulæ finem habuit, omnique periculo defun-

iculo defuncta conualuit, vrinis nigris, ac liberali profusio menstruorum quæ paulò ante non ibant, sursum autem metastasin fecerant. Idem accidit virgini Larissæ. Sed hæmorrhoidum fructus in illo sunt aphorismo. *melancholicis et nephriticis prodest hæmorrhoidas superuenire.* Non enim vacuando solum hæmorrhoides profunt: sed qualitate humoris qui vacuatur, consecutionem adferunt sanitatis. Eòdem spectat & ille. *insanientibus si veniant hæmorrhoides; insaniam finem adferunt.* Ex quibus efficitur; hæmorrhoidas per metastasin obortas, & conuenienter fluentes, vacuando, retrahendo, ac detrahendo rheuma concitatum atque consistens, ipsamque morbosam cacochymiam & impuritatem vasorum expurgando; propugnatione & epanorthosin adferre peripneumoniacis, hæmoptycis, phthisicis ab earum suppressione natis, melancholicis atque fanaticis. Vide comment. nostrum ad 21. Coac. cap. 13. huius 2. lib.

hist. 7. part. 3.
3. Epid.
aph. 11. 6.
aph. 22. eisdem
lib.

6 Φθίσεις ἑπικινδυνόταται αἶτε ἀπὸ ῥήξις φλεβῶν τῆς παχέων, καὶ ἀπὸ κατάρρεως τῆς ἀπὸ κεφαλῆς.

In metu sunt maximo phthises, tum à ruptione crassarum venarum, tum à catarrho è capite.

HACTENVS de phthisis natura, deque symptomatis eius. Nunc de causis dicendum breuiter vnde ipsa venit primum & per se, nec morbi alterius succedanea. Non enim hoc loco agitur de phthisi empyicorum, quæ nullam admittit medici diligentiam, nec vllam industriam: nisi fortè illam quæ insanabilis esse percipitur; proptereaque indigna censetur cui medicina fiat, vt ne ipsam quidem velit attingere medicus. Quod est prudens bonique viri officium, ne vana spe laceret ægrotum, nec subeat suspicionem occisi quem fors ipsius peremit. Nec verò hic ponitur illa phthisis, veteribus dicta *τῶπαι*, quæ propria est *ἐπιλεπτικῶν καὶ κυρτωγῶν*. Agitur autem de primigenia phthisi quæ in vlcere pulmonum ferino consistit, *πνεύμα* Græci vocant, cuius proprium nomen est *φθίσις*: de symptomate autem maciei atque marcoris, κατὰ ἐξέχρωσιν nominatur; quod ea tres habet emaciandi causas, quarum visæua homines breui sic à se mutantur, vt planè iam cadauerosi esse videantur. Sunt autem edacitas vlcus, tabifica febris, & æris inspirati pestifera qualitas. quam ipsi, pulmonis impertit fœda exulceratio. Sed ista sunt *αἰδαντικῆς* demonstrationis ad secundam prognosin huius tractatus, vbi de phthisi abundè disseruimus. Atque illius hyporthosin, velut digito indicauimus, quæ à præceptore hîc in quæstionem vocatur: vt ex perspicuitate scopi quò dirigit mētis aciem, nihil nisi appositè de comminiscamur, scribamus, ac nihil inepte moliamur. Ergo de causis dicendum quæ faciunt ipsam phthisin qualem descripsimus. Nam *τῆς ἐπικινδυνῆς*, i. *causarum suscipientium*, per quas efficiētium vis impressa manet, vnde omnis morborum generatio est; earum, inquam, species & idæ ponentur, postquam efficientium ratio patefacta fuerit ac expensa.

Coac. 2.
huius cap.

IN METV SVNT MAXIMO PHTHISES] i. Ostentant periculum sui ne accendant; vel, cùm inciderint, periculum mortis iniiciūt. Sic vtroque modo explicari potest τὸ ἐπικινδυνόν: sed prior explicatio mihi magis probatur ad eam loquendi formam qua vsus est nuper *κινδυνεύουσιν ἐμπνευστικῶν*, i. *periclitantur empyici fieri.* Nam phthisin omnem, malè habere quos inuasit periculosè; nouum non est: vt nihil noui adferre videatur prognosin hæc si eò dicatur. Adde quod, vt cōcedam phthisin tum à ruptione vasorum, tum à catarrho natam, periculum vitæ moliri: non tamen tam certò, nec tam citò molitur quàm phthisis empyicorum. Ac sæpe ipsa phthisis primigenia, periculosior est efficientē causa, quàm morbi natura, aut certè morbo diutius periculosa; celerius autem causa, i. feritate catarrhi, & hæmorrhagia pulmonum à perennitate anadromes. Ergo periclitantur homines, phthisi mox affutura.

Coac. 68. cap.
super.

TVM A RUPTIONE CRASSARVM VENARVM] Nam anastomosis rarò adducit exulcerationem: *δυσέρωσις* autem fit à catarrho, quæ altera phthisis est causa. Quemadmodum autem rupitio venæ incidat, dictum est suprà ad primam prognosin huius tractatus, ac demonstratum; *αὐτομάτως* ipsam fieri, vel *μετὰ πρῶτον*; tam intrā, quàm extrinsecus; idque iuuenibus qui eas degunt ætates quæ sunt à 18. ad 35. annum, vt mox infrā diceretur. Crassas autem venas intelligit, ramos insignes venæ arterioles, vti iam vidimus ad illam prognosin. *Quibus in pulmone rupta est magna vena, et multum illi sanguinem vomunt, et periculo: &c.* Est igitur hîc vena crassa, quam illic vocat *μεγάλη*; & rursum *μεγάλη*, quæ alibi nominatur *αἰμάρρους*, quod, ius diuisis, hæmorrhagiæ accidunt, quæ non cadunt in paruas.

Coac. 1. lib.
ius cap.
sent. 9. lib. 2.
ceteri ἀγνοῦν.

TVM A CATARRHO E CAPITE] Qui corruptione propria substantiæ in vitio est: proptereaque dicitur *κακωνής καὶ πνεύματος*: quia metum adfert τὸ πνεύματι. Est enim phlegma, vt ait præceptor, putre & salsum: proptereaque *δυσέρωτικόν*, vt scribit Galenus. De huius autem catarrhi feritate, multam alibi scripsimus, & feritatis vim calamitosam ostendimus in erodendo partem capacissimam erosionis, i. pulmonem *μακρόν*. Ac de illo catarrho ferino verum est illud Hippocratis; quod eius prolapsus, & vbi infederit, & vnde vel quā exierit incideritve, sæpe insanabiles morbos facit: maximè verò iis qui ei catarrho gignendo, ciendo, & excipiendo nati sunt temperiem cōtrariam nobilium partium, cum hepatitis impuritate; & conformationem thoracis angustī, dorsique alati; palatum verò habent sublimius fornicatum, ac dentes *παρπλαγμένους*, ex capite turbinato parte antica. Lege diuina super hac re præceptoris verba, literis digna aureis. Sed ea præstar nostro fœdare aramento, quàm silere. *Οἱ φθίσεις αἱ μετὰ πρῶτον, ἰσχυροὶ καὶ τὰλλα πνεύματος οἰοῦσιν. οἱ δὲ κατὰ πρῶτον, καὶ ἀπὸ πρῶτον πνεύματος, καὶ ἀπὸ πρῶτον πνεύματος. i. Foxi, siue capite turbinati, qui validam habent ceruicem; robusti sunt cū partibus aliis, tum ob-*

lib. 1. cap. 1.
comment. ad
part. 1. 2. sect. 3.
6. Epid.
ibid.

lib. 3. alim.
6. Epid. par. 7.
6. Epid. part. 1.
vide comm.
ad Coac. 51.
cap. super.
rioris.
6. Epid. part. 1.

6. Epid. part. 3. *bus* : at quibus caput dolet, stillantque aures; his convexum palatum, serrati dentes. Et, *Οσφυ πρησθεις τις εστι*
πλευραν, ελε τιω τις ατοπιως αιδωαμιλω, και οτι τιος κα πειρασι, τιος κα ονδου, και ικχευεσιν, και μη εν *κατα*.
Quibus alatae sunt costae, propter conformantis causae imbecillitatem; hi male habent à catarrhis malignis, siue ex-
cernuntur, siue subsistunt. Iam verò aggrediamur ad alteram causam τιω ονδου κελω, quae propria est phthi-
sis quam facit ruptio venae crassae.

7 Τῶν δὲ ἡλικιῶν ὁπικινδυνόταται πρὸς φθίσιν, ἀπὸ 1η. ἐτέων, μέ-
γιστ. ε. καὶ λ.

Inter aetates, illa demum ostendant periculum phthisis, quae sunt ab anno decimo octavo, ad trigesimum quintum.

SUPERIORE prognosi deductum est, quoad resolui potest, τὸ ἑνδεκμὸν phthisis quam facit catarrhus è capite. Nunc ponitur alterum ruptioni vasis accommodatum, per quam prior incidit phthisis differentia: sicut à catarrho altera. Quoties autem conspirant æqualiter, vis efficiendi & opportunitas excipiendi; opinionem faciunt rei futuræ quam moliuntur. Hinc rerum omnium, quæ terra marique gignuntur, principia causæque ducuntur. Continuo has leges æternæque fœdera Deus imposuit rebus omnibus procreandis. Et verò Hippocrates nihil vnquam statuit de morborum natura & exitu, nisi καὶ τὸ πρὸς τὸν καὶ τὸ ἑνδεκμὸν, i. ex cognitione et perspicientia efficientis causæ et excipientis. Atque hic cardo est morborum omnium quorum historiz sunt in libris τῶν ἑνδεκμῶν. Hoc fundamentum est libri tertij aphorismorum. Denique hæc præceptoris est διγνώσια, vbicumque agit de cognoscendo, medendo, & prædicendo. Inde omnis comparatur ratio διγνώσις, θεωρήσις, καὶ διεγχείρις.

Ergo. INTER ÆTATES] Quorum successione mutatio fit cuiusque naturæ, in temperamento, complexione, & habitu. Nam quibus iuuenibus astrictior fuit alvus, in senectute laxatur; & quæ sunt eiusmodi. Ergo inter ætates, per quas degendæ vitæ distincta ratio est. Sunt autem; triplex infantia, pueritia, pubertas vel adolescentia, iuuentus, constans ætas, & triplex senectus: quæ tamen non certo annorum numero definiuntur; sed actionum varietate, vel diuersitate succedanea.

ILLÆ DEMVM OSTENDANT PERICVLVM PHTHISIS] Vel, vt modò vertimus, in metu sunt maximo phthisis; vel obnoxie sunt maximè phthisi: Græcè est *ἄνθρωποι νόσται πρὸς φθίσην*: ex quo apparet, idem esse quod iisdem scripsit verbis in superiore prognosi, cùm ait, *φθίσις ἀνθρωπίνου*, vt iam monuimus. Intelligit autem phthisin quam facit ruptio venæ crassæ, non catarrhus è capite. Huius enim ad phthisim incommoda non minùs expetiuntur senes quàm iuuenes: teste illa sententia. *Τοῖς πρεσβυτέρῳ δύσπνοια, καὶ κατὰ πρὸς βρογχίτις*, i. senioribus spirandi difficultates, catarrhi tussiferi, &c. Quò spectat & illud. *Φθισίτις πολλή*: vbi Galenus hæc. Dictum est à me priùs, quòd destillatio è capite in fauces, indeque per laryngem in asperam arteriam, cùm ad pulmonem peruenit, huiusmodi facit morbos: quod iuuenibus contigisse scripsit Hippocrates in pestilentium morborum catalogo. Sunt igitur ætates illæ phthisi obnoxie, quæ accidit rupta vena.

QVÆ SVNT AB ANNO XVIII. AD XXXV.] Causæ vltcrius deduci non possunt, quàm à nobis deductæ sunt initio huius tractatus, & superiore prognosi. Vt paucis dicam; facillimè omnium venæ rumpuntur iuuenibus: tum αἱματικός per spadonem, cohibita familiari hæmorrhagia, vel etiam sanguinis carullientis orgasmo: tum μετὰ μεσάκος, tam intrà, quàm extrinsecus; idque vel casu, vel diatræ vitio in victus ratione, & vitæ instituto. Annorauit Galenus, ætates hîc dici plurali numero, quòd illis annis qui sunt à 18. ad 35. exigantur duæ ætates, videlicet pubertas & iuuentus. Ac finem præceptor statuit excretionū omniū criticarū, potissimùm verò hæmorrhagiæ, trigessimūquintum ætatis annū.

8 Τὰ κνησιμόδεα σώματα μὲν κοιλίης γαστρίᾳ ἐν φθιζικοῖσι κακόν.

Pruriginosa corpora post alui suppressionem in phthisicis; grave malū.

NIHIL MORTIFERUM magis est quàm falso credita, aut insidiosa symptomatum funestorum leuatio. Solenne est illud. Τα θάνατος, ἀσθμία, & αἰσθησις πρὸς τὸν θάνατον συμβαίνει. i. Lethalia quæ abs te miscescunt; mortem subesse testantur. Exempla non ita pridem adducta sunt ad illam prognosin. Latens dolor qui cum spūto bilioso euauuit; insaniam facit. In phthisicis, vt nihil pestiferum magis est quàm diarrhœa per quam ad exitum præcipitantur, propterea quæ dicitur à præceptore τὸ πρῶτον, i. illud ipsum quod perimus: sic insidiosa eius repressio, tantum abest vt aliquid opis & adiumenti adferat, fortè ad vsum diuturnioris vitæ; vt ipsam dulcedinem auferendo per impatientem moræ pruriginem, efficiat ne diutius in periculo sint, sed vt celerius moriantur. Id ita esse, planum faciet ratio huius prognoscæ.

PRURIGINOSA CORPORA.] Quorum impuritas putris est & falsa, primum hepatitis, mox aliarum venarum *αἰμοφύσας*, cacochymiam suam in venulas cruentantium, ac velut *ταυρία* in quandam edentium. Hinc fœda venit pforæ prurigo, quæ nullam diurnæ neque nocturnæ quietis partem imperterritis quos impatienter exercet.

[POST ALVI SUPPRESSIONEM] Repressa scilicet diarrhoea, cuius causa superstes, eodem plane modo pruriginem excitat toto corpore, quo diarrhoeam ipsam ciebat. Vt autem per epigenesin diarrhoea constabat: sic etiam importuna perque molesta pruriginis proritatio. Nam si per metaptasin exorta esset illa prurigo, cum redintegratione & officio partium nutritiarum; bona spe consolaretur medicum, aut retinendam adhuc salutis, aut certe productioris vitae. At causa diarrhoeae manet superstes, quam diximus positam esse vel in efficta virtute partium nutritiarum quae coquendo; distribuendo, & excernendo, naturalem oeconomiam componunt & administrent; vel in prolapsu catarrhi maligni, facientis alium aphthosam. Atque superstitis causae, naturalem oeconomiam labefactantis argumentum est prurigo illa firmiter fixa, non fugax, vt esse solet quando incidit per metaptasin; cuiusmodi sunt tubercula, exanthemata, tum cutis ictérica defœdario. Firmiter autem fixae pruriginis causa est cachexia; huius verò, perennis impuritas viscerum & hepatitis, eaque putris & salsa; vnde totius corporis nutritio deprauata.

[IN PHTHISICIS] Quorum iam vires effictae languent à phthisi & diarrhoea, & qui iam multum emacruerunt à triplici causa emaciandi, quam phthisis, vt ita dicam, secum portat.

[GRAVE MALUM] Denunciant atque inferunt: ac denunciant quidem, origine mali vnde prurigo accidit, quae inueterationem & inexpugnabilem causae morbificae perennitatem ostendit. Miserrima est enim quae in marcorem incidit cachexia: inferunt autem, molestia quae somnos adimit, & remeabili vapore putri & fœdo. Huiusmodi sunt pectora rubris maculis supersparsa empyicorum, quae mortifera esse dixit præceptor. Huc pertinet illud etiam quod supra iam positum est. Si cui spua salsa, *ut rubet corpus velut exanthematis obsitum: sed ante interitum exasperatur.* Vide comment. ad illam prognosin. Ergo diarrhoea phthisicorum lethalis, repressa immerito, & in cachexiam conuersa; mortem subesse testatur, ipsamque, celerius opinione, adducit.

Coac. 55. cap. 1.
super.
Coac. 15. cap. 7.
lib. 2.

9 *Ἐπὶ τοῖσι Φθινώδεσιν ἔξῃσι, μὲν πυρετὸς, ἐς ἔλα καὶ ὀδόντας ρεύματα Ἰνφανόμυρα κακόν.*

30 *In habitu phthisiformi, cum febre, si fluxio in dentes & gingivas coorta sit; ingens malum.*

[IBI DEMUM] in propinquo est malum, statque, vt dici solet, pro foribus, vbi ad præparationem excipientis causae accedit vis efficiendi. Nam vtriusque causae societate & quasi conspiratione quadam, atque consensu, omnia fiunt quae sunt in rerum natura. Ne longum faciam, facilis est generatio phthisis in habitu phthisiformi, quotiescunque incidit causa phthisifera. Iam verò qui sit habitus phthisiformis; quae item causa phthisifera & habitui consociata, vel quae suam illi dicat operam ad generationem & impressionem phthisis; id verò est quod hæc prognosin in quaestionem adducit.

40 [IN HABITU] In habitudine corporis quae cernitur in charactere, colore, & mole: tum autem in collocatione, situ, & apta cum quodam lepore conuenientia, aut contra indecora compositione partium singularum καὶ τῆς ὁμομελίας. Quae habitudo, prima sub aspectum cadit, estque tractabilis. Nam suus est etiam cuique parti habitus, eorum quae in præcordiis aut hypochondriis continentur, vnde homines μεγάλας αἰχρῆς καὶ πυρετοὺς αἰσθάνονται dicuntur, quorum scilicet canaliculus bilis prorepit ad fundum alui, non ad tenue intestinum. Tales biliosi sursum ex habitu nominantur.

[PHTHISIFORMI] Qui præ se fert speciem & ideam, suscipiendae phthisi & fouendae accommodatam siue idoneam, cuiusmodi est hominum thoracis angusti, dorsique alati, quibus ex conuexione ceruicis, quae est recticava καὶ φέρει, pectori ferè mentum annectitur. Tum autem qui turbinato sunt capite, palato nimis altè fornicato, ac dentibus quasi pectinatim committis. Hæc fabricatio est τῆς φθίνουσας, quos ita esse docet Hippocrates. ὁ δὲ τῶν τῆς ἀπορροῆς ἀδυναμία; ob eamque causam, fortis catarrho phthisifero: quod ei gignendo, ciendo, & excipiendo, magna sit thoracis & capitis sympathia, magna etiam syntimoria. Hic enim paupertas caloris viuifici, angustiam facit thoracis vnde crudor cerebri, cuius propugnaculum caput in vitio est formatura & complexione ipsa. Hinc repletio assidua capitis; vt nulla hominum fabricatio sit catarrhi maligni feracior, quam talium τῶν φθινούσων, quos inde vocat præceptor φθινώδεις: quod viscerum & hepatitis, aortaeque ipsius impuritate; capitis repletionem & destillationem perenni, cæteris omnibus antecellant. Denique hi sunt ἀδυναστῶς ἔχοντες, οἱ δὲ πῶς τὴν φύσιν ὁρᾷ τὴν φθίνουσαν, i. qui valetudine vtuntur dubia, quorum natura vergit ad phthisin.

lib. 2. cap. 1.
lib. 1.

[CUM FEBRE] In talibus hominum naturis catarrhi feracissima, ipsum gignendo atque ciendo. Idem facit vinum quod citò caput replet, indeque est καρὶ κεφαλήν. Et verò nunquam cessat catarrhus donec febris quicuerit. Vt in stillaritiis aquis, non sit stillandi finis, quandiu accensus est focus. Quicquid enim vaporem sursum effert, nec dissipat; stillicidij causam adfert. Quamobrem consideratè multum, vt cætera omnia, dixit Hippocrates. Conuulsionem sanari ab exorta febre acuta quae prius non fuit: quod si prius fuerit, exacerbata; vt par sit conuulsifica cause.

part. 18. lib. 2.
6. Epid.

Coac. 11. cap. 14.
lib. 2.

[SI FLUXIO IN DENTES, ET GINGIVAS COORTA SIT] Vel, ad verbum ex mente authoris; si fluxio feritatem suam ostendet in dentibus & gingivis, vt illis quidem inferat spha-

Coac. 8. & 9.
cap. 7. lib. 2.

celissimum, his verò exulcerationē vel abscessum; peius habiturū ipsum pulmonem, cū eò illapsa fuerit.

Coac. 13. cap.
7 lib. 2.
infra, in
Coac.

INGENS MALVM] Quod scilicet remeando & permeando, sursum deorsumque prorepat: At remeando quidem: quoniam. *Si denique syderato ingens cum delirio febris accesserit; mortiferum: sin autem periculo defungantur, ossa illi abscedent.* Nam in his casibus magna cerebro est sympathia, quæ in officij communicatione, & vicinitate cōsistit. Permeando autem, catarrhi vis effera in aluo diarrhœam aut dysenteriam, in pulmonibus autem phthisin exitialem parit: præsertim iis qui sunt natura phthisici. Nam quod in aluum prorepat, ibique tyrannidem suam exerceat; in promptu sunt illa dogmata præceptoris. *Qui è gingivis cum aluo liquida sanguis exudat; pestiferum.* Et. *Ora gravidarum aphthosa, terrifica.* Num etiam perliquidas reddunt aluos? De facili autem catarrhi prolapsu in pulmones *phthisis*, quos hîc & supra descripsimus; otio esset abuti, pluribus demonstrare: quando id ratum est omnibus: ac nemo sit omnium, qui nostra hæc legerint, quem id nescire persuasum habeam.

10 *Ἐπὶ πᾶσιν ὑποχόνδρια μετέωρα κακὸν. κάκιστον δὲ Ἐπὶ τοῖς φθιστικοῖς.*

Hypochondriorum meteorismus, cū ceteros malè habet; tum vero eos pessimè quos phthisis exercet.

CAPUT EST ad perceptionem huius prognoseos, primū intelligere; quod eò peius, ægrotiores eunt, quod plures naturæ principatus in vitio sunt. Quod nemo inficias inicit ita esse. Cū igitur duplex omnino sit œconomia naturæ per quam vita hominum sustentatur; vna quidem spiritus; altera, nutritus: profectò malè res eunt si alterutrius malè morata, malèque constituta sit ratio: pessimè, si vtriusque. Ac sanè vitia vtriusque cernuntur in hac prognosi cū legitur. *Hypochondriorum meteorismus, pessimè illos habet quos phthisis exercet.* Est enim spiritus prægrande malum in phthisi; nutritus, in hypochondrij meteorismo, qualem hîc velit præceptor: tum autem quemadmodum fiat, & quorum appareat.

HYPPOCHONDRIORVM] i. Illarum abdominis partium quæ sunt proximè cartilagineos thoracum costarum, & ensiformis: vel eorum viscerum quæ hypochondriorum quasi complexu fouentur, hepatis, lienis, diaphragmatis, & cordis vulgò dicti stomachici. Hæc enim per metonymiam hypochondria quoque dicuntur, ac suos quæque habent meteorismos, vel abditos, vel in abdomine manifestos: sicut abdomen ipsum proprio tumore obfessum.

METEORISMVS] i. Tumor in hypochondrio aspeçtabilis; non quidem eius vitio: sed partium abditarum, quarum etiam suus est meteorismus, tractabilis tantum intrà; de quo illud scriptum est. *ὑποχόνδριον ἔντονον κακώδες*, i. *Hypochondrij submollis distentio.* Hîc superstilitio esset, denuo recensere varias meteorismi distinctiones quæ positæ sunt in tumoribus, in spiratione difficili, & in habitu decumbendi. Tot enim reperio apud Hippocratem, quas auper attigimus. Hîc scire licet, hypochondria dici *μετέωρα*, πᾶσι ὅντων μείζον καὶ τὰς πολλὰς αἰτίας γινόμενα, i. *quæ in molem maiorem, multis de causis, assurgunt.* Causæ autem cur sic assurgunt, tres omnino dictæ sunt à præceptore; inflatio, inflammatio, scirrhus. Inflatio fit à spiritu flatulento, eaque duplex; cum borborygmo, & cum torminibus. Cum borborygmo, recens atque fugax: quoniam borborygmus ille sic editur, flatus exclusione deorsum. Itaque citò exoluitur, vel cum deiectionibus & urinis, vel ipse per se traiectus, vel ad sedes inferas deuolutus. Inflatio cum torminibus, contraria est borborygmo: est enim dolorifica; ille doloris expertus: hæc sursum mouetur, ille deorsum. Atque hæc recens, aut vetus. Ac recens quidem, à sero bilioso quod exudat à iecore in tenuia intestina. Vetus, ab intemperie hectica tenuium intestinorum, quæ hydræpem siccam prænunciat. Sed hypochondriacæ phlegmones duo sunt genera; vnum fugax & simplex, alterum firmiter fixum atque systrophicum. Vtrumque facit in hypochondrio meteorismum: sed illud quidem doloris expertem; hoc verò dolorificum atque durum. Fugax est hypochondrij phlegmone: fugax item meteorismus qui ad hæmorrhagiam apparet instante crisi febris acutæ, per sanguinis ad caput anadromen. Fugax est etiam meteorismus quem humor attollit peripneumonix, dum ad crura cursum inflectit, ubi abscessum facit. Talis in Herophonæ fuit sinistri tensio hypochondrij, quam hîc meteorismum dicimus. Sed à systrophica phlegmone iecoris aut lienis, hypochondrij meteorismus assurgit dolorificus atque durus. Est autem huiusmodi, tum proprio viscerum ipsorum vitio, tum alieno. Ac proprio quidem; conuexarum hepatis partium tensione prægrandi, & intemperie, ab humoris infarctu præcalidi & glutinosi. Nam alieno vitio dolet hypochondrium, non autem suo, à viscerum oppressione nimis distentum. Atque systrophica tantum phlegmone iecoris aut lienis, meteorismum hunc facit durum, recentem, ac dolorificum, quem veteres nominarunt *καρτίσμα* τῶν ὀνείων, καὶ ἐπὶ δυνάμιν. Nam eius qui à scirrho attollitur, inueteratio est, ac doloris vacuitas; item borborygmi, & torminum. Diaphragmatis inflammati consecutaria est vtriusque hypochondrij sursum intrò retractio, vt in Sileno. Et. *Quibus acuta vox, hypochondria intrò sursum iis reuulsa sunt.* Ac satis iam de hypochondrij meteorismis, quorum ille demum ius habet calamitatis in hac prognosi, quem phlegmone viscerum systrophica excitauit. Declarat illud quod ait, cū ceteros malè habet. Nullus autem, præter hunc, ceteros malè habet periculosè. Nam scirrhi & torminum hîc nulla opinio esse potest.

CUM CETEROS MALE HABET] i. Omnes omnis ætatis, sexus, naturæ; quocunque illi morbo laborent: qualem fuisse legimus Hermocratem cum febre acuta, & capitis atque lumborum dolore, qui *ἰσχυρὸν* habuit *τὴν ἰσχυρὰν κατὰ τὸν*, ac sexto die fuit ictericus; obiit autem 27. Qualem Apollonium Abderitam, qui cum diu *ὁρῶντι* progressus esset, quanquam egre, quod esset *μεγαλὸν αἷμα*, & familiariter ei iecur doleret, ac tum colore icterico multum fœdatus; tandem victus morbo decubuit, ac 34. die interiit. Huiusmodi sunt icterici omnes quibus dextrum obduruit hypochondrium. Ne multa, ut hypochondriorum *ἰσχυρὰ* & *κατὰ τὸν* in omni æqualitate, cum spiratione facili, præclare ad salutem apparet & facit in omnibus morbis acutis: sic inæqualitas illa triplex hypochondriorum, & impedita respiratio, terrificæ omnino debet haberi, quando excusationem non habet perturbationis criticæ ad salutem. Denique nunquam in tuto est ille qui meteorismum gerit hypochondrij stabilem, & firmiter fixum.

TUM VERO EOS PESSIME] Et periculosissimè: nec iis diutius periculo locum esse sinat, qui ea forte citò intereunt.

QVOS PHTHISIS EXERCET] Qui dominatu phthisis tenentur cum signis prædictis. Nam dolorifica hypochondriorum mala, quæ tacit inflammatio viscerum systrophica; homini necando ipsa per se satis sunt: sicut & ipsa phthisis. Ac dolorificus atque durus hypochondrij tumor, per initia quidem natus, mortem brevi affuturam denunciat: nisi primis periodis per hæmorrhagiam liberalem, periculi locus tollatur. Ergo si ad phthisin accedat hypochondrij tumor, celeritas incidit moriendi: quoniam fatalis ad interitum morbi accessio fit: ne taceam interim perennitatem causæ phthisiferæ quam fundit hypochondrij meteorismus, ut spumantem inde sanguinem effundi iam viderimus: quem ego non successione phthisis, sed potiùs accessione primigenia, exortum fuisse arbitror, & consecutionem attulisse phthisis, non hanc illius. Nisi quis fortè obiciat illam prognosin. *Quibus hypochondria tumore affurgunt, alio suppressa; malum: malum est etiam quibus inueteratione morbi tabescentibus, alui profusè setuntur.* Sed nihil ad rem.

Coac. 46. cap. 16. lib. 2.
Coac. 17. cap. 11. lib. 2.

II Τῶν μακρῶν Ἰπὶ τοῖσι τετηκόσι ὀλεθρίοισιν ἐνίοι πορὶ τῆς τελειῶν Ἰπὶρριζοῦσι.

Qui ex longa phthisi consumpti ac desperati sunt; nonnullis ante finem vita, rigor cietur.

PRUDENTIS est medici, non solum funestos exitus prævidere morborum: sed ipsam quoque mortem iis indicare qui proximè absunt à fine. Ac non id quidem cum animam desperari agunt: id enim faciunt idiotæ: sed cum in spe viuitur longioris vitæ, aut etiam retinendæ adhuc salutis. Mortem in propinquo esse quædam signa testantur quæ vulgò putantur *ἀμφιδόξα*, nec nisi à sciente animaduerti possunt quorsum illa fiant atque appareant. Huiusmodi sunt illa. Qui prorupto sanguine perhorrescunt in *ἰσχυρὰ*; grauißimum habent malum. At *ἡ* vitam finituri differendo, nec opinantes. Et, Qui à morbis acutis aut longis, vel à *ἰσχυρὰ*, vel undecunque multum emacuerunt, si atra bile aut sanguine nigro aliis ducatur; possidendi moriuntur. Et quoniam illud, *ἡ* μακρῶν, ancipitis iudicii est (Nam eò referri potest quod modo Latine posuimus de hypochondrij meteorismo in phthisicis; Græcè autem sic habet. *Οἷον τὸ πορὶ τῆς τελειῶν ἰπὶρριζοῦσι*) erit, meo quidem iudicio, commoda huius prognosæ formula, his verbis concepta.

Coac. 3. cap. 13. lib. 2.
aph. 3. 4.

Coac. 17. cap. 11. lib. 2.

E phthisicis qui longa phthisi planè confecti sunt ac desperati; nonnullis ante finem rigor cietur.

ATQVE HANC formulam legi velim pro stylo ipso prognosæ, cuius enarrationem sic instituimus.

E PHTHISICIS] Quorum historiam pridem tenemus, nec dum excidit animo; ut nihil necesse sit nouam ordiri, minùs autem retexere.

QUI EX LONGA PHTHISI] Quæ in vetustatem incidit, & cuius inueteratio inde fuit, quod neque succedanea sit empyematis; nec primigenia perennitatem exceperit catarrhi ferini; nec perennem habuit malignam anadromen; nec accessionem aut consecutionem diarrhoeæ mortiferæ, quæ sæpe ante diem phthisici ad exitum præcipitatur: sed quæ in pulmonum vlcerè solo manet, suis comitata symptomatis, quæ & iam dicta sunt, & mox loco dicentur.

PLANE CONFECTI SUNT] i. Contabuerunt, vel macie conciderunt à tribus illis emaciandis causis quas inesse diximus in exulceratione pulmonis vnde ipsum vlcus nomen sibi vendicat phthisis. Sunt autem; ipsius edacitas, febris hectica, & spiritus, quem spirando inducimus, tabifica vis, ipsi à pulmone impressa. Quinetiam huc conspirant tres illæ contabescendi causæ, quas ita literis mandauit præceptor. *Γενεσιάν τε χρόνι μακρῶν, καὶ ποτὶ πολλόν, καὶ κακῇ ἐμπεψέως, i. a longo tempore, laboribus multis, & colliquatione assidua:* quamuis non eò scribantur à præceptore, sed ad generationem prauorum abcessuum. Nam longo tempore, multo labore, & colliquatione praua homines contabescunt. Quæ

aph. 3. part. 2.

aph. 7. 2.

6. Epid. part. 3.

tria sunt posita in phthisi prædicta. Hic enim à phthisi longa, similiter macies extrema inferitur, ut à febre ardentem acuta atque tabifica, quæ circa initia facit oculos concavos, collapsa tempora, & nares acutas. Notum est illud. Τα ἐν πικρῷ χρόνῳ λεπυρόμενα στήματα, καὶ σπλάς ἐπικρατὲς ἐφ' ἃ καὶ ἐν ὀλίγῳ, ὀλίγῳ. I. Quæ longo tempore extenuata sunt corpora, sensim reficere oportet: quæ autem brevi, confestim. Nam extenuationis inchoatæ & confectæ signa sunt alibi tradita eo stylo. Extenuatio primum cutim relaxat, postea verò descendit, &c.

AC DESPERATI] Adducta in sympathiam naturali œconomia, quam sui iam tædet officij, ac signa edit malè gestæ rei in diarrhœa: pus verò phthifici, iam fœdi odoris est, in ignem impositum, petitque fundum aquæ marinæ in eam coniectum: ut iam nulla salus in phthifico sperabilis esse possit, collapsis prædiis œconomix utriusque, tum spiritus, tum nutriticus; effecta virtute partium spirabilium & nutritiarum, quarum singulari vitio, naturæ commoda in summa incommoda transierunt. Nam loco nutriticus, defraudatio est atque corruptio alimenti; tum spiritus loco viuifici, tabifica respiratio.

NON NVLLIS] Quibus fortè substitit expurgatio fœdi ac virulenti puris, unde spiratio difficilior, & febris intensior.

ANTE FINEM VITÆ] Paulò antè quàm è vita excedant, aut vitam cum morte commutent: quæ commutatio insperata, tam citò accidit, derepente oborto rigore, ut mox dicetur. Ac vitæ finem adfert coniuncta cum extinctione paulatim obrepente, repentina suffocatio caloris vitalis.

aph. 46. 4.

initio 1. lib.

RIGOR CIETVR] Tum ab vlcere sordibus valde oppleto: tum à vasis, transfusam ab vlcere puris impuritatem exprimentibus in carnem & cutim, quarum concussione rigor cietur: qui quoniam frustra fit, translationem facit ad cor & ad cerebrum, cum afflictione summa caloris viuifici, ad rēperit vsque perducti; ad cuius extinctionem, repentè ingruit suffocatio. Est enim sic ratio comparata crebri rigoris, ut homines morbo iam fractos, ad mortem præcipitet. Et verò effectæ vires, tantam concussione perferre non possunt. Ac de rigore omni symptomatico, multa sunt alibi disputata, & quæ non est animus huc transferre.

12 Τα ἀμυχώδεια Ξανθήματα · Φθίσιον ἔξις σημαίνε.

Pustulata corpora velut ambusta; phthisin ostendunt habitus.

Vel.

Τὰ ἀμυχώδεια Ξανθήματα · Φθίσιος ἔξις σημαίνε.

Pustulata corpora velut ambusta; phthisin confectam ostendunt.

lib. 4. acut. & 2. Epid.

Coac. 6. cap. 16. lib. 2. Coac. 15. eiusd. cap. Coac. 33. eiusd. cap.

lib. 2. progn.

Coac. 8. huius cap. Coac. 15. cap. 7. lib. 2.

lib. de arte.

lib. 4. acut.

V T R O Q V E stylo vera est instituta prognosis, & appositè scripta ex mente authoris. Nam pustulata corpora, velut ambusta, & habitus phthisin, & ipsam phthisin confectam ostendunt. Ac phthisin quidem confectam, cuius dominatu ad vltima ventum est, pulmonibus purulente limosis, ut quodam loco scripsit præceptor. Exoriuntur autem pustulæ illæ πνευματώδεις, vel ἀμυχώδεις, ex affluxu & collectione ichthium venenatorum & acrim, corporis erodentium, vel amburentium. Qualis autem subliuida est bulla continua in lingua tumescens, cum pleuritidis funesta est; quæq; eam refert, in oleum immersi ferri candentis; ubi multum interesse vidimus inter linguam bullatam & bile suffusam: tales hoc loco sunt pustulæ phthisorum ambustæ. Quod si pectora rubris maculis sparsa, peripneumoniæ sunt malè habentis mortiferæ quos inuasit; non minus periculum inferri testantur pustulæ à phthisi exortæ, quarum generatio & origo supra iam posita est in empyemate inueterato quod proxime ad phthisin accedit. Εξῆν autem vocat τῆς φθίσεως quæ opponitur τῇ ἔξι; non inchoatæ quidem: sed planè confectæ, & ad extremum perductæ, ac firmiter fixæ & stabili. Quo etiam stylo scribuntur febris hæctica, elephantia, leuce, marasmus, & intemperies omnis æqualis. Est igitur phthisis confectæ, pulmonis purulente limosi perfecta exulceratio, cuius τὸν ἔξιν ostendunt corpora pustulata, & bullis, velut ambustis, obfita. Talium autem bullarum causæ adductæ sunt.

Altera lectio est huius prognoseos de habitus phthisi, quæ non est febris hæctica; nec enim phthisis est febris, nec in hac febre, corpora sunt pustulata: sed phthisis est habitus, vel in complexione partium aspectabilem, vel in earum structura. De complexione, illa sunt posita. Pruriginosa corpora, cum suppressa est alius; in phthifico graue malum. Est enim miserrima quæ in tabem incidit cachexia. Et si cui sputa salsa, vnaque tussis inhibentur; iis rubet corpus velut exanthematis obfuit: sed ante interitum exasperatur. Hæc enim pertinent ad marasum & corruptionem partium solidarum. Et verò, quicquid in corporis habitu cautum est, καὶ ἀκίνητον, i. incohibile, cuiusmodi sunt interstitia musculorum; ut spiritu repletur in secunda valetudine: sic ichthibus in aduersa, quorum collectione, præter perennem affluentiam à viscerum corruptione, pustulæ toto corpore excitantur erodendo, vel amburendo. De habitu autem phthiformi ex partium structura & fabricatione ad suscipiendam phthisin idonea, certum est inde pustulas exoriri posse, unde ipsa quoque phthisis exoritur, & vna sæpe incidit diarrhœa: nempe a catarrho quem edit pituita putris & salsa. Tum huius confectæ phthisis confectariæ esse potius, quàm alterius quæ accidit à rupta vena


à rupta vena pulmonis. Hoc stylo igitur legi potest prognōsis. Ambusta pustula, sunt phthisis illius quæ nascitur ex habitu phthisiformi: sicut defluuium capillorum, & socia diarrhoea. Longè alia est conditio eius quæ cadit in eas ætates quæ sunt à 18. ad 35. annum. Hæc enim habitus non est, sed iuuenilis ardoris, & multi sanguinis biliosi; vnde ruptio venæ crassæ pulmonis, & inde phthisis. Descriptio habitus phthisiformis, ad viuum nuper expressa est commentario ad nonam prognōsin huius tractatus.

13 Οἱ δὲ πνοοὶ πληροὶ, πολλὰ ἀπεπνία ἀνὰ ζῶντες ἐν φθίσει ὀλέθριοι. malè fuit
ἐπὶ πνοῇ

13 *Suspiriosi ex nimia puris abundantia, & cruda expuentes multa in phthisi; desperati.*

EQVIDEM nunquam fastidiosè iudicari de verbis & stylo prognōscere in hoc libro scriptarum: sed religiosè correxì, duce auctore, quicquid non esset consentaneum suæ maiestati. Sed facere non possum quin hic dissentiam à lectione vulgata, ac pro ξηρώσι, legendum putem παρὰ. Nam & ξηρώσις nomen apud Hippocratem nouum est, ac nihil præscribit meditandum hic dignum Hippocrate. Penè dixerim, ineptiæ sunt comminisci πνῆμα πρὸς στήθος, conuulsionis sobolem in thorace. Hoc febrium est acutarum ardentium, nec ullam hinc societatem habere potest cum expuitione multorum crudorum. Et verò dyspnœa omnis partium spirabilium, frequens & parua est, quam edit proprius ipsarum dolor vel inflammatio. Ibi nulla ξηρώσις: verùm angina, pleuritis, peripneumonia, & asthma. Hinc nimia puris abundantia spirationem facit asthmaticam cum horrore. Qua de re illud præceptum est. *Labores horri-feri, cum suspirioso anhelitu; signa sunt phthisis, mortifera ex hoc loco.* Cur autem mortifera sit, dictum est supra.

DE HEPATICIS.

30  *ΙΣΙΝ ἡπατικοῖσι πολὺ πύαλον αἱματώδες, εἴτε σύν- C A P. X VIII.
πόσαωρον, εἴτε λευκώδες ἀκρητον ὀλέθριον βλάψως.*

1 *Quibus hepaticis copia est cruenti sputi, eiusque vel nōnihil mali odoris, vel biliosi meri; cito mortiferum.*

QVEMADMODVM præclarè Hippocrates, non omnia, inquit, iisdem nominibus appellata, easdem vires habere, quamuis non sint æquiuoca; sed quòd eiusdem speciei variz sint idæ: sic nominum deriuatio similiter facta ad nomenclaturam morborum & ægrotorum qui partium obfessarum nomina sibi adoprant, non semper eandem in omnibus denotat ipsarum partium conditionem, vnde nomina deriuantur. Nam, exempli gratia, pleuritis & pleuriticus, hepatitis & hepaticus; eiusmodi sunt; illa quidem ab inflammatione systrophica lateris; hæc verò, ab hepatis ἀπνία, sine systrophica phlegmone, quam dyscrasia prægrandis inuexit. Et tamen eorum similis est deriuatio, & similis analogia in deriuando. In promptu sunt Galeni placita super hepaticis, omnia suo quæque loco scribenda in stylo prognōscere, quæ complectuntur omnem hepaticorum formam & speciem, omniæque ipsorum symptomata. Hæc igitur primæ lex de signis hepaticorum atque symptomatū fāciatur. Nam scrupulus quem mihi præceptor iniecit de triplici hepate, contra Galeni placita, per Dei gratiam eximetur, nec animo fixus hærebit donec finem faciam disputationis.

30 QVIBVS HEPATICIS] i. iis qui hepate laborant; vel quos hepatitis malè habet periculose. Est autem hepatitis, hepatis ἀπνία, i. exolutio: hepatis dico ὁ καὶ καρδιάμας, i. è norma & præscriptione sui proprii temperamenti & complexionis, procul egressi: atque id sine phlegmone systrophica, & sine scirrho. Quæ ratio egressionis iam demonstrata est supra. Vt propriè sit hepatitis; exolutio virtutis hepaticæ, ex qua hepatici nominantur. Virtutem intelligo πλὴν ἰσχύϊ, i. substantiæ ipsius robur, cuius potentia est ipsa δύναμις, Latine facultas dicta, quæ versatur circa officia partis cuiusque. Ac trium principatum quorum dominatu regitur ipsa corporis vniuersitas, totidem facultates esse dicuntur; hepatis quidem, nutritia; cordis, viuifica; & cerebri, animalis. Hinc de nutritia; cuius perditio similiter mortifera est, ut viuificæ facultatis à phthisi: ut paria esse videantur incōmoda phthisis & hepatitis. Atque ut vitale officium perit à phthisi descripta: sic ab hepate nutritium. Porro hepaticæ facultatis ab hepate naturaliter constituto, in laude est sanguificatio (liceat enim sic loqui per analogiam mitificationis quam Cicero vsurpauit: ne quis momentorum auceps mihi obganniar.) Eaque sanguificandi actio, sicut virtute & integritate perficitur hepatis: ita suscipitur ope & ministerio illarū quatuor facultatum quæ ab officio nominantur, attractrix, retentrix, coactrix, & expultrix. Earumque omnium, totidemque actionum, præsidia sunt; hepatis ἐν πνία, vasorum libertas, ἐν πνία, καὶ ἐν πνία, optima conspiratione atque admodum enim, cū illa tria in promptu sunt, ἐν πνία, ἐν πνία, καὶ ἐν πνία.

consensu, facultati cuique actio morem gerit in attrahendo, retinendo, coquendo, & expurgando; unde sanguificatio ipsa voris naturæ responderet: ita collapsis tribus illis præfidiis, labefactantur auxilia *αἱματώσεως*, i. sanguificationis, ac nulla facultas officium facit, omnisque cessat actio, aut certe in vitio est deprauata vel imbecilla: ut est conditio facultatis, meatus, & chyli. Enimvero sicut illorum trium *ἐν τῇ αἱματώσει, ἐν τῇ χυλῷ, καὶ ἐν τῇ σπλῆνι* conspiratio esse debet, ut inoffenso cursu progressio fiat *τῆς ἰσχύος πρὸς τὴν διάνοιαν*, & *διάνοιαν πρὸς τὴν ἐκτέλεσιν*, i. virtutis ad facultatem, & huius ad actionem, unde perficitur sanguificatio naturæ consentanea: sic eorum discordia concidit triplex illa consensus, actionis non morigeræ facultati, nec huius virtuti & robori principatus. Est quidem virtutis & roboris exolutio, ipsa perditio facultatis; & perditæ huius symptoma, vacuitas actionis. Verum hæc retrò non commeani; ut actionis læsio, sit facultatis offensæ; & huius offensio, exolutæ virtutis quam in *ἐν τῇ αἱματώσει* ipsius substantiæ positam esse diximus. Exemplo sit hydrops, qui non solum accidit alienatione facultatis sanguificæ: verumetiam impedimento functionis hepaticæ. Pariter enim fit, non tamen similiter, *ἡ ἀπώρυξ τῆς αἱματώσεως ἐργον*, i. alienatio sanguificandi operis; tam ab impedimento quàm deperditione functionis hepaticæ. Ergo duplex erit generatio hepatis quæ homines facit hepaticos; una quidem hepatis impedita functio; altera verò substantiæ ipsius primigenia exolutio. Impeditæ functionis duæ sunt causæ proximæ; privatio seu deprauatio primæ coctionis; & interceptio distribuendi chyli, quam *ἀνάσσειν* Græci vocant: ut iore dici possit interceptio digestionis. Interceptæ *διὰ τὸν σπλῆν* & *ἀπὸ τῆς σπλῆν*, tum autem *ἐκ τῆς αἱματώσεως* causæ, tam intrâ natæ, quàm extrinsecus incidentes, loco dicuntur. Planum sit igitur ex his quæ posui, per syntimoriam in vitio esse vicissim & mutuo, *ἰσχυρὸν & διάνοιαν, καὶ τὴν ἐκτέλεσιν*, partim ipsius principatus, partim meatuum, partim humorum. Est autem medici operæ precium, tenere scienter hæc omnia, ne vnquam fallatur, nec erret in *διαγνώσει & θεωρίᾳ* hepaticorum. Scientiam verò tenebit ex incommodis siue symptomatis, & ex signis quæ cuique apparent & sunt, cum perspicientia causarum tam *ὁρμημένων* quàm *ἐκσταμένων*, i. ingruentium & consistentium, foris & intrâ. Quæ omnia tempus est propalam explicare. Ac primum, iam illud verè positum est ac demonstratum, quod hepatis *ἀπώρυξ*, i. imbecillitas quæ facit hepaticos, causam habet dyscrasiam prægrandem. Est enim consentaneum, ut si robur hepatis, *καὶ ἐν τῇ αἱματώσει* fundamentum habeat *τὴν ἐκτέλεσιν*: imbecillitatem *καὶ ἀπώρυξιν* inferat *δυσκρασίαν* prægrandis, multum scilicet à naturali temperamento egressa in omni genere intemperiei, calidæ, frigidæ, humidæ, siccæ, & ex his compositæ. Nam quod recentiores quidam medici, omnem *ἀπώρυξιν*, vitium esse putarunt materiæ, non intemperiei; non intellexerunt profectò constare omnia *τῇ κατὰ τὴν φύσιν*, & *τῇ συνστάσει*, i. temperamento & complexione *τῆς συνστάσεως*, i. humorum quatuor; ac temperamento ius esse & imperium in complexionem, cuius mutatio frequens esse ab intemperie. Sed extra oleas hæc. Nunc mentis aciem dirigamus ad scopum. Est igitur *δυσκρασία* omnis, causa *τῆς ἀπώρυξιν*. Sed illa dyscrasia, aut primum & per se cadit in hepar, aut aliunde superuenit. Ac primum & per se, quæ *πρὸς τὴν αἱματώσιν* dicitur, i. primigenia. Primigenia est *συγγενής*, i. congener, velut parente sata; *συνέχου*, i. coactanea vel coæua: ut in iis quæ natura sunt *μεγαλοπαραχρηται*. Est autem *συνεχὴς* quæ cum ætate simul accreuit, diatæ vitio, in victus ratione, & vitæ instituto. Cōgenere dyscrasia, gentilitij iuris est elephantia, & virulentia; ne longius abeam. Coæua dyscrasia quam fouet malè moratum hepar, malèque constitutum, in complexione & fabrica; omnis aduersæ parens est valetudinis; frigida quidem, crudore, cacochymia pituitosa, & flatu; calida verò, ardore, putredine, bile primum flaua, mox atra, & ad extremum marasmo hydropico. Sed dyscrasie incremento, quod vitio diatæ infertur, omne genus accidit symptomatum hepaticorum. Sic Apollonio iam *μεγαλοπαραχρηται*, & iam icterico, pessimè fuit ab usu carniū bubularum & lactis caprini. Sic pestifera esse dicitur aqua mulsa omnibus *μεγαλοπαραχρηταις*. Nam trium generum hepatitis, primum quidem refert Hippocrates ad bilem atram, quæ autumno potissimum proripit ad hepar, ibique stabulando adducit in hepatis primum afflicti sympathiam, vicinas partes & socias. Sed alterum genus oriri dixit ætate *ἀπὸ τῆς κρεοφαγίας καὶ τῆς βουβίαν* & *οἰστρονίης*, i. ab edacitate carniū bubularum, & vini voragine. Sic merito dici potest dyscrasia *ἐκ παλαιῆς* diatæ *καὶ τῆς ἐκτέλεσεως* sicut *ἐκ παλαιῆς* morbi sunt qui cum ætate simul crescunt, virēsque acquirunt eando. Quales dicuntur esse podagra & calculus in vesica. Sed satis iam de primigenia dyscrasia quæ cadit in hepar, humores, & vasa; & quæ *ἀπώρυξ* causa est, tum *ἀπὸ τῆς ἀφύλης* tum *ἀπὸ τῆς ἐκτέλεσεως*. Super sunt quædam causæ procatactice, i. non intrâ natæ, sed extrinsecus incidentes, quæ nouam inferunt dyscrasiam, *τῆς ἀπώρυξιν* parentem, præter supradictam diatæ quæ auget *πρὸς τὴν αἱματώσιν* dyscrasiam. Sūt autem, diatæ olim sapienter institutæ mutatio in *φάλλῳ* & *φλαύειν*, profusa narium hæmorrhagia, profluuium muliebre quod vocant *ροαὴ γυναικεία*, hæmorrhoides licenter proruptæ; licentior etiam phlebotomia; tum balnea intempestiua, & forus. Hinc summa viscerum labe, quam *μεγάλῳ κακῷ* veteres nominant. Hinc deprauatio & perditio nutritus, cachexia, & hydrops. Denique hæc dyscrasia nuper exorta, nec minus firmiter fixa, quàm verus illa nobiscum sata, coæua, & simul increscens; omnino similiter productrix est symptomatum hepaticorum, ut illa prædicta. Nam quibus hæmorrhagia profusior est: labentibus inde diebus *ἢς* in vitio sunt alui, quæ feruntur partim liquidis excrementis, partim chylosis. Et. Ab hæmorrhagia, nigrorum, ut faculentis sanguinis, delectio; praua est: pestifera est etiam cum præterbri illius feritur alui. Profluuium autem muliebria saniosa, tum similes dysentericæ; ut sunt incommoda siue symptomata hepatis in suo sanguificandi munere fatiscens: ita per syntimoriam, ipsum peius habent periculose. Sed illa profluuiorum muliebrium incommoda scripsit præceptor in libris *τῶν γυναικείων*. De balneis autem & fomentis intempestiuis, illud præceptum est; frigida quidem *σπασμὸν* hepatis, ut loquitur Aristoteles, Latine crudorem & velut *νεκρῶσιν* quandam adferre: calida autem *νεύρων ἀσθένειαν*, *ἀσθενὴν δὲ τὴν ψυχὴν*, *γὰρ τὸν τὰ φύσιν ἢ τὰ φύσιν*, *αἱμωρρῶσιν*, *λεπτοθυμίαν*. *Ἐν τῇ αἱματώσει*, i. neruorum imbecillitatem, carniū effeminationem, stuporem mentis, hæmorrhagias, lipothymias; hæc quibus mors. Denique omnem *ἀπώρυξιν* hepatis comitatur

hist. 1. part. 3.
1. Epid.
lib. 3. acut.

lib. 1. et 2.
lib. 3. acut.

6. Epid. part. 5.

sph. 21. 4.

in aph. pron.
& Coac.

in proth. &
lib. 4. et 5.
et 6.

lib. 3. et 4.
et 5.

in problem.
sph. 16. 5.

comitatur coloris fœditas, atrophica, & cachexia. Et verò hepatitis primæ color est subliuidus. Secundæ ^{lib. 1. cap. 17.} auriginosus. Tertiæ niger. Ac pro dyscrasie cuiusque prægrandis idea, facultarumque, vasorum, & humorum vitio; symptomatum variorum fœtura est, quæ cernuntur in deiectionibus & urinis, tum in habitu colore, caractere, & mole. Nam impeditur functionis hepaticæ, non suo quidem vitio, sed alieno; incommoda mox infra dicentur, cum ventum fuerit ad hydropem.

Ergo. **QVIBVS HEPATICIS**] Quorum hepatitis & ^{lib. 1. cap. 17.} æmilia, repente impressa est, a vetere dyscrasia hepatis, vel partium vicinarum & sociarum, per quam præsidia collabuntur, ^{propterea 17. C. 2.} cuius labefactæ in hepatico adolescente signa obseruauit Galenus; excretionem multam proluuiei rubræ, & urinas, similiter vt est aqua, tenues atque albas, cum febre, quam stylo Hippocratis ^{lib. 1. cap. 17.} βαλάνος, suo autem nomine nominauit. Sed hæc ^{lib. 1. cap. 17.} καὶ δὲ ὑπόθεσιν hepatici adolescentis, non καὶ δὲ ὅλην hepaticorum omnium. Sūt enim alia signa & incommoda hepaticorum, pro varia, quæ ipsos facit, virtutis facultarumque dyscrasia, & variarum facultatum offensione: vnde & varia læsio actionum. Nam vt omittam cætera; impeditur digestio ^{lib. 1. cap. 17.} ἡ ἀπὸ δόσεως, tum vitio attractricis, tum exolutione vel obstructione vasorum; signum est chylosa deiectio: cessante autem coctrice, fit excretio proluuiei rubræ.

COPIA EST CRVENTI SPVTI] Non quidem similiter vt qui spumantem expuunt sanguinem, dextræque laborant hypochondrio: de quibus extat prognos̃is: sed quorum exoluta est vis expultrix cum ipsa coctrice; nec rubra proluuie fertur alius; vnde collectio illa plethorica, cum deprauato naturæ impulsu, qua data porta, exitum sibi quarit, faciliemque viam inuenit quæ exeat per efflationem thoracis, secundum spacia interiora pulmonum. Est enim ratum illud: quod solita excretio sanguinis, si iure & loco non fiat, aliò cursum inflectit vt exitum habeat. Sic denegata proluuiei rubræ excretio facit hæmoptysin in hac prognos̃i positam. Nec mirum in syndrome officiorum deprauatorum, extraordinaria signa edī. Est quidem frustrata sanguificationis, & resolutæ in coquendo virtutis hepaticæ, ordinaria proluuiei rubræ per aluum excretio, cum urinis tenuibus albis: sed proluuiei suppressæ in hepate vbi gignitur, extraordinaria est copia sputi cruenti: sicut mulieri menstruali cui menstrua non respondent, nouum est sanguinem vomendo profunderere & extraordinarium.

EIVSQVE NONNIHIL MALI ODORIS] Cuius fœditatem contraxit cacochylia suppressa in hepatis amplitudine, vbi ^{lib. 1. cap. 17.} τέχνησι facit denuo caloris natui: sicut ipsius est soboles, ipsamque naturam ostendit, dum ferretur per aluum in rubra proluuie.

VEL BILIOSI MERI] Accensa multum, & æstu incandescente vi alteratrice, vel etiam rupta hepatis bile, & sursum prorupta: quamuis hæc vomatur potius quàm expuatur.

CITO MORTIFERVM] Quoniam vt in phthisi, mortifera est diarrhœa: sic in hepate & hepatis æmilia, sputi cruenti copia, aut biliosi meri. Nec solum hæc mortifera est: sed etiam mors ipsa cum incidit, siue, vt loquitur de diarrhœa, in phthisicis, ipsum ^{lib. 1. cap. 17.} πένει. Causæ in promptu sunt: quoniam vt excrementum illud, signum est ^{lib. 1. cap. 17.} μεγάλης κακότητος, & insanabilis partium nutritiarum, maximè verò hepatis è suo catorthomate omnino egressi, planèque alienati: sic ipsa excretio vires exoluit, cum cita extinctione caloris viuifici.

2 ΕΦ' ἡπατικῶ τῆζις ἀμια βραχύχ: κακόν. ἀλλῶς τ' κὴν ὑποθέσιν.

In hepatico mala est colliquatio cum raucitate; idque cum aliis, tum si tussicula sit.

HEPATITIS & phthisis mutua conspiratio est in ægroti perniciem, atque sympathica earum generatio, hinc inde causas ducentium. Nam hepatitis à phthisi, & huius ab hepate generatio est: sicut in hac prognos̃i docetur quæ sic habet.

IN HEPATICO] Quem fecit hepatitis æmilia.

MALA EST COLLIQVATIO] In qua liquuntur partes solidæ, suo defraudatæ genio, & contabescunt, ac signa edunt extenuationis perfectæ in pallore, ac rigida tensione ipsarum. Non enim hic colliquatio est colliquamenti quod cernitur in deiectionibus & urinis à febre tabifica quæ ardētè acuta est: sed exhaustarum partium solidarum, suo, vt iam dixi, genio defraudatarum, ex perditâ nutriticæ economia, cum febre lenta, & excretionibus importunis. Est autem mala, vt signo & causa. Vt signo quidem: quoniam colliquatio habitus, colliquamentum ostendit principatus nutritij. Vt causa autem: quoniam totus habitus naturali vacat officio, non sine reciproca viscerum offensione. Tum autem valsa impuro & inutilli succo distenta, refluxus incommoda multa adferunt ad hepar.

CVM RAUCITATE] Quam edit arteriæ inæqualitas catarrho imbutæ. Imbuatur autem perenni prolapso. Perennitatem facit repletio capitis. Repletur autem vaporibus & humoribus qui sursum feruntur & reflunt.

IDQVE SI TVSSICVLA SIT] Quæ signum syllogisticum est catarrhi: è faucibus in laryngem, indeque per arteriam prolagentis in ipsum pulmonem, vbi ferire sua (est enim efferus inde natus) exulcerationem facit pulmonis, in cuius edacitate, corruptione, & febre, phthisis ipsa consistit. Vt enim raucitas, inæqualitatem ostendit arteriæ catarrho imbutæ: sic tussis ipsa perennitatem prolagentis catarrhi, quando raucitatem secum habet coniunctam. Quemadmodum igitur in phthisi, hepaticum est aluum ferri liquidis & saniosis excrementis: sic in hepate, phthisicum continenter tussire cum rau-

citrate, vel rancum esse cum pruritacione rusciluz. Ac verum illud est quod posui non ita pridem. Quo plures principatus in vitio sunt, eò res zgri peius eunt. Nam hepatitis & phthisis, alterutra homini necando ipsa per se satis est.

3 Οἱ καὶ ἡ τῶν ὀδυώδεις, καρδιαλγικοὶ, καρφόδεις, ριγώδεις, κοι-
λῆαι, τεραχώδεις, λεπτοὶ, ἀπόστοι, ἐφιδροῦντες πολλὰ πνώδεια καὶ
κοιλίῳ περιένται.

Circa hepar dolentes, cardialgici, veternosi, perhorrescentes, aluo turbata, macri, ciborum fastidiosi, sudatiunculis crebri; purulenta per aluum profundunt.

Hic est complexio symptomatum hepaticorum, quæ facit inueteratio hepatitis. Omnia autem nomine afflictorum scripta sunt pro afflictionibus ipsis. Quæ metonymia & eius conuersio, frequens est, ut iam monui, apud Hippocratem: ne quis fœditatem clamer solæcismorum, qui elegantiam sapient Hippocratis maiestatis.

Ergo, CIRCA HEPAR DOLENTES] Non quidem, si bene iudico, ab inflammatione systrophica conuexarum hepatis partium: sed à collectione humorum, partes vicinas & socias opprimetium, venasque oppilantium: cuiusmodi dolor est hepatitis secundæ. Nam systrophicarum hepatis phlegmonarum natura, distinctio partium, causæ, symptomata, & signa syllogistica, periodi, paroxysmi, & crises proprium iam & velut dictum, atque quodammodo consecratum ei cognitioni & scientiæ habent tractatum, Hippocratico planè stylo accuratè contextum. Et verò hic locus est hepatitis & hepaticorum: non autem assurgentium in molem propriarum hepatis phlegmonarum. Nam quod empyema hic ait per aluum profluere, phlegmonè ipsam fuisse non arguit quæ illud fecerit empyema: sæpe enim funditur suppurato intra venas humore, ac sine vlcere partis quàm illæ venæ circumfluunt: ut in menstrualibus annotauit præceptor, quas diu malè habuit menstruum suppressio circum locos, ac tandem pus effundunt per vterum, sæpe omnis exulcerationis expertem. Cætera autem symptomata, nec solius phlegmones propria sunt, nec eius, cum incidit aut transit in empyema, necessariò consecraria, si tantum rigorem exceperis. Præterea quæ huic citima est mox explicanda prognosis, acerbissimum ponit dolorem hepatis, quem superueniens febris exoluit: quod certè in phlegmone systrophica locum habere non potest. Quid verò? nonne ab hepatis ἀνία, quando ipsum tædet officij sanguificandi, quæ prius exhibet rubra proluuias, post nigra & fæculenta effunditur? Sic fæces minutulæ duræ, instar pilularum stercorosarum capræ, abeunt in deiectiones chylosas: sic etiam flauæ & glutinosæ, in rubram proluuiem. Hæc fiunt, quando ventum est ad partium alienationem quam interperies prægrandis igne xit. Erant quidem pilulæ stercorosæ, & flauæ atque glutinosæ deiectiones hepatis multum & nimium alterati. Nunc autem chylosa excretio, & rubra proluuias; sunt hepatis alienati. Sic alterationis transitus esse solet ad alienationem: nisi ἐπιώρῃσιν loco fiat partis ἐκ τοῦ καὶ ὁρῶματις multum egressæ. Et cum ad vltima ventum est alienationis, omni vacat officio principatus, atque dominatu corruptionis regitur œconomia nutritus. Ibi continenter noua succrescit, & effera cacochymia: Ibi symptomatum perennis est propagatio in socias partes & in vicinas. Est autem propagatio sic.

CARDIALGICI] Quos dolor exercet cordis, quod est orificium alui, sensus acerrimi. Exerct autem à pruritacione humoris maligni, qui eò proripit ab hepate quam fecit æstate bilis collectio ab edacitate carniū bubularum, & vini voragine. De quibus hæc sunt Hippocratis. Ταῦτα γὰρ πάντα, τῶν τριῶν τῶν ἐπὶ τῶν ὀφθαλμῶν, πολεμώματα τῶν ἡπατι, καὶ χαλῶν μάλιστα προσίσιναι πρὸς τὸ ἡπαρ. i. Hæc enim hepatium infestissima sunt & bilem ad hepar adducunt. Est autem Galeno idem cardialgia in stomacho, quod καρδιωμός, cuius fundamentum est καύμα ἰσχυρὸν πρὸς τὸν κοιλίῳ, i. ventriculus aestu incandescens; feruescere scilicet in runicis eius, bile. Sic cardialgia Galeno in commentario, vel καρδιωμός Hippocratis in stylo prognoscos; vomitionem ostendit mox affuturam. Et verò Hippocrates author est dolorifica lumborum mala quæ incidunt ab æstu prægrandi quo vasa lumbaria incanduerunt, & ab oppressione particularis plethoræ, tum etiam micantis arteriæ magnæ pulsu molesto; non rarò cardialgiā excitare; idque, si Galeno credimus, proripere sero è vasis expresso in aluum, indèque in stomachum vel orificium alui quod sensu præditum est quàm exquisitissimo: proptereaque dicitur αἰσθητικώτερον, ὅτι νευροειδέστερον. i. acutissime sentiens: quia nervosissimum.

VETERNOSI] Καταχρηστικῶς hic vocat καράδας, qui sunt reuera κοματώδεις. Quid enim differat carus à comate, scriptum est suprâ. Hic igitur coma est: licet in illo. Hypochondrij tensio cum fastidio, comate, & cephalalgia; fundit paratidas. Omnis enim repletio capitis, cataphorica & cephalalgica; fundit paratidas. Est autem cataphorica hæc repletio comatosa, non carosa: quoniam carus, symptoma & signum est phantasie exolutæ, cuius exolutionis causa est, prægrandis frigida intemperies quam acida pituita inuexit. At coma, inclinatio est veternosa, phantasia infirmæ symptoma: licet carus abolitur. Atque huius quidem comatis causa est repletio capitis, ut iam dixi, cataphorica, quæ soboles est viscerum afflictorum, & impuritatis vasorum.

PERHORRESCENTES] A pure horrifero, de quo iam multa in empyemate; qui locus fufficiet explicando huic fimili eius rigori. supra, cap. 10. huius lib.

ALVO TURBATA] Quorum alui, non ita pridem, reddebant pilulas stercorofas, veruecinarum fimiles; nunc & chylofis feruntur deiectionibus, & rubra proluuie, cum torminibus atque morfu, quod fit alteratione verfa in alienationem hepatis; vt ipfum iam fui radeat officij in coquendo & attrahendo.

MACRI] Nam emaciandi caufa in promptu funt; principatus vitia in contumpendo; nulla coctio; nulla digestio; hepatitis vena, ac ceterarum fanguifluarum impuritas; colliquatio; labores multi; & inueteratio morbi. Sic igitur macie contabescunt, vt eorum facies iam cadauerofa effe videatur: quod extenuationis signum est abfoluta.

CIBORVM FASTIDIOSI] Vnde fignificatur collapfa facultas appetendi, vel *ἐκφρασις* ipfa ventriculi. Atque inter cardialgiam fivē cardiogmum, & *ἀνοίχας* hoc intereft: quod illa prorirationis est: hac verò exolutionis. Illam excitat acrimonia ftimulando: hanc fœditas refoluendo. Est igitur fymptoma *καλονόητον*, de quo præclare multa Hippocrates in Epidemiis; præfertim verò in tritaphya febre, & tempeftate peftifera. lib. 1. & 3. Epid.

SUDATIUNCULIS CREBRI] Sic enim vertendum duximus, *ἐπιδουούτες πολλῶν*: vt illud, *πολλῶν*, idem fit quod multum in pluuiis, tamen minutulis, propter earum frequentiam. Ergo fudatiunculis crebri funt, in quibus exudat crebro fudor exiguus, fymptoma exolutæ virtutis partium folidarum, quando inueterauit iam morbus: ficut idem ab oppreffione exprimitur circa initia. De tali fudatiuncula extat illa prognofis. Crebra fudatiuncula & horrore vicifitudo; peffima, fivē mortifera. Nam dum vitam funt; empyema oftendunt cum aluo turbata. Propterea fubiecit præceptor. 1. Epid. Coac. 10. lib. 1.

PURULENTA PER ALVVM PROFVNDVNT] Empyemate quidem non collecto in tunica: fed in viscere ipfo, & circumfluentibus vafis diffufo. Quamvis autem pus inde fundatur per loca *ἐκφυέοντα*, lege naturæ (nam cauarum hepatis partium propria est per aluum expurgatio) tamen loco illa funt, eam ob caufam, ex euentu incommoda; quod noua fuccrefcit offenfio nobilium partium, virulentam potiùs quàm purulentam materiam excipientium, vnde labefactatur coquendi vis in ventriculo; distribuendi in ieiuno; & naturaliter excernendi in craffioribus inteftinis. Atque ita moriuntur. Coac. 3. cap. 1. lib. 1.

4 Τοῖσιν ἢ ὡς Ἑσπίνης μελοδωῶσι· πυρετὸς Ἰππυχρόμυδος λύει.

Meliùs fic in aphorismis.

Οσοῖσι μετὰ τὸ ὑποχόνδριον πόνοι γίνονται, ἀτὲρ φλεγμονῆς· οὕτέοισι πυρετὸς Ἰππυχρόμυδος λύει τὸ πόνον. aph. 40. 6.

Quibus hypochondrii dolor est, sine phlegmone; iis superveniens febris, dolorem exolvit.

CERNUNTUR hîc primùm differentia doloris hypochondriaci, quæ vt apparent, fic earum diversa curatio effe debet. Cernuntur hîc etiam commoda febris quæ finem adfert doloris hypochondriaci: quamvis ea naturæ bellum indixerit. Similiter autem hîc facit, vt illic. *conuulsionem sanat acuta febris exorta, quæ priùs non fuit: quod si priùs fuerit, exacerbata.* Non enim conuulsionem sanat quæ incidit ab exhausto, vel ab inflammatione neruorum: quemadmodum neq; hîc dolorem hypochondriacum, quem inflammatio facit, vel morfus; vt mox diceretur. Singularis est autem Galeni peruicacia, cum ex hac sententia veterem illam conatur explodere. *Quæ ex hypochondriorum doloribus febres nascuntur; terrefce.* Qua de re nos alibi difceptauimus contra Galenum, cuius difceptationis difceptatores appello viros bonos, medendi & philofophandi peritos. Sed aggrediamur ad lectionem præfentis prognofeos. Coac. 11. cap. 1. lib. 2.

QVIBVS] In omni diæta cruditati ftudentibus, in otio, & fâietate ciborum.

SINE PHELGNONE] i. Sine phlogofi & inflammatione systrophica, quæ in cauo hepatis infert fingulum, fitim, & linguæ, fucatæ flauo aut viridi colore, scabriciem: in conuexo autem, ficcâ rufam, difficilem fpirationem, & circa iugulum dolorem acerbum. Tum autem nulla fenfio exciteretur morfus molefti, quem ideo prætermisit Hippocrates, & inflammationem folam excepit e censu doloris: quia morfus nomen, dolorificam vim fuam ipfum per fe oftendit: propterea quæ non dolor, fed morfus vocatur. Testis est illa fententia. *Οἱσι, χαλῶδεος ἐβόης δειχνορήσιος, μετὰ σήτος δόξης, καὶ πυρετὸς κακόν.* i. Quibus, cum biliofa deiectione, premittitur morfu pectus, amarefcitque os; malum. in proemio ad para. 2. 3. Epidem. & in prorrh. comment. ad Coac. 32. lib. 1.

HYPOCHONDRII DOLOR EST] Quem cum exceptione phlegmones atque morfus neceffe est fieri, vel ab oppilatione, vel à tensione fpiritus flatulenti, vel ab intemperie inæquali.

SUPERVENIENS FEBRIS] Quæ priùs non fuit: fed nunc exorta, humoris collecti putredine, doloris acerbitate, atque vigiliis.

DOLOREM EXOLVIT] Quoniam, vt ait Galenus, febrili calore dolorificus humor inciditur, tenuatur, atque digeritur; tum fpiritus flatulenti tensio ipfa laxatur, atque intemperies inæqualis ad

Coac. 11. cap.
11. lib. 2.
& aph. 74. 4.

temperamenti æqualitatem reducitur. Eòdem spectat illa prognòsis. Tumores hypochondriorum, sine phlegmone recens obortos, tum tade natos dolores, excoluit borborygmus in hypochondrio excitatus, maximèque si exciderit cum deiectionibus & urinis; sin minùs, ipse per se traiectus. Iuvat etiam is qui ad inferiora deuoluitur. Hæc autè prognòsis legitur iisdè scripta literis aph. 50. 7. Sed melior nobis visa est 40. 6. quam secuti sumus.

5 Οσοι δὲ ἀφροδῆς αἷμα πύοισι, πονέοντες ὑποχόνδριον δέξιον· ἀπὸ τῆς ἡπατος πύοισι, καὶ πολλοὶ ἀπόλλυνται.

Quicumque spumantem expiunt sanguinem, dextròque laborant hypochondrio; ab hepate spiumunt multique intereunt.

Coac. 46.
cap. 16. 2.

OMNIA QUÆ pertinent ad philologiam & philosophiam huius prognòseos, suprà sunt posita ad eandem prognòsin, iisdèmq; verbis à præceptore traditam: sed non eodem scopo; quam tamen adduci non possum vt excolam nouo stylo. Pergamus ad reliqua.

6 Οἱσι καυδεῖσιν ἡ ὥρ, οἷς ἀμοργὴ ἐρχεται· θανάσιμον.

Quibus inuisto hepate, velut amurca prodit; funestum.

Coac. 38.
cap. 16. 2.

Coac. 47. &
48. eiusd. cap.

DEMONSTRATVM est in empyicis, quòd eorum bene res eunt atque còfestim seruantur, quibus, supra vomica, febris discedit, & concupiscunt cibos; ipsum verò pus educitur facillè, album, nihil olens, æquale, & læue. Contrà; ipsos mori quibus, concutiendo, pus editur cernosum & fœdi odoris. Tum autem, quibus à pure coloratur specillum tanquam ab igne, ipsos non posse seruari. Coloratur autem specillum vulnerarium quod in sinum immittitur, siue in fistulam perusti lateris vnde pus foras exit quod erat in thorace diffusum. Similiter empyema hepaticorum, quod exitum foras affectat, nec ferrur per aluum; si quidem, perusto hypochondrio, libertatem habeat exundi, ac tum in extra signa edat integræ partis solidæ, vegeti caloris natiui, & humoris morigeri (quoniam id manat è tunica vbi collectum erat, non in viscere ipso diffusum) apparètque omnino quale modò descriptum est; certa spe consolatur medicum futuræ salutis. Sed tamen id fieri posse non arbitror in hepatis ἀπὸ πύο quæ pus edit prauum, in viscere ipso diffusum, non autem collectum in tunica: cuiusmodi nuper èffundi per aluum ostendimus. Nisi fortè quis in laude ponat empyema quod fecit doloris acerbitas in hepatico, quam foris tensio flatulenti spiritus excitauit, vt Galenus auctor est. Nam à systrophica hepatis phlegmone sic fieri, nouum non est.

Coac. 9. cap.
11. lib. 2.

aph. 45. 7.


Coac. 2.
huius cap.
comment. ad
aph. 50. 7.

Ergo. QVIBVS In hepatico empyemate constitutis quod fecit hepatitis secunda, quæ nec dysteribus; nec purgatione lactis asinini cocti, & mellis, quieuit; nec verò etiam lactis caprini vsu, cum ter tia parte melicrati, nec verò concessit lacti equino. Quinetiam cui nihil profuit sanguinem detraxisse incisa vena interiore brachij dextri, nec operam dedisse purgationi post sanguinis detractionem. Intumuit autem magis ac magis hepar, multumque prominet foris, vt iam vitioni sit locus, quæ sola superest atque restat de tot prædiis; tum buxeis fusis in oleum feruens immixtis, aut etiam fungis, vel nostris pyreticis è calce & cinere culmorum & siliquarum fabacæarum, ex aqua confectis; vitionem moliri oportet. Ac si bene cesserit vitione, sanus euadet, & reliquum vitæ tempus exiger sine labore. Sin minùs, nulla ope remediorum deinceps adiutus, vitam finiet in corruptione. Talem verò exitum fore ostendit pus amurcosum quod manat huiusmodi è parte corrupta, cum pari fœditate odoris atque coloris: vnde nulla salus vitæ sperabilis esse potest in amissione vitalis officij quo fungitur ipsum hepar dum valet natura & valetudinis cura.

lib. πειρῶν
ἐπὶ τῇ πύοι.

DE HYDROPE.

CAP. XIX.



Ι Δ Ε ὕδρωπες ἐκ τῆς ὀξέων νοσημάτων· ὅππῃ ποιοὶ γίνονται καὶ ὀλέθριοι. ἀρῶνται δὲ οἱ πλείστοι μὲν ἀπὸ τῆς νεφῶνων καὶ τῆς σπύης· οἱ δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ἡπατος.

At verò hydropes illi demum permolesti sunt atque mortiferi, qui veniunt è morbis acutis: plurimi autem nascuntur à lumbis & ilibus: alij verò ab hepate.

INTER SYMPTOMATA hypochondriaca quæ ipsos male habent diutius & periculose quos inuaserunt, ne dicam mortiferè, hydrops principatum obtinet mortiferæ contumaciæ atque molestiæ. Sic enim præceptor ait, *ὁ κίπρις καὶ ὁ ἀλκίπρις*: loquitur autem de iis qui veniunt è morbis acutis. Sed aliorum quoque similis ratio est quos diutè vitia promouerunt, per hepatis alienationem, & per intemperiem licetiam cæterarum partium nutritiarum quæ impedimentum adferunt functionis hepaticæ; ut suo quæque loco illæ omnes causæ ponentur. Est autem hydropis tanta calamitas, ut ad illius nomen exterriti homines, toto corpore perhorrescant, ac subinde illud exclamēt, Dominus meliora. Et tamen per paucos videas qui seruent leges ipsum arcendi quando in metu est, ac ne abigendi quidem quando aduenit, naturamque oppugnat, ipsam pro certo expugnaturus. Nisi excusatio fortè sit accipienda illius cui, cum aqua interminatum esset, mero liberaliter se inuitauit, quoad vixit, unde implicitus fuit hydropem. Tum eius quem nobilis quidam medicus apud Antigonum regem negauit posse sanari. Cùmque alter medicus se sanaturum polliceretur, respondit; illum ad ægri morbum respicere: scilicet verò ad animum: quod homo esset notæ intemperantiæ. Nec cum res fefellit. Ille enim cùm summa diligentia, non medici tantummodo, sed etiam regis custodiretur: tamen malagmata sua deuorando, bibendoque suam urinam, exitium sibi quæsiuit. Nulla sunt igitur leges curandi pro iis qui vitam sectantur voluprariam: sed pro instantum qui frugaliter viuunt & frugi sunt, atque obediunt se gerunt in medicos bene monentes, benèque præcipientes omnia quæ sunt salutis. Nunc de hydropem ipso dicendum.

Hydropis vel hyderi (nihil enim refert) idea cernitur vel in abdomine, tanquā vtre, distento; vel in cōpagine vniuersi corporis quod inæquale est, tumoribus aliter atque aliter per totū id oriēribus. Distentionem facit abdominis tanquam vtris; vel spiritus flatulentus; unde si mouetur, creber est sonus instar percussu tympani; vel aqua in aluē ipsū cōtracta, quæ moto corpore ita mouetur, ut imperus eius cōspici possit. Sed tamen hydropis nomine omnia prædicta genera continentur: quia cōmunis omnium est, humoris nimia abundantia. Nam siccum hydropem dixit Hippocrates, quem proximo seculo insecti medici, *τυμπανίαν ὑδρῶς* nominauerunt. Et quamuis hydropes, aliarum quoque sunt partium, ut vidimus nuper in illo. *Ὀρθοπνεῖαν faciunt hydropiformia dura*, & suus capiti sit hydrocephalos, hyderos quoque suus pulmōni, ac suus vtero, tum etiam testibus hydrocele: tamen quia similitudo τῷ ἄνδρι, i. vtri repleti, quæ nomen dedit hydropi, potissimum cernitur in abdomine, vbi non minùs tympanicem effingit, quàm ipsū ascitem: tum autem quia sonori flatus, potissimum intra distentum abdomen exaudiuntur, ibique fluctuantis aquæ conspicitur imperus dum mouetur: hydropis antonomasiam sibi vendicat pars illa distenta, cuius distentio similis est vtris repleti, & ab ea similitudine dicitur hydrops, tam tympanias, quàm propriè dictus ascites; ut rectè annotauit Galenus, vbi nos ὕδρων, legendum duximus ἀσцитῶν. Nam commemorata inæqualitas tumorum per totam compaginem orientium, dicitur quidem hydrops: sed ὑποδριδίας, ex aquæ nimia abundantia quæ communis est omnium, non ex figura ipsa. Nam quod obicitur, ascitem propriè dici κατὰ τὸ ἄνδρι; sanè quidem, tum à materia, tum à forma: sicut repletus vter, dicitur hydrops; quod eius teres à distentione figura, penè aspectabilè facit humorē intrus conclusum cui excipiendū factus est vter; humorem dico, vinum, mel, oleum, aquam. De tympanite verò quod dicitur huiusmodi esse à tympano cuius edit sonitum, si pulseris; est illud quidem verum, à sonis: sed vtriformis est, unde hydrops vocatur: & à sonitu quē edit pulsus intra spiritus, pelle collisā, sicut in tympano, siccus ab Hippocrate nominatur. Atque hæc super philologia hydropis.

Nūc ad philosophiam accedamus. Ea versatur circa essentiam morbi, partem obsessam, causas, symptomata, signa, periodos, paroxysmos, & crises. Ac primum hydropis essentia, tumor est vtriformis qui cernitur in abdomine multum distento, vel à spiritu flatulento, vel ab humore intra stagnante inter peritonæum tunicam & intestina. Stagnandæ partis illius ratio mox explicabitur: quemadmodum & hydropis illius quem ὑποδριδίας veteres nominauerunt. Sed hydropicarum causarum duo sunt genera; vnum, simplex humorum in amplitudine alui collectio; alterum, perennis aquarum, & spiritus flatulenti generatio, & perennis in aluum affluxus. Atque illa simplex & semel contracta in aluum, aquæ collectio, tribus fit modis: nimia portione aquarum, ob inexplebilem sitim à febre vel ab itinere sub ardenti Sole confecto: præterea febris abscessu: tum à ruptione bullarum hepaticarum quæ ὑδρῶδες Græcè dicuntur. Dicendum de singulis antequam veniamus ad perennitatem causarum hydropificationis, quæ propriæ sunt huius prognosæ.

Ac primum inexhausta portio aquæ, cumulatam edit collectionem sui in aluco, facitque hydropem in aluo tractabilem & aspectabilem, si, simulatque pora est, liberali vomitu non excludatur. Ac de huius quidem hydropis natura & caulis, hæc ratio fuit Hippocratis. Si mulier teneatur hydropem, ac lien eius aquarum copia intumuerit; iniunescit autem aquosus, cum adueniente febre, nec abeunte, suus ipsum detinet inexplebilis; quam explere cupiens, sæpe & multum bibit, nec reuomit. Inde adeo fit ut, de instituto naturæ, quantum solebat, per urinæ ductus abeat in vesicam, & meiando reddatur. Reliquum, quod multum superest, lien sibi capiat, & à ventre exhauriat, cum incaluerit rarus natura, spongiosus, & proximè ventrem suus. Quæ cum ita sint; si nec sudore difflexerit, nec alius profusè fluxerit; tū lien assurgit in molē, eoque magis cum tam liberalis portio aquæ est; quem si quis attingat pressiore tactu, percipitur mollis ut lana, fortassis etiam cum renixu. Cum ergo intumuit nimia abundantia saturatus, planèque expletus, redundantiam deponit per venas in corpus, & maximè in omentum, indeque in amplitudinem alui, loculosque, & crurum, diffunditur. Sic enim comparatum est natura, ut aliis alia de suo impertiant, cum quid redundat, nimiumque est supra vires, ut amplius capi non possit. Inde igitur venit hydrops: quando lenis consuetudo est, ut visceris rari & spongiosi, contemneret humorem superfluum attrahendi, & redundantiam deponendi, ut dictum est. Egregia certè, ac digna Hippocrate, philosophandi ratio, quæ ponit hydropis huius naturam in repletionem vtris aluini, quam fecit aquarum collectio ex nimia portione, nec vomitu,

Epid. part.
7.

lib. 1. proth.

hic dicitur
verum aquale.

Epid. part. 2.

aph. ss. 7.

lib. 1. aph. 7.
lib. 1. aph. 7.Gal. in lib.
lib. 2. progn.aph. 48. & 43.
lib. 6.Gal. ad lib. 1.
progn.

nec sudore, nec fluxu ventris exhausta. Hydropicos autem hoc tantum hydropem implicatos, sanari posse arbitror diæta, & ventris compunctione, *ἡ δὲ ἰατρικὴ τῶν ὕδρωπων* Græci vocant: sicut faciendum præcepit Hippocrates. Hi sunt de quibus illud præceptum est. *Ἐπεὶ οὐκ ἔστιν αὐτῶν ἡ ἀνία*. i. Hydropicos statim secare oportet. Horum enim sanatio in aquarum vacatione consistit, quando earum perennitas nulla est. Vt planè ridicula sint triscurria Paracelsi, qui ex hoc hydropem sanabili, omnium sanationem pollicetur. Ac sanè, hydropis huius, qui curationem recipit, pulcherrima descriptio est apud Hippocratem, quam aureis scriptam literis, Latine sic vertimus. Oportet eum qui dominatu hydropis tenetur, *ἔτι* tamen superstes futurus est, eoque salubriter defuncturus; primum quidem visceribus præditum esse bene moratus, ut virtus natura luceat in coquendo ex facili; tum facile spiritum ducat doloris expers; totumque adeo corpus aequaliter suauiterque caleat; nec extrema partes liquentur *ἔτι* contabescant. Satiùs enim fuerit ipsas tumere: præstiterit autem neutrum esse. Nam partes extremas, aequaliter esse decet ac molliter constitutas. Nec verò nimium intenta sit alvus: sed molliuscula, digiti attrectata. Nulla susus adsit: nec sius, nec lingua asperitas, ne à somno quidem, cum solent hæc tria exacerbari *ἔτι* irritari. Tum cibos libenter capere, nec satiari admodum, si fortè ceperit liberalius. Quinetiam sit alvus morigera, citroque feratur cum purgationi dat operam. Aliàs verò ducatur mollibus excrementis *ἔτι* figuratis. Urina autem fundatur, appareatque qualis esse debet pro vitæ instituto, vinique, quo vititur, mutatione in copia *ἔτι* qualitate. Excitationem *ἔτι* laborem ferat alacriter vacuus lassitudinis. Opera precium fuerit hominem sic in omnibus constitutum esse, ut securitatem consequatur salutis. Hic silet Hippocrates, iamiam dicturus de altero collectionis modo, qui fit à febris abscessu critico, cuius tamen salutifera non est crisis: quia vires non sunt ferendo hydropi grauissimo inde nato. Ac generationem & ortum eius ita docet præceptor. Exactus iam multis diebus, multisque laboribus, *ἔτι* colliquatione assidua; exorti sunt inde abscessus, aut multo maiores quam ut tolerabiles essent, aut certè minores quam ut prodesse, sed intrò recurrerent, *ἔτι* ipsos ægrotos peius haberent, *ἔτι* periculosius. Ac maiores quidem *ἔτι* intolerabiles erant, post longum tempus, multosque labores, *ἔτι* colliquationem triacophye febris quæ tunc regnabat; dysenteria, tenesmi, lienteria, diarrhæa: quibusdam verò hydropes. Ibi Galenus auctor est; illos hydropes exortos fuisse ob nimiam abundantiam frigidorum & liquidorum humorum, qui, mea quidem sententia, non confluxere ad intestina, sicut ij qui prædicta proluvia excitant: sed ad lienem; quæ ratione dictum est in prima specie collectionis hydropicæ ex lib. 1. *ἡ δὲ τῆς ὑδρωπικῆς*. Sed tamen hoc interest, quòd illa, ex nimia portione aquæ, sanabilis est: hæc verò, ad mortem fatalis: quòd à colliquatione orta sit. Tertia restat ratio *ἡ οὐκ ἀπορροή*, i. coacti *ἔτι* cumulatè in aluum collecti humores, vnde hydrops assurgit, qui non minùs periculosè suum exercet hydropicum, quàm is cuius modò meminimus. Ratio autem collectionis hæc est. *Οὐδὲν οὖν τὸ ἥπαρ, ὅθεν πλεονάζει, ἐς τὸ ὀμφίλιον ῥαγῇ*. *Ἐν τῷ οὐφίλιῳ ὁ ὕδωρ ἐμπιμπναι, καὶ ἀπορροήσεται*. i. Quibuscunque aqua repletum hepar, ipsam in omentum profundit; inde alvus repletur, *ἔτι* moriuntur. Et tamen Galeni iudicium est; tales hydropicos posse seruari atque sanari: quàm verè & rectè iudicavit, viderint sapientes. Non enim temerè scripsit Hippocrates, mortiferum esse talem hydropem. Et quamvis autoritas viri sufficiat perueicaciz infringendæ cuiuslibet hominis vel opiniosissimi: tamen ipsa originis perspicientia, quam ex Galeno ipso hausimus; difficultatem maximam curationis ostendit. Nam ortus principia, sunt hepatis bullæ quas vocant *ὀφελίδες*, quarum generatio facillima est in ea, quæ vestit hepar, membrana. Huius verò causa est, proruptæ, à ruptis bullis, in omentum, aquæ collectio; vnde stagnatus venter edit hydropem. Sed earum bullarum quæ assurgunt in hepate, causa est circumtentio à collectione ichorum, vel erodentium, vel amburentium. Quamobrem in vitio est ipsum hepar quod colligit, & ichor qui, erodendo vel amburendo, facit hepar bullatum. Ergo maiora sunt incommoda ichoris in omentum proruppi, quàm pluuiarum aquarum stagnantium, *ὁμαδὲν* potarum, ut ait præceptor. Solenne est illud, quòd omnia è malis orta, ut eadem quoque sint mala, necesse est. Et, pars vnaquæque dum valet bene, spiritu quidem abundat: dum autem male, ichoribus.

Sed hæc sufficiant. Sequitur ut de causis hydropificis hoc loco dicamus, quarum perennis generatio est, & perennis in aluum affluxus. Inde assurgunt hydropes de quibus agitur in hac prognosi. Eorum verò hydropum causa communis est, ac verè hydropifica, *ἡ ἀπορροή τῆς τῆς αἱματώσεως ἔργου*, i. frustratum opus sanguificandi. Hoc enim frustrato, seri, pituitæ, & flaturum perennis generatio est, vnde nascuntur hydropes, quorum diuersa illa materia tres edit ideas; *πομπαια, ἀορίστου, καὶ ἀπορροή*: quæ nomina, suis quæque proprietatibus distincta sunt in philologia huius tractatus. Sed ea sanguificandi frustratio, quantum complector animo, duobus omnino fit modis. Aut enim functionis hepaticæ impedimento accidit, aut alienatione virtutis sanguificæ quæ penes est ipsum hepar. Hepaticæ functionis impedimento cernitur in lienteria, diarrhæa intestini iciuni, tum in torminibus alui quæ nulla curatione quiescunt; propterea in liene magno vnde lienici nominantur, & in dolorificis lumborum malis quorū anadrome fit ad hepar. De lienteria illud præceptum est; quòd primæ coctionis abolitio, quæ ipsam facit, omnem generando sanguini materiam præcipit, vnde frustratio est *αἱματώσεως*. Huc pertinet aphorismus ille. *Quibuscunque lenofis dysenteria incidit; bene est, si longa non est: longa enim parit hydropem, aut lienteriam, vnde homines moriuntur.* Ad quem locum ita scripsit Galenus. *Vitiatis prauorum humorum transitu intestinis, faculas eorum iacet afflicta, tum labefactatur symmetria caloris natui, vnde nascitur lienteria *ἔτι* hydrops.* Ac lienteria quidem, à solo intestinorū vitio quod serpit ad ventriculum vsque: hydrops autem per sympathiam tum hepatis, tum lienis, atque adeo generis omnis venosi. Diarrhæa intestini iciuni, frustratæ signum est *αἱματώσεως* vnde accidit hydrops: propter interceptam digestionem chyli, & interclusum iter eius ad hepar. Ac diarrhæa quidem fit oppressione & proritatione iciuni, à copia & corruptione chyli cunctantis. Amplificatio chyli est atque corruptio in iciuno: quia interclusum est iter ad hepar, & intercepta digestio, quam *ἀνάδωρον* Græci vocant. Digestionis interceptæ causa est, iciuni aut mesenterij phlegmone, quæ facit infirmas venas per quas solebat hepar

bat heparchylum & alimentum sibi attrahere; vt iam contumaces, principi morem non gerant. Atque hæc diarrhoea, potissimum cadit in eum hydropem qui venit ab ilibus vel à lumbis. Nam de torminibus quæ nulla curatione quiescunt, illud sancitum est, quòd transeunt ad siccum hydropem: ob intemperiem hecicam intestinorum tenuium, quorum antractibus, vt claustris quibusdam, flatus conclusi fremunt. Vt enim flatum illorum generatio, est vera soboles creditatis: sic eorum in ventre permansio & stabulatio, causam habet collapsam vel deprauatam vim *αδυσχελεω* ipsorum intestinorum: quòd scilicet intestina, motu peristaltico naturali contrario, circumcirca fibris rotundis colligant se inferne sursum. Quæ morus deprauatio dicitur *ἀδυσχελεια*, vnde & ileus nomen habet. Est igitur eadem causa hydropis tympaniz quem siccum dixit Hippocrates, quæ torminum flatulentorum. Amplificatio sola flatuum, distinctionem ponit illorum symptomatum, per vtiiformem abdominis tensionem.

10 Magni lienis magna est cum hepate sympathia, iure societatis & vicinitatis. Atque vt officiorum inter se communicatio est: sic vitiorum etiam. Est enim similis partium syntimoria per quam mutuas tradunt operas ad salutem, vel ad exitium. Sicut igitur nimiam humoris abundantiam & hepatis redundantiam excipit, quam in omentum & vacua intestinorum loca deponit, vnde hydrops assurgit, maximè verò ascares: sic eandem redundantiam, qua prior obruitur, faciliè ad hepatem transmittit; eaque vitiorum communicatio, sanguificandi vim labefactat. Magni autem lienis, à bile aut pituita causæ ducuntur. Hippocratis illud est: *Quibus magnus est lien, si quidem biliosi sunt; sedati multum apparent, vlceribusque obsiti quæ* lib. vii. 2. lib. 4.

difficiliter sanantur: tum illis ab ore fædus est odor, atque macrescunt. Lien verò durus percipitur, manetque sui similis in magnitudine. Si autem pituitosi sunt lienosi, nec cibos deiciunt, multò minora sunt ius prædicta incommoda, tam lien aliàs atque aliàs maior aut minor est. Ergo in splene affecto, & in totius corporis malo habitu, nascitur hydrops. Similiter lumborum anadrome facit hydropem, vt magni lienis. Vitiorum item lumborum communicatio, cum mesarzo, mesocolo, & intestinis, hydropifica esse solet. Lumborum excursus fit à repletionè particulari hæmorrhoidæ venæ & arteriæ quæ adiacent lumbis; cum nec hæmorrhoides fluunt hæmorrhoidicis, nec menstrua menstrualibus, vt solebant. Huiusmodi sunt etiam diuturni circa lumbos & ilia, qui ad hypochondria prorepunt, dolores, tanquàm *χειρὸν ματοῖς*, i. qui velut quibusdā vncis instar cuiusdā reus piscarij, quod nominatur *χειρὸς*, hypochondria circūplectendo, ipsa quodammodo laniare videntur. Est enim feritas magna illius excursus qui prorepat à lumbis, ac suorum incommodorum vim magnā ostendit quocunque appulerit, ad cerebrum, ad cor, ad stomachum, ad seprum transuersum, vt alibi iam demonstratum est. Magna est etiam vitiorum lumborum communicatio cum mesarzo & mesocolo, quæ à ligamentis & nervis lumborum oriri docet Hippocrates. Hinc veniunt tormina quæ abeunt in siccum hydropem: quæ ratio hydropifica differetur ad illum locum vbi de hydropè dicitur qui nascitur à lumbis & ilibus. Atque iam patefacta est omnis hepaticæ functionis impeditio quæ frustrationem adfert *ἀπώρευσις*, vnde hydrops *αδυσχελεια* & *αδυσχελεια* dicitur, quia *αδυσχελεια* dicitur, quia *αδυσχελεια* dicitur.

Ventum est igitur ad alteram causam frustrari operis sanguificandi, quam positam esse diximus in alienatione virtutis sanguificæ quæ penes est ipsum hepar dum manet in norma & præscriptione sui proprii temperamenti, compaginis & complexionis. Eius alienationis duæ sunt in vniuersum causæ. Vna quidem *ἀνένια*, i. exolutio. Altera verò *μυροσπότης ἀδυσχελεια*, i. exhaustum frictum; vel, vt ita dicam, frictura retorridum hepar. Exolutionis causæ omnes dictæ sunt nuper in hepaticæ & hepaticorum historia, quæ rumpimigenia impressione cadunt in hepar, tum ipsi accedunt & accidunt per epigenesin vicinarum & sociarum partium afflictarum. Ac primigeniæ sunt quæ dicuntur *μεσεντερικαί*, vel intrà natæ; congenere & coæquales, *αὐτογενεῖς καὶ συγγενεῖς*; vel extrinsecus incidentes à dictæ vitio, in victu & instituto. Sed satis iam de his non ita pridem, ne nauseabunda sit repetitio eorum quorum memoria recēs, lectorum & auditorum animis firmiter hæret. Succedit exhaustū hepar, seu frictura retorridū. Exhaustū hepatis atque rosti causa est cæcus ignis, veharior febrilis, vnde celeriter, continenter, & vehementer febris mouetur; proindeque acuta est, vnde hydropes veniunt huius prognoses. Atque cæcus ignis fundamentum habet in dyscrasia congenere; velut parentum vitio lata; tum in coæua, quam *αὐτογενεῖς* Græci vocat, quæ scilicet cum ætate simul accrescit; tum ea quæ primum insira, dicta hæc est qua vires acquirit eundo. proptereaquæ *ἐπαιχρὴς* nominatur. Talis est dyscrasia eorum qui iam *μεγαλοσπαστικοί*, à primæ compagine, sicut Apollonius, dyscrasiæ prægradis accessione adiungunt, ætate potissimum *ἀπὸ τῆς κατὰ φύσιν* *ἐπιπληθύνου*, & *ἐπιπληθύνου*, i. ab edacitate bulularum carnium, ex liberalissima portione vini. Atque hic cæcus ignis depopulatur hepatis gratiosum humorem ipsumque; reddit exuccū, quod atrescendo fit durū, & è suauerubenti nigrum aut cinericū. Sic ab exhausto vis perit sanguifica, & pro sanguine funditur serū aut pituita arri coloris aut cinericij. Interea dum cæcus ignis depopulatur humidū primigenium, antequam incommoda veniat marasmi hepatici, depopulatio illa cernitur in atrophia & cachexia hominum morbo regio fœdatorū, in siti & siccitate linguæ fucatæ subviridi aut flauo colore, tū in febricula quadā nocturna, & parū placida membrorum quicre. Deiectiones sunt pilularæ, verucinarum modo. Vrinæ multa bile saturatæ. Adueniēte marasmo, & alienata virtute sanguificæ, frustratio est *ἀπώρευσις*; ac tum paulatim hydrops assurgit, perennitate ichoris in aluentem confluentis. Confluendi ratio, & stabulatio, mox dicitur. Superest causa altera marasmi hepatici, quæ posita est in ardore febrili quo ipsum hepar conflagrat. Enimvero nihil æquè natium calorem extinguit atque febris ardor. Ac sanè iactura fit maior humidi primigenij septem diebus à febre acuta; quàm à calore insito, septuaginta annis, vt alio loco iam diximus. Septem diebus vitam is finit; tabifica vi febris consumptus, qui septuagenarius erat futurus duce nativo calore. Nihil tam citò fatale est ad interitum, quàm febris acuta, si pestilentiam tantum excepēris. Ergo marasum facit *αδυσχελεια* febris acuta quæ in hepate focum habet. Qualem in Hermocrate notauit Galenus ex historia præceptoris. Ac talis marasmus, aut citò mortiferus est, vt in Hermocrate;

inclinatio, diuersitatem adfert symptomatum & incommodorum. Atque vt finem faciam, & breui complectar quæ super his dici possunt; repetam illud quod recensui in catalogo hydropificarum causarum. Est autem hic aphorismus. *Quibuscumque aqua repletum hepar, ipsam in omentum profundit; inde alius repletur.* Ecce repletio hepatis ex aquarum nimia abundantia, quas ipsius genuit *ἀνία*, easdemque suppressit. A suppressione oppressio ipsarum, expressionem attulit in omentum, inde oppressum pariter. Similiter autem vt hepar ipsas exclusit, aliis excepit, cuius repletio ipsa est hydrops ascites. Nō enim occulti sunt aquæ ductus per quos effunditur in amplitudinem alui. Nunc de hydropē qui aqua dicitur inter cutem, *ὑποδερμίδος* Græci vocant, *αἰσθητὰ, ὑποδερμὴ, καὶ λευκὸν φλέγμα, καὶ λευκοφλεγματῶν.* Atque hic quidem hydrops cernitur in tumorum inæqualitate, per totam cōpaginem aliter atque aliter orientium. Est igitur forma huius hydropis, *ἡ καχεξία* vniuersi corporis, quæ primum apparet in pedibus: quod illi procul absint maxime à partibus calidissimis. Cachexia hæc venit ex cacochymia sanguinis pituitosi, quam hepatitis vena impertit singulis hæmorrhoidibus venis, per totam compaginem distributis: quemadmodum hæc rursum expleræ, cacochymiam, velut per *ταυρίων* quandam, effundunt & euomunt in venas minores, carnibus & cuti affixas nutriendi causa. Ibi deprauata nutritio est: quoniam nec appositio fit, nec assimilatio illius cacochymix, quæ non *κατ' ἐξῆν*, vt naturaliter suscipitur ipsa nutritio, sed *κατ' ἄνω*, i. *appulsa*, ad nutriendas partes accedit, ipsasque opprimendo malè habet, quas nullo modo reficit. Hinc spiritus abit interuallorum carnis, & pro eo replentur ichore illo pituitoso, ipsasque interualla minimè coibilia, sicut Hippocrates vocat *ἀσύνετα*, glutinoso mucore nunc inter se coeunt & confunduntur. Hinc tota cutis tumida est atque turgida, quæ pressa digito, statim subdit, mox inde confurgit. Est autem huiusmodi, obruta pituitoso sanguine, verius quàm nutrita. Ex eodem fonte confluit pituitosus hic sanguis, quo humor ascitæ hydropis. Est autem fons ipsum hepar quod sanguinis vbertatem mutauit in aquas, & pituitam. Iam explicatæ sunt causæ aquarum. Sed nimia pituitæ abundantia, causam habet suffocationem caloris natiui quæ in propinquo est. Periculum suffocationis positum est in oppressione. Oppressionis autem causa est ipsa suppressio, vel hæmorrhoidum soliarum in hæmorrhoidis, qui sunt eiusmodi complexione, temperamento, atque dicta; vel menstruorum familiarium in menstrualibus. Hæmorrhoidum verò vel menstruum intelligo, sursum ad fontem refluentium, i. ad hepar, quod *ἐν μάλιστα* esse dicit Hippocrates, ipsūque quodammodo sua copia obruentium. Ergo hydrops venit à suppressione sanguinis, vt ab eiusdem profusione. Verus est illud, *ὅτι ἐξ ἀμφοτέρων ὑδρωπῶν*, i. quod ex hæmorrhoidis & hydropis sunt. Atque ex perspicientia prædictæ causæ hydropicæ, maiores nostri ad leucophlegmatiam inchoatum, detractionem sanguinis consultò præscripserunt, quæ ceteris hydropum generibus interdixerunt. Ad inchoatum dixi: quoniam iudicium est præceptoris, ipsum planè fieri vetustate *ἀποκτείνε, καὶ γινώσκῃ ἐχέμεν*, i. illud *finde* atque *moliri*, vt *fugari non possit*. Ac de illo quidem illud præceptum est. *Ἡ ὑπό λευκὸν φλέγματος ἐχόμενα δειρρῶτα ἰατρὴ ὀπιθῆναι* *ἀνὲρ πλὴν τῶν*. i. Si cui leucophlegmatia implicatio fortis superueniat *διὰ τὰς*; morbum exoluit. Hic pensum meum absoluisse videor super causa formali cuiusque hydropis. Quid superest igitur? Vt eorum hydropum supradictorum symptomata exequamur, periodos item, paroxysmos, & crises. Quæ omnia, quoniam de his institutæ sunt prognoses hic positæ, in recensione & examine singularum loco dicentur.

Ergo. AT VERO HYDROPS.] Ac si diceret: quoniam hepaticorum consecratia sunt hydropica. Illud enim significat particula, *καὶ*, quæ instituti præsentis è proximo consecutionem ostendit. Nec tamen hydropes attingit quorum causa est hepatis *ἀνία* quæ facit hepaticos: sed eos qui sequuntur proximè morbos acutos, ob eam causam sic nominatos: quia celeriter, continenter, & vehementer mouentur. Huiusmodi sunt febres quæ nominantur *σφαγίς*, & quarum excrementa sunt *καυσμά*. Ergo. HYDROPS.] Quorum iam forma expressa est in ascite, leucophlegmatia, & tympanite.

ILLI DEMVM PERMOLESTI SVNT.] Symptomatum vehementia quæ cernitur in dolore, iactatione, siti inextinguibili, difficultate spirandi, febre, vigiliis, cum scditate coloris.

ATQVE MORTIFERI.] Causæ hydropicæ contumacia inexpugnabili, & hydropicorum symptomatum calamitosa vi. Nam hydropica causa est hydropum hîc descriptorum, non simplex aquarum collectio, sed earum perennitas; vel à marasmo retorridi hepatis; vel ab intemperie hectica frigida nutritiarum partium. Atqui omnis frigida intemperies nata ex ardore febrili, est insanabilis: quoniam à priuatione habitus denuo comparari non potest. Symptomatum autem prædictorum acerbitas; & succrescentium causa est incommodorum, & vires exoluit, calorem natiuum suffocat per translationem ab hypochondriis ad præcordia denique omnia tollit officia, tum vitalia, tum naturalia.

QUI VENIUNT E MORBIS ACVTIS.] Tum *κατ' ἀποκτείνε*, i. per abscessum; tum *κατ' ὀπιθῆναι*, i. per propagationem morbi, & alterius impressionem. Nam si per abscessum oritur morbi acuti, sicut è *mitrophya* febre oriri narrat Hippocrates, natura non erit ferendo hydropi grauissimo: propterea; talis abscessus maior esse dicitur à præceptore, quàm vt perferri possit. Sin autem per epigenesin oritur, maior inde fiet incommodorum accessio. Nulla enim quæ per sympathiam incidunt symptomata; leuationem adferunt primigeniorum malorum. Et. *Τὸν νοσητὰν δὲ, πρὶν ἢ ἐπὶ τῇ ῥῆσιν* *ἀποκτείνε*, i. E morbo qui alter superuenit alteri, non tardò mortificandū habet ægrotum.

PLVRIMI AVTEM NASCUNTUR E LUMBIS.] Tum per epigenesin lumbanum vitiorum, secundum neruos ipsos quia lumbis exoni constituntur mesocola; tum per communicationem febris acutæ quæ focum habet in vena & arteria contragendi lumborum. Et. *ἐν τῇ αἵματι*] Ab intemperie frigida hectica tenuium intestinorum, spiritu flatulento fætorū, vel à icterum phlegmone quæ digestionis officium adimit venis mesaraicis, nec sinit esse morigeras hepati attractici.

ALII VERO AB HEPATE] Frustrato sanguificandi opere; tum propria ipsius *απρία*; tum scirrhus atque marasmus; tum suffocatione caloris nativi ex nimia effluentis sanguinis abundantia.

2 Τοῖσι μὲν ἔν δὲ τῷ κενεῶνων καὶ τῆς ὀσφύος δὲ χειρὶ μοῖσιν ὁ πόδες οἰδέουσι, καὶ διαρροαὶ πολυχρόνιοι ὀρθοκοιλιοῦσιν, ἔλαττασθουσι τὴν κοιλίαν, ἔδε τὰς ὀδυνὰς λύσται τὰς δὲ ὀσφύος καὶ κενεῶνων.

Ergo quibus hydropes à lumbis & ilibus ortum habent; iis tument pedes, ac diarrhoea longa est quæ nec pratumidum ventrem adequat, nec ipsos lumborum & ilium dolores exolvit.

CUM OMNIS, qui per se incipit, gravis est hydrops; tum verò gravissimus, qui morbo alteri, tam acuto, quàm vetusto superuenit; imprimisque quartanæ, omnium vetustissimæ. Siue autem per se incipiat, siue morbo alteri superueniat; certum est ipsum vel ab hepate, vel à lumbis & ilibus ortum habere. Ac lumbaris quidem & iliaci primùm hîc signa ponuntur, atque incommoda siue symptomata.

ERGO] Patefactis hydropum sedibus unde nascuntur, & ubi subsistunt; sequitur ut signa & incommoda eorum ponantur, quæ sunt huiusmodi.

QVIBVS HYDROPE A LVMBIS ET ILIBVS ORTVM HABENT] I. Qui à mesenterio, vel, ut scripsit Hippocrates, à mesocolo lumbigena, vel ab intestinis iliatis principia causantur, ducunt, per earum partium inflammationem, vel intemperiem hecticam frigidam quæ à lumborum vitio serpit ad illas, ibique firmiter fixa hæret. Nam vitiorum lumbarium magna esse solet communicatio cum gentilitiis partibus, vicinis item & sociis. Ac denique lumborum vitia, nullam partem corporis sinunt exptem sui; sicut demonstratum est alibi. Et verò multa iam diximus de iis quæ pertinet ad materiæ procreationem, & ad formalem causam hydropis cuiusque, lumbaris atque iliati.

IIS TVMENT PEDES] Non quidem dum reapse manet morbus acutus; sed cùm in vetustatem incidit per *μετέσθιν*, ac tum nomen solum retinet morbi acuti, quod olim iure habuit, naturam verò amisit. Primùm igitur pedes tumet antequam sparsa sit tumorum inequalitas, alibi quoque ortum; nec verò tument ut in phthisicis à *νεφρῶσι*, quæ toto diffusa corpore, primùm apparet in pedibus: quod illi procul maximè absint à principatu & fonte viuifici nectaris quod in corde situm est, indeque corporis vniuersitatem viuidam reddit: sed quod pituitosum sanguinem primi excipiant, quem prænatua & aduentitia intemperie frigida, melius mitigare non possunt: & quod laborant ex paupertate spiritus & caloris viuifici, in languida viciacitate, propter longinquitatem partium calidarum, sanguine abundantium, & propinquitatem ipsius cruditaris quæ vnica matrix est *ἡ ἐμφυσιματώδης* in quibus assurgunt hydropes hoc loco descripti qui à lumbis & ilibus ortum habent. Ergo sic pedes intumescunt primi omnium totius compaginis: quemadmodum iidem primi omnium refrigerantur in paupertate & interceptione vitalis caloris. Nam primæ omnium manus, vel extimi digiti, sensum exhibent perfrigerationis in eiusdem caloris retractione vi febris ardentem acutæ, ut alibi annotauimus ex r. lib. *ἡ ἐν δὲ*. Est igitur primùm hoc signum hydropis iliati: quantum commune sit aliorum quoque hydropum. Distinctio tamen ponenda in tempore tumoris exorti, ut loco dicetur.

AC DIARRHŒA] Profluvium alui quod continenter sit liquidis excrementis, ac sine cruditate ciborum quam dysenteria fundit sine doloris molestia, tum sine exienta deiectione quam cum torminibus exprimit dysenteria. Sic enim differentiz statuuntur illorum trium profluviorum alui.

LONGA EST] Quia non fit humore in aluum protupto, vel è toto corporis habitu per venas ad hepar (sic enim per aluum, corporis vniuersitas expurgatur, ut etiam per *ῥινάσας*) vel è capite, vel è nutritiis partibus ad intestina prolunem deponentibus. Actalis diarrhoea non est *πολὴν μέρος· ἀλλ' ὀσμώδης* *λαύρας καὶ ἰσχυρῆς*, ut scribit Hippocrates de dysenteria quæ dicitur *αἱματώδης*. Tum sæpe critica est fugax illa, & exigui temporis diarrhoea, profusè peracta; idque cùm aliorum morborum qui homines periclitari solent habent; tum verò hydropum. In promptu sunt illa. *Ἐκ τῆς λευκοφλεγμάτων ἰμπλικοφῶς* superuenias diarrhoea; morbum exolvit. Et si quis dominatu hydropis tenetur, per venas aqua profluente in aluum; sanatur. Hic diarrhoea longa, est toto genere symptomatica. Est autem huiusmodi perenni generatione profluentis humoris, & perenni affluxu. Perennitas ortus posita est in phlegmone intestini ieiuni, & contumacia mesaraicarum venarum: propter quæ mala ipsum hepar suo non potest fungi munere caratendi. Sic intercluso iunere, chylusque in anfractibus ieiuni concluso & ilei; tandem accessione gravitatis à pondere, & proritationis à chyli corruptione ac bilis morfu; claustra laxantur: nec duce vi expultrice, penè collapsa, excrementis chylosi bile multa fucatis, continenter & rapidè fertur aluus. Est igitur symptomatica omnis excretio qua minimè vacuantur quæ vacuari prodesset: ac tantum abest, ut affligentis mali aliquam leuationem adferat, ut contra ægrorum maximè damnis augeat. Talis est illa diarrhoea quam à melicrato meracioris, biliosis porissimùm, accidere narrat Hippocrates. Eius verba hæc sunt Latine conuersa. Enimvero biliosa excrementa, spumantia, tum saturata magis quàm decet, magisque feruida; melicratum metum ducit potius quàm bene dilutum. Ac talia quidem excrementa, alia quoque inferunt magna incommoda.

aph.23-7.
aph.74-7.

progn.19.
lib.23

Coac. 3. exp;
4. lib. 2.

part. I. sec. 4.
6. Epid.

Gal. comment;
ad promiss. 76.
63.14

30

40

1

6

EST QUIDEM communis omnium hydropum causa & veluti matrix quædam, frustratum opus sanguificandi. Sed operationis frustrata, in promptu sunt mala, quæ tum à lumbis & ilibus, tum verò ab hepate ipso principia causæque ducunt. Ac de lumborum & ilium vitiis hydropificis, & signis eorum, tota est proximè scripta prognôsis. Nunc de hydropæ dicendum hepatico, cum scilicet proprio hepatis vitio, non alieno, frustrata est sanguifica operatio.

SED QVIBVS] Hydropicis, & vtriforme abdomen gerentibus.

AB HEPATE SVNT HYDROPEs] Quos edit aquarum collectio, amplitudinem alui replentium, quas hepar fundit alienata virtute sanguifica, idque per marasimum retorridum, quem febris impressit ardens acuta, nec tamen tam citò peremit; aut quæ per *μετέωρον* acutæ vetusta est, vt quartana; vel etiam per suffocationem caloris nativi, & scirrhum, ex copia sanguifluorum illuc resluentium. Nam hepatis *ἀνία* è dyscrasia frigida & hæmorrhagia, quamvis hydropifica, hic non habet concursum descriptorum signorum atque symptomatum.

ET VNA TVSSES ADSVNT] Vnâ posui, vt omnis tollatur suspicio eius tussis de qua scripti sunt illi aphorismi. *Τοῖσιν ὁδωπατικοῖς ἐκ τῆς ἐπιπλοῦς καὶ ἰ. Quibus hydropicus, non è tussis accidit; grave malum.* Et. *Ἰδρωπικὸν τὸ ἐκ τῆς ἐπιπλοῦς ἀνίατος ἐστίν. i. Hydropicum si tussis malè habet; desperatus.* Eiusmodi enim tussis, mortem subesse breui testantur, quando ad vltima ventum est ipsius hydropis, & ad extremum perducti. Sic enim Praxagoras auctor est, epigenesin fieri grauiorum symptomatum in morbis grauissimis. Hic ponitur illa tussis quæ comes est hepatici vitij quod facit hydræm. Accidit autem concussione thoracis atque pulmonum, quam ciet, non quidem prolapsus catarrhi: sed inane studium anacarbaræ, cuius opinionem facit proratio diaphragmatis ab exudante sero, & quodam ichore maligno ex hepate cui superpositum adiacet diaphragma. Idem quoque facit prætumidum hepar quod suo appulsu multum opprimit diaphragma, vnde pulmones similiter in angusto esse videntur, vt si catarrhi copia obruerentur: proindeque non minus contendunt expedire se & explicare tussiendo ab illa molestia, quam si materia esset quedam expectorabilis, cuius expectorato liberantur, & liberè aura fruuntur. Sed hi frustra id moliantur per tussim, vt mox dicitur.

ET CREBRA INCESBIT TVSSIENDI CVPIDITAS] Idque tam sponte nostra, quam morbi; tam scilicet instinctu quàm electione. Dictum est de instinctu. Cernitur autem electio hydropicorum, in tussiendo, dum student comparare pulmonum libertatem, extussiendo id quod eos redigit in angustiam quæ adimit beneficium liberæ spirationis. Sed illa tussiendo contentio atque studium breui cessat: quia est irritum, non secus atque illud, deglutiendi crebrò in laxitate vuulæ. Frustra enim deglutiendo certant qui sic laborant.

ET COMMEMORABILE NIHIL EXTVSSIVNT] Nisi fortè quidpiam paucum ac tenuè, quod sudatiunculæ instar exudar, & quod in summa tussiendo contèrione exprimitur in arteriam, & inde in fauces, quod nullam adfert leuationem. Sed cum ichorem qui exudar ex hepate, propter summam ipsius tenuitatem, fumidus cordis vapor suis velut manibus complexi non potest, neque per bronchia sublatum ad bronchum adducere, & ad fauces. Nec verò tumor hepatis, quod, opprimendo septum transuersum, angustiam illam parit ipsorum pulmonum, atque spirandi adimit libertatem, vlla tussiendo contentione, ac studio, extussiri posse videtur, nec dolorificum illud malum foras exire.

AC PEDES TVMENT] Oedemate illic oborto à sanguine multum pituitoso, cuius incommoda primùm apparent in pedibus, natura & situ, omnium frigidissimis; qui, vt longissimè absunt à fonte viuifici nectaris, atque à commercio partium calidarum: sic non ita procul à domicilio cruditatis, quæ sua sponte prolapsa deorsum, in pedibus tandem subsistit, ibique tumorem facit oedematofosum, ipsis non modò non bene assimilata, sed ne apposita quidem bene. Nam eius hydropis quem suffocatio infert caloris hepatici atque sanguifici, ex muliebrium sanguifluorum, & hæmorrhæicorum refluxu ad hepar *ἐκ μεταωρον*; tum eius qui nascitur à vetusto ictero, vel à quartana per longam consumptionem hæmidi primigenij; eius, inquam, hydropis, vel eorum hydropum signa multò antè sunt in albo & molli pedum tumore, quàm in abdomine vtriformi, quæ forma est vera cuiusque hydropis. Ac tumor ille sursum prorepat sensim à pedibus ad malleolos, indeque ad crura & ad ilium ossa, tum ad lumbos & ad ventrem, vt mox dicitur. Secus fit in vero ascite quem genuit *μεταωρὸς περιπνεύσις*, à febre acuta. Huius enim ad summum perducti, propagatio est pedum & crurum tumor, sicut hydrocele testium. Atque tum hydrops ille, quando ad vltima ventum est, *ἐπὶ τῷ* habet sursum tussiferam in thorace; deorsum verò in artus, oedematofosam. Erit igitur pedum tumor hydropicus, in quibusdam *κατὰ πότον*, in aliis verò *ἀνὰ πότον*.

TVM ALVVS NON DEICIIT] Hoc signum syllogisticum est, atque, vt ita dicam, character hydropis hepatici; non secus atque diarrhœa prædicta, iliaci. Aluus autem nihil deicit: quia nec irritatur corruptione chyli, nec suppressione tanta opprimitur. Deinde hic *σάκες* naturali carent vehiculo, i. humore quem hepatis phlegmone prorsus exaurit. Tum intestina, proritatione illa non gaudent, vt solebant, deiectionibus ipsis dicata, quam bilis edit per folliculi meatum effusa. Quæ ratio inhibendæ atque sistendæ *σάκος*, communis est omnium ictericorum: cuiusmodi sunt tales hydropici.

NISI DVRA] Velut pilularæ *σάκος* caprarum, quæ *δυσχωρήματα αὐτὴν ἐκείνη* nominantur. Huiusmodi autem sunt: quia diutius cunctantur in aluo: & quia, exhausto caloris cuiusdam igni, dura redduntur perusta.

ATQVE COACTA] i. Non sua sponte: sed medici artificio ipsam cogentis ad excernendum. Ac talis difficultas excernendi cum *σάκος* duris, planè ostendit nutritiarum partium œconomiam in vitio esse caloris & siccitatis. Hinc partium illarum sicci dicuntur morbi: sicut & sicca pleuritis, in spui vacuitate: & sicci morbi venarum & arteriarum, in asperitate linguæ & cutis squalore; vt alibi docet Galenus in explicatione siccorum morborum. Sed excrementorum talium, ac deiectionum forma & ratio continetur in illo prorrhethico. *Κοιτίαι σκληραῖναι, οὐκ ἐπὶ δὲ πύλας αὐτὴν ἐκείνην αἰσθάνειν χαλκῶν. i. Suppresse alui, nec nisi pauca quadam nigra, fecis caprarum instar laxantes, idque coactæ; malum.*

QVINETIAM CIRCA VENTREM ASSVAGVNT OEDEMATA] Verbum hic Græcum retinui

retinui potius quàm Latinum, *tumorem*: quòd illa sint vera œdemata, sicut à recentioribus vsurpantur, ne quis existimet tumorem dici hoc loco, illum repleti supra modum vel intenti abdominis vtriformem, qui verè formam & ideam exhibet ipsius hydrōpis. Hic enim circa ventrem assurgunt œdemata: sicut primum in pedibus assurgere diximus, idque *τὸ πρῶτον ἀπὸ τοῦ ποδὸς* tumoris œdematosi, qui sensim prorepit à pedibus ad crura & ad ilia, indeque ad ventrem, pro cruditatis accretione, partiumque, vbi subsistit, succedanea refrigeratione, &c, quasi ordine quodam, consecutaria suffocari caloris hepatici atque sanguifici.

PARTIM DEXTRA, PARTIM SINISTRA] Vt est inclinatio tumidorum pedum & crurum *καὶ ἐκ τῆς δεξιᾶς αὐτῆς καὶ ἀπὸ τῆς ἀριστερᾶς*: tum vt pars alterutra, ventris incommoda percipit suffocari caloris.

QUI MODO CONSISTUNT, MODO SUBSIDENT] Ac si diceret. Est quidem tumida cutis atque turgida toto corpore hydrōpicorum, vt quæ nutritatum capessit à sanguine pituitoso, quæ appressa digito, statim subsidit, & mox consurgit. Sed tamen non statim vnà cum *μεταπλάσσει* acutorum morborum, cutis intumescere consuevit. Nam turgidi sunt primi omnium pedes ipsi: quia longissimè absunt à partibus calidissimis. Inde symptōma illud paulatim conscendens, transit ad ventrem, ipsūque totum occupat, similiter pariterque affectum, i. turgidulum atque tumidum, sicut pedes; vt in eo digitorum vestigia imprimantur, appareatque fossula quæ mox consurgit. Atque illud est quod præceptor ait, circa ventrem nasci œdemata modò consistentia, modò subsidentia. Quamuis hæc etiam dici possint de ortu primo eorum, vbi circa initia modò alius tumescit, modo resedit; ac tandem in rumore manet, neque resedit ampliùs. Hæc sunt Galeni.

lib. 2. progn.

4 *Επὶ τοῖσι ξηροῖσιν ὑδρωπώδεσι, τὰ στραγγιζμένα μοχθηρὰ. Φλαῦρα δὲ, καὶ τὰς μικρὰς ὑποστάσεις ἔχοντα.*

In sicco hydrōpe; stranguria praua est: ac praua quoque urina, quæ hypostasin habet exiguam.

SEQUITUR, vt posita distinctione hydrōpum trium ex causis & signis, quæ *περιμένα* Græci vocant; deinceps dicamus de iis, quæ in singulos cadunt, symptōmatis. *Επιχρόμμενα* sunt cuiusque hydrōpis ad summum perducti, suāque incommoda huc illuc quoquouersum propagantis, idque nulla leuatione partium afflictarum: sed contrā maiore afflictione, non earum modò quæ in sympathiam adducuntur; sed illarum etiam quæ primum laborare cœperunt. Sic enim comparatum est, vt epigenomena grauiorum morborum, non minùs ostendant calamitatem partium ipsa propagantium, quàm partibus ipsis, quæ feruntur, & vbi excipiuntur, calamitosa sunt. Vetus est illud. *Ὅσα μὲν καὶ συμπάσας γίνεται νοσήματα· πάντα δὲ ἐν τῇ λυτικῇ εἰς ἐξ ἀρχῆς παθόντων*. i. Earum quæ per sympathiam oriuntur afflictionum, nulla omnino est quæ primigenia mala exoluat. Omnia autem *τὰ ἐπιχρόμμενα* veniunt per sympathiam: cum scilicet priore morbo, non solùm superstire, sed multum adaucto; nouus quidam alter accedit, non autem succedit, vt fieri solet in *μεταπλάσει*. Cum igitur *τὰ ἐπιχρόμμενα* sint eius morbi, qui tantum abest vt aliquid de suo concedat, vt contrā magis ac magis ingrauescat, virēsque, vt ait ille, acquirat eundo; tum ipsa quoque oborta, grauiorum malorum accessionem adiungant; terrifica sanè videri debet omnis hydrōpum, alioqui per se mortiferorum, epigenesis. Atque imprimis crudelissimæ stranguriæ, quæ hîc docetur cadere in siccum hydrōpem.

Gal. ad sent. 10. lib. 3. cap. 2. 2. 2. 2.

aph. 11. 7.

IN SICCO HYDRŌPE] Cui quidem morbo, similitudo vtris intenti nomen dedit hydrōpis: adiunctionem verò habet siccitatis, & siccus nominatur à flatulento spiritu, quo nimium alius intenditur. Aliter quoque dicitur *τυμπανίας* ἢ *τυμπανίτης*: quia, similiter vt tympanum aliquod, sonitum edit: pulsato intrā spiritu, quando pellis alui colliditur. Hunc sapienter Hippocrates verus dictator, ex causâ hypodipicâ, i. flatu, perspiciebat, siccum vocauit in aphorismis, vt iam posuimus in philologia trium hydrōpum. Idem cholera nomen adiectiuum dedit, quam spiritus acres flatulenti excitarunt. Sic enim ait. *Χολῆς δὲ ξηρῆς, ἢ γαστῆρ πρὸς σπλῆν, καὶ ψόφοι εἶναι*. i. Sicca autem cholera alius inflata est, atque intrā soni exaudiantur. Sed tamen hydrōpis sicci alia consideratio esse potest in hac prognosi, vt eò siccitas illa spectare videatur, quòd maneat siccus hydrōps, de quo ne minimum quidē decidit in stranguria. Sic enim sicci dicuntur morbi, vt vidimus in sicca pleuritide, quorum vacuatio nulla est, nec vlla leuatio, si quid aliunde foras edatur. Nam siccus est hydrōps, manetque suo statu, vel etiam crescit in symptomatica diarrhœa quæ dolorificum vel hydrōpificum malum foras non edit: sed intus inclusum esse testatur. Denique in omni vacuatione qua morbi causa foras non exit, sed intrā subesse ostenditur; siccus est morbus, de quo verendum, donec à pepasmo humescere cœperit. Ergo. IN SICCO HYDRŌPE] Qui est eiusmodi; aut propria specie & idea, vt *τυμπανίας*; aut qui nihil concedit de suo, nec vlla ex eo deducitur portio causæ hydrōpificæ. Vtrunque sapit *τὴν ἐξέλιξιν* præceptoris, vt mox videbitur.

aph. 11. 4. Coac. 1. huius cap.

lib. 4. cap. 2. 2. 2.

Coac. 3. cap. 16. lib. 2. lib. 2. progn. & Coac. 2. huius cap.

STRANGURIA] Vrinæ stillicidium, quod continenter, quasi guttatim, exprimitur: cuius expressionis tam crebræ & exiguæ causa est, vesicæ imbecillitas, tum ab intemperie, tum à tumore aliquo, vel acrimonia ipsius vrinæ; tum à renibus; tum à venis; in vesicam ipsam deductæ. Quòd fit vt stranguria omnis posita sit vel in morbo, vel in symptōmate ipsius vesicæ. Atque hîc stranguria vtriusque, & morbi, & symptōmatis, opinionem facit. Ac morbi quidem, intento nimium aqualiculo, qui, non dissi-

aph. 56. 5.

mili ratione, opprimendo cogit vesicam ad meicendum, qua prætumidum hepar diaphragma; indeque in angustiam redactum pulmonem, ad tussendum. Sic editur stranguria crudelis in calculo, cuius oppressione, tam crebro vesica concutitur ad eum excutendum: sed frustra conando, ex ea concussione frequens vrina meitur stranguriosa. Tum illa oppressio multum intenti aqualiculi, vesicam non sinit vilius inflammationis expertem, nec intestinum rectum, cuius tamen vitio vesica non trahitur in sympathiam ad stranguriam; nisi prægrande sit vitium illud, teste Galeno, cuius verba hæc sunt. *Ὁυζ αὐτὸς ἐπεὶ ἐπεὶ ὁ πύλινος περικυβέλλεται ἀπὸ τῆς ἀξιοῦς καὶ μέγας*. Hæc igitur stranguria quæ morbo vesicæ fit ab hydræ per sympathiam propinquitatis; non dubium est quin, accretione hydræ, terrifica sit, & meicendi molestia corpus infirmum faciat cum accessione grauiorum malorum quæ veniunt à dolore. Symptomata autem stranguria, i. quæ accidit symptomate ipso vesicæ, non morbo; vel quam vesica edit, non suo quidem vitio, sed alieno, sæpe finem adfert grauioribus morborum. Talis illa fuit de qua hæc scripta sunt. *Inter signa omnia fuit vnum vtile maximumque, quod multos à maximis periculis liberauit, quibus in stranguriam mutatio facta est, eoque abscessus conuersi sunt*. Hæc fuit propria iis quos diu multumque tritaophya febris iam exercuerat. Sed alia est hydropicorum stranguria, quorum hydræ per se ieiuni phlegmone, vel à torminibus, ortum habent. Nam vnde sunt homines ileosi, non raro etiam fiunt stranguriosi, & contrà: quamuis Galeno parum id placeat. Sed placitum est præceptoris, quod non sine iudicio & experientia positum esse arbitror, nec ratum, nec homini sapientissimo persuasum: vt spero me aliis demonstraturum si Deus voluerit, cum ea de re suo agetur loco. Ergo si ex eodem fonte stranguria incidit vbi fit ileus, & ibidem hydræ ab eadem causa exurgit; commoda erit stranguria, si fiat per metaplasin hydræ, per quam hydropica causa liberè foras exeat: declarat id ipsum leuatio. Incommoda autem per *ὁπλίσιν* propagata, quæ, vt iam posui, dolorificum malum foras non edunt: sed ipsum intus inclusum esse testantur. Argumento est incrementum hydræ, & maior molestia quàm solebat.

PRAUA EST] Signo & causa. Vtriusque ratio patefacta est in historia stranguriæ, suprâ hic posita. Sed vt complectar breui quæ fusiùs dicta sunt. Praua est quidem stranguria vt signum: quoniam symptomata est per propagationem hydræ in quo summa sunt omnia symptomatum hydropicorum. Ac rantiùm abest vt adiumentum adferat leuationis, vt incommoda multa inferat: proptereaque causam obtineat prauitatis. Non enim fugax est, vt critica illa prædicta quæ profuit Thasis ad febrem tritaophyam: sed *πολύμακρος*, i. *dinturna*, & molestissima, quæ, sicut dolor omnis, acerbitate sua & vigiliis facit corpus infirmum, & vnâ corruptionem adiungit humorum. Hinc febrium ortus & paroxysmi, omniumque penè malorum productio.

PRAUA EST AVTEM QUÆ PAVCAM HABET HYPOSTASIN] Ac si diceret, hoc signum est syllogisticum atque certissimum argumentum stranguriæ, non quidem naturæ, sed merito morbi susceptæ, quam nec perithecâ vrinæ fundit afflictarum partium expurgatio: quod vrinæ nulla sint prædita hypostasi, aut perexigua. Quo nomine hypostaseos, non debet intelligi nec fingi animo illa quæ ad crisin apparet febrium acutarum, læuis, æqualis, & alba: sed albuminea, crassa, *γοτειδής*, i. *genituralis*, quæ speciem & ideam præ se fert genituræ humanæ, per quam exoluuntur ferè hypogastrici omnes morbi à pituita: non raro etiam conuulsiones ac febres quæ sunt natura vetustæ. Atque huius hypostaseos descriptio est in illa historia Thasiorum de quibus hæc scripta sunt à præceptore. *Πολοὶ δὲ καὶ παύροις μετὰ πύλινος ὑσμινάδες, πύλινος, καὶ σπαραγμώδεις*. i. *Circumfluebant mulis vrinæ abradentes, puriformes, stranguriosæ*. Deinde subiecit. *Ὁὐ νεφριτικὰ ἀλλὰ πυλίσιν, ἀλλὰ ἀντ' ἄλλων*. i. *Non erant nephritica: verùm his pro aliis alia*. Quod est eiusmodi ac si diceret. Tales vrinæ non vitio renum fluebant, nec ipsius vesicæ: verùm per *μετάπλιν*, atque, vt ita dicam, *σπασιν* partium superarum implicitarum morbo, & se humore morbifico exonerantium. Talis est illa hypostasis de qua in conuulsione sic legitur. *Quænetiam prodest, vrinam fluere albumineam*. Talis & illa de qua illud memoriæ proditum est ab Hippocrate. *Εν Περὶ τοῦ πυλινῶς τὸ πύλινον ὅ, π κριμῶν, καὶ ὅ, ἢ ἡσθον τὰ πύλινον* ὅ, π αἱ ἐρηγίαι ῥύονται ὅ, ται ἐπὶ φύσιν πολλῆς, ἐπὶ κοπρῶν πολλῆς γυμνῆς διήσθησης, ἐλαττωσιν. i. *Perinthi vrina genituræ similis, vel ipsam genituralis quod cernitur in vrina, tale nobis visum est, quale criticum quippiam esse solet*. Et verò talia sunt hypogastriorum, quorum vitia humorifica tollunt vrinæ, cum illa nec multo flatur, nec multo stercore glutinoso residunt. Nam vt absoluiam; enæoremata genituræ, vt in febre acuta mortiferè apparent: sic in vetusta, pituitæ ostendunt purgationem. Nec verò mirum videri debet vrinas reddi stranguriosas & genituræ similes, per expurgationem pituitæ à mesenterio & intestinis: quando huiusmodi sæpe feruntur in conuulsione per *μετάπλιν* à neruis ad venas: sicut à venis ad neruos non raro fit *μετάπλιν*, vnde incidit tremor atque delirium. Atque mirari desinet qui attentè legerit & intellexerit hunc aphorismum Hippocratis. *Quibus inter ventrem, & septum transversum prolapsa est pituita quæ facit dolorem, nec exitum habet in aluum alterutram; his conuersa per venas ad vesicam pituita, malum exoluitur, siue sanatur*. Ibi Galenus docet, egregios naturæ conatus, qui vulgò miraculis apponuntur in molicenda & absoluenda vacuatione cuiusque humoris morbifici.

5 Τοῖσιν ὑδρωπώδεσιν ἐπιληπτικὰ ἐπιχυρόμυρα ὀλέθρια. ἀλλήλων τε σημείων μοχθηρῶν, καὶ κοιλίας καδυγχαίνοισι.

Hydropicis quæ superuenit epilepsia, funesta. Cum enim signa hæc mutuò certent inter se maleficientia: tum verò profusiores faciunt aluos.

EX EODEM fonte multa oriri symptomata nouum non est: quando *ἐκ τοῦ αὐτοῦ* grauissimorum morborum varia esse solet. Atque ut idem fons multos fundit riuulos: sic idem morbus multa symptomata epigenomena, quoquo se verterit & cursum inflexerit eius perennitas. Ac ne longum faciam, leuoremque obruam multis exemplis quæ thesorem huius catholici veritatem ostendunt; paucis ab solnam, eo contentus quod ponitur in hac prognosi epigenomenon graue ipsius hydropis. Est autem epilepsia quæ nouè incidit in hydropicos, quorum, & ipsi, vnde nomen habent, hydropes, per epigenesin oriuntur.

HYDROPICIS] *ὑδροπικὸς*, i. qui speciem & formam gerunt hydropis in abdomine vtriformi per *ἐκ τοῦ αὐτοῦ* lumborum & ilium, vel in prætumidi, nimiumque turgidi totius corporis inæqualitate, à nimia sanguinis ad hepar refluens abundantia, ipsūque calorem sanguificum suffocantis.

EPILEPSIA] Iniussa corporis vniuersi conuulsio cum læsione sensuum atque mentis, quam edit cerebri proritati contractio, mox inde spinalis medullæ, & inde neruorum omnium, motui atque sensui præfectorum. Atque hæc quidem conuulsio epileptica, non est neruorum, conuulsificam intra se causam habentium; videlicet repletionem aut siccitatem: sed vnius tantum principij, hoc est cerebri, deprimato accidit motu, non vitio artuum contractorum: ut cætera omnia quæ incidunt genera partium conuulsarum: earum dico quarum iniussa contractio est, non simplex collectio. Simplex autem collectio est illarum quæ, à paralyti oppositarum & antagonistarum, ipsæ sua sponte, non nostra, principium versus colliguntur. Sed olim multa diximus de conuulsione.

QUÆ SUPERVENIT] Per epigenesin causæ hydropicæ, vel ipsius symptomatis, vnde proritati cerebri, & ea proritante multum afflicti, contractio est, non autem conuulsio: qualis edi solet quando ipsum potens est *ἐπεστροφὴ*, & proritantis causæ. Hic autem labascit, ac dominatu regitur illius causæ malignæ, cuius appulsu contrahitur. Sed ille appulsus fit primum per *ἐκ τοῦ αὐτοῦ* causæ hydropicæ quæ tum à lumbis & ilibus, tum à refluxu sanguinis, olim per sedem vel vterum profluentis, ortum habet. Deinde verò per propagationem symptomatis ipsius hydropici. Ac de lumbarium vitiorum propagatione vetus est illud. *Διούρην circa lumbos ἔχοντα, τὸν qui ad hypochondria prorepunt dolores cum febre ἔχοντες, si fortiter inde ad caput transferantur, crudeliter illi conuulsifico modo necant.* Nam dolorifica lumborum mala quæ propagantur ad ceruices & ad caput, vicissitudinem adferunt conuulsionis & paralyseos. Atque in ea vicissitudine, grauissimorum morborum tempora exiguntur. Sed tamen Galeno visum est, credibilis esse, natam ex anadrome lumborum paraplegiam tolli oborta conuulsione. Quid verò?

nōne huc spectat etiam illa prognosis? Ex dolorifici lumborum mali excursu, oculorum perversio; graue malum. Possem hic ego plura ex Hippocrate ad hunc locum adferre: sed hæc sufficiant. De sanguisuiorum autem muliebrium, & hæmorrhoidorum refluxu ad hepar, vnde hydropes, si quidem vltra fiat eorum propagatio; in promptu sunt illa symptomata epileptica. *Quæ statim temporibus sanguinem profundunt, si careant eo beneficio, nec amplius loco profundant; vitam finiunt epileptici.* Nam & Hippocrates inter symptomata quæ veniunt ex puerperiorum excursu; commemorat *ἐπὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰσχυρὰ*. Nam hysteriarum ferè comes est conuulsio epileptica, fugax tamen & facilis, sine febre; non quia proritando potius quàm exhaustiendo fit, ut posui: sed quia fugax eius causa, sicut & suffocationis hysterice. Hic autem fixa est firmiter quæ facit hydropem. Ex quo efficitur, propagationem penè infinitam videri, *αὐτὴν πρὸς τὸν ὀφθαλμὸν καὶ τὸν ὀφθαλμὸν, i. propagantium ἢ propagatorum inde malorum.* Nam quæ in hydropicos incidit epilepsia, & causæ ipsius propagantis hydropem, & propagati hydropis symptomata est epigenomenon. Nam & hydropico symptomati superuenit epilepsia, nō minùs quàm ipsi causæ hydropicæ: quoniam in hydropes stabulum est corruptionis quæ facili, cerebrum lacessendo, consecutionem adfert horrendæ illius epilepsiæ; idque tum appulsu venenatæ cuiusdam auræ, tum translatione malignæ hydropis cacochymicæ: sicut vidimus in Comitissa Grueriana. Ac talis epilepsia mox vertitur in apoplexiam mortiferam & insanabilem. Sed aliàs multa scripsimus de malo epilepsiæ quod magnū ab Hippocrate nominatur.

CVM ENIM MUTVO CERTENT INTER SE MALEFICIENTIA] i. Cum mutuo se afficiant, mutuasque tradant operas in ægri perniciem, ut alibi scripsit Hippocrates, *συνμαρτυροῦντες ἐς τὸ θάνατον*: quoniam syntimorie maleficæ causa est ipsa epigenesis, quæ, ut ita dicam, par pari refert ei morbo & loco vnde propagatio ipsa fit, ipsūque cumulare auget malis atque damnis ægrotum. Nota sunt illa præceptoris; quod malè orta, pessimè ipsos habent quos inuaserunt. Et. *Τὸν τοῦ αὐτοῦ ὁ, πρὸς τὸν ὀφθαλμὸν ἔχοντα, ὅς τε πολλὰ δαπανῇται. i. Quorum morborum alter superuenit alteri; maximam illè partem interimit.* Et, quod plures principatus in vitio sunt, eò res ægri peius eunt. Est autem epilepsiæ tanta; ut sic dicam, atrocitas, ut nulla vis naturæ maior *αὐτομάτως* possit inferri, quàm quæ ab ea inferitur. Est enim regina conuulsionum, quæ omnes per iniussam contractionem natæ, crudelissimæ sunt. Ac demonstratum est alibi, quod illa demum symptomata citæ mortis, ac iam iam venturæ argumenta sunt & causæ ipsæ, quæ cum signis effectæ naturæ, offensionem ipsi quoque inferunt intolerabilem.

TVM VERO FACIUNT PROFVSIORES ALVOS] Per *ἀντίαν* ventriculi quæ accidit per sympathiam cerebri epileptici, cuius maleficium illud est, ut iniussas contrahat seipsum versus partes illas quæ nostra spōte, i. *αὐτοκίνητος*, & iussu nostro mouetur: eas verò exoluta quæ sua spōte, *αὐτοκίνητος*, non nostra, opus quæque suum faciundo; vitæ inferniunt conseruandæ; ut ventriculus, exorquando & appetendo; intestina, distribuendo & excernendo. Atque hoc profusum alui, non est criticum hydropi sanando; ut esse iam diximus illud de quò hæc scripta sunt à præceptore. Si cui leuio phlegma implicito fortis incidat diarrhœa, morbum exoluit. Et. *Si quis dominatus hydropis tenetur; per venas aqua profluente in alium; sanatur.* Sed est omnino symptomaticum lientericum; & soboles cruditaris. Atque mox infra dicitur; diarrhœam hydropis criticam, esse debere omnis cruditaris expertem. Hic autem

cruditas & lienteria, ortum habet ex eo quod omnia cerebri vndecunque afflicti mala, cum stomacho facile societatem ineunt: idque vel vna generis similitudine, qua *πυρεθισμός* omnium esse dicitur, proptereaque cerebri omnium *συμπύρεσις*. Non igitur inde facta profusior aluus, hydropico vllam videtur adiumentum adferre: sed maximam potius noxam atque damnum ingrauescentis hydropis, & vtrumque collapsarum. Quicquid enim morbum auget, fouetque, & vnà corpus facit infirmum, desperationem adfert salutis. Ac tam nocenter hydropicum afficit hæc lienteria, quam pleuriticum illa diarrhœa quam esse dicit Hippocrates *αὐτὸ τὸ πύρον*, i. illud ipsum quod perimit. De qua, vt iam diximus, hæc scripsit Galenus. *Γίνεται μὲν γὰρ τὸ πύρον συμπύρεσις, ἐπὶ ἀρρώστια τῆς διωάμεως· αὐτὸ τε πάλιν ἀρρώστειαν ἀποβάλλεται.*

6. *Εν τοῖσι χολώδεσι κοιλίῃ παραχώδης διαδιδύσασιν μικρὰ γονώδεα, μωζώδεα, καὶ πόνῳ ὡδὲ ἥττω ἐμποιέοντα, καὶ ἔρα ἐκ διλύτως ἰόντα· ἐς ὕδρωπα δὲ ποτε λυτὰ ἐκ τῶν τοιούτων.*

In biliosis aluus turbata que pauca exhibet similia genitura, atque mucosa, & circa hypogastrium dolorifica, nec vrina faciles in meiendo; ex talibus desinunt in hydropem.

IBI DEMUM hydropes in metu sunt, vbi causarum hydropificarum est concursus, maleficentia inter se pariter concertantium ad generationem hydropis. Sed in biliosis, causarum est concursus ad hydropem, quibus apparēt & sunt quę scripta sunt in hac prognosi. Quod sic aggredior ad demonstrandum.

IN BILIOSIS] Qui sunt eiusmodi temperamento, habitu, & diætā, i. victu & instituto, quod *ὀππιδεύμα* Græci vocāt. Ac tēperamento quidē, qui hepate sunt calidissimo, & hepatite turgida sanguine bilioso. Habitu verò biliosi hoc loco ponētur, quos *αἰὼ καὶ κάτω* huiusmodi esse narrat Hippocrates, quorum exempla leguntur apud Galenum in Paulo rhetore, & Eudemo philosopho, qui tamen *πυρεθισμός* erat temperamēto. Sed illi tota compagine pituitoso, ac bile sursum refluxente, alitior erat aluus, crebra vomitio biliosa. Huic verò biliosæ deiectiones: vomitio bilis nulla. Biliosi autem diætā sunt; instituto quidem, qui in labore, & animi contentione, sæpe irarum æstu fluctuantes; ac suum defraudantes genium, corpus conficiunt. Victu autem, seu victus ratione, bilis abundat in iis, propterea que sunt biliosi, de quibus hæc scripsit præceptor. *Απὸ τῆς κρεοφαγίας βοείων κρεάτων, καὶ ἐξ οἰοφελίας ἐκ τῆς κατὰ τὴν δίαιταν, ἢ χορῶν (χορῶδης ἐστὶν). Ταῦτα γὰρ παύει τὴν πικρὰν τῶν ἐν τοῖς ὥρῳ πλεμύματα τῶν ἡπατι, καὶ χαλὰ μάλιστα ποσὶς ἐστὶν ἡπαρ, i. Ex bubularum carniū edacitate, viniq; immodica potione, idque potissimum astat; color est similis malicorij. Omnia enim prædicta, sunt hepati eo tempore infestissima, bilēque adducunt & sistunt ad hepar. Sic Apollonio facta est bilis accessio, natura iam bilioso, editaque sunt exempla intemperantiæ. Ergo IN BILIOSIS] Temperamento, habitu, atque diætā: quorum biliosa natura atque conditio, cum ætate accreuit simul, eaque *συνοχῆς* à prima complexionē atque compagine, facta est *συνήγορος καὶ ἐπαυγής*; idque potissimum constanti ætate, quo tempore ad summum perducta est.*

ALVVS TURBATA] Cuius egestio crebra est, cum torminibus atque morfu. Sic enim Galenus *τὴν πύρεσιν* alui describit, vnde dicitur *παραχώδης*. Verba Galeni hæc sunt. *Τὸ ἐς τὴν κοιλίαν ὄνυχον, ἢ πόνον κατὰ μετὰ δίαιταν· ἐργάζεται τὴν ὀππιδεύμα. i. Quod in aluum defertur, si cum morfu subducitur, perturbationem facit. Quanquam reperio apud Galenum, *τὸ παραχῶδην ἴσχυα, ἐστὶν τὸ συμπεριεῖν ἵστον χόρην*, ἀλλὰ πλεονάζουσαν διωάμεν. i. verbum hoc, perturbari, non modicam indicare deiectionem, sed nimiam eius abundantiam. Hic tamen secus est, quod sic habet.*

QVÆ PAUCA EGERIT] Propterea que non lege critica & salutari: quia nihil paucum est criticum. Atque hoc solo quantitatis vitio exlex est illius legis quæ sancita est de alui perturbatione spontina, his verbis. *Ὅτι μὲν οἷα δὲ καθαίρεισθαι, καθαίρονται. i. Si qualia purgari decet, purgantur. Nam illud αἷον, quo significantur *τὰ χαλὰ καὶ κρίσιμα*, minimè locum habet in tam exigua quantitate. Nam illud paucum, quo symptoma est languescens vel nimium oppressæ naturæ. Sed eius aluinæurbationis symptomaticæ alia sunt argumenta hic posita.*

GENITURÆ SIMILIA] Quorum tamen diuersa est ratio, indēque varia euidētia, tam ad interitum, quàm ad salutem: hic certè adduci non possum quin ea putem colliquamenta esse tenuium intestinorum, quorum adeps liquitur, ac deiectiones edic velut opimas, i. albas & læues, cuiusmodi scriptæ sunt in prognostico de dysenteria. Liquitur autem adeps à vitabifica tum ardoris hepatici, tum bilis, abradendo, intestinīs molestæ. Sin autem bilis ipsa nacta sit *τὴν αἰὼν πικρὰν*, cuiusque, vt ita dicam, distere careant intestina; tum hectica intemperies quam infert pituitæ manfio, cuiusque suppressa egestio; similiter hydropem faciet, vt illa quam intulit bilis appulsus, vnde liquitur adeps intestinorum. Atque hic glutinosa mucosa egeruntur & pauca. Hic etiā duæ in promptu sunt causæ hydropis: vna quidem *ὁλική*, i. materialis, videlicet pituitæ collectio; altera verò *πυρεθισμός*, i. efficiens, intemperies hectica tenuium intestinorum quæ pituitam intrus inclusam mutat in ætrem statulentum.

ET CIRCA HYPOGASTRIUM DOLORIFICA] Quæ *δὲ ἐστὶν καὶ ἀσχημον*, i. que abradendo & exasperando, partibus illis molesta sunt, vt suprà iam diximus.

NEC VRINÆ FACILES IN MEIENDO] Non quidem vesica plena, sed vacua: vt nulla verè ichthuria

10 *ischiuriz sit excusatio, quæ propria est vesicæ, cum vel sensio nulla excitatur, nec pruritatio ad me-
iendum, sensu amisso: vel nulla vis excernendi lucet, quæ reddat urinam: vel urinariz fistulæ tanta est
oppilatio, ut exitum urina non habeat. Sed ideo non sunt faciles in meiando; vel quod earum materia
derinetur in alvum, nec tamen excitat diarrhœam: vel ipsi renes laborent in officio miltgendi serum à
sanguine; vel impeditio sit illac transeundi ad ipsam vesicam. Sed ischiuria hæc præcætit morte hydro-
pem. Est igitur talis ratio præceptoris. Quemadmodum in aquarum perennitate, quæ posita est in syn-
drome prædictarum causarum, hydrôpis occasio præcipitur; sicut & ipse iam exortus sanatur; si vel
diarrhœa cruditatis experite, vel perirrhœa liberali, aquarum copia excludatur: sic denegato exitu per
illos veluti aqueductus, ex earum collectione hydrôps assurgit. Quod ipsum declarat illud quod se-*

quitur.
EX TALIBVS DESINVT IN HYDROPEM] Ac si diceret; ex perenni fonte aqua-
rum qui cernitur in causis hîc positis, necessariò venit symptoma hydrôpicum; si fontis illius nulli sint
tumul, per urinz ductus aut scæces: ac neque diarrhœa cruditatis experite, nec perirrhœa, hydrôpis ma-
teria & occasio præcipi posse videatur.

7 Ὅδε αἰῶνι πυρετῶδες ἔρ(ω) μικρὸν καὶ τεταραγμέν(ω) ὀλέθρι(ω).

Si cui aquoso cum febre urina pauca sit atque turbida; perniciosum.

30 SUPERIORE prognosi ea mens fuit atque ἡρόσια præceptoris, ut planum faceret, ibi demum hy-
drôpis molem assurgere, ubi causarum eius coitio est, quam αὐδρομύω Græci vocant: & impeditio nul-
la, quin ea moles assurgat. Ac syndrome quidem causarum est, in biliosis descriptis, quorum aluus pauca
egerit, partim genituræ similia, partim mucosa, & circa hypogastrium dolorifica. Quæ sunt eiusmodi;
ut malum subesse intus, non foras exire testentur. Impeditio nulla est molis hydrôpicæ, quando aqua-
rum perennitas non habet exitum per diarrhœam aut perirrhœam urinz liberaliter confluentis & ef-
fluentis. Hîc signa ponuntur hydrôpis funesta, quæ ducuntur è causis mortiferis. Ac signa quidem fu-
nesta sunt, urinz paucæ & turbidæ. Causæ autem mortiferæ, ingrauescens hydrôps, & febris. Atque sic
30 epilogismus est præceptoris. Si cum accessione causarum mortiferarum, euidencia sit prauorum signor-
um atque lethaliū; ibi non desperata solum est salus, verumetiam mors in propinquo. Sed epilogi-
smi huius analogismus sic recensere oportet.

SI CUI AQVOSO] Consultò verè aquosum & ὀδρεῶδες: quoniam nomen illud non est cuius-
vis hydrôpici, sed eius tantum qui stagnat aquis, & implicitus est vero ascite. Ac philologiz huius phi-
losophicæ, documentum statuit illud quod alibi legitur scriptum his verbis. ὀδρεῶδες δὲ αἰῶνι πίμπει. Per-
tinet autem illud præceptum ad vacuationem aquarum stagnantium, ex quibus ὀδρεῶδες nominantur
potius quàm ex abdomine vtriformi, quod etiam tympanitarum commune est ut ascitarum. Nam ex
abdomine vtriformi, similiter nominatur tympanias hydrôps, ut ipse ascites. Ergo. SI CUI A-
QVOSO] i. Aquarum in aluo stagnantium nimia abundantia multum implicito, quas genuit hepatis
40 αἰτία vel suffocatio caloris sanguifici, vel etiam marasmus retortidus, frustrata in totum operatione san-
guifica. Earum verò aquarum perennitatem excipit lien, quam in omentum deponit, mox illud in am-
plitudinem alui, & inde assurgit verus ascites qui tum ab humore, tum à forma vtris quam exhibet, no-
men habet hydrôpis.

CUM FEBRE] Vel exorta nouè acuta, vel exacerbata: tum à putredine aquarum stagnantium,
tum hepatitis ipsius impuritate, cuius cum ipso corde facilis communicatio esse solet, unde vel exori-
tur febris quæ prius non fuit; vel, si prius fuerit, exacerbatur. Atque huius febris symptoma est, ge-
minata corruptio partium stagnatarum & sitis inextinguibilis: cui gerendus mos, liberaliter se potu tri-
gidæ inuitando. Nam sitis tædia non facit nec toleranter feruntur: quia sunt tædia penè intolerabilia.
Sed tamen potio non vltà danda est, quàm ut vitam sustineat: optimæque est quæ urinam mouet.

50 VRINA PAUCA SIT] Cuius tamen liquor vel ὀρρος, nec febris ardore consumptus est: nec
diarrhœa profluxit; nec etiam sudore diffuxit: nec verò tantum eius transit ad vesicam, quantum so-
lebat: non quia in vitio sunt renes vel aqueductus: sed quia omnis humor cursum ad lienem inflectit,
quem cum expleuit, tandem effunditur in omentum; & inde in spatium illud quod est inter omentum
& tunicam peritonæum. Nullus enim ascites oritur sine consensu & conspiratione ipsius lienis. Est igi-
tur urinz paucitas, ab inopia seri aliò confluentis quàm ad urinz ductus. Ac nulla hîc renum maleme-
rentium, nec urinz ductuum, accusatio esse potest: nisi fortè in vitio sint, ipsâ quotidiani officij vacui-
tate, aut saltem remissione, ignauiores.

ATQVE TURBIDA] Similiter ut illæ urinz iumentorum similes, quæ cum agitatae fuerint, diu
depositæ non residunt. Ac tales urinz dicuntur ἔξω θελερῇ, οἷα ὑπερζήτων, ἀνεπέστατα, καὶ ἀνύστατα. Sunt
60 autem eiusmodi, perturbato sero in venis, à spiritu flatulento, & intus inclusò febrili ardore. Ac pessimæ
sunt tales urinz: ut signo quidem; quia denunciant paupertatem caloris natui, & incrementum eius
qui contra naturam est, eique internecinum bellum indixit: ut causa autem; quoniam translationem
habent sursum ad caput, unde dicuntur cephalicæ, & conuulsivæ, ut in Polyphanto.

PERNICIOSVM] i. Non solum desperatæ salutis eorum qui seruari non possunt, sed mortis
propinquæ. Nam si πὸ ὀλέθρου, ἀσώμους παραινέσται. δεικνύει σημαίνει, i. perniciofa, immeritò sedata; mortem sub-
propinquæ. 17.

7. Epid.

esse restant : quidni mortifera erunt circa mortis & iam iam ventura, pernicioſa quæ merito ingraueſcunt, & ſignis comitata ſunt planè funeſtis? Huiusmodi ſunt vrinæ pauca ac turbida, nec tamen nephriticæ, quarum explicata ratio in hydropæ aquoſo, & febre ſitiferâ; inualeſcentis mali, & triumphatæ naturæ, collapsorūque omnium præſidiorum, ſigna oſtendit. Παιν γὰρ διακρίεται, καὶ ἀπὸ πλεονεξίας αἵματος αἰσθητὸς καὶ φθόγγος, καὶ ἀσπαστὸς; καὶ διακρίνεται. i. Vrina valde crasſæ, turbatæ; ſignis ſunt certiffimo cephalalgie, conuulſionis, & mortis. Eſt igitur verum quod initio poſui ad demonſtrandum id quod ſcriptum eſt in hac prognôſi. Si cum acceſſione caſarum mortiferarum, euidentia quoque eſt ſignorum lethaliū, mors in propinquo eſt. Sed eam caſarum mortiferarum acceſſionem demonſtrauiſmus in aquoſo languore & febre: ſignorum lethaliū ſuper his euidentiam, in vrina pauca & turbida. Quamobrem epilogiſmo ſuum attulimus analogiſmum, cum veritate huius prognôſeos.

8. Επὶ δὲ υδέρῳ διαρροίῳ, διαρροίῃ υδρομένη υδατώδης χυμὸς ἀπὸ
ψῆς· λυεὶ τὸ νόσημα.

*Jam verò ineunte hydropæ, ſi aquoſa incidat diarrhœa, cruditatis
expers; morbum exoluit.*

aph. 29. 7. &
lib. πρὶ 1910.

aph. 25. 6.

lib. 4. πρὶ
ἀφ' ὧν
comment. ad
Coac. 4. hy-
ins cap.
aph. 21. 4.

QUÆ SCRIPTA ſunt haecenus de hydropæ; omnia metum adferunt atque metorem. Scripta autem ſunt de cauſis hydropificis, earūque origine: tum de ſymptomatis quæ per ἐπιπύξιν propagantur; alia quidem ſurſum; alia verò deorſum. Nouiſſimè poſita ſunt etiam ſigna hydropis funeſta quæ ducuntur è cauſis mortiferis. Nunc operæ precium fuerit, animum reuocare ad criſin hydropis, quæ ipſum reficiat, & conſoletur ſpe aliqua ſecundæ valerudinis. Eſt igitur in hydropæ ſpes aliqua ſecundæ valetudinis; primum in quo plus vacuatur humoris, quàm aſſumitur; deinde verò qui, lege critica, hydropiſmum excernit humorem, quò, quâ, & quemadmodum, natura duce, ſuſcipitur atque perficitur ipla excretio. Ac nulla eſt ratio excernendi potior, neque commodior, quàm ea quæ, per diarrhœam aut perirrœam, ſponte abſoluitur. Nam præceptoris illud iudicium eſt; quòd. Si quis leucophlegmaticæ domi-
nati tenetur, à diarrhœa forti ſanatur. Et. Si quis hydropæ implicatus ſit, aqua per venas in aluum profluente, morbo defungitur. Verùm, vt obiter moneam, quòd ἰσχυρὸν eſſe velit diarrhœam hydropis; non eò certè dixit vt longa ſit: ſed vt libera & liberalis. Id ipſum declarat illud quod alibi ſcriptum eſt de cruenta diſſenteria
ἡ δὲ τῆς φύσεως, i. natura duce ſuſcepta. Ορμαίνεται μὲν λαύρως καὶ ἰσχυρῶς· ἀπὸ ἧς παρὰ μέτρον γίνεται, ὅτε γίνεται
i. Cietur liberaliter atque fortiter: ſed tamen nec longa eſt, nec mortifera. De perirrœa autem ſolenne eſt illud quod nuper adduximus. Quibus inter ventrem & ſeptum tranſuerſum prolapsa eſt pituita quæ facit dolorem, nec exitum habet in aluum alterutram; hæc conuerſa per venas ad veſicam pituita; malum exoluitur. Eſt igitur huius prognôſeos hic epilogiſmus. Ea demum ſalutaris vacuatio eſt, quæ incidit in hydropem; qua & morbiſicus humor, atque vt decet, quemadmodum, quâ, & quantum, & quando necesse eſt, vacuatur. Huiusmodi eſt aquoſa diarrhœa, cruditatis expers, quæ prorumpit circa hydropis initia. Sed huius prognôſeos veritatem oſtender qui ſequitur analogiſmus. Eſt autem huiusmodi.

IAM VERO] Ac ſi diceret: patefacta omni cauſa hydropis, omnique ſymptomate quod incidit per epigenefin; perſpectis etiam ſignis fatalibus ad interitum; ſequitur vt dicam de criſi qua quidam hydropici periculo defunguntur.

6. Epid. part. 3.

lib. πρὶ 1910
ἐπ' αὐτῇ.

INEUNTE HYDROPE] i. Circa hydropis initia, cum adhuc validæ ſunt vires ægroti, quarum ope tanta contentio eſt naturæ, vt miraculo apponi ſoleant inſperatæ, & inſuetum per iter, excretiones quas ipſa molitur & perficit. Ac tum ineunte hydropæ, nondum in corruptionem adductis viſceribus à vitio & putredine aquarum iam pridem in aluo ſtagnantium. Quod certè cum ita eſt, fruſtra ſuſcipitur aquarum vacuatio, tam ſponte ſua, quàm noſtra: quod dicere ſoler præceptor αὐτὴ μάλιστα, & παρὰ μέτρον. Propterea illud edictum eſt dictatoris. Τὸ δὲ παρὰ μέτρον σημαίνει τὸ μέτρον, i. aquoſos citò ſecare. Nam vbi locus eſt ſectioni ad vacuationem aquarum: ibi ſalutaris eſt etiam, quæ ſua ſponte incidit, aquoſa diarrhœa cruditatis expers; neque aliter ſit hydropici commo-
do: quoniam fruſtra emittitur aqua quæ vitariſ viſceribus, ſubinde enaſcitur; niſi fortè geminata corruptio in metu ſit, niſi aqua emittitur quæ contra naturam ibi ſubſiſtit, quæque nocet hepatis, & œconomiam labefactat partium nutritiarum, mox autem ſpirabilem. Id metuens bonus medendi artifex atque magiſter Hippocrates, crebrò dabat operam purgationi, ſurſum, deorſum, vt viſum erat. Ac ſurſum quidem, elleboro: deorſum autem, cneoro, ſextis quibusque diebus: hippophais ſucco, octanis: grano cnidio, decimis. Nec verò illa pharmaca eò dabat, quòd ſperaret, emiſſo humore, ſanari poſſe hydropem: ſed vt aquarum vitaret incommoda, quæ ibi ſubſiſtunt, & ſtagnando putreſcunt: tum vt emiſſus humor, medicinæ locum faceret quam intrus inſuſus impedit. Eò etiam porui dabat vinum Mendæum album, quod erat ſuauiſſimum atque pauciſſimum. Quòd ſi ſua ſponte alius ferretur liquidis excrementis, vinum dabat auſterum. Et ſi purgando nihil proficeret, pyroticis eſcharoticis, & ferro, qua data porta, humori vacuando exitum foras moliebat. Atque hæc omnia remediorum genera, ſuo quæque loco & ordine, circa initia præcipit adhibenda, iis verbis. Ταῦτα δὲ κατ' ἀρχὰς ποιεῖν τὸ νόσημα.

SI AQUOSA INCIDIT DIARRHŒA] i. Alui profluuium quod continenter ſit liquidis excrementis, idque ſine vlla ciborum cruditate, quam fundit lienteria: tum ſine cruenta deiectione, quam exprimit

quam exprimit dysenteria. Sic enim posita sunt differentia illorum trium profusiorum alui. Diarrhoeam autem vult esse aquosam, ut secus ab ea sit hydropico, quam ab illa nuper praedicta, hydropis toto genere symptomatica, quae dolorificum malum foras non edit: sed intus inclusum esse testatur. Est autem chylifera, quae nec pratumidum ventrem adaequat, nec ipsos lumborum & ilium dolores exoluit. Ex aquosa igitur diarrhoea secus est planè hydropico quam ab illa praedicta: quoniam ex aquosa tam bene est illi, quam ex chylifera malè. Est autem bene: quia dolorificum malum foras exit; ac vacuatur id quod vacuari potest. Hinc tumidus venter subsidit; dolor sedatur; medicinae locus est ad viscerum quam impediēbat aqua intus inclusa. Tum verò non est in metu ampliùs noxa praegravandis quam partibus inferunt aquae stagnantes: nec verendum ampliùs de translatione sursum aquarum, quae nullifera esse solet, atque mortifera. Denique haec diarrhoea, omnium commodorum proveniunt beat hydropicum, ipsa per se, modò fugax nō sit illa beatitas, ut mox dicetur. Iam verò quemadmodum incidat haec diarrhoea planè insperata, & insuetum per iter, ne verbum quidem Galenus. Mea autem sic ratio est; humorem cieri & attrahi per venas quae attrahendi potentia carnes ipsas praecedunt, denuo in omentum, & inde in lienem, unde per splenica vasa *παροχέται* habet in mesenterica, & inde profuit ad intestina. Sed haec sunt κατ' ἐξιν. Quòd si ad eam vim attrahendi, quae tributa est venis, & partibus, conspiratio quoque accedat κατ' ὅσον, i. ab impulsu naturae studentis expellere quod ipsam malè habet periculosè, multumque lacessit; hic sanè vlturpandum vetus illud Hippocratis. *Δυσὶν μεγάλῳι, μέγιστα καὶ τὰ ἐκτοῦ αἵματος.* i. Postius magnis duobus, oriunda quoque sunt magna. Atque in ciendo & propellendo, tanta vis lucet naturae oppressae, ut saepe viam inueniat quae ducitur ad vacationem cuiusque humoris morbifici: quamvis & ipse crassior sit, & meatus angustiores: modò validae sint eius vires ad fortem in expellendo contentionem. Ac super his fuit illud Galeni iudicium, non dubitasse Hippocratem scribere, naturam moliri abscessus per ossa; hydropicorum aquas confluere ad intestina; empyicorum pus rupta vomica, in thoracem effusum, per anacatharsin expurgari. Abscessus & vacationes edi κατ' ἔξιν, bene, in nulla meatuum evidētia: αἰσπάλιν verò, malè. Quoniam maior vis est in contentione forti naturae, quam in meatibus.

1. Epid. part. 2.

Coac. 2. huius cap.

comment. ad
aph. 29. 7. &
25. 6.
lib. 1. πτελ
victur.

2. Epid. part. 1.

comment. ad
aph. 52. 7.

CRUDITATIS EXPERTS] Quae cernitur in oxyregmia, & excrementis, quae tum ex aluo, tum è venis ducuntur. Ex aluo quidem, lientericis; quorum praepropera excretio, vel à catarrhi prolapsu in aluum, vel à coctione frustrata, cuius frustratio est ab intemperie frigida firmiter fixa in aluo: ne intem taceam aphthas quae inferunt lienteriam. Sed cruda est etiam diarrhoea chylifera quam nuper attigimus. E venis autem fluunt urinae quarum apparet cruditas in colore, liquore, & hypostasi. Huiusmodi sunt, *ἕλα κηλὶ, ἄχρῳ, ὑδατώδεα, ἀκατάστατα, καὶ ἀνυπόστατα.* i. Urinae tenues, decolores, non residentes, nec vlla hypostasi praeditae. Sed ea cruditas alui, nunquam ipsa per se consistit quin accessionem habeat vinarum crudarum. Vetus est illud. *Ἡ κακὴς τὰς κύστες, ἢ ὅτι ὅλον συνέχουσιν, καὶ ἢ ὅτι ἀγρίαν ἀκαταστασίαν.* i. Alui segnicies, omentum confusio, vasorumque impuritas. Tamen si reperio, alui cruditatem vitari praegressam etiam summa illius causa: ut prorupta nimium haemorrhagia, dum manet coctio vinarum. Quae de re illud praecceptum est dictatoris. *Οἷον αἰμὴν ῥαγιά πλείους παρὰ χρῆστος χρόνος, καὶ ἰαὶ ποτρεύονται, ὡς μὴ τὰ ἕλα πτωχῇ.* i. Quibus saepe et multum profuit sanguis; malefica sunt alui, modò coctae non sint urinae. Ποτρεύεται autem hic ait, quod alibi scripsit in hanc sententiam, καὶ συρραίνεσθαι. Ergo diarrhoea hydropici sit aquosa, & vacua cruditatis: ut scilicet, cum proruptis aquis cessarit profusum, quod *ὀληρῆμα* esse decet, i. paucorum dierum, alius ducatur faecibus figuratis & mollibus: urinae autem fundantur, quales debent esse pro vitae instituto, vinique, quo vitur, mutatione in copia & qualitate. Ex quibus efficitur, hydropem hic poni cuius natura & *ὑπερῆς* in aquarum collectione, non in perennitate consistit; & cuius curatio atque sanatio, solam desiderat vacationem aquarum. Nam caeterorum hydropum qui vel ab hepate, vel ab ilibus ortum habet, nullae urinae sunt cruditatis expertes. Ac deiectiones posita sunt contra naturam.

part. 1. sc. 3.
6. Epid.proth. 42.
3. 1.
aph. 27. 4.Coac. 1. huius
cap. ex 1.
proth.Coac. 2. & 3.
huius cap.lib. 2. proth.
& Coac. 1.
huius cap.

MORBVM EXOLVIT] Quòd eius hydropis conditio sit qualis descripta est in prorrhethico, cum integritate partium nutritiarum & spirabilium: & in quo hydropici qualitas & excrementa, nullam aut exiguam è norma sua naturali egressionem ostendunt. Et talium, ut iam dixi, curatio in vacatione sola versatur aquarum replentium, quando earum perennitas nulla est. Diarrhoea autem descripta sufficit vacuandis aquis, quarum simplex collectio est in amplitudine alui, sine vlla viscerum offensione.

9 Τοῖσι ξηροῖσιν ὑδρωπώδεσι παροσημαῖνοισι, σφόδρῳ πρὸς τὸ λεπτόν ἐμπύκνωτες· κεκόν.

Denunciato iam sicco hydropem, si tormina sint circa tenue, ingens malum.

TERRIFICA sunt illa symptomata, & cum periculo permolesta, quae nec vale dicunt, & continenter accrescunt. Enimvero dolorifica hydropis mala, quae vel sponte non exiunt, nec medicinae concedunt; mortifera sunt: ac multò magis, quando eorum perennis accretio est. Talis maleficientia est hydropis quem auctor posuit in hac prognosi.

DENUNCIATO IAM SICCO HYDROPE] Qui est eiusmodi, aut propria specie & idea, qualem esse diximus *πυκνίαν*, quem siccum Hippocrates nominavit; aut qui nihil concedit de suo; nec

vlla ex eo deducitur portio causæ hydropicæ, nec ipsius symptomatis; tum propter peritonæi tunica densitatem, per quam nihil expirat spiritus flatulenti; tum propter peristalticæ intestinorum virtutis infirmitatem, vel etiam depravationem, vnde fit ἡ αἰὼς εἰλησις, ac tensio maior, cuius quidem laxitas non est sperabilis, denegato quaquaversum exitu spiritui flatulento. Denunciatur autem siccus hydrops in specie & idea, cui similitudo vtrius intenti, nomen dedit hydrōpis: *πυμπνίας* autem dicitur, quia, similiter videtur tympanum, sonitum edit, pulsato intrā spiritu, quando circumtensa vel intenta nimium pellis alni colliditur. De natura huius hydrōpis, multa iam diximus, tum in historia de hydrope, tum ad prognosin illam; *In sicco hydrōpe stranguria prava est.*

Coac. 1. & 4.
huius cap.

SI TORMINA SINT CIRCA TENVE] Quæ ipsum torquant sævi doloris cruciati, ab intemperie firmiter fixa tenuium intestinorum, cuius quidem vitio sævi dolores illic exorti, nulla medici ope quiescunt: tum propter causæ morbificæ contumaciam, tum propter perennem statuum accretionem: labefactata etiam vi peristaltica intestinorum, vnde flatulenti spiritus exitu prohibentur. Quæ de re aliās.

INGENS MALVM] Quoniam dolorificæ tensionis laxamentum comparari non potest, neque sperari dum manet vitium insanabile tenuium intestinorum, cuiusmodi est firmiter fixa, & velut hædica intemperies quam negat Hippocrates posse reduci ad pristinum statum, & eius ἐπιστάσις frustra tentari novando atque vacuando. Quæ duo sunt remediorum genera quibus omnes morbi sanabiles curationem recipiunt. Super hac re, nota est sententia præceptoris.

10 Τὰ δὲ ὑδρωπικῶν ἐπιληπτικὰ ὀλέθρια.

Quæ ex hydropicis veniunt epilepsia; mortifera.

H V I V S prognoscos philologia & philosophia continetur in commentario nostro ad quintam huius tractatus.

11 Ὑδρῶς πρὸς δεξαπείλῳ ἐνδιδούς, καὶ παλινδρομέων ἀνέλπιστος.

Hydrops qui medicina concedit, ac reuenit; desperatus.

E O R V M symptomatum frustra tentatur leuatio, quorum inexhausta manet perennitas. Quod cum in aliis locum habet, tum verò in hydrōpe cuius insanabilis causa est: proptereaque subinde resuscitur simulatque impeditio nulla est quin renascatur, cum scilicet finis est medicandi. Ad medicandum inuitat ventris repletio atque distentio dolorifica; metus noxarum hepatis, omniumque partium nutritiarum; suspecta sursum translatio ad superiorem ventrem, tussifera atque mortifera: tum vi medicinæ sit locus quam impedit symptoma ipsum hydrōpicum. Medicandi ratio suscipitur atque perficitur, idque circa initia cuiusque hydrōpis, in leucophlegmaria quidem primum, sanguinis detractione; in cæteris verò, catharticis, diureticis, compunctione, *δεξαπείλῳ* Græci vocant, & iis quæ prosunt novando ad oppugnationem causæ morbificæ. Bene res eunt cum ea curatione, in perpetuum venter subsidit, pristinumque suum recipit *κατάρσιον*: tum quiescit omne symptoma hydrōpicum, & restituta est omnis œconomia, vitæ custos, tum spiritus, tum nutritus. Talem hydrōpis formā ille modò exhibuit quem sua sponte sanat aquosa superueniēs diarrhœa, cruditaris expers & vacua. Secus fit in eo hydrope quem author posuit in hac prognosi.

Coac. 8. huius cap.

HYDROPS QUI MEDICINÆ CONCEDIT] i. Cuius intentum abdomen, novando & vacuando subsidit, vnde hydrōpici magna leuatio, & alacritas quoque incredibilis.

Coac. 26. cap. 16. 2.

A C R E V E N I T] Non recurrendo quidem, vt dictum est suprā de abscessibus qui à peripneumonia in crure oborti, cursum eò reflectunt, velut postliminio, vnde prius venerunt; quod propriè est *παλινδρομέων*: sed renascendo, vt febrium recidiuæ, quarum scilicet exactarum τὰ ἐγκαταμπαρόμενα, μετὰ κρῖσις ὑποσφοδάδα. Sunt autem τὰ ἐγκαταμπαρόμενα, i. reliquiae febrium, superstes ipsarum materia, & empyreuma, vnde solent renasci. Huius autem hydrōpis, qui renascendo reuenit, τὰ ἐγκαταμπαρόμενα sunt, hepatis ἀπνία, marasmus retorridus, atque scirrhus; extinctio item caloris sanguifici: denique causa omnis alienatæ virtutis sanguificæ, vel impeditæ functionis hepaticæ. Est enim consentaneum, vt si causa quævis hydropifica hydrōpem genuerit, dum vires valerent; nunc, iis afflictis, maiorem vim habeat procreandi: maxime verò cum impeditio nulla sit.

D E S P E R A T V S] i. Desperatam salutem ostendit eius qui seruari non potest: quoniam & insanabilis causa est quæ accrescit; & symptoma ipsum, corruptione partium nutritiarum, & μεταστάσις sursum ad thoracem, mortiferum. Nec verò amplius curandi necessitas parem habet commoditatem, vt antea; nec medicinæ locus est: quia fractæ sunt vires.

12 Τοῖσιν ὑδρωπικῶσι καὶ φλέβας, ἐς κοιλίην ραγέντος ἔνδατος λύσις.

Qui secundum venas hydropici sunt; prorupta in alui aqua sanatur.

E A D E M

10

20

30

40

DE DYSENTERIA.

50

1

quem exhibet dysenteria. Sunt enim symptomata hæc maximam partem hepatica, vel hepatis ex-
 ff iiii

quamvis & ipsa ex aliarum quoque partium vitis enascantur. Sed post historiam hepatitis, atque hydropsis, doctrinae institutus ordo, dysenteriae explicationem loco à nobis requirit.

Dysenteriaz nomen communi voce ad vitia pertinet intestinorum. Propterea Celsus, dictionis accipio, ut esse solet nimius verborum auceps, *τὴν δυσεντερίαν* Latinè vertit, *tormina intestinorum*. Tum intestina intus exulcerari dicit, & ex his cruorem manare. Sed tormina siue tormenta, propriè sunt intestini sursum reuulsi, cuius affectio crudelissima, *σφοδρὸς καὶ εἰλεὸς* nominatur. Hic dolorificum malum foras non exit, ut in dysenteria. Et quamvis in crueta deiectione, posita sit ipsa dysenteria: non tamen efficitur, ipsam manare semper ab vlere intestini. Nam duplex hepatica dysenteria, quarum altera verè cruenta est, nihil habet eiusmodi. Dysenteriaz profecto natura, his verbis expressa legitur apud Galenum, ex mente Hippocratis. Προσέριπται ἡ ἡμῶν ἐν πῶς περ εἶναι, ἡ γὰρ περὶ τὰ τοιαῦτα νοσήματα, ἃ καὶ περὶ τῶν αἰμάτων εἰς τὴν γαστέρα σφίγγοντων πᾶς μὲν δυσεντερίας δηλοῖται, μετὰ τὸ διαχωρηματῶν αἷμα πικρὸν καὶ ἐν ὑδατοῦ ἐστὶν ἡγεμένον. i. *Diffusum est à nobis ansea, huiusmodi morbos nasci* (loquitur autem de dysenteria, hienteria, diarrhoea, teneismo) *confluentibus excrementis in aluum*. Ac dysenterias quidem, cum sanguineis deiectionibus, quocunque illa modo exorta sunt. Ergo non vna est tantum ratio dysenteriaz, quam in exulceratione positam esse dixerunt. Quinetiam idem Galenus author est; Hippocratem consuevisse, nomen dysenteriaz non solum ad intestini vlcus referre: sed ad cruentam excretionem quæ per intestina deiecitur. Ergo nec semper tormentum est intestini, nec semper vlcus, dysenteriaz causa morbifica, ut Celso placuisse video, cuius ego latinitatem magis amplector, quàm ipsius scientiam medicinæ. Igitur, ut paucis complectar, ac dicam quod sentio; Dysenteria, omnis cruenta egestio est per intestina, vndecunque illa egeritur.

Dixi ex Galeno, duce Hippocrate, quocunque illa modo, & vndeunque egeritur: quoniam egestionis illius cruentæ, propter eamque dysentericæ, multæ sunt causæ, multiplex item ratio atque modus. Causæ sunt, hepatis *ἀσθία*, vacuatio periodica, & expressio symptomatica; quorum egestio, sine vlcere fit intestini cum primùm egeritur. Exulceratio est intestini, cum *ἀπὸ τοῦ σπλινος καὶ τῆς χολῆς*, i. *abrado et exasperando*, molesta sunt quæ illuc confluunt, & illac effluunt excrementa. Qualia esse solent colligamenta febrium tabificarum; excrementa critica febrium acutarum; dysenterica splenicorum: postremo eorum qui *ἀπὸ τῆς πυλιδος καὶ ἀπὸ τοῦ σπλινος*, i. *sponse sua et sine ulla prauidentia*, dysentericæ morbo explicantur, quam vel bilis flaua, vel atra, vel etiam pituita putris & salsa excitauit. Dicendum de singulis, vt, ex earum perspicientia, conuenienter & appositè remedia præscribantur, nec dysenterici mala incurant in hac prognosi descripta, quæ mala curatio inferre solet.

Prima egestio cruentæ, propterea quæ dysentericæ, causa est; hepatitis *ἀνία*, de qua nuper diximus in hepate. Cernitur autem dysenteria hæc in proluuiæ rubra ventris, quam vocat præceptor *ἐκφυγνὴ δειπνιστῆ*. Egerendi ratio facilis est, sine morfu, ac tormine intestini, nec consolationem exigit clysteris à lacte; donec adultior facta, cœperit esse nigra, & intestinis molesta. Pugnandum iis remediis quæ confirmando hepatis suam dicantur operam, tam intrâ, quàm extrinsecus. Ac sæpenumero frustra pugnatur, & irrita est oppugnatio, cum hepatitis verus est causa, & ipsa quoque in vetustatem incidit. Altera dysentericæ causa est, hepatitis *εὐπρία*, cuius virtute sanguis prorumpit ad intestina, quod scripsit Hippocrates, *λαύρως καὶ ἰσχυρῶς*, i. fortiter & liberaliter. Ac salutaris est illa dysenteria & periodica puri sanguinis, vnde κατ' ἐξοχὴν dicitur *αἱματώδης*, vel *αἱματηρή*. Talis est verna dysenteria ephæborum & iuuenum, si forte careant hæmorrhagiæ commodis à 18. ad 35. annum, quibus ætatibus naturaliter fluit sanguis à natis; iuxta verus illud receptum. *Ὅταν ἀφροδισιάζῃς ὀφθαλμοῖς, ἢ πρᾶξι, αἱμορραγῶναι*. i. Cum cœperint agnosce-
re venerem, vel asperam vocem edere; sanguinem illi profundum è naribus. Vere autem sanguis augetur, *ὥς-
τε οὐ μόνον, καὶ οὐκ ἀνιμμελεῖν*, i. tum ab imbribus, tum à cælo calidiore. Talis est dysenteria eorum qui, ad
curationem cruris perfracti, sic parte saucia collocantur, vt semper sit *διὰ πόρον*, dum curantur. Quæ col-
locatio vt bona est dum phlegmone est in metu: sic eo sublato, vitiosa. Tunc enim debet esse *κατὰ πόρον*.
Talis eorum est etiam qui altero crure sunt mutili, si nullam quotidiani victus partem deduxerint. Sed
cum symptomatica omnis dysenteria morbo accidat, vel hepatitis exoluti, vel intestini exulcerati; quo-
rum symptoma commune est cruenta per aluum egestio: fecus hanc fieri docet Hippocrates, vt naturæ
ipsius merito, non morbi, accidere videatur. In symptomatica dysenteria, vel vlcus est intestini, vel he-
patis *ἀρρώστια*. In hac verò, vlceris nulla suspicio: cernitur autem hepatitis *εὐπρία*, & fortis naturæ conten-
tio. Sic enim scripsit præceptor. *Ὁρμάται μὲν λαύρως, καὶ ἰσχυρῶς· ἀπὸρ, ὅτε πολὺ μέρος γίνεται, ὅτε θανάτωδης. ὅ-
τε μάλ' ἀποστῇ γίνεται, ὅτε διῶς συμφύει κατὰ γῆν*. i. Cietur profusè & fortiter, nec longa est, nec mortifera. Non
enim ciborum fastidiosus sunt, nec video cur hic vacuationi operam dare oporteat. Præter infirmitatem hepatis vel
ἀπώγια quæ rubram edit proluuium, alia quoque cernitur à visceris oppressionē. Hic longa est dysente-
ria *αἱματώδης*: quia non cietur fortiter, nec liberaliter. Ibi tum vacuationi locus est, per sanguinis detra-
ctionem, quæ multis auxilio fuit ad epidemicam illam dysenteriam quæ in hominum vitam inuasit Lu-
tericæ 1578. Sed satis iam de dysenteria merè cruenta & impermixta, quam triplicem esse diximus.

Nunc de intestinali, quam scilicet vlcus exprimit intestini. Hæc sanè symptoma est semper ipsius rheumatis consistentis: sæpe etiam concitati, *συνιστάμενον καὶ ὀρμώμενον* Græci vocant. Sed huius tamen nō raro, per eam fit crisis. Rheumate quidem consistente exulceratio est intestini, eaque vel nuda & simplex, vel cum putredine quadam coniuncta quam veteres medici, communi voce, *ρῆξις* dixerunt. Vtræque exulceratio ferè naturam sequitur & qualiter rheumatis concitati. Planum id faciet singularum causarum examen, quarum catalogum iam recensuimus. Ac primùm rheumata concitata quæ vlcus faciunt intestini, sunt colliquamenta febrium tabificarum, qualia fuisse narrat Hippocrates dysenterica illa febrium tritæphyarum, quibus iamdudum, cum sævis doloribus & colliquatione multa impliciti erant Thasij. Hic non est dubium quin exulceratio illa *ρῆξις* habuerit ex maligna putredine. Quæ causa est cur

1. Epid. part. 2

aph. 48.6.

27b-43.6.

lib. 1. 1. 1. 1.

aph.19.34

lib.2.149

11b. 1. 1962

1. **1000**

1578.

1538.

Lib. 1. Epist.

lib. 4172

— **சாத்திரம்**

¹ *Ibidem*.

1. Part 1.5. Exams

Galadaphn.

26-4
hh:prop

1

aph.36.4v

2ph.21.4v

→ aph.22.4.

APL 24-41

carcinomatis ulcerati, quod cum extrinsecus insanabile est, multo magis intrā, desperationem ostendit sanationis: tum quia nec vlla est eius redintegratio sperabilis in tam maligno ulcere quod nullum habet fundamentum *ἐπὶ καὶ ἐν τῷ σώματι*: tum quia non est medendi commoditas: tum quia illud carcinoma, perpetuo excrementorū appulsu, fordescit & proritat. Tertia restat causa dysentericæ aluinæ quam in pituitæ puris appulsu & adhesionē positam esse diximus, vt cæterorum humorum exulcerantium. Sic enim visum est philosophari duce Hippocrate, qui, vt Galenus author est, eandem statuit causam *lib. 4. cap. 3.* ulceratū pulmonis & intestini. Verba Galeni hæc sunt. *Humoris prauī ē capite in fauces affluxu, quod in pulmonem prolapsū est, affectionem phthisicam excitauit: quod verò in ventrem delatum est, deorsum subeundo cum morfu, perturbationem cieuit ipsius.* Sed quid authorem Galenum appello? Ipse Hippocrates author est, eundem esse fontem phthisicos atque torminum alui. Huius pituitæ prouentu onustum est caput in tempestate austriua quæ pluuias exhibet. Exprimatur autem modò ad superum ventrem, modò ad inferum, vel ad vitrumque; cum eam tempestatem iam diu regnantem excipit aquilonia. Quæ ratio causæ morbosicæ symptomatumque inde nascentium, auris scripta literis à præceptore, sic legitur apud Celsum. *Si verò austri pluuiæque hyemem occuparunt, ver. autem frigidum & siccum est (& aquilonium) grauide quidem fæmina quibus tum parius adest, abortu periclitantur: hæc verò quæ gignunt, imbecillos virque vnalescunt. Cæteros dysenteria & lippiundo arida: & si seniores sunt, grauedines atque destillationes male habent.* Hic Celsus ex Hippocrate aurum colligere nesciuit: sed pro eo thesauro nobis carbonēs exhibuit. Otiosum est in ea versione versari. Sed alius erit explicandi locus. Ad institutum reuertor, & aduocabo Galenum qui super dysenteria è tempestatibus illis enata, tam bene scripsit, vt alibi nusquam melius scripsisse videatur. *Qua in tempestate prædicta ortum habuit pituita, ob calidiorem hyemem salsa erit; propterea quæ gignendis dysenteris accommodata, postquam illa diu multumque mordendo & abradendo vitiauerit intestina, visore quæ propter lentorem in sinuosis intestinis subsistit, atque quodammodo stabalatur, ac pigro lapsu meat. Quò fit vt continenter acri sua qualitate abradendo exulceret, ac dysenteriam edat cum egestione cruenta.* Hactenus de natura & causis dysentericæ. Nunc ad examen institutæ prognoseos accedamus.

DYSENTERIA] i. Cruenta egestio, tum hepatica, tum aluina. Nam symptomatica omnis dysenteria, morbo accidit, vel hepatis exoluti, vel intestini exulcerati. Sic enim Galenus. *Νόσημα μὲν αὐτὸ ἐστὶν ἢ τῆς ἡπατὸς ἀρρώστιας, καὶ ἢ τῆς ἐντέρας ἰκκώσεως: καὶ τὸ δὲ σύμπτωμα ἐστὶν ἢ διὰ τῆς ἡπατὸς ἰκκώσεως αἱματώδης.* i. Morbus est tam hepatis imbecillitas, quàm intestinorum exulceratio: eorum porro symptoma commune est excretio per sedem cruenta. Excipio deiectionem cruentam *αἱματωπὴν*, quæ est eiusmodi vt cum ipsius cruoris deiectioni nomine, dysenteria sit atque dicatur: tamen naturæ fortis merito, non morbi vitio, accidere videatur. Ac similiter quidem ipsa sit, vt hæmorrhoides, hoc solum differens; quòd hæmorrhoides fluant aperta vena in ano: dysenteria verò, κατ' ἐξοχὴν dicta *αἱματωπὴ* vel *αἱματώδης*, αἰσχροπύον habeat in anfractibus vel inuolacris intestinorum. Ergo. **DYSENTERIA**] Tam hepatica, quàm aluina: quocumque illa modo incidit.

QUÆ INTEMPESTIVE SISTITUR] i. Cuius *τὸ πρόμα ὀρμητικόν*, i. fluxio concitata, exitu prohibetur per intestina & sedem, quæ exire solebat, & quidem priusquam vacationi & deriuationi operam dederit, ac neoterismo. Quæ curandi ratio sic tradita est à præceptore. *Si quem dysenteria tu occupauit, huic toto venire dolor est atque tormentum, ac bilem, pituitam, & sanguinem ipsis permixtum egreditur. Huic purgato capite, pharmacum dato potui, quod pituitam sursum expurget (vt faciundum præcepit in illo. Εμβολίζον δὲ καὶ οἷς διὰ τοῦ κεφαλῆς ἐκέρται πρόμα.* i. Elleboro purgandi sunt, quibus est à capite defluxus.) Tum postquam aluum lacte cocto prolueris, reliquum corpus, vt decet, curato: ac si quidem febre careat, opimis, pinguibus, dulcibus atque humidis, continenter inutilia & incommoda ex aluo subducito: tum calida multa quæ infra sunt umbilicum partes foueto, si dolor adsit. Potiones autem, sorbitiones & cibos conuenienter exhibere oportet sicut præscriptū est in pharmacitide. Hic sanè morbus accidit cum pituita & bilis affixa sunt ad venas alui, & ad ipsam quoque aluum. Hic vitiatur sanguis & corruptus egeritur. Vitiatum etiam intestinum quod abraditur & ulceratur. Atque hic morbus est longus, & saeuus, ac sæpe mortiferus. Verum si firmo adhuc corpore, validisque viribus adhibita fuerit medicina, spes quidem est euadendi. Sin autem consumpto iam corpore, & aluo in totum exesa, remedia præscribantur; hic nulla salus vitæ sperabilis. Sistitur autem potissimum, vt cætera omittam styptica, imperio mulierum aulicarum, & medicorum ipsis morem gerentium improbitate & imperitia; pastillis terræ Lemniæ, quam Turcus dicitur dono Regi misisse, vt maior autoritas ei remedio comparatur.

ABSCESSVM FACIT] i. Dysenterici humoris *ἀποθήκη*, i. decubitus, per *μετέσταν*, i. translationem rheumatis quod primū ciebatur ad intestina. Translario autem fit, cum vel interclusā viā humor se aliò recipit illuc effusus; vel aliò idem retrahitur atque refuit, per quandam palindromen qua eò reuertitur vnde primū cietur. In hac *μετέσταν*, nunquam bene est dysenterico. Sed bene est in deriuatione per diuretica, & vomitu, sponte vel arte prorupto.

VEL IN LATERIBVS ATQVE VISCERIBVS] Vt per eam *μετέσταν*, pleuritidem exciet, vel peripneumoniam, vel hepatis phlegmonem: non secus ac si resfluerent hæmorrhoides à longo asper fluxu, quæ ex eo refluxu hydropem gignunt vel phthisin.

VEL IN ARTICVLIS] Similiter vt colici sunt arthritici, conuerfa colica in arthritidem. Sic enim visum est præceptori cum ait. *Ἐπὶ τῇ ἐντέρῃ ἐστὶν δόξα, ἀρθριτικὸς ἐστὶν, καὶ ποικίλος. ἐπὶ δὲ τῇ ἐντέρῃ ἐστὶν ποικίλος.* i. Cui dextra situm intestinum dolebat; oborto articulari morbo, fuit quiescit: sed eo quiescente, rursum inde fuit afflictior. Vetus opinio est, talem esse *μετέσταν* vel *μετέσταν* crudelem ipsius dysentericæ. Solenne illud est quod ea de re alibi scripsit præceptor, vnde magistri Scholæ Coz, institutam prognosin huc transtulerunt. *Δυστερεινὸν δὲ σπένημα, ἢ ἐπαρμὰ ἢ παυσματὶν πῖσις: καὶ μὴ ἐς πυρετὸς, & ἰσχυρὰ καὶ ἐξ παλίας & νεωτέρας πενιχίας, ἢ ἐς κροτὸν, ἢ ἐς ὄρχη, ἢ ἐς σκέλεα δὴν μαται, ἢ ἐς ἰσχυρὸν ὀδυνη σπένει.* i. Dysenteria quæ cessauit, abscessum faciet, vel tumorem: nisi dolor abeat & obfirmetur vel in febres, vel in sudores, vel in vrinas crassas & albas, vel in va-

vel in varices, vel in scrotum, vel in crurum dolores, vel ad ischium quoque ipsum.

AN VERO BILIOSA IN ARTICVLIS? CRUENTA IN LATERIBVS ET VISCERIBVS:] Ac si diceret. Virū dysenteria aluina quæ ex ulceratione alui consistit, quam facit humor segregatus à concretionem sanguinis, ut est bilis flava quæ relictis intestinis, ad articulos cursum inflexit; dolores excitat articulorum? Cruenta verò, i. *αἱματώδης*, refluit primū eò vnde venit, i. ad hepar, indeq; excurrit ad latera, & ad pulmones? Animaduertet autem studiosus, in hac quæstione positam esse discessionem vtriusque dysenteriz; videlicet hepaticæ, quæ ipsa per se cruenta est; & aluinz, cuius deiectione cruentata, causam habet exulcerationem intestini quam facit bilis flava, aut pituita putris. Ac per dysenteriam biliosam notauit cætera quæ, similiter ut illa, fiunt in aluo. Sed transitus ratio fit dysenteriz in arthritidem; aut per derivationem humoris à fonte vnde manabat à rheumate concitato; aut per *μετέωρον* rheumatis consistentis, ab intestino ad lumbos; vnde facilis est abscessus, vel ad crura, vel ad varices. Ut enim lumborum phymata, dysenterica sunt, vel etiam varicosa: sic aluina dysenteria, primū exorta; dolorum lumbarium, & inde articularium proleteria esse solet. Est enim lumborum & intestinorum facilis sympathia, & *συμπάθεια*.

2 Δυσεντερικοῖσιν ἐμέλιος χολώδης ἐν δὲ χειρὶ κακόν.

Dysentericis vomitio biliosa initio; graue malum.

20

EA DEMVM in malis ducenda sunt, quæ olim profutura, nocent quando apparent & fiunt. *Critica sine crisi; alia quidē mortifera sunt; alia verò sinistra crisis.* Et. Τὰ ἀσπεκνύμενα ἢ αἴματος κρῖσις ἢ αἰσθησώδης. ἢ δὲ *μὴ ἀσπείκνεται*. ἤτοι αὐτὸ ἐπὶ δὲ τῶν αἰσθησώδων ἢ μὴ σπασμῶν. i. *Quæ crisin subeunt ante diem, si cruda sit crisis, hinc veniunt recidiva: sin minus, actisia manent.* Fuerit etiam illa crisis funesta, si non parua. Et. *Ὅσα κελαιμα σημεῖα, τὰ αὐτὰ τῶν μὴ γρηγορήσων, δύσκολα.* i. *Quæcumque signa sunt critica, si eadem non sint eiusmodi; sinistra sunt crisis.* Ergo si vomitio biliosa dysenterica veniat sine crisi cuius ministra est, vel potius ipsa effectrix, cum recte fit; aut si ante diem incidat, cum feritate bilis; aut denique, si non sit critica, ut esse debet; vel erit mortifera, aut sinistra iudicij; vel socia & conscia grauissimæ recidivæ: nisi forte superstes maneat actisia. Quemadmodum autem prædictorum malorum origo sit & causa effectrix vomitio biliosa quæ dysentericis accidit circa initia; paucis aperiam.

30

DYSENTERICIS] i. lis quos occupat dysenteria, non quidem *αἱματηρὴ*: sed aluina quæ cruentatas edit egestionem ab ulcere intestini quod pituita putris, vel bilis effera excitauit, dum pigro lapsu glutinosa fertur per intestinorum anfractus, ipsisque abradendo & exasperando sæuissimam infert molestiam.

VOMITIO BILIOSA] Bilis flauæ spumantis & meræ, quam sursum deorsumque incandescens hepar effundit, ac similiter cum dysenteria cietur, ut in cholera cum diarrhœa.

INITIO] Vel circa initia, cum ipsa natura morbificis causis multum opprimatur, nec tum sperabilis vlla crisis, quæ vi naturæ, ac lege critica fit, excernendo: ut ea vomitio, & qualitate ipsa, & tempore, symptomatica sit.

40

GRAVE MALVM] Quia dysentericis nulla inde leuatio est, sed grauiorum malorum accessio: quod nullam exhibeat speciem causæ criticæ qua dolorificum malum foras exit: sed nuncia sit prææ affectionis quæ intrus inclusa est. Omnium enim quæ per *ἐπιπύρεσιν* ad sympathiam adducuntur; nihil est quod primigenij mali leuationem adferat: sed contrā symptomatum grauiorum accessionem. Est igitur biliosa vomitio circa initia dysenteriz, eius amplificatio. Secus dicendum de illa vomitione quam sua sponte natura ciet ad remoram diarrhœæ verustæ. Hæc artificium præbet medico, ad imitationem naturæ comparandum. Eius adiumentum in reuulsione positum est: quemadmodum prædictæ vomitionis biliosæ noxa & calamitas in *ἀνακχυμῶσι*, i. *coëffusione*, per *ἐπιπύρεσιν*, i. *propagationem materiz sursum deorsumque confluentis*.

50

3 Οἷσιν ἐκ δυσεντερείας ὀξείας, ἐς πυώδεια ἤκη· τὸ ὑγρὸν, τὸ ἐφιστάμενον· ἐκλυκόν ἐσται, καὶ πολὺ.

Quibus è dysenteria seu itur ad puriformia; qui superstat humor, multum albus erit, & multus.

BENE RES eunt quando cruditatis mutatio est in pepasimum, & sæui dolores mitescunt. Ergo dysentericis bene est cum è dysenteria seu itur ad puriformia. Cuius pepasini signum est, humoris multum albi, facilis & multa egestio. Positæ autem mutationis, & signi, mea quidem sic ratio est.

QVIBVS E DYSENTERIA SÆVA] Sic enim visum est interpretari illud *ἐξέως*, ut omnis tollatur opinio dysenteriz illius quæ ipsa per se cruenta est, propterea quæ dicitur *αἱματώδης*, quæ ut celebritate cæteras antecellit (est enim *ὀλγήμερος*, i. *exigui temporis*) ob eamque causam videri possit acuta: ta-

men in ea saui dolores non sunt, quorum cruciatu hæc verè acuta est: quamvis diutius ipsum malè habeat quem innasit.

Ergo: QVIBVS E DYSENTERIA SEVA] i. E cruenta egestione quam edit exulceratio intestini nata ex morfu acerrimo pituitæ putris, aut bilis: vnde sæua tormina excitantur cum egestione difficili, crebra, & pauca.

ET VR AD PURIFORMIA] Mirificato rheumate concitato & consistente. Nam pituita pe-
pasmò fit puriformis: ipsa verò bilis, πῶς φλεγματίζεται, i. quodāmodo pituitescit, vt visum est præceptorī. Igi-
tur ab egestione cruenta quæ difficulter, crebrò, & parum egeritur, transitur fit ad puriformem, facilem,
& nihil olentem; virtute caloris natiui, & integritate partium solidarum, quibus materia effera mitifi-
catur, & omnem exuit feritatem: vt iam dominatu & imperio regatur ipsius naturæ, nec amplius ipsi
vim adferat. Secus est in egestione opima, læui, pauca; partim alba, partim subflaua. Hic liquitur adeps
& seum, quorum seuiosa & adiposa egestio, febris ardore liquata; difficilis est, ac fœdi odoris, nec vl-
lum adfert dysenterico adiumentum: sicut hæc puriformis.

QVI SUPERSTAT HUMOR] Υπερσπασμένος, quæ vox Hippocrati familiariter vsurpatur de iis
quæ supernatant in deiectionibus & vrinis. Ac superstat quidem puriformis humor, si aqua in pelui ex-
cipiatur, nec fundum petir, vt spurum funestum phthisici mare conspueutis. Vel superstat etiam puri-
formis egestio, ipsa per se, in stercore.

MVLTVM ALBUS ERIT] Segregatus à concreione & mixtione alieni humoris: non secus
ac tela & cera insolatione albescunt, segregata omni forde, quæ ipsas fucabat. Hæc autem segregatio
virtute perficitur caloris natiui in puriformi egestione quæ multum albescit etiam ab intestino quod
album est, cuius integritate ὁμοιάζει τῇ ἀπὸρροια τῇ ἀποκαμένῃ ἐξ αἵματος, i. effluentia similis est subiectæ substantiæ vn-
de manat.

ET MVLTVS] Qui antè paucus egeretur ab oppressione; nunc multus egeritur liberè, à liber-
tate partium obfessorum quarum redintegratio cernitur in liberali & libera egestione cocti humoris, cui
ius pepasmi arguit copia & albedo.

4 Τὰ δυσεντερικά, ὑπέρυθρα, ἰλυώδη, λεῖρα διαχωρήματα,
ἐπὶ φλογώδεσιν ἔξερυθροῖσι χρώμασι λυόμενα· ἐκμανῶσι.

Deiectiones dysentericæ quæ rubris, limosis, cumulatè ducuntur; si
cum facie rutila et saturo rubore suffusa quiescant; insania est in metu.

HIC SPECIES altera est dysentericæ quam in diarræsi positam esse diximus primæ prognoscos,
vbi quæstio est præceptoris. An dysenteria cruenta intempestinè cohibita, abscessum faciat in lateribus
& visceribus. Enimuero duplex est omnis ratio dysentericæ: vna quidem hepaticæ, altera verò aluinæ.
Sed aluinæ incommoda sunt explicata, & redintegratio quoque ipsa. Nunc de symptomatis dicendum
hepaticæ, de qua iam illud perceptum est; quod ea intempestinè suppressa, tum in lateribus, tum in visce-
ribus exempla edit intempestiuæ suppressionis. Atque inter symptomata eius immeritò subsistentis,
principem locum habet id quod ponitur in hac prognosi. Est autem insania, cuius origo sic est, ac signa
eius mox affuturæ prænuncia.

DEIECTIONES DYSENTERICÆ] Quæ cernuntur in cruenta egestione quam edit πῶς
καὶ πῶς αἵματος, i. copia & vitium sanguinis; vel exulceratio intestini. Sed hic sanguinea tantum attingitur,
vbi sanguis in vitio est; vel nimia abundantia; vel qualitate ipsa.

QVÆ RVBRIS LIMOSIS CVMVLATE DVCVNTVR] Aluo prompta, primum rubro,
mox inde crasso & sæculento sanguine, quem hepatis ἐν πύλινῃ profundit ad intestina, vel laxitas & ἀνία
effundit.

SI CVM FACIE RUTILA] Et scintillantibus oculis non quidem à lumine sibi cōnato, quod
est instrumentum αὐροῦ δέξιν, visificæ facultatis: sed à fulgore aduēticio, ac velut quibusdā marmarigis ob
oculos obuersantibus, à sanguinis appulsi, multa bile perfusi, ad nitentes pellucidāsque oculorum
membranas, cum inflammatione quadam proprii oculorum luminis atque fulgoris; vnde nascuntur
intus & ὀφθαλμοῖς coruscantia.

ET SATVRO RVBORE SVFFVSA] Non eo quidem refluò, vt in iis qui verecundia crube-
scunt: sed firmiter fixo & stabili, quem edit cruenta dysenteria, sursum ad caput reflexa; nec tamen he-
morrhagiæ opinionem facit.

QVIESCANT] Repentè inhibeantur, idque immeritò καὶ ἀβελόγως; vt dictum est in prima pro-
gnosi huius tractatus.

INSANIA EST IN METV] Præsertim si vuluosa sit facies, egregiè colorata; qualem Hippocra-
tes vidit in ea muliere Thasia quam vocat θυγάτηρ, ex bilis atræ infectione, quæ facilem ortum habet ex
sanguinis æstu quo primum incanduit cerebrum, vnde facies egregiè colorata, mox vuluosa & rubra;
quod signum tanti fecit Hippocrates ad omnis dementia præensionem, vt illud instar omnium esse
duxerit. Nota est illa prognos. Egregiè colorata facies & vuluosa; pestiferum: ac tum caperatio frontis
phreniticum. De phreniuidis autem & insanis ortu multa iam scripsimus i. libro.

5 Δυσεντερία σπληνώδεσι μὴ μακρὴ· χυλίσμων μακρὴ δὲ, πονηρόν· λή-
γούσης γὰρ, εἰ ὕδρωπες, ἢ λειεντερίαί γίνονται θανάσιμον.

*Dysenteria lienosis, non longa quidem; utilis: longa verò pestifera.
Nam quiescente illa, si vel hydropes veniant, vel etiam lienterias
mortiferum.*

ERAT ex illis quæ pertinent ad dysenteriam, illud extremum; ut patefactis omnibus, quæ ipsa
infer, symptomatis atque incommodis; si quæ essent illius commoda dicerentur. Eorum commodo-
rum recensio longa non erit. Catalogum finiet vnius commemoratio: eiusque non ita certæ securita-
tis. Est autem dysenteria quam lienosis edunt, quæ ut longa, aut brevis est: ita sinistra aut secuti di iudi-
cij esse solet. Sed antequam instituta prognoscos demonstrationem aggrediar; diorismos adferam
splenicorum, ut intelligatur quibus adiumentum adferat dysenteria quam edit lienis expurgatio duce
narura, vel artificio medici ad imitationem naturæ comparato.

Sanè lienosis non sunt, nec huiusmodi esse dicuntur apud Hippocratem, quos morbi omnes inuadunt
lienis. Nec verò vnde cunq; lien affligitur & malè habetur, eius afflictio lienosum facit eum quem occu-
pat, ut inde propterea nomen habeat lienosis. Non enim lienosum dici eum repèro, cui turgidum est,
durum, ac dolorificum hypochondrium sinistra parte, ab inflammatione systrophica ipsius lienis: quem-
admodum nec hepatici nomen habet is cui pariter similiterque dextrum laborat, hepate inflammato.
Eorum enim viscerum systrophica phlegmonæ, circa initia periculum adferunt citæ mortis mox adfu-
turæ: nisi, hæmorrhagia liberali, periculo defungantur; aut validarum virium beneficio cum eo tu-
more ad vigesimum usque diem perueniant, quo ipsa phlegmone in empyema mutatur. Hic neuter eo-
rum nomen adoptat sibi partis obsessæ; ut alter quidem hepaticus; alter verò splenicus nominetur. Non
Herophonti nomen est lienoso, cui die quinto lien intumuit cum hypochondrij tensione; octavo cœpit
imminui, & in crura tumor abscedit. Inauditum etiam fuit lienosis nomen Philisco, de quo sic narrat

lib. 2. progn.
& in Coac.

hist. 3. 2. Epid.

hist. 1. 2. Epid.

30 præceptor. Σπλὴν ἐν τῇ ᾤσει φερεῖ κύρτωμα, ἢ. Turgidus erat lien tumore rotundo. Ac ne cōplectar omnia quæ
multa sunt apud Hippocratem; comprehendam breui: sic enim statuo cum Galeno; hic lienosos dici
quibus iam pridem viscus ipsum lienis induruit: ut planè stulti sint qui ἀσθενέως eandem lienosis & me-
lancholicis curationem instituunt. Sed multum interest, magnique refert deturne oxymeli splenico, an
melancholico. Illi saluberrimum est: huic nocentissimum. Testis est illa sententia præceptoris. Nigro-
rum fermentatio est ab oxymelite, tum meteorismus et amplificatio. Ergo lienis vetustè orta duricies, lienosos
facit quos occupat. Hæc autè vetusta duricies sic ortum habet, auctore Hippocrate. Quibus magnus est
lien, si quidem biliosi sunt, fædædæ multum apparent, vlcerebusque obsui quæ difficulter sanescunt; tum illis ab ore
fædus expirat odor, atque macrescunt. Lien verò durus percipitur, manetque sui similis in magnitudine, nec cibos de-
ijciunt. Sin autem pituitosi sunt, multo minora sunt ijs prædicta incommoda: tum ipse lien alias atque alias maior aut
minor est. Sed illa vetustas duricie quam esse dixit Galenus πῶς ἀπὸ τῆς χολικῆς σκληροσμεῖται ἔχεται, ἢ. iis quibus

aph. 43. 6.

lib. 3. 2. Epid.
& i. 1.

lib. 2. 2. Epid.

40 longo tempore lien induruit; non debet referri ad statum ipsius duricie quam pridem existit: sed potius ad
ortum eius qui verus est, vnde lienis tumor paulatim assurgit. Talis est illa loquendi forma. Quæ longo
tempore extenuantur corpora, parvè ac diu rescinda: quæ verò breui, breviter, ἢ. paucis diebus. Non enim eò
spectat illud χολικῆς, ut significetur vetustas tumoris qui iam accrevit; sed inveteratio acrescendi: quem-
admodum nec in illo, vetusta est corporis extenuatio, sed ipsa extenuandi causa. Sed illa lienis tensio, indèq;
nata duritas quadruplicè habet formā, quæ sic expressa est à præceptore. Σπλὴν σκληρὸς, ἢ τὸ αἶμα κατὰ τὸν σπλὴ-
να, πλατὺς, παχύς, μακρὸς, λεπτός. ἢ. Lien durus, non sursum; deorsum rotundus, latus, crassus, longus, tenuis. Quod
est eiusmodi ac si diceret. Quotiescunque lien induruit; non est sursum hæc duricies quæ ortum habet
à veteri congestione humoris: quemadmodum illa quam repentina fluxio excitavit, quæ & ipsum lie-
nem facit αἰσχροπύον, & omnia quæ inde moventur αἰσχροπύον, ut hæmorrhagiam, & faciem insigni calore
& colore suffusam. Sed hæc duricies vetustæ congestionis, vnde homines lienosi dicuntur, deorsum
percipitur, estque κατὰ ῥόπον, omniāque inde nata κατὰ ῥόπον, quæ cernuntur in calore & pustulis partium
inferarum, ut pedum, & genuum; cum frigore superarum, ut aurium, narium, & manuum quoque
ipsarum: sicut Galeno visum est emendanti vulgarem scripturam. Ergo hic lien deorsum durefcit, eaque
duricies cum accrevit, rotunda est, aut lata: quarum differentiarum commune est nullam esse lienis ac-
cretionem in longum: quæ tamen accretio, reliquarum duarum communis est, crassæ ac tenuis: ut
scilicet ipsa duricies sit longa & crassa, tenuis item & longa. Quæ cum ita sint, nunc erit facilis demon-
stratio huius prognoscos quæ sic habet.

6. Epid. 2. 2.

50 DYSENTERIA] i. Cruentæ egestio; non quidem hepatica: sed aluina; quam edit exulceratio
intestini, nata ex glutinoso & acri humore qui admodum pigro lapsu extrà fertur per sinuosa intestina,
quibus abradendo & exasperando molestiam exhibet sæui doloris.

LIENOSIS] i. Quibus lien ipse iam pridem cœpit durefcere, ac tandem κατὰ ῥόπον factus est: non
quidem repentino affluxu sanguinis melancholici qui phlegmonem edit systrophicam, ipsumque facit
αἰσχροπύον cum duritate ac sæui doloris cruciatu: sed quibus congesta sensim pituita, aut melancholicus
humor, duritatem attulit tensionis; oborto scilicet lienis tumore rotundo, aut lato, longo & crasso;

itemque tenui atque longo. Quæ omnes differentia sunt in *κατάρτη* liene, per congestionem humoris pituitosi, aut melancholici: quod spectat instituta prognosis.

NON LONGA QUIDEM] Quod in laudē positum dysenteria periodicæ sanguinis redundantis, quæ fit *κατὰ φύσιν* naturæ, i. imperio ac dominatu ipsius, quæque nullam habet *κατάρτην*. Est autem non longa, i. pressa leuiter ad exigui prædicationem temporis, atque fugax: à forti contentione naturæ, in morem morbosum, iam ceptum mitigari, consentim ac celeriter expurgantis. Naturæ autem contentio excitatur cum lien induruit: quia tum oppressa, tum proritata, fit *αδύναμος* *κατὰ φύσιν*, cum sensione ac perceptione tumoris molesti. Antea verò nullum erat studium excernendi, dum virtus excretrix manebat sopita & debilis: quæ causa & occasio lieni fuit, congerendi humorem melancholicum aut pituitum, sine molestia: donec ipsa congestio cumulata, lieni tensionem attulit, indeque duriciem atque tenitatem, ac proinde sensionem suæ molestiæ qua proritatum viscus colligit se ad excernendum humorem morbosum *ἀπὸ τῆς συμπίπτουσας* *κατὰ φύσιν*, per loca lege naturæ commoda, vt explicet se illa molestia. Quæ ratio explicandi concessa est partibus omnibus quæ communi funguntur officio. Intellego autem quod, quæ, & quemadmodum, vt est humoris motus, naturæ impulsus, & partis obsessæ conditio atque situs. Quæ tria expurgandi conuenienter commoda & opportunitates, sunt in liene turgido & *κατάρτη*, per intestina: vnde dysenteria per accidens excitatur.

V. T. I. L. I. S.] Quia inde certissima est securitas, secundam fore valetudinem lienosi quem modò descripsimus; idque tum per se, tum ex euentu. Ac per se quidem: quoniam vacuando atque nouando, redintegrationem adfert lienis, multum è natura egressi, facitque vt ad officium redeat segregandi humorem nigrum à sanguine. Quod non in vltima laude ponendum est naturalis œconomia, naturaliter constituta. Ex euentu autem: quoniam fugax illa dysenteria non infert incommoda, mox dicenda, lienteria vel hydrops.

LONGA VERO] Cuius longinquitas tribuenda est, vel ipsi lieni ab oppressione nimia fatiscenti, non exurgenti contra vim morbi; vel humoris efferi offensionis, cuius exulceratio sæua est in intestino, cum diuturno affluxu lacerantis continenter humoris: cuiusmodi esse dicitur dysenteria quæ à bilis atra duxit initium.

P. E. S. T. I. F. E. R. A.] Signo & causa. Ac signo quidem: quoniam ipsa symptomatica, nata est è symptomate, ac symptomatico motu edita, non vi naturæ: tum autem quia tam sæua dysenteria, & colliquamento vtriusque adipis, & intestino exeso, funesta est. Vt causa autem: successionē mortiferorum symptomatum, lienteria, vel hydrops. Sequitur enim.

N. A. M. C. E. S. S. A. N. T. E. I. L. L. A.] Non quidem redintegrato intestino nimium exulcerato, penèque exeso, nec restituto liene quem dira vis morbi, diu multumque oppressum labefactauit: sed omni sensione sopita, sublato intestini sensu per *κατάρτην* & gangrænam.


S. I. V. E. L. H. Y. D. R. O. P. E. S. V. E. N. I. A. N. T.] Tympanias vel ascites, quorum inde natorum generatio patefacta est in historia de hydropē.

V. E. L. L. I. E. N. T. E. R. I. A.] Cuius natura & causæ mox dicentur in proxima decisione.

M. O. R. T. I. F. E. R. V. M.] Sic enim dixit alibi, *κατὰ φύσιν*: quoniam nulla redintegratio esse potest in magnis symptomatis quæ à pessimis ortum habent; idque cum aliàs, tum si naturæ vires languent effectæ. Hic autem lienteria, ex imbecillitate orta virtutis, ipsam quoque denuo infirmiozem facit. Notum est illud verus Hippocratis. Morborum quicunque alter alteri superuenierit; maximam partem interimit. Nam cum infirmo iam corpore, maleficientia morbi presentis; alter morbus incidit, prius ab imbecillitate moritur, quam morbus nouè adueniens, cursum suum confecerit.

Existit quæstio difficillima, super dysenteria vindicis breuitate, quæ vnicè commendatur. Num semper in vitio longa sit; ac nullam vim habeat vindicandi, grauiorum malorum asserterix. Fuit namque illud iudicium præceptoris, vt dysenteria longa, sit vindex lumbarium gibberum: quando illa gibbera & *κατὰ φύσιν* veniunt à luxante tuberculo. Hippocratis verba hæc sunt. *Ὁδὴν ἔστιν ἡ νόσος, καὶ ἡ δύσεντερια καὶ ἡ γίγνησις γυρομένη*. i. iam pridem constat quod quibusdam, gibberorum lumborum libertatem attulit dysenteria quæ longa est. Ergo dysenteria longa, vindex est lumbarium gibberum à tuberculo enatorum. Hic certè querendi occasio est, cur ea longinquitas non inferat illa incommoda mortifera, lienteria & hydrops, de quibus verendum præcepit in longa dysenteria lienosi. Enimvero phymatis siue tuberculi, coxam, i. lumbos luxantis, & *κατὰ φύσιν*, i. gibberum facientis, causa est sanguis quem mitigari oportet, & in empyema mutari, vt confluat ad intestina, quò nec sua sponte posset appellere, propter crassiciem: nec ab inflammata parte cieri; propter segniciem. Sed empyemate, crassi humores tenuantur, ipsa quoque partium obsessarum natura excitatur ad excretionem humoris molesti. Est autem pepasimus sanguinis, omnium humorum mitissimus. Itaque dysenteria longa est, longo affluxu materiae, cuius ne minimum quidem superesse oportet in phymate, vt luxata vertebra reponatur. Sed ea materia longo affluxu non facit carcinoma in intestino, nec intestini substantiam labefactat, quam superficie tenus tantum abradit; nec verò nutritias partes in mali societatem adducit, vt inde lienteria vel hydrops in metum sit. Longinquitas autem dysenteria, id secum adfert commodi, vt phymatis luxantis materiam vacuando, ipsam quoque luxatam vertebra, è suo ginglymo & symphyli foras egressam, intrò velut fugitiuâ retrahat, per sympathiam mesocæli, nervos lumborum ex quibus constat, in crebra egerendi contentione attrahentis. Secus est in dysenteria lienosi, quæ si à pepasmo veniat pituita à forti contentione lienis exclusa, brevis est atque fugax, nec vlla suæ feritatis impressa relinquit vestigia in intestino. Sin autem melancholici humoris putredine quadam attrabilia excitetur; quò longior, eò peior: quoniam, vt paucis dicam, idem facit quod illa quam excitat bilis atra.

DE LIENTERIA.



ΝΑΛΙΕΝΤΕΡΙΚΟΙΣΙ μὲν σμεῖων ὁ CAP. XLII
 διῶαι, σφόδρ' λυγύμεναι. τὰ δὲ ἀρδρα μετ' ὧραισι
 ἐκ τοῖσιν λεπτα ἔξερυσθαι φλυκταίνουμένα. ἐφιδρώ-
 σαντες οὗτοι διαφορῶσονται, οἷα μετέξιν.

In lientericis cum feris aluinis, qui tormine exoluntur dolores, quæ circa sunt articulos tumefaciunt. Hinc prærubra squamula & bullata, Quinetiam oborta sudatuncula, vubibus rubent obsiti, vt flagris cæsi.

SEQUITUR aluinum symptoma, toto genere symptomaticum, quod nulla ratione criticum esse potest, vt sæpenumero est diarrhœa: non raro etiam dysenteria, vt supra ostendimus. Est autem lienteria, quæ ex infirmitate orta naturæ, ipsam reddit denso infirmiore. Ergo lienteria semper metetur male de iis quos inuasit: quia non effundit quod intus læsurum erat, sed potius profuturum, videlicet quicquid assumptum est, propterea quæ vt causa ipsa, sic etiam spatio periculosa est. Interdum enim ægros trahit: interdum præcipitat.

Cels. cap. 16,
 lib. 4. & 1.
 Epid. part. 2.

Sed eius infirmitatis, vnde lienteria ortum habet, causa omnis priuationem edit primæ coctionis in aluo: idque tum per se, tum ex euentu. Atque natura lientericæ in coctione frustrata consistit: symptoma verò in præpropere egestione *εἰς τὴν ἀμετέωρον*, i. ciborum mutationis penè omnis expertum. Vt non minùs in vizio sit lientericæ morbus atque symptoma, quàm si lægro manus adferret. Est enim perinde adeo vitium rollere, ac vitâ adimere: planèquæ idem est lientericum esse, quod genio defraudari, & fame absumi.

Quemadmodum autem symptoma hydropis edit frustratio *ἀμαρτυρία*: sic lienteriam frustrata chyli operatio, vel ipsa chylis frustrata. Ille symptoma est secundæ coctionis deperditæ: hæc verò primæ. Sicenim Galenus agnoscit in lienteria, *εἰς τὴν τῆς τροφῆς πείρας*: quemadmodum in hydropè, *πρὸς τὴν τῆς ἀμαρτυρίας ἐργου*: vt supra iam demonstratum est. Quamobrem nec *λενιότης* Græcum nomen, nec Latinum, *lenitas intestinorum*, conuenienter & appositè, morbi aut symptomatis naturam animo complectendam proponit. Nec enim lenitas intestinorum, semper est: sed quandoquæ asperitas: nec si esset, symptomatis huius consecutionem adferret. Adfertur autem morbo ventriculi, non intestinorum. Atque vt iam cœpi attingere, duplex in aluo causa est vnde lienteria vulgo dicta enascitur. Vnâ quidem, frustratio coctionis: altera verò, præceps egestio. Illic manet cruditas: hîc contineri nihil potest quicquid assumptum est, quin protinus imperfectum reddatur. Atque vtriusque causæ commune est, coctionis priuatio: sed frustrationis, per se; præcipitis verò egestionis, ex euentu. Commune est etiam vtriusque, aluum ferri cibis incoctis & crudis.

aph. 1.6. &
 lib. 2. progn.

Frustratæ coctionis per se, causa est prægrandis ventriculi frigida intemperies quæ *ἀνία* facit, vnde frustratio coctionis, cuius frustratæ primum symptoma est, alui grauatæ oppressio, inde crudorum quæ sumpta sunt, libera & liberalis egestio. Eius lientericæ *αἰσχρογύμνα* sunt, fames canina quæ dicitur *κυνεργία*, i. inextinguibilis appetentia, hinc *βυλμία* τῶν πρὸς τὴν τροφήν τῆς διωάμεως ἐπείκελης, i. collapsa vis appetendi, cum indigentia alimenti per *νέκρωσιν* alui quam in Pario annorauit, quem scribit fuisse *ἀπώστην*, i. cibi fastidiosum, cum aluo prorupta vel profusa liquidis excrementis. Comitantia autem signa sunt, alui oppressio ex irrita contentione & inani conatu coquendi: mox inde profusa crudorum ciborum egestio. Huius lientericæ, his de causis enatæ, proprium epiphænomenon quiescentis & vale dicentis, est *ἀνυρεμία*, i. *acida* & *rustatio*, quæ prius non fuit: sicut alterius lientericæ mox explicandæ, *προαγύμνα*, i. prænuncium signum, quod eam cîcò venturam denunciat, similis oxyregmia, siue acida crustatio. Ad lientericæ huius curationem, neoterismo tantum est opus, *ἐπὶ ἀγῶς συμπερι καταγγίεν*, vt verbis vtat Hippocratis, i. neque profuerit vacuationi operam dare. Atque ipsa curandi ratio, in illo præscripta est à præceptore. *Διὰ τὴν εὐρυτίαν λυγί*, i. *Famem caninam, potio meri exoluit & sanat*. Huc spectant fomenta stomachica, litus, hapsi, emplastra; tum piperata etiam, siue aromatica condimenta, cum delectu morbi & ægri.

aph. 1.6. & 2.
 Epid.
 lib. 3. ἀνὲρ
 διώκτης

Restat altera lienteria, cuius præceps egestio causa est cruditatis; cum scilicet quicquid assumptum est, conneri nequit in aluo, donec perfectum sit: sed protinus redditur imperfectum. Eius incontinentiæ duplicem causam reperio; vnâ catarrhi prolapsum crudi & albuminei, quo præcipitatur quæ sumpta sunt omnia, priusquam mitificari ceperint, vel etiam mutari in aluo. Hæc, tempestatis est humidæ frigidæ & aquilonis, cuius vi sic ortam fuisse Thalsis narrat Hippocrates. *Τοιοῦτον δὲ τὸ ἐπος ὅλα ὑγρὰ, καὶ ὑγρὰ, & βορρὴν ἤνεμα μὲν τὴν τροφὴν ὀφθαλμίας ποώδεις. καὶ τὸ πείρος ἦδὲ καὶ φθινόπωρον, λετορνεώδεις*, &c. i. *Exacto anno humido frigido & aquilonio; primum quidem exorta sunt ophthalmia liquentes. Per astatem verò & autumnum, iam pridem concepta causa, facti sunt lienterici*, &c. Vide Galenum. Hic primum siccandum est caput marsupii, & pane calido, ne quid deinceps confluat: mox purgationi operam dare oportet diluto rhabarbari: diætā præscribere siccam ac tenuem, nec sistere ante tempus. Lientericæ huius descriptio digna Hippocrate, sic legitur. *Lienteria, cibos egerit imperfectos & crudos, ἀνίλους vocat Hippocrates;*

2. Epid. part. 2.

lib. 1. cap. 1.
 σελ. 10.

ac tum nullus dolor est. Sed tamen corpus macrescit. Ac morbus quidem infertur, quando è capite & supere ventre catarrhus pituita prolabitur ad inferam ventrem. Quod cum accidit, cibi ab ipso catarrho crudorem concipiunt, & humescunt: unde ipsum dicitur, i. crudorum & incoctorum præceps egestio esse solet. Tum corpus liquitur.

Superest causa altera præcipitis egestionis: propterea que crudæ, quæ inconuenientiam ventris ostendit. Est autem aphthosa ventriculi tunica, i. leuis & superficiei tenus impressa exulceratio, quæ funditur fit in alio lienteria, vt stranguria in vesica. Huius lienteris historia legitur quidem alibi apud Hippocratem. Sed quia pertinet ad hanc prognosin, vel ipsa prognosin ratio in eius notitia continetur; sufficit locos attingere, & explicare per singula membra ipsius prognosin, vt eodem stylo exaretur.

[IN LIENTERIA C I S] Quorum præceps egestio, causa est cruditatis, frustrata scilicet coctione ob incontinentiam cibi quam edit aphthosa in sup. ventriculi superficies. Talem enim lienteriam ideam ponit instituta prognosin, vt planum facient quæ sequuntur. Sed primùm aphthosi ventriculi ratio explicanda. Sanè aphthosus, i. aphthosus fit, aphthis quibusdam oblitus. Sunt autem aphthæ, vlcuscula quædam, superficiei tenus in ore cõspicua lactentiũ nuper natorũ infantium, quæ non in ætate, nomen habent: quod infantium ora mollissima, tenerissimaque, seriosioris lactis contactum & qualitatẽ perferre non possunt. Hoc sporadicum est à dicta: propterea; sanescit ex facili, vbi sola sufficit dietæ mutatio. Sed aliud epidemicum est, habetque quod pestiferum, de quo hæc scripta sunt à præceptore. Στίματα ἀφθώδεις, νοσήματα ἀφθώδεις, Στίματα. i. Ora aphthosa, turbata alui, ciborum fastidia. Vbi Galenus author est; aphthas infantie quæ cum nutritis lacte fuguntur, statim quiescere, si ora lactentium modicè astringantur: sed eas quæ ab humore prauo nascuntur, serper malignas existere. Deinde subiungit. Prolapso è capite prauo humore in fauces, quicquid in pulmonem irruit, tabificas facit afflictiones: quod verò in alium subit, eam perturbat cum morsu: in transitu autem, appetendi vim labefactas, cibique adducit fastidium, quod Σπορια Græci vocant. Sic ora grauidarum aphthosa, futuri abortus prænuicia sunt: quod ab eodẽ ferino catarrho, idem futurum est in ventriculo, quod apparet in amplitudine oris, videlicet leuis exulceratio. Hinc lienteria quæ abortionis causa est: quia gerendi & nutriendi forcum adimit commoditates. Quæ cum ita sint, pergamus ad reliqua.

[CUM FERIS ALVINIS] Vel ani potius, quæ sunt ascarides: sicut alui feræ, vermes rotundi & lati. Nam de huiusmodi ferarum causis & nomine, dictum est alibi.

[QUI TORMINE EXOLVUNTUR DOLORES] Quos excitat irritata exulceratio, dum præceps egestio fit ciborum, quorum appulsu necessario refricatur, unde tormentum quod cibis egelis quiescit, vnique dolor obortus mirefcit. Demonstratum est supra; quod morsus & tormina nunquam doloris nomine appellantur. Sic igitur dolores oborti cum tormine, exoluntur cum cibi transierint, quorum contactu pressa quantumuis leuiter exulceratio proritatur, atque quodammodo recrudescit. Secus fit in prima differentia lienteris, quam edit ventriculi æmia nata ex prægrandi frigida intemperie. Nec enim læua est crudorum egestio, nec ita præceps, caretque omni molestia in excernendo.

[QUÆ CIRCA SVNT ARTICVLOS TVMEFACIUNT] Quod est eiusmodi ac si diceret. In longa lienteria, quæ quoties alium ciet, dolores excitat cum tormentis, nec nisi excluso cibo quiescunt; si quidem cibi appulsu tantum, exulceratio proriteretur, cuius ipsa præcipitem facit egestionem; ipsum verò præceptum dicitur, i. concitatum è capite, aliò se cõuertat, imperumque faciat in articulos ipsos; cum iam pridem emacuerint, propterea que multum extenuati sint, eos tumefaciet, nõ quidem videri: sed quodam tumore cachectico. Est enim facilis atrophie transitus in cachexiam: præsertim cum perenniter est cacoehymia. Quod satis indicant quæ sequuntur. Verbum autem, μαλακίζω, pertinet ad tumorem contra naturam, nõ ad videri: i. carnium succi plenarum & solidarum accretionem. Sic dysenteria biliosa, intempestiuè suppressa, abscessum facit in articulis.

[HINC PRÆVERBÆ SQVAMVLÆ ET BVLLATÆ] Cum scilicet ad vltima ventus est, & cachexia solidarũ partiũ, ex æquo certat cum ætate. Hic enim pustulati articuli velut ambugi, corpore habitudinis phthisin ostendunt, vt demonstratũ est supra in illa prognosi. Pustulata corpora, velut ambugi; phthisin ostendunt habitus. Ac primùm hic pustulæ, velut bullæ sunt rubræ, ex affluxu & collectione ichorum venenatorum & acrium, superficiem corporis amburentium vel erodentiũ. Inde squamose fiunt, & velut squamatim cadunt emortuæ in marasmo partium solidarum, vt visum est præceptorum illo. Si cui sputa salsa & tussis inhibentur, ius rubet corpus velut exanthematis oblitum; sed ante mortem exasperatur. Sed satis iam alibi de bullatis exanthematis quæ cadunt in ætate partium solidarum, & suo genio defraudatarum, & erethismis effert cacoehymia afflictarum.

[QVINETIAM OBORTA SVDATIVNCVLA] Quæ tum exudar, cum succi alibilis nulla fit assimilatio, partibus exolutis, ac sui negligentibus, ipsum effluere permittentibus.

[AC RVBENT VIBICLVVS OBSITI, VELVT FLAGRIS CASI] Quoniam à putri calore sudatiũculæ, cum naturalis humor effluxit, feruntur ichores qui occupant totum corporis habitum. Est enim percepmodum illud Hippocratis; quod quicquid in corporis habitu cauum est, & admodum cohibile, cuiusmodi sunt interstitia musculorum; vt spiritu replentur in secunda valetudine: sic ichoribus in aduersa, quorum collectione, præter perennem affluentiam ex hepatitis, venarumque omnium impuritate; modò pustulæ, modò vibices toto sparguntur corpore, pro qualitate humoris morbifici, & varia partium oblesarum figura. Tali stylo edita est illa prognosin. Οἱ τὰ δὲ στα φλυκταίματα, ἔξωθεν ὀρθοπαλαιοῖς ὀρθοπρωταῖς ἔτι, καὶ αἰσθῆσις ἀσθενήσας, ὡς πλησθὲν ἐπιδύοιτο, καὶ ἀποσπασθῆναι. I. Quæ articuli assolluntur subrubris bullis; hi cum obriguerint, toto ventre & inguinibus velut purpurati conspiciuntur, tanquam vibicibus cæsi, & moriuntur. Sed eius prognosin enarratio infra ponetur. Pergamus ad alia.

2 Οἱ ἐν λειαντηρίῳ δέσσι μακροὶ, ἀμα θυελιοὶ, σφοδρῶδες, ὀδυώ-
δες, λυομένων ἐποιδιοὶ. Ἡ Ἱπποκράτους Τυποὶ καὶ οὐκ

*Quos longa exercet lienteria, cum feris, torminibus, & doloribus,
cum hac quieverint, intumescent. His superrigere male est.*

10 HIC LONGA non est lienteria, in aphorismis posita, quam ex Græco Latine ita conuertit: *in lon-
ga lienteria si acida sit eructatio quæ prius non erat, bene sit agro.* Est enim causa eius, ventriculi *ἀρροσία* quam
genuit ingens ipsius frigida intemperies. Eius egestio caret omni tormento, & omni morfu, atque do-
lore intestinorum, nec ita præceps est, ut iam dixi, quam aliarum quæ à prolapsu catarrhi è cerebro e-
nascuntur: imprimisque ferini, qui & ventriculum, & intestina tenuia facit. *ἀρροσία*. Qualem iam po-
suit superiore prognosi, & in hac etiam symptomata eius prosequitur tum adiuncta, tum consequentia,
ἡ δὲ ἱστορία καὶ ἐπισημῶν Græci vocant. Est enim lienteriz signum vnum pathognomonicum καὶ ἀρροσία
ἢ, præceps crudorum vel imperfectorum ciborum egestio.

20 QVOS LONGA EXERCET LIENTERIA] Quam edit alius aphthosa, vnde crudorū præ-
ceps egestio ab incontinentia omnium quæ sumuntur. Est autem longa, tum ob perennem affluentiam
catarrhi ferini, ex anno austrino quem pluviz occuparunt, vnde ventriculi & intestinorum aphthæ cō-
iunctum habent Hippocraticum illud *ἡ νόσος*; non autem latentium similes quæ excitavit ferocius lac
nutricis: tum ob assiduam pruritacionem eorum quæ sumuntur, illac transeuntia, vnde solaminis lo-
co, afflictis datur afflictio, ut in proverbio est.

CUM FERIS] i. Ascaridibus, in ano velut catullientibus, quæ sunt putredinis fædæ soboles, non
autem excrementi chylosi, quale multum est in puerulis ab edacitate: propterea quæ scatent lumbricis.
Nam tæniarum alia ratio est, quam supra ex præceptore attigimus. Non enim credibile est in chylosi
excrementi vacuitate, ac tam præcipiti egestione, lumbricos nasci: quamvis in torminibus etiam ena-
scantur; si verum illud est præceptoris. *Τὰ καρδιακά μὲν σφόδρα καὶ ἡ νόσος καὶ ἀρροσία* i. in cardialgia cum
30 torminibus, feræ alui prorumpunt. Sed ascaridum hæc nulla est impeditio: quin potius opportunitas ex fæ-
da corruptione. Ascarides autem, feræ sunt, nec raro καὶ ἐξ ὧν, nomen ferarum obtinent, ut in illo. *Τὸ
ἡμεῶν ἐστὶν ὄρνις* i. Autumno ferinum. Vbi Galenus author est, ferini nomine contineri ascaridas, lumbrico-
cos, elephantem, cancrum, phthisin, cæteraquæ omnia sæua mala quæ autumno potissimum regnare di-
cuntur. Sed ex omni sensu *ἡ νόσος*, cui locus hic esse possit quam ascaridibus, non hercle inuenio.
Lumbricos iam exploramus: elephantem verò, cancrum, phthisin, & vlcus depascens, quod *ἡ νόσος* ἢ το-
μὴ Græci dicunt, huc aduocare nec possumus, nec debemus. Nam ut cæterorum facilis ratio est cur in
lienteria loco ponenda non sint: sic ferini vlcus ac depascentis nulla est æquitas cur in lienteria sit vsur-
patio. Est enim *ἡ νόσος* vlcus, ἢ νόσος in aluo, dysentericæ aluinæ causa effectrix: quoniam egestionem
mouet cruentam, quæ nulla est in lienteria: sed tantum crudi cibi, & imperfecti, ab impotentia coquen-
di aut continendi.

40 TORMINIBVS] Quæ intestinorum leuiter pressa excitat vlcératio, appulsu ferini humoris vnde
mordentur, estque morsus ille, torminum causa vna: sicut & flatus acrior qui in sinuosis intestinis sub-
sistit, nec exitum habet, ut mox dicitur.

ET DOLORIBVS] Contactu eorum quæ frustra sumuntur dum illac transeuntia præcipitantur
ad exitum. Notabilis est, hoc loco, doloris atque torminum distinctio.

CUM HÆC QUIEVERINT] Sed tamen ἀνέπαυτος καὶ ἀσήμερος, ut nulla redintegratio sit alui, nec in-
testinorum, cum perenni affluxu catarrhi ferini. Quiescunt autem ascarides, dolor & tormina: quoniam
cessat egestio sensu amisso per *ἐκπαυσιν* alui & intestinorū, vnde nulla amplius rei molestæ sēsis excitatur.

INTUMESCUNT] Occupati scilicet tympania hydrope qui assurgit copia subsistentium statuunt lib. 2. progn.
in anfractibus intestinorum, in quibus impotentia est, vel deprauatio peristalticæ facultatis.

30 HIS SUPERRIGERE] Τὸ ἐπὶ Ἱπποκράτους, semper symptomaticum est apud Hippocratem, ut alibi se- lib. 6. aph. &
pe iam obseruauimus. Est autem symptomaticum materiz subsistentis, ut in purulento abscessu; non
autem è vasis expressæ in partes acerrimi sensus, nervosissimas; cuiusmodi est ille rigor qui cietur in fe-
bribus, è lumbis per dorsum ad caput.

MALE EST] Signo & causa: quod alibi demonstratum est, ut nemo sit omnium qui nostra hæc
legit, quem ista nescire persuasum habeam.

3 Λειαντηρία μὲν δύσπνοίης, καὶ πλῆθος τῇ κνήσῃ ἐς φθίσιν ἀποτελεῖται.
60 Lienterica quæ cum spiratione difficili, & lateris vellicatione con-
iuncta sunt; transeunt in phthisin.

ENIMVERO vna lienteriz differētia, & vna item phthisicæ, ab eodem fonte principia causasque
ducit; nempe à cerebro vnde ferina destillatio est, nata ex tempestate austrina pestifera, cuius prolapsus
Gg iij

part. 3. Epid.

in aluum aphthosam fit lienteria; in pulmonem vero, *σπείρωμα φθιδέας*, i. *ferinum vlcus tabificum*. Nota est illa lienteria nuper à Galeno adducta super symptomatis quæ à ferini catarrhi prolapsa in fauces nascuntur; quædam in aluo, vt perturbatio vel *καταρρhis*; quædam in pulmonibus, vt phthisis; quæ omnia sequuntur naturam humoris morbifici, & partium occupatarum. Sed tamen peritæ accidit vt ambæ partes, è catarrho in fauces, pariter similiterque affligantur. Vnius afflictio vindex alterius esse solet, sicut in ructu acido, ratò pleuritidis incidit: nisi tanta sit catarrhi feritas & propagatio, vt ambas æquè inuadat & occupet. Quod sapienter Hippocrates annorauit in diarrhœa pleuriticorum & phthisicorum, quam scribit nonnullis eorum superuenire, affecto iam morbo; quosdam verò circa initia pariter occupare. Omnis autem præceptoris ratio de diarrhœa cum phthisi, aut super phthisi, continetur in illa prognosi. *Ε phthisicis, quibus defluunt capilli è capite; pereunt à diarrhœa. Et quibus phthisicis diarrhœa superuenit; moriuntur.* Hic sanè lienteria secum habet coniuncta signa *φθιδέας*, dyspnoeam scilicet, & lateris vellicationem; quorum significatio est in illo, *μέλα δεικνύει*, i. cum spiratione difficili, &c. Non enim per lienteriam *μετέσθωσιν* phthisis incidit, vt nuper vidimus in dysenteria eruentia, in rempessuè suppressa. Nec verò per *παροξυσμὸν* humoris lienterici, qui mutata vellicatione confluit in thoracem, aluo relicta: sed eius qui pariter æqualiterque simul thoracem & aluum occupauit dominatum & magisterio: ita tamen, vt cum cessarit lienteria, & aluus tumescere cœperit ob causas prædictas, tum phthisis ipsa lumen suum ostendat, conceptò iam vlcere quod ferina intulit destillatio, dum lienterica esset aluus, nec vlla proinde expurgatio fieret vtriusque rheumatis, concitati & consistentis. Quo stylo & scopo scripta est instituta prognosis.

Ergo. LIENTERIA] i. Lienteria illa species quam intulit sæua destillatio per aluum aphthosam: unde impotentia continendi quæ nutritui assumuntur: proptereaque omnium præceptis egestio.

Coac. 2. cap. 3. 2.

QVÆ CVM SPIRATIONE DIFFICILI] Crebra & parua, ex contumacia & labore partium spirabilium, catarrho & phlegmone occupatarum. Nam spiratio frequens & parua, inflammationem denunciat & laborem partium spirabilium; thoracis, pulmonum, & arteriarum.

ET LATERIS VELLICATIONE CONIUNCTA SVNT] Ob prostrationem tunicæ costis intextæ, à sæuo catarrho & phlegmone ipsa systrophica, vt suprâ dictum est in pleuritide.

TRANSEVNT IN PHTHISIN] Vel potius finiuntur phthisi quam ipsa lienterica non genuerunt, nec per se, nec ex euentu, i. neque per *μετέσθωσιν* ipsius lientericæ iam enata; neque per derivationem catarrhi efferi prolabantis: sed accrescendi causam & occasionem dederunt, quod anacatharsin prohibuerunt ipso ventris profluuiio, quod ea ratione plus valet ad imprimendam phthisin, quam derivatione catarrhi, eius impressionem impediatur. Hic enim derivatio nihil prodest in pari confluxu materia in aluum & in pulmonem: quoniam phthiseos & lientericæ, ab eodè & æquali ortu generatio est. Non igitur hoc loco idem est ortus phthiseos, qui fuit inflationis à lienteria in superiore prognosi. Nec verò *καταρρhis* hic nomen phthiseos usurpatum pro lienteria atrophica & cachexia, vt opinari quis possit illud, *εἰς φθίωσιν ἀποπλευνῆς*, i. in phthisin desinunt, cò spectare vt inde extrema macies intelligatur quæ longam sequitur lienteriam. Sed phthisis idem significat quod ipsa phthoë Atheniensium, pertinetque ad vetustum vlcus pulmonum, quod emaciandi potentia, & vi tabifica, cæteros omnes morbos præcedit, tum edacitate sua, tum febre hectica, tum aëris quem ducimus infectione tabifica quam ei, pulmonis ipsum *σπείρωμα* & sædum vlcus impertit. Sed satis iam de his in phthisi, & eius historia.

Coac. 2. cap. 3. 2.

4 Εἰλεώδεις ἐμέτος καὶ κόφωσις κακόν.

Ileos vomere & obsurdescere; malè est.

Coac. 2. huius. cap.

HACTENVS de lienteria quæ cernitur in præcipiti & molesta egestionem crudorum & imperfectorum omnium, quæ nutritui assumuntur: ab impotentia continendi, quam edit aphthosa ventriculi exasperatio. Nam eius quæ impotentia coquendi enascitur, exposita est omnis ratio in historia lientericæ. Quoniam autem sæuis torminibus fœta est illa quoque intestinorum afflictio, quæ ileus nominatur; hic iure & loco quærendum videtur super natura eius, & super symptomatis, quæ ipsos malè habent periculose, quos ileus occupauit. Sed ramen hoc interest inter lienteriam aphthosam & ileum; quod cum vtriusque commune sit cruciari torminibus, illa causam habeat impotentiam continendi portionem & cibum; hic verò permeandi & transmittendi extrà per sedem, vt mox dicetur. Ergo nomen ilei pertinet ad intestinorum *εἰλεωδὲς* contra naturam, quæ est in motu peristaltico intestinorum, còtrario naturali; cum scilicet intestina fibris rotundis circumcirca colligunt se infernè sursum; neque id naturaliter, vt sit supernè deorsum. Est enim peristaltica intestinorum vis, qua transmittuntur infrà humores, flatus, & fæces. Atque id naturaliter fit. Secus autem in ileo, cuius quidem vitio cibus & fæces non permeant, sed primum in aluo subsistunt, mox remeant sursum, vt etiam per os reddantur. Talis *ἀπὸ εἰλεωδὲς* fundamentum est ilei, cum firmiter fixa est eius causa. Nā sæpe est fugax & pressa leuiter, cuiusmodi est illa quam infert oxy-meli cum abradendo & exasperando, intestinis molestum est, de quo sic ait præceptor. *Φύσιν καὶ νόσον εἰλεωδὲς ἀλλὰ παλινδρομὴν ποιεῖ*, i. Flatum prohibet infrà transmitti: sed ipsum fatit suprâ recurrere. Tum illa etiam quæ fit appulsu rei frigidioris ad anum, unde comparatur alui astrictio, iis præsertim qui parum obrecto podice diu sedent in marmore. Sed ingens malorum fœtura est ex ea, quæ sursum fit contra naturam, intestini vtriusque refluxione, quàm *τὸ αὖθις εἰλεωδὲς* nominauimus. Inter hæc mala incredibile est & admirabile

lib. 3. met. 13.

6. Epid. part. 3.

admirabile quantum & sæui doloris cruciatu & viscerum afflictione, proptereaque imminenti periculo antecellat symptoma illud quod ileum veteres nominarunt, cuius inexpugnabile vitium est *ἡ ἀνὸς νόσος*, ob summam causarum vnde ortum habet, contumaciam. Ac primum de ileo vetus est illa prognosis. Est δὲ ἡ νόσος οὕτως ὅτι ὀνείδωται. i. Est autem princeps morbus & periculosus admodum. Symptomata autem mortifera ilei continentur illa historia quæ sic Latine legitur ex Græco Hippocratis. Apud Tisamenum decumbebat mulier quam vix tolerabilia ileosa continuo inuasit: vomitiones multæ, impotentia continendi quæ biberat: circa hypochondria sæui dolores; tum infra cruciatus ad aluum, assidua scilicet tormina: nulla fux erat, sed assu incandescibat; extrema partes frigida exactum ad morbum; summa mulieris anxietudo; somni vacillans; urina pauca ac tenuis; deiectiones cruda ac tenuis. Seruari non potuit, nec potius fuit quicquam opis adferri; proindeque tali sorte interit. Sed eorum symptomatum distinctio est in prognosi mox explicanda, cuius facillima erit ratio, postquam percepta fuerit ilei definitio. Est igitur ileus, vtriusque intestini sursum reuolutio, qua nec aluus, nec spiritus infra transmittitur, sed contra cibis & stercus, cum inueterauerit, per os redditur. Eius reuolutionis in ileo, causa est, tum alterutrius intestini vel vtriusque inflammatio; tum, crassioris præsertim, firmiter fixa oppilatio. Ac fixæ firmiter oppilationis in crassiore, doctrina est illa præceptoris. Hic sanè morbus, inquit, nascitur quando perustis stercoribus copia est atque subsistit in intestino, ac pituita inuoluitur, eorumque duorum cumulata congerie clausum intestinum circumtenditur & inuoluit. Oppilationis autem documentum, idem præceptor statuit hoc argumento cum ait, Nec vllum eorum quæ sumuntur per os medicamentum excipit, sed sursum vomendo reddit: nec eorum quæ conuenienter subiiciuntur vllum clysterem admittit. Sed inflammationis systrophicæ intestini tenuioris, argumenta leguntur in prædicta historia mulieris ileosæ. Sunt autem; prægrandis hypochondriorum æstus & ardor, frigus extimarum partium, & incontinentia portionis, vel eorum quæ porui exhibentur. Ergo si alterutrius inflammatio sit, vel oppilatio; nec aluus, nec spiritus infra transmittitur. Si pars superior affecta est, cibis: sin autem inferior, stercus per os redditur. Sed eorum symptomatum distinctionem adferet instituta prognosis, quam sic aggredior explicandam.

ILEOSIS] i. Quibus reuolutio est intestini sursum; qua neque aluus, neque spiritus infra transmittitur, cum sæui doloris hypochondriaci ac torminum cruciatu. Sic enim præceptor. Si quem forte ileus occuparit, ei venter durescit, ac nihil deicit: tum per totam inferiorem aluum sæuus dolor exoritur, cum febre & sui. Sic item Galenus ex Hippocrate. In ileo nihil infra transmittitur. Atque hoc proprium morbi est inseparabile. Idem quoque alibi scripsit apertius. In illu nihil omnino deicitur, ne clysteribus quidem inditus ac crioribus. Atque inter causas reuoluti sursum intestini, memorabilem ponit Galenus, cum exulceratio levis est intestini, si à ciborum transitu proriretur, nec exitum citò habeant; tum euenire ut intestinum hac noua proritacione afflictum transmittat sursum ea quæ ipsum læsura erant; ac mutata velificatione, cursum deinceps inflectat sursum contra naturam, quem olim naturaliter deorsum tenebat. Hoc facit intestinum sui diligens atque doloris metuens ex rerum molestarum appulsu. Sic aphthosæ lientericæ transitus esse potest in ileum.

VOMERE] Cibum per os reddere cum incontinentia portionis, cum eò perducta est inflammatio tenuis, vel afflictio intestini, systrophica phlegmone occupati, ut circumtensum extremis digitisprehendatur. Quam afflictionem *χρόδα* veteres nominarunt, ex eo quod tractabilis sit ipsa chorda. Est autem chorda, tenuius intestinum. Ac tum epigenomena sunt, vomitus biliosus mali odoris, varius, atque niger; adductis in sympathiam intestini phlegmone systrophica inflammata, hepate & liene, multum inde vitariis, valdeque afflictis. Tum sitis adest inexplabilis atque febris ardens acuta, cum prægrandi frigore partium extimarum. Sed alia quoque vomitio est fæcis ac stercoris quam, pace Galeni dixerim, venire arbitror à contumaci descripta oppilatione crassioris intestini, cuius reuolutio inde fit sursum, eorumque quæ intra continentur, eodem transmissio, cumulata congerie; quando, ut iam diximus, infra transmitti non possunt. Stabulantur autem in crassiore intestino fæces & stercora quæ aliunde proficisci nequeunt quam vbi sunt. At nihil eiusmodi est in tenuiore. Nec verò illac transmittendi stercoris copia est cum phlegmone systrophica occupatur: ut maius periculum sit in vomitu cibi quam stercoris, tum ob vomendi causam, tum ob symptomata ipsum. Nam vomendi causa est phlegmone, cuius periculo illud adiicitur, quod vomitione cibi & chyli tollitur nutritus: ne taceam interim quæ ex crebra vomendi contentione symptomata excitantur. Ac leuia intestini tenuioris mala, sunt grauiora quam crassioris prægrandia. Nefas autem negare est eam crassioris intestini afflictionem, quam ponit Hippocrates in oppilatione à perustæ fæcis congerie cum inuolucro pituitæ glutinosæ & crassæ. Quod fecisse video ipsum Galenum.


ET OBSVRDESCERE] Surditate vtraque: tum ea quam facit exolutio partis illius cerebri, vnde vis audiendi manat: tum ea quæ fit impedito appulsu *ἡ ἀνὸς νόσος*, per obstructionem meatus auditorij: vnde assurgunt parotides graecolentis ilei confectariæ. Ac sanè ilei graecolentia percipitur in vomitu fædi odoris, in expiratione, in ructu, in flatu, in perspiratione totius compaginis, cuius fæditatem obseruasse se narrat Galenus in quodam ileoso.

MALE EST] Ne dicam mortiferè; ut certè omnino est, Ac tum mortifera vis est ilei, ut cita inde mors veniat. Quod accidisse legimus ileosæ mulieri, quam scripsit Galenus biduo afflictionis, aut ad summum triduo periisse. Causæ interitus notæ sunt. Talia autem symptomata vomitus & surditatis, tum etiam conuulsionis atque singultus in eos tantum cadere ileosos docet Galenus, qui *ἡ ἀνὸς νόσος* i. quos ileus habet mortiferè cum desperatione omni salutis.

DE MORBIS VESICAE.

HÆC ex prognostico: quòd ea lectio mihi melior visa est, quàm Coacarum.

CAP. XXII.



ΥΣΤΙΕΣ δὲ σκληραί τε ἔπώδυνοι: θανά μὲν παν-
τελῶς καὶ ὀλέθρια. Ολεθριώταται δὲ ὁκόσαι ξυῶ πυρετῶ
συνεχεῖ γίνονται. καὶ γὰρ ὁ ἀπ' αὐτέων τῆς πυρετῶν πόνοι
ἱκανοὶ ἀποκτεῖναι. καὶ αἱ κοιλίαι ἔδιαχωρέουσιν ἐπὶ τῆς
ποιέτων, εἰ μὴ σκληραί τε, καὶ πρὸς αἰνάνη. 18

1 Vesica autem dura quas dolor praegrandis occupat, graues omni-
no sunt atque pestiferae. Sed illae demum perniciose admodum, quae cum
assidua febre nascuntur. Etenim quae mala inferunt tales vesicae, illa ne- 20
cando sunt satis. Sed ei periculo illud adiicitur, quòd inde alius nisi co-
acta, nihil reddit, ac dura sunt quae transmittuntur.

POST QUAM DE aluo dictum est, nunc de vesica dicendum. Eius afflictae non hercle minora
sunt, nec saeva minus, nec minus mortifera, quàm ipsius alui symptomata. Nam difficultate ipsa certat
cum aluo: nec verò difficile dictum est quin ipsam precedat, cum celeritate interitus. Ac sanè consenta-
neum est ut patefactis incommodis quae inferuntur ab aluo & quae ipsam inuadunt, stylum hunc no-
strum ad vesicae vitia conuertamus: quòd vtriusque idem sit munus in excernendo, illius quidem ster-
cora, huius verò vrinas. Sed inter vesicae mala, illud demum maleficientia eximium est, quòd summam 30
vesicae infert molestiam, saevi doloris cruciatu; & vnà secum adfert officij ad vitam tuendam necessarij
difficultatem, saepe etiam vacationem, cum sympathia sociarum vicinarumque partium, quarum affli-
ctione salus in dubio esse solet. Huiusmodi est, vesicae inflammatio per systrophem nata rheumatis con-
citati, vnde ipsa turgendo fit dura, & praegrandi dolore afflicta. Quae duo symptomata ponere solet
Hippocrates in omni partium tumidarum inflammatione systrophica. Nam actionis laesio, inflamma-
tionis consecutaria esse solet, ut aliarum quoque affectionum. In vesica, propriae actionis laesio conside-
ratur in stranguria, dysuria, & ischuria. Quae tria symptomata non sunt inflammatae solùm vesicae pro-
pria, nisi κατὰ τὸν δόξαν: sed aliarum quoque affectionum communia, ut suo quaeque loco dicentur. Sed
inflammationis cuiusque systrophicae, vndeunque oborta sit, proprium est κατὰ ὅλα, καὶ κατὰ μέρος, par- 40
tem occupatam tumere, durefcere, & multum dolere cum pulsu, si magna sit inflammatio. Sic enim
Galenus. Αχρεῖον, inquit, σημεῖον τῆς μεγάλης φλεγμονῆς ὁ σφυγμός. Ergo non aliter visum est praeceptorij, vesicae
phlegmonem systrophicam describere, quàm ipsius hepatis. De quo inflammato sic ait. Οἰδημα δὲ ἐν
τῇ ὑποχονδρίῳ, σκληρόν τε καὶ ἐπώδυνον. i. Tumor autem in hypochondrio durus est dolorificus. Idem non fecit in
lateris phlegmone, cuius naturam attigit pleuritis nomine: quòd lateris tumor non est tractabilis, ut
eius duricies possit percipi, sicut vesicae in aqualiculo, & hepatis in hypochondrio. Nunc igitur verba
Hippocratis, iuxta ipsius πικρὸν examinemus.

lib. 2. ad
Glauc.
lib. 2. progn.
& supra cap.
18. huius 2.
lib.

lib. 4. viii
diff.

VESICAE AUTEM DVRAE] Quatum duricies nata est à tensione, quam intulit tumor ille
contra naturam, quem ex Hippocrate nominare solco systrophicam phlegmonem. Non enim duri-
ciem hinc opinamur concretionis aut siccitatis: nec verò tensionem distentae vrinæ vesicae.

lib. 4. viii
diff.

QVAS DOLOR PRAEGRANDIS OCCVPAT] Cuiusmodi esse solet à phlegmone infe-
stissima partium acerrimi sensus, ut sunt vesicae. Hic enim rei molestissimae acerbissima sensio excitatur.
Ac doloris à phlegmone in vesica causa est omnis tensio ingens cum intemperie magna humoris phle-
gmionici, partem exacto sensu praeditam, crudeliter lacerantis. Hoc scire pulcherrimum est: maximaque
adfert commoda aegris dolentibus qui sanitatem expetunt, ut dolore careant. Nam ex perspicentia do-
lorificarum causarum, artificium datur medico leniendi dolorem, cum tensioni laxitas, intemperie
temperatio adhibetur.

lib. 4. viii
diff.

GRAVES OMNINO SVNT] Doloris acerbissimi cruciatu, vigiliis, anxitudine, cibi fastidio,
cephalalgia, delirio quoque ipso. Grauitatis autem accessio fit vrinæ appulsu, cuius collectione, quia li-
bertatem exundi non habet, proritatio maior est atque distentio. Ac tum scerura est corruptorum hu-
morum qui proletariam habent doloris acerbitem cum vigiliis coniunctam, quae bilis flauae ac vini- 60
dis, si quid aliud, feracissima est.

ATQVE MORTIFERA] Symptomatum calamitosa vi, & summa corporis infirmitate. Sym-
ptomatum autem calamitosa vis, cum in iis potissimum cernitur quae iam adducta sunt: tum verò in il-
la clausula mox explicanda quae statuit inflammata vesicam, homini necando ipsam per se satis videri
& esse. Ad

& esse. Ad quem locum ratio differetur, quamobrem vesicæ inflammatio ipsa per se non solum periculosa, sed etiam non raro mortifera ipsum habeat quem firmiter occupauit. Nihil autem æque facit corpus infirmum, atque prægrandis dolor.

EVNESTISSIMAE. AVTEM] Quæ ad vltima ventum esse testantur, ut iam nulla salus sperabilis esse possit, nec aliqua vitæ dulcedo, nec vsus diuturnior: quia in propinquo mors est.

QVÆ CVM ASSIDVA FEBRE NASCVNTVR] Quæ simulatque inflammari cœperint, assiduam febrem accendunt, unde significatur phlegmones magnitudo atque ferocitas: quoniam symptomatarum febrium ortus ducuntur non nisi ex magnis morbis, atque ex iis præsertim qui sunt exitui. Nascentur autem febris, accenso calore cordis, in sympathiam inflammatæ multum vesicæ adducti, arteriarum societate quæ ex ramo per foramen ossis pubis in crus descendente per latera colli, inter vesicæ tunicas ad fundum vsque sparguntur. Ac febres illæ sapiunt magnam & malignam vim systrophice phlegmones in vesica conceptæ. Sunt enim peracutæ, assiduæ, singultuosæ, tremulæ, paraphoricæ, breues, funestæ: quales oriri scribit Hippocrates ex calcis fracturâ quæ habet ex *γούρ*, & inde nigritiem. Est enim vesicæ ad gangrænam euntis, eadem planè cum cerebro, corde, & stomacho sympathia, quam esse docet Galenus fracti calcis atque iam syderari incipientis.

ETENIM QVÆ MALA INFERVNT TALES VESICÆ] Quæ sunt phlegmones & inflammatæ vesicæ. Ac phlegmones quidem sunt, rubor, incendium, pulsus, renixus, & dolor. Inflammatæ autem vesicæ, tenio dolorifica partium circumiacentium, stranguria, dysuria, ischuria: tum ipsa nobilium partium sociarum atque communium sympathia; quæ tantum abest ut aliquid opis adferat ad phlegmones leuationem, ut maximis damnis augeat.

ILLA NECANDO SVNT SATIS] Nam phlegmone ipsa prius ad exitum præcipitat, quam habeat empyema quo exoluatur. Tum phlegmones amplificatio, unde symptomatum prædictorum scutura est, ipsorum quoque syntimoriam excipit. Hinc empyema nullum, sed eius loco gangræna, quæ ipsa per se mortifera est: ut documento sunt calculosi, quibus extracto calculo, vel appulsu aeris frigidioris, vel extractione violenta, quod sæpe accidit, vesica syderatur. Iam verò ischuria vesicæ inflammata, homini necando ipsa per se satis est.

SED ET PERICULO ILLVD. ADIICITVR] Iuxta illud. Morborum quicunque alter superuenit alteri, periculo adiicit; atque non raro interimit.

QVOD ALVVS. NON NISI EGRE REDDIT ET DVRA] Hæc sympathia est partium vicinarum, ut intestini recti, cui vesica insidet: sicut iam posita est sympathia sociarum, ut cerebri, cordis, & stomachi in febre assidua, peracuta, singultuosa, paraphorica. Ergo sympathia est intestini, egestionis impediri, meatu oppresso ex ponderosa & graui vesica. Hæc autem impediri par pari refert vesicæ in egerendi conatu: quo si desistat eger, doloris metu; pilulatæ sunt fæces, velut caprarum, quarum incômoda, signo & causa sunt alibi explicata. Si igitur clausula huius prognoscos, quod tum ad vltima ventum est, quando cum sæui doloris cruciatu afflictio est prægrandis nobilium partium, nec vrina redditur, nec alius infra transmittitur: quarum suppressa excretio ipsa per se mortifera est.

2 Λύει δὲ οὐρ πύωδες οὐρηδέν, λευκὴν καὶ λεῖαν ἔχον ὑπόστασιν.

Sanat autem urina quæ cum pure reddita, leuem & albam habet hypostasin.

IN SPEI ANGVSTIA, cum scilicet metus est sinistri iudicii, naturæ contentio tanta est, ut viam sæpe inueniat, qua se morbo expediat. Sic in nobilium viscerum phlegmonica systrophe, non raro hæmorrhagia liberalis κατ' ἔξιν, primis prorupta periodis, periculi locum tollit, quod tum instabat maximè imminēbatque. Hic autem cum in phlegmone & febre assidua periculum sit, eius depellendi ratio est omnis posita in vtriusque morbi pepasino & excretionem, quibus occupatum partium redintegratio comparatur. Ac febris quidem pepasimus ostenditur in vrina, laudabili prædita hypostasi: phlegmones autem in empyemate, quod cum tali vrina meiando effunditur. Vtriusque pepasini ratio & quæ sunt inde commoda mox dicuntur. Sed primùm empyematis. Enimvero systropharum omnium phlegmonicarum quadruplex omnis migratio esse potest: vna in partis æqualitatem per *ἰσότητι* potissimum expectendam: altera in empyema: tertia in gangrænam, quarta in scirrhum. Hic *ἰσότητι* expectanda expectari non debet ob densitatem partis afflicta. Nec verò sperabilis est hæmorrhagia quæ tumorem minuat sicut in viscere hypochondriaci: quoniam fixa phlegmone nullam exhibet commoditatem sanguini remeando aut permeando. Non enim hic nudæ sunt venæ, nec suspensæ, ut spon- te sanguis effluere posse videatur. Quocirca bene præcipiunt qui sanguinis detractionem tum ex interiore cubiti vena, tum ex malleoli saphæa præscribunt. Sic enim præceptor. *ὀφθυσίαν*, inquit, *sanat phlebotomia*. Secare autem decet interiores. Ergo naturæ vnicum in empyemate ipso perfugium. Nam scirrbi mutationem mors ipsa præcipiet. Gangræna autem est ipsum *κρίσις*, i. quod verè mortiferum est, ut verbo vtar Hippocratis de phthisici diarrhœa. Quæ cum ita sint, verba authoris, ad scopum prognoscos conuertamus.

SANAT AVTEM] Doloris vacuitate ac restituta meiendi & egerendi libertate, quam edit mor-

comment. ad
aph. 7. 7.

lib. 2. mel
ap. 1.

lib. 3. mel
ap. 1.

lib. 1. mel
ap. 1.

lib. 3. progn.
Coac. 1. & 3.
cap. 11. lib. 2.

aph. 7. 4.

aph. 3. 6.

lib. 2. mel
ap. 1.
Coac. 6.
cap. 17. 2.

202c.11. cap.
14. lib. 24

bi pepasimus, vesicæ redintegratio, & febris discessio. Atque sanandi verbum usurpauimus: quoniam Græcum πᾶν, idem est quod sanare, ut supra ostendimus ad illam prægnationem. *Convulsionem sanat exor-
ta febris acuta.* Vbi Græcè legitur. Σπασμὸν λοιπὸν πυρετὸς ἐπιτρεφόμενος ὀξυΐ.

[VRINA] Cui excipiendæ atque reddendæ vesica dicata est, quæ cum redditur liberaliter, signo & causa bene est. Ac signo quidem redintegrandæ partis: causa autem vacuandi humoris qui pepasimus recepit, conuersa phlegmone in empyema.

[QUÆ CUM PURE MICTA] Quæ mictione dolorificum vesicæ malum foras excluditur, si pus album sit, læue, ac nihil olens. Atque illa crisi phlegmones propria est, quæ occupat ipsam vesicam: succenturiata autem peripneumoniæ quæ caret anacatharsi libera & liberali. Sic enim purulentæ fun-
duntur yrina paucorum dierum, quæ non sunt nephriticæ. Nam quæ continenter ac diuturnas reddun-
tur, vesicæ sunt exulceratæ, aut renum.

[LEUEM ET ALBAM HABET HYPOSTASIN] Quæ cernitur in fundo matellæ, cum pus impermixtum residet. Est autem hæc quædam mitigatæ febris acutæ: unde nec amplius bilis fla-
ua sæuit, quam ipsa continenter gignit dum viget, nec amplius liquitur sanguis & caro tenera; sed par-
cium solidarum virtus iam lucet, quarum munus proprium concoctio est.

3. Ἡν δὲ μήτε ὁ πυρετὸς ἐν διδῶνι, μήτε ἡ κύστις μαλθακιστοῖτο, ὅτε
πυρετὸς ζιωνεχὴς ἦ, ἐν τῇσι πρῶτοις ἐξιδῶσι τῆ νοσήματος· ἐλπίς
ἀλγέοντα ἀπολέσθαι.

*Sin autem nec ulla remissio est ab urina, nec vesica mollior; tum et-
iam febris assidua sit, credibile est agrum primis morbi periodis periturum.*

IN PERACUTO morbo ac dolorifico spes ruit omnis ac retro sublapsa refertur, si & vires ac-
quirat, & nulla eius leuatio est, unde leuari solet: sed contrā ei iam admodum periculoso, inde pericu-
lum maius adiicitur.

Ergo. SIN AUTEM NULLA REMISSIO SIT AB VRINA] i. Si vrina non facit ut
morbus concedat & mansuescat, domita feritate: vel si vrina nihil opis adferat & adiumenti ad leua-
tionem morbi atque symptomatum eius; quod ea vel intus subsistat in ischuria, unde plus longè ad-
ditur periculo, quàm à phlegmonica systrophe, & febre assidua: vel si vrina difficulter atque stillarim
reddita, nullum ostendar phlegmones atque febris pepasimum, in pure & hypostasi læui & alba. Ex quo
efficitur ut.

NEC VESICA SIT MOLLIOR] Ut esse solet ab empyemate, sicut systrophica omnis
phlegmone: sed contrā perenni affluxu multum distenta, durior ac magis dolorifica.

TUM FEBRIS ASSIDUA SIT] Bilis prouentu ac sanguinis, partiumque recens pressarum
colliquamento infestissima, cum sympathia cerebri atque stomachi: unde sunt αἰσθήσεις, singultuosæ, &
paraphoricæ.

CREDIBILE EST] Non falsa & fallaci opinione, sed certa tecmaris è signis orta syllogisticis:
tum ex comparatione morbi & ægri.

ÆGRVM] Doloris acerbitate fractum, & læua molestia, insomnem, anxium, cibi fastidiosum, an-
helosum, & cui nihil nisi dura & ægrè alius infrā transmittit: nec vrina libertatem habet liberaliter ex-
eundi, sed intus subsistit cum syntimoria symptomatum, phlegmones, atque febris.

PRIMIS MORBI PERIODIS] Primo quaternario, aut ad summum septenario: quoniam
ut peracutorum morborum celerissimi sunt motus ac vehementissimi; sic eorum etiam celeritæ mu-
tationes ad interitum, vel ad salutem.

PERITVRVM] Quoniam quæ sunt omnia quæque apparent primis periodis, eiusmodi sanè
sunt, ut mortem subesse & in propinquo esse testentur, sine vlla spe defungendi pericula per hæmor-
rhagiam aut empyema. Quod sæpe accidit cum in angusto spes est, cum phlegmone systrophica iccat
occupat, quæ primis etiam morbi periodis mortifera esse dicitur.

4. Ὁ δὲ τρόπος ἔπος ἀπλείη τῶν παιδίων, μάλιστα τῶ ἐπιδεινῶν, ἐς αὐ-
πεντηκαιδεκάτην γίνεται.

*Atque hæc morbi species, potissimum septennēs inuadit pueros, donec
decimum quintum ætatis annum attigerint.*

VBI CAUSARVM est concursus, ibi morborum facilis generatio esse solet. Sed in puerulis septen-
nariis ad 15. ætatis annum, concursus est ac veluti conspiratio causarum phlegmonicarum, systrophica
in vesica

in vesica efficientium & excipientium, quibus generatio morbi absolvitur, & citz mortis prædictæ ratio comparatur. Ergo descripta morbi species, & crisis funesta, potissimum cadit in septennies pueros, donec 15. ætatis annum attigerint. Quemadmodum autem fiat, sic exponendum arbitror.

ATQUE HÆC MORBI SPECIES] In Græco est, ὅ δὲ ἑπταετίας, quo continetur omnis historia morbi prædicti, quam recensuit in specie, magnitudine, more, & motu systrophicæ phlegmones in vesica. Ac si diceret. Eorum quæ hæcenus dicta sunt, ratio & historia, quod nos morbi specie complexi sumus, breuitatis causa, nec malè.

POTISSIMUM] Μάλιστα, i. ad circiter, ut in illo. Οὕτως αὖ καὶ Σηλασιος λέγει πρὸς μάλιστα. Vbi Galenus lib. 1. 1. 1. Thucydide interpretatur illud, μάλιστα, ὡς ἔγγιστα, i. quàm proximè. Ac si diceret: inter ætates hominum, illa phlegmones in vesica feracissima est, quæ est ad circiter annum septimum, usque ad decimum-
10 quintum, vel, ut in stylo est ipsius prognoscens, potissimum hæc morbi species inuadit septennies pueros.

SEPTENNES INVADIT PVEROS] Vel etiam natu minores, si verum est quod scripsit Galenus, idem esse tempus ad opportunitatem gignendi calculum, & inflammationem in vesica. At sæpe nos à trimatu infantiam vidimus calculosam, & multis extractum fuisse calculum in quadrimatu. Sed tamen Hippocrati visum est, infantiz calculum statuere in tertia ipsius parte quæ septimum attingit annum, ac iam pueritiz nomen habet; eamque potissimum ætatem scetam esse phymatis, tum eam quæ adultior est, donec ad pubertatem ventum sit. Inuadit autem septennies cùm sic esse cœperint, ac dominatum exercet in prouectiores ad pubertatem usque: propter eorum edacitatem, qua gignitur copia glutinosi humoris, cuius in vesicam illapsu coagmentatio est lapidosa in cruditate: in corruptione autem crudelis inflammatio, quam faciliè concipit tenerrima & multum infirma pars nervosa quæ mor-
20 bificam causam excepit, nec meiando exclusit. Atque hic morbus nascitur à diætæ vitio in parte multum adhuc per ætatem infirma & tenera; propterea quæ illa ætas systropharum omnium feracissima est. sph. 17. 1.

DONEC DECIMOQUARTVM ÆTATIS ANNUM ATTIGERINT] Exacto scilicet decimoquarto, quo regnare incipit adolescentia, ætatem omnium temperatissima, quæ si cum pari temperantia esset coniuncta; ætatem omnium secundissima valetudine frueretur. At verus est illa sententia præceptoris, quod à 14. ætatis anno ad 42. natura est morborum omnium capacissima. Hic tamen finis est systropharum vesicæ propriarum, comparato partis robore per ætatem, & portione deducta humoris, nec iam ita glutinosi & crassi. Sed tamen ut propria vesicæ tollitur coagmentatio: sic aliena inducitur, ut sequens prognosis aperiet.

30 ὅ οἱ λιθιῶντες χημαπιδέντες ὥστε τὸ λίθον μὴ περσάπλειν πρὸς τὸ ὕρτημα· ρηιδίως οὐρέοισι.

Calculosi ea figura siti ut ne calculus procidat in urinaductum; facilius illi meiunt.

40 QVONIAM systropharum vesicæ, phlegmonica dicta est in essentia, symptomatis, periodis, atque crisi nunc idem faciendum de altera, cui coagmentatio lapidosa, calculi nomen dedit, vnde illi quos ipse occupat, calculosi dicuntur; neque iniuria. Sunt enim tā sēui dolores eorū quos infestat calculus in vesica, ut nullam ferè partem neque diurnæ, neque nocturnæ quietis imperiar: propterea quæ ipsis cōpetit appellatio calculosi. Vix continent se in illo cruciatu sēuissimorum dolorum, quin illud exclament; vivat mors, pereat vira mea. Nam mori se malunt, quàm cruciari sic duriter & immisericorditer, ut sine intermissione aures eorum qui præstō sunt, querelis & gemitu compleantur. Dicamus igitur de naturā crudelissimi huius tyranni, cuiusque tyrannidem destruamus. Hic non magnopere laborandum de philologia calculi. Dicendum quid sit ex mente authoris qui eum sua lingua lapidem nominavit.

Est igitur calculus, glutinosi & crassi humoris coagmentatio lapidosa. Hæc autem coagmentatio, cum in aliis partibus formam obtinet calculi: tum verò potissimum in vesica, ut mox dicetur; vnde
50 homines calculosi dicuntur. Lapidosa coagmentatio in vesica, duplicem habet matricem, quod πρῶτον veteres nominarunt: vnam in rene; alteram in ipsa vesica. In rene quidem, cùm ante cœptam ductū urina, quod est Hippocrati πρὸ ὕρτητος, coagmentatum illic sabulum, in vesicam illabitur, nec inde citò exclusum, corticatum crescit, & in eam calculi molem assurgit, ut intolerabile sit pondus vesicæ. In vesica autem matrix est, perfectio urinae ductu, quod est μετ' ὕρτην apud Hippocratem, cùm ipsa per se sit coagmentatio lapidosa, quam vocat præceptor τὸ σπύγμα: quæ facilis est à glutinoso & crasso humore qui stabularur atque subsistit in vesica debili puerorum, vel hominum grandæuorum, aut certè ingru-
60 uescentis ætatis. Fuit enim præceptoris iudiciū, non nasci calculum in vesica, nec ipsum per se coagmentari perfectio urinae ductu, quod est μετ' ὕρτην, à 42. ad 63. ætatis annum. Cæteræ omnes ætates in promptu causas habent coagmentandi calculum in vesica, ob vitæ genus omne quod sectantur voluptuariæ. Sed in puerili ætate causa est τὸ σπυγµατικὸν μετ' ὕρτην, copia humoris crassi ab edacitate, ipsæque urina crassa quæ diutius in vesica imbecilliore subsistit; propterea quæ rectè consulunt qui pueros de nocte excitant ad meiendum, ipsosque ut fortiter meiant, hortantur. Sed epheborum, iuuenum, consistentium ac declinantium ad 63. ætatis annum, coagmentatio in vesica, ferè matricem habet in renibus de qua iam diximus. Atque in his ratio & experientia locum habet doctissimi viri Ioannis Fernelij,

qua sustinet, omnes vesicæ calculos, *κατὰ φύσιν* habere à renibus: quod in omnibus calculis, quos ipse fregit plurimos, nucleus quidam sit ruber, quem corticatum pituita inuoluit. In pueris fallax est Fernelij experientia, nec inde certum iudicium comparari potest. Idem etiam de grandænis dicendum post 63. ætatis annum. Nam si forte cuiusdam pueri aut senis prædicti calculo inuentum est *κατὰ φύσιν* nephriticum: non tamen efficitur idem esse in cæteris, quorum coagmentatio lapidosa vesicæ primigenia est. Sic enim præceptor, puerorum calculos coagmentari docet *μὴ ὑπὸν*, perfecto scilicet vrinæ ductu qui perficitur in vesica. Vbi Galenus author est crassamentum vrinæ quod est in pueris, cum in vesicam illapsum cunctatur atque subsistit, nec exitum citò habet, initium ibi capere condescendi & coagmentandi: ac tum iacto eo concretionis fundamento siue initio, quicquid deinceps affluit, similiter crassum ut prius, faciliè adplasmari, unde corticatum auctus, maior assurgit *κατὰ φύσιν* *λίθος*, i. lapis tephaceus, qui ab Hippocrate nominatur *συνάγμα*, i. coagmentatio. Pari ratione grandæni *κατὰ φύσιν* habent in vesica, coagmentati calculi.

Ergo vesicæ calculus vndeunque principia causasque duxerit, cum in maiorem molem accrevit, accrescit autem granatim aut corticatum, ut iam vesicæ imperio regi non possit, admirabile est quam seculi doloris cruciatu ipsam exerceat quotiescunque incescit meiendi cupiditas. Incescit autem frequenter, non tam vrinæ copia & acrimonia, quam ipsius vesicæ, sui nimium diligentis, temeraria contentione atque conatu. Est quidem sui diligens lege naturæ, qua duce anquirat viam qua se tueatur atque conseruet: sed *ὡς ἐν σφαίρῳ*, ut ait præceptor, i. non præueniente consilio nec ratione; cuius quidem inops, irritam habet contentionem, quoties illa contendit concutiendo excutere id quod intrà sæuam exhibet sibi molestiam. Ac tum pro calculo, vrinam stillatim ac difficulter exprimit. Tum collectà omni ex parte vesicâ, tephaceus lapis in fistulam procidit vrinariam, ægrumque diris cruciatibus, velut barbarus quidam tortor, exercet. Afflictio autem vesicæ, quam infert coagmentatio Hippocrati lapidosa, aut Galeno lapis tephaceus, nominatur à præceptore *λιθίασις*; & qui ab ea vexantur, *λιθιαστοί*: Latine, Celso interprete, *calculosi*, ut mox dicitur. Sed eam *λιθίασις*, *λιθία* quoque dici reperio ab Hippocrate, vbi de ortu calculi pulcherrima disputatio est.

Eius in vesica coagmentati ponuntur hæc signa, quæ Celsus ex illo loco sic fecit Latina. Difficiliter vrina redditur, maximeque circa finem emissionis, paulatimque interdum sine voluntate destillat (quia contineri nequit, ut in stranguria.) Eadem arenosa est: nonnunquam sanguis, aut cruentum, aut purulentum aliquid cum ea excernitur. Eamque quidam promptius resti; quidam resupinati, maximeque hi qui grandes habent calculos; quidam etiam inclinati reddunt, colêmque extendendo, dolorem leniunt. Gravitas quoque cuiusdam in ea parte sensus est (& in podice); atque ea cursu, omnique motu augetur. Quidam etiam cum torquentur, pedes inter se, subinde mutatu vicibus implicant. Fæmina vero oras naturalium suorum manibus admotis scabere crebrò cogitantur: ut mares præputium. Sed nos ad *πυλὸν* calculosæ vesicæ, hæc signa syllogistica obseruamus, præter causas coagmentandi, & gravitatem partium vicinarum. Sunt autem; crebra meiendi cupiditas, cum difficultate maxima in mictione extrema, tum vrina lactea, crebrò etiam diuersis coloribus variegata.

Iam verò in hac torsione calculi quæ celeritatem curandi exposcit: quia sæuus dolor non habet iures, ut inanem verborum audiat consolationem, atque ipsa quoque celeritas mora est: tamen illud crudelitati adiicitur, quod ipsa curatio crudelissima sit, & ad eam, præcipitem festinare nullo modo conueniat. Cautio magna virium, gratis, morbi ac temporis esse debet in eo remedio, quod, cum aliter succurri non potest, necessariò adhibendum. Est autem incisio qua è vesica calculus euellatur, ut, eo euulso, vesicæ redintegratio sit, actionum libertas, & quies symptomatum omnium quæ tum à calculo in vesica enascuntur, & læsa vesica in societatem vicinarum & lociarum partium propagantur. Sed ea incisio, cutis & carnis laceratio, tum calculi è vesica euulsio, non rarò eiusmodi sunt, ut ea subire nihil aliud sit quam mutare periculum, non effugere. Et tamen sic visum est dictatori, euellere calculum è vesica; neque aliud remedium edicto sanciuir, quod ipse tamen adhibere noluit: sed aliis adhibendum reliquit. Solenne est illud edictum, quo medicorum ora complentur. *Οὐ πῦλον δὲ διδμελὺν λιθίαστος· ἐκ χειρὸς δὲ ἐπὶ γυναικὶν αὐτὰς ἀποκτείνουσιν*, i. Nihilominus autem non incidam calculosos: relegabo ad viros artifices tante operationis. Et verò Galeni sublimis est philosophandi ratio super morborum natura quos Hippocrates vocat *ἐν πυλὶ*. Inter alia eius precepta quæ sunt eximia, illud est commemorabile, quod puerorum calculus in vesica enatus, non eo gaudet ætatis beneficio quo puerilis epilepsia, quæ inoffenso vitæ & viuentis cursu, in pubertate sanatur. Nam quod longius ætate proceditur, eò calculus maior fit ac ponderosior, nec nisi ope chirurgica euelli potest, nec vllò modo excludi. Hic superstirio esset vel ostentatio, causas adferre cur ei curando, nulli medicinæ sit locus. Fremant licet omnes Paracelsi; ridicula sunt eorum triscurria. Exemplum desidero sanationis: non autem mortiferæ curationis vel potius carnificinæ quam temeraria eorum medicina exercet.

Possent hic ego, perinde ac idoneum nactus locum, multorum historiam recensere, quos eorum periclitatio ad crudelissimam mortem adduxit. Sufficiet illud exemplum quo sapientissimus doctor Hippocrates documentum statuit, ne sui discipuli talem amentiam imitentur. Historia sic narratur. *Λατρίσσει Θεοφωρῷ* puer, calculosam habebat vesicam; glutinosum quidpiam permeiebat, idque difficulter cum sæuo dolore, tum initio, tum faciens finem meiendi. Præputium manibus confricabat. Hic cum bibisset acerrimum diureticum, nihil in vesicam secessit, nihil è vesica excessit: vomuit autem multum puriforme & bilem. Ac tum huiusmodi altera trans mittebat infra per aluum. Venter dolebat admodum, & intus incendio conflagrabat; reliquum verò corpus frigidius erat glacie. Omnibus membris captus est, nec voluit quicquam assumere. Huic magna erat ipsius alui exulceratio, à forti nimium medicamento seu pharmaco. Perit, à potione tertium agens diem. Ergo nihil opis adfert

6. Epid. part. 5.

Idem penè ad verbum legitur lib. 4. *τρίτης*, vbi agitur *τρίτης* *λιθίασις*.

6. Epid. part. 5.

Ibid.

lib. 3. aph.

lib. 4. *τρίτης* *λίθος*.

cap. 7. lib. 2.

lib. 4. *τρίτης* *λίθος*. 5. Epid. de pueri Theophorbi.

6. Epid. part. 5.

6. Epid. part. 5.

5. Epid.

FACILLIVS. ILLE OMNIVNT.] Cum antea difficulter meierent, dum se inus opponeret calculi, ac tum res ipsa cogeret manu emolui urinam. Cæteras autem causas difficulter meieri, & ischuriæ ipsius, hoc nihil necesse est aduocare, nec singulas cuiusmodi sint examinare.

Eiusdem symptomatis ut multi sunt morbi; & morbi eiusdem, ut multae sunt causae: sic varia redintegratio esse debet, quam *ἐπιρρησις* Græci vocant: proptereaque varia medendi ratio adhiberi. Commune symptoma est dysuria multorum morborum, quibus imbecillitas, impotentia & impeditio

comparantur faciendi vrinam. Fibratum laxitas in vesica, imbecillam facit vim expellendi. Eadem quoque impotentiam infert meiendi, exoluta prorsus vesica. Idem facit *αἰασις* vesicæ, i. *senilis amissio*, unde nulla sensio excitatur vrinæ stabulantis in ipsa vesica. Fistulæ oppilatio dysuriam parit vel ischuriam. Oppilationis autem, quæ morbus est, causæ sunt; puriuita, sanguinis grumus, rophus, coagumentatio lapidosa cum procidit ad vrinæ ductum; item tuberculum fistulæ vrinariæ primò exortum, tum illud succrescens phyma per hypercarcinon natum vrinariæ fistulæ vlceratæ, quam exulceravit fœda colluvies illac transmissa ex impuro coitu, cuius virulentia prostratam glandulam cum inflammatione turgidam tumidamque reddidit; unde pissæ calidæ vulgò dictæ. Hic dysuriæ symptomatis vnicum ponit morbum, qui est *πρὸς οὐρῶν*, i. *meatus vrinarij oppilatio*; cuius duplicem tantum causam attingit; vnam, rophacci lapidis appulsum vel illapsum; alteram verò, phyma in meatu exortum. Vtriusque causæ distinctionem vno constituit argumento, quod est eiusmodi, ut inde sit facile *ἀντιπαρα* ipsam inire *διαγνωσις*, *πρὸς ἰατρικῶν*, i. *diagnos*, i. *canonem statuere cognoscendi, prædicendi, & rectè curandi*. Quæ tria sunt medici officia quibus inuenitur veram laudem, & amicos parari. Est autem hoc argumentum.

AT QUIBUS TUBERCULUM EST.] Græcum illud *φομα*, quod latè patet, omniæque suo velut ambitu complectitur quæ in us foris & intra pullulant in compagine vniuersi corporis, singula- rumque partium; consultò ex mente authoris restricti ad tuberculum quod in phlegmonica sytlo- phe continetur, vt illud. Εν δὲ τῷ πλεῦρι γίγνεται τὸ φώμα: vbi agitur de pleuritide. Et verò super hac quæ- stione bis proposita in aphorismis, nomen τὸ φώμα idem significat, quod Latine *tuberculum*, vbi sic le- gitur. Οὐκ ἐστὶ δὲ τὴν οὐρῆν φώμα γίγνεται ποτὶ οὐκ, ἀεὶ πῶς αὐτὸς καὶ ὁμοειδές, καὶ οὐκ. i. Quibus tuberculum est in urethra, i. in urinx ductu; iis, pure factò atque prorupto, morbi dimissio et libertas meiendi. Ergo. QVI-

BU-S TVBERCULVM EST.] i. Phlegmonica quædam sytrophe quam facit rheuma concitatum atque consistens; v^t cæteræ omnes morborum sytrophæ enascuntur: hîc autem enata, aut prima congerie, aut secunda: vt in iis quibus à fœda colluue vlcus edit *ἡσπιδίον*, quæ carnositas vulgò dicitur.

CIRCA VESICAM.] In ea parte quam Hippocrates vocat *τὴν οὐρησπῆν*, i. *urethram*; Galenus interpretatur *πορὸς οὐρητῶν*, i. *meatum urinarium*, cuius descriptio est anatomica superiore prognosi. Appositè autem circa vesicam dixit, vt intelligatur pars ea quæ ministra est vesicæ, non corpus ipsum vesicæ, cuius inflammati prima fuit decisio huius historiarum de morbis vesicæ.

QVOD EXHIBET DYSURIAM.] Vel ischuriam: quò spectare dixit Galenus aphorismum supradictum, ubi lectorem incitat ad scopum visendum, quem illic præceptor non posuit cōceptis verbis, ut in hac prognosi. Quæ res, ut spero, æquior emihi reddet Galenum, in æstimatione harum prognoscon Coacarum. Ergo vrethæ phyma siue tuberculum, exhibet dysuriam vel ischuriam; non quidem impotentia vel difficultate meiendi, à laxitate fibrarum; nec verò à sensus amissione, obliâ sui vesicæ: ut nulla impotentiz, vel imbecillitatis, vel sensus amissi opinio sit: sed exeundi & transmittendi extrâ, libertate adempta. Est autem impeditio, intercluso meatu à phymate. Atque hanc difficultatem meiendi, curandam præcepit Hippocrates, ex diorsino Galeni, detractio sanguinis, incisa vena interiore malleoli, è directo. *Dysuriam phlebotomia exolvit: secunda autem vena interiores.* Vbi Galenus sic legendum censet. *Dysuriam & phlebotomia exolvit, &c.* Cætera autem non tollit venæ sectio, vnde impeditio est meiendi. Huiusmodi autem sunt; calculus, tophus, pituita gypsea, grumus, & vetusta caruncula. Nam ad imbecillitatem vel impotentiam, tantum abest ut valeat, ut plurimum noceat ipsa venæ sectio: sicut ad vesicæ *αισθησις, ὅτι τὸ κατὰ φύσιν αὐτῆς ἐστὶν αὐτῶν ὑποπό, καὶ μὴ ἀδυνατεῖ τῆς αἰσθ.* i. perfrigerato, qui est 40 in ea, nervo; nec urina molestiam sentiente.

QVOVIS ILLI MODO SINT COLLOCATI] Inclinati, recti, resupinati, proni, & in alterutrum latus conuersi: denique quoquouersum illi se verterint, doloris leniendi causa, & emolliendæ urinx.

TORQUENTVR.] A dysuria & ischuria : quoniam nulla collocatio, neque figura oppilationem tollit meatus à phymate : sicut à calculo procedente. Nam & vrethræ suis idem semper est situs, nec loco mutatur ut vesica : tum phyma ipsum firmiter est vrethræ affixum, neque oberrans ut calculus; isque vel sua sponte, vel appulsu vesicæ ad vrethram, dum ita se colligit in reddendo urinam, ut nihil reliquarum superfit. Atque hoc solo argumēto diorismus comparatur calculi atque phymatis, cum alterutrum dysuria est vel ischuria. Nam multum sanè interest quæ utrique morbo sit adhibenda curatio. Ac præfacta est quidem ratio curandi calculum, secando & euellendo. Hæc autem vera est phymatis.

SANATIO HVIVS] Tuberculi, quæ perficitur amore omni causa morbifica, & redintegrata parte quam phyma exercuit.

ATQUE LIBERTAS EST] Meiendi, quæ prius impedita fuit, vřethra phymate occupata. Sic enim nomen *πρὸς λύσιν* accommodari duximus ad morbum, phyma; & ad symptoma, dysuriam vel ischuriam: quod sæpe tam præceps est, vt antequam phyma mitificari cœperit & expurgari, vřethram incidere non raro sit necesse ad emolendam vřinam, quæ diutius in vesica nequit subsistere, quin eius suppressio crudelissimam mortem secum adducat.

PURE PRORVPTO] Quo sylvstrophe omnis phlegmonica firmiter fixa, gangtanam arce, & occupata partis redintegratio comparatur, cum libertate naturalium actionum. Est enim bene cuiusdam phymate occupato, cui aliter succurri non potest, quando ipsum phyma vertitur in empyema, & ruptio empyematis liberum habet exitum in pure laudabili: quemadmodum supra ostendit curatio inflammatae vesicæ, & empyema pleuritidis & peripneumoniz, rum hepatis inflammatione obfessi.

7 Οἷσι λανθάνει τὸ οὖρον παρὰ τὸν αἰσθητικὸν ἐς τὸ αἰδοῖον· ἐκλύονται ἀνέλ-

πυδοί.

Quibus urina clam illabitur ad pudendum; exoluntur desperati.

DE DYSURIA & ischuria cœpi agere, quatenus enarratio superioris prognoscos exige-
 bar, non vltra. Hic visum est subiungere clausulam vtriusque, priusquam ad aliud transcam quod mea
 festinat oratio, vt disputationem finiam de morbis vesicæ. Est autem hæc clausula. Quod dysuria &
 ischuria, quæ sunt affines, ac differunt tantum κατ' ὄψιν καὶ μάλλον, i. per magis & minus; quod, in-
 quam, affectiones illæ cadunt in vesicam plenam, non vacuum, cuius illæ sunt propriæ; & ibi, non
 alibi, verè huiusmodi sunt, atque dicuntur. Nam ischuria critica, sudoris prænuncia, quam vocat
 præceptor πῶς ἔστιν ὁπότερ' ἐν τῇ ῥίμῃ, i. urinae suppressionem ante rigorem; tum symptomatice, renum
 vitio & vtererum; καὶ παρὰ τὴν κατὰ φύσιν, i. presumptione quadam & abusu nominis appellatur.
 Non enim urina est donec serum descenderit in vesicam: vt eius cohibitio esse non possit, antequam
 ipsa sit. Ergo dysuriæ & ischuriæ causa omnis posita est vel in vesica, vel in vrethra. In vesica est ἀπῆλ-
 αῖσθησις, i. exolutio vel sensus amissio. Exolutio labefactat vim expultricem vesicæ. Sensus amissio; ne-
 gligentem & oblitam sui reddit vesicam: quod nulla exciteretur urinae sensio, cum debeat esse molesta
 qualitate aut copia. In vrethra oppilatio est, quam facit aut phyma siue tuberculum, aut lapis top-
 hæus siue coagmentatio lapidosa quam Celsus Latinè calculum nominavit. Sunt quidem plures aliæ op-
 pilandi causæ. Sed illæ tantum prædictæ, posita sunt à præceptore. Oppilatio hæc fistulæ vrinariæ,
 quam nominavit vrethram, vesicæ contentiorem frangit in transmittendo urinam quam exitu probi-
 bet, atque meiendi adimit libertatem. Iam verò determinata quæstione super impotentia aut difficul-
 tate reddendi urinam; sequitur vt alteram determinemus super urinae incontinentia. Incontinentiam
 dico urinae, intempestiuam eius excretionem, cum scilicet ipsam continere non potis est, effluitque
 aut sua sponte, aut nostra, velimus nolimus: dum scilicet crebro cogimur ad eam reddendam, quod
 Græcè est παρὰ τὸν αἰσθητικόν, i. coactu eius. Itaque duplex omnis ratio est huius incontinentiæ, vel intempe-
 stiæ excretionis; vna quidem iniussæ; altera verò inuitæ. Iniussa est incontinentia, cum ἀπαρτίως
 fluit urina, i. sine voluntate, ac sine sensu, cuius ratio est in hac prognosi. Inuita autem, cum ægrè cogi-
 mur latere claustrum sphincteris, vt exeat: quod cernere est in stranguria, de qua prognos̃is est vltima
 huius tractatus. Sed incontinentiæ, quam diximus esse iniussam mictionem, causa omnis & ratio in-
 notescet ex hac prognosi.

6. Epid. par. 1.

comment. ad
 proth. 16.
 c. 1.

QVIBVS] Meiendi non cupidis: quod nulla sensio sit urinae in vesica collectæ.

VRINA] i. Collecta & stagnans in vesica colluies, vel potionis crudæ, vel feri humorum qui sunt
 in venis, vel etiam partium liquefactarum. Est enim hæc triplex vrinæ materia.

6. Epid. par. 1.

CLAM ILLABITVR AD PV DENDVM] i. Quæ fluit immemori, ac si lectum
 in somnis commeeret: quod est sine voluntate ac sensu. Nam mictionis iniussæ vtraque ratio conti-
 netur hoc stylo.

CLAM ILLABITVR AD PV DENDVM. Etenim duplex omnis
 consideratio est vacuationis iniussæ, ἢ δὲ πῶς καὶ πῶς, ἢ δὲ αἰσθητικῶς καὶ ἀσθητικῶς. Etenim duplex omnis
 i. aut quia mens aliud agit, aut quia sensus amissio est partium quæ ei vacationi dicata sunt. Sensus amissio-

proth. 46.
 c. 1.

ibid.

nem illæsa voluntate illud declarat. Ἀπὸ καλῆς καὶ ἀπὸ κακῆς αἰσθητικῆς διένεας, ἐόντα παρ' ἐαυτοῦ καὶ ἄλλου, ὃς ἡπατικῶς.

i. Ex alio tenuia infra transmitti, nec sentienti, cum tamen apud se sit; male est: sicut hepaticæ. Occupatæ men-
 tis ac voluntatis amissæ documentum est illud. Τὰ ὑρῆματα, καὶ ἀπορροαί, ὁλέθρια. ἅρα καὶ τυφλοῖσι ὑρῆ-
 ματι, ὃς ἡ πῶς καὶ πῶς αἰσθητικῶς; i. Quæ immemoris mictu redduntur; lethalia. Etenim his meiuntur simi-

proth. 17.
 c. 1.

liter vt si perturbaueris ipsam hypostasim? Ac si diceret: cum pestifera est omnis urina quæ sine sensu ac
 voluntate redditur; tum verò ea maximè quæ similis est iumentorum: quoniam vtriusque principa-

tus summa imbecillitas ac deprauatio indicatur, naturalis & animalis. Quod autem plures principatus
 in vitio sunt, eò res ægri peius eunt. Talem exercuit παρὰ τὸν αἰσθητικόν in lethargicis, de quibus hæc scripsit.

50 Biliosa est alius cum impotentia continendi; quæ si fortè astrictior est, attamen urinae & facies, clam ægro, iniussæ
 transmittuntur infra & extra. Ergo urina, vesicæ imperio, sua sponte, non nostra, dum occupatur ani-

“

“

Coac. 147.
 c. lib.

mus, aliudque agit, nec vlla sensio est phantasie, nec vllum regimen ἢ ἡγεμονικῶς; illabitur ad pudendum:
 quod sensus amissionem, & laxitatem indicat ianitoris muscoli, olim sphincteris, qui eam non prohibet

transitu ad pudendum, cum illac sit ei transcendendum. Nam simulatque ad pudendum illapsa est, nulla
 restat potentia continendi, quin effluat.

EXOLVNTVR] Sic enim ἐκλύονται, olim legendum duximus, αἰτ' ἢ ἐκλύονται. Est enim pudendi
 reuulsio, laboris grauissimi argumentum, ac periculum subesse testatur mortiferum. De qua sic ait

præceptor. Ὁρχεὶς καὶ αἰδοῖα αἰσθητικῶς· πόρος ἰσχυρὸς σημαίνει, καὶ κίνδυνος θανάτου δέσσει. i. Testiculi & pudenda re-

lib. 2. prog.

uulsa, labores denunciant acerbissimos, periculumque subesse mortiferum. Sed hæc nulla est æquitas, conuul-

60 sionem locare cum laxitate. Sunt enim αἰσθητικῶς, pudendi reuulsio siue contractio, & sphincteris mi-

sculi resolutio: præsertim cum ipsa facultas in vitio est, perinde ac instrumentum. Quod cernere est in
 hac prognosi, vbi cum impotentia continendi urinam, coniuncta est deprauatio voluntatis. Ergo exol-

vuntur, collapsis omnibus naturæ præsiidiis in animalitate sensus & morus, tum in nutrimento partium
 nutritiarum & principatu cordis vitali.

DESPERATI] Sine vlla spe poriondæ & perfuendæ salutis, cuius desperatio in cuiusque vitalis

Hh ij

officij vacuitate consistit. Nam exolutionis desperata multa sunt alibi à nobis conscripta. Hæc autem prognos potissimum ad eos pertinet qui mente sunt capti.

8. Ἐπὶ στραγγεῖν εἶλεται ἡπιχρόνιον· ἐβδομαίους δὲ πολλοὺς. καὶ μὴ πυρετὸς ἡπιχρόνιος, ἀλλ' ὁ ἔρως ἔλθῃ.

*Stranguria ileus superueniens: septimo die perimit: nisi oborta febre
urina fluxerit cumulata.*

ERAT EX illis quæ proposita sunt, illud extremum, ut de vrinæ incontinentia diceremus, cuius excretio est non iniussa quidem, ut superior, sed inuita. Quæ duplex omnino est ratio incontinentiæ. Ac de iniussa quidem, quam ἀπερσπρωτο Græci vocant, tum mentis labore, tum sensus amissione, & laxitate sphincteris musculi qui ei vacuationi ex voluntatis imperio suam dicauit operam; dictum est abundè suprâ. Nunc de inuita dicendum.

Est igitur illa demum inuita, quæ contra voluntatem, suo coactu exit, quæque subinde nos cogit musculi ianitoris claustrum laxare, nec desinit esse molesta quando paulatim ægrè destillat. Eius inuitæ functionis, ab ægro multæ sunt causæ, quarum maleficientia præceps vrinæ & crebra destillatio est. Præcipitem dico, quæ redditur ægro inuito, sine periodico vesicæ conatu, qui esse solet cum vrinæ copia vesicam distendit, ipsamque excitat ad liberalem & liberam vacuationem rei molestæ. Talis inuita vrinæ destillatio quæ stranguria est, proportionè respōdet ei lienterici cuius præceps egestio est ab impotentia continendi ea quæ assumuntur, quam edit vel aluus aphthosa, vel proritata morfu portionis aut cibi. Omnis enim stranguria fit, aut morbo vesicæ, aut eius symptomate. Morbus quidem est; exulceratio, vel coagmentatio lapidosa. Symptoma autem, proritatio quam facit triplex vrinæ materia quæ in vesicam confluit. Ipsa autem meiendi molestia, proximè ad tenesmum accedit, in quo similiter ani sphincter laborat, ut vesicæ in stranguria. Hic primum dicam de triplici vrinæ materia, vnde proritatio est vesicæ.

Prima est potionis præcipitis, ut vini albi Germanici calce infecti; aquæ vini; tum vini albi, cantha-
ridibus medicati; præterea fontium Leodiensium, chalcantio medicatorum; denique diureticorum
6. Epid. part. 5. omnium fortiorum. Talem vrinam scripsit esse Hippocrates ἐμύχρον βρώματι καὶ πόματι. Altera vrinæ ma-
teria stranguriosa, est serum biliosius eorum qui sunt in venis humorum. Atque hæc stranguria, non ra-
1. Epid. part. 2. rō est critica & salutaris. De qua illud scriptum est à præceptore. Ὡς εἴδηται ἐν τῇ ὕμνῳ τῇ μεγάλῃ, καὶ ἐν τῇ ὕμνῳ τῇ μικρῇ. Vtile fuit vnum maximumque omnium
quæ apparebant signorum, ac plurimos liberauit qui erant in maximis vitæ periculis, quibus conuersio facta est ad
stranguriosam vrinam. Vbi Galenus author est; vniuersitatem corporis æquè sic expurgari per vrinæ du-
ctus, atque per aluum & intestina. Tertia restat vrinæ materia liquefactæ, cuius liquamine proritatio
est vesicæ atque sphincteris, ad stranguriam. Sed antequam de ea dicam, hic defraudari nolim lectorem
ea sententia præceptoris, vbi docetur triplex illa, quam memorauimus, vrinæ materia. Est autem his verbis
6. Epid. part. 5. Οὗτος ὁ μύχρον βρώματι καὶ πόματι, καὶ ὡς εἴδηται ἐν τῇ ὕμνῳ τῇ μεγάλῃ, καὶ ἐν τῇ ὕμνῳ τῇ μικρῇ. i. Vrina tum cibo et po-
tioni est concolor, tum qualis esse consuevit, tum vbi est humidi colliquatio. Ac primum, humoris liquamen sic
início lib. 2. legitur in nostro Larino ex Græco Hippocratis. Crebrò vrina redditur cum incaluerit multum caput. Liqui-
tur enim pituita in eo. Liquefacta autem, partim ad nâres abit, partim etiam ad os ipsum, partim per venas con-
fluit quæ ducitur ad pudendum. Quod simulatque appulsi, tum meit is quem lacepsit, eandemque molestiam experi-
1. Epid. part. 2. tur cuiusmodi esse solet à stranguria. Huc spectat etiam quod idem scripsit præceptor de perinthea put-
lentæ & stranguriolæ vrinæ, quæ tamen non erat huiusmodi renum vitio, aut vesicæ. Et ea quidem per-
tinent ad stranguriam quæ ipso symptomate fit vesicæ, non morbo. Nam sæuo dolore crudelissima est
illa stranguria, & firmiter fixa, quæ morbi symptoma est in vesica. Morbus est quidem stranguriosus,
exulceratio, quæ idem facit in vesica, quod aphthæ in aluo. Ut enim ex aphthis incontinentia est cibi &
potionis in aluo: sic in vesica exulcerata, vrinæ. Hic finis non fit meiendi cruentum quidpiam, aut pu-
rulentum, sicut à renibus exulceratis. Notum est illud, si sanguinem quis aut pus meiat; vesicæ, aut renum
exulceratio est. Stranguriosa est etiam prostaticæ glandulæ inflammatio & vlcus, vnde colluvies illa fœda
quæ vulgò est pissæ-calida. Stranguriosus item calculus, ut suprâ exposui. Ergo inuitæ functionis ad
meiendum, & stranguriolæ vrinæ, distinctio est multarum causarum: sicut rectè monuit noster præ-
ceptor, cum ait. Στραγγεῖν ὅπου μὴ πολλοὶ καὶ ποικίλοι. i. Stranguriæ modi sunt varij et multiplices. Quæ cum
ita sint, iam loco à nobis exigitur ut quæstionem propositam decidamus, qua ponitur stranguriæ ad
ileum propagatio. Decisio autem erit, ipsius prognosæ explicatio, quæ sic habet.

STRANGURIA] Quæ posita est in expressione inuita vrinæ, non quidem vesicæ morbo, sed
eius symptomate quod inferitur pituitæ putris & glutinosæ appulsi, quæ difficulter & ægrè exprimitur,
nec liberum habet exitum suo coactu, sed paulatim destillat: vnde stillicidium dicitur, vel vrinæ sub-
stillum.

ILIVS] i. Variusque intestini, sed crassioris præsertim, hoc loco, sursum reuolutio, quæ nec aluus,
nec flatus infra transmittitur: sed cum inueterauerit, stercus per os redditur. Non enim hæc reuolutio
est tenuioris intestini à phlegmone. Sed intestini crassioris oppilatio, causa est ilei, de quo hæc philoso-
phirest

phia est præceptoris, quam suprà positam, hic denuo scribere non pigebit. Hic morbus, inquit, enascitur quando perusti stercore copia est atque subsistit in intestino, ubi pituita inuoluitur, eorumque duorum congerie cumulat clausum intestinum distenditur.

SUPERVENIENS] Non quidem retrogressu pituita in vesicam illapsa, ad crassius intestinum; nec intestini oppressione à vesica: sed pituita illabentis in utramque alucum propagatione, aut pariter in utroque cumulata congerie.

SEPTIMO DIE PERIMIT] Hic enim potissimum locum habet perceptum illud Hippocratis, quo statuit omnem morbum qui alter superuenit alteri, non raro esse mortiferum. Est autem ad intestinum præceptus ileus, ut suprà ostendimus. Pertinet etiam, quod penè omiseram, ad ilei, cuius hic mentio est, *Σπλην*, quod super ortu eius scripsit Galenus. Cum, inquit, exulceratio levis est intestini, si à ciborum transitu proritetur, nec exitum cito habeant; tum certè accidit ut intestinum hac noua proritacione afflictum, sursum remittat ea quæ ipsum lesura erant, ac mutata velificatione, cursum deinceps, contra naturam, sursum inflectat, quem olim naturaliter deorsum tenebat.

NISI OBORTA FEBRE] Ex collectione, motu, & putredine bilis acertimæ, quam genuit sœui doloris acerbitas, cum vacuitate somni coniuncta. Nihil enim perinde facit ad sanguinis corruptionem, unde bilis prouentus, ac sœui doloris cruciatus, & fortes vigilæ. Sit autem febris acuta, quæ prius non fuit; aut, si prius fuerit, exacerbata: ut suprà demonstratum est in conuulsione.

VRINA FLUXERIT CVMVLATE] Quæ antea destillabat paulatim, & ægrè. Sic enim stranguriæ & ilei materia vacuatur, quæ intestino sursum reuoluto in ileo, infra transmitti nequit, ac tantum per vesicam, eius vacuatio molienda, quæ aliter fieri non potest. Ad eam moliendam vnicè valet exorta febris acuta, tenuando, incidendo, vrinæ ductus explicando, naturamque ipsam veteriosam excitando. Ac sanè idem hic facit febris acuta, quod in conuulsione, cum ea repenè incidit, neruis à frigido & glutinoso humore distentis. Pugnat autem pro me illud Galeni perceptum quo hanc prognosin positam in aphorismis oppugnat. Scimus, inquit, eos tantum morbos iuuari siue curari à febris, qui consistunt in frigore, vel qui à frigore sunt enati, quod vel ipsum est per se, vel cum humoribus crudis & pituitosis, vel cum spiritu flatulento. Non enim hic stranguriam agnosco à morbo vesicæ: sed à symptomate quod pituita appulsu infertur. Nec verò ileum à phlegmone intestini editum, sed eum quem ex Hippocrate & Galeno descripsimus. Quid verò? nonne huc spectat etiam quod scripsit Hippocrates de pituita inter diaphragma & aluum illapsa; quæ per decubitus in vesicam exoluitur, cum aliter exolui nō potest?

DE APOPLEXIA, PARALYSI,

ET PARAPLEGIA.



ΑΡΚΑΙ καὶ ἀνααιδησίαι ὡς δὲ τὸ ἔδος ἡρόμεται· ἀπο-
πληκτικῶν συμπενομορῶν σημεῖον.

CAPUT
XXIII.

1 Sensus hebetudo, & eius amissio, si fortè inciderint; futura denunciant apoplectica.

ETSI CEREBRI morbus est apoplexia: quia tamen corpus vniuersum prostermit, à quo prostrato nomen habet; huc differri iure eius tractatio debuit, postquam explicati morbi sunt qui caput & ventrem propriè afficiunt. Adde quod apoplexiæ nomine paralysis & paraplegia continentur, quæ magis in membris quàm in cerebro esse videntur.

ERGO ut rem propius iam attingam. Capitis cerebrique repleti & proritati, suprà demonstratum est, omnino symptomatum quatuor esse genera; cephalalgicum, cataphoricum, paraphoricum, & catarrhoicum. Pertinet genus omne τῷ ἀποπληκτικῶν, ad catarrhoicum: quando scilicet apoplectica, ut hic docetur, à cerebro enascuntur. Nam apoplexia *κεῖως* dicta, resolutio est vniuersi corporis: paralysis dimidiati: paraplegia autem, quorumlibet artuum. Atque hæc tria symptomata, hic, nomine τῷ ἀποπληκτικῶν continentur: ut mox dicemus. Nascuntur autem, significata signis hic positis; alia quidem in cerebro; alia verò à cerebro. Sanè apoplexia, in cerebro quidem nascitur per catarrhum quo cerebrum ipsum valde oppressum fatiscit, & vim animalitatis nullam edit, cum amissione sensus & motus in vniuerso corpore. Paralysis verò & paraplegia, per catarrhum qui à cerebro foras transmittitur in cerebri ipsius propagines; vel, ut Græci nominant, *περικύπτει*; videlicet ad spinalem medullam, & neruos. Sed eorum symptomatum natura omnis, & ratio atque distinctio, infra suo quæque loco dicetur. Ergo in apoplexia, *κεῖως* dicta, collapsa repenè cernitur animalitas ipsa, in amissione sensus & motus; idque principatu eius constricto; vel spiritu animali concluso; vel dissipato, nec instaurato. Nam quod incidente primùm apoplexia, stertor ad tempus auditur, qui est cum motu; eò certè fieri narrat Galenus, quod magna spirandi necessitas in æstu & impuritate cordis adhuc micatis, nec tã cito extincti, neruorum

spirabiliū vim excitat ad respirandū, quamvis egrē. Ac tū suffocatio est in propinquo, cum stertor adest.

- Animalitatis collapsæ, quæ cernitur in amissione sensus & motus, causa potissimum agnoscitur à præceptore, constrictio cerebri qua spiritus animalis, facultati morem non gerit, nec vllam iam edit officium *ἀπορροήτης*. Talis in promptu est apoplexia de qua præceptor hunc posuit aphorismum. *Quibus concussus est cerebrum, quavis de causa; necesse est ipsos continuo fieri voce captos.* Vbi Galenus author est, per aphoniam intelligi motus & sensus amissionem, quæ cernitur maximè in iis qui capti sunt voce.
- aph. 14. 7. Huc spectat & illud quod idem sic annotauit. *Ἐν πλῆθὶ ἐς τὸ κατὰ τὸν ἔκπληξιν, ἢ ἀπορροήτης καὶ ἰ. ἡ* plaga in capite accepta, attonitum fieri, vel mente capi; male est. Vbi Galenus hæc scripsit. *Ἐκπληξίς ἐστι· ἡ μὴ φέρεσθαι π, μὴτε ἀπορροήτης· ἀλλὰ ἀναπνεύμενός τις ὁφθαλμοῖς ἐφ' ἡσυχίας μένει· ὁμοίως τις καὶ δέος ἐκπληξίς.* i. Concussus, percelli, attonitum reddo appello, cum quis ab ictu nec clamat, nec quicquam aliud agit; sed commotus prostratus quiescit oculus, similiter vt i qui timore coercentur. Hi casus veniunt *ἀπὸ τ' ἐξωθεν, ἐκ δὲ τ' ἐνὸς.* i. appulsu violento rerum extrinsecus incidentium, lapsu, & ictu: non autem à vitio rerum quæ intrā sunt, & intus ledunt. Tā *ὀρεβρία*, i. quæ intus ledunt, apparent in illo. Quibus, dum bellè valent, exoritur dolor in capite, ac citò voce sunt capti & stertunt; pereunt illi septem diebus. Huc pertinet illa prognōsis. Quibus cephalalgia & echus varietas sine febre, vnāque vertigo tenebrosa incidit, & tarditas vocis, & manuum stupor; hos vel apoplecticos, vel epilepticos, vel etiam leihargicos fore expecta. Pertinet illud etiam quod sic legitur in aphorismis. In melancholicis morbis, periculum sic ostendat ipsorum decubitus: aut enim apoplexiam corporis; aut conuulsionem; aut insaniam; aut cecitatem ostendit. Sed apoplexiæ hinc natæ, potissimum in eam cadunt partem, quæ est à quadragesimo ad sexagesimum. Intrā sunt etiam, & intus lædunt, ac verè sunt *τὸ ἐνὸς*, vt ita dicam, apoplectica, capitis fabricatio crassa, rotunda, vnde ceruix enascitur brevis & crassa.
- lib. 2. aph. Denique, *οἱ πυχῆς φύς· παχυδαναιώτεροι δὲ ἰσχυρῶν*, i. natura crassi quàm graciles, mortis sunt magis precipitii.

- Auicenna. Ex iis quæ intrā sunt, & intus lædunt, nascitur apoplexia, corrumpiturque animalitas ipsa cum amissione sensus & motus: aut quia spiritus animalis exitu, aut vitalis aditu ad cerebrum prohibetur. Spiritus animalis exitu prohibetur, cum cerebri sinus repleti sunt nimia abundantia pituitæ, nigri humoris, aut sanguinis. Ac dum replentur, necdum repleti sunt, symptoma est conuulsionis epileptice, quam excipit resolutio apoplectica; vt ipsi vidimus in Episcopo Niuernensi, & in Quæstore Ballomo, quibus vita defunctis inuenta est repletio sinuum, à sanguine illuc prorupto. Spiritus autem vitalis aditu prohibetur ad cerebrum, in iis qui natura sunt crassi & breuioris colli, repletis nimium, obstructis, compressis, quæ illac feruntur ad caput, arteriis atque venis. Hic enim spiritus animalis exhausti nulla est instauratio. Quod fit vt animal corrumpatur: quia non illi suppetunt *τὸ ἐνὸς* τῷ τῷ sensus & motus.
- aph. 42. 2. Sed apoplexia est omnis diuisa in fortem & debilem. Atque distinctionis huius ratio in spiratione posita est: prout difficultas est maior aut minor in respirando. Meā quidem sententiā, debilior est apoplexia intercluso vitali spiritu, quàm animali: nec tam desperabilis est vitæ salus in ea quam peperit interclusio spiritus qui à corde manat viuificus atque vitalis. Nam obstructarum venarum libertas, de tractione sanguinis comparatur: sicut faciendum præcepit dictator in illo. *Aphoniam febri experientem exoluit detractio sanguinis.* Et. *Τὸ ἀφονον ἐξ αἵματος ἡρώδου· φλεβῶν ἀπολήψεις πλείους· ἢ ὅταν ἴσται τὸν θυμὸν, αὐτὸν ἀφαισῶς, ἢ ἀλλῆς αἰτίας ἰσχυρῆς. φλεβοτομήν δὲ τὸν βραχίονα τὸ δεξιὸν πρὸ τοῦ φλέβα.* i. Quod quis repente obmutescat, in causa est venarum interceptio, si bene valenti accidat, non præuisa, ac sine aliqua fortiori causa. Ergo venam secare oportet interiore cubiti. Hic tamen negare non ausim, fortis ac debilis apoplexiæ rationem, etiam denegato exitu spiritui animali posse discerni. Hoc enim spectat illa sententia præceptoris. *Τὰ ἐξ ἡμέρας ἀποπληκτικὰ λεγόμενα, ὅτι περὶ πῆντα πνεύματος ὀλεσθῆναι.* i. Exorta repente apoplexia non insanabilis, in lenta febre; funesta est. In apoplexia forti quæ, animalitate omni collapsa, continuo stertorem edit, nulla vitæ salus sperabilis esse potest. Scitum est illud præceptoris. *Ἀπὸ ἀποπληκτικῶν ἰσχυρῶν· ἀδύνατον.* i. Apoplexiam fortem exolvere non potis est.

- Hactenus de apoplexia *κρείως* dicta. Nam de paralyti & paraplegia, satis iam supra scripsimus ad illam prognōsin. *Parotides præua sunt paraplecticus.* Est autem ratum illud, persuasumque omnibus; quod apoplexiæ omnis, paralyseos, & paraplegiæ ratio, in exolutione consistit. Sed ea demum exolutio pessima est atque mortifera, quam facit interclusio spiritus animalis in cerebro; nec solum apoplectica, sed etiam paraplegica; quæ cernitur in oculorum perversione, & oris, in febre acuta. Sunt enim principiorum, facultatumque grauior casus, quàm organorum. Atqui oculorum & oris perversio in morbis acutis, à cerebro est, & in cerebro ipso perficitur. Qualem fuisse legimus paraplegiam illam mortiferam in Epidemiis, quæ, vt Galenus author est, non talis erat, culpa & vitio exolutarum partium: sed ipsius principij, hoc est cerebri, vnde paraplegica exolutio veniebat. Huc pertinet illa prognōsis, supra iam posita. Quibus morbo iam fractus, videndi vis audiendi re perit, aut etiam labiorum, palpebrarum, vel narium perversio cernitur; mors in propinquo est. In cæteris, partium quæ sponte nostra moventur, exolutio; cum libertate spirandi, non est fatalis ad mortem: sed tantum symptomate ipso grauius atque molesta: quoniam nulla pars nostri, ne minima quidem, vacat officio, quin tantum incommodet *τῇ ἡλικίᾳ*, i. vniuersitati, quantum ipsa commodabat olim ad vsum & dulcedinem vitæ, dum bene valeret.

Nascitur autem paralytis & paraplegia, vel mollitudine ipsa neruorum & membranarum per ingressum currentem serosi catarrhi, vel impedito spiritus animalis appulsu, qui totā substantiā non fertur vt decet, ad partem à qua suscipitur actio. Examinanda superest instituta prognōsis quæ est huiusmodi.

SENSVS HEBETΥΔΟ] Græcè est *λαβὴν*: qua voce, partium omnium velut segnicies quædam ostenditur.

offenditur in officio faciundo, vel in appulsu *ἢ αἰσθητῶν* excipiendo stupor & hebetudo. Alii segnicie in coquendi officio declarat illud Hippocratis. *Ἡ χαλὴ τῶν τερνῶν, ἢ ἡ ὅλη σὺγχη, καὶ ἡ αἰσθητὴ ἀκατάστασις*. i. *Alui segnicies, omnium perturbatio, & vasorum impuritas*. Ad quem locum hæc scripsit Galenus, *ταρῶν* hic audiamus, debilitatem alui circa cibos coquendos. Idem *ταρῶν ἐδωλῶν*, i. *dolorem stupidum, siue torpidum*, autore Galeno, per *ταρῶν* expressit, cum ait. *Νάρκη τῆς κεφαλῆς*. i. *Stupor semoris quod è directo est*: loquitur autem de renibus calculosis. Atque hic dolor stupidus, opinionem facit diminuti pariter sensus & morus. Quod cernere est in iis quibus obstupescit crux illud quod, sedendo, alteri decussatim superimponunt. Et quibus apparet, verum illud esse quod posui; nempe quod voce *τῆς τερνῆς*, tum quædam segnicies atque infirmitas quarumlibet partium, in cuiusq; officio declaratur; tum etiam stupor &

torpor, vel hebetudo, qua sentiendi vis languet infirma, nec bene sensio excitatur *ἢ αἰσθητῶν* in sensu ob-
 10 cuso. Sed illa sensus hebetudo qua sensio frangitur ipforum sensilium; tamen propria est *ἢ αἰσθητῶν*, i. *quorumlibet sensoriorum*, ex paupertate spiritus animalis, vel in fonte ipso, cuius exhausti parua est instauratio; vel etiam sæpe à vitio riuiulorum quod intulit nervi constrictio vel oppilatio: tamen reperio apud Hippocratem *ταρῶν τῆς κεφαλῆς*, i. *torporem mentis*: in quo agnoscit Galenus *τὴν ἀνία τῆς κεφαλῆς, δὲ λυμῆς* *ἀνία*, i. *imbecillitatem mentis: resoluta scilicet, ut nervo-*
 20 *tum, ita cerebri substantia*. Loquitur autem de incommodis aquæ calidæ, si quis ea diu multumque utatur. Huc pertinet illa prognosis. *Νάρκη ἐς ἀμφότερα μέλη τὴν κεφαλὴν καὶ τὸν κοιλίαν*. i. *Stuporis utrobique cita mutatio mala est*. Vbi demonstratum est, me autore, stuporem illum minimè ad sensoria referendum, sed ad sensationem ipsam quæ propria est *τῆς φαντασίας*; non solum in obiecto sensilium, sed rerum expetendarum, ut portio-
 nis & spiritus. Repentina illa mutatio phantasie stupidæ, potissimum cernitur in iis quibus acuta febre
 30 conceptis, occupata delirio phantasia non antè percipit necessitatem rerum in febre expetendarum, ut portio-
 nis & spiritus; quàm incremento necessitatis ipsa veterino suo excitetur ad percipiendum & sen-
 tiendum vim causæ sitiferæ aut necessariæ spirationis. Ergo qui in febre acuta, modò sui est negligens, modò diligens in vsu rerum expetendarum, ut portio-
 nis & spiritus, parem in utroque ostendit calamita-
 tem; illic multum hebetis sensificæ facultatis; hic verò crescentis ad summum necessitatis à febrili ar-
 dore quo viscera ipsa conflagrant, unde phantasia stupida excitatur. Qua de re præcepta sunt à præce-
 ptore sic posita. *Extimarū partium cita in utrumque mutatio, ac sitis huiusmodi, prava est*. Ac si diceret. *Quem-*
 40 *admodum cita mutatio partium extimarum, imbecillitatem arguit nativi caloris, & vim ardoris febri-*
lis: ita quæ sit in siti μετέπειτα, qua modò accensa sitis, modò sedata videtur; idque immeritò; tum he-
betudinem sensificæ facultatis, tum robur sitiferæ affectionis ostendit. De spiratione autem quæ notis
 non respondet incandescentis cordis, sine contumacia organorum spirabilem, solennis est illa prognosi-
 sis. *Magna & rara spiratio in febre acuta, dementiæ signum est*. Atque hæc omnia, stupidæ phantasie & ex-
 cussæ documentum complectitur hic aphorismus. *Ὁσὸν ποτέστιν ἢ τὸ σῶμα, καὶ πολλὰ ἢ πόνη μὴ αἰσθητῶν*
τῶν τοιοῦτων ἢ τῶν νοσούντων. i. *Qui dolentes ab parte aliqua corporis, sæpe dolorem non sentiunt; huius mens laborat*.

Ergo. SENSVS HEBETUDO] Quæ est in sensoriis quinque sensilium, & sensio stupida; nō
 in segnicie partium nutritiarum, nec occupata delirio phantasia. Atque illa quidem hebetudo sensus,
 causam agnoscit, vel paupertatem spiritus animalis, vel denegatam ipsi libertatem petueniendi quæ &
 quò viam affectat, *καὶ ὁρμῶν, ἢ καὶ ἀποπληξίας*, causa ciendi motus & sensus. Adimitur autem libertas, ner-
 vis constrictis vel oppilatis.

ET EIVS AMISSIO] In qua sensilium ne minima quidem perceptio est in certis quibusdam
 40 sensoriis, vel etiam omnibus.

SI FORTE INCIDERINT] Græcè est *ἢ ἐξ ἑσῶς*, quod est præter morem & consuetudinem
 hebecendi, quæ sit sæpenumero ictu & lapsu; tum etiam cruribus complicatis, cabitum innixu, fa-
 me, vigiliis, scoliis vertebrarum cervicis, renibus calculosis, & artubus illaqueatis. Est autem præce-
 ptoris *ἡ δόξα* hæc. Si quis repente stupuerit, sine vlla *αἰσθητῶν*, qualis est nephriticorum, ac sine forti
 causa.

FUTURA DENUNCIANT APOPLECTICA] i. Genus omne amissionum sensus & morus
 50 *ἢ τὸν νοῦν*; tum in vniuersitate ipsa, per apoplexiam; tum in dimidio corpore, per paralyin; tum in
 quibuslibet artubus, per paraplegiam. Nam *ἡ ἀποπληξία* sic vsurpari reperio apud Hippocratem; eaq;
 significatio verè & appositè tribuitur huic prognosi. Ergo sensus hebetudo & eius amissio si fortè inci-
 derint, futura denunciant apoplectica: quoniam ibi demum quælibet resolutio in propinquo est, quan-
 do spiritus animalis non facit officium *ἢ ἐνορμῶν*, in cerebro interclusus; aut cum illius inopia labora-
 tur, aut prohibetur appulsu & aditu ad ipsa sensoria per quæ suscipitur omnis actio animalis. Neque e-
 nim sensifica vis lucet in vllō sensorio, cum spiritus animalis interclusus est in fonte ipso, vel summa
 paupertas; aut cum eiusdem interceptio est in cursu, quem ipse per nervos inflectit. Sed illa sensus he-
 betudo apparet quando sensilia non exactè percipiuntur in proprio quæque sensorio, nec libera motio
 est earum partium quæ sponte nostra mouentur; idque *ἢ ἐξ ἑσῶς*, i. non proprio ipsarum vitio, sed a-
 lieno, videlicet facultatis ipsius. Huc aduocandi etiam deprauati & alieni sensus eorum quæ intrā sunt,
 & intus lædunt. Huiusmodi sunt tenebrosa vertigo in cerebro; marmarix & amblyopia in oculis;
 60 bombus & echo in auribus; fœtor in naribus; stupor & hæsitatio linguæ; palpitatio quoque in muscu-
 lis, & tremor in artubus. Quorum exempla sunt passim apud Hippocratem, ac suprā iam posita & ex-
 plicata, quæ esse solent partim apoplexiæ, partim paralyseos, partim paraplegiæ ipsius prænuncia. Ex o-
 mnibus autem sufficere vnum proponere quod valde nos exercuit in explicando. In convulsione diu ob-
 mutescere, malum est. At verò parumper, aut linguæ apoplexiam, aut brachij, partiumque dextrarum denūciat.
 Exoluitur autem vrinis repente multis & cumulatè prorsus. Ergo ut spiritus interclusus est, & paupertas in

sent. 5. part. 2.
6. Epid.
aph. 50. 6.

aph. 69.5.8r
part. 3.6. Epid.

lib. de trans.
cap.

Cont. 57
CP.34.2.

Созд.п.
с.р.14.2.

ad xph. 44.6.

 $\approx 40.7\%$

Conc. 13,
Cap. 14.2

Coze 6.
Cap. 7.2

PARTIM DEXTRA, PARTIM SINISTRA] Pro vario humoris motu, naturæ impulsu, & meatuum conditione ac situ. Vt autem apoplexia κατὰ οὐκ ἐστὶν dicta sit occupato principio & spiritu intercepto: sic paralytis & paraplegia in vitio τῆς πνεύματος ἀπὸ τοῦ πνεύματος, & impedito spiritus appulsu consistit. Omnium autem symptomatum ἀποπληξίαν quæ à tromate capitis nascuntur, prænnuncia est inde nata corporis impotentia siue ἀσθένεια. Quod autem partim dextrâ, partim sinistrâ incidat resolutio, in causa sunt illa quæ modò usurpauit; humoris motus, naturæ impulsus, atque conditio partium excipientium. Ac demonstratio apoplexiæ partium dextrâ sitarum, repetenda ex comment. ad prognosin 13. cap. 14. huius 2. lib. Nō enim appositè huc aduocari potest paraplegia illa cuiusdam mulieris, quæ cum diu multumque tussiculosa fuisset, nec commemorabile quippiam expuisset, exolutionem passa est paraplegicam sinistri cruris & brachij dextri; cætera bene habuit, omnique alteratione caruit faciei & mentis. Ex quo efficitur, cerebrum omni vitio caruisse. Quamobrem verisimile est talem paraplegiam venisse ex metapneumonia pulmonarij morbi; partim in brachium, intercepta expurgatione, quam ἀνακαταρξίαν Græci vocant: tum in crus sinistrum, nō bene suscepto, nec bene peracto abscessu crurali, quod ipsa materia cursum inflexerat.

2. Epid. part. 2.

Vide comm.
ad Coac. 4.
cap. 4. 2.

3 Αποπληκτικοῖσιν αἰμορροΐδες ἑπιγνώμεναι· χηΐσιμον· ψύξεις δὲ καὶ νάρκωσις· πονηρόν.

Qua apoplecticis veniunt hamorrhoides; salutare: pestifera autem perfrictio atque stupor.

IN APOPLECTICIS mortifera quidem sunt omnia ob citam spiritus quem ducendo viuimus vacationem: si malum morbificum citò non exit; id scilicet quod intus lædit & magis læsurum est, nisi exitum citò habeat liberalem & liberum. In apoplecticis morbificum malum est, quo spiritus animalis exitu, aut vitalis aditu ad cerebrum prohibetur, vnde animalitas ipsa intercudit, corrumpitque animal, cum amissione sensus & motus. Ac spiritus quidem animalis, exitu prohibetur, cum eius interclusio est per obstructionem sinuum cerebri, tum à pituita, tum à sanguine, tum à nigro humore. Vitali spiritui aditus denegatur per interceptionem venarum carotidum; vt visum est præceptor, cum ait. Τὸ ἀεὶ οὐκ ἐξέρχεται τὸ σπύρον· φλεβὰν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ποιεῖται, καὶ ὑπὸ τὴν σπύρον, ἀπὸ τοῦ σπύροντος, ἢ ἀπὸ τῆς αἵματος ἰσχυρῆς. Quæ omnia tamen iam dicta sunt explicata: tamen necessaria hic fuit eorum recensio, vbi agitur de curatione per detractionem causæ morbificæ. Non enim redintegratio comparatur corporis vel humorum è natura egressorum; nisi perspecta sit illa egressio, vnde, quemadmodum, & vbi euenerit.

lib. 4. acut.

Vt igitur causæ sunt apoplecticæ, tum apoplexiæ idea & focus: ita curatio est, vel ipsa curandi negligentia esse debet: quia non decet eum attingere qui seruari non potest. Atque hoc prudentis est medici, ne subeat suspicionem occisi, quem fors ipsius peremit. Ac primum, iam constat fortem apoplexiam non posse sanari: debilem verò vix esse sanabilem. Exempla debilis apoplexiæ posita sunt in superiore & in hac prognosi. Ac superiore quidem vidimus, eos qui à tromate sunt impotentes corporis, & in periculo apoplexiæ; defungi eo periculo, exorta febre acuta, rigoris experte. Hic autem debilis apoplexiæ critica vacuatio salutaris; tum ea quæ artificio fit medici, ad imitationem naturæ comparato, duce iudicio, & comite experientia, proponitur explicanda. Quinetiam debilis apoplexiæ in fortem μεταπίπτει ostenditur, quando, natura cessante, & negligente sui, atque quodammodo triumphata, stuporis & frigoris accessio fit, criticæ vacuationis loco.

APOPLECTICIS] Quorum debilis est apoplexia sine stertore, in quo dyspnœæ summa sunt omnia: sed cum difficili tantum spiratione frequenti & parua, propter infirmam facultatem moticem thoracis quæ sua sponte mouet ἀπὸ τῆς αἰσθητικῆς, nō excitata solum neruorum vi ad functionem in summa spirandi necessitate ab æstu & impuritate cordis adhuc micantis, nec tam citò extincti: quod ipsum apparet in forti apoplexia, vbi spiritus animalis nullum facit officium τῆς αἰσθητικῆς, sicut in debili. Ergo. APOPLECTICIS] Quorum debilis est apoplexia, superstite adhuc nonnulla spirandi facultate, & sunt eiusmodi, non intercluso prorsus animali spiritu per absolutam, sed inchoatam sinuum obstructionem, quam facit melancholici morbi ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, hoc loco intelligenda, non semper; aut ipsa venarum ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, de qua iam diximus. Vt apoplexiæ, initio debilis, & nondum fortis duplex omnino causa esse videatur; vna quidem, inchoata sinuum cerebri oppilatio, vel eius concussio; & venarum interceptio.

Coac. vltim.
cap. 13. 2.Coac. 1. cap.
12. 2.

HAMORRHOIDES] Vel quæ nunc primum fluere inceperunt, ob nimiam humoris melancholici abundantiam; tum propter repletionem: vel quæ antea parum & parumper aperta, oborta vertigine, paraplecticam quippiam ominantur & inferunt; postea autem velut postliminio redeunt: iuxta illud præceptum. Dolorifica in lumbis mala; sanguiflua. Est enim comparata sic hamorrhoidum ratio, vt iis vel cacoehymia melancholica lienis, totiusque adeo mesenterij, & cauarum iecoris partium expurgetur per ἀνακαταρξίαν venarum, ex mesenterico venæ portæ ramo, ad vltimas sedis oras productarum, vel etiam vacuetur repletio venarum quæ adjacent lumbis, vnde dolorifica lumborum mala sanguiflua, per venas quæ ex hypogastria inferuntur in cutim hypogastrij musculosam, & intestinum rectum.

Coac. vltim.
cap. 13. 2.

EXORTÆ] Nunc primum aut postliminio: per humoris ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, qui habuit inde sursum μεταπίπτει vertiginosam, & paraplecticam siue apoplecticam. Hic enim paraplegia pro apoplexia usurpatur, cum ait. Ex hamorrhoidē quantumvis parum & parumper aperta, oborta vertigine; paraplecticam quippiam ominantur.

int: f. 282

et: *sanæ autem phlebotomia*. Solenne est illud, quod hæmorrhoides cum inconsideratè sistuntur, eadem et: *solus aduocare & inferre solent symptomata, quæ ab iis arcentur dum conuenienter feruntur.*

SALUTARES] Vel salutiferæ; quibus apoplectici à debili apoplexia hîc posita, periculo defunguntur & morbo. Nam hæmorrhoides per *μὲν* obortæ, vacuando, retrahendo, ac detrahendo rheuma concitatum atque consistens, ipsamque adeo morbosam cacochymiam & impuritatem expurgando; repletionem quoque deplendo, propugnationem & *ἐπιπληξιν* adferunt, vt melancholicis, sic apoplecticis inde natis; vel ex decubitu melancholiz, vel ex humoris melancholici anadrome & ad caput appulsu. Non enim commodis hæmorrhoidum apoplectici fruerentur ad morbi leuationem, nisi apoplexiæ causa esset melancholicus humor; tum per metaptosin melancholiz; tum per epigenesin plus humoris, anadromen sursum habentis. Quæ de re illud præceptum est quod antè posui. Ex hæmorrhoidibus quantumuis parum & parumper aperta obortæ vertiginēs, paraplecticum quippiam oīnantur. Nam de *μὲν* melancholiz in apoplexiâ, solenne est illud. In melancholicis morbis periculum sic ostendit ipso *μὲν*. Aut enim apoplexiâ corporis, aut conuulsione, aut insanîâ, aut cecitatē ostendit. Et. Melancholici, non raro sunt epileptici. Sunt igitur hæmorrhoides cōmodæ apoplecticis, in debili apoplexia quam genuit melancholicus humor, tum per anadromen, tum per metaptosin melancholiz, quam fieri dixit Hippocrates à quadragesimo ad sexagesimum ætatis annum. Eōdem pertinet illa sententia præceptoris. *insanientibus oborta varices vel hæmorrhoides, exolunt insaniam.* Vbi Galenus, exoluendi rationem agnoscit, *ἐξούσης τῆς νόσου ἐς ἀνθρώπου μέλας τῆς τῶν μαλακῶν ἐργασίαντος χυμοῦ, καὶ μάλα ὅταν μετατρέχῃ οἱ καὶ παχὺς.* i. Humores malignam committentes, in partes ignobiliores natura reſciente, maximeque si melancholici et crassi fuerint. Ex quo apparet, eam demum purgationem bene suscipi, & commodo ægrotantis, qua humor qui in vitio est, per commoda loca, liberè & liberaliter expurgatur. Ac sanè commoda hæmorrhoidum, potissimum commendantur, quando nigra illac conuenienter ducuntur. Scitum est illud. *Αἷμα δὲ σπέν, ἐκείνῳ αὖ ἢ κακόν. καὶ δὲ σπέν τὰ μέλας ἐπερὶ σπέν.* Nam vacuandæ repletionis lumbaris per hæmorrhoidas, longè alia ratio est in qualitate sanguinis, copia, & excernendi modo. Tum enim fluunt hæmorrhoides *λαύρος καὶ ἰχθύος*, i. liberaliter atque fortiter. Ac mirum ni talis vacuatio sit dysenteria *αἱματώδης*, i. cruenta puri sanguinis, quam refert Hippocrates ad hepatis *ὑπὲρ*, proptereaque non esse *πλήμμερον*, i. multorum dierum, vt inferat *ἀπεχίας* i. cibi fastidium. Talis est verna iuuenum dysenteria, si fortè careât hæmorrhagiæ commodis quibus ferè illi fruuntur à 18. ad 34. ætatis annum. Talis eorum est etiam qui ad perfracti cruris curationem, sic parte saucia collocantur, vt semper sit *ἀνάρρητος* dum curantur: cuiusmodi esse solet eorum qui altero crure sunt mutili, si nullam quotidiani victus partem deduxerint. Quæ cum ira sint, dubitari non potest quin hæmorrhoides ad vtrumque vitium repletionis & melancholicæ cacochymiz, si cōuenienter fluant; mirificos adferant sanitatis fructus, arcendo & abigendo mala quorum sœtura esse solet quando humores in vitio sunt abundantiz vel impuritatis.

PESTIFERA AUTEM] Quæ nullam recipit curationem medici vel naturæ. Medici quidem, cui prærepta est omnis medendi occasio atque facultas, vt mox dicitur. Naturæ autem, quæ victa iacet, nec excitari potest ad exclusionem causæ morbosæ, & cui nulla excretio, quantumuis critica, vel minimum opis & adiuuenti potest adferre, cum vires effœtæ languēt. Ergo pestifera est, vnde circa mors veni, quæque ipsam subesse & in propinquo esse testatur.

PERFRICTIO] Quæ itur à debili ad fortem apoplexiam, quæque ostendit *ἡκρωσις τῆς ἐμφύτου Σπύματος*, vt verbis Galeni utar, i. *extinctionem caloris nativi*: cuius quidem nulla instauratio est in spiratione amissa, vel in stertore; nec partium solidarū viuacitas amplius illustrari nec vegetari potest à nectare cordis viuifico, vnde ipsarum perfrictio est: quia non plus habent caloris quàm nectaris illius viuifici, à corde perenniter affluentis. Duplicis autem perfrictionis positz à Galeno, grauior & periculosior est vniuersi corporis, quàm partium extimarum. Ac talis perfrictio pestifera est, non solum ipso symptomate, sed etiam impotentia medicandi. Hippocratis illud est. *Αἷματος ἀφαιρέσις ἐν κατὰ φύξιν πνεύματι κακῷ.* i. Detractio sanguinis in torpida perfrictione; pestifera.

ATQUE STYPOR] Non quidem ille quem paulò antè posuit, apoplexiæ prænuncium, sed cum qui cernitur in delapsu ad pedes, quem *ἑρρίψι* vocat Hippocrates; & qui coniunctam habet perfrictionem: vt idem sit hoc loco *φύξις καὶ παρῳσις*, quod in adducta prognosi *κατὰ φύξιν πνεύματι*. Quæ duo simul coniuncta, effœtam vim vtriusque facultatis ostendunt; vitalis quidem, in perfrictione; animalis verò, in torpore sine dilapsu, qui antè non erat. Omnis autem aphonia quam facit paupertas natiui caloris, & summa imbecillitas potentiz animalis; desperationem salutis, atque adeo spem medici planè sublapsum ostendit.

4 *Ἐν τοῖσιν ἀποπληκτικοῖσιν, ἡ δὲ δυσφορὴ τῆς πνέματος ἰδρῶς ἡπιόμορφος· θανάσιμον. ἐν αὐτοῖσι δὲ πάλιν τοῖτοισιν ἡ πυρετὸς ἡπιόμορφος· λύσις.*

In apoplecticis à spiritus angustia sudor proruptus; mortem subesse ostendit. Contra, iisdem febris exorta; morbum exoluit.

LIBI DEMUM salutis ac vitæ certa desperatio est, vbi vitalis officij proxima vacatio est atque privatio. Ac vitalis quidem officij vacatio est, cum tollitur ipsa spiratio per quam est vita. Tollitur autem; vel intercepto motu nervorum thoracis, atque spirabilium musculorum, collapsa eorum facultate motrice; et in forti apoplexia: vel sublato spirandi vsu, qui est in corde, sicut apparet in syncope; tum in parua, rara, & frigida spiratione, extincto calore nativo. Hic tantum excipio alterum genus mulierum hysteriarum, in quibus dissipatur spirandi vsus ad tempus. Postremò vitalis officij, cessante spiratione, vacatio est, intercluso meatu quâ spirabilis ducitur aër, & fumidus vapor excluditur; vel à laryngis phlegmone, vel ab illaqueatione, vel à luxatione cernicis. Quæ causa movit Hippocratem, ut ex perspicua ratione illorum symptomatum, vitalis officij vacationem inferrent, tres illos posuerit aphorismos. *Qui crebro & fortiter exoluntur, nulla occasione manifesta; vitam repente finiunt.* Et. *Apoplexiam fortem exco-* 10
que non potis est. Et. *Qui strangulantur & exoluntur, necdum tamen animam exhalant; non resurgunt, ore*
spumante. In summa; quicquid respirationem adimit, vitam tollit. Id ipsum facit tum apoplexia fortis, intercepto motu thoracis: tum vera cynanche, ductu spiritus intercluso: tum syncope ipsa, sublato spirandi vsu. Sed cum in apoplectica spiritus angustia quæ stertorem edit, spes in angusto sit; tum verò in propinquo mors est, cum inde sudor exprimitur vel exudat. Ac veritas huius prognoscos sic lumen suum ostendit.

IN APOPLECTICIS] A forti apoplexia, vbi collapsa est animalitas, cum sensus & motus amissione. Sic enim appositè videor explicare *χρ. ἀπὸ τῆς πρὸς τὸν πνεύματος* præceptoris. Nam prima decisio huius capitis, quæ ad omnem pertinet apoplexiam. Secunda est de apoplexia cuius occasionem & causam, febris exorta præcipit in iis qui sunt impotentes à tremate capitis. Tertia verò describit apoplexiam debilem atque sanabilem per hæmorrhoidas convenienter fluentes. Quarta hæc, symptomate ipso difficillimæ spirationis, & sudore violenter expresso vel exudante, non nisi ad fortem apoplexiam potest referri.

A SPIRITVS ANGVSTIA] In qua difficulter admodum spirabilis aër ducitur, ac fumidus vapor excluditur: quia spiritus animalis in cerebro interclusus, nullum facit officium *τὸ ἐννοούμενον* in respirando: sed ideo manet ad tempus difficillima respiratio, quæ singulis momentis augetur & crescit ad summam difficultatem & *μίσση*: quia spirandi necessitas in ardore cordis adhuc micantis, nervorum & musculorum spirabilium excitat functionem ad inspirandum & expirandum. Itaque *δυσπνοία* est magna spiritus in hoc stertore apoplectico, vbi neque voluntas, neque mouendi organum, necessarii vsui morem gerit qui est in corde: cuius extinctio & suffocatio proximè abest ab eo stertore, vnde citò vita commutatur cum morte. Omnes enim morimur per suffocationem vel extinctionem caloris vitalis qui est in corde, vel, ut præceptor loquitur, *τὸ ἐν τῷ καρδίᾳ* & *ἐν τῷ πνεύματι*. Quæ sententia in suffocatione locum habet, non in extinctione simplici caloris vitalis; vbi respiratio editur parua, rara, & frigida. Sed omnis ratio atque causa difficulter spirandi, suprà est posita & explicata.

SUDOR PROCVPTVS] Non quidem naturæ impulsu per excretionem proruptus, qualis est sudor periodicus à rigore in tertiana, aut criticus in ardente: quorum ille facit ut æger alacrius ferat morbum; hic autem morbum exoluit. Sed ille sudor symptomaticus, per oppressionem naturæ exortus, quem ciet expressio; vel quem ipsa partium exolutio, velut roscidulum & miliarem fundit. Quæ sudatiuncula est *ἐκιδρωσις* apud Hippocratem, authore Galeno. Ac de sudoribus alibi satis multa.

MORTEM SVBESSE OSTENDIT] Quia deinceps, nulla sperabilis vitæ salus in exolutione partium solidarum, & impotentia continendi succum alibilem proprium quem continenter fundunt: ac nulla spes etiam in expressione sudoris qui oppressionem non tollit: denique ibi demum salutis & vitæ desperatio est, sicut iam posui, quando cum vacatione vitalis officij, quam intulit fortis apoplexia, excretio incidit symptomatica; sicut iam vidimus in lethargo & comate. Ac de lethargo illud præceptum est; quod si lethargico immemori alius feratur liquidis excrementis, vel urinae fundantur similes iumentorum, ipsum servari non posse, ac mortem subesse. De comate autem vigili ab oppressionem nato, cum pari magisterio bilis & pituitæ, solennis est illa sententia, *Μυκτὴρ ἀπὸ τῆς ζωῆς ὁλέσθαι*, i. mortiferum est sanguinis è nave substillum: quoniam inde significatio fit iam fatiscientis nature, ab oppressionem partis afflicta, ut cerebri: denique in triumphata natura multum afflicta, omnis vacuatio symptomatica esse solet; proptereaque funesta, aut certe sinistri iudicii. Et verò in omni resolutione scitum est illud, quod sudores nocent confertim prorupti, conferunt autem qui sensim exudant; non quidem effæta vivacitate partium solidarum, vnde assimilatio nulla est succi alibilis: sed ab excretionem particulari quam virtus naturæ suscipit *χρ. λέγον* humoris mitificari & partis obfessæ: nec ramen ea lege critica quæ cernitur in crisi febrium acutarum, in quibus nihil paucum est criticum. Ac fuit illud iudicium præceptoris, quod apoplectica illa potissimum exoluntur urinis multis & crassis, & cumulatè proruptis. Ergo sudare in apoplexia forti à difficillima spiratione; mortiferum: siue sudor confertim exprimatür ab oppressionem magna: siue sudatiuncula tantum exudet, effæta vivacitate partium solidarum. Tum enim ad vltimum ventum est apoplexiæ, quando cum perfriktionem corporis exudat sudatiuncula, vnde significatur summa paupertas atque extinctio vivifici nectaris, & resolutio partium solidarum, ipsaque vivacitas omnino effæta. Hippocratis illud est. *Ἐκ πινυν μικροῖς ἰσχυρῶς ὡς ὅταν κακὰ καὶ κινῆται μὴ ἔσθαι*, i. Substillum narium cum exiguo sudore frigido, peiorem in modum exortum; pestiferum.

Pars altera huius prognoscos non est Hippocratica veritatis. Itaque non est mihi animus abuti otio philosophico super ea.

Τὰ Ἰαίφτης ἀποπληκτικὰ ληυμδύως, ὅτι πυρετὴν ἰσχυρὴν
 Sic in prorrhethico, 50. l. 2. i.

Apoplexia repente oborta; solubilis: adueniente lenta febre; mortifera est.

QUI MORBO aliquo sunt occupati, ea demum remedia expetunt quæ salutifera esse solent. Sed ea quæ expetuntur, nō raro expectationem fallunt ægroti & medici, ac sæpe adiciunt ei periculo quod à morbo infertur. Remediorum in apoplexia expetendorum, sola febris consolatur medicam spe certa leuationis, si fortiter oppugnando expugnat causam apoplexiæ: tum inde sit redintegratio cerebri & neruorum. Eadem merum adfert sinistri iudicii, ac certam desperationem salutis; si frustra ciendo humorem morbificum, incommoda exciter magis oppressi cerebri & neruorum.

Ergo. APOPLEXIA] Debilis, iam descripta: quia non potis est fortem excutere; tum obruto cerebri principatu, & animalitate collapsa: tum irrita facultate omnium remediorum quæ adhibentur.

REPENTE OBORTA] i. Non præuisa quæ intrā sit, & intus lædat, vnde symptomata sunt hæc; cephalalgiz varietas, tenebrosa vertigo, bombus, echo, vocis tarditas, manuum stupor: vel quæ adueniat illata extrinsecus, vt capitis trauma quod saucium facit corporis impotentem. Sed quæ sua sponte, nec antè significata irruit; vel sinuum repletionem, qua spiritus animalis nec liberè, nec liberaliter manat è cerebro: vel interceptis venis, vnde vitali spiritui aditus denegatur ad cerebrum.

SOLUBILIS] Non insanabilis: quanquam difficulter sanabilis, vt alibi monuit præceptor his verbis. *Apoplexiam debilem vix est sanare.* Est autem sanabilis: quia non tanta est magnitudo causæ, nec tanta symptomatum violentia, vt omnem respuat industriam medici, omnesque adeo naturæ conatus. Quod autem hic posuit *ληυμδύως*, id verò multum exercuit Hippocraticos, imprimisque Galenum. Sed inter cætera quæ mandauit literis super eo aduerbio, *ληυμδύως*, operæ precium est legere & intelligere quod ille annotauit ex Erasistrati quodam libro, vbi docetur duplicem esse rationem & causam symptomatum apoplecticorum: vnam eorum quæ *συνέχονται καὶ συνπινοῦσι τὰς διαφθόρας*, i. quæ contrahunt ac distendunt articulos artuum: alteram verò eorum quæ *διελύουσι καὶ καλᾶσι*, i. quæ resolvunt & laxant eosdem articulos artuum. Itaque illud, *ληυμδύως*, videri positum esse pro apoplexia quæ in laxitate consistit. Quasi verò alia sit eorum symptomatum ratio, quàm laxitatis. Non enim si aphonia parem habet causam contractionis & laxitatis neruorum & musculorum vocalium: idem de apoplexia sentiendum in sensus & motus amissione. Est quidem in conuulsione, motus amissio: sed non sensus, vt in apoplexia. Nec verò si aphonia ponitur pro apoplexia: tamen hæc retrò non commeant, vt omnis aphonia sit apoplectica. Est quidem omnis ἀποπληκτικὸς ἄφρων: sed non πᾶς ἄφρων, ἀποπληκτικὸς. Existit enim quædam aphonia conuulsiva. Qualem ostendit illa sententia præceptoris. *Si quis ebrius obmutescat conuulsus, &c.* Tum illa. *Febris conuulsio finem adfert, quæ aut eodem febris die; aut pridie; aut etiam perendie aduenit, &c.* Iam verò nulla est æquitas beneficium febris contrahere tantum ad apoplecticam laxitatem. Nam febris oborta æquè benignè facit conuulsivæ tensioni, atque apoplecticæ laxitati.

ADVENIENTE LENTA FEBRE] i. Nouè exorta febre diuturna, lenta & tepida, quæ prius non fuit. Quod enim præceptor scripsit, *ὅτι πυρετὴν ἰσχυρὴν ἰσχυρὴν*, Galenus interpretatur, *ἐκ ὧν καὶ θερμὸν, διὰ βληχρὸν καὶ χροῖον ἀκολήθουντα πυρετὸν*. Atque idem nominat βληχρὸν πυρετὸν, χλιαρὸν, i. febrem tepidam. Fallitur si quis illa duo aduerbia, *ληυμδύως καὶ χροῖως*, ad febrem reterre studet; cum illud sit apoplexiæ; hoc verò febris ipsius. Præterea si *ληυμδύως* dicatur de febre cuius exolutio est atque discessio: quī fiet illud in apoplexia quam febris lenta, è sanabili facit mortiferam?

MORTIFERA EST] Quoniam febris ipsa periculò adiecit apoplexiæ, frustra ciendo humorem morbificum qui grauioribus malis augeat ægrotum. Quicquid enim humorem ciet, neque dissipat, nec exhaust; oppressionem infert maiorem. Et verò in omni morbo præstat naturam quiescere, quàm aliquid frustra moliri. Nam inde sunt acrisia, dyscrisia, dolor, atque mors ipsa. Quæ res adduxit Hippocra- tem vt ita scripserit. *Conuulsionem sanat exorta febris acuta, quæ prius non fuit; aut si prius fuerit, exacerbata.* Vide comment. nostrum ad illam prognosin.

SEQUUNTUR decisiones tres de hydropæ, vt mihi videtur, perperam interiectæ. Quæ quoniam supra sunt posita & explicata, non fuit animus, idque consilio, lucubrationem nostram hic denuo collocare.

DE MELANCHOLIA ET MANIA.

CAPVT
XXIIII.

I METΑ σιγῆς ἀθυμία ἐ ἀπανθροπία; Παι-
κῶς, αὐτῶν κατερρασιαί. [μηλαχολίαν σημαίνοισι. ἢ,
μηλαχολικὸν τὸ τοιοῦτον. Ex aphorif. 23. lib. 6.

I Abiectio animi taciturna, & solitudo quasita, ipsa sui per se auiho-
res, & modica; melacholiam ostendunt: vel, huiusmodi melancholicū est.

MELANCHOLIAM si animæ peccatum magis esse docuerimus, quàm vitium cerebri; parebit si-
mul, eius explicationem cum morbis capitis non fuisse coniungendam, sed commodè ad hunc locum
reiiciendam: vt in apoplexia par esse duximus. Præsertim cū eius fons sæpius in liene & mesenterio,
& toto corpore reliquo quàm in cerebro reperitur.

ABIECTIO ANIMI TACITURNA] Vel, vt legitur in aphorismis, φόβος καὶ δουρικύνη, i. metus
& maior: vt abiectio scripta hoc loco, non sit demissio ab humilitate & pio Dei cultu profecta, qualis
eorum est qui sanctè & religiose vitam instituunt. Sed ea quàm genuit mæsti ac timidi hominis ægri-
tudo, qui omnia tuta timer, ponitque semper ob oculos, primū quidem suspiciosè omnia quibus ex-
terretur metu, nec vllam quieris partem sibi impertit; ponit autem frequenter insidias sibi paratas: hinc
malitiosè odit quos metuit, ac perisse expetit. Sed tamen in perturbatione mentis ita consternitur, vt
satis non habeat animi quò linguam promoueat ad conquerendum & obiurgandum, aut comminan-
dum; vel brachia & manus, ad decerrandum per vim; nisi cū ex melancholico sit insanus, exitque o-
mnino è potestate mentis. Nec verò illa demissio est hypocritica, qualem testantur sacræ literæ in Pha-
risæis apparuisse, quos inde vocant στυφάποις. Sed ea demissio hīc audienda eorum, qui morbo animi
sunt morosi, terribiles aspectu homines, ob eamque causam melancholici nominantur, vt mox dicetur.

TACITURNI] Non quidem culpa linguæ, verborum dædalæ, cū manet immota, vt in ἀναδία,
i. impotentia voces efformandi atque loquendi; quæ vitio accidit organi dialectici. Ac talis ἀναδία, iniussa est
& inuita. Sed ideo sunt taciturni homines illi, animo multum abiecti: quia morem gerunt animo per-
tinaci, & sponte sua, fandi sunt negligentes, non impotentes: nisi fortè sit impotentia voluntatis, non
autem instrumenti, nec facultatis. Qualem fuisse legimus in historiis Thasiam illam Dealcis uxorem,
quæ signa edidit delirantis, partim silentio, partim nugarum garrulitate, exactum ad morbum. Vbi Ga-
lenus agnouit silentium illud, melancholicum; garrulitatem verò, phreniticam.

ET SOLITUDO QVASITA] Græcè est ἀπανθροπία, i. inhumanitas, vel hominum vitata socie-
tas & consuetudo: qualis eorum dementia est qui suis æqualibus, familiaritèr vti nolunt; quòd sibi fo-
li placeant, elati fastidio & contumacia. Sed illi potissimum ad solitudinem viam affectant, vitandæ so-
cietatis causa, qui vultu sunt mæsto atque demisso, quem ἀποστροφή κατὰ φύσιν Græci vocant; ac si malè sibi
conscij essent, atque, vt ita dicam, rei quodammodo rerum infelicitèr & malè gestarum. Talis est μωαν-
θροπία, quæ pugnat è directo cum φιλικῇ θροπία. Ac solitudinis affectatæ causa est, praua opinio quæ sola
cadit in mentem, cū eius excolendæ studio non affectatur: nec vt vitetur aliorum genus inuitia, ne
cui quis noceat. Sed ne hæc quidem sanæ sunt mentis. Etenim qui & discendi studio, à rebus gerendis
auocantur, & qui nocendo nemini, alterum genus vitant iniustitiæ, pariter in vitio sunt; quia profunt
nemini, sicut pro se quisque debet prodesse. Vt paucis dicam; illa dēum est ἀπανθροπία hīc posita quæ
inhumani est hominis qui procul ab omni societate suum cor edit, persuasionē falsa imbutus.

IPSA SVI PER SE AVTHORES] i. Sine causa & occasione sui effectrices, vt nemo intel-
ligat vnde sit, & quorsum illa demissio animi cum silentio & solitudine affectata, nisi fortè sit ægri-
tudo animi τῶν δυνάμεων, i. vultuosorum hominum, qui vt Galenus ex Critia interpretatur, leui de causa fortiter
rascuntur; aut læsi grauitèr, sæuum dolorem sic animo cōceptum fouēt, vt inde nunquàm, aut ætèrè vix
excidat. Thasia mulieris pathemata hæc fuerunt. Ex λύπης καὶ πένθος ὁρῶσα δὴ τὴν ἐξ ἡμέρας ἀγρυπνίαν ἢ κατὰ
πένθος, καὶ δι' ἡμέρας, ἡ δὲ ἀποδύνει τὴν πρὸς τὴν ἀγρυπνίαν νύκτας, φόβος, λόγος πικρὸς, δουρικύνη. i. Ex maiore per occasionē concepit,
dum adhuc staret, facta est somni expers, cū negligens, sitibunda & anxia. Inde quo die primū decubuit, ineunte
nocte, visa est sibi metuens, garrula & animo consternata. Ex quibus apparet verum esse quod in sanctorum
hominum proverbio est. Per quod quis peccat, per id & torquetur. Er verò admirabile est quārum ap-
positè, pathemata illa reciproca, suis quæque locis profecta, & velut postliminio restituta, stylo Hippo-
cratico, catholicum illud habeant theorema. Οἱ φόβος, ὁ ἀγρυπνία, ἡ λύπη, ἡ δόνη, ὁ ὄργη, & τὰ διὰ ταῦτα ἐκείνα πάθη.
ἐκαστὸν δὲ τὸ πρὸς ἑκάστου τὸ σπέρματι, τὴν ἀρχὴν ἐν πύττειν ὑπακούει. i. Timores, vt vetecundia, tristitia, item voluptas, irascen-
tia, & cetera quæ sunt eiusmodi, sic morem gerunt occasione & causis ipsorum (vt cū horrescimus viso serpen-
te.) Id autem quod cuique actioni dicatum est, ac veluti aptum natum, vniciuque pathemati etiam morem gerit at-
que inseruit, vt hepar voluptati, cor iracundie, cerebrum verecundie. Ergo Thasia illa mulier vultuosa, il-
lis pathemata occupata fuit per morbum, quæ ipsi, dum valeret, causa fuerunt agrotandi. Sunt igitur
pathemata illa reciproca, quæ vnde prodeunt, ibi memoriam de integro sui reuocant, & reuertuntur.

ET MODICA] Græcum ὀλίγη, idem significat quod illud Latinum, Nihil nimis: vt ex Galeno
suprà iam diximus. Est autem sic positum in hac prægnosi, vt ea circumstantia τῆς ἀθυμίας καὶ ἀπανθροπίας,
appositè

hist. 15. part. 3.
3. Epid.hist. 15. part. 3.
3. Epid.lib. 1. cap. 20.
lib.

appositis ipsas conuertat ad illud de quo dicuntur, nempe ad melancholiam. Nec enim leuis & fugax *ἀσθενία* vel *ἀκαταστασία* est melancholica. Nec illa quæ diu & fortiter hominem occupauit, quæque ad febrarum diuertit ipsam redegit, præ summo mœrore & metu, cum desperatione *τῆς ἐνθυμίας*; aliud signum requirit melancholiam cuius ad vltima ventum est. Sed illa demissio taciturna quam diutius præ se fert quispiam, nec ita leuiter, sed abundè satis; illa, inquam, propria est melancholiam nondum perspectæ & cognitæ, vt mox planum fiet in ipsius natura. Ac nisi me fallit animus, eodem planè sensu hic legendum *διουρῶς*, quo illud in aphorismis. *Ἦν φόβος καὶ δυνάμειν, πολλὸν χρόνον ἔχοντα ὀξυτέρη. ἢ. Si metus et mæror ipsos diutius male habeant quos inuasit, tum autem similiter exiguuntur, &c.* aph. 23.6.

MELANCHOLICVM ILLVD EST] Siue denunciat melancholiam. Est autem melancholia sic dicta, quodd ab humore nigro, non quidem atra bile nascatur. Non enim melancholia, nomen est nigri humoris, sed morbi. Nec verò melancholici vulgò dicuntur qui sunt in dominatu nigri humoris, nec qui à scopo veritatis aberrant; vt certè aberrant melancholici verè dicti: sed illi maximè qui studio discendi sunt apud se, & qui bonarum cogitationum epulis taciti recreantur & saturantur: quemadmodum de Vlysse narrat Homerus. Quinetiam noster præceptor non attigit solum melancholicos mente captos, cum ait. *Τοῖς δὲ μελαγχολικοῖς φαρμακεύειν ἀδρότερος τὰς κατὰ. ἢ. Melancholicos, serio per inferam aluum purgare oportet.* aph. 9.4. Sed eos attigit etiam quibus hypochondria sunt obsita nigro humore, nec tamen sunt melancholici errore mentis. Tum verò illos homines qui cum olim calido & sicco temperamento fuerint; affecta iam ætate, sunt frigidi atque sicci. Talium enim sic comparata est ratio complexionis atque humoris, vt cum purgare cōsiliū est, pharmacum esse debeat *μοχλικόν*; cuiusmodi solet præscribi ad morbos qui humoris morbifici contumacia in vetustatem inciderunt. Sic elleborisum commendat Hippocrates: quando, vt scribit Galenus, *τὸ πάθος χρόνιον ὄντι, καὶ ὡς αὐτοῖς πρὸς μολύβδου δόξαν. ἢ. diuturna est passio, & velut veste indigens.* comment. 6. in part. 1.6. Epid. Sed alia quoque ratio est cur serio καὶ ἀδρότερος purgandi sint melancholici à 40. ad 60. ætatis annum: quoniam illa ætate sperabiles non sunt crises κατ' ἐκβολὴν ἢ κατ' ἀπόθεσιν. Quòd fit vt omnis spes medici & cœptæ curationis fiducia posita sit in pepasmo & purgatione. At verò melancholici mente capti, eiusmodi sunt, morbo melancholiam occupati.

Sed melancholiam nomen & ratio, duplex omnino est apud Hippocratem. Vna quidem eorum quos acuta febris inuasit: altera verò illorum qui habent *ὀρθοσίδιαν*, & febre carent. Ac prior significatio est in illo. *Τοῖς ἐξισταμένοις ῥιζαρχολικῶς, ὃς ἔσται ἐπὶ τὸν τοῦ κακῆς. ἢ. Qui melancholicè de potestate mentis exeunt, si tremor superueniat; malo sunt loco: vel potius, sunt desperati.* procr. 14. c. 1. Ad quem locum hæc scripsit Galenus. *Μελαγχολικὸν ἔσται ἢ ἀκαταστατον, τὴν σφόδρα καὶ πλεονάζον. γίνεται δὲ αὐτὴ, ἀσθενεστάτης τὴν ἐν τῇ φύσει κατὰ τὴν φύσιν. ἢ. Egressio melancholica hic audienda quæ violenta est atque ferina. Hæc autem gignitur à stassa bile perusta, cerebri imbuente.* aph. 23.6. & c. Epid. part. 8. Altera melancholiam significatio est in hac prognosi & in aphorismis, quam stylo nostro decernimus explicare. Ergo melancholia hic posita, delirium est intermissionis & febris expers, cum assiduo metu & mœrore coniunctum. Delirium cernitur in mentis egressione. Mentis egressio est in falsa & praua opinione, non quidem phantasia; sed ipsius iudicij, quod ἡ χαμαικότ Græci vocant, & in quo regnum est animi. Falsæ ac prauæ opinionis causa est ægritudo ex metu & mœrore concepta. Nam ex mœrore & metu, potissimum ipsa mens commouetur, & inde nata ægritudo, perennitatem habet eorum pathematum à quibus enascitur. Et cum melancholicus omne tempus exigit in ægritudine: ibi mœoris & metus nulla vacatio esse potest. Itaque perpetua ægritudo, quæ propriè est melancholia, ostentat quoque assiduitatem mœoris & metus. Quæ duo pathemata sunt melancholiam *ἐκστα*: sicut illius olim fuerunt *ἐκστα*. Est autem melancholica ægritudo, febris expers: quia cerebri nulla est proratio, sed tantum infractio quædam mentis. Et verò noster præceptor, melancholiam domicilium collocauit in mente, ipsamque voluit segregari ab omni concretionem corporis. Sic enim scripsit. *Οἱ ῥιζαρχολικοί, καὶ ἐπληθικοί εἰσὶν ἢ γίνεται ὡς ἐπὶ τοῦ κατὰ καὶ οἱ ἐπληθικοί, ῥιζαρχολικοί. Τούτων δὲ ἐκαστοὶ πολλοὶ γίνονται ἐφ' ὅτι περὶ αὐτῶν τὸ πρὸς ἀπόθεσιν. ἢ. Melancholici & epileptici consueverunt esse vt plurimum: & epileptici, melancholici. Horum verò vtrumque potissimum accidit, prout in alterutram partem infirmitas se inflectit. Ac si quidem in corpus, epileptici sunt; in diuina autem, melancholici. Est igitur melancholia, mentis: vt epilepsia, corporis. Atque hæc duo symptomata melancholiam & epilepsiam, se mutuò consequuntur, & sibi succedunt inuicem; non quidem per μεταστροφήν epilepsiam in melancholiam, & contrà: sed per ἐπὶ τὴν vtrinque profectam. Non enim successio est causæ morbificæ in alterutrum, vt scilicet ægritudo mutetur in morbum, & morbus in ægritudinem; relicto priore foco, quod μεταστροφήν Græci vocant, & inde est μεταστροφή: sed vtroque malo & vtriusque foco superstitie, propagatio fit vnus alterum, quod est ἐπὶ τὴν αὐτὴν, & inde nata ἐπὶ τὴν αὐτὴν. Nam melancholia superstes, humorem gignit melancholicum epilepsiam; & epilepsia primigenia, ægritudinem parit animo, ex diuturno mœrore morbi, & metu cadendi: vt rectè Hippocrates annotauit. Hinc mentis demissio & veluti quædam infractio. Est autem philosopho, ne dicam Christiano, indignum & nefas, putare causam epilepticam migrare in mentem, quæ sola est ἀνθρώπου, ἀφάρτης, καὶ ἀνέστης, omniumque affectionum securæ præterquam αἰρέσεως, ἢ. opinionis: quæ sola, vt ait Plato, cadit in mentem; ex eaque, si praua est, melancholica ægritudo: sin autem pia & sancta, ἡ εὐθυμία, ἢ. tranquillitas regnat in homine. Quòd enim mens ipsa, omni alteratione careat, planum apertè facit diuina illa disputatio præceptoris, cuius finem attulit hæc conclusio. *Δι' οὐκ οὐκ ἔστιν ἀλλοίωσις ἢ ψυχῇ ἀποχωρεῖ, καὶ πρὸς οὐκ οὐκ ἔστιν ἀλλοίωσις, καὶ οὐκ οὐκ ἔστιν ἀλλοίωσις. ἢ. Cuiusmodi sunt meatus & vasa, per quæ excurrit anima; & vt sunt affecta, quibus accedit; tum illis etiam quibus permiscetur & se infinuat: sic homines aliter atque aliter sentiunt; ob eamque causam eiusmodi pathemata per dietam possunt emendari atque transponi. Sed ipsam naturam inaspectabilem transformare non potest. Est igitur melacholiam* lib. 1. c. 19. diuina ad finem.*

lia, mentis ægritudo quæ cernitur in assiduo mœrore & metu. Eius naturam ita descripsit Arculanus et Auicenna. Melancholia, inquit, est mutatio existimationum & cogitationum à cursu naturali ad corruptionem, timorem, atque malitiam: propter complexionem melancholicam, quæ spiritum facit sylvestrem in cerebro; ipsumque facit timidum, propter ipsius tenebras, quæ, sicut exteriores tenebræ, sollicitant ac timere faciunt, eò quod complexio frigida & sicca contraria est spiritui, debilitans ipsum: sicut complexio calida & humida, qualis est vini, conueniens & confortans. Ex ea iudicij deprauatione nihil nisi perperam opinantur & faciunt melancholici. Nam falsa illi pro viris, turpia pro honestis, vanitatem pro veritate; caliginem pro Sole, & Orcum pro luce habent. Denique inimicos colunt abiecti & humiles; amicis autem, morosè vtuntur & cum fastidio: tum ipsos amicos pro inimicis fugiunt & auersantur.

Ex quibus apparet, tres casus haberi melancholiæ auctores atque fautores; ægritudinem animi; spirituum tenebras; & frigidam atque siccam complexionem cerebri. Sed tamen æquè par est in humidos cadere melancholiam per ægritudinem, atque in siccos. Ac multos ipsi vidimus in adolescentia melancholicos à mœrore & metu. Erat autem illa tempestas tumultuosa, melancholicorum feracissima.

Iam verò illa melancholia quæ in opinionis errore posita est cum ægritudine; utrū alibi sedē habeat quàm in iudicij domicilio; & num aliter quàm in dianœa & à dianœa existat; hîc loco quærendū. Enimvero ratum est medicis, quandam esse hypochondriacam melancholiam, à nigro humore quærendū. Enimvero gignitur in hypochondriis, vbi non rarò effervescent ac veluti fermentatur, vt ait Hippocrates; ac tum ex eo tetram effert anathymiasin, vnde spiritui tenebræ offunduntur, visæque apparent mendacia, quæ, sicut in tenebris, pauitant melancholici: sic ipsos metu exterrēt. Quæ vt concedam vera esse, per illud catholicum theorema; quod vt sunt mentis propria instrumenta: sic homines aliter atque aliter opinantur: tamen non efficitur id verè dici, nec veram esse melancholiam, quæ continenter in opinionis errore versatur cum ægritudine. Est enim verè illud positum à Galeno: quod nullum delirium potest videri *διωκείς*, quando in cæteris partibus, humorum offensiones, cerebrum in sympathiam & contagionem adducunt. Sed præceptoris iudicium est; quod ibi demum est melancholia, vbi quis in mœrore & metu longum tempus exigit continenter. Scitum est illud. *Ηι φόβος καὶ δυνάμει, πολλὰ χρόνιον ἔχοντες ἀπαίειν· μάχαλλον τὸ τοῦτον.* i. Quod metus & mæstinia perdurent; à melancholia illud est.

lib. 3. acut.

lib. 1. πρὸ
διωκείς.comment. ad
protr. 1. c. 1. 1.

aph. 23. 6.

2 Οἷσιν ἐκ φόβου καὶ ἀνύψιος ἐξίστανται· πυρετοὶ μὲν ἰδρώτων, καὶ ὑπνοὶ ὑπαναίνουσι ταῦτα λύουσιν.

Quibus à metu febris vacuo, ad furorem egressio est; id febres cum sudoribus, & somni arctiores, nec turbulenti exoluunt.

PULCHERRIMA hæc decisio est, in qua docetur melancholiæ in maniam, i. furorem, tum ratio explicatur defungendi eo furore, idque *ἐκείνης* & *ἐκείνης*, i. secunda crisi, vnde nihil superest reliquiarum, ac redintegratio est naturæ cum sana mente in corpore sano. Existunt tamen hîc difficillimæ quæstiones, quarum solutio erit in prognoseos ipsius recensione.

Ergo. QVIBVS] Melancholicis, qui sunt eiusmodi; non quidem à mentis ægritudine primum concepta, & iam vetusta, quibus tantum prodest tranquillitatis voces audire, remediumque à Deo precibus impetrare: nihil autem medicinam corporis adhibere, nisi fortè sit medicinæ locus ad symptomatum, quæ inde in corpus cadunt, correctione: sed iis melancholicis, quibus spirituum tenebræ inferunt ægritudinem, à tetra vapore, quem melancholicus humor in cerebro excitauit, vnde animi deiectio est, ac velut infractio quædam: quia visis mendacibus exterrētur, quæ opinionis errorem inducunt.

A METV FEBRIS VACVO] i. Ab ea demissione animi, quæ in futuri mali falsa opinione posita est: vel etiam à timore propter expectationem futuræ censuræ, vt ipsi vidimus in quadam illustri muliere admodum melancholica, quod in suspicionem adulterij venisse se falsò putaret apud maritum, ob eamque causam diem vadimonij coram iudicibus expectaret. Itaque toto corpore perhorrescebat, omnibûsq; artibus cōtemiscebat. Græcè est, *ἐκ φόβου καὶ ἀνύψιος*: quod nos ex professo vertimus, METV FEBRIS VACVO: ad verbum, METV CVM REFRIGERATIONE. Sed illud Græcum, *καὶ ἀνύψιος*, vel extinctionem caloris natiui ostendit in toto corpore, partibûsq; extimis quàm frigidissimis; vel ipsam febrilis ardoris vacuitatē. Ac prior quidē significatio nuper adducta fuit & explicata. Restat altera nunc explicanda, de vacuitate ardoris febrilis, quam hîc secuti sumus. Ergo scire licet in celsura & examine horum duorum nominum, *καὶ ἀνύψιος* & *ἀνύψιος*, alterutrum pro altero recenseri. Legitur autem *ἀνύψιος* in verbo *ἀνύψιοςμαι*, pro vacuitate ardoris & moderatione caloris apud Hippocratem, vbi ait, *ἀνύψιος, & τὰ πάλιν αἰεθρμαίνη*. i. temperiem habuit; mox rursum aestu incanduit. Quod idem est ita scriptum alibi. *Ἀπύρετος ἔδοξε ἡμέρας· ὥς δὲ δειλὴν ἤ πυρετὸς ὤξυς*. i. Visus est febris expers: sub vespertum autem febris acuta, &c. Sic *αἰεθρμαίνω* verbum, pro restituto calore natiuo, & pro accensa febre reperio vsurpatū. Nam quod *ἀνύψιοςμαι* verbum & *ἀνύψιος* nomen, caloris moderationem partiumque ipsarum temperiem, non secus atque frigus extremum significet, testis est illa sententia præceptoris. *Τὰ ἐγκαταμπατόματα καὶ μακρὰ ἐν ὑποχονδρίῳ πυρετὸς ἀνύψιος· κακόν*. i. Ardoris reliquæ in hypochondrio, refrigerata febre, ipsos male habent quos occupant. Nam quod obiicitur; illam temperiem expressam nomine *ἀνύψιος*, insidiosam esse, falsoque inde crediram discessionem febris, tum in ardore hypochondrij, tum in febre acuta: vt illud concedam; tamen

Coac. 3. cap.
23. 2.
protr. 31. & 32.
c. 1. 1. & 34.
c. 3. eiusd.
hist. 2. part. 3.
lib. 1. Epid.
hist. 1. lib. 1.
Epid.
In protr. vbi
sup.

protr. 1. c. 1. 1.

tamen non efficitur quin illa temperies siue *καταψυξις* in hac prognosi posita, non verè significet vacuitatem febris, ubi nulla est inflammatio, nec antegressa febris, aut comes; ut certè nulla est in melancholia. Est autem febris vacuitas in melancholia, quam pertinax metus ostendit, ut signum *ἀρχαῖον*, i. *inseparabile*: quoniam in ea primum laborat illa pars animi, quæ mentis & consilij est, *αἰσθητικῆς*, propterea quæ. Nec verò vlla proritatio est *καταψυξίς*, *ἐρεσιζοῦν* Græci vocant, in stupore animi melancholico, quem inferunt tenebræ spirituum; sed veluti quædam infractio & hebetudo. Nam qui cum febre delirant melancholicè & quasi è mentis exeunt potestate; non sic eorum ratio est; ut mox dicitur.

AD FVROREM EGRESSIO EST] Græcum illud, *ἐξίσταται*, sic vertendum duxi, ne quis existimet Hippocratem hîc posuisse *ἐκστασιν* illam *σιγήσαν*, quæ cum silentio est, ac paulò pòst infra recenset. De qua etiam suprâ iam diximus ad illam prognosin. *Αἱ ἐκ πρῆνιτι ἐκστασις ἐρησται, μὴ ἀφ' οὗ ἐκστασις*. i. *Qui cum silentio, è potestate mentis exeunt, nec voce sunt capti; mortiferum habent malum.* Nec verò *ἐκστασις* illa est, quæ in stuporis excessu consistit, per quam vacatio est officiorum animæ sentientis, mouentis, & intelligentis; ubi homines stupent attoniti & immoti manent, ut vel transfixi non sentiant: tamen non negauerim hîc febrem salutariter exoriri. Sed illud verbum, *ἐξίσταται*, indeque nomen *ἐκστασις* ad melancholicam pertinet egressionem, vel, si mauis, excessum, quem Galenus vocat *μελάνη*, i. *ferinum*: quoniam sic affecti cœptis immanibus efferuntur, proritato cerebro ab atra bile, cuius acriores sunt morsus quàm nigri humoris, quem *μαυροχολικὸν χυμὸν* Græci vocant, cuius in atram bilem *ὁδὸν ποιεῖ*, i. *transitus* est, in melancholia hîc posita. At proritatio atræ bilis magna in cerebro esse solet, quòd ea tres qualitates habeat proritandi, τὸ θερμὸν, τὸ δραστικὸν, καὶ τὸ ὀξύδεις, quæ non sunt in nigro humore vel melancholico. Tantum verò interest inter atram bilem, & nigrum humorem: quantum inter ferrum candens, & frigidum. Ergo melancholici tandem euadunt fanatici, & cœptis immanibus effecti, sese præcipitant ad exitium, ac sibi manus adferunt violentas.

ID EXOLVUNT] i. Vel ferocitate domita, fanaticos faciunt mansuescere & ad se redire; vel esse apud se, qui suæ mentis non erant, per *ἐπαμύρωσιν* qua morbosicæ causæ amotio, & partis afflictæ redintegratio comparatur, nulla superstitie morbi materia, nec empyreumate.

FEBRES CVM SVDORIBVS] Quæ celeriter, continenter, & vehementer mouentur, cum spe salutis, ac sine offensione nobilium partium, nutritiarum, spirabilium, & animalium. Ipse autem faciunt liberè, liberaliter & citò, exire malum, quod intus lædit; per sudores confertim proruptos: unde primum certa est ægris, nec insidiosa leuatio; mox inde perfecta restitutio. Sed febrium commoda hîc descripta non recipit ad perfruedum, illud prorrheticum, nec illa prognosis iam posita. *Οἱ ἐκστασις, ὀξέως ἐπ' αὐτῆς ἐκστασις ἐρησται, καὶ τὸ ὀξύδεις*. i. *Quibus excussa insania, febris acuta superuenit; phrenitici rursus euadunt.* Quæ sententia si attentè legatur, & ad Momi lucernam examinetur; non expugnat: sed ne oppugnat quidem, quæ scripsimus in hunc locum. Id planum faciet commentarius noster. Sed instat Galenus, cui placere iam nuper vidimus atque aliàs, nihil expectandum à febre quod sit salubre, nisi ad eos morbos, qui vel à frigore simplici enascuntur, vel cum humore crudo. Quod certè ut verum est: sic à sententia nostra non discrepat. Nō enim hîc febris est primum exorta, cuius excursionem in cerebro stabulante, paraphorica symptomata excitantur, quæ ipsa vi febris vires acquirunt eundo. Nec verò vlla est cerebri phlegmone: sed proritatio febris expers, quæ vel hæmorrhoidè, vel ipsis varicibus in crure obortis quiescit: quemadmodum ipsa quiescit etiam, sudoribus criticis, qui à febre cientur. Adde quod humor temperamento frigidus, nunc factus est cunctando acrior, & in atram bilem migravit.

ET SOMNI ARCTIORES] Quorum magna vis est pepasmo ad crisin, & vnde firmissima crisis ostenditur: idque cum aliàs, tum verò in ecstasi, vel, si mauis, excessu melancholico, in quo infelix animi vix vnquam

Soluitur in somnos, oculisve aut pectore noctem

Accipit, ---

ut poëta cecinit de Phœ-

nissa. Ac beneficium somni ad crisin, restatur illa sententia præceptoris, *Οὐκ ὀξέως πορεύεται ὕπνος πάντες ἀγασθῆναι*. i. *ibi somnus benignè facit, ubi delirium inde quiescit.* Et. *Εὐπνία τὰ ἐκ πρηνιτι ἐκασθῆναι ἀγασθῆναι*. i. *Quæ in phrenitide memorantur insomnia; boni sunt ominis.* Quòd autem somni arctiores nec turbulenti firmæ sint crisis atque securæ; in promptu est illa prognosis iam adducta. *Somni arctiores, nec turbulenti, firmissimam crisin denunciant: turbulenti verò cum labore corporis, incertam nec stabilem.* Ergo. **SOMNI ARCTIORES]** Qui sunt eiusmodi per aliquot dies à crisi: quoniam necessitati summæ à diuturnis vigiliis par est dormiendi somnique ineundi commoditas in temperie cerebri, materia suavi somnifera, & tranquillitate animi iam regnum in recto iudicio possidentis.

NEC TVRBVLENTI] Græcè est *ἰπτανάουδαι*, emendando vulgatum codicem Græcum, qui habet *ἰπτανάουδαι*, i. somni silentium & placidè dormientium exactam ad noctem, qui faciunt breues tenebras: quia illi serpunt gratissimi, curasque leniunt, & corda oblita laborum. Ex quibus significatio fit redintegrati cerebri, & sanæ mentis, nec ampliùs perturbatæ. Nam turbulentos facit *ἡμερῆ* & acris tetraque anathymiasis.

3 *Εκ μανίης ἐς βερέχον μὲν βῆχος, δόπασσις καὶ ἐν τοῖσι μανιώδεσι πασμοῖς ἡμερῆς ὁμόμοτος, ἀμαύρωσιν ἔχῃ.*

Ex furore ad raucitatem cum tusi, abscessus: tum insanientibus exorta conuulsio, ἀμαύρωσιν adducit.

VT NIHIL melius bona crisi, qua illud ipsum quod intus lædit, foras excluditur, ac redintegratio vel ἐπιστροφή comparatur corporis è natura egressi, quæ certa & stabilis sanatio est: ita nihil peius nec magis mortiferum, quam praua μετέσσις vel egressionis progressus ad pessimam ἐπιήρσιον. Bona est crisis insaniz per μετέσσην timoris melancholici, non autem phrenitidis. Bona est, inquam, crisis; proroptus sudor à febre qui restituit cerebro, somnum conciliat suauissimum atque gratissimum. Prava μετέσσις, raucitas, cum rufsi oborta. Pessima ἐπιήρσις, conuulsio est insaniz confectaria. Ac sudoris quidem & somni commoda sunt exposita in superiore prognosi καὶ ὑποψίῳ furoris ex melancholico metu enati. Nam μετέσσις prauæ & ἐπιήρσις incommoda recensentur hoc modo.

EX FVRORE] Hic posito, qui est ῥαυχολικὴ ἔκστασις, vel, si mauis, egressio melancholica; cum scilicet quispiam è melancholico enadit fanaticus. Existit enim mania quædam phrenitica quam genuit bilis atra, ex flaua bile perusta, cuius quidem multò sunt acriores morsus quam flauæ; propterea que infert sæuiora pathemata quam ipsa phrenitis vnde ortum habet cum febre, cuius melancholica rarò est particeps. Ac de mania quidem phrenitica, illud iam vidimus possum à præceptore. Phrenitici spiritatores, fanatici; etiãne tremuli? Nã à phrenitide sæuiore ad maniam facilis egressio esse solet: vt penè miraculo apposuisse videatur Hippocrates quòd illa tempestate pestifera quam descripsit, ne vnus quidem phreniticorum qui tunc ægrotabant, euasit fanaticus. Sic enim ait. Οὐδὲ ἐξ ἐμῶν φρενιτικῶν ἰδίς, ἀσθενὲς ἔτι διέμειν, &c. Sed huius phreniticæ maniz multa sunt exempla primo libro Coacarum prognoseon.

Ergo. Ex furore melancholico A B S C E S S V S] Καὶ ὑπόδου, i. per decubitus materiz morbificæ, quòd vel ipsa excurrit, vel eò transmittitur: non autem κατ' ἐκβολήν, i. per excretionem veram & criticam: qualis descripta est ad salutem, superiore prognosi. Atque hæc quidem ὑπόδου non fit ὅτι δει, i. quòd decet, nec salutare edit abscessum: qualem exortum legimus Herophonti, per quem defunctus est morbo lethali. Exortus est autem primùm in liene, mox in crure κατ' ἵν, i. è directolienis. Qualem etiam còmodis ægri rebus enasci testatur illa sententia præceptoris. Τοῖς μακρομένους κροτῶν ἢ αἰμορροῦντων ἐπιήρσιον ἐκ τῆς αἵματός. i. Insanientibus hæmorrhoides aut varices exortæ, sanant insaniam. Quem aphorismum Galenus enarrans hæc scripsit. Ἐκ τῶν μακίων τῶν κρεῖστος ῥαυχολικῶν καλεῖ, ἢ τῶν ἀπὸ χολῆς. i. Hic sanè maniam vocat melancholiam verè dictam, non quæ à bile est. Ergo nascuntur abscessus è mania quæ in excessu melancholico est; non autem phrenitico. Atque illi demum abscessus consolantur medicum tpe certa salutis, quos modò recensuimus. Hi verò metu exterrent interitus, qui sic è mania melancholica enascuntur.

AD RAUCITATEM CVM TVSSI] i. Ad vocis asperitatem cum sicca rufsi coniunctam: quarum illa quidem inæqualitatem ostendit arteriz catarrho imbutæ; hæc verò perennitatem catarrhi in fauces & arteriam prolagentis. Et quia catarrhi vis effera est, quæ cernitur in raucitate & sicca tufsi assidua; periculum est ne tabem inferat erodendo pulmonem. Quod metuens noster præceptor, ac tanquam è specula eam calamitatem, vt tempestatem futuram, præuidens; prognosin hanc medico ad industriam comparandam præscripsit. Βερέχως μετὰ βνήδος καὶ κοιλίης ὑγῆς, πῶς αἰετῶν. i. Raucitas cum tufsi & aluo liquida, pus educit: non quidem primùm & per se, sed interuentu phthisis quam facit catarrhus ille raucitatis author & tufsis ferinæ. Quæ docendi ratio est quodammodo ἀντιματώδης, quemadmodum in hac prognosi cum ait. EX FVRORE MELANCHOLICO, ABSCESSVS AD RAUCITATEM CVM TVSSI; HABET ΑΜΑΥΡΩΣΙΝ. Quod idem est vt si diceret; ægrotum lumine cassum reddit vita extincta. Sed clariùs hoc infra dicitur.

ET INSANIENTIBVS] Græcè est μακίως, in quibus regnant τὰ μακία, vel qui sunt in omni excessu melancholico. Huiusmodi μακία sic leguntur in aphorismis. Τὴ μὲν ἥρως τὰ μακία καὶ τὰ ῥαυχολικά. i. Vere quidem futura est pathematum mania & melancholia, &c. Est autem credibile hic vernam insaniam, non in excessu phrenitico, sed melancholico constitutam. Et verò οἱ μακίως εἰς τοιοῦτον εἶδος, vt, si aucupio dictionis credendum est, non mania illa feroci phrenitica; sed leuiore ac melancholica, ex qua propriè fanatici nominantur, impliciti esse videantur. Ergo insanientibus, non quidem phreniticis, in quibus insaniz summa sunt omnia, & ceptis immanibus efferi sunt, propterea que vinculis coërcendis; sed insanientibus melancholicis: tamen & illud quo ista ponuntur, in phreniticis locum habet, nempe à conuulsione ἀμάρωσις.

EXORTA CONVVLISIO] i. Iniussa & inuita contractio artuum dolorifica, non autem simplex iniussa collectio quæ omni dolore caret; nec verò conuulsificam intra se habet causam: sicut nec epileptica contractio artuum. Exoritur autem in mania, conuulsio quæ priùs non fuit, per causam conuulsificam artubus impertitam, ἢ καὶ μετέσσην, ἢ κατ' ἐπιήρσιον, i. transponendo aut propagando. Ac μετέσσην quidem in illo est. In melancholicis morbus periculum sic ostendit ipsorum decubitus. Aut enim apoplexiam corporis, aut conuulsionem, aut maniam, aut cecitatem ostendit. Επιήρσις autem in illo. Qui melancholicè insaniant, si tremor superueniat; malo sunt loco. Sed mania melancholica ipsa per se non infert ἀμάρωσιν: verum interuentu conuulsionis. Nec verò illa conuulsio maniz succedanea, vel potius confectaria, secum habet ἀμάρωσιν, suffocando calorem nativum, sed extinguendo. Est enim ἀμάρωσις propriè & metaphoricè, symptōma extinctionis, vel ipsa extinctio. Quamobrem conuulsio hæc, symptōma erit maniz per ἐπιήρσιον: non autem maniz in conuulsionem μετέσσην. Sed illa ἐπιήρσις incremento accidit morbi: cum scilicet diuturna & vehemens alteratio vertitur in alienationem partis obfesse. Atque inter μετέσσην & ἐπιήρσιον conuulsificam quid intersit, planum illud facit. Quòd melius est delirium superuenire tremori, quam tremorem delirio. Nam ille tremor est μετέσσην alterantis: hic verò ἐπιήρσις alienantis. Atqui alteratio nondum habet ἀμάρωσιν; & adhuc sperabilis est redintegratio: alienatio autem habet cum desperatione salutis: quoniam à priuatione habitus denuo comparari non potest.

PRAE SE FERT ΑΜΑΥΡΩΣΙΝ] Hic non intelligit antonomasticam illam ἀμάρωσιν quæ oculorum

Coac. 99.
lib.

3. Epid. part. 3.
Vide còment.
ad pronth. 1.
c. 1.

hist. 3. 1. Epid.

aph. 22. 6.

Coac. 52.
cap. 16. 2.

aph. 21. 3.

aph. 35. 6.

proth. 14. c. 1.

lib. 1. progn.
de stridore
dentium qui
superuenit
delirio.

oculorum est propria: cum scilicet exhausto humore crystallino & spiritu visifico; tum etiam extin-
 do splendore & lumine oculorum proprio, ipsi apparent oculi velut emortui. Ac talem ἀμαύρασι no-
 minat in prognostico, ὅψι ἀσχυμῶσαι καὶ ἀμαύρα, i. visionem squallidam & lucis expertem. Eò spectat igitur
 illud, ἀμαύρασι ἐστὶν, ut intelligamus duo hic posita; nempe abscessum & furorē ad rancitatem cum tuf-
 si; & conuulsionem exortam præ se ferre causam & signum exoluti spiritus, & extincti caloris natui;
 proptereaque mortem subesse: quæ quidem verè & appositè dici potest ἀμαύρασι. Nam & πνεῦμα ἀμαύ-
 ρον, i. obscuram spirationem, morti proximam, eò quoque dici reperio apud Hippocratem. Quæ cum ita
 sit, vtrè & appositè sic videor interpretaturus istam prognosin. E FVRORE AD RANCITA-
 TEM CVM TVSSI; ABSCESSVS AMAYPΩΣIN EXEI, i. mortem infert, vel adducit.
 TVM INSANIENTIBVS EXORTA CONVVLISIO, AMAYPΩΣIN EXEI, i. mortem
 subesse testatur. Atque hæc, nisi fallor, germana est versio & enarratio diuinæ prognoscis.

4 Αἱ σιγῶσαι ἐκείσας, οὐκ ἡσυχάζουσαι; ὄμμα δειδλέπουσαι;
 πνεῦμα ἔξω ἀναφέρουσαι. ὀλέθρια. ποῖσι δὲ ὀραπληκτικὰ χρόνια;
 ἀπὸρ καὶ ἐκμαίνονταί ἐσσι. οἷσι δὲ ὀπὶ παρασχὴ κοιλίης ἔτω ὀροξυῶν-
 ται. ὡς ἐκρίσιν μύθῃνα διέρχεται.

Qui cum silentio sunt excessus inquieti, oculos circumagentes, ac
 spiritum sublimè intrò ducentes; mortiferi. Sed tamen diuturnas infe-
 runt paraplegias: quinetiam furiosi euadunt. Quibus autem, alio tur-
 bata, exacerbatio est; iis ferè sub crisin nigra ducuntur.

MORBORVM omnium, principatus naturæ sic occupantium, ut inde ipsorum officia peruehantur;
 expectanda in peius mutatio est. Hic nulla sperabilis redintegratio. Sic enim comparata est ratio
 morborum lethaliū, ut si non citò exeant crisi propria & secunda; quemadmodum illi specie ipsa pri-
 mum, symptomatisque multum exterrēt medicos: ita mox edant signa iam iam futuræ mortis. Ne
 longius abeam; exemplaque ex aliis repetam huc pertinentia; examen sufficet huius prognoscis: Sic
 igitur meis ponderibus examinabo.

QVI CVM SILENTIO SVNT EXCESSVS] Quos intulit melancholia: quod ipsa ta-
 men non facit primum & per se, ἀλλ' ὅταν ὁ μολιχολικός χυμὸς ἐπὶ πλείον, ἢ τοι συγκαυθῇ, ἢ δισσώπῃς. ὁππότε
 κακῶς δρῶνται, i. cum melancholicus humor perustus, aut putrefactus, comparatur sibi maligna actimonia.
 Est igitur excessus ille per ὁππότε melancholiz, de suo statu egressus: proptereaque magis occupat ce-
 rebri principatum, accessione qualitatis malignæ quæ est in atra bile quam genuit melancholicus hu-
 mor, cuius non ita sunt acres morsus quàm atræ bilis. Atque hæc melancholiz in excessum mutatio,
 40 peiusque habet cerebrum, magisque vitiat animalitatem in motu & sensu; quàm melancholiz ipsius in
 suo statu permansio. Quinetiam in excessu maiora sunt vitia officiorum animæ intelligentis, quàm in
 melancholia. Officiorum animæ intelligentis, vitia hic cernuntur; primum quidem in silentio & in-
 quiete animo: mox in furore & rabie. Melancholicus quidem excessus cum silentio, memoriam renou-
 uat melancholiz taciturnæ quæ in errore opinionis versatur. Hic autem silentij causa est, animi perti-
 nacia superstes melancholiz quæ in excessum migravit, ἐκστασι Græci vocant. Non enim silentium hoc
 melancholicum, culpa linguæ accidit quæ voces efformat: sed impotentia voluntatis quæ pertinaci a-
 nimo morem gerit. Nec verò impotentia est facultatis, nec organi dialectici: sed eius tantum, quam
 modò attingi, voluntatis καὶ παρὰ τὴν. Itaque proritatio hæc cerebri quæ facit excessum, animalitatem
 50 promouet ad inquietem: melancholiam verò non tollit; nec vitia emendat officiorum animæ intelli-
 gentis.

Galen. com-
 ment. ad
 aph. 55. 6.

Est autem ἐκείσας, triplex distinctio; vna stuporis, qua stupent attoniti, manēntque immoti, vulgò
 dicuntur τανύς; altera silentij & inquietis; tertia verò furoris & rabiei, quæ quidem phrenitica nomina-
 tur. Secundæ ἐκείσας in tertiam ὁππότε recensetur in hac prognosi cum ait, FVRIOSI EVADVNT:
 cuius exemplum legitur in Dealcis vxore, quæ morbum exegit vsque ad finem vitæ, quem attulit die 21.
 partim cum silentio melancholico, partim cum multa nugarum garrulitate phrenitica. Itaque triplex
 illa distinctio sic nominari poterit, ἐκστασι ἀπλῶς dicta, ἐκστασι ὁρῶσα, καὶ ἐκστασι φρενιτικὴ.
 Sed illa ἐκστασι quam hic vocat σιγῶσαι; non est eius silentij quod vel aphonia induxit conuulsoria;
 vel cerebri alienatio quæ facultatem adimit vocalem & dialecticam. Sic ebrii & cataleptici, ex priore
 60 causa obmutescunt conuulsi, per iniussam contractionem, quæ vera cōuulsio est partium vocalem ma-
 teriam exprimentium, deducuntur, & modulationem. Sic ex altera causa quæ est cerebri alienatio; de-
 liria obscura, cum silentio & tremore coniuncta, sunt valde phrenitica, cum in propinquo morset; Sed
 illud silentium agnoscimus quod ex mœiore narum & metu, simulatque orta est melancholia, in eius
 excessu voluntatis καὶ παρὰ τὴν; denunciat impotentiam, eximiamque animi pertinaciam. Etenim ἀνα-
 στα quam aphonia inuexit conuulsoria, cum excessu melancholico; mortis prænuncia est mox affuturæ.

Coac. 1. cap.
 9. 2. & priorib.
 19. 6. 1. 1.

prom. 33.
 1. 1. 1.

tis excutere quod sibi molestum est. Atque hic cernere est, verum illud esse catholicum theorema. Quod omnes partes officiales incitantur & excitantur magis ad exclusionem rei molestæ, quam ad comparationem necessariæ. Ergo descripta hic respiratio, ut signis abundat lethalibus: sic ipsa officij vacatione, quam adducit; mortifera est atque funesta.

MORTIFERI] Causæ sunt explicatæ, in essentia morbi & signis lethalibus; quæ sunt, inquires, oculorum varij huc illuc coniectus; tum respiratio magna, rara, tarda & velox.

SED TAMEN DIVTURNS INFERUNT PARAPLEGIAS] Ac si diceret: quemadmodum alterato diu multumque cerebro, unde primum silens excessus, itur ad eius alienari à propriis quæ ternitur in oculorum crebro huc illuc coniectu, & difficultate illa spirandi quæ vitio incidit voluntatis, & cerebri languescens: ita contentione forti naturæ in cerebro, effectis iam nervis; ibi nascuntur paraplegiæ, quo ipsa materia viam affectat; quæ non excutuntur facili, sed firmiter fixæ diu manent: propter humoris morbifici contumaciam, & infirmitatem partium obsessarum. Itaque à silenti excessu melancholico nihil expectari potest præter interitum: nisi oborta febre cum sudoribus, vel abscessu paraplectico, defungantur eo periculo. Sed tamen non facili adducor ut eos ab interitu vindicent paraplegiæ, quas alibi docet esse funestas, quando superstitie malo cerebri enascuntur: ut ipsi annotauimus in comment. nostro ad illam prognosin. *Parotides prauæ sunt paraplecticis.* Quid autem sit paraplegia, quæque sint illius causæ; dictum est in apoplexia. Ex quibus apparet quæ sit attentio medici ad res ægroti, dum occupatur silenti excessu melancholico, unde progressus sit ad symptomata grauiora: cuiusmodi hæc sunt quæ sequuntur.

QUINETIAM FVRIOSI EVADVNT] In quibus insanix summa sunt omnia. Sic enim comparatum est, ut primum ægritudo cum metu, adferat demissionem animi quæ parit ἀπαισθησίαν, inde à silenti excessu nascitur μουσθησία, quæ tandem ab odio transit in λυμαινόμενην, cum rabie furibunda. Scitum est illud. *Quem quisque metuit, odit; & quem quisque odit, perisse expetit.* Itaque non sine causa, metus parit odium; atque hoc rursum φλονημωσίαν, qua homines incitantur ad vlciscendum, vel eos etiam à quibus falsè læsi esse videntur. Ut autem progressus illi pathematum, duce opinionis errore, mutuo se consequuntur, ac mentis illius tyranni sunt: ita cerebri alteratio, quam sæui humores inferunt; suo excessu, parem adducit symptomatum accessionem, quam deprauatio ipsa ostendit officiorum animæ mouentis & sentientis: quemadmodum ipsi opinionum errores peruertunt officia intelligentis & immortalis. Igitur à silenti excessu melancholico, furiosi euadunt, i. in summo sunt excessu furoris: ubi ad vltima ventum est ferocis insanix, & immanitatis: ob eam sanè causam, quod summa peruersio est officiorum animæ immortalis, quæ in errore summo versatur crudelium opinionum, quæ ipsi, tanquam speculo, visis mendacibus offunduntur à tetro vapore bilis atræ acerrimæ, in cerebrum sæuientis, unde peruersio est etiam officiorum animæ mouentis & sentientis, sicut iam demonstraui-mus. Ac de symptomatis & natura insanix, dictum est supra in phrenitide.

QUIBUS AVTEM ALVO TVRBATA, EXACERBATIO EST] i. Quibus aluo prorupta cum morfu ab effera bile, silentis excessus melancholici egressio est ad furiosam insaniam.

NIGRA DVCVNTVR] i. Deiectionibus nigris alui feruntur: quod eò natura & humor cursum infectat: quemadmodum spuratores, phrenitici, & inde fanatici, nigra vomunt. Ut enim priusmo niger vomitus: ita perturbatione alui, nigra in his deiectio esse solet. Ac deiectionum nigrarum, cur ita sint, eadem planè ratio est quam posuit in illa prognosi. In dolore stomachi febriculoso, aluus cum morfu prorupta; deiectiones nigras prænuñciat.

SVB CRISIN] i. Sub finem vitæ, cum in propinquo mors est. Nunquam enim feruntur alui, sua sponte, nigris excrementis, tum melancholicis, tum atrabilaris; quin pessimè sit ipsis ægrotis. Expectandæ hic potius hæmorrhoides, aut varices; quæ tamen furibundis, propè iam alienato cerebro, nihil prodessent. Nam hæmorrhoidum commoda, quæ πῶς μαρτυροῖσι commendantur à præceptore, Galenus ibi author, *μαρίαν* ab eo dici τὴν κρείστος μαρτυρίαν. Quod autem ad crisin attiner, nouum non est, noumen illius pro exitio interdum usurpari. Testis est illa sententia præceptoris. *Lingua quæ multum nigrescit, intra 14. diem, crisin fore ostendit, i. exitium ægri denunciat.* Nam ei periculo illud adiecit, *χαλεπὴν τὴν ἡμέραν, καὶ χαλὰν.* Sed hæc sufficiant.

DE FRIGORE LUMBORVM.



ΙΣΙΝ ὑγῆνοισι, χιμῶν ἐόντων, πλεῖν ὀσφρὺν ψυχρότης, καὶ βαρὺ ἀπὸ βραχείης περὶ φάσι, καὶ κοιλίης ἐπίσας, τῆς δὴ καλῶς ὑποηρεπούσης ἰχίας, ἢ νεφρῶν πόνον, ἢ σπασίαν, τὰχ' αὖ συμβαίη.

I Quibus rectè valentibus, hyeme frigus est circa lumbos, atque grauitas leui de causa; tum aluus subsistit infera, & supera in officio est

cōueniēter; iis vel ischias, vel renum dolor, vel strāguria fortē cōtingit.

PROGNOSIS hīc posita, familiari docet exemplo, distinctionem causarum efficientium, suscipientium, & reuocantium, ad succedentium inde morborum prauisionem. Est autem potissimum scripta in gratiam ischiadis.

QVIBVS RECTE VALENTIBVS] Græcè est *ὁμαλούς*, i. qui bene valent natura, & valetudinis cura; sine ullo diætae vitio, in victus ratione, & vitæ instituto, quod Græci dicunt, *τὸ οὐδὲν καὶ τὸ ὑγιανόν*: vt nulla excusatio sit *τῶν ἐντέροντων*, i. eorum quæ intrā sunt, & intus lædunt; nec eorum etiam quæ veniunt *ἀπὸ τοῦ ἐξωθεν*, i. extrinsecus incidunt, à spiritu & inclementia tempestatum; quod inde coniicio.

HYEME] Scilicet aquiloniæ tempestatis quæ autumnalem exceperit austrinam. Sic enim præceptor ait. *Ἡ δὲ τὸ φθινόπωρον ἐπιμύρον καὶ τὸ πρὸς ἡμῖν κεφαλαγία ἰσχυρὰ ἐς τὸ χιμῆρα, καὶ ἑσθες, καὶ βραχὺ, καὶ κάψασι αὐτοὶ δὲ καὶ φθίσις.* i. Si autumnum pluuia occuparint & austris, cephalalgia fortes ad hyemem; tussis item, & raritates; nonnullis etiam phthises. Atque hoc fundamentum erit prognoscere enarranda. Hic non decet causam referre pituitatis hybernæ, ad nescio quam diætam, hyeme consuetam, cruditaris parentem. Hanc non agnouit præceptor cum scripsit. *Ὁ μὲν χιμῆρ ἀρδὺς ἐργον, καὶ πᾶσι τὰ εὐεργετὰ, καὶ ἀνία.* i. Hyems ignaua est; tum ea quæ assumuntur, cocta sunt atque simplicia. Et tamen Hippocrates author est, hyemem esse *εὐμαρτυρὴν*, i. pituitæ procreatricem. Ergo non à diæta, sed à spiritu & tempestate hyberna. Quæ ideo visum est annotare, vt statuam & confirmem id quod initio posui; nempe hīc, rectè valentes intelligi eos qui sani sunt natura & valetudinis cura.

FRIGVS EST CIRCA LUMBOS] i. Frigus, quod frigidi humoris appulsu occupat eam regionem *τῆς πλάγος*, quæ infra thoracem est, supra os sacrum vbi finitur, habetque vertebrae quinque. Ac lumborum nomen in hac regione descriptum, suo velut ambitu complectitur omnia quæ continentur, quæ continentur, quæ adiacent foris & intus: tum ea quæ à lumborum nervis ortum habent. Huiusmodi sunt vertebrae ipsæ, quæ continent; medulla spinalis, renes, & γοναί, i. genitalia muliebria, quæ continentur; carnes lumborum foris & intus, vena vtrique lumbaris, quæ adiacent; mesocolum, quod à lumborum nervis enascitur. Lumbares musculos, tam intus quàm foris, ipsamque adeo spinalem medullam; tum etiam ligamenta & nervos lumborum, frigus exercet; non quidem à simplici statu aquilonio, & frigida intemperie: sed à catarrhi prolapsu, cuius materiam abundè suppeditat austrina tempestas exacti autumnis, quam hyberna excipit aquilonia. Sic enim docuit in aphorismo quem ex libro tertio aduocaui. *Κεφαλαγία ἰσχυρὰ, καὶ κόρυζα, i. cephalalgia fortes & coryza ad hyemem.* Nam dictum est a libi ac demonstratum; coryzae nomen complecti omnem catarrhoicam repleti capitis expressionem. Et verò cephalalgicum illud symptoma capitis multum repleti ab autumno quem auster & pluuia occuparunt; facile transsit in catarrhoicum, vel ipsum per se primum ab eadem autumnali tempestate infertur, adueniente hyberna frigida & aquilonia.

ATQVE GRAVITAS] Quæ causam dolorificam, firmiter ibi fixam ostendit, quæque sympathiam non exhibet vicinarum aut sociarum partium afflictarum: sed veram *ἰδιοπάθειαν ἢ παροξυσμὸν*, i. primigeniam vel aduentitiam, per *μετακίνησιν* è capite vbi fuit primum *καρπὸς ἐπὶ πόδων*, quod inde migravit in lumbos. Omnis enim *καταδρομὴ*, sicut de anadrome dictum est; ibi morbum facit, vbi subsistit. Est autem *gravitatis* nomen positum ab Hippocrate, pro afflictione quam facit rheuma consistens & concitatum; siue quod eò proreperit, vbi colligitur. Atque talis gravitas, detrahendi & retrahendi consilium adfert medico: sicut faciendum præcepit in pleuritide, vbi sensio est gravitatis ad mammam & brachium. Quod tamen eò dici nolim quis putet, vt, venâ incisâ, sanguinem detrahendum censeam ad omnem partium gravitatem. Ergo hīc posita lumborum gravitas, quam parit crudi humoris collectio firmiter fixa in lumbis, non autem sympathia partium enatarum vel intrā sitarum, cuiusmodi est lumborum dolor ab intestini torminibus; cuiusmodi etiam renum grauis dolor in calculosis; tum illa quæ sunt in lumbis dolorifica mala sanguiflua.

LEVI DE CAUSA] Tam intrā, quàm extrinsecus: est enim *αἰσθησις* illa duplex; cum scilicet fugax & levis intemperies frigida, lumbis iam frigidis horrida est; ac multum inducto iam frigori & gravitati adiicit: tum autem quæ intus lædunt, leui opera sunt graviora. Scitum est illud; quod omnis pars intemperata, similem intemperiem facilius excipit quàm temperata contrariam. *Τὸ γὰρ εὐκταὶ δυσκρασίαν εὐδαιμόνιστος πάσχει*, i. intemperie propria, facile omnes corripuntur. Itaque *τὰ αἰσθησιμώτερα*, non minus malo adiciunt, excipiendo; quàm *τὰ αἰσθησιμώτερα*, inferendo. Et quoties *τὸ πᾶν πᾶν*, simile habet *τὸ δὲ πᾶν*; quæ inde nascuntur mala, grauissima esse solent.

TVM ALVVS SUBSISTIT INFERA] Non quidem sicca, & quæ non nisi ægè excrementa reddit *αὐροαὶ δὲ δαίκα*, i. pilularum capra stercororum similia. Hæc enim non sunt bene valentium, quales hīc ponit author. Sed alio bene constituta in naturali œconomia coquendi, ministrandi, & excernendi: tum autem quæ diarrhœam non edit, vel criticam, vel symptomaticam. Nam diarrhœa critica, non chylosa, omnisque adeo cruditaris expers, sanat lumborum gravitatem. Quæ causa movit Hippocratem, vt inferam purgationem duxerit præscribendam ad intestini torminacum dolore lumborum, & genuum gravitate coniuncta. Quem locum sic enarrat Galenus. *Κατὰ τὸ πᾶν ὅπως οἱ λυπηρὸν χυμῶν, & τὰ καὶ αὐτὸς χεῖν ποιῶναι.* i. Vt inclinatio est rerum molestiarum: sic vacationes moliri oportet. Itaque diarrhœa critica, & cruditaris expers, materiam & occasionem præripit morbis omnibus quos posita lumborum gravitas, per *μετακίνησιν*, est illatura. Ac præripiendi ratio, quam observare libet in hac prognosi, ex alio liquidis excrementis prorupta *καὶ λόγῳ*; tum verò succedentium inde malorum materia & occasio *ἐν μέρει*

ex alno quieta; eodem planè stylo & scopo hic legitur, aut certe legenda est, quo in prognosticis illa successio paratidum, vel abscessus cruralis ex peripneumonia quæ liberalem & liberam non habuit *ἀνακαθάρσιν*, ægro superstitæ. Est autem hic stylus. Quibus autem ex peripneumonia sub auribus, vel inferis partibus nascuntur abscessus, ilique habent empyema, & fistulantur; hi defunguntur morbo. Hic autem sic esse debet ad res ægri attentio. Si febris detinet, si dolor nondum quietuit, si conuenienter sputum non editur, si aluus non fertur liberaliter biliosis excrementis; si urina nec multa est, nec crassa, nec multa particeps hypostasæ, &c. Ac si diceret: si peripneumonia, propriam non habuerit anacatharsin vnde quiescat, & tamen validæ sint ægri vires, vnde sperabilis vitæ salus; abscessum in superis partibus, vel inferis expectare oportet; modò abscedendi materiam & occasionem nihil præcipiat. Præcipiunt autem diarrhœa & peristhœa. Ergo si aluus subsistit, manetque in officio: sicut iam diximus.

lib. 2. progn.
& Coac. 12.
& 23. cap. 16.
2.

ET SUPERA IN OFFICIO EST CONVENIENTER] Quæ pariem adfert vsui necessario commoditate, in libertate spirandi quæ cordis voto respondet inspirando & expirando, siue raucitate, ac sine tussi; vt nulla offensio partium spirabilium subesse videatur, vnde incommoda veniant abscessus coxarum, vel ischiadici, doloris nephritici, & stranguriæ, quæ recensentur in hac prognosi. Tali enim futura est in afflictione thoracis atque pulmonum: maximè autem cum earum partium sytrophica est inflammatio quæ transitum habet in empyema. Denique si tam secundæ sint res de aluo vtraque, vt commodis vti liceat quibus vita hominum sustentatur, nempe spiritu & nutritio. Nam de aluo supera illud præceptum est, quod ea circumscribitur à thorace. Sed tamen alui superæ non eadem significatio est in aphorismis libri quarti, qui pertinent ad modum purgandi. In promptu est ille. *Φαρμακὸν ἥρεος μὲν τὰς ἀνω μέρων, χαλκὸς δὲ τὰς κατω.* i. Purgare decet, æstate quidem ventrem superum: hyeme verò, inferiorem. Sed extra oleas hæc.

aph. 3. 8. 6.
aph. 4. 6. 7. 8.
& 9. lib. 4.

IIS FORTE CONTINGIT] Per *μυῖτις* si materiæ contumacis, quæ firmiter fixa, diu hæsit in lumbis, nec exitum habuit per aluum inferam, neque per superam. Nam, bene dixit esse ambabus, nec inferam ferri quàm facibus figuratis: superam verò, nullam ciere anacatharsin dolorificæ in lumbis materiæ, quæ non tarò, iis relictis, sursum ad pulmones cursum inflectit; nec turò, sed admodum periculosè. Nam grauitatem lumborum exolui per inferam aluum, is demum intelliget faciliè qui tener sympathiam & syrtimoriam lumborum, mesocoli, & intestinorum; vt in dysenteria è gibberis lumbis enata. Ac tali penè stylo excoluit illam prognosin quæ loco scribetur in stranguria hic posita.

lib. 3. progn.
& cap. 12. hu-
ius 2. lib.

Ergo. LUMBORVM GRAVITATE] Quæ aliter exolui non potuit, neque per aluum superam, neque per inferam. Fortè contingit, pro inclinatione varia humoris morbifici.

VEL ISCHIAS] i. Dolorificum malum, idemque doloris sauiissimi cruciatu acerbissimum, quod occupat *τὴν ἀσπὸς τῆς ἰσχίως, καὶ ἐς ἀκροῖ τοὺς ποταμοὺς, καὶ ἐς τὴν γαστήρ, καὶ ἐς τὰς πτερύγας τοῦ σπλένους πλεονατὰς ἢ ὀδυνοῦ.* i. legamentum femoris, os sacrum, & gloutium siue nates. Est autem grauissimi huius doloris causa; humoris maligni collectio ad *ἀσπὸς τῆς ἰσχίως*, vnde ipsa, sensus acerrimi, distenditur & proritur. Atque illa distensio & proritatio, cruciatus infert saui doloris. Collectionem vocat præceptor *συσπρῖμμα*. De humore autem sic ait Galenus. *Τὰς δὲ ἰσχιὰδες ὕλοισι ὅτι κακοηθεῖα τῆς χυμῶς, καὶ τῆς ὑψέως μάστιγας ἵκεται.* i. Ischiadas credibile est ex frigore & cacœthia succorum nasci. Loquitur autem de ischiade autumnii: qualem hoc loco agnoscimus, quam genuit lumborum grauitas atque frigus. Talis ischias, nata ex frigore & grauitate lumborum, non rarò protrahitur exactum ad annum, nec antè quiescit: maximè verò iis qui iam ætate sunt grandes, nec nisi ægrè ducitur aluus, eaque multò mucore; nec potis est ipsos arrigere. Quinetiam hic morbus eò procedit, vt accessione pituitosi humoris, quæ *μύξα* est veterum; femoris caput è suo excidat acerbulo, idque subinde; quoties ipsum subit; subit autem ex facili, sicut & brachium eo modo luxatum. Secus est de ischiade inuenum, quæ tamen si doloris acerbitate non cedit prædictæ: tamen breuitate ipsa, tolerabilior est: quia discedit facta quadraginta dierum; sed ea lege, vt neque stupor prægrandis, neque frigus incidat lumborum & crurum. Huius ischiadis sic ratio est. Cum pituita & bilis in sanguinem venam confluxit, ibique firmiter fixa subsistit, vndecunque illa inciderit, vel ipsa per se, vel aliunde; tunc oberrat pituita illa, bile permixta, per totum crus; & ubicunque infederit; ibi dolorem excitat acerbissimum, non tamen mortiferum, &c. Nam si purgando non cessat, nec quiescit; vltioni locus est in foco doloris, sit autem vltio crudi lini, &c.

lib. 1. 2. 1. 1.

lib. 2. prorrh.
aph. 22. 3.

VEL RENVM DOLOR] i. Nephritis, tum ipsa per se, tum calculosa. Per se ipsa quidem, primus est è lumbis enata, eò transmissa causa primigenia grauitatis lumborum, vbi dolorem infert grauissimum: vnde coagumentatio est crassi humoris in calculum & arenas. Atque in tali nephritide calculosa, dolorum acerbitas varia esse solet. Est enim primum sytrophe dolorifica, dum cruda manet. Est quoque dolorificum, quod inde nascitur, empyema. Tum ipsa coagumentatio, quam *συνάγμα* vocat præceptor, varietatem adfert dolorum, in generatione, in mansione, in motu. Vt nihil varium sit magis, nec magis mutabile, quàm dolor nephriticus quem prima edit nephritis hic posita. Nam si bene completur animo, cuius regnum est in iudicio; ex quatuor illis morbis qui numerantur in renibus, primi omnium, relictis aliis qui ab Hippocrate recensentur, historia locum habet in hac prognosi. Est autem sic à præceptore scripta, Latine verba. *morbi sunt quatuor nati à renibus. Ac primi quidem sunt hæc parthemata. Dolor acutus renem inuadit, & lumbos ac testem qui è directo est renis. Tum sape urina redditur, atque subinde sistitur, & sabulosa est. Et cum arena transmittitur per fistulam urinariam, dolorem infert prægrandem, qui ea excelsa quiescit: mox inde renouatus, ægrum exercet. Atque quoties urinam reddit, præ dolore, colem extendit & fricat, leniendi causa doloris. Hic medicorum vulgus, imperitia huius mali, ex arena conspecta, vesicam existimat calculosam: sed falsò. Est enim ren ipse calculo occupatus. Hic morbus nascitur è pituita, quam quidem exceptam ren aliò non transmittit: sed intus coagumentat in topnum. Quemadmodum autem, lumborum & renum dolo-*

aph. 5. 8. & 59.
lib. 1. 1. 1.
2. 1. 1.

lib. 2. prorrh.
lib. 1. 2. 1. 1.

sent. 5. part. 1.
6. Epid.

lib. 1. 2. 1. 1.
2. 1. 1.

lib. citato.
lib. 3. πει
ἀρδρ.

res, vicissim mutuo se excipiant, sibi que succedant inuicem, planum facit ipsorum sympathia, & mutua syntimoria. Nam & nephritis in sui contagionem atque sympathiam lumbos adducit, & dolores lumborum mala, euadunt nephritica, quando humor transit ad renes: sicut à renibus transit ad lumbos. Sic empyema renum, in lumbos expressum, ipsos intumere facit. De quo illud scriptum est à præceptores. Οὕτως γὰρ ἔμπυος ἢ ὁ νεφρὸς ἀποιδέει πρὸς τὴν ῥάχην. Nam gibberorum lumborum à phymate, nota est ratio ipsa curandi per transitum ad venas, unde varices; vel ad intestina, qui facit dysenteriam.

VEL STRANGURIA) i. Vrinæ stillicidium; vel inuita vrina quæ contra voluntatem suo coactu exiit, quæque subinde nos cogit, muscoli ianitoris claustrum laxare, nec desinit esse molesta: quoniā paulatim ægrè destillat; idque tum inde nato vesicæ morbo, tum ipso symptomate. Ac stranguriæ causas non ita pridem recensuimus, prognosi octaua de morbis vesicæ.

2 Οἷσι δὲ τὰ κατώτερα κοῦται, κνησμοῦν ἐπ' ἐνομήρων ἔμπεραθεν ἰγμῶν· τούτοις ἀμμιῶδες ἔρϕη γίνεται, καὶ ἐφίσταται. τοῖσι δὲ ὀλεθροῖσι αὐτῶν· ἡ δὲ διάνοια ἀποναρκοῦται.

Sed quibus in vitio sunt inferiora, pruritu antè forti oborto; vrina iis redditur sabulosa, & cohibetur. Et quibus inde spes in angusto est, dianæa torpescit.

ENIMVERO criticorum abscessuum certa non est crisis, nec inde sperabilis vitæ salus, nisi & procul, supernè infrà eò descendant κατ' ἔξιν, vbi non apparent ἡμύρροποι, i. semistui: sed ἀξίως τῆς ἀνέλεως, i. pro dignitate humoris morbifici, nec inde recursus habeant unde venerunt. Nam ἡμύρροποι καὶ αἰσχροῖται abscessuum, velut paratidum, ferè funesti sunt exitus. Omnium verò tam infrà, quàm suprà exorientium, difficillima curatio esse solet, quorum materia est maligna & effera. Sic enim præceptor ait de puerorum tussi, cum aluo turbata, & febre. Λύσειε δὲ αὐτὴν καὶ ἐλκυσθῶν κατὰ τοὺς ἰσθμους· ὡς μὴ στρογγύλα καὶ βαδία, τὰ πτωχὰ ὅλεθρα· ἀλλὰς π καὶ παιδοῖσι. i. Soluerit autem vlcusculorum exortum, modò ne rotundorum & profusorum. Eiusmodi namque mortifera sunt; præsertim pueris. In hac prognosi καὶ ἰστοῖσιν familiaris exempli, doctrina est prauorum abscessuum, partes inferas occupantium, quorum maligna vis, ὁπρὸς ἔχον habet intrò & sursum, quæ & symptomata infert grauissima, & unde sit vitæ timendum ostendit.

SED QUIBUS IN VITIO SVNT INFERIORA] i. Quibus infra vmbilicum malè est, prauis abscessibus illic obortis, qui eiusmodi sunt, quia ἡμύρροποι καὶ κακοῦδης, i. semistui atque maligni; unde, primigenio adhuc morbo superstite, nullam ægris adferunt leuationem: sed contrà, doloris acerbissimi cruciatur, & sua propagatione foris intrò, multum periculo vitæ adiiciunt. Qualia esse narratur τὰ ἐλκυσθῶν στρογγύλα καὶ βαδία. Qualia item quæ scripta sunt à præceptore his verbis. Exanthemata parua, nec dignè morborum excretioni respondentia, inde mox rursus euanescentia, &c. Extiterunt etiam quibus ad articulos, maxime verò ad coxendicem, ἰσθμους admodum paucis, sunt exorta criticè: quæ, loco relicto, mox inde rursus euicta, sursumque translata, ad priorem habitum reuertebantur. Inde mors plurimus veniebat. Nam illud, τὰ κατώτερα, i. inferiora, pertinet ad partes inferas quæ sunt infra hepar; tum ad articulos crurum, tibiarum, & pedum. In promptu sunt illa Hippocratis, vt omittam cætera. Ἡν μὲν κατὰ τὸ ὄμφαλόν, κατὰ τὸν αἶσαν· ἐν πῶσι κατὰ τὰς ἁρτῶν, ἀναδόν. i. Quod si è superioribus paribus, in inferiores demittantur, in illisque subsistant; bonum. Et. Ἡ καὶ τὰ κατώτερα τῶν ἁρτῶν, αἰσχροῖται ἀναδόν. i. ὅταν εἰς ὀρχας, καὶ κῆρας. i. Ea quoque spectare oportet quæ infra recur supernè descendant, veluti in testes & varices. Quibus in locis docetur; partium inferarum abscessus, meliores esse quàm superarum. Nam superarum abscessus, nec morbos exoluunt, nisi per empyema, nec abeunt sine noxa. Inferarum verò, finem morborum adferunt, nisi recurrat intrò & sursum. Cæterum appositè scripsit, τὰ κατὰ τὸν κῆλον, i. vniuersi & ladi: quoniam feritate humoris eò prolapsi, multum à se mutantur colore, caractere, mole, dolore, & actione: tantumque abest vt inferiora sic vitata, superiorum tollant vitia vel emendent; vt ea reponant vel augeant sua contagione atque sympathia. In causa est malignus humor, & impar morbo abscessus. Hinc læsa parte infera, multumque afflicta, recursus fit intrò sursum. Hinc recidua peior priorè morbo. Reliquum excidit.

DE PHYMATIS.

CAP. XLV.



Ἰ τὰ ἀρδρα φλυκτανοῦ μέρη. Ἐξυδατοῖσι ἑπιπολαίοις ἑπὶ ῥιζώσαντες οὗτοι, κοιλίας καὶ βελώνας διαφονίσσονται, οἷα πληγῶν ἐπωδυοῖσι, καὶ ἀποθνήσκουσι.

1 Quibus artus sunt pustulis prærubris obfisi, velut ambustis, crebrò rigentes illi, per bubones & ventrem obsidentur puniceo; velut diuerberati; cum dolore, & moriuntur.

PERTINENT

P E R T I N E N T hæc prognoses ad symptomaticam morborum *ἐν τῇ σπλῆνι, ἐν τῇ χολῇ, ἐν τῇ σπλῆνι, ἐν τῇ χολῇ*; unde maiora ægris incommoda inferuntur, quàm à morbo; idque tum locis quâ feruntur, & ubi subsistunt; tum ipsis quoque unde venerunt, si eò recurrant, ac velut postliminio reuertantur. Ac prognosi quidem, superiorem præcedente, lumborum à frigore & gravitate occupatorum scriptus est transitus, vel ad ischiadem, vel ad nephritidem, vel ad inuitam urinam, quæ est Græcorum *σπληνική*. Circa hanc altera, symptomata continet inferarum partium vitiararum, ex quibus, maligni humoris palindrome fit intrò sursum. Hæc autem, ichoris maligni, venenari, & efferi collectionem modicam in artubus, imparem morbo, unde manant; tum feritatis ipsius documentum ostendit: mox inde novam *καὶ τοῦτο* peioris cacochymia, non ita procul à foco in partes, unde facilis *συνπύρεξις* est atque funesta. Quæ omnia cuiusmodi sint, hoc stylo aperiemus.

Q V I B V S] Maligna febre ac pestilenti correptis & occupatis: quam genuit ichor malignus & putris à tempestate austriua, cum densis nimbis & æstu coniuncta: unde concipitur *τὸ θερμὸν συνιδιόθεις*, vt *6. Epid.* Galenus ait; quo sæuus ichor, substantiam partium labefactat. Quale Hippocrati visum est illud rheuma, de quo hæc scripsit. *Ἦν δὲ καὶ ῥέυμα συνιδιόθεις, ὃ πῶς ἵκετο, ἀλλὰ συνεδίοντο ἅπαντα*. i. Eras autem rheuma con- *6. Epid. part. 3.* sistens, haud puri simile; sed alia quædam putredo.

A R T V S S V N T P V S T V L I S O B S I T I, V E L V T A M B V S T I S] Ab ichore maligno illuc expresso, cuius collectione omnes exoriuntur pustulæ, tam lævæ, quàm tuberosæ; quas edix vel coloratio circumscripta; vel circumtensio cutis ipsius: unde apparent illa, quæ tum phlyctæna & phlyctanides, tum phlyzacia, tum exanthemata, tum ecchymata Græcis dicuntur. Ac circumtensa cutis est, atque, vt ita dicam, bullata, erodendo vel amburendo: quod fit à crassiore ichore. Coloratio autem, nec tuberosa, sed velut stellata siue stigmatica, sero imbuta tenuiore. Sunt igitur in hac sententiâ pustulati articuli, pustulis prærubris obliiti, nigricantibus & crustam vertice gerentibus, quæ sunt pustulæ *αἰθρακώδεις*, quarum generationem & ortum recensuit lib. 2. *Epidem.* Cum densis plueret nimbis, collectos fuisse sub cute ichores, qui pruritum excitabant, *ἵπτα φλυκταίναντες* *περικαυσταί*. i. pustulas, ambustus similes. Sunt autem hæc pestilentis morbi propria, à sanguine, substantia sua vitiosa, & atra bile multa conspurcato, originem ducentis. Proponuntur verò ab Hippocrate in exemplum, vt ab illis petatur æstimatio ecchymatum reliquorum. Si scédant cutim, vt morbilli quos stigmata antè nominauimus; si ipsam bullant, sed albicant, nec dura sunt admodum, nec acuminata, vt variolæ quas Sileno non admodum pruriginosas esse dixit; critica esse vt plurimum, maximèque pueris quibus *ἐκλύειν* saluti esse, scet. 2. 6. *Epid.* vt suprâ retulimus, annotauit: symptomatica si fuerint: at non esse tam grauis morbi, quàm hæc quæ pestilentia sunt; ac sanè mortifera si consecutionem habeant eorum quæ sequuntur.

C R E B R O R I G E N T E S I L L I] Id enim *τὸ θερμὸν ἵπτα* significati esse, suprâ sæpe monuimus, & comprobauius; illud insuper docentes, esse ad mortem fatale, si à vasis cuiusmodi fuerit: vt hîc profectò est, ubi empyema non subesse ponitur: sentitur autem, natura deuicta, humorum effera & effrenata vis, cum paulò ante mortem, vel paulò post.

P E R B V B O N E S E T V E N T R E M O B S I D E N T V R P V N I C E O, S I M I L I T E R V T D I V E R B E R A T I] Puniceus color est, flammei & rubri coloris in nigro, inquit Aristoteles 3. Meteor. Sanguis igitur natura rubens, dum ardore nigrescit, colorem exhibet puniceum. Nigrescit autem hîc, vt iam diximus, & cum venis conclusus tenetur, & cum per rigorem erumpens, in inguinibus & ventre subsistit, quæ loca sunt foco impuritatis propinqua: quam notam obseruaram esse cupio abscessus non boni, vt scilicet prope à morbi domicilio absit. Puniceo colori proximus est liuidus, & in eum transit, morte adueniente. Corpus enim, inquit Galenus, viret, nigrescit, liuet, sanguine perfrigerato: quod est mortiferum. Quod talis diuerberatorum sit color, quod syderati sic colorati dicantur, audiuius antea in illo. *Quibus peripneumonicis, pulmonum sic inflammantur* *Coac. 31. cap. 16. 2.* *coria, vi costis habeant; illis ante interitum liuida videntur costæ.* Hos antiqui appellabant *ictos*. Bubones autem intelligo inguina: sed & ea in tali casu, unde liuent, inde etiam tument, atque in tumores assurgunt, quibus à loco, bubonum est nomen.

2. *Τὰ ἰκτερώδεια, ὃ πάνυ πῆφαιθανόμην, οἷσι λύγεις κοιλίαι κατὰ ῥήγνυνται ἴσως δὲ καὶ ἰπρίσσεις· ἔτοι σιχλοῖενται.*

Quicunque icterici, nec inde admodum quid sentientes, oborto singultu, iis alui prorumpunt; fortassis autem ex ipsa sistuntur; virore saturo colorantur.

E S T Q V O Q V hoc phyma symptomaticum vniuersi corporis, quod diffusa, verius quàm effusa, bile per totam compaginem, icterus nominatur: quia colorem exhibet similem anis illius unde nomen accepit. Nam qui effusa bile in morbis acutis, nec ante septimum diem, apparet; idque cum hypochondrii æqualitate, bellèque coloratis urinis, ac deiectionibus figuratis, & mollibus; duce natura exoritur, & lege critica morbum exoluit. Sed bilis diffusæ per habitum corporis, unde icterus nascitur symptoma-

ticus, multæ sunt causæ quas ita complexi sumus. Vna est dira veneni vis, portione vel morsu immittæ altera morbi orgasmus: tertia hepatis oppilatio, inflammatio, scirrhus. Quæ tria hepatis vitia, duritatis nomine intellexit præceptor cum ait. *Εν τῇσι κίτριναις τῇ ἡπαρ σκληρὸν γίνεσθαι* *ἢ ὁρμήν*. i. *istericus hepatis durum esse; pesiferum*. Est igitur omnis ictericorum ratio, diuisa in criticam & symptomaticam: vt ex ictericis, alij quidem eiusmodi sint criticæ; alij verò, symptomaticæ. Ac sanè ictericis bene est ab ictero critico qui attulit finem febris. A symptomatico autem, malè: quoniam nulla *ὁρμήν* vel *συνέχεια*, deducit causam morificam: sed multò maiorem subesse restatur. Atque illa bilis effusio siue diffusio, phyma est vniuersale quod occupat totam compaginem, idque cōtinuum; non autem locorum interuallis distinctum, vt posita modò ecchymata, vel exanthemata cutis bullatæ. Sed icteri critici nulla hic mentio. Ad symptomaticum pertinet instituta prognōsis.

QVICVNQVE ICTERICI Græcè est, *τὰ κίτριναις*, i. *quæ sunt ictERICA*; vel, quibus fordata cutis est, bile per eam diffusa, fixæque firmiter, quò affluit continenter, ob perennitatem causæ ictericæ. Talis enim ratio est icteri symptomatici, non autem critici, quem cita edit *μυρία πωσις* ad cutim, nec amplius eò ventura, fonte impuritatis exhausto, quæ est Hippocratis *ἢ ἡσ ἀγρίων ἀναπαρτία*, vel, vt Galenus interpretatur, *ἢ ἡσ μωχθερὸν χυμὸς πλεονεξία*, i. *prauorum humorum nimia abundantia*.

NEC INDE ADMODVM QVID SENTIENTES i. Quibus ab ictero accidit quædam segnicies in officio faciundo, vel in appulsu *ἢ ἀσθενείῃ*, i. *sensilum excipiendo*, stupor quidam & hebetudo. In prorrhethico sententia hæc sic expressa est ab authore. *Κακὰ δὲ καὶ ἡ ὁρμήν κίτρινον μωχθερὸν*. i. *Præsumptum est etiam quæ cadit in icterus fatuitas*. Vbi Galenus author est; eodem planè sensu hîc positam esse *μωχθέρην*, quo suprà legitur *ἢ τῷ ὁρμήν* in deiectione alba phreniticorum. Cernitur autem illa *τῷ ὁρμήν*, vel in corpore multum graui & plumbeo, vel in effæto & languido. Graue est corpus & plumbeum, ab humore frigido, crasso, glutinoso, καὶ ὁλως δυσκίνητον, vt Galenus ait, *ἢ qui agere difficulter que ciatur*. Est autem effæctum & languidum *ἢ τῷ τέρῳ* *ἢ τῷ δυνάμει*, i. *emortua facultate*. Quæ cum ita sint, authore Galeno, difficilis admodum ratio est quare *τῷ ὁρμήν* adiciatur ictérico. Nam calidus humor, qualis est bilis ictERICI, non est *δυσκίνητος*: sed contrā *εύκίνητος*. Quòd si emortua facultate accidar illa *τῷ ὁρμήν* quæ facit *τῷ ὁρμήν*, cum scilicet homo subinde ad pedes delabatur, mortem in propinquo esse denunciat. Quæ ratio *τῷ ὁρμήν*, accessione non eget symptomatum mortiferorum, cum ipsa per se ad inferendam mortem sufficiat. Quid ergo ictericum faciet *τῷ ὁρμήν*, i. *in mouendo pigrum, & sentiendo hebetem?*

Hîc sanè implicitum me fateor difficultate maxima, quam exhibet mihi Galenus in sua distinctione causarum *τῷ ὁρμήν*, dum suo animo morem gerit, nō veritati; vt prorrhethicum illud expugnet quod modò adduximus de alba deiectione phreniticorum. Est quidem vera Galeni diuisio; sed vitiosa: quoniam imperfecta. Nam prætermissio est causæ cuiusdam, segnicie inducentis, quæ mox proferetur. Nec verò satis appositè, nec verè quidem, dilemmate vsus est cum ait; in dominatu bilis mobilissimæ, non posse adduci grauem *τῷ ὁρμήν*, cuius humorem necessariò esse decet *δυσκίνητον*. Quid enim? nōne illud scitum est præceptoris? *Τὰ καυστικά μωχθερὰ*, i. vt ipse Galenus interpretatur, *τὰ μωχθέρη ἢ ἐμπεπνευμένα*, i. *quæ fatuitatem adducunt*. Sed idem Galenus author est, *τῷ μωχθέρη* idem esse, quod ipsa *τῷ ὁρμήν* apud Hippocratem in quibusdam prorrhethicis. Ex quibus efficitur; eandem posse videri causam fatuitatis, & segniciei, quæ sunt *μωχθέρη καὶ τῷ ὁρμήν*. Sed *καυστικά* idem fatetur esse *μωχθερὰ*, i. *fatuitatem adducuntia*. Sunt autem *τὰ καυστικά*, vt Galeno visum est, tum morbi *δυσκίνητος*, tum excrementa quæ faciunt morbos acutos, quorum vel cita crisis est, vel etiam cita mors. Ergo si *τὰ καυστικά* sunt *μωχθερὰ*: similiter erunt

τῷ ὁρμήν: quemadmodum ipse dictator Hippocrates, fuisse narrat febres ardentes circa initia *καυστικὰ*, & paroxysmos ipsarum, coniunctam habuisse *τῷ ὁρμήν*, quam esse dicit Galenus *τῷ ὁρμήν*, καὶ *τῷ ὁρμήν* *ἀπὸ τῶν ἡσ μωχθέρη τῷ σώματι*, i. *velut exolutionem & relaxationem quandam omnium corporis partium*.

Quid verò? nōne huc spectat quod idem præceptor in phreniticis annotauit? *Οὐδὲ ἐξέμαρ ἢ ἑπτακὼν ἡμέρας, ὥστε ἢ ἄλλοις ἢ ἄλλῃ κατὰ τὴν φύσιν ὁρμήν βαρύνει ἀπὸ τῶν ἡσ*. i. *Nemo fuit omnium phreniticorum, qui ferocitatis excessum habueris, vt sit in ceteris; sed veteriosa quadam segnicie graues perierunt*. Ergo nihil vetat quominus in regno bilis ictERICÆ, locum habeat ipsa *τῷ ὁρμήν*: quoniam principatus neruorum humescit cum ictero, similiter vt cum phrenitide, & cum febre ardente quam veteres *καυστικὴ* dixerunt. Quò aduocanda mihi est sententia illa Galeni, quam de austrina segnicie scripsit his verbis. *Τῆς δὲ ἀρχῆς ἡ νύκτις ἡσ τῷ σώματι* *αἰσχυροὶ ὄντι καὶ ὅτι τῆς κατὰ ὁρμήν ἀρχῆς γίνεσθαι τῷ ὁρμήν*, καὶ ὥστε ἀσθενεῖν ἐν αὐτῇ φάσματι τῷ αἵματι

ἢ ὁρμήν. i. *Madefacto neruorum principio, necesse est in eis, quæ sponte nostra eduntur, actionibus, segnicie quoque oriri; tum veluti exolutum videri hominem in seipso*. Quemadmodum autem principatus neruorum madefcat ictericis, in promptu ratio est: quoniam, diffusa bile per totam compaginem, defraudatur cerebrum suo, vt sic dicam, elementari calore & sale. Itaque sicut apparent *καλὸς ἡσ*: ita sunt *καλὸς ἡσ*. Hinc *μωχθέρη* illa ictericorum, & inde *τῷ ὁρμήν*. Ad hoc valet plurimum deiectio alba & pigra.

OBORTO SINGVLTV Quem edit alui concussio, dum effera bile lacessitur & proritatur, quam ipsi transmittit fons biliosus humoris qui est in hepate inflammato, quod facit ictericos multum fordatos, & saturata bile fucatos. De quibus hæc scripta sunt à præceptore. *Ἰκτερίδης κατὰ κίτρινον ὁρμήν*. i. *ictERICI multum fordati; pereunt*.

IIS ALVI PRORVMVNT In prorrhethico est, *αἵμα δὲ καὶ κατὰ τὴν φύσιν τῷ σώματι*. i. *Fortassis etiam hic vitatur aluus*. Nam ex perenni affluxu bilis in aluum ab hepate, vnde singultus, biliosa deiectio crebra est: quæ si prorepit ad stomachū sensus acerrimi, cardiogmū excitat, aluum sistit, similiter vt in iis qui sunt *πικρόχολοι αἵμα τῷ ὁρμήν*, i. *qui habitu sunt biliosi sursum*. Talibus enim solet astrictior esse aluus.

VIRORE SATVRO COLORANTV i. Qui hepate inflammato sunt ictERICI, multum il-

Li primū fœdari apparent, & satūra bile fucati; quoniam diffusa bilis ab hepate inflāmato, mera est, nec mitigando diluitor, qualis effunditur ad crisiſi ictericā, vel ad icterum criticum. Ac tales in eo ictero ſymptomatiko, ſtatim virore ſaturo colorantur: quoniam ſauæ bilis mietæ, in viridem facilis mutatio eſſe ſolet. At qualis humor diffuſus, talis & color eſt. Ac talem colorem icterici moribundi, vt dictum eſt, ita depinxit Hippocrates. *Ικτερος τοῖς δὲ ὄσιν ὁ ὄξυς, καὶ ὀξὺς παχὺς ἀπακρίνεται. ἢ χροὶ ὅλην εὐδαιδὺς ἀπό- lib. 3. πρὸς νῆσιν.* *δρα ὄξυς, χλωροτέρη, ὅς εἰ σπῆραι αἱ χλωροὶ παρόμοιος δὲ καὶ ὁ χροὺς, καὶ τῷ ὕμῳ ὑφίσταται, ὅς ὁρόβιον πυρρόν. ἢ.* Huiusmodi eſt ætius vehemens, & celeriter interimit. Color vniuerſi corporis, velut malicorij eſt: viridis ad inſtar lacertorum: cuiusmodi, inquam, eſt color, atque in vrina eſt hypoſtaſis orobea.

COROLLARIUM.

Cautio phlebotomiæ.

Α καὶ πλῆθρον ἀλγήματα, ἐν πυρετοῖσιν ἰσχνῶς ἐσηκῶτα, ἀση-
μα· φλεβοτομὴν βλάβη· καὶ ἢν δὲ πόσιος ἢ· καὶ ἢν ὑποχόνδριον
μετέωρον. Καὶ ἐν κατὰ φύσιν ἐκ ἀπύροις νεκρωθῆναι μύροις· αἱ-
ματὶ ἀφαίρεσις βλάβη· καὶ δοκέοντες δὲ ἐπιεικέστερον ἔχον, οὗτοι
θνήσκοσι.

*Dolores qui latus inuadunt in febris, æqualitèrque ibi absque si-
gnis subsistunt; phlebotomia offendit: quamuis & cibi fastidiosus, ac
tumido sit hypochondrio. Tum quibus perfrigeratio est cum torpore, nec
febris expertibus; sanguinem detraxisse nocet. Nam cum sibi mitius
esse putant, intereunt.*

VETVS quorundam opinio est; nullum dolorem lateris, nedum pleuritidem, nisi vnico phlebo-
tomiz alexiterio posse sanari. Ac sanè opera precium est, nugarum audire garrulitatem, quarum amba-
gibus ipſorum vanitas solertissima est apud vulgus, omnique potior veritate. Sed audiamus dictatoris
edicta, è tribunali sapientiæ ac veritatis medicæ. Sunt autem his verbis concepta. *Τῶν ὀδυνην ἢ πλευρησὶ
καὶ ἐν στήθει, καὶ ἐν τοῖσιν ἄλλοισιν· εἰ μέγα δὲ φέροιτο, κατὰ μαθητὶον. ἢ.* Dolores qui tum in latere, tum in pectore, tum ali-
bi quoque sunt; an multum ceteris antecellant; perdiscendum. Quod est cuiusmodi ac si dixisset. Quemadmo-
dum partis cuiusque dolor, afflictionem eius denunciat: sic ipsa doloris idea, magnitudo, æqualitas vel
inæqualitas, tum assiduitas vel intermissio, cuiusmodi sit ea partis afflictio planè ostendit. Ex cuius per-
spiciencia, omnis prædicendi atque curandi ratio comparatur.

Ergo. **DOLORES**] Vel dolorifica mala quæ, distendendo ac profrigendo, tensionem inferunt rei
naturæ tristis & permoleſtæ in sensorio & in sensu, αἰσθητικῶν καὶ αἰσθησιν Græci vocant.

QVI LATVS INVADVNT] Parte dextra, sinistra; ſupera, infera; poſtica, antica: vbiunque
ſcilicet concitatum rheuma ſubſiſtit; ſiue dolorem faciunt τὰ ἐντοῖς, ſiue τὰ ἔξωθεν, i. quæ intrā ſunt & in-
tus ledunt; vel quæ extrinſecus incident.

IN FEBRIBVS] Fortaſſe melius, vt olim annotavi, ſine febris, vel febris expertibus: vt legatur
ἀπυρετίῃς pro ἐν ἀπυρετίῃ. Quæ lectio magis eſt καὶ λόγον τῷ ὑποκειμένῳ περὶ τὸ κατὰ φύσιν, i. conuenienter ma-
gis, ac verius, ſubiectum accommodat prædicato. Nam lateris dolor cum febre, non ita reſpuit venæ ſectio-
nem, quàm ſine febre. Itaque dolor lateris ſine febre, videri nequit pleuriticus; qui nunquam eſt febris
expers. Nec verò ipſa febris vacuitas in dolore, ſuſpicionem adfert pleuritidis, qualem excitare dicitur
primigenia febris in Anaxione.

ÆQUALITERQUE IBI SVBSISTIT] Græcè eſt ἰσχνῶς: quæ dictio pertinet ad τὴν ὁμοχρίαν,
i. ad æqualitatem naturaliter conſtitutam partis cuiusque. Talis eſt illa cynanche quæ fortem ſtrangula-
tum & ὀδύνην inferit τοῖς ἰσχνῶς vel ἰσχνῶς, i. ſine rubore ac ſine tumore aſpectabili faucium & laryngis. Quod
ſpectat & illud, ne plura conſectet quæ ſunt quamplurima. Ταῖς ἐν φάρυγι ἰσχνῶς διχρηματὶ περιέδρα· ἀπὸ μεφύλης
ἐν γνάθῳ ὁρμώμενα· ὀλέθρια. i. Qui cum æqualitate faucium dolorifici ſtrangulatus, a dolore capitis concitantur,
mortiferi. Ex quo efficitur, dolorem hūc poſitum qui latus inuadit, naturam pleuritidis non habere;
quoniam in æqualitate lateris, quam illud ἰσχνῶς declarat, nulla ſuſpicio eſt inflāmatæ membranæ co-
lis intextæ; in cuius phlegmonica ſyſtrophæ, ipſa pleuritis conſiſtit. Sed vt concedam eſſe pleuriti-
dem, ſi febris nulla eſt antegreſſa cuius propagatio ipſam fecerit (nam ſymptomatica nomen non ha-
bet febris, atque vanefcit continuo, vt morbus vnde venit exoluitur) hæc autem pleuritis ἐν φάρυγι καὶ
ἐν γνάθῳ, ſua ſpontè quieſcit; quis ibi reſtat phlebotomiæ locus? Sed hæc dicuntur poſtea.

ABSQVE SIGNIS] Quæ cernuntur in doloris idea quæ non eſt puncturiam acerbitatem, quæ
propria eſt tunicæ inflāmatæ à ſyſtrophæ ſanguinis, multa bile perfuſi; nec tanta eſt grauis, aut crassa

tensui molestia. Tum æqualis non est: quia per se ipse miretur, vel artificio: idemque non est contrarius; sed particeps intermissionis. Quæ omnia sunt *ἀσυμμετρία* pleuritidis, & nulla *παρὰ φύσιν*. Aut si concedam signa quædam esse pleuritidis verè *παρὰ φύσιν*, primum quidem in puncturij doloris idea, cui adiciuntur sicca tussis, difficultas spirandi, & febris: illa tamen non sint eximia in sua quæque idea, nec æqualitate contumacia, nec assiduitate plurimum importuna; sed proritate partis moderatione, ac tensionis laxitate mirentur, cum tussi humida quæ fuerat antè sicca, ac permolesta: tum ipsa libertas spirandi restituatur per anacatharsin liberam & liberalem sputi, accuratè modica bile permixti. Hic certè.

PHLEBOTOMIA OFFENDIT] Quoniam phlebotomiæ & pharmaciæ lex illa principio est sancita; vt loco adhibita, sint *ἀναισθητικά* & alexiteria: at sine delectu, temerè & inconsideratè, *ἀναισθητικά* & deleteria. Sed in dolore lateris, qui nec idea pleuriticus dici potest, inflammata membrana costis intexta, quod ipsum declarat *ἰσχυρὰ*; nec magnus est vehementia, nec æqualis contentione, nec assiduitate implacabilis; ac neque est *ἐξ ἡρώος* febris, neque ipsius *ἐξ ἡρώος*; exoritur autem à prolapsu catarrhi, non ab orgasmo sanguinis: in eo, inquam, dolore, phlebotomia nullam vim habet retrahendi *τὸ πρῶτον ὁρμώμενον*, i. concitatum; nec detrahendi *τὸ συνιστάμενον*, i. consistens. Ergo nec iure, nec loco, ad eum dolorem præscribitur phlebotomia: propterea quæ tantum abest vt aliquid opis adferat, vt plurimum noceat: quia multum adiciit catarrho, ipsum gignendo per frigus, eundemque ciendo per infirmitatem potentia retentricis quam infert.

Nam de pleuritide, cui summo iure deberi sectionem venæ clamant omnes sophistæ; illud præceptum est à dictatore summo; ei tantum pleuritidi, iure & loco, propterea quæ conuenienter, præscribi, quæ attingit claviculam, cum grauitate brachij, atque ipsius mammæ; nec fotu miruit, manetque sicca & sputi expers; ob eamque causam, doloris ideam habet puncturiam, magnitudine peracerbam, æqualitate similem, & assiduitate grauissimam. Quæ omnia coniunctam habent siccam tussim, febrem assiduam, cum spiratione multum difficili. Et quoniam in eo cruciatu sæui doloris pleuritici, & summa difficultate spirandi, omnia solent esse mortifera; nisi dolorificum malum, id scilicet quod intus lædit, exeat citò foras; hoc est systrophica inflammatio tunicae costis intexta; hic venæ sectio, & liberalis detractio sanguinis, verum est alexiterium quo ipsi pleuritici, periculo defungantur. At si pleuritis infera sit, rheuma consistens non detrahètur phlebotomia. Hic pharmacia est opus quodammodo mochlica. Qualem præceptor instituit ex peplio & veratro, quæ simul mixta, *ὁμοῖον* esse dicit, omniumque quæ nouerat, præstantissima; plurima autem nouerat. Non enim hæc duo præscripsit inopia pharmacorum, vt scioli arbitrantur: sed meliorum delectu.

Sed reuertor ad superam, cuius quidem sic comparata est ratio, vt si tum ex facili, tum citò & liberè liter expurgetur, ac sputo flauum exactè permixtum sit; tum careat omni excursu quem ciert febris, omnique coryza; & vinarum bella sit coloratio; phlebotomiam non exigat: sed respuat potius & auerteretur: quoniam detrahendo sanguinem, sputum, quod omni arte ciendum erat, retrahitur, ipsaque sistitur anacatharsis, quæ liberalis erat & libera, quæque ipsa per se facit vt nihil opis requirat pleuritis à medico: quia tum sua sponte quiescit. Ergo in tali pleuritide, per se sanabili, à phlebotomia periculum est: ob impeditam anacatharsin, quæ libertate spuendi & liberalitate, votis naturæ & medici responderebat: ne taceam lateris infirmitatem quam infert repetita carnificum phlebotomia: quandiu pleuriticus, liberali & libera fruitur expurgatione sputi, sanguine pauco permixti. Scitum est illud Hippocratis. *Καὶ ὅτε ὁππότεν ἀματανία πύοντι: πλενέταις*, i. Impeditio phlebotomiæ ut qui cruenta expuunt; pleuritidis. Causarum autem recensio clara est, modò scripta, cur in pleuritide vbi expuuntur cruenta venam secare non debeat omnis qui tenet scientiam medicinæ.

AC SI QVEM TENEAT CIBI FASTIDIUM] In cibi fastidio sine febre, ac sine repletionē valorum lumbarium venam secare non licet, nec expetitur. Hæc enim *ἀνορέσια*, i. cibi fastidium, symptoma est ventriculi exoluti quod annotauit in Pario cuius emortuam facultatem fuisse ait Galenus, vel est symptoma humoris præui è capite procumbentis in fauces, cuius inde prolapsu in alium perturbata cietur, vitiata primum apperendi potentia, vnde *ἀνορέσια* sunt ægroti, i. ciborum fastidiosi. Quæ ratio *τῆς ἀνορέσιας* continetur in illo Hippocratis. *Κεῖναι περὶ ἀνορέσιας, ἀνορέσια*, i. Alui perturbata, ciborum fastidiosi. Tale symptoma quod accidit vitiata vel emortua facultate stomachi naturaliter appetentis, grauissimum atque pessimum esse docet præceptor in omni calamitate febrium tritæophyarum quæ apud Thasios illis temporibus viguerunt. Ac Pario fuit mortiferum. Hic venam secare, nihil aliud est quam hominem iugulare: quoniam venæ sectio, periculi loco adiciit, ac viribus detrahètur; ipsasque iam morbo fractas, ac genio defraudato per *τὸ ἀνορέσιον* collapsas, ad exitum planè præcipitat. Sin autem cibi fastidium, siue *τὸ ἀνορέσιον* inferat proritatio quædam ichoris quem genuit ipsa febris, vt ab eodem gignitur; vel qui prorepat è vasis lumbarum ad ventrem, & inde ad stomachum qui est acerrimi sensus: hic sanè faciendum arbitror, quod ipsa per se natura dux optima, suo commodo experitur, & artificio præbet medico, ad imitationem sui comparandum. Itaque sicut natura hic promouet hæmorrhagiam: sic medici artificium esse debet, si ea desit, venam secare. Naturæ studia & crises in promptu sunt illis prognosis. Dolorificè in lumbis mala; sanguisua. Et in lumborum dolore prægrandi, cardialgie & cibi fastidia, signa sunt hæmorrhagiæ, tum futura, tum antegressæ. Possem hic ego plura scribere: sed hæc sufficiant.

ET SI QVIS HABEAT TVMIDVM HYPOCHONDRIVM] Græcè est *μεταπνοή*, i. quod in molem assurgit. Sed eius meteorismi multæ sunt causæ, inflatio, inflammatio, scirrhus. Hypochondrium inflammatione tumidum, vt cæteræ omnes systrophæ dolorificæ, non nisi phlebotomiæ concedit, si desit hæmor-

hisp. 1. part. 3.
3. Epid.

3. Epid. part. 3.

4. Epid. part. 3.

Coac. 2. cap. 12.
Coac. 3. cap. 12.
Epid. & proth. 3. 63.
aph. 73-4.

60

desit hæmorrhagia *καὶ ἴσχυς*: ac redditur insanabile, si quis antè operam purgationi dederit, quàm venam secuerit. Atque ut verba scribam, aureis digna literis, ex dictatore. *Ἡ φλεβοτομία, ἥτις πρὸς τὴν ἡμμορραγίαν* 4.204.
ἔσται. i. Hic à phlebotomia ordiri oportet. At meteorismi quem facit recens inflatio, cum borborygmo, vnica redintegrandi spes atque ratio, in purgatione consistit, nisi fortè natura pensum illud per se absoluat, sicut docetur in illa prognosi. Tumores hypochondriorum sine phlegmone, recens obortos; tum inde natos dolores, exoluit borborygmus in hypochondrio exciatis; maximèque si exciderit cum urinis & deiectionibus: *ἢ μίαν* 11.2.
καὶ, ipse per se trahens. Iuuat etiam is qui ad inferiora deuoluitur. Hic phlebotomia, pariter studet morbo, & naturæ bellum indixit: quia calorem minuit, vnde maior cruditas, quæ flatuum parens est: quorum amplificatio meteorisum hunc facit, cuius exolutio perficitur flatu traiecto, vel ad partes inferas deuoluto, duce natura; vel medici artificio, qui eam cruditatem oppugnat, facultatèque excitat peristalticam intestini, clystere, cathartico, atque foru. Ac sanè cruditatis victæ, & restitutæ virtutis peristalticæ intestini, signum est borborygmus. Quod si borborygmus medendo, ut dictum est, non excutitur: quia indomabilis est cruditas in hæctica intemperie frigida intestini, cuius tum actio nulla est peristaltica; ipse autem meteorismus assurgat cum sæuis torminibus, transit ad siccum hydropem qui cernitur in abdomine vtriformi, quod amplificatio spiritus flatulenti multum distendit. Ad eum meteorisum nulla est æquitas venam secare, ut neque ad siccum hydropem.

TUM QUIBUS EST FRIGUS TORPIDVM, NEC FEBRIS EXPERTIBVS, SANGVINEM DETRAXISSE NOCET Ad frigus torpidum detractio sanguinis perniciofa est in illa prognosi. *Αἷματος ἀφαίρεσις ἐν κατὰ ψύχην τοῦ σπυγμῆτι κακόν*. i. Sanguinis detractio in perfrigeratione; perfrigerum. Est autem frigus torpidum, quod vel oppressione virium & caloris, ab humore frigido, crasso, 13.2.
καὶ δυσκίνητος inferitur; vel ab emortua facultate, & paupertate caloris viuifici. Ad neutrum frigus torpidum bene fit à phlebotomia. Nam huic quidem cita mors venit: illi autem, multum periculo adiicitur ut mox dicetur. Quod autem frigus est retracto calore à viscerum phlegmone, causo, & lipyria febre, adiunctionem non habet torporis siue *κατάρσις*. Quale illud vidimus. *Τὰ ἐν κατὰ ψύχην τοῦ σπυγμῆτι καὶ καύματα ἐν τοῦ σπυγμῆτι, πορὸν ἀφαιρῶντος κακόν*. i. Quæ in hypochondriis relicta supersunt incendia, extincto febris ardore, malum denunciant. Hic sanguis, incisa vena, loco detrahatur. Sed in torpore graui & frigido, qui sanguinem detrahit, etiam prætextu febris, tam est in vitio, quàm si ægroto manus adferret: quia plus nocet, detrahendo calorem natium; quàm prosit, extinguendo febrilem. Sunt enim maiora vitæ incommoda ex paupertate caloris natium & virium infirmitate, quàm à febrili ardore. Propterea, quibus cum frigore torpido febrientibus, temeraria est phlebotomia; cum sibi mitius esse putant, vacuitate febris quam attulit venæ sectio, moriuntur; extincto calore vitali, & suffocato à dominatu crudi humoris, frigus torpidum inducentis. Atque hi fato concedunt, vitamque finiunt *διαλερόμενοι καθραΐας*, i. differendo 13.2.
νεκροπίναντες: similiter ut illi qui prorupto sanguine, perhorrescunt in tremare. Nam si ex critica hæmorrhagia frigus eximium est lethale; quidni funesta erit detractio sanguinis quæ ad frigus torpidum adhibetur? Sed hæc sufficiant.

Kk ij

FINIS SECVNDI

LIBRI.



COACARVM HIPPOCRATIS

MAGNI PROGNOSEON

LIBER TERTIVS.

INTERPRETE ET ENAR-
RATORE LYDOVICO DVRETO.

TRACTATVS PRIMVS DE

PROGNOSTICO CORPORIS,

omnibus morbis communi.



ΕΦΑΛΗΝ, καὶ πόδας, καὶ χεῖρας κατεψύχαι,
κοιλίης καὶ πλεθρὸν θερμῶς ἐόντων κακόν. βέλτισον δὲ παῦ
ὁμοίως τὸ σῶμα θερμόν τ' εἶναι καὶ μαλθακόν.

*Caput, & pedes, & manus perfriguiffe, alio, co-
stisque æstu incandescentibus; graue malum. Optimum autem fuerit,
vniuersum corpus equaliter esse calidum atque suauiter.*

OMNIS PRÆDICIENDI ratio comparatur primum ex comparatione similium ac dissimilium
sui corporum in qualitate, actionibus, & excrementis. Deinde verò ex causarum perspicentia, cur illæ
res quæ sunt, quæque apparent, huiusmodi sint aut illiusmodi. Distinctio enim signorum cur ita sint,
40 quorū illa, quæque apparent, planè ostendit: ac veram instituit *περὶ μέρους* morborum exitus præui-
dendi. Sed inter signa quæ cernuntur in corpore, prima occurrit qualitas aspectabilis atque tractabilis
in calore, colore, charactere, & mole. Tot enim signa exhibet qualitas ipsa corporis, tam vniuersæ
compaginis, quàm partium singularum. De calore igitur in hac prognosi. Ac primum ponitur τὸ θερ-
μὸν καὶ μὴ καὶ κρύον, i. calor qui bellum indixit ac peremit. Inde τὸ φίλον καὶ χεῖρον, i. calor amicus & salutaris:
ut intelligatur quantum inter vtrumque interfit.

Ergo. CAPVT, ET PEDES, ET MANVS, PERFRIGVSSÆ] Non quidem frigore cri-
tico, nec periodico quod est fugax, & *κρύον*, i. natura conuenienter editur ad salutem; quia inde morbi di-
scellio est vel intermissio, si hemitritæum exceperis. Sed frigore symptomatiko perfruisse; nec eo qui-
dem à paucitate caloris viuifici, cum ad vltima ventum est vitæ: sed ex illius retractione à viscerum phle-
gmone, vel cum ipsius impeditio est perueniendi ad extimas partes, quæ tantum habent caloris, quan-
tum à corde viuifici nectaris, quo defraudantur cum eius interceptio est à contumaci obstructione ve-
narum micantium, quam vocat præceptor *πνεύματων ἀπορροήν διὰ τὰς φλέβας*, i. spiritus per venas interceptio-
nem. Nec verò frigus id leue est, sed exitium: nec pressum leniter, sed firmiter fixum; aut certè, cum ci-
ta febrilis ardoris vicissitudine. De qua illud præceptum est. Extimarum partium cita in vtrumque mutatio,
pestifera est. Galeni autem iudicium est, quod extincto vitali principio partium extimarum; exhausto
etiam fonte caloris vitalis qui est in corde, sit ut cum illæ partes perfrigerent, non amplius caloris viuifi-
ci affluxu recreentur: sed incandescent ardore fugaci, flammæ in visceribus accensæ appulsu; quæ cum
evanuerit, partes ipsas, ut prius erant, marmore frigidiores relinquit. Atque illa perfrigeratio partium
extimarum, est mortis propinquæ: quoniam in causa mortifera, quæ est in æstu quo viscera incande-
sunt, signum apparet caloris emortui. Sed commemorata perfrigeratio in hac prognosi, non est calo-
ris vitalis emortui: sed retracti, cuius retractio cernitur ex ardore vitalium partium, vel nutritiarum, vel
spirabilium, ut mox dicetur. Extimas autem partes hæc posuit, similiter in prognostico, caput, manus,
& pedes. In Epidemiis dum signa receperit inuentis transilethalis, *τὸ κρύον* esse dicit & *ἀπρία*; ut ferè
sunt pedes extremi, maxime verò manus. De capite autem sic ait. *Ἐφ' ὧν οὐκ ἐκέρχεται*, i. sudatiuncula

lib. 4. cap. 15.

Coar. 13.
lib. 2.
par. 22. f. 2. 3.

progn. 4.
lib. 1.
2. 3. 4. par. 3.

erat circa frontem. Sed à visceribus inflammariis maior esse solet retractio caloris vitalis, quàm à venis febre ardentibus. Propterea in Epidemiis bene est, ἀπὸ τῶν φλεγμάτων, super causo: sicut in prognostico, ὑπερθερμα, super visceribus phlegmone conflagrantibus. At viscerum phlegmone conflagrantium notae sunt.

A LVO COSTISQVE ESTV INCANDESCENTIBVS] Non quidem copia & abundantia vitalis caloris eò retracti; cuius amplificatio quò maior est in aluo & costis, eò suavior & melior esse solet; qualem exposuit illa sententia praeceptoris. Αἱ καρδίαι τῶν πυλῶν ἐστὶν ὁ πυλῶν, τῆς φύσεως θερμότητι. Alii sunt hyeme & per naturam calidissimae: sed ardore viscerum quae illis adiacent, aestuantibus.

G R A V E M A L V M] Fortasse mortiferum & funestum: quia viscerum, incendio conflagrantium tanta est è natura egressio, ut vix redintegratio esse possit: tum cessat eorum vitale officium, quo vitam carere non potis est: praeterea nec tar viuificum citò absumitur, cum eius deinceps nulla sit instauratio, neque à spiritu inspirabili, neq; à sanguine. Quinetiam, scui doloris cruciatu, vigiliis, alysmo, cum sympathia vicinarum partium & sociarum, crudeliter vitam finiunt, quibus cum ardore costarum & alui, extimae partes frigore obriguerant. Ac de caloris illius inaequalitate firmiter fixa & stabili, foris & intus, edicta sunt illa dictatoris. In febribus quarum discessio nulla est, intus ardere, & foris frigere atque sistere; mortiferum. Et. In morbus acutus frigus partium extimarum; graue est malum. De qualitate autem caloris & frigoris cuiusmodi sit, vide Galeni commentarios tum ad praedictos aphorismos, tum ad prothetica 8. 31. & 32. lib. 2.

OPTIMUM AVTEM FVERIT] Vel, ut Galenus ait, ἀριστὴς καὶ ὁμαλὴ, i. optima constitutio quae ad salutem praclare apparet & facit. Nam illud, ἀριστὸν ἢ βέλτερον (nihil enim refert apud Hippocratem) signo & causa est salutare: ut, ὑποχόνδριον μὲν ἀριστὸν, &c. i. hypochondrium optimè constitutum.

V N I V E R S V M C O R P V S] Tam intus, quàm foris, tota compagine. Pertinet enim ad id quod intus est atque foris in corpore, aphorismus ille. Si corpus tuberculis oblitum est, cum excretionem biliosa; intus aegrotat. &c. Hic enim foetura est phymatum quae ipsum malè habet foris, cum intus illi sit bene, si excrementa fundantur sanorum similia. Sic enim ait. Tutum est, corpus tum alere. Quod certè non faceret, si esset intus impurum. Nam impurum corpus quò magis nutritur; eò magis laeditur.

Ergo. **OPTIMUM FVERIT VNIVERSVM CORPV S]** Τὴν ἐλαφύτητα, i. vniuersitatem corporis, quam edit coagmentatio & oeconomia viscerum nutritiorum, spirabilium, & animalium in sensu & motu: tum vero ipsa compago partium singularum in corporis habitu qui est foris. Quò spectat hic posita corporis vniuersitas quae propria est partium tractabilium & aspectabilium. Optimum autem dixit, quod bonitate excellit in signo & causa salutis. Ac signo quidem, in bene morata oeconomia vitali, tum spiritus, tum nutritus: unde viuacitas partium sustentatur, atque viuifico neetate recreatur. Non minora autem sunt argumenta salutis in qualitate corporis, quàm in actionibus & excrementis. In causa autem salutis illud est optimum, per quod illa commoda crisis optimae comparatur, excretio & pepasimus. Est enim τὸ θερμὸν ἐμφύον, φίλον ἐχέον, i. amicum & salutare.

ÆQUALITER ESSE CALIDVM] i. Calorem idea similem, & eundem pariter æqualiterque, toto diffusum habitu; idque continenter: nisi fortè sit critica aut periodica refrigeratio, ut iam posui, partium extimarum, vel vniuersi habitus. Ac talis æqualitas, vacuitatem indicat phlegmones retrahentis, & cacoehymiae malignae, qualis est in lypyria febre, & cholera morbo: tū vero ipsa denunciat robur naturae, sanguinis abundantiam, & meatuum libertatem. Quae tria optimo iure sunt optima. Ergo in omni morbo, caloris æqualitas expetenda, qui non sit ὁμαλὴς; ut planum facit quod sequitur.

A T Q V E S V A V I T E R] Græcè est, ὁμοίως θερμὸν εἶναι καὶ μαλακόν, i. similiter esse calidum atque molle. In prognostico autem sic, θερμὸν τὸ εἶναι καὶ μαλακὸν ὁμαλῶς, i. equaliter calidum atque molle. Hic nos aucupio τῆς διαφοράς, veriùs quàm verborum, æqualiter calidum vertimus atque suauiter: ut illa suauitas intelligatur caloris diffusi æqualiter. Quod est eiusmodi ac si diceret. Expetenda caloris æqualitas quae non est in causo & lypyria; nec illa tamen quae est tractabilis per totam compaginem incendio conflagrantem in febribus perurentibus, quas vocant ὁμαλῆς: sed eam quae blanda percipitur atque suavis æqualiter, tam in artubus, quàm in costis & hypochondriis; quorum nec aspera cute, nec rigida & mordaci, sed bene morata in calore suavi, percipitur solida & succi plena. Talis complexio prae se fert illud Hippocratis ἀριστὸν, vel, ut Galenus ait, τὴν ἀριστὴν καὶ ὁμαλὴν: cuius τὰ φάρμακα signa, sunt bonitate eximia, cum vacuitate malorum quae posuit in ardore costarum & ventris, cum frigore partium extimarum. Obseruabis autem studiosus, τὸ μαλακὸν hic significare τὸ σύμμετρον τῆς ἀπολάσεως, i. mediocritatem renixus, quam ὠχρὰ καὶ λευκὰ alibi nominauit; i. solidum, succi plenum, atque tactu suauis: quod nostrates dicere solent, doillet.

2 Σηρόφρατα δὲ πνιδίως καὶ τὴν νοσήσαντα, καὶ ἐν τοῖς μετεωρομοῖσι ἐλαφρον εἶναι.

Oportet autem facile conuersi agram, & alacrem esse in exurgendo.

B I N E E S T agro dum manet virtus atque integritas trium principatuum quorum potentia regitur ipsa corporis vniuersitas. Ac sanè principatuum nutritus, & vitæ, magna vis lucet in qualitate corporis quam posuit optimam, ἐν τῇ ἐλαφύτητι καὶ τῇ ἀσπικύτητι. Cernantur τὰ φάρμακα, i. ea quae adfunt, quæque

quæque existunt, in æqualitate ac suauitate caloris diffusi per totam compaginem: & de æquilibrium, in vacuitate ardoris costarum & hypochondrij: tum frigoris partium extrinsecarum. Quod si ad eam *αἰσθησιμότητα*, quam edit vitale officium cordis & hepatis; facultatum etiam principatus, qui est in cerebro, lumen affulgeat, in ratione, duce & comite motus alacritate, cum sensuum integritate omni; votis medici respondebunt ad bonam valetudinem conquirendam & redintegrandam, è naturæ norma egressam. Sic enim comparata est ægri ratio in quo hæc fiunt atque apparent, vt in virtute naturæ spes optima sit contra vim morbi. Ac salus vitæ in promptu est, simulatque natura triumphat de morbo: sicut mors in propinquo, triumphata natura. Sed eam de morbo triumphaturâ certissima securitas est, iis præditam commodis quæ pugnant cum morbo, vitæque ipsam tuerentur ac sustinent. Hinc veniunt

10 pepasmi & crises.

Ergo. OPORTET AVTEM] Quod est eiusmodi ac si diceret: præter constitutionem quam exhibent medico *ἡ ὑπάρχουσα*, naturaliter constituta in calore, colore, caractere, & mole totius compaginis; quorum omnium causa est vitale officium cordis & hepatis; expectanda quoque integritas facultatum actionumque omnium, quæ partim sunt in principatu cerebri, partim ab ipso veniunt. In cerebri domicilio sunt actiones quæ *ἡγεμονικῆς*, i. principes nominantur. A cerebro autem motus & sensus. Ac motu & sensu opus est ad vitam tuendam, quorum vt status melior est; eò firmiora sunt vitæ præsidia. Nam *ἡγεμονία* sunt vitæ humanæ diuinitus institutæ, non animalis, quam animalitas ipsa conseruat. Vt enim vitale officium cordis & hepatis, ministrum est animalitatis: sic animalitas ipsa inseruit dicaræ œconomiae spiritus & caloris viuifici respirando. Itaque *συνεμφερείσιν διήλοις ἐς τ' ἀγασθόν*, i. *mutuò inter se certant, 20 mutuâsque tradunt operas ad ægri salutem*. Ac si conspiratio vtriusque, par pari referat in iuuando; res ægri tam bono sunt loco, quàm dictum est à præceptore his verbis. *Εἰ πάσι τὸ σπῆν, τὸ ἐρρωδῆν πλεονέκτηται, καὶ εὖ ἔχει* aph. 1.2.3. *ἡ ἀσθενεία τῆς ἀσθενείας: ἀγασθόν*, i. in quouis morbo, mentem valere ac cibis gaudere; bonum est, vel, præclare ad salutem facit atque apparet. Magna sunt igitur commoda potentiae animalis in liberi motus officio, ad felix faustumque prognosticum. Sed illud motus officium vegetæ animalis potentiae, primum in decubitu & spiratione apparet. De spiratione dictum est alibi. Decubitus autem, conuenienter naturæ in validis viribus bene compositi, hæc prima lex à præceptore sancita est.

FACILE CONVERTI AGRVM] Vel sua sponte in latus vtrumque, vel inuitum; etiam si teneatur alysmo, vt expedito motu, loci & figuræ impatiens, suam denunciat *δυσφορίαν*: non autem sit *ὑπερδυσφορία*, vt esse solent quibus fractæ sunt vires: propterea quæ suo stare loco inuiti coguntur diu multumque; 30 anxii. Vnde significatio sit prægrandis morbi, & virium effectarum. Sed expedita conuersio, quæ vel inuisa est ægri sponte, vel inuita in *δυσφορίᾳ*, virtutem ostendit *τὴν φέρουσαν*, i. *facultatis quæ portat, & solidum corpus φερόμενον, quod portatur*. Sic enim Diocles, authore Galeno, corporis fabricationem statuit *ἐκ τῆς φέρουσης & τῆς φερόμενης*. Portantis robur est in expeditione cita *τῆς ἐνὸς ὁμοφύωντος*, i. *intus cientium*, nempe spirituum qui facultati morem gerunt. Solidum verò corpus in obedientia musculorum atque nervorum, quorum effeminatio par esse non potest quantumvis validæ facultati. Ergo salubre est corpus *εὐκρινές* in omni febre acuta, quod morbo resistit, nec oppugnatum fortiter, expugnatur. Tum illud est *ἀγασθόν* signo & causa, vbi conspiratio est æqualis ad motum *τὴν φέρουσαν*, i. *portantis*, in ciendo: tum *φερόμενη*, i. *portati*, in obediendo. Sed illa æqualitas conspirandi ad motum, ciendo & obediendo, lucet splendetque in eo quod sequitur.

ET ALACRE MESSE IN EXURGENDO] Nam talis alacritas in exurgendo, maiorem ostendit vim atque robur cientis potentie, & promptiorem obediētiā corporis quod mouetur. Est enim maior contentio in meteorismo, quàm in decubitu. Nec tantæ virtutis est, nec virium tam validarum, decumbendo ægrum conuertere ex facili; quàm edere meteorismum, alacriter exurgendo. Omnis ergo qui sua sponte exurgit alacriter, *πέχυρον* exhibet tum vegetæ facultatis, tum solidi corporis. Atque alacritas illa in exurgendo, complectitur *ἡ ὑπάρχουσα & ἡ ἀσυνεχὴς* corporis, planè virium integri, & vacui infirmitatis, quam ipsa denunciat *καθρότης & ἔρριψις*. Est autem *καθρότης* in *δυσσυνεχίᾳ* corporis multum oppressi: quam facit etiam *ἡ νέκρωσις τῆς δυνάμεως*, i. *facultas emortua*; vnde ipsa quoque sit *ἔρριψις*, cum scilicet æger subinde ad pedes delabatur, nec amplius fruitur beneficio decumbendi. Reuēra enim decubitus ipse perficitur officio facultatis. *ἔρριψις* autem, pondere grāui corporis quod amplius regi nequit magisterio & virtute *τὴν φέρουσαν*, emortua facultate. Vide Galenum in prognostico. Ac super meteorismi nomine, alibi multa scripsimus quæ nihil necesse fuit huc transcribere.

3 Βαρύτης δὲ ὅλου τῆς σώματος, καὶ χερῶν, καὶ ποδῶν· πονηρόν.

Gravitas autem totius corporis, manuum item ac pedum; pestifera.

Sic in prognostico 7. lib. 2.

60 Εἰ δὲ βαρὺς εἶναι φαίνοιο, πῶς τ' ἄλλο σῶμα, καὶ τὰς χεῖρας, καὶ τοὺς πόδας· Πικρὸν δυνάτορον ὄσιν.

Sin autem gravis admodum videatur, tum reliquo corpore, tum

verò manibus atque pedibus; id multò periculosius ipsum habet.

BENE MORATI corporis, benèque confituti argumenta sunt *ἡ ἀνέχουσα* bona in qualitate ipsius corporis, & facultatum virtute qua regitur ipsum corpus, cum vacuitate malorum quæ in vitio esse restentur *ἢ φέρει καὶ ἢ φερόμενος*, i. id quod portat & quod portatur. Atque illa *ἀνέχουσα* bene habiti corporis, bene res ire ostendit ipsius ægroti; nec dum naturæ præsidia sic occupari à morbo, quin contra vim eius, vires opponant cum spe salutis & securitate. Secus est illi cum spe angusta, quem velut cōstrictum detinet totius corporis artuumque omnium granitas quædam plumbea, cum aspectabili qualitate partium extimarum contra naturam. Ac primum quidem perceptum est de gravitate: alterum verò de qualitate. Est autem perceptum hoc granitas quam opponit alacritati, & expedito motui in conuertendo & exurgendo.

SIN AVTEM Quod est eiusmodi ac si diceret. Vt bona sunt illa corporis *ἡ ἀνέχουσα* in qualitate & actionibus quæ proximè absunt à norma & præscriptione naturæ: sic mala sunt illa in quibus apparet prægrandis ab illo naturæ statu egressio. Sunt autem.

GRAVITAS i. Plumbea velut moles & sarcina quædam penè immobilis, quæ est huiusmodi, non tam mouendi ponderis contumacia, quàm eius quod mouet, i. facultatis infractione. Hoc tamen perceptum est viriusque; *καθ' ὅπως*: quarum altera est grauitatis à crasso, frigido, & contumaci humore quem Galenus vocat *δυσκίνητος*: altera verò *ἡ κατὰ τὴν ἐκφύσιν τῆς δυνάμεως*, i. ab emortua facultate. Sed illa *καθ' ὅπως* posita in gravitate, primum & per se est causa morbosæ, vel aduentitiæ multum & grauitèr opprimentis naturam: qualem fuisse narrat Hippocrates *τὴν ἀφρον, ἢ πῆσιν*, i. laxitatem corporis in paroxysmis ardentium febrium pestilentiar. Altera verò *καθ' ὅπως*, ab emortua facultate, est morbi sæuissimi iam triumphantis de ipsa natura.

TOTIVS CORPORIS Quæ cernitur in pigra conuersione corporis quod iacet in lecto, vbi nulla suspensio est, nec meteorismus: sed tantum simplex decumbendi mutatio in latus alterutrum. Talis mutatio decumbendi facilior est, quàm meteorismi. Nam in decumbendo firma est basis, cui sufficit ad mouendum ipsa mouentis potentia. Sed ipsa meteorismi alacritas, firmam ostendit virtutem mouentis potentie, cum pari coniunctam corporis obedientia. Totius autem corporis grauitatem posuit in spinæ carina quæ decumbendo ægrè conuertitur, ac ne vix quidem. Subiecit autem.

MANVVM ITEM AC PEDVM i. Artuum omnium, quorum vis lucet potissimum in meteorismo. Ac manuum quidem, cibum capiendo atque bibendo: tum palmas tollendo ad sydera, dextramque amici dextræ iungendo. Nam cæterarum rerum quarum ministræ sunt manus, vacatio esse solet in morbis, nisi fortè scribendum sit. Hic si non potis est manus attollere lecto affixas, aut si ægrè tollantur & contremiscant: ipsi autem pedes proiecti iaceant ad extremam spondam delapsi, nec modicè sint reflexi: tum verò standi omnis, progrediendi, atque sedendi virtus adempta sit, si fortè surgendum ad subducendam aluum; cui hæc manus, nec lumbi sunt auxiliares natibus erigendis ad summittendam in lecto peluim egestoriam; magna est illa grauitas virium effectorum: proptereaque pessima, ut certè est omnis *καθ' ὅπως* quæ accidit *ἡ κατὰ τὴν ἐκφύσιν τῆς δυνάμεως*: de qua iudicium est Galeni, seruari posse neminem qui ea de causa sit *καθ' ὅπως*.

4 *Εἰ δὲ καὶ πρὸς τῷ βαρεῖ ὄνυχες καὶ δάκτυλοι πέλιονοι γίνονται πρὸς ὀγκμὸς ὁ θανάσιος αὐτίκα.*

Quod si præter corporis artuumque omnium grauitatem, ungues liuent ac digiti; mors in propinquo est.

VERISSIMUM illud est quod sæpe iam posui. Quod plures naturæ principatus in vitio sunt, eò peius ægroti res eunt. Ergo si collapsio principatus animalitatis, quæ iam efficta cernitur in pigro motu & sensu obscuro, vitale officium ipsaque virtus viuendi cesseret in corde languido, caloris viuifici & spiritus vacuo, ac ne vix quidem micante, cita inde suffocatio est, & vitæ extinctio. Tantæ autem calamitatis signa syllogistica hic ponuntur.

QVOD SI PRÆTER CORPORIS ARTVVMQUE OMNIVM GRAVITATEM Quæ cernitur in decubitu qui ægrè mutatur in studio conuertendi; tum in difficili meteorismo per exurgendi conatum; idque non tam mouendi corporis artuumve contumacia, quàm impotentia facultatis, vnde ipsa *καθ' ὅπως*, *ἡ κατὰ τὴν ἐκφύσιν τῆς δυνάμεως*.

VNGVES LIVENT AC DIGITI Non quidem liuore quem infert *ὀγκμὸς* ἢ *ταυσίασις*, i. expressio sanguinis è venulis nauseabunda in cutim, qualis apparet in oculis sugillatis & calce perfracta: sed ita liueant, quia perfrigerati: perfrigerantur, emortui: emoriuntur autem, per extinctionem viuacitatis in vitali principio, & paupertatem extremam viuifici nectaris, à corde exhausto. Quæ liuoris ratio adduxit Hippocratem, ut rarum esse voluerit persuasumque omnibus, non rarò in nigris digitis, minus quàm in liuidis, periculo locum esse: quia sæpe illi nigrescunt *ἡ κατὰ τὴν ἐκφύσιν*, quam sanat amputatio: semper autem liuent, *ἡ κατὰ τὴν ἐκφύσιν*, i. extincto calore vitali, cuius extinctio est irreparabilis: quoniam à priuatione ha-

sione habitus denuo comparari non potest. Propterea sic prädicit.

MORS IN PROPINQVO EST] Quæ in priuatione caloris natui per extinctionem aut suffocationem consistit. Vnde igitur significatio sit extincti caloris, inde certa mors atque cita ostenditur. Est autem in propinquo, nec dum adest: quia nondum ventum est ad vltima extinctionis, cum primum apparent signa in vnguibus, qui & procul absunt à fonte caloris, & sunt nitentes atque pellucidi: propterea que celeriores & apertiores eorum maculæ, quàm partium cæterarum. Nouissima erit in fonte caloris extinctio, ac breui temporis intervallo, ab vnguibus liuidis: ac tum cita mors veniet; idque ad punctum temporis.

Hæc prognosis adducta est è prognostico, sicut ibi legitur; idque, ut visum est, melius quàm hic.

Μελαινόμυροι δὲ παντελῶς ④ δάκτυλοι καὶ πόδες· ἥσσόν ὀλέθριοι ἢ πελιδνῶν εἰσίν. ἄλλα καὶ τὰ ἄλλα σημεῖα σκέπτεσθαι χρὴ. ἰὼ γὰρ δι-
πετέως φαίνεται φέρων τὸ κακὸν, ἢ καὶ ἄλλοι. ἢ πᾶσι μελεσηκότων πρὸς
20 τούτοις σημεῖων ὑποδάκνυς· τὸ νῦν σημεῖον εἰς ἀπόστασιν τρέπεσθαι ἐλπίς ὥς τ
⑤ μὲν αὐτοφρον πειρημένον, τὰ δὲ μὴ γινώσκοντα ἀποπειροῦν.

Qui autem penitus nigrescunt digiti atque pedes; minus perniciosè habent agrotum, quàm liuidi. Sed alia quoque signa spectare oportet. Nam si malum illud ferre alacriter videatur, aut si quod aliud præter hac signum salubre ostendet; spes est ipsum morbum in apostasin ab-
30 iturum: adeo ut ipse quidem superstes sit homo; excidant autem ea qua nigredinem contraxerunt.

QUE MALA sunt orta è malis, pessima esse solent signo & causa, siue κατὰ φύσιν, siue κατὰ νόσον oriantur. Ac sanè malum est è malis ortum, sanguinis stillicidium die quarto è naribus. Mala est etiam dysenteria, causa & signo, atrabilaria. Sic mala sunt κατὰ νόσον, phymata dura & dolorifica, quæ ἡμῶν-
40 τος καὶ αἰσθητικῶς assurgunt. Sed illa demum quæ mali speciem præ se ferunt, non sunt reapse mala, si veniant ἐκ τῶν χρεῶν, ut quodam loco scripsit Hippocrates. Huiusmodi sunt ischuriz criticæ ac sudorificæ. sent. 10. par. 1. 6. Epid.
Possem hic ego, perinde ac idoneum nactus locum, exemplis lectorem obnuere. Sufficiet illud quod positum est in hac prognosi, quod excellentia & perspicuitate cetera vincit omnia quæ aduocari possent. Quid enim peius est ipsa specie in qualitate corporis, quàm digitorum & pedum nigredo? At semper non est mala reapse, si veniat ἐκ τῶν χρεῶν, duce natura, lege critica, finem morbi adferens vnde venit. Distinctio autem boni & mali, ut ad vtrumuis nigredo apparet, sic adhibenda est.

QUI AUTEM PENITVS NIGRESCVNT DIGITI ATQVE PEDES] i. Qui ultra liuorem processerunt colore, ut iam nigredine saturi, non autem fuligine sint fucati. Cur autem nigrescant penitus, mox dicetur.

MINVS PERNICIOSI SVNT LIVIDIS] Sanè quidem: quia non semper sunt perniciosi, ut liuidi. Nam sæpe illi nigrescunt penitus ἐκ τῶν χρεῶν, merito ipsius naturæ: propterea que plus habet
50 salubritatis, nisi palindromen moucant; vel ex gangræna periculo sit locus, quod medici est arcere: liuidi autè per se iam mali, non liuent nisi ex malo quod est in emortua viuacitate, & in extincto calore viuifico. Itaq; maior periculo locus est in signo liuoris: quia semper venit è malis per mala, propterea que semper est malum. In causa autem nigredinis verendum est de palindrome & gangræna: quamuis bene venerit ἐκ τῶν χρεῶν, atque periculum morbi exacti sustulerit. Nam si è malis exorta est, longè liuorem pernecie ipsa præcedit. Ergo digitorum & pedum liuor in febre acuta semper apparet ad mortem citò venturam. Nigredo autem, si loco venit, nec extirpetur, causam infert interitus, vel sua palindrome, vel ipsa gangræna.

SED ALIA QVOQUE SIGNA SPECTARE OPORTET] Quæ scilicet ex incertis, nos red-
dant certos comportes que consilij in iis quæ sunt ἀμφιδόξα, i. ancipitis vel incerti iudicij, qualis est digito-
60 rum & pedum nigredo, prout oborta est ἢ ἐκ τῶν χρεῶν, ἢ ἐκ τῶν κακῶν, i. integræ agri rebus, aut malis, vel ad spem salutis, vel ad interitum.

NAM SI MALVM ILLVD FERRI ALACRITER VIDEATUR] i. Si nigredo illa digitorum & pedum, leuationem adferat febris exactæ; nec eam quidem insidiosam: sed veram & criticam, cum vacuitate symptomatum malorumque omnium, quæ vel à palindrome, vel à gangræna inferuntur. Nam criticorum abscessuum certa est crisis, nec aliter, cum salutariter exoluntur: sicut parotidum

criticarum in empyreare: nigredinis autem critica in extrema parte mutila quæ contraxit nigredinem
et mox dicitur.

NAM SI QVOD ALIVD. PRÆTER HAC, SIGNVM SALVRE APPAREAT] i. Si
 præter alacritatem ^{in toleranda partium extimarum nigredine,} in toleranda partium extimarum nigredine, vel causa ipsius, quam edit
 humoris morbifici ad partes illas ^{in copia,} copiosa quæ ibi facit ^{ex humore,} unde non exit per venulas ad
 modum nauseabundas: si præter eam, inquit, alacritatem ægroti quam attulit critica ^{metastasis,} quæ, fonte
 morbi exhausto, sine reliquiis, capacitatem macta est perfecti abscessus, unde alacritas ipsa est: aliud
 quoque signum salubre appareat in somni benignitate, cibi appetentia, libertate spirandi, doloris & fe-
 bris vacuitate, cum urinis bellè coloratis, ac deiectionibus figuratis & mollibus.

SPES EST IPSVM MORBVM IN APOSTASIN ABITVRVM] Vel potius, certa securitas est oportam nigredinem humoris appulsa morbigfici, non quidem semifuo, sed perfecto: vnde symptomatum omnium discessio est, ac signorum salubrium euidentia, per *exemptum* principatum vitæ & animalitatis.

ADEO UT IPSE QUIDEM SUPERSTES SIT HOMO] In quo redintegratio est utriusque vitalis œconomiz, videlicet nutritivæ & spiritivæ; & in quo sunt commodâ omnia quibus vita hominum sustentatur. Est autem superstes: quia per illam apostasin defunctus est morbo & vitæ periculo.

EXCIDANT AVIEM EA QVAE NIGREDINEM CONTRAXERUNT] Vnecessario debent excidere vel amputari: quia hæc mortua, sunt inimica viventis, *et* *avi* *ex* *in* *vorta*, i. *quæ* *ipsum* *vi-*
uens *interimunt*, quod semper impatiens mortui esse solet: nec vaquam quiescit, donec radicitus fuerit
extirpatum.

Sic in prognostico, melius quam in Coacis.

6. Ορχεῖς δὲ καὶ αἰδοῖα ἀνέσπασμένα· πόνοις ἰσχυροῖς σημαίνε, καὶ
σπασμὸν θανατώδεα.

Testes & pudenda contracta; sanos dolores denunciant, & convulsionem mortiferam.

EST QUOD hoc symptoma inualeſcentis morbi & virium effœtarum, proptereaſque, doloris cruciatu, mortem citò inferit crudeliſſimam, omnémque reſpuit medici diligentiam & induſtriam: quia tempus & occaſionem præripit curationi. Tum illud citæ mortis periculo adiciſtur, quod tam crudele ſymptoma, earum ſit partium quæ principatûs omnes naturæ adducunt facilè in ſui contagionem atque ſympathiam, iure omnis ſocietatis. Verus eſt illud Hippocratis. ΟΡΧΕ ΟΙΔΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΕΧΥΩΝ ΙΣΤΟΜΗΝΑΙ ΠΑΙΝΩΝ ΕΝ ΕΣΤΩΝ, ΜΕΛΩΝ, ΓΟΝΗΣ, ΠΑΝΗΣ. i. Cùm teſtis intumeſcit a tuſſi; memoriã renouat ſocietatis peſtorum; mamma- rum, genitura, &c. vocis.

Ergo. TESTES] Siue didymoi, i. gemelli, scroto conclusi, vasorum spermaticorum numerosa propa-
gine, velut pertexti: proptereaque molles, cauernosi, laxi, & rari, percoquendo semini, quod ab iis
dem. vasis per epididymidem & per parastatam accipiunt, à natura facti & sculpti, per quos amplifica-
tio est caloris natiui: vnde vox plenior, dum manent solidi arque viuaces in prolifico semine faciundo.

[ET PV DENDA] Quæ sunt; veretrum seu membrum virile, quod ab osse pubis producitur, ligamentis duobus tatis, quæ ipsum efficiunt, illinc exortis, tactu exquisito præditis, quibus venarum atque nervorum multa est propagatio: musculorum item officia præstò sunt, tam introcundo, quàm irrigando fundum vxoris.

CONTRACTA] Vel reuulsa, vt si obriguerint, & intò retrahi videantur: testes quidem, conuulsis & inflammatis musculis qui secundum vasa spermatica, ex hypogastrio ad ipsos descendunt, ipsisque adeo vasis, emortuæ iam facultati viuificæ & copias colligenti, nec amplius quicquam de suo impertienti, morem gerentibus: pudenda verò, inuita & violenta contractione vaforum, neruorum, & musculorum, sui quæque principatus vitio afflictorum, & commeatus inopia laborantium. Sic enim comparatum est, vt inter omnia *inueniuntur*, testes & pudenda eò magis laborent incommodis suorum principatuum, quò magis eorum commoda & officia ipsis necessaria sunt ad fundum proles arandum cum spe fidissima procreationis.

SAEVOS DOLORES DENVNCIANT] Quorum cruciatus fit illa partium *συμπεσπύκτων* retractio, qua vis naturæ maior inferri non potest. Hic enim partium sensus acerrimi violenta retractio est, vicio insanabili principatuum. Atque illa retractio tollit naturæ præcipua duo solatia, quæ sunt *ἡ φύσις* & *ἡ κωνσταντία*. Ambo tolluntur mutatione loci, quo ipsa norma & naturæ omnis præscriptio conservatur.

ET CONVULSIONEM MORTIFERAM] Signo & causa. Ac signo quidem; collapsis omni-
bus naturæ prædiis, commodisque ademptis quibus vita hominum sustentatur: causa autem; gravi
doloris cruciari: quo nihil est omnium quod magis faciat corpus infirmum, maiorémque adferat syn-
timoriam: maximè verò in hac genitalium retractione, propter sympathiam omnium principatuum:
ut verè & appositè hîc dici possit quod alibi de convulsione nara ex febre scripsit Galenus. *Οὐκ αἰσίων*
τὸν χρόνον τῆς ἰατρικῆς ἡ σωτηρία τοῦ νοσήματος· ἀλλὰ καὶ τὰ χεῖρα λαμβάνει μὲν τὴν δύναμιν, ἔξω τι βάραιος ὀρεγεί. i. Tempus non
expectat curationis, morbi vehementia: sed citò vires exolvit, & citam mortem infert.

Sic in prognostico, & melius quàm in Coacis.

7 Φύσαν δὲ, δύνω φόφω μὲν καὶ πρὸς τοὺς διεξιόναι· ἀείρον. κρέσσον δὲ καὶ ξυν φόφω δέλθαι, ἢ αὐτὸ ἀνελείεσθαι· καίτοι καὶ ἔγω διήσοδον, σημαίνει πονέειν π. Φ. δύνωσπον, ἢ πρὸς ἀφρονέειν, ὡς μὴ ἔκων ὁ δύνωσπος ἔγω ποιήσεται τὴν ἀφροσύνην τῆς φύσης.

10 *Flatum, absque sono quidem & strepitu traïci infra; optimum. Melius autem fuerit, ipsum cum sono transire, quàm sursum reuolui: quamuis ita traiectus, denunciaret inde vexari hominem, aut delirare; nisi prudens ac sciens talem flatum exitum moliatur.*

VT RESPIRATIO, spiritus œconomiam bene aut malè moratam esse testatur in vsu, voluntate, & actionibus partium spirabilium: sic flatus aluini sursum deorsumve traiecti, vel intrus conclusi, nutritus œconomiam cuiusmodi sit, ab officio partium nutritiarum quæ ipsam coquendo, distribuendo, & excernendo; absoluunt; syllogistica signa ostendant, quibus deducimur ad certam prognosin. Ac flatus quidem aluini non ita diu cunctantur, quin sedenti medico è conspectu ægri, se prodant, vel ructu, vel crepitu, vel ipso murmure, vel sæuis torminibus. Sed flatuum infra traicientium, quænam cuiusque sit conditio in traiectu: tum autem quorsum illi sic exeant vel subsistant, cum reuoluuntur sursum; id verò est quod ponitur in hac prognosi.

Ergo. FLATVM] Πνέσμα φυσώδες, i. spiritum flatulentum, quem edit cruditas ab imbecillo calore, vel ζύμωσις, ῥέσας γυμώδ, i. fermentatio nigri humoris. Sic enim visum est de aluinorū flatuū generatione philosophari, duce Galeno & Hippocrate, quorū ille sic ait. Πνέματις φυσώδες ἢ ἡγρεσι εὐλογον ὅτι ἐπὶ αἰσθητικῆς. lib. 2. progn. i. Originem flatulentis spiritus consentaneū est duci à cruditatibus. Hic verò sic ponit incommoda oxymelitis. Τὰ ῥέσας γυμώδ, & μακρὴν ἔχει, & πολλὰ πλάσσειται, i. Ab oxymelle nigriorū est fermentatio, meteorismus, & amplificatio. lib. 3. acut.

30 ABSQVE SONO] Quem edit crassi humoris bullati crepitus, dum infra deuoluitur atque traieciuntur, per angusta viarum expressus. Sic enim de sono sternutamenti ait Hippocrates. Ὑπερχίται γὰρ αἶμα, ὁ αἶμα, ἔξω· φρενὶ δὲ, ὅτε δὲ σπύσσει αὐτὰ ἢ διεξέρχεται. i. Aër vel spiritus flatulentus qui lacerat, intus foras erumpit. Sonat autem, foras exire coactus: quoniam per angusta ipsi est exitus. Atque hi flatus sonori dicuntur; in aluo quidem, διαβορροελζορς; in exitu verò, φύσαν φόφωδες.

ET STREPITV] Vel stridore potius, qui creber est sonis minutis, cum liquidis excrementis à spiritu flatulento spumantibus. Atque ita visum est diorissimum adferre stridoris & bombi, securo Hippocratem, qui posuit in prognosi φόρον καὶ πρὸς τὸν: vt sanè hic πρὸς τοὺς idem videatur quod πρὸς τοὺς, de quo illud scriptum est. Εἰ δὲ εἴη ὄρεσι τὸ διαχέρμα, ζυμώδες μὴ πρὸς τὸν. i. Sin autem liquida deiectio est, profuerit non stridere: tamen Galenus auctor est, nomen illud stridoris, indicare τὸν φόρον. Quod ipse concedo: sed uti cum diorismo exposui. Erit igitur hæc φύσα πρὸς τοὺς: vt aluinorum flatuum triplex omnino sit idea, σπύσσει, φόφωδες, καὶ πρὸς τοὺς.

TRAIECI INFRA, OPTIMVM] Non quidem ἀπλῶς optimum, præstantia ἢ πρὸς τὸν, & opportunitate ipsa ἢ ἀνυμωστικῶν; vt apparet in aliis quæ sunt reapse optima: sed inter omnes optima demum est illa exclusio flatuum, quæ sine sono est, ac sine stridore: quia victrice natura fit, officio caloris natui, primùm quidem humore sopiti, nunc autem suscitari atq; potentes: cum libertate meatuum, & virtute integra peristalticæ functionis, vnde flatus ipsi traieciuntur infra & sine sonitu excluduntur: quod est imprimis expectandum in aluinis laboribus.

MELIUS AVTEM FVERIT IPSVM CVM SONO TRANSIRE, QVAM SURSUM REVLVI] Nam reuoluti flatus foras non exeunt: sed intus lædunt atque subsistant. Ac subsistendi causa est, perennis à cruditate origo, & deprauata functio peristaltica intestini, quæ fit infernè sursum motu, naturali contrario. Hinc sæua tormina, & crudelissimi cruciatus qui nulla ope quiescunt: sed abeunt in siccum hydropem, quem exhibet vtriforme abdomen, spiritu flatulento distentum. Distentionis causa est, perennis origo flatuum à cruditate, & amplificatio quam deprauata edit functio peristaltica intestini. Ergo minora sunt multò incommoda flatus, quātumuis ægre & inconsideratè infra traieci, cum sono: quàm reuoluti sursum, vt patet ex eo quod sequitur.

QVAMVIS ITA TRAIECTVS, DENVNCIET INDE VEXARI HOMINEM] Si considerare id faciat, necessitate adductus, nec indecorè, fastidio elatus & cōtumacia: præsertim verò in eos qui præstò sunt, quos reuereri solebat. Hic enim dolorificum malum intus subesse testatur, quod studet excludere, posthabito eorū delectu & reueretia, quos pudor ipsius magis offenderet: quando beneuolè, audito crepitu recreantur. Flatus autem sonori, ægrum inde vexari denunciant ægro traiectu: ob crassitudinem spiritus flatulenti ab imbecillo calore & cruditatis sobole: tum propter meatuum angustiam, & excludentis naturæ oppressionem.

AVT DELIRARE] Si olim modestiam excoluerit. Tum enim apparet sui dissimilis. Atque hæc dissimilitudo est morum institutorum; non infortiorum: propterea quæ principem locum obtinet inter

signa delirij, quæ sunt omnino quatuor; indecora compositio; verborum absurditas; falsò credita doloris vacuitas; & morum dissimilitudo. De qua iam olim diximus ex professo, ad illam prognosin. *Moderati hominis responsa proterua; mali sunt ominis.* Et. *Deliria paulisper ferocia, mox erunt inmanissima.* Delirij autem natura & causæ, tum etiam differentiæ, alibi sunt explicatæ.

NISI PRVDENS ET SCIENS, TALEM EXITVM MOLIVR] Necessitate adductus, cum bona venia eorum qui adsunt. Hic nulla delirij suspicio est, cum sæui doloris acerbitas vincit ex-cultam in omni vita modestiam & temperantiam, leuacionis ergo. Notabilis est in hac prognosi, prisca religio vitæ honestæ, quam nostri homines vitio iis vertunt qui cum ea vitam decorè instituunt; nimis profectò securi religionis & honestatis.

Sic in prognostico: ubi melius quàm in Coacis.

8 Ελκος δὲ λεῖτ' καὶ περιγερονὸς τύχη ἔχων, λεῖτ' καὶ ἐν τῇ νέσῳ γήρη-
ται· κατὰ μαρτυρεῖν γῆρ'. λεῖτ' γὰρ μὴν δὲ πολλοὺς αὐτὸς ἀνθρώπος, πρὸ τῆς
θανάτου, πέλιδ' ὄντ' καὶ ξηρὸν ἔσαι, ἢ ὡχρὸν καὶ ξηρὸν.

*Vlcus autem, tum si quis ante, tum in morbo ipso natum habeat; per-
discendum. Nam si moriendum est agro, ante mortem ipsam liuidum
atque siccum, aut pallidum atque siccum euadet.*

SINGVLARIS est medico ad res ægri attentio, si nihil eum lateat vnde incunda sit *τίμῃσι* fæli-
citer prædicendi. Ad eam profectò attentionem, præceptoris hortatio est in hac prognosi cum ait, *κα-
τὰ μαρτυρεῖν γῆρ'.* i. omni cura & studio scire oportet: vt nihil sit loci negligentia cum agitur de prædicendo; nec
eos imitemur qui sola inspectione cõtentì vrinæ: cum rhythmo venæ micâris perfunctoriè duobus di-
gitis explorato, quamuis ad Lyrâ asini: tamen cõposito bene vultu, totòque corpore, ad summâ hypo-
crisis; vanitatè ambagibus solertissimâ, pro veritate ostētant. O larvæ! ô lemures. Atq; inter ea quæ in
occulto larēt, sunt vlcera partium stragulis velatarū, quæ oculis debēt conspici, ad iudicandū cuiusmo-
di sint, & quorsum appareāt. Ex iis enim signa petūtur interitus aut salutis: vt in hac prognosi docetur. 30

VLCVS AUTEM] Quod vel sponte venit, lacerata cute & carne ab iis quæ intus lædunt, & *ἀνίμα*
dicuntur; vel ictu, iactu, aut casu illarum est: propterea quæ illinc phyma, hinc *τῶμα* dicendum: siue
vtrumque simplex appareat, siue coniunctam habeat contusionem, phlegmonem, aut varicem.

TVM SI QVIS ANTE MORBVM HABEAT] A collectione ichoris, quem intus subesse te-
statur exulcerata sponte caro & cutis: vel quæ sauciata extrinsecus, saniem & sordes collegit; atque id,
partim exorto phymate, partim illapso *τῶμα* ante morbum.

TVM IN MORBO IP SO NATVM] Siue primùm cutis bullata fuerit, exanthemate, bubone,
carbunculo; & inde diuisa: siue ulcerata primo ichoris appulsu, ipsam erodentis vel amburentis.

OMNI STUDIO PERDISCENDVM] Est enim magnæ molis, instituire certâ prognosin, cuius 40
instipendæ ratio nō minùs de vlcere, q̃ de signis aliis cõparatur. Nō enim minora sūt argumēta prognos-
eas, quæ cernuntur in qualitate corporis, quàm in actionibus & excrementis. In qualitate corporis, na-
turæ vis lucet aut morbi, vnde signa petuntur virium validarum vel effectarum, ipsiusq; naturæ viuidd
vel emortuæ: tum in viuacitate ipsa partium solidarum: tum in viuifico neccitate quod venit à corde.

NAM SI MORIENDVM EST ÆGRO] Suffocatione vel extinctione caloris vitalis, quam in-
ferunt ardor febrilis, cacochymia maligna, cum venenata aura, partiumq; impeditio quarū officia sunt
omnino vitalia. Sic enim de morte statuendū & causis mortiferis, quæ fiūt, quæq; apparēt, tum in sym-
ptomatis planè hostilibus, tum verò in signis triumpharæ naturæ ac fariscentis: quæ omnia cernūt in
actionibus, excrementis, & qualitate corporis, ad quam potissimùm pertinet instituta prognosin.

ANTE MORTEM IPSAM] Cum scilicet ardor febrilis, vel qualitas venenata, per extinctionem 50
caloris natiui, ad interitum est fatalis. Nam suffocatio ipsa quam facit impeditio partium spirabilem,
hic locum non habet: nisi fortassis ea quam infert phthisicum empyema.

LIVIDVM ATQVE SICCVM] Cuius liuore & siccitate ostēditur, illinc extinctio vitalis caloris,
hinc defraudatio vel deprauatio nutritus. Liuet enim, quia emortuum: emoritur, perfrigeratum: per-
frigeratur autem, extincto calore. Nam si liuoris causa est ipsa *ἀνίμα*, deprauatio est nutritus, nigri
humoris soboles, vel atræ bilis. Sed ideo siccum est vlcus: quia suo genio defraudatum, ex paupertate
sanguinis: vel quia palindromen sursum habet funestam, vnde & socio caret molli tumore, & excre-
mentis. Nam siccitas illa non est naturæ, in parte solida & succi plena: nec artificio medici comparata,
siccando & detergendo: sed vitio partis exhaustæ, quam defraudatio siccam fecit; vel ipsa palindro-
me: extinctio autem caloris, vel deprauatio alimenti, liuidam atque siccam.

VEL PALLIDVM ATQVE SICCVM] Græcè est *ὡχρὸν* & *ξηρὸν*, in prognostico: in Coacis au-
tem, *χλωρόν*: quam lectionem probat Galenus, cui placere video, idem esse *χλωρόν* & *ὡχρὸν*; tamen si fate-
tur *χλωρόν* usurpari pro viridi, vt in illo versu Homeri, *Οὐ πύλας χλωροῖς ἐπὶ τόσσον αἶμα, ἔδ' ἐπὶ σπύγῃ.*
Sed in colore flauo aut pallido, multum interesse arbitror inter *ὡχρὸν* καὶ *χλωρόν*. Ac rationem attuli qua-
re dissentiam à Galeno, commentatio ad prognosin de linguæ coloribus. Ergo vlcus pallidum atque
siccum, 60

ficcum, defraudati est nutritus ac deprauatus: quemadmodum in petroso capite signa sunt desperatae salutis; ac mortis propinqua; faucia caro sicca & velut sale condita, quam vocat *πύρετρον*: os item pallidum, quod erat album; & cariosum, quod erat solidum & perpoliturum: vt omittam cetera quae spectantur in cerebri actionibus deprauatis. Haec enim sunt vitiatæ qualitatæ partium petrosarum. Erit igitur hæc summa prognosæ Hippocraticæ. Vnde significatur defraudatio vel deprauatio nutritus, & nativi caloris extinctio: inde mors in propinquo esse ostenditur in morbis acutis. Atqui ex vlcere limbo atq; sicco significatur deprauatio vel defraudatio nutritus, & caloris nativi extinctio. Ergo &c.

lib. de vitiis
capitis.

10 9 *Ἀνάκλις βέλυσή μὲν, ὡς εἰδικαί τις ὑγιαίνων.*

Illa demum ratio decumbendi est optima, quam unusquisque seruat dum valet bene.

VETVS ILLVD scitum est. Quod omnia quæ sunt, quæque apparent in ægris, eiusmodi esse debent ad spem salutis; vt bene valentium similia sint, eiusque potissimum cuius valetudo curatur. Atque hic sanè communis est epilogismus omnium quæ super ægro feruntur prognosæ. Est enim consentaneum, vt qui absunt proximè à norma & regula naturæ, iis meliùs esse putetur, quàm qui longissimè; proptereaque multò facilius sit eorum redintegratio. Vt autem catholicum hoc theorema, scitè & appositè locum habet in omnibus quæ circa ægrum spectantur; videlicet in qualitate corporis, actionibus, & excrementis: tum verò maximè in decumbendi modo, quem in valetudine aduersa requirit ab ægro, qualem olim seruabat dum rectè valeret.

Ergo. ILLA DEMVM RATIO DECUMBENDI] Quam sua sponte iniuit is qui decumbit, alienamenti studio ac dulcedinis comparandæ causa: non autem decori seruandi erga medicos aut familiares atque propinquos. Atque in eo decumbendi modo salutaris à medico, priusquam ad lecti spondam accesserit: sicut præceptum est à dictatore. *Κεκαμμένον δὲ χεὶ καὶ λαμβάνειν τὴν ποσὶν ὑπὸ τὴν ἰατρῆν.* i. *Ægrum decumbentem oportet deprehendi à medico.* &c. Notabili autem delectu posuit *τὴν ἀνάκλινσιν*: qua voce firmiorem ostendit vim decumbendi, quàm per *κατάκλινσιν*, quæ non tollit *ἀρετὴν*, sicut *ἀνάκλινσιν*.

EST OPTIMA] Proptereaque experienda maximè: quia medici votis responderet, causa & signo. Ac signo quidem, vegetæ animalis potentia, cuius imperio decumbendi ratio ipsa perficitur, non autem iacendi. Est enim decumbendi ratio in actione posita virtutis quæ portat & mouet: iacendi verò, in passione illius, ob grauitatem corporis quod amplius portari non potest. Causâ autem, ratio illa decumbendi est optima: propter opportunitates & commoda liberæ spirationis quam iuuat: cuius libertas præclare ad salutem apparet & facit in omnibus morbis acutis.

QUA VTITVR QVIS FAMILIARITER, DVM VALET BENE] Est enim cuique sapiens vitam instituenti, à natura tributum, vt parem necessitati commoditatem quærat in decumbendo, qua & spirandi comparet libertatem, & dormiendi suauitatem, cum vniuersi corporis artuumque omnium iucundissima quiete in lecto. Sed ea commoda comparantur in secunda valetudine, si quis decumbat molliter toto corpore, in dextrum latus, vel in sinistrum: idque tum ceruice, tum cruribus atq; manibus decenter reflexis & modicè; vt nulla sit corporis artuumque figura & cõpositio posita in excessu tensionis aut flexionis, quod *χῆμα κατὰβολὴν* Græci vocant. Idem si quis faciat in valetudine aduersa morbi acuti, signum dat magnum vegetæ facultatis quæ portat, cum alacritate corporis quod portatur. Omnis enim figura teres atque rotunda, qualis est cylindri & globi, ægriùs consistit loco, quàm plana. Causam autem anquirat & parat prædictorum omnium commodorum; videlicet liberæ spirationis, somni benigni, atque totius corporis suauiter quiescentis. Quæ sanè commoda eiusmodi sunt, vt multum opis adferant & adiumenti ad morbum feliciter defungendum.

prognos.
lib. 1.

10 10 *Ὑπὶ πῶν δὲ καὶ δαί, σκέλεα ἐκτεταμένα· ἐκ ἀσείων.* 1. *ὅτι ἐπὶ χαλῇ αὐτὴν πρὸς τὴν*

Supinum autem iacere, extentis cruribus; indecorum.

ATQVE ILLA prædicta, sunt & *ὑπαφῆρα* bene & naturaliter decumbendi, quæ signo & causa, rerum ægri bonarum sunt optima. Hic nunc ponuntur *τὰ συμβεβηκότα*, quæ indecora vocat, proptereaque mala: quoties in decumbendo sua quæque sponte iniussa sunt & inuita; nec medici bene monentis, vel ægri prudentis ac sui diligentis delectu apparent.

SUPINVM AVTEM IACERE] Græcè est *καίδω*, non *ἀνάκλινω*; idque appositè: non enim decumbit qui supinus iacet in lecto, extentis ceruice, manibus, atque cruribus, vt scriptum est in prognostico. Ergo. SUPINVM IACERE] i. Tota spina iacendo sustineri, dorsoque suam adimere *ἰσχυρότατα*, ceruicis nimium extendendo: si talis decumbendi ratio non sit inuita, nec iussa; vel quibusdam delictis; vel ipsa pleuritide alterutrius lateris: quæ quia tum suspensione, tum oppressionem molesta est, illic decumbendo in latus oppositum, hinc verò in afflictum; sæpenumero ac ferè semper, inuitum cogit ægrotum iacere in dorsum; quod est supinum esse.

EXTENTIS CRVRIBVS] Tum etiam manibus & ceruice, vt legitur in prognostico: quod cer-

tè opportunitatem adimit totius corporis, artuumque modicè reflexorum, quam paulò antè posuimus. Causam verò subesse ostendit cur ita sit, videlicet portantis infirmitatem, i. facultatis, καὶ τῆς ἐν-
μύτης, i. quæ ciet intus, vel gravitatem corporis quod vix portari potest. Atque hîc cernitur ipsa καὶ τῆς
quæ facit ἡ ἐκτασις, i. exolutio facultatis & corporis. Quò spectat illa prognôsis nuper exposita. Si æ-
ger gravis admodum videatur, tum reliquo corpore, tum verò manibus atque pedibus; id multò peri-
culosius ipsum habet.

INDECORVM] i. Absurdum: quod non minùs exterreret medicos, quàm idiotas. Est quidem hæc
iacendi, verius quàm decumbendi ratio indecora: propterea quæ si iussa, vel est dementiæ omnis decori
securæ, vel necessitatis in metu grauioris molestiæ, aut à suspensione viscerum, aut ab eorum oppressio-
ne quæ accidit decumbendo in latus. Iniussa verò, meteorismi expers, manuum atque pedum, causam
vtramque subesse ostendit praua καὶ τῆς ἐν-μύτης atque pestiferæ. Nam quæ tāta esse potest gravitas manuum
atque crurum, vt lectari non possint? Melius erat Similo, de quo sic festiuè Virgilius,

Membra leuat sensim, vili demissa grabato.

Ergo difficilis ille artuum meteorismus, quem
vult Hippocrates alacriter suscipi atque perfici, facultatem in vitio esse testatur. Ipsa autem crurum ex-
tentio, non est indecora, nec vitiosa, cum iussu medici comparatur ad curationem fracturæ. Est enim
naturaliter constituta, in stando. Propterea bene præcipiunt qui manus perfractas collocant in mite-
la: crura verò in lecto extendunt. Sic enim natura comparatum est vtrisque. Ergo indecora corporis
artuumque collocatio mali est ominis, cum vel inuita est, vel iniussa: ob eamque causam est indecora,
tanquam decori secunda & negligens, quod est ipsius ægri coacti, dementis, vel impotentis. Talis descrip-
tio prauitatis est in illa prognôsi. Oculorum caligatio, album ve rubens, aut liuens, aut nigrus oblitum venulus;
indecorum. Est autem prognôsis hæc scripta καὶ τῆς ἐν-μύτης ὑπὸ καὶ τῆς ἐν-μύτης, i. καὶ τῆς ἐν-μύτης.

suprà in
Cos. & in
prognôsi.

II Εἰ δὲ καὶ κατὰ ῥέοι περὶ τοῦ ποδὸς· χεῖρον.

Ad hæc, si protinus delabatur subinde ad pedes; peius est illi.

EST QUIDEM indecorum, supinum iacere sic, vt iacentis caput situm sit ad amissum crurum
& pedum, minimè reflexorum: sed in figura hyperbolica extensorum. Est autem indecora hæc collo-
catio, planè κατὰ ῥέοις; propterea quæ hominis vel dementis, in amissione decori; vel impotentis, in gra-
uitate portati, quæ certat ex æquo cum infirmitate portantis. Præua est igitur hæc collocatio indecora,
quæ vel dementiæ signum est, vel impotentis, quæ est ipsa καὶ τῆς ἐν-μύτης, vt veteres nominarunt. Vt autem
illa καὶ τῆς ἐν-μύτης, signo & causa medicum exterreret metu: sic descripta ἐν-μύτης in hac prognôsi, eundem planè
in desperationem vitæ & salutis adducit. Hæc enim iacendi ratio, nullam profectò facultatis actionem
ostendit: sed potius afflictionem extremam, cum scilicet ad vltima ventum est. Eam præceptor τῶν ἐν-μύτης
nominauit, in qua similiter esse iis quos habet mortiferè, docet Galenus, vt auius quæ à volatu cor-
ruunt fauciatur vel mortuæ: secus ab illis quæ summa virium contentione, fortique alarum remigio in
sublimi manent immotæ. Atque idem Galenus sic interesse contendit inter eum qui natura duce de-
cumbit, & eum qui desperatus iacet fractis iam viribus. Quæ cum ita sint.

lib. viii
24. m. v.

lib. de tremo-
re.

AD HÆC] Præter hyperbolicam in iacendo figuram, quam supinum corpus κατὰ ῥέοις, extentique
nimum artus omnes ostentant, quæ est ipsa καὶ τῆς ἐν-μύτης, quam facit, non tam portati gravitas, quàm por-
tantis infirmitas: quòd periculose quidem habet ægrotum: sed illud periculo multum adiicitur, vel, vt
præceptor ait.

PEIUS EST ILLI] A signo collapsio facultatis: cuius quidem nulla superest redintegratio. At
cum facultas cessat in officio, exhausta virtute quæ est in substantia, nullum est maius vitæ periculum;
immo tum vita commutatur cum morte.

SI PROTINVS DELABATUR AD PEDES] Pereunte omni facultatis officio quod lucet
splendèrque in decumbendo, exiguum adhuc manet in supino corpore artubusque extentis, ob facul-
tatis infirmitatem; quæ ipsum tamen continet, dum indecorè iacet: omnino autem deserit, ac misero
vale dicit ἐν τῇ ἐν-μύτης ὅτι τῶν πέρας. Tum in propinquo mors est.

12 Θανάσιμον δὲ καὶ κεχηνέναι, καὶ καθύδην αἰεῖ, καὶ τὰ σκέλεα ὑ-
πὸ κατὰ ῥέοις συγκεκαμμένα ἔτι ἰσχυρῶς, καὶ διαπεπλεγμένα.

*At verò hiare, funestum est, ac dormire assiduè; tum etiam supinè
iacenti crura esse contracta fortiter, atque implexa.*

ATQVE HIC, metu proposito in habitu ipso contra naturam fani cuiusque iacentis, vitæ spes
nulla superest. Quod certè ostendit illud θανάσιμον ἢ θανατῶδες, i. funestum. Nihil enim tam bene fit aliun-
de, vt inde salutis aura possit afflari medico sapienti, cum vel ægrotus hiare, vel dormit assiduè. Quam-
obrem verò hæc signa funesta sint, ipsa causarum cognitio demonstrabit.

AT. VERO] Præter ea quæ non solum metu exterrerent medicos in habitu decumbendi, vel iacen-
di potius:

HIARE.] Ore diducto gulam & fauces propalam explicare, propter laxitatem *vel amillar* nethorum & musculorum, ora claudentium, qui ceteros omnes virtute præcedunt; imprimisque autem qui ætæ temporibus nomen habet, & crotaphita dicitur: vel; si à terano qui non raro cadit in febrem acutam, cum ceruix obtruncetur, maxilla luxaret. Aut si ardore pulmonum & cordis ora hiantia inhiant frigidissimo aëri, pleno haustu foris ducendo.

20

30

40

Ipsū verò iacere in ventrem, quibus est insuetum, delirium indicat, & circa ventrem labores.

50

60

natura, si nulla sit ex consuetudine. Sic dentium stridor atque collisio, quæ dormiendo auditur à medico, ipsum metu non exterreret, si ea sit ægro dormiendi consuetudo.

DELIRIUM INDICAT] Sicut omnis compositio indecora, quam facit dissimilitudo institutorum morum.

ET CIRCA VENTREM DOLORES] Actum indecora compositio in eo iacendi habitu inflata est & innuita, tensionis amoliendæ causa, & dolorificæ suspensionis vitandæ. Actalis habitus decumbendi quo se componit æger, dolori sedando, signum est diligentis sui naturæ, potius quàm dementiæ: nisi fortè is dolor aluius consecutionem adferat mentis percussæ, ipsiusque delirij de quo sunt positæ illæ prognoses. *Palpitatio ventris in febre; facit insaniam. Et. Umbilici dolores cum pulsu coniuncti; nonnihil paraphoricum præ se ferunt, nec sue mentis agrotum esse testantur.*

Coac. 12. &
30. cap. 11. 1. 2.

10

Sic in prognostico, ubi melius quàm in Coacis.

14 Εἰ δὲ καὶ γυμνοὶ τῶν πόδας δειλόκοιτο ἔχων, μὴ θερμοὺς κάρτα ἔοντας, καὶ τὰς χεῖρας, καὶ τὸ πρᾶχιλον, καὶ τὰ σκέλεα δύωμάλως διερρίμμένα, καὶ γυμνὰ κακόν, ἀλυσμὸν γὰρ σημαίνει.

Sin autem nudis pedibus, nec ita calentibus deprehendatur iacens: tum manibus, & ceruice, cruribus item disiectis inaequaliter, atque nudis; pestiferum. Anxitudinem enim denunciat.

OMNIA QVA apparent & fiunt contra naturam morbi & ægri; pestifera sunt atque sinistri iudicij: præsertim si nulla sit critica perturbatio, cuius excusatio accipienda est etiam in alba vrina, delirioque ipso, dum itur ad crisin morbi acuti. Ergo si contra naturam febris acutæ, qua foris pariter atque intus calescunt eximie quos occupauit; & contra ægri consuetudinem qui sapienter vitam instituit, pedes non ita calentes vti par erat, nudi appareant, sic deprehensi à medico; nec vlla suspicio sit commoti humoris ad crisin: talis iacendi habitus, grane intus malum subesse testatur, quod pessime & periculose habet agrotum. Cuiusmodi autem sit malum, docebit recensio huius prognoseos quæ sic habet.

SIN AUTEM NVDIS PEDIBVS] Quos, reuoluta stragula, foras exponit, frigoris capiendi causa.

NEC ITA CALENTIBVS] i. Non dignè satis pro æstu febrili quo incandescit æger, quem æquum fuerat toto diffundi corpore, omnibusque artubus; vt sanè diffundi solet in omni febre acuta bene morata. Secus sit in lipyria & causo, vbi non est æqualis perceptio ardoris febrilis tam foris quàm intus: sed inæqualitas magna, vbi ardent viscera cum artubus aliofisi.

DEPREHENDITVR IACENS] Priusquam medicus ad spondam lecti accesserit, nec eius præsentia vrgeat ipsos velare, donec id faciendum præceperit ex dictatoris edicto. *Υπὸς ὁφείλει ἐπιθεσθαι μίτρα. i. Somnos inire oportet, & frigus captantem.* Talis est illa distinctio quam initio posuit in deprehensio habitu decumbendi de more sani iacentis. Sic enim ait. *Κεκλημένον δὲ χειρὶ καὶ λαμβάνειν αὐτὸν τοιοῦτον ὡς τὸ ἐκ τῆς. i. Decumbentem ægrum oportet deprehendi à medico.*

6. Epid.
Part. 4.

lib. 1. progn.

TVM MANIBVS ET CERVICE, CRVRIBVS ITEM DISIECTIS INÆQUALITER, ATQVE NVDIS] Vt ipsum tædeat omnis loci & omnis figuræ, cum falsi caloris in artubus tædio intolerabili: vnde illa veniunt, disiectorum artuum & sine causa nudorum, fastidia. Sic enim apparent negligenter dispersa & inæqualiter, vt omni ratione sint omnium minimè sibi placentis ægri, & sua sorte, vt ita dicam, contenti: sed contrà sibi maximè displicentis, & sua tædia ostentantis per impatientiam vel intolerantiam cuiusque figuræ & loci, quam ipsa declarat crebra mutatio.

ALYSMV ENIM DENVNCIAT] Hic nomen Græcum retinui, quo vtraque causa ægri iactati & anxij continetur. Ac nequæ anxitudo, neque iactatio, satis appositè, ipsa per se, naturam alysmi ponit ob oculos: cuius vtraque subest ratio in hac prognosi. Est enim iactatio & anxitudo, vnius alysmi, qui suo complectitur ambitu τὸ αἶσθησι καὶ τὸ δύσφοβον, quarum illa est anxij, hæc verò ægri iactati. Cause in promptu sunt. Nam cum alysmi nomen veniat à verbo αἰνέειν, quod est multarum rerum satagere, studiæque sua subinde ad res novas conuertere, earum fastidio quæ prius placuerant: hinc nomen alysmi translaturum ad ægros qui, ad punctum temporis, quæsitos fastidiunt novos iacendi habitus. Eius fastidij duplex omnino causa est: vna quidem, stomachi proritatio atque morsus, à feritate humoris, cum æstu; altera autem, virtutis oppressio à corporis gravitate, vt nulla collocatio ei fastidio sit gratiofa. Cause vtriusque signa sunt syllogistica. Prioris quidem, nauscabunda proritatio: alterius autem, crebra iactatio, moræ impatiens, sine nausea. Itaque duplex alysmus, distinctione causarum, nominari solet à Græcis; ille quidem τὸ αἰνέειν; hic verò τὸ δύσφοβον. Vtraque alysmi causa, fastidiosum parit habitum decumbendi, qui cernitur in artubus quoquoersum subinde iactatis atque nudatis: tametsi præcipua iactandi causa, est virtus languida & oppressa; nudandi autem, febris ardens & lipyria. Sed plura de alysmo scripsimus primo libro huius operis.

aph. 14. 7.

proth. 44.
lib. 1.

15 Ανακαθίζεν δὲ βέλεσται ψυχοέοντα, τῆς νέου ἀκμαζούσης· πό-
τηρ μὲν ἐν πᾶσι τοῖσιν ὀξέσι νεσθήμασι· κένισον δὲ ἐν τοῖσι πεπνυμο-
νικοῖσι.

10 *Sed residendi cupidum esse iacentem, dum viget morbus; pestife-
rum quidem est in omnibus morbis acutis: pessimum verò in peripneu-
monicis.*

20 **ÆGRORV** signa quæ in iacendo sunt indecora, siue illa morbi dominatu edantur inuita, siue iniussa, virtute omni collapsa; quàm sint terrifica, metu interitus vel dyscrisæ, suprà iam diximus. Hic ponitur vnum quod vel inuitum est, vel affectatum. Inuitum quidem, est indecorum, quod valet ad morbi arque doloris leuationem, & ad comparandam dulcedinem. Affectatum verò est, quod sponte fit ægri, nullo vsu vitæ quasito, nec vlla dulcedine; sed incitante alysmo, vel etiam dementia præeunte qua tollitur omnis decori honestas. Sed tamen inuiti, quàm affectati, conditio granior esse solet. Est autem cupiditas crebrò residendi vel in peripneumonia, vel in acutis febribus quæ celeriter, vehementer, & continenter mouentur. In peripneumonia quidem, inuita est illa cupiditas residendi, ad vitæ vsum & ad dulcedinem quasita sic libertate spirandi. In acutis febribus affectata fortè quidem, vt mos geratur incandescenti cordi: certius autem, delirio & alysmo. Quænam autem sit ratio in eo iacendi habitu, indecoræ voluntatis aut necessitatis, & vtra ægrotum habeat periculosius; iam ad docendum ag-
gredior.

SED RESIDENDI CUPIDVM ESSE IACENTEM] Quem vel necessitas, vel indecora voluntas eò adducit. Ac necessitas quidem in peripneumonia & cordis æstu, dum viget febris acuta. Indecora autem voluntas, quando non suæ est mentis, aut etiam deliciarum ergo, vbi collocatio indecora, nihil præ se fert mali, nec signo, nec causa.

30 **DVM VIGET MORBVS**] Quando symptomatum summa sunt omnia, ac tum natura pepasmo dat operam, si bene res eunt: sin minùs, accessio est cruditatis, ardoris, orgasmis, ac retro sublapsa refertur spes medici.

PESTIFERV QVIDEM IN MORBIS ACVTIS] Tum enim si crebrò studeat reside-
re, nec tamen sit alacer in assurgendo, nec residendi potens; signum dat cordis incendio conflagentis, & virium languidarum, quarum virtute est opus in morbi vigore, tam ad pepasum humoris morbifici, quàm ad salutarem habitum decumbendi. Aut si orgasmo humoris ad cerebrum, dementia quædam sit ægri tam indecorè iacentis, nec vlla spes crisis affulgeat à pepasmo; id sanè pestiferum est, ac periculosè habet ipsum ægrotum. Nam deliciarum signa sùsque deque habentur, nisi fortè mutatio sit consuetudinis atque morum.

40 **PESSIMVM VERO IN PERIPNEVMONICIS**] Quorum cognitio arque notitia sic
comparatur. Nam febris acuta ipsos exercet, ac spiritum crebrò ducunt, calidumque expirant, multum iactati & anxij. Ac dolor est sub omoplatâ, qui prorepat ad iugulum & ad mammam, cum pectoris grauitate. Ipsum verò adest non rarò delirium. Est autem pessimus ille iacendi habitus in residendo, quem viget peripneumonia; potiùs quàm febris acuta: quoniam in spiratione difficili parua & crebra, quæ vicio accidit partium spirabilium, systrophica phlegmone obsessarum, grauiora sunt multò incommoda, maioraque tædia, & signa peiora; quàm in difficultate spirandi, crebra & magna. Hæc enim, ducunt tantum sit vsu adancto, qui est in corde ab æstu febrili. At periculosior est ipsa difficilis spiratio à phlegmone partium spirabilium, quàm à crescente vsu. Tum autem cum eò ventum est difficultatis à phlegmone in pulmonibus quæ facit peripneumonicos, vt non nisi residendo & ægrè spiritum possint ducere: tum in angusto spes est: quia spiritus, locum non habet introeundi, nec vapor fumidus exeundi.
50 Hinc suffocatio est in propinquo.

16 Καθεύδαν δὲ καὶ πλεονέκτα, πλεονέκτα δὲ ἡμέλει ἐξηγορέσαι· τὸ δὲ
ἐναντιον, πονηρόν. ἡκιστα δὲ αὐτὸ λυπέοιτο τὸ περὶ κοιμῶντος· ἕως τῆς
πειπυ τῆς ἡμέρας· ὅθεν μὲν ταῦτα ὕπνοι, πονηρότεροι.

60 *Dormire autem noctu oportet, vigilare interdiu. Contrarium au-
tem malo fit ægri. Sed tamen is minimum offendetur dormiens manè ad
tertiam partem diei: qua exacta, somni omnes inde peiores.*

HACTENVS de omni habitu decumbendi atque iacendi. Quoniam autem potissimum eò se

comparat æger decumbendo atque iacendo, ut quiescat, si potis est, vitæque afflicte dulcedinem; laborumque suorum aliquam leuationem percipiat: leges hinc posite sunt vigiliarum & somni, ad incundam prognosin de natura & consuetudine dormiendi & vigilandi, ut illæ seruantur aut immutantur in ea vicissitudine actionum. Est enim consuetudinis naturaliter institutæ ratio, conseruatrice naturæ: mutatio autem egressæ naturæ de sua præscriptione, ipsius vera est labefactorio. Itaque prima lex illa de somno sancita est à dictatore, ut idem sit eodemque modo, *ὁ αὐτὸς καὶ ὁ αὐτοῦ χρόνος ἔστω* i. quemadmodum naturaliter consuetum est nobis. Vbi Galenus hæc scripsit. *Ἐν τῷ Ἱπποκράτει ἔστιν ὁ κανὼν ὅτι τὸ καλὸν καὶ τὸ κακὸν ἐστὶν ἐν τῷ χρόνῳ* i. Hippocratis seculo, non aliud erat quod è natura est, aliud verò quod est de more institutioque hominum. Erat igitur consuetudo, lege naturæ, dormiendi noctu, & vigilandi interdiu. Quæ causa est cur ita scriptum sit in hac prognosi. **DORMIENDVM NOCTV, VIGILANDVM INTERDIV:** 16
velut Latine vertimus, Græcum secuti.

DORMIRE] Somnum inire, vel in somnum solui: exhausto spiritu vigilando, cum animi contentio est ad res gerendas, corporisque labor in motu & sensu; cui spiritui reficiendo & instaurando, placida est opus quiete, quæ dono diuini gratissima serpit, subitque in vicem vigiliarum. Ac somnus ille qui animalitatis quiete absoluitur, cessante motu & sensu, virtuti adiicit partium nutritiarum atque vitalium. Inde ciborum & sanguinis coctio, tum copia viuifici nectaris corde repleto, veluti cornucopiæ: vnde caloris & spiritus propagatio est ad cerebri *τὸ ἐνcephalon*, quorum amplificatio comparata, hominem somno excutit, facitque alacrem in omni opere faciundo, qui ante somnum stare vix poterat, aut certè stando habebat conuiuentiam veterinosam, iuxta illud Hippocratis. *Τὸν ἐδραστός ὁρᾷ πρὸς νύκτα* 16
6. Epid. part. 4. i. *Somnus profundus stantem nutare cogit.*

NOCTV OPORTET] Quoniam consuetudo est naturaliter instituta dormiendi de nocte. Ac talis consuetudo, ut naturam indicat bene moratam: sic ipsam reficit, recreat, & conseruat. Denique omnino præscriptio atque norma naturæ, spectatur in consuetudine illa, quæ in secunda valetudine *καὶ πρώτη*, i. naturaliter adhibetur: quod noster præceptor vocat *τὸ ἐνὶ νύκτι καὶ τὸ ἐν ἡμέρᾳ*, vbi de somno agit. Est autem naturalis, vel naturali iure fundata consuetudo dormiendi noctu; idque tum per se, tum ex euentu. Ac per se quidem: quia in nocte præcipua est somni causa. Ut enim natius calor, foras vel intro- 20
viam affectat: sic inclinatio esse solet vigiliarum aut somni. At noctu calor intro recurrit, hostilium re-
nebrarum appulsu. Contra idem calor interdiu, foras excurrit cum spiritu, excipiendæ causa lucis ami-
cæ, familiaris, atque, ut ita dicam, congeneris. Est enim res quælibet, suo quæque simili consocialis. Ex
euentu autem naturalis est etiam consuetudo dormiendi noctu: quoniam impetrata quiete laborum, 30
per noctem ignauam exhausti fontes replentur suo vitali nectare: vnde somniferis epulis cerebrum re-
creatur atque reficitur, suæque fundit ad vitæ usus *τὸ ἐνcephalon*.

VIGILARE INTERDIV] Somno soluto, sensus acerrimos integerrimosque habere, sensibilibus
quemque suis excipiendis: idque interdiu, quo tempore copia est *τῷ ἐνcephalon* in cerebro, ad mouen-
dum & sentiendum. Ipsa verò tum sponte sua, non minùs quàm nostra, præstò sunt negociis obeundis,
quæ absoluuntur dianctra, motu, & sensu.

CONTRARIVM AVTEM MALO FIT] Quoniam magna est è natura egressio, tum ipsius
adeo naturæ peruersio in nocturnis vigiliis & somno diurno. Non enim par est ratio diurnæ quietis at-
que nocturnæ, tam in necessario dormiendi usu, quàm in causis somniferis. Est autem contra naturam, 40
calorem cum spiritu intro cogi ad somnum diurnum; qui naturaliter horis diurnis foras excurrit, vigi-
landi causa. Quinetiam tum bilis feruescit, ac viscera incandescunt æstu caloris, in cibi vacuitate. Sci-
rum est illud Hippocratis. *Πῶς τίςιν ἀφ' ὧν καὶ ἀπὸ τῶν κατὰ τὴν φύσιν, καὶ ἀπὸ τῶν ἀκαταρκτησίων* i. Exercitatio est artium, atque
6. Epid. part. 5. *carum cibis, & somnus viscerum.* Atqui naturalis consuetudo exercendi corpus & artus, interdiu; quod
propriè est vigilare: dormiendi autem noctu, à cibo. Nam cibi & somni societas, concordia est ad salu-
tē: alterutrus autem, sine altero, maleficientia. Ergo diurni somni maleficientia est, etiam in dormien-
di necessitate illius qui vigilauit noctu: quoniam ad dormiendum interdiu, non suppetunt naturales
causæ somnifere, quas habet in promptu is cui de nocte ipsas suppeditat calidus venter cum cibo & po-
tu. Sic ventres hyeme, natura sunt calidissimi, & somni longissimi; amborum naturali quadam syntri-
moria. Vbi Galenus longinquitatem somni nocturni statuit in longa nocte hyberna.

SED TAMEN IS MINIMVM OFFENDETVR DORMIENDO AD TERTIAM 50
PARTEM DIEI] i. Quod si contentio animi, fortisve cura, aut sæua quædam molestia somnum ad-
emerit; nec placidam membris dederit noctu quietem; & iam exacta nocte, vel mentis tranquillitas,
vel ipsa doloris leuatio, aut febris remissio, albescente iam die, partem aliquam diurnæ quietis imper-
triat, loco nocturnæ; minimùm offenderetur, minimùmque in commoda sua peccabit, si beneficio somni
fruat, donec dormiendo exegerit tertiam partem diei quæ est horarum quatuor lucis diurnæ, ab ho-
ra sexta matutina vsque ad decimam. Hæc enim pars diei qui absoluitur horis duodecim, præ se fert a-
nalogiam veris; quo tempore somni sunt longi: quemadmodum meridiana, æstatis; & vespertina, au-
tumni. Ac sanè illis diei partibus, humorum dominatu homines pro se quisque tenentur; manè quid-
em, sanguinis; meridie, bilis; vesperti autem, nigri humoris. Nam tenebrarum est pituita. Sic in hu-
moribus animalium, mutua quædam inest mouendi & quiescendi vicissitudo. Hinc veniunt paroxysmi 60
aporborum. Quoniam autem prima diei parte, sanguis in motu est, nec dum etiam lucistatus est splen-
dor, tantæque, ut sic dicam, fulgetra, ut ad se magna vi rapiat calorem & spiritum: propterea leuis offen-
sio est, si tum intus maneat & intro cogatur, cum sanguine gratioso qui somnum suauem conciliet. Ut
maiori beneficio sit apponendum in necessario somni usu, matutinis horis dormire, quàm maleficio,
sanguinem & calorem, contra naturæ consuetudinem, deuerso ad viscera cursum retere. Est illud quid-
dem possi-

dem positum in more institutōque naturæ, ut si quis expletus somno eoque solutus, ipsum denuo manē instaret, dormiāque ad multam lucem; ea profectō incommoda experiatur quæ à diurno diurno-
noque somno importari scripsit præceptor his verbis. *Ut fortis vigilia, crudelitatem parit potionis & cibi: sic* lib. 2. acut.
diurnior somnus & artior digestio tō σῶμα, καὶ ἐφθόνηται, καὶ κατὰ τὰς ἀρτίων ἐμπύεται. i. corpus resoluit, elixat, capitis
grauitatem parit. Sed ramen peccatur granius vigilando in cruditate, quàm dormiendo interdiu. Quæ
res adduxit Hippocratem, ut somnum diurnum, tanquam nocturnum, iis præscripserit ineundum qui
contra consuetudinem se prandij epulis innitarunt. ibid.

QVA EXACTA, SOMNI OMNES INDE PEIORES] Sunt quidem peiores & gra-
niores quàm marutini; vel, ut verbo absoluam, omnino mali sunt meridiani & vespertini somni: quia
10 rum clanguescit corpus velut elixum atque turgidulum simul cum capitis granitare: ob eam sanè cau-
sam, quod calor & spiritus, inuita luce, abripiantur intrò, ubi cum visceribus incandescunt æstu: cui
quidem malo, grauius illud adiicitur quod subest intus à bile coacta, vel à nigro humore. Ut verè videar
illud dicturus de somno meridiano & vespertino, quod scripsit Virgilius de autumno pestifero,

Corruptique lacus, infecit pabula tabo.

Est enim mira vis corrumpendi & inficiendi corpora, humores & spiritus, in somno diurno.

17 Κάκιστον δὲ μὴ καθύπνου μὴτε ἡμέρας, μὴτε νυκτός. ἢ γὰρ ὑπὸ
20 ὀδύνης τε καὶ πόνου ἀγρυπνοῖν αἰ, ἢ ὡρα φρονήσας ἀπὸ τούτων τῶν σημείων.

*Pestiferum autem est non dormire nec interdiu, nec noctu. Aut enim
à dolore atque labore sic vigilauerit, aut, de hoc signo, sua non erit
mentis.*

QVEMADMODVM vita hominum, vigilando & dormiendo ad vltimum vsque diem inoffenso
cursu exigitur: sic magna vitæ offensio esse solet, quando vigiliarum & somni vicissitudo nulla est in
30 morbis acutis. Ut igitur nihil æquè facit ad salutem & nihil apparet in morbis acutis, atque somni be-
nignitas, & vigiliarum vicissitudo: sic vigiliarum aut somni vacuitas pessimè, si quid aliud, habet ægro-
tum. Ac somni assidui non ita pridem incommoda sunt adducta. Sed vigilandi assiduitas ut signo &
causa medicum exterreter metu, in hac prognosi docetur his verbis.

PESTIFERVM AVTÈM EST] Græcè est κάκιστον, i. *pessimum*, quod scilicet maleficientia cæ-
teris omnibus antecellit, nec cæterorum signorum bonitate vinci se patitur, neque adducitur ad bene
merendum; [nisi dum instat crisis: propterea quæ illud κάκιστον, vertendum duxi *pestiferum*: quoniam
illa somni vacuitas non rarò mihi visa est mortiferè ipsos habere quorum signa cætera videbantur ἀμ-
φιδέα.

NON DORMIRE NOCTV, NEC INTERDIV] i. Nullam partem neque nocturnæ,
40 neque diurnæ quietis habere, nec posse oculis aut pectore noctem accipere in summa dormiendi ne-
cessitate.

AVT ENIM A DOLORE] Ut nulla sit curarum & studiorum excusatio quæ adimant mem-
bris quietem in morbis acutis: sed ipse dolor in causa sit cur somnus iniri non possit: quoniam in do-
loris cruciatu fiat acrior phantasia, unde omnia sensoria excitantur ad vigilandum, denegata ipsis quiete.

ATQVE LABORE SIC VIGILAVERIT] Occupata natura causis morbificis acutorum
morborum qui perpetuam habent ὀδύνην, virēsque acquirunt eundo, remissionis expertes. Inde v-
trumque genus alysmi, cum intemperie sicca & calida cerebri, tetròque vapore somnifero, sine vlla
tranquillitate mentis. Nam vapor ille fumidus, non est conciliando somno idoneus: sed potius excu-
tiendo. Itaque sic à labore vigilat qui dormire non potest. Cernitur autem labor in perturbatione, in-
temperie, & fumido illo vapore qui certè vigiliarum feracior esse solet quàm somni.

19 AVT, DE HOC SIGNO, SVÆ NON ERIT MENTIS] Nam perturbati animi fa-
cilis transitus est ad ipsam phrenitidem, quam facilè concipit cerebrum siccum & calidum: sicut in-
fertur facilè ab anathymias tetra & effera. Positis autem magnis his tribus, ut oriunda quoque sint
magna, necesse est. proth. 4.
lib. 1.

TRACTATVS SECVNDVS,

DE TRŌMATIS.

AC PRIMVM DE PERTVSIONIBVS CAPITIS.

CAP. I.



ΚΟΣΟΙΣΙ κρόταφθ τέμνεται· απασιμὸς ἐν τῇ
 ἐν αὐτῶν τῆς τρυφῆς ἐπιγίνεται.

10

I. Quibuscunque tempora praciduntur; convulsio incidit è diverso partis pracise.

FUIT ILLVD institutum præceptoris in eo libello quem aureis dignum literis accuratè scripsit, ad lauream, de capitis pertusionibus siue trōmatis; primum naturam explicare capitis pertundendi, ac demonstrare; quòd hominum capita, similiter non sunt affecta nec constituta siue coagmentata: vt ex perspicuentia singularum capitis partium, in suo cuiusque temperamento, complexione, connexionē, & situ; omnium pertusarum dignotio, præuisio, atque curatio cuique propria compareretur in specie & idea. Sunt enim alia, specie & idea, suturarum trōmata, quàm cæterorum capitis ossium. Sunt item alia temporum, alia frontis, alia syncipitis, alia quoque occipitis. Atque inter ipsa, vt magna est dissimilitudo: sic etiam magna in singulis; vt scilicet propius longiusve absunt à sua quæque futura. Ergo nec eadem, nec similia, nec æqualia sunt ossis cuiusque trōmata, quæ vel pari ictu, ictuue pari aut lapsu inferuntur, secando, findendo, collidendo, & effringendo: quia non idem est τὸ βλάπτειν cuilibet trōmati pariter atque similiter excipiendo. Non enim secari potest futura telo, quātumlibet exacuto, quin ei sectioni adiuncta sit comes fissura, proptereaque contusio. Nam quicquid finditur, idem vnà contunditur. Ex quo euenit vt sauciatus homo in pari periculo sit corrupti ossis à cōtusione, atque humoris qui ad membranam descendit, exitum verò non habet. Ergo magna vis est τὸ βλάπτειν ad ineundam τέχνην cognoscendi, præuidendi, atque curandi. Sic puerorum ossa, eiusmodi sunt temperamento, vt pertusa putrescant facilius quàm iuuenum atque hominum constantis ætatis. Sic etiam synciput sauciatum, periculosius habet ægrum, quàm occiput: idque tam osse corrupto, quàm humore qui ad membranam descendit, eamque irritat, & inflammationes mouet lethales. Vt igitur ossa tenuiora, minùs resistunt ictui mitiori, quàm crassiora validiori: sic eorum fracturæ, facilius & celerius mortem inferunt, quàm crassiorum. Est quidem fatalis ad interitum, vtraque causa interitus, fractura syncipitis, pari specie & idea, quæ in occipite curationem recipit. Tum si moriendum sit ægro ab omni parte capitis fissa, incisa, contusa, effracta; vitam is finiet die septimo, cui læsum est synciput: qui cam protrahet ad decimum-quartum, fronte pertusa: sicut idem ad vigesimum, occipite violato.

20

30

40

Connexionis autem varietas & suturarum positus, magno Hippocrati mentis errorem non attulit in iudicanda τῇ λόγῳ fractura, ex ictu & telo: tum ex iis signis quæ non nisi osse fracto eueniunt. Sunt autem; oculos caligare, obmutescere, soporari, concidere, bilem vomere; tum sanguinem per nares aut rēve exire. At certè sensum ipsius decepit in exploranda τῇ ἔργῳ. Inde cauit sedulo ne quis deinceps eadem ratione deciperetur, qua ipse fuit deceptus. Sic enim statuit de suturarum positu, ex capitis proiectura vtraque; antica, postica; vel neutra, vel altera: vt facillimum sit iudicare cuius ipso specillo, quod explorandi causa demittitur; sitne fractura, an verò futura vbi asperitas ossis percipitur, quod natura est læue ac perpolitum, ὁμαλὴν Græci vocant. Est autem futura omnis, rimosa & aspera: proptereaque sensum & mentem fallit similitudo eius cum rima, quando incisa finditur, vnàque contunditur. Ac sensum quidem, in artificio explorandi, visu & tactu. Ipsam verò mentem in iis quæ tantum ratione nituntur. Sunt enim signa fracti ossis prædicta, æquè sectionis atque fissuræ. Vt admirabile sit præceptoris iudicium, quod ille non ἔργῳ, nec λόγῳ etiam de signis & causis morbificis comparauit: sed tantum ex proprietate partis ipsius secando contusæ. Nec verò futuræ modiolum admouendum suasit, quo excidatur os ipsum quod suo circumactu complectitur, vt vacuetur humor qui ad membranam descendit, aliterque inde non exit: periculosum enim propter inflammationem & cerebri concussionem; vnde non rarò humi procumbunt apoplectici, qui ea parte secantur. In vicino id faciendum præcepit, ne sauciatus pereat qui curationem admittit. Omnis enim pertusio non insanabilis, euadit mortifera vel osse corrupto, vel inflammata meninge. Inflammationem arcet vacuatus humor osse exciso primis diebus, nec ultra triduum; præsertim æstate. Ossium verò quæ vel pertuendo denudantur, vel ope chirurgica; sic comparata est ratio, vt nullum ferant liquorem, vnde corruptio in metu est: ne vinum quidem vlcibus valde propicium; quòd eius complexione liquida grauius offendantur, quàm temperamento sicco iuuentur. Tum in caluaria, sic nata sunt ossa, vt qua eorum parte est diploë, inflammatio & empyema locum inueniat, omniàque carnis ipsius mala suscipiant. Sed tamen inter ipsa hoc interest, quòd cætera quidem omnia, inflammationem suscipiant à rheumate consistente; nulla verò à rheumate concitato quod sola frons excipit, & inflammatione tentatur. Hæc enim sola omnium continetur propagatione,

50

60

gatione, production vasorum, & firu. Ac proinde huic soli lenientia sunt in usu, non repellentia, dum in metu est inflammatio: quo tandem sublato, lenientibus abstinendum, privilegio nudati ossis ferramento aut telo. In cæteris, dum rheuma consistens adest, à ferramento quod secuit carnem, amplificandi causa vlceris, vel ossis nudandi, cataplasma superponitur ex farina hordei torrefacti, exacte cocta in oxymelice. Reliquum curationis tempus exigendum siccando & detergendo puluisculis quos inde vocant cephalicos. Et quoniam sectio ipsa modiolò viam munit, qui principatum obtinet in curatio: tum autem ad alia quoque necessaria est, quæ faciendæ sunt necessariò ad bene conuenienterque curandum.

Hic prima quaestio est de ferramenti usu; locòne omnibus adhibetur caluariz capitis partibus: vt iure adhibendum suadet ipsa trømaris insiditi conditio. Ac super ea quaestione, hæc visa est præceptorum ratio iudicandi, quam posuit in hac prognosi. Est igitur cardo libri de capitis pertusionibus. Quòd hominum capita similiter non sunt affecta *χρ. τωτε*, i. eadem compagine quæ *ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ οὐκ ἐν τῇ σπονδύλῳ*, i. temperamento & complexionē consistit: nec verò futuræ omnium eodem sunt loco; vnde varia est capitis conformatio. Arque illa propositio *τὸ κεφάλαιον* planè continet *ἀσθενήσας, ἀσθενήσας, καὶ ἀσθενήσας*.

QVIBVS CVNQVE TEMPORA PRÆCIDVNTVR] Quod est cuiusmodi ac si diceret: Partium dissimilitudo inter se, non eandem omnium curationem admittit: propterea non vbiuis partium, sectioni est locus, quoties eam iure trøma ipsum requirit. Vt enim excidendi causa ossis pertusi, vel in conspectum adducendi; quantum ipsius læsum est, tutò aperitur cutis & caro, vbiunque telum infuderit: tamen ea sectio inter musculos qui tempora continent, merum adfert eorum symptomatum quæ proferentur mox.

Ergo. QVIBVS CVNQVE] Omnis naturæ, sexus, ætatis: vt catholicum sit quod docetur.

TEMPORA] i. Musculi temporales qui tempora ipsa continent, quæ ossium tenuitate, vasorum amplitudine, subiacentis cerebri vbertate, neruorum & musculorum virtute, grauissimis malis obiecta sunt, tam intrà, quàm extrinsecus, præter cæteras partes capitis & caluariz. Ibi enim crudelissima est cephalalgia. Ibi facillima omnium cerebri sympathia. Hic mitiori ictui non tam resistitur, quàm alibi telo ingenti quod validæ vires contorquent. Hic trøma est insanabile, cuius quidem alibi sperabilis foret sanatio. Denique nulla sunt grauiora mala quàm quæ temporibus à trømate inferuntur. Nam de anatomicæ temporum suprà iam diximus.

PRÆCIDVNTVR] Ferramento chirurgi, vel inimico telo. Ac ferramento quidem, vt læsum os in conspectu sit, quòd latebat: tum vt excisæ cutis angustia, latius aperiatur. Quod etiam sinuoso vlceri, rotundo atque prætumido faciendum: idque audacter vbiuis partium fauciarum capitis: non tamen in musculis quæ tempora continent. Illic enim sectio merum adfert symptomatis quod ponitur in hac prognosi, aliorumque quæ mox dicentur. Est autem.

CONVULSIO] i. Iniussa collectio musculorum, maxillam huc illuc mouentium, quæ *ἀνύπας* conuulsio est: quia non fit imperio causæ conuulsivæ quam induit pars conuulsa, videlicet tensionis ob vacuitatem vel nimiam abundantiam: sed insita quadam mouendi potentia partis collectæ, non quidem iniussæ, sed tamen iniussæ: quoniam sua sponte illæsa mouetur, non nostra, vt olim. Firmissima enim securitas est, quòd, vt iam dixi aliàs, ea conditio est naturaliter insita musculorum congenerum vel antagonistarum qui ex æquo certant magnitudine, virtute & numero; vt si alterutrà laxentur, sinistra aut dextrà; è diuerso iniussi, & nobis inuitis, colligantur. Ea collectio quæ firmiter fixa est atque immota, maxillam prohibet omni officio. Præcisio autem partis, contractionem adfert, non quidem articuli quem mouebat, cui non præest ampliùs, ab eo excisæ: sed ipsius netui & musculi qui proximè abest à cerebro. Hinc veniunt læua magis & citæ mortis funestiora mala, quàm quæ luxatà maxillà, ex oris hiatus accideret Hippocrates, ob temporalis musculi tensionem, quæ inflammationem, ex eo cruciati doloris conceptam, cerebro vicino impertit: vnde ipsum dementiæ merum adfert à febre assidua. Tum inde nascitur fera bilis; ipsa quæ adeo tenera & recens pressa cum adipe caro liquitur: quod certe liquamen cum bile prorepat ad eam partem quæ, societate cum cerebro, cæteris antecellit. Est autem stomachus *νευροδύστης*, propterea quæ sensus acerrimi. Ex quo euenit, vt merè biliosis & paucis soleat ferri alius: & si vomitio fortè cietur, merum est quod euomitur. Tales vitam finiunt ad circiter decimum morbi diem. Quæ cum ita sint à tensione musculorum crotaphitarum; quidni eorum præcisio, neruique ipsius, cerebrum contingentis, & sua contractione dolorifica, & inflammatione oborta, maiorem in cerebro febrem accendet, quæ consecutionem adferat symptomatum grauiorum, quàm ipsa tensio inferre solet? Nam si ea veniunt alteratis musculis vel distentis, vt visum est præceptorum; quæ maior tensio esse potest, vel acrior alteratio, quàm ea quæ nobilissimi omnium, fortissimi que musculi sectione infertur, proximè ipsum cerebrum & meningem?

Sed conuulsionem è diuerso partis præcisæ, ideo scribit accidere: quoniam eò peruersio est maxillæ, à musculorum ipsam mouentium, iniussa quidem nobis, non tamen inuita sibi collectione, conuulsivæ omni causa vacantium. Sed præcisorum contractio est, cerebrum versus, tum læsione ipsa, tum societate & vicinia principatus æquè afflictæ & inflammari. Est enim principatum & subiectarum partium, imprimisque vicinarum & sociarum, facillima omnium sympathia & syntimoria. Nam mutuò se afficiunt, mutuàsque tradunt operas in ægri perniciem, vt suprà ostendimus.

Ex quibus efficitur verum esse, quòd hominum capita similiter non sunt affecta *χρ. τωτε*, i. eorum quæ ossa constituunt, & quæ ipsa continent pari & simili complexionē: vt si ferramento sit opus ad secandum, vel ossis, quòd læsum est & in occulto latet, nudandi causa, quò in conspectu sit; vel curim & carnem latius aperiendi, securus periculi, tutò id faciat medicus in omni caluariz, quòd in temporibus tentare non auit.

2 Οσοισιν αὐτὸ ἐγκέφαλος σφαιρὴ καὶ πονέσῃ πληγῇσιν, ἢ ἄλλως πίπῃσι· ὥρα χεῖμα ἄφωνοι γίνονται, καὶ ὅτε ὁρῶσιν, ὅτε ἀκούοισι, καὶ τὰ πολλὰ θνήσκουσι.

Quibus concussum est cerebrum, doluitque percussis aut lapsis; continuo non vident, nec audiunt, ac ferè moriuntur.

UT OSSIVM capitis inter se dissimilitudo καὶ τῶν in iis quæ ipsa constituunt & in iis quæ continent atque connectunt, sanationis viam illi demum præmonstrat qui tenet eorū notitiam, nec ipsum aberrare sinit à scopo: sic leges prudentiæ ipsi præscribit in opere faciundo, quod cætera quæ adhibentur, virtute curandi præcedit. Est autem ratio excidendi ossis modiolus siue serra rotunda, quæ tantum ossis adimit, quantum circumactu suo complectitur, vacuandi causâ humorem qui ad membranam destillat; exitum verò non habet nisi per illud foramen quod fecit modiolus: quod nisi esset, funesta inflammatione, membrana & cerebrum occuparentur. Ex quo evenit ut ampliores fracturæ, minùs periculose sint quàm exiles atque minùs angustæ: tum quia subitò in conspectu sunt, nec accuratam requirunt industriam medici anquirendo, unde non rarò fallitur: tum quia hîc non est operæ præcium excidendi modiolus quod in minutulis esse solet, non absque salutis periculo, si is qui ferram adhibet, secandi non sit petitus. Quale autem periculum sit in promptu; hoc loco docetur his verbis.

QVIBVS CONCVSSVM EST CEREBRVM] Percusso capite, graui telo atque obruso quod validæ vires contorserint; vel etiam læso capite quod præcipiti lapsu in saxum ex alto conciderit: vel etiam si excidentis modioli repentino & graui appulsu cerebrum opprimatur ab imperito chirurgo qui continenter circumagendi finem non fecit, donec ipse modiolus apprimendo, repente violentèrque ad membranam cerebri penetrarit. Hoc enim pertinet ad cerebri concussionem quam ipsa facit violenta oppressio: sicut & cæterorum casuum qui cerebrum ipsum commonent, quod Galli vocant *esbranler* & *choquer*. Non enim concutitur cerebrum nisi lapsu, inimico telo, aut ferramento chirurgi, perperam & inconsideratè secantis: nec alia est ratio concutiendi extrinsecus, unde mala veniant quæ ponuntur in hac prognosi. Nam ea concussio quæ infertur manibus capite apprehenso, nihil habet eiusmodi, nec cerebrum concutit, aliditque caluaria: nisi fortè id priscam amiserit vbertatem quæ totam caluariam occupabat. Talis concussio locum habet in exploranda puris copia; quod empyema pulmonis in thoracem effudit. Ergo in cerebri vbertate nulla est eius ad galeam suam allisio, dum ipsa manibus apprehensa concutitur. Sed alia cerebri concussio est ab iis quæ intrâ sunt & intus lædunt, ut cæterarum partium quæ communi officio dicatæ sunt atque quodammodo consecratæ, quibus id studium est concutiendi pro se cuique, ut ea excutiant à quibus læduntur. Pertinet enim ad cerebri concussionem sternutatio: thoracis atque pulmonum, tussis: ventriculi autem, singultus. Atque illa concussio, vitæ naturæ est proritatæ, si concutiendo excutiat quod sibi molestum est. Sin autem naturæ potens est causa morbifica quæ intus lædit, exempli causa, in cerebro, concussionis irritæ symptoma erit conuulsio epileptica, quam mox excipiet apoplexia. Sed satis iam de concussione, cuius hîc nomen improprie video usurpari pro cerebri contusione quæ semper est symptomatica: ut vera concussio cerebri, est quidem eius proritati, sed tamen potentis molestiæ proritantis. Ac sanè illa contusio cerebri, contusi capitis non semper est socia neque comes: multum enim refert, sitne contusum caput, an cerebrum; ut partes illæ multum inter se differunt. Nec verò liber ille Hippocratis quo pertusi capitis causæ omnes, signa, differentiæ continentur, vllam proponit pertusionem cerebri, sanationis ergo: ut in pertuso capite. Est enim funesta omnis pertusio cerebri, nec vllam requirit industriam medici. Atque ut paucis dicam quid inter capitis & cerebri læsiones intersit: est quidem cephalalgia, capitis; catocche ac delirium, cerebri; tremor autem, neruorum principij. Ergo non quoties caput contunditur, vnâ etiam cerebri contusio est, quin ea veniant mala quæ hîc ponuntur. Sunt autem in promptu, parèntque omnibus ad visendum, quoties fortis percussio est, aut lapsus ex alto ad perpendiculum, vel etiam temeritate chirurgi modiolus magna vi apprimatur cerebro, ipsumque contundit.

DOLUIT QVE] Græcum illud, πονέσῃ, sensionem ostendit concussionis quæ potens est cerebri, multum propterea in officio laborantis, vel potius eo carentis: idque ad tempus, vel in perpetuum; ut causæ morbificæ, & offensionis est magnitudo. Id ipsum declarant quæ sequuntur.

PERCVSSIS] Fortiter telo graui desuper ad perpendiculum, siue κατ' ἕξιν de industria: tum ea parte capitis quæ faciliè perundatur.

AUT LAP SIS] Casu vel iactu, qui vel ex alto rectâ ceciderunt in caput ad saxum, vel qui pari iactu in caput; similiter ut Pyrrhus & Æschylus conciderunt.

CONTINVO] Ad punctum temporis: non ut in corde auulso, quod etsi principium est vitæ: tamen principatum non habet sensus & motus, ut cerebrum. Itaque contuso cerebro, cessat continuò animalitas; quæ auulso corde, aliquantisper manet.

VOCE CAPTI] Græcè est ἀφώνι: quorum ἀφασία, i. vocis amissio venit δὲ τῷ ἐκλυσι τῆς φωνῆς καὶ μὴν φωνῆς, i. exoluta omni virtute neruorum & musculorum vocalium, partim mouctum in thorace, ad ἀφύπνῃσιν, i. ad efflationem: partim modulantium in larynge & epiglottide. Sunt quidem aliæ causæ πρὸς ἀφασίαν,

αἰσῆς, alibi iam explicata, de quibus nihil appositè ad hunc locum. Quæ autem propria est huius loci, eò certè fuit, quòd ibi, collapsio imperio voluntaris à cerebri cōcussione, mors & sensus vacatio est, inopia τῆς ἀποφύσεως, quæ non mittuntur ampliùs, vt solebant: sed retrahuntur ad cerebrum, vbi conclusa manent, atque non raro pereunt. Est enim cerebrum, sedes ac domicilium voluntaris καὶ ὁρμηλὴ καὶ χυμώδης, i. ab instinctu & electione, cui morem gerunt καὶ ἀποφύσκει, mouendo & sentiendo.

NON VIDENT] Sensu amisso, cum vitio τῆς αἰσθητικῆς, i. sensorij. Ac sensus quidem amittitur, collapsa parte illa cerebri vnde videndi vis manat: tum etiam visifico spiritum intercluso. In vitio est ipsum sensorium, turbato nitore omnium membranarum, imprimisque autem pupillæ, & conspurcato splendore trium humorum, maximè verò crystallini, & lumine oculorum proprio caliginoso. Ex quibus efficitur vt ipsa τὰ ὁρατά, i. sensilia quæ sunt aspectabilia, neque à sensorio excipiantur, neque à sensu videndi percipiantur.

NEC AUDIUNT] Quoniam ab eadem causa obsurdescunt, qua occæcantur. Est autem auditus priuatio, non impedito quidem appulsu τῆς ἀκουστῆς, i. audibilium: sed non excepto, culpa auditorij, quod est insitus aër, nunc impurus & crassus; neque percepto ab audiendi sensu: ob vitium partis illius pertusæ, vbi est ipsa facultas atque potentia audiendi.

AC FERE MORIUNTUR] Si quod subsidit cerebrum, à concussione non statim confurgat. Tum enim transitus est de aphonia in apnoeam quæ est priuatio spirationis, vnde vitalis caloris suffocatio est atque extinctio, proptereaque mors ipsa. Nec verò spirandi necessitas, neruorum vim excitat ad functionem spirabilem: quoniam pariter illi sunt exoluti cum cerebro: tum spiritus animalis omnino exitu prohibetur, cuius vberras exhausta est, vt nihil reliquiarum supersit. Itaque omni animalitate collapsa in virtute, facultate, & spiritu; moritur apoplecticus, cui concussum cerebrum ita subsidit, vt non inde confurgat. Nam si confurgeret; maneret sperabilis vitæ salus: & homo voce captus, occæcatus & surdus ad se rediret. Hæc autem scripta sunt περὶ τῆς αἰαχῆς, apud Hippocratem.

lib. 1. τῆς
ἀφροδ.

3 Οἷον ὁ ἐγκέφαλος ὑπερώσκειται· πυρετὸς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, καὶ χολῆς ἐμετ· ἐπιγίνεται, καὶ ἀποπληξὶς σώματος καὶ ὀλέθριοι τοῖς τοις.

30 Quibus cerebrum vulneratur; iis vt plurimum febris, & bilis vomitio incidit, & corporis apoplexia: tales autem sunt desperati.

SUPERIORE prognosi argumenta sunt αἰαχῆα, i. necessaria cerebri concussi, videlicet vocis amissio, cæcitas atque surditas: ἐνδίασεν verò, i. posita in incerto, cum scilicet proposito metu, & in spe angusta, nondum tamen ad vltima ventum est. Vt enim cerebrum ictu lapsuue concussum, mox eò confurgit vnde subsidit, aut manet collapsum: ita vocem recipit saucius quam ex eo casu amiserat, aut in perpetuum voce captus iacebit. Quæ ratio præceptorem adduxit vt scripserit. AC FERE MORIUNTUR. Vt igitur signa illa sunt διαγνωστικὰ αἰαχῆα: sic è diuerso, προγνωστικὰ ἐνδίασεν. Hic autem contrà, ponuntur ea quæ sunt καὶ διαγνωστικὰ ad id de quo dicuntur ἐνδίασεν, nec semper ἐπιγόμενα· καὶ δὲ προγνωστικὰ, αἰαχῆα. Nam vulnerato cerebro, nec semper, nec solius vulneris propria sunt, neque ἀρώεσα, bilis vomitio, febris, & corporis apoplexia, quæ cæterarum etiam pertusionum capitis communia sunt. At quoties ea cerebro vulnerato inciderint, desperationem salutis ostendunt. Sic enim præceptor ait. ΤΑΛΕΣ ΑΥΤΕΜ ΣΥΝΤΕΣ ΔΕΣΠΕΡΑΤΙ. Prognoscens autem veritas ostendetur in eius examine quod sic aggredimur.

QVIBVS CEREBRVM VVNERATUR] Hic verbum ὑπερώσκειται, non eam ponit διαγνωστικὴν quæ sic expressa legitur à Galeno in aphorismis. Διακοπὴ ἐστὶν ἡ μεγάλη πρὸς τοὺς καὶ μικροὺς βλάτους, i. prægrandis scilicet vulneratio ad fundum vsque. Et. Τα διακομμένα, ἐς τὸ πέρας ἔχοντα διήκουσαν τὴν διάρρησιν. i. Dissecta sunt ea quorum diuisio ad extremum perducta est. Hic enim veritas lucet illius sententiæ. Quibuscumque dissectum est cerebrum; his necessariò febris superuenit, & bilis vomitio. Hæc epim cerebro inflammato superueniunt, vt mox dicitur. Inflammatio autem vitari non potest, cum secundo ventum est ad extrema. Nec solùm illa duo symptomata, dissecti cerebri sunt ἐπιγόμενα: sed illud etiam de quo ita scripsit præceptor. Αποπληξίαι δὲ τῶν καὶ ἐγκέφαλον πρὸς τὴν. i. Moritur autem si cui cerebrum sit præcisum. Quò spectat etiam Galeni distinctio ad illam sententiam præceptoris, vbi docemur vesica dissecta, aut cerebro, aut corde, aut diaphragmate; moriendum esse. Est autem Galeni iudicium; quòd neque omnis vulneratio, neque omnium quæ illic narrantur partium, est citæ mortis funestæ, ne cerebri quidem; nisi prægrandis, quam ipse διακοπὴ nominauit. Quæ ratio me adduxit vt posita hic cerebri vulneratio siue πρὸς τοὺς, non eò perducta esse videatur, quòd ipsa διακοπὴ. Nam in diacope, necessaria est bilis vomitio, atque febris; vt scriptum est in aphorismis. Quæ duo symptomata, non ἐξ αἰτίας: verùm ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, i. vt plurimum scribit accidere in hac prognosi. Ergo non est prorsus, nec semper eadem, quæ scripta est πρὸς τοὺς in hac prognosi, & illa quæ legitur in aphorismis διακοπὴ. Ex quo efficitur, quòd bilis vomitio atque febris, non sunt αἰαχῆα διαγνωστικὰ cerebri vulnerati. Quamobrem. QVIBVS CEREBRVM VVNERATUR] Similiter vt caluaria, in qua reli acuti sedes apparet, qua parte infederit. Vulneratur autem, diuisa vtraque meninge ictu valido reli acuti: nec vlla suspicio est fissuræ, cōtusionis, nec effracturæ; nisi telum fortassis illapsum

est in futuram, ubi sedes ipsa vel *ἑσρα*, perpetuò coniunctam habet fissuram, & vnà cōtusionem. Verùm hīc proponuntur symptōmata cerebri solo vulnere sauciati, vt suprà, concussi atque concussi. Nam *πρωτῆς* caluariz qua exhibetur sedes & *ἑσρα*, tantum sub stillo in membranam periculosa est; nec aliud quippiam ei periculo adicitur, præter ipsius carnis vnà diuisā corruptionem, si quid peccatum est ab imperito chirurgō, vel etiam cœli morbo. Sed illa vtriusque membranæ *διμενῆ*, sine qua cerebrum vulnerari nequit, symptōmatis fœta est longè grauissimis quæ infrā ponentur. Hīc loco dicendum de iis quæ vulnerato cerebro tribuuntur. Eorum quædam reapse videntur *ἀμφιδόξα* membranæ dissectæ & cerebri vulnerati. Sunt autem, bilis vomitio atque febris. Alia verò, cerebri quouis modo grauiter sauciati; quæ tamen hīc propria esse dicuntur cerebri vulnerati. Ex iis in promptu est illud quod vnicum posuit, nempe ipsa corporis apoplexia. Dicendum de singulis in suo cuiusque examine, quod sic instituiamus.

VT PLVRIMUM] Ergo non semper, nec solū à cerebro vulnerato: nam & dissecta membrana eueniunt; idque continuò, per sympathiam quæ cum ventriculo intercedit, in vomitu: non autem per *ἑπὶ χυμῶν*, oborta febre ab inflammatione. Sed tamen ea fuit opinio præceptoris, vt necessariò eueniant illa symptōmata, quæ sunt *ἀρχαῖα* signa cerebri vulnerati. Sic enim scripsit in aphorismis. *Ανάγκη πυρετὸν καὶ χολῆς ἔμμενιν ἐπὶ πνεύματι*. i. Neesse est dissecto cerebro, febrem & bilis vomitum superuenire. Sed eam *ἐγκοπὴν* non expressit in primo de morbis cū ait. *Ἡ δὲ πρῶτη, πυρετὸν πὶ ἐπὶ χυμῶν, καὶ χολῆς ἔμμενιν, καὶ ἀποπληκτικὸν πὶ τῇ σάματι χυμῶν, καὶ ἀπόλεσιν*. i. Sin autem secundo, cerebrum sit pertusum; neesse est febrem superuenisse, ac bilis vomitum; vnā quippiam apoplecticum fuisse, & interiisse. Nam cui cerebrum sectione pertunditur, non potis est ipsum seruari, vt mox dicitur.

FEBRIS] Non ea quidem fracturæ symptomatica, cū facta est insanabilis ex euentu, negligentia medici vel imperitia. Tum enim febris accidit; æstare quidem, septimo; hyeme autem, decimo quarto; nata ex humore qui ad membranam delapsus, vnde non exiit, lethales ibi excitat inflammationes; vel ex pertusæ carnis atque ossis corruptione. Sed alia quædam febris, pathognomonica cerebri sauciati, telō acuto: similiter vt concussi aphonia, cæcitas, atque surditas. Sic enim cerebri vtroque modo pertusi propria & necessaria statuuntur à præceptore primo de morbis, vnde adducta sunt hæc præcepta. Nascitur autem hæc febris cerebri vulnerati, similiter vt principum ceterarum, quoties inflammatur. Semper enim febris est socia inflammatae partis cuiuslibet quæ principatum habet, & cuius potētia corporis vniuersitas administratur. Atque hæc febris, tyrannidem suam exercet in corpus, vt sua virtute ipsi benignè faciebat, dum rectè valeret pars occupata. Itaque maleficientiam nunc experitur eius, cuius quidem olim beneficentia fruebatur. Sunt enim hæc febris ab inflammato cerebro maleficia.

BILIS VOMITIO INCIDIT] Est enim hoc maleficiū inter cætera febris acutæ, à cerebro inflammato, vt noua inde bilis continuè succrescat, & teneræ carnes liquantur. Tum primus omnium stomachus bilis appulsum percipit, & ichoris carnum liquefactarum: quia est *νευρωδύτης*, propterea quæ sensus acerrimi: cuius præstantia sympathiam habet cum cerebro, & syntimoriā rerū omniū fugiendarum & expetendarum. Itaque factus particeps eorum malorum quæ inferuntur ab inflammatione & febre acuta, fœturam habet symptomaticam quæ sunt ipsius propria. Sunt autem, cardialgia, bilis vomitus, singultus, & nauſea. Qualia exoriri iam vidimus, cū alteratio atque tensio musculorum qui tempora continent, inflammatione, cerebrum male habent. Sic in phreniticis annotauit præceptor. *Φρενιτικῶσι μὲν σπασμοὶ: ἀλλὰ καὶ ἰσθμὸς ἐμέτοις, καὶ παχυδακτυλίοις ποτύων*. i. Phreniticorum conuulsio est: tum aruginosa bilis vomitio, vnde quibusdam eorum cita mors venit. Ac de phrenitico cuius historia est apud Hippocratem, ita scriptum reperiō. *Ὁ φρενιτικὸς τῇ πρῶτῃ κατὰ κλινίδι, ἡμερῶν ἰσθμὸς*. i. Phreniticus quo die primum decubuit, aruginosa vomuit.

ET CORPORIS APOPLEXIA] Quæ est reapse totius corporis exolutio, animalitate omni collapsa, in priuatione sensus & motus. Sed tamen in lib. de morbis, apoplexiæ nomen contraxit ad paraplegiam, quæ est quarundam partium resolutio, vt suprà ostendimus. Sic enim ait. *Ανάγκη ἀποπληκτικὸν πὶ χυμῶν καὶ ἀπόλεσιν*. i. neesse est apoplecticum quid, mortēque ipsam aduenire. Siue autem *κρεῖως*, siue *καταχρηστικῶς* nomen sit positum apoplexiæ; certum est eam non euenire similiter vt iis qui longa iam fracti pertusione capitis, non autem primum cerebri, signa edunt mortis futuræ. Inter quæ numeratur apoplexia, sicut & conuulsio huic contraria quàm de historiis narrat è diuerso pertusi ossis accidere; vt in ancilla: quemadmodum & parte vtraque corporis, cū in propinquo mors est; vt in Autonomo. Sed vulnerati cerebri exorta continuò est apoplexia, læso neruorum principio, & intercepto spiritu qui ciet intus & foris motum & sensum. Vt igitur apoplexia verè dicta, est cita morte funesta, quam ipsa per se infert: sic paraplegia, ex euentu mortem denunciat, ob vitium insanabile cerebri vulnerati. Qualem fuisse narrat Hippocrates illam epidemicam quæ multis exitio fuit: non quidem ipsa per se, quia spirationem non adimit, vt apoplexia: sed à prægrandi frigida intemperie principatus, planè mortifera.

TALES AVTEM SVNT DESPERATI] Morbo insanabili, qui est vulnus cerebri, membrana dissecta, & amissione vitalis officij, quo vita ipsa penè ad punctum temporis carere nequit. Est autem respiratio intercepta, cum febre assidua, vnde bilis succrescit & carnes liquuntur, quæ cient crebras vomitiones, ob societatem alui cum cerebro. Quod videns Hippocrates, ita scripsit. *Ἀποθνήσκουσιν οἱ ἐν κέφαλῳ πρῶτῃ*. i. Perit is cui cerebrum est vulneratum.

4 Τῶν ρηγνυμένων τῆς κεφαλῆς ὀστέων, χαλεπώτατον γινῶναι τὰ καὶ τὰς ῥαφὰς ρηγνύμενα.

Ossium quæ finduntur in capite, difficillima est cognitio eorum fissuræ quæ adiacent ipsi suturæ.

HIC SANE ponitur operæ precium medici quod maximum esse possit ἔργον καὶ λόγος ipsius, in quaerenda, inuenienda, & iudicanda specie & idea illius fracturæ, quæ ut minima est amplitudine: sic abundat symptomatis atque signis unde ipsa mors venit. Est autem, fissura quæ vel in suturam incidit, vel proxime ipsam suturam. Eius inuentio difficillima, difficultatem adfert curandi: nisi forte serò inuenta, ipse adimat curationis. Est autem inuentio difficillima ἔργον καὶ λόγος, i. experientia & iudicio. Quæ duo sunt inueniendi iudicandique propria instrumenta. Omnis enim cognitio atque scientia comparatur 10 duce iudicio & comite experientia. Sed experientia quæ huc aduocatur τὸ ἔργον, incerta est atque fallax: quoniam simillima est rimæ suturæ, & rima suturæ. Sunt enim αἱ ραφαὶ ῥαγμοειδές, inquit præceptor, i. suturæ speciem gerunt fissurarum. Ex quo euenit, ut percepta specillo asperitas, ubi sutura est, nec sedis, nec fissuræ vllum iudicio adferat documentum, sicut adferre solet cum alibi quàm in sutura percipitur ossis asperitas. Nec visu etiam, vel oculorum acie, secando, abradendo, fissuræ idea & species è sutura emerget. Non etiam atramentum quod explorandi causa immittitur, firmiter fixa nigricies quæ abradendo non tollitur, fissuram ostendit: quoniam æquè sutura, nigriciem continet, atque fissura.

Iudicium verò laborat & fallitur in diorismo signorum quæ non nisi osse fracto eueniunt, si forte acutissimum telum suturam in longum secuerit, ibique vestigium sui & sedem posuerit, ἑώρα καὶ δῆλον 20 πῶς vocat Hippocrates. Nam cum ea sectio ipsius suturæ, perpetuò habeat coniunctam fissuram, propterea quæ contusionem: signa syllogistica fracti ossis quæ nuper attulimus, æquo iure pertineant ad ipsam diacopen & ad fissuram, si nulla cerebri læsio sit à diacope, nec duræ membranæ. Tum sedis ideâ si forte percipitur, in occulto latebit ea quæ est ipsius fissuræ: quamuis eodem ictu parique simul incidat cum reli vestigio, quod tam longè patet, quàm fuit reli sedes. Secus est de fissura quæ longius solet excurrere, quàm ubi telum insederit. Quinetiam non minori periculo locus est ab ossis corruptione quam infert occulta contusio, fissuræ comes; quàm ab humore qui, osse diuiso, ad membranam descendit, unde non exit; propterea quæ cunctando & putrescendo, inflammationes illic mouet grauissimas atque funestas. Quæ cum ita sint, tempus est examini aggredi huius prognoses quæ mouet fissuræ.

OS SIVM] Syncipitis, frontis, occipitis, quæ sunt duplicia, diploë intertexta: quorum exterior superficies adiacet pericranio, capillata cute obiecto: interior verò meningi, quæ omnium membrana- 30 rum est parens atque origo. Vtraque autem læuis & perpolita, quæ τὸν ὁμολογεῖται exhibet veterum Pythagoreorum qui superficiem cuiusque corporis, ἁλίστα vocabant. Itaque tota caluaria ex illis contexta ossibus, quæ per medium caput excurrit, i. inter vtramque membranam, nulla sui parte in superficie percipitur aspera, cum rectè habet, nisi ad suturas quæ ossa connectunt.

Arist. lib. de sensu.

QUÆ FINDUNTUR] Obtruso telo & graui, quod validæ vires in caput contorserint, aut lapsu ex alto, unde finditur os contusum. Nam quicquid finditur, idem contunditur. Ac sanè contusio quidem cernitur in depressa planicie: fissura autem in rima quæ longius excurrit quàm ubi telum insederit. Itaque fissura omnis illud periculo contusionis adiicit, quod præter huius corruptionem, materiam & occasionem suppeditet inflammationis ab humore qui stillat in duram meningem; unde non exit, nisi osse exciso.

IN CAPITE] In caluaria quam prædicta ossa constituunt, futuris veris connexa. Nam ossium lapidosorum squamosa connexio est vtrinque ad synciput, siue bregma.

DIFFICILLIMA EST COGNITIO EORUM FISSURÆ QUÆ AD SVTURAM EST] In futuris veris difficillima quidem est cognitio quæ illic fissura est, quia συγκρίσεις τὸν γόμφον καὶ τὸν αἰσθητὴν τῆς ἰντρεῖς, αἱ ραφαὶ ῥαγμοειδές φαινόμεναι. i. Sensum & iudicium medici fallunt suturæ, speciem gerentes fissurarum, ut scripsit præceptor. In futuris autem squamosis, non est copia explorandi visu & tactu: quia illic sunt muscoli qui tempora continent, quos nefas est ferramento attingere, metu eorum symptomatum quæ scripta sunt in prima prognosi huius tractatus. Ac fissurarum quæ sunt in veris futuris, telo acuto disiectis, ex æquo certant pericula inflammari membranæ, & ossis corrupti à contusione socia ipsius fissuræ. Quæ res adduxit Hippocratem, ut in pari casu posuerit fissuram sectæ futuræ, quo cerebri concussione & vulnus. Itaque patefactis symptomatis quæ infert concussio cerebri atque vulnus, difficultatem posuit inueniendæ fissuræ quæ incidit in suturam; maximè autem cum secta est telo quantumuis acuto. Atque illa difficultas inueniendi, non rarò interitus causa est, osse corrupto, & inflammata meninge, priusquam inuenta sit: quoniam loco, ut debuit, non est prouisum, osse exciso. Tum excindendi ratio periculosa est in sutura, cui prope ipsam periculo locus est. Quamobrem ut difficillima est fissuræ inuentio ad suturam: sic temeraria eius curatio; non rarò est αὐτὸ τὸ πῦρον, i. illud ipsum quod perimit.

Ἡ ῥήνυται δὲ ἐκ τῆς βαρέων μάστιγος, καὶ ἐκ τῆς ἱερῆς ὑποστασίας φε- 60 ρομένων, καὶ μὴ ἵε' ἰσοπέδου.

Rumpuntur autem potissimum obtusis telis & grauib; tum ex aduerso illatis, non æquo & solo.

Coac. 2. huius
cau.

Coac. 3. eiusd.
cau.

EXPOSITA sunt omnes differentiæ fracturarum caluariae, cum idea cuiusque, unde sunt grauiorēs, & in spe angusta sanationis. Ac primū cerebrī à contusione vel effractura concussi ratio est adducta cum iis quæ inde nascuntur symptomatis atque incōmodis. Sunt autem, aphonia, cæcitas, atque surditas: unde mors venit, si quod subsidit cerebrum, non statim cōsurgat. Hinc venit ad examen, ossis *σφην* quæ teli sedes ostenditur in osse pertuso, *ἔσπερ* vocat Hippocrates, in cuius idea dissectio summa est quæ utroque osse diuiso, atque membrana; cerebrum vulneratur: unde symptomata hæc necessariō enascuntur, bilis vomitio, febris, & corporis apoplexia, quæ sunt mortifera. Inde subit illa iudicij omnis & sensus multū secuta & negligens, vel, si mauis, contemptrix, quæ in occulto latet fissura, suturæ impressa, quæ nisi à sciente animaduerti nō potest, ab ictu, telo, & partis natura cui telum infederit. Nam vt concedam credibile esse futuram fissilem findi ex facili obtuso telo & graui, ab ictu non equè valido atque in aliis caluariae partibus quæ ictui magis resistunt: tamen quæ ratio esse potest fissæ suturæ, ob eamque causam contusæ, quoties telo quantumuis acuto inciditur? Est quidem intolerabilis imperitia cum teli obtusi & grauis validiore ictu non creditur fissæ esse sutura: quia fissuram nō exhibet aspectabilem, quia est ipsa *παρρησιάζει*, si homo prædicta signa ediderit quæ non nisi osse fracto eueniunt. Sed, penè dixerim, summa est inhumanitas, cum excusatio medici non accipitur de non inuenta nec credita suturæ fissura & contusione, cum secta est. Et tamen huc mentis aciem conuertendam præceptum est, ad iudicandum quod sine fissura secari non potest ipsa sutura. Quæ cum ita sint, admirabile est quantum hæc doctrina cæteris antecellat, quæ tē ponuntur cum differentiis omnium caluariae fracturarum, in quibus summa sunt omnia rerum illarū ideas vocat præceptor) quæ primū & per se, ipsas fracturas denunciant esse perniciosas ac sæpe funestas. Positis ergo differentiis omnium caluariae fracturarum, & magnis ipsarum ideis ac signis quæ cernuntur in fissura, diacope, contusione & effractura: sequitur vt exponantur causæ à quibus illæ omnes fracturæ extrinsecus inferuntur.

RVM P V N T V R] Ea specie ruptionis quæ cernitur in fissura, non in teli vestigio. Hic enim sedes est sola teli acuri. Sed in fissura longius excurrit rima, quàm vbi telum infederit.

P O T I S S I M V M] i. Vt plurimū, ac ferè semper vbiuis caluariae ossium, si tantū futuram exuperis quæ semper incisa telo quantumuis acuto, fissuram habet coniunctam & vnā contusionem.

O B T V S I S T E L I S E T G R A V I B V S] Sic enim præceptor alibi, unde hæc prognosis adducta est. *Τὰ δὲ βλήαν ῥήγναι μάλα τὸ ὅσον τὰς τε φανέρας ῥωγμὰς καὶ ἀφανέας, καὶ πλαταῖ, καὶ ἐσφλὰ ἴσως ἐκ τῆς φύσεως τῆς ἐκείνῃ τὸ ὅσον τὰ σφηνώδη π, καὶ ἀσφιδέα, καὶ ἀρτίσμοι ἀμβλύα π ὄντα, καὶ βαρέα, καὶ σκληρά. i. Sanè telorum illa demum ossibus fissuras inferunt tam aspectabiles, quàm occultas, ipsaque contundunt, ac suo quaque loco effringunt; ea quæ sunt rotunda, orbiculata, atque suis oris globosa. Tum ea quæ sunt obtusa, graua, atque dura. Ergo telis obrutis & grauibz, forti dextra contortis, ossa finduntur quæ primo appulsu contusa sunt, similiter vt ipsæ carnes: quoniam telis talibus nulla secandi vis inest, maxima contundendi & vltra findendi. Sed vltra fissuram incidit effractura, si ponderoso telo & graui adiciatur vis effringendi à viribus validis eius qui telum contorserit, sicut poëta cecinit de Laocoonte in equum Troianum.*

1. Anecd.

Sic fatus, validis ingentem viribus hastam contorsit. — Nam tali telo, tantisque viribus, credibile non est caluariae ossa posse resistere, quin contendantur, findantur, & effringantur *καὶ ἡ δὲ καὶ μάλλον*, pro ratione ictus ac teli quod contorquetur.

T V M E X A D V E R S O I L L A T I S] i. Vt alibi loquitur, è directo, ad amissum, vel ad perpendiculum, *καὶ ἔξω*, vtraque ratione *τῆς ἑξῆς* quæ cernitur in linea recta. Nam ictus obliqui, sunt ferè inuallidi.

N O N A Q V O E S O L O] Sunt enim telorum grauium ingentiores ictus & iactus, si eò contorta sint atque illata; quod sua sponte ipsa feruntur, hoc est supernè deorsum, non in sublime. Sic enim par est conspiratio ad ictum & iactum ingentem, videlicet teli grauis, & virium validarum, quæ aliter infriguntur & eliduntur.

6 *Τὰ δὲ διὰ τὸν ῥῆγναι πότῳ ἔρρωγν, ἢ ὅ, κρινέειν δέ, διαμασάδς διδόντα ἐφ' ἐκατέρω πλὴν σιγῶνα, αἰδέεικον, ἢ νὰρ ἴσως, καὶ πωροτέραν καλεῖν εἰ πὶ ψοφεῖν αὐτῷ δοκέει τὸ ὅσον. τὰ γὰρ κατηγόντα δοκέει ψοφεῖν.*

Sed cum in dubio est an sit os fissum, necne; sic iudicare oportet, exhibendo mandendum vtraque bucca caulem asphodeli vel ferulam; ac precipiendo vt eò attendat, num ipsi os aliquod strepere videatur. Est enim credibile quod strepunt ea quæ fracta sunt.

N U L L A excusatio est medici accipienda in errore *τῷ ἔργῳ*, unde ignoratio peperit ignorantiam. Sola ignoratio tolerabilis & excusanda, cum in scientia fracti ossis quæ signis syllogisticis comparatur, fissura *τῷ ἔργῳ* inueniri non potest, cum alibi sedem habet quàm vbi telum infederit. Sic enim ratio est præceptoris. *Τὰ πῶς πλὴν ἐν ἑκαστῷ ὅτι ῥήγναι, οὐκ αἰ ἔχεις ἀσφιδέα ἔδιν. i. Tanta calamitati cum inciderit, penes te non est unde succurras.* Atque hæc sola excusatio est medici accipienda in omni exercitatione medendi, si deceptum

Σ.Ερμάκης

³⁰ inneniendi quod positum est in hac prognosi, omnémque locum adimit dubitandi de loco vbi latebat ipsa fissura. Sic enim præceptor ait:

³⁰ inneniendi quod positum est in hac prognosi, omnemque locum adimit dubitandi de loco ubi latebat ipsa fissura. Sic enim praeceptor ait:

³⁰ inneniendi quod positum est in hac prognosi, omnemque locum adimit dubitandi de loco ubi latebat ipsa fissura. Sic enim praeceptor ait:

³⁰ inneniendi quod positum est in hac prognosi, omnemque locum adimit dubitandi de loco ubi latebat ipsa fissura. Sic enim praeceptor ait:

³⁰ inneniendi quod positum est in hac prognosi, omnémque locum adimit dubitandi de loco vbi latebat ipsa fissura. Sic enim præceptor ait:

pyemate quò minor est puris copia, eò maior strepitus exauditur, concussis empyici humeris. Contra quò maior est puris abundantia, eò minor strepitus esse solet, aut certe nullus: quoniam nulla est fluctuatio. Sic in osse diuiso cùm cietur collisio, strepitus excitatur: in continuo autem nullus; quia collisio nulla est. Ergo credibile est vt ea strepant ossa quæ fracta sunt, quando cietur collisio, vt certe hic mandendo cietur in fracta caluaria.

7 Προϊόντος δὲ τῆς χροῦς τὰ ἐρρωγέτα μὲν ζ'· τὰ δὲ ιδ'· τὰ δὲ καὶ ἄλλως διασημαίνει· ὅτι τε σαρκὸς ἀπόσσεσις ἀπὸ τῆς ὀστέας γίνεται, καὶ τὸ ὀστέον πέλιον, καὶ πόνοι ἐχώρων ὑπορρέοντων. γίνεται δὲ ταῦτα ἤδη δυσβοήθητα.

Sed procedente tempore, ossium rima occulta, tum septimo, tum decimoquarto, tum aliàs quoque se prodit. Nam caro abscedit ab osse; ac tum apparet os liuidum. Dolores item ichorum diffluentium excitantur. Atque iam pridem hæc difficulter cedunt auxiliis.

ENIMVERO medicus defatigari non debet quærendo, donec inueniat vbi caluaria in vitio est fracturæ illaræ, nec tamen tractabilis, nec aspectabilis. Qui secus facit, opinionem merito subit occisi, quem fors ipsius non tam peremit, quàm vel ignauia, vel imperitia medicantis. Nam rima detecta, foret sanabilis, quæ abdita & occulta, redditur insanabilis. Est enim consentaneum vt omnis caluariæ grauis pertusio, vicinarum partium, ac primum sui corruptione & inflammatione, ad interitum sit fatalis; nisi remedia loco adhibeantur, quibus corruptio & inflammatio arceantur. Sed ea remedia loco adhiberi non possunt, nisi etiam loco in còspectu sit ipsa rima quæ in occulto latebat. Id autem est loco, si non primo die, saltem post tridie, aut ad summum perendie: quibus exactis, vana est omnis industria quærendi atque curadi, præsertim æstate, qua inflammationis & corruptionis causæ atque symptomata magis in promptu sunt, quàm in cæteris anni partibus. Loquor autem de tramatis ipsius caluariæ, de quibus hæc sancita lex est à præceptore, non autem de aliis, vt brachiorum & crurum. Scire autem licet quòd omnis corruptio fissæ in occulto caluariæ, sua fundit symptomata suo quæq; loco pestifera, in falso credita integritate: nec prius apparet fissura neglecta, aut perfunctoriè ac negligenter quæsita, quàm signa ediderit eius quæ in propinquo est mortis. Signa autem ponuntur in hac prognosi quæ sic conscripta est.

SED PROCEDENTE TEMPORÈ] Cùm scilicet illud exactum est tempus quo erat occasio quærendi & inueniendi ἐρρηγμένη καὶ λυγρή fissuram, dum esset sanabilis, nec dum funestæ causæ inciderant ex euentu, omissa loco idonea curatione. Sunt autem causæ funestæ, corruptio & inflammatio, quæ solent accidere labentibus inde diebus à pertusa caluaria, nec tamen inuenta loco pertusione, nec loco adhibita prouisione. Nam illud quod scriptum est, ἀερίοντες τῇ χροῖ, eò certe pertinet vt intelligamus, paroxysmum morborum atque periodis quæ sunt in tempore, motus omnes cieri quibus mutatio ipsa fit, tum ad pepasum & excretionem, duce natura; vel ad corruptionem & interitum, imperio morbi & magisterio. Scitum est illud. Οἱ παπασμοὶ οὐκ εἰς χρόνον, & quæ sunt eiusmodi. Tempora autem præcedentia mox dicentur.

OSSIVM RIMA OCCULTA] Græcè est, τὰ ἐρρωγέτα, i. omnis fissura, vel illa quæ fissa sunt. Nos tamen còsultò, ex perspicuitia τῆς διανοίας nostri authoris, rimam occultam vertimus; quæ scilicet in còspectu cùm non esset, tamen non adducta est in conspectum, per imperitiam medici, vel eius ignauiam. Est autem occulta, sede ipsa, vel rimæ idea. Ac sede quidem; vel in futura, telo quantumvis acuto præcisa; vel cùm pertrupta est alibi quàm vbi telum infederit. Idea autem; si angustissima est, nec abradendo exactè quæsita, vt iam præceptum est. Nam effracturæ quæ cum fissura est, difficilis non est inuentio. In promptu autem prouisio est, qua & corruptio, & inflammatio virari debet.

TVM SEPTIMO DIE] Vbi celeritas, assiduitas, & vehementia morus, celeritatem quoque adfert mutationis ad inflammationem & corruptionem ossis pertusi, & partium vicinarum. Id locum habet in vtroque syncipite, præsertim vbi est prope futuram, maximè verò æstate quam pluuiæ occuparint. Nam primis periodis cita mutatio esse solet ad interitum vel ad salutem, vt eò conspirat celeritas motus, naturæ, morbi, ac temporis. Sic morbi acuti, celeriter quidem omnes, ac celerius æstate quàm hyeme indicantur. Nam & quartanæ æstiuæ sunt breues, & autumnales longæ. Est autem syncipitis violari atque pertusi motus celerior atque mutatio, quàm cæterarum capitis partium; præsertim autem quæ ipsum futuram attingit.

TVM DECIMOQUARTO] Cùm scilicet non tam cita venit corruptio, nec inflammatio, vt certè non venit, si longius abest pertusio à futura; si os pertusum durius atque solidius; si leuius item percussum, quamuis alta rima diuisum; vt cùm eo telo quod rimam fecit, illa manet membrana quæ subiaceret ossi percusso, indeque pertuso. Nam quod obicitur de Autonomo, quem scripsit Hippocrates, à tramate capitis interiisse decimosexto die, cùm ei lapidis iactu, æstate media, pertusa esset futura quæ per medium bregma excurrit, ex qua præceptor deceptus est tanquam rimosa, vnde peccatum est in commoda fauciari, quòd ea ignoratio commodandi locum omiserit; non admodum scilicet loco serrata

rotunda siue modiolio in vicino futura: ac tandem præterita occasione, cum iam ad vltima ventum esset, serò diuifum ferramento quod fuit 15. die, membranam ostendisse paucò perfusam pure, ac cætera corruptionis expertem: postmodum autem suum obuisse diem Autonomum, quem æquum fuerat intra septimum obuisse, nec vltra. Vt illa concedam, quæ vera sunt omnia: tamen non efficitur, falsam esse regulam quæ posita est de septimo die in pertuso bregmate ad futuram; idque æstimo tempore, quo maior esse solet moriendi celeritas, quàm hyberno. Nam senioris interitus excusationem habet historiæ clausula his verbis concepta. *Καὶ πάλιν ἀποθανεὶ ἐν πάλῳ ἡ δὲ μεμβράνη ἀσπυρὶς ἐφαίνετο.* i. *Subierat paucum pure: ipsa verò membrana visa est incorrupta.* Ergo nec læsa fuit ab ictu, nec inflammata est ab humore qui ad ipsam descendit: quo non exeunte, inflammationes mouentur lethales. At citæ mortis causa est, cita membranz inflammatio atque corruptio, quæ nulla hîc visa est ab osse corrupto.

TUM ALIAS QUOQUE SE PRODIT.] i. Celerius, seriùsve quatuor illis periodis quæ absoluntur 14. die, quibus homines intereunt aut conualescunt à morbis acutis; vt scilicet tarda aut cita est ossis, membranæ, & carnis inflammatio atque corruptio. Distinctio autem petenda ex telo & ictu: tum verò ex osse cui telum infederit: quibus accedunt regio, tempus, & ætas.

NAM CARO ABSCEDIT AB OSSE.] Quia: vt omne viuens, consortis mortui impatiens esse solet: sic mortuorum partium nulla est consociatio, sicut viuentium. Est enim carioli ossis atque corrupti caro inde nata emortua: tum pericranij caluariam vestientis, eadem planè conditio quæ ipsius membranæ cerebrum inuoluentis, unde illa producit. Atque vt membrana putris abscedit à cerebro: sic pericranium, ab ipsa caluaria quam suo complexu fonebat. Membranæ corruptæ causa est inflammatio: inflammatur à sanguine & ichore, quem excipit partim à carne pertusa, partim à diploë fissi ossis. Inflammationis illius particeps pericranium, cephalalgiam febri adiungit, quam edit membrana cum signis coniunctam funestis, vt mox dicetur; præsertim cum ei inflammationi succedit corruptio. Sic igitur membrana putris abscedit à cerebro, & à caluaria pericranium: quod hîc vocatur caro, sicut in libro de capitis pertusionibus. Nota est illa descriptio capitis posita eo libro his verbis. *Duplici constat osse caluariæ quæ per medium caput excurret, cuius id quod supremum est, carnique subiacer, durissimum est atque densissimum.* Vbi, ne longum faciam, certum est carnem vocari tunicam pericranij.


ET LIVIDUM OS APPARET.] Est autem eiusmodi: quia emortuum, extincta viuacitate vitalis principij quod erat in parte solida; tum intercluso neccare ipso viuifico quod venit è corde. Adeo vt liuor ille qui nunc apparet in osse quod erat priùs album dum viueret, causam non habeat *τὸν ταυρίανον, ἢ τὸν ἐκχυμένον*, i. *nauseam vel effusionem*, sicut in sugillatis: sed *νέκρωσιν τῆς ἐμφύτου θάλασσης*, i. *emortuum viuum innatum calidum atque viuificum.* Est autem extincta *ἡ δὲ ἐκ ζωῆς*, & exhausta *ἡ σπέρσις*.

INCOMMODA ITEM VENIUNT AB ICHORIBUS SVBTERLABENTIBVS.] Quod certè perinde est ac si diceret. Exorta febre in rima occulta, post septimum diem, æstare; & paulò infra decimumquartum, hyeme; caro abscedit ab osse, velut sale condita, colore fulua, inde subliuida: os autem tum incipit occupari sphacelo, & fieri cariolum, quod erat læue & perpolitum; postremò subflauum & cinericium. Sed præter ea quæ cernuntur in carne & osse multum à se mutatis colore, caractere, & mole: ichorum quoque subterlabentium symptomata excitantur. Sunt autem sic à præceptore tradita. *Si parulentum os fuerit, aut pustula assurgunt in lingua, aut ipse percussus ex saucius cum delirio vitam finit. Tum ab ichore qui ad membranam descendit, nec exitum inde habet, inflammatio grauius mouetur.* Postremò, cum in propinquo mors est, conuulsio partes occupat quæ sunt è diuerso pertusæ. Ac de symptomatis quemadmodum illa veniant ab ichoribus in pertusa caluaria; dictum est alibi. Nunc illud tantum attingam, quod à quibusdam visum est miraculo potius apponendum, quàm super eo cur ita sit, accuratè disputandum. Est autem, conuulsio partium quæ sunt è diuerso pertusæ.

Sanè conuulsionis illius quam, sicut dixi, narrat præceptor inferri à tremore capitis, sola, vt paucis absoluiam, causa est inflammatio. Sic enim Galenus ait. *Ἐπὶ τοῦ τοῖσι τραύματι οἱ ἀσπυρνοὶ χηροὶ τῆς ἐκ τῆς αἰνῆς φλεγμονῆς, οὗτος ἔσται τῆς νευροδύτης μασίως.* i. *Reapse vulneribus conuulsio incidit, merito eius quæ ipsa consequitur inflammationis; cum scilicet ipsa nervosæ partes attingit.* Non enim conuulsio ibi est, neruis à frigido & glurinoso humore distentis: nec verò ipsam facit humidum primigenium nerui absumptum, ac multò minùs resolutio partis pertusæ, vt in præcis musculis qui tempora continent, vbi conuulsio incidit è diuerso partis præcisæ. Verum, dicit aliquis; posita inflammatio hæc conuulsifica, causam non aperit cur ipsa conuulsio sit potius è diuerso, quàm è directo partis pertusæ. Instat Galeni autoritas ita scribentis ad idem quod iam adduximus. *Καὶ πρῶτον μὲν φαίνεται ἀσπυρματα τὰ μὲν κατ' ἐνδὸν τῆς φλεγμονήτος.* i. *Ac prima cernuntur conuulsa, quæ sunt è directo partium inflammatarum.* Ex quo apparet, quòd inflammatio conuulsifica conuulsionem non mouet in partibus quæ sunt è diuerso ipsius, sed è directo. Quod sanè concedo. Sed audiamus quod sequitur. *Ἐπὶ οὗτοι οὗτοι τῆς ἀρχῆς αὐτῆς ἔσται τὸ πάθος ὅτι πάλιν οὐκ αἰνῆται τὸ σῶμα.* i. *Deinde verò cum principatum attingit inflammatio, in vniuersum corpus excurret affectio siue conuulsio.* Ex quibus efficitur; conuulsionem natà à tremore inflàmato, primùm è directo esse partis percussæ, mox autem pariter è diuerso, vt è directo, i. æquè dextrâ atque sinistrâ principio inflàmato. Talis conuulsio visa est ipsi Autonomo, lapidis ictu percusso atque pertuso ad medium synciput, in ipsius futura quæ rectè excurret à fronte ad occiput. Huic enim conuulsæ sunt ambæ manus; quòd in medio bregmate vlcus esset. Secus autem fuit puellæ cuidam Omeliz quæ conuulsionem experta est partium sinistrarum, cum in dextris esset pertusio. Hîc sanè quærendum cur è diuerso conuulsa est, non è directo. In promptu causa est, quam sic præceptor posuit. *Ἐν δὲ τοῖσι δεξιῶσι μάλιστα εἶχε τὸ ἔλκος.* i. *Quoniam dextrâ potius pertusionem habebat.* Quæ ratio pugnat cum iis quæ ex Galeno adduximus. Sed sympetasma est præceptoris, cuius tanta fuit benignitas, vt nihil sciuerit quod nos nescire voluerit: tanta autem solertia & sapientia.

DE VV LNERIBVS

ET FISTVLIS.



ΣΟΙΣΙΝ Πήλοον ἐκπίη· ἀνάγνυι λποσαπῆναι. CAP. II.

1 Quibus omentum excidit; necessario hinc putrescit.

10

HACTENVS de capitis pertusionibus, quarum corruptio & inflammatio mortifera est contagione cerebri & membranz. Nunc de incommodis vulnere-
 quæ vel à parte saucia enascuntur, vel à vicinis & sociis inferuntur, laeso ipsarum
 propugnaculo, vnde potissimum conseruantur. Sunt enim grauiora ventris, thoracis, & capitis vulne-
 ra, non tam merito illarum partium sauciarum, quàm earum nobilium atque vitalium quæ intra eas vi-
 uunt & sunt viuificæ. Ac primum vulnerati abdominis symptomata hîc ponuntur quæ veniunt ab o-
 mento, cum sua sede mouetur, & excidit per vulnus illarum.

QVIBVS] Abdomine vulnerato sauciis, omento tenus diuiso peritonæo; nec vltà.

OMENTVM EXCIDIT] Foras exit per vulneris amplitudinem, quam fortè intulit venabulum
 20 lato ferro, vel etiam latus ensis aut pugio. Non enim hîc verbum *excidendi* pertinet ad prolapsum omē-
 ti, quem sæpe habet in scrotum, à laxitate quam attulit fortis contentio in gerendo, vel attollendo gra-
 uiore & impari viribus onere, vbi diu manet ad vitæ finem. Nec verò in præpingui abdomine si claudit
 os vteri, vnde sterilitas, eò prolapsum excidisse dicitur, vt scriptum est in hac prognosi: cuius *στέρις* tan-
 tum spectat vulnus abdominis, vt Galenus author est in aphorismis. Huc spectat etiam ea sententia iis-
 dem verbis hac de re concepta i. lib. de morbis, vnde *τὰ ἀπαρχαῖα* tromatum atque vulnere-
 scripserunt Scholæ Coæ magistri. Excidit autem omentum, per vulnus abdominis: quia non ampliùs
 inuolucro peritonæi complexum, suo continetur loco, vt olim, cum esset fomentum ventriculi & inte-
 stinorum. Excidit verò facîle: quia supernat, vnde nomen habet epiploï, nullo constrictum vinculo
 quo exiri prohibeatur. Sed cum exciderit.

aph. 58. 6.

NECESSARIO HINC PUTRESCIT] i. Quia excidit, inde putrescit, *τὸ λόγος τὸ ἐπὶ ἀπὸ τοῦ ἐξελυμένου*, i.
 30 merito suscipientis cause ambientis appulsum, quem nunquam experta est. Quæ ratio sicut communis est
 aliarum quoque partium abditarum, simulatque contactu & qualitate aëris offenduntur, quo nunquā
 vsæ sunt familiariter: tum verò epiploï siue omenti consentanea, penèque dixerim propria esse vide-
 tur: tum quia excidit; tum quia putredini obnoxium est præter cæteras. Nam calidum eius innatum
 corrumpitur facîle in proprio humido, simulatque contactu & qualitate ambientis offenditur. Tum
 illa pars venis obsita, causam putredinis *τὸ ἐπὶ ἀπὸ τοῦ ἐξελυμένου*, secum portat in ambientem, corruptionis au-
 thorem, videlicet sanguinem qui non habet *φυλακὴν* in vena detecta. Sic enim comparata est ratio femi-
 nis *τὸ ἐπὶ ἀπὸ τοῦ ἐξελυμένου*, vt facîle corrumpatur, si aliud effundatur quàm in matricem foeminæ consocialis: quia
 non habet *φυλακὴν*. Sanguinis autem sic ratio est atque conditio, vt ne intrà quidem maneat incorru-
 40 ptus, vel ad punctum temporis, si fortè sit extra venas, vbi non alibi conseruatur. Ac ne in venis etiam
 diu retinet suum calorem; corruptionis expertem, si aliquantisper sub dio sint expositæ ambienti, deter-
 etæ sua carne, & suo, vt ita dicam, eictæ propugnaculo. Ergo sic res eunt omenti, vt partim suo egress-
 sum domicilio, partim venarum, quibus abundat, propagine, à communi causa putredinis, propriam ci-
 tò habeat corruptionis differentiam, præter cæteras partes in graui odore. Quamobrem non antè ma-
 nibus reponi debet in alueum, quàm excisum fuerit illud quod excidit, sicut præceptum est à Galeno.

i. Ep. 12.

2 Ἡν ἐν τῷ διακοπῇ τῷ λεπτοῦ, οὐ συμφύεται.

10 Si quod precisum fuerit tenuium intestinorum; non coalescit.

QVÆ IN medendo sunt omnia, scopum habent *τὸ ἐπὶ φύσιν*, id scilicet quod est naturaliter consti-
 tutū. Ex cuius perspicientia, partium è natura egestarum redintegratio comparatur, aut ne tēatur qui-
 dem, nisi ab imperito medendi. Enimvero nullius partis è natura egressæ redintegratio priùs tentari de-
 bet, quàm ea cuiusmodi sit, & quanta eius egressio cognoscatur. Huius rei notitia est in hac prognosi,
 quæ ponitur sectio tenuis intestini, vnde spes omnis adimitur coalescendi, videlicet ex vulneris ampli-
 tudine, & vulneratæ partis natura. Quorum examen & comparatio, impotentiam planè ostēdet ipsius
 symphyseos, quod spectat potissimum omnis medicina vulnere- & fracturarum. Omnis enim diuisiō
 60 redintegratur per symphysin.

Ergo. SI QVOD] De tribus intestinis quæ transponendo chylo, digerendo, & segregando sunt
 comparata, propriè quæ ipsis tributum est vitale officium quo vitam carere diu non potis est. Atque
 hæc secundas tenent inter partēs nutritias, quarum aliæ quidem coquendo, aliæ digerendo, aliæ excer-
 nendo suam dicarunt operam.

TENIVM INTESTINORVM] Quæ sunt; cephysis, transponendo chylo; iciunum, distri-

buendo ad hepar per mesaraicas portæ venas; ileum, segreganda facie à chylo, transmittenda ad colum, indeque ad rectum, vnde per sedem transmittitur. Eorum duplex tunica, est membrana solida quam ipsis dura meninx impertit.

aph. 14. 6.

aph. 18. 6.

DISSECTVM FVERIT] Μέγιστος ὁ ὅλος ἐν ὁρμητικῇ, i. ad intimam usque diuisum amplitudinem, non tamen excisum, vel amputatum penitus. Qualis eorum diuisio est, dum vulnerantur, quæ posita sunt hoc aphorismo. Κύστις διακοπὴν πῇ ἢ ἐν τῇ φάρυγγι, ἢ κατὰ τὸν λάρυγγα, ἢ ἐν τῇ στήθι, ἢ ἐν τῇ κοιλίᾳ, ἢ ἐν τῇ σπλάγχνῳ, i. Vesicam dissectam, aut cerebrum, aut cor, aut diaphragma, aut intestinum tenue, aut ventriculum, aut iecur; mortiferum.

NON COALESCIT] Tum quia est ipsum natura ἀσύνευτον, i. incoibile. Est enim ἀσύνευτον, i. carnis ex-
pers, cuius interuētū membrana carnea coalescit, nempe cutis obducta cicatrice, cuius materialis causa
est caro succrescens, versā in vinculum præ siccitate. At nulla est caro tenuis intestini quæ, ipso diuiso,
idem faciat quod in cute. Tamen enim venis abundat tenue intestinum: tamen eas sibi non habet, sed
hepati, quibus utitur attrahendo chylo quem aliis expleta deposuit, & eò transmittit. At nulla est am-
plificatio rei quæ antè non fuit. Enimvero simplex caro diuisa, coit in vnum sub forma priore, quæ ve-
ra est symphysis. At cæterarum partium quas vocant spermaticas, nulla coitio esse potest cum semel di-
uisæ fuerint, nisi per cicatricem aut callum. Cicatrix cuti obducitur sauciæ: quia ibi caro succrescit ner-
uo intexta. Ferruminatur os fractum, callo nodoso. Hic vtriusque perit verus figura, nisi fortè sit ex-
cusatio cereorum infantie ossium, quæ fracta, in vnum coire dicuntur; non quidem ferruminata callo:
sed φυσικῶς ἐνωθέντα, quæ vera est symphysis, auctore Galeno. In cæteris quænam coitio sperabilis esse po-
test, vbi nullum est fundamentum cicatricis aut calli? In cute fundamentum est cicatricis: quoniam hic
caro subest quæ amplificatur faciliè. In osse perfracto fundamentum est calli, ab eo quod intus exudat
& circumponitur, ac firmiter adhærescit parti firmissimæ. Sed nulla est membranæ amplificatio in for-
ma priore, vnde sit redintegratio cōtinuitatis amissæ. Nec video quid apponi possit vnde coalescat mē-
brana diuisa; cuius accretio dū naturaliter esset cōtinua, gaudebat succo alibili propagato & assimilato
parti cōtinuæ. Nunc ei distractæ propagatio nulla erit, nec alimēti ad ἐνωσιν, nec excrementi ad ἔλκεσιν. Tū
nulla est basis in parte quæ subiaceret fistulata, vnde succrescat aliquid, cuius interuentu oræ ipsæ coëant
intestini diuisi. Igitur neutra symphysis expectēda in cōtinuitate amissa tenuis intestini. Atq; hæc de na-
tura quæ intestinū facit ἀσύνευτον, i. incoibile, cum eius diuisio est vt semicylindri, qua oræ distractæ, am-
plius coire non possunt; neq; propterea coalescere, inopia cicatricis. Nam si tantum altera tenuis tunica
sectum esset, non autem dissectum; & si non ita esset ampla dissectio quæ oras dissecti multum à se dis-
traheret: sanè illa fundendo, hæc autem apponendo reliquias alimenti, symphysin ederet ferrumina-
tam. Sed intestino altè dissecto ad semicirculum vel semicylindrum, manu est opus quæ oras multum à
se distractas adducat, vt coeant & coalescant. Quæ faciendi ratio non est in promptu, nec facilis in vul-
nere intestini, sicut in fractis artubus, quæ vinculis continentur & coercentur, exprimēdo & reprimen-
do, vnde nodosi calli generatio comparatur. Nec verò in tanta difficultate medendi per chirurgiam, in-
testino vacat, nec satis est: oīj coalescere, non faciundo vitale officium nutritus quod ei demanda-
tum est, quo diu vacare non potest, vita superstire. Propterea sic læsi homines, celerius moriuntur quam
iuuari possint: tum vacuitate officij, tum ipsa symptomatum crudelitate quam intestini concitat in-
flammatio. Nam cibus & potio per vulnus exeunt, præcordia indurescunt; nonnunquam bilis per os
redditur. Quamobrem verè & appositè scriptum est à præceptore, quod intestini vulnus mortiferum
est: tum quia ἀσύνευτον, vacuitatem habet vitalis officij quo vira diu carere non potest: tum quia ipsum
vulnus in membrana quam occupat, inflammationes mouet lethales.

lib. 1. 1. 1.

Cels. lib. 5.

3 Νεύρον διακοπὴν, ἢ γνάθου τὸ λεπτόν, ἢ ἀκροποδίν· ὃ συμφύεται.

Nervus resectus, aut quod in gena est tenue, aut præputium; non coalescit.

ECCE ITERVM noua symphyses impotentia, quæ est in partibus omni fundamento & oc-
casione carentibus coalescendi, quoties præciduntur, quatenus ipsa vnusmodi sunt in suo quæque in-
strumento cui dicatæ sunt. Nam artus præcisi & amputati nulla sperabilis coitio est. Nec mirum cur
ita sit. Sed nervi præcisi & cæterarum partium quæ hic ponuntur, quamobrem nulla sit redintegratio;
id verò nos exercebit in hac prognosi.

NERVVS] i. Pars omnis quæ nomen habet nervi; qualis est πῶς à cerebro vel à spinali medulla,
per quem facultas animalis, & ea quæ intus cient, videlicet τὰ ἐνεργητικά in officio esse dicuntur actionum
suarum ἐνεργητικὰ ἢ αἰσθητικὰ. Qualis est tendo etiam vel ἀντιστάσις in fine cuiusque musculi, orta è fibris
ligamenti & nervi, sparsis per villos carniū, indeque in chordam coeuntibus, quæ omnes ducuntur ar-
ticulū, vt voluntati visum est, καὶ ὀρμητικῇ, ἢ καὶ ἀσθενεῖ. Tum συνδέσμοι & ligamēta, quæ omnem συνάρθρωσιν
atque διαάρθρωσιν continent expeditam & clabi mentem in ἀρθρῶδες, γυνήκεα, καὶ ἀνδρῶδες. Nervus igitur
tū, πῶς, πίνων, καὶ συνδέσμος, i. tonus vel ipsum robur, tendo, ἢ ligamentum. Ac sanè πῶς qui verus est ner-
uus, propago est siue τὸ πρῶτον τοῦ ἐγκεφαλοῦ & spinalis medullæ. Ligamentum, soboles & origo earum quæ
sunt in ossibus ἐπιφύσεων. Tendo autem quædam est velut ἐκφυσις fibrarum ligamenti & nervi, quæ
sunt in villis carniū & in ipsarum exitu coeunt in vnam chordam quæ ipsa est tendo.

R. 1. 1. 1.

RESECTVS] i. Toto suo corpore cylindraceo obtruncatus, vt ea obtruncatio, sublata omni continuitate, partes ipsius non sinat esse contiguas : sed multum à se inuicem reddat distractas.

AVT QVOD IN GENA EST TENVE] Quicquid interiectum est inter vtramque maxillam, quod ipsum per se in omnem partem mouetur, immotis articulis, ope larii musculi, cuius origo est à membrana cuti subnata. Est autem pars illa buccarum sub malis quodammodo suspensarum, quarum resectio nullum habet fundamentum crescendi à carne subiecta quæ nulla est, nec apponendi reliquias alimenti in vulnere alto & amplo, vnde partes diuisæ valde sunt dissipatæ à se inuicem, quo sua sponte in membrana & cute ex quibus ipsæ constant, huc illuc trahuntur. Itaque futura & hamo est opus, vt dissitæ vi adducantur, & ibi coalescant ferrumine cicatricis cuius materiam, vt cuiusdam glutinis, suppeditabunt reliquias alimenti. Ac sanè ibi locorum omnium foedissima est cicatrix quæ faciei veterem & genuinum turpificat characterem. Itaque illud videor verè dicturus cum Galeno, quod dissita glutinantur, non autem verè coalescunt dissecta. aph. 26. 6.

AVT PRÆPUTIVM] i. Extrema cutis qua tegitur glans pudendi, nec ei tamen adhærescit : sed circumuoluitur, suamque habet *idiar περιγαλιω*, ex membrana & cute. Atque pars illa circumciditur verpis Iudæis, infanribus octo dierum in signum Iudaismi : quia est regenerandi & accrescendi expers.

NON COALESCIT] Quoniam non denuo gignitur neque augetur. Est enim pars orta è spermate, cuius *idia περιγαλιω*, *μωρεα* & *πρωτογενετω*, quæ semel amissa nunquam reponitur, nec vlla esse potest illius amplificatio. Itaque nulla sperabilis est *νέωσις* in neruo, arteria, vena, membrana, & cute dissitis. Nulla item *χόνδρωσις* in cartilagine rupta, excisa, auulsa, dissecta. Nulla denique *ὀστέωσις* in osse perfracta. Expetenda symphysis per cicatricem aut callum, cuius materia sunt exudantes reliquias alimenti, aut caro succrescens in cute. Nam carnosarum partium perennis generatio est à sanguinis perennitate vnde primùm enatæ sunt. Inde fit *σπέρμα*, qua sola cauorum vlcernum curatio atque sanatio comparatur. Nam si quis obiciat, materiam gigni spermatricam quæ idem faciat in spermatricis partibus, quod in carnosis de sanguine dictum est : obiectio facilè diluetur, cum intellexerit eam materiã esse quidem *σπέρμα*, i. consocialem spermatricis : non tamen iis restituendis à quibus excernitur, indeque pellicitur à testibus ad faciendum semen, procreandi causa. Itaque materia illa non mutatur in partem spermatricam, sicut sanguis in carnem. Sit igitur ratum & persuasum omnibus, quod nerui solidi, & membranæ, imprimisque teneus & suspensæ, nec vlla basi firmatæ, cum dissecando multum distractæ fuerint à se inuicem, vt ipsas in vnum coire non potis est per symphysin naturalem : ita nec posse ferruminari, nisi ope chirurgi, ac difficulter admodum & indecorè. Nam excisarum nulla spes regenerandi & accrescendi, vt in præputio.

4 Οτε ἐν σώματι ὅσῃον ἀποκοπή, ἢ χόνδρος· ἐκ αὐξεται.

Si quando in corpore, vel os exectum fuerit, vel cartilago; nunquam augetur.

EXPOSITA EST difficultas & ratio coalescendi per symphysin ferruminatam in osse, membrana, & neruo diuisis, facta diacope cui debetur symphysis, vt partes illæ in officio sint vel instrumenti, vel vniuersitatis : vt similes, illi; organicæ autem huic suam dicant operam. Nunc de apocope cui debetur *αὐξήσις* vel accretio reponendi causa & restituendi quod mancã partem reddidit vnde abscedit. Hoc enim video interesse inter apocopen & diacopen, vt illa iacturam adferat substantiæ in parte organica aut similari : hæc verò continuitatem exoluat. Vtramque affectionem coniunxit in aphorismis cum ait. *Οὐτὲ αὐξεται, ἢτε σὺμφύεται*, i. *neque augetur, nec coalescunt*. Tamen si diuersa illic ratio est accretionis, vt mox dicitur. In summa; coitio pertinet ad solutionem continui; accretio, ad iacturam substantiæ. Est autem accretio necessaria coalescendis partibus quæ vel minimam sui iacturam fecerunt. Id cernitur in vlcere cauo quod non antè coalescet, quàm fundum repleuerit. Sed tamen in osse, membrana, præputio, cartilagine, atque palpebra, non est par necessitati commoditas : quia hæc non augentur, nec coalescunt, vt caro. Ac sanè difficultas iam patefacta est coalescendi. Nunc autem quænam sit impeditio accrescendi, superest vt quæramus.

SI QVANDO] i. Quotiescunque, vel ab iis quæ intrā sunt & intus lædunt, vel ab iis quæ foris incidunt & extrinsecus.

IN CORPORE] In quo est partium inter se optima conspiratio, & cum lepore quodam conuenientia *πρὸς ἑαυτὰς*, i. ad vniuersitatem, quæ suis expleta numeris, animò morem gerit : vt scilicet quæ hic recēsetur exclusio, excisio, iacturam ostendat viuētium partium, non autē sphacelismi detractionem & partium mortuarum. Nam sphacelismi & gangrænæ cum amputatur, nulla restat basis nec fundamentum accretionis : quia denuo gigni non possunt. Sed in viuo corpore, si partis iactura sit violenter illata, vel etiam portiuncula aut fragmenti; non est æqua omnium succrescendi & accrescendi conditio, vt hic docetur.

VEL OS] Cuiusmodi tandem id fuerit; solidumne, adnatum, enatum. Atque inter solida, quæ scilicet suo quæque muneri & officio appositæ sunt descripta, (nam enata, sunt apophyses, vt adnata, epiphyfes) siue illa sint fulciendo, vt ossa tibiæ & crurum : siue propugnando, vt ossa caluariæ & thoracis : siue iuuando ad efficiendum, vt manuum ossa : siue ipsa per se faciendo, vt dentes. Omne os

denique quod siccitate induruit ad summum, & duritate ceteras partes præcedit: idque tam sensus expers, quam particeps.

lib. 4. tit. 1.
vires.

EXECTVM FVERIT] Ferramento chirurgi, telo aduersarij, fractura, effractura, contusione: quæ omnia *βλάβος* nomine continentur apud Hippocratem. Omne os denique ab osse detractum, vel amica manu, vel inimica; vel etiam sponte sua eiectum.

lib. 1. hist.
animal.

V[er] IL CARTILAGO] Pars vniuersi, quæ omnium proximè abest ab osse, duritate quam siccitas attulit in terrestri substantia, quæ ipsi cum osse communis est: dura minùs dum cartilago est initiis ossium, quorum naturam suscipit vetustate. Nam cartilaginem quæ sic manet, os duritate præcedit. Sic autem manet quæ connata ossibus ipsa connectit inuicem, vt sterni ossa & pubis: vel ipsi tantum appensa est, vt cartilago xiphoides, cartilago costarum, & nasi: tum illa solius hominis quæ colligat iugulum cum omoplatæ spina, vt ceteras non recenseam. Sic etiam manet cartilago quæ ipsa per se partem constituit, cuiusmodi est in tarso vtriusque ciliij in quo sunt palpebræ: tum in epiglottide, in larynge, in vocali arteria, &c. Itaque omnes illæ cartilagines exectæ vel eiectæ, quouis modo abscederint, vel earum portiuncula.

aph. 19. 6.

NVNQVAM AVGVNTVR] i. Ossis execti vel eiecti, tum etiam cartilaginis nulla sperabilis restitutio, sufficiendo ac reponendo id quod deest, *ὅτι τὸ μὴ δυνάμει ἔχοντος ἰσχύος ἡ φύσις οὐ δύναται*, i. quia non potest denuo generari substantiam quandam eiusmodi qualis amissa est. Nam circumcisum præputium infantibus octo dierum, mancum est in perpetuum: quia deinceps non accrescit, manetque in signum aspectabile Iudaismi. Quod si fatale illud est membranæ & cuti; multò magis ossi & cartilagini. Sic empyemata in arthrodia brachij, *καταγνάσκοντες* reddunt infantes. Sic os ferramento exectum, nunquam idem reponitur: sed fungus pro eo. Tum quibus è palato eiectum est ossiculum maxillæ superioris, resinus fit nasus in medio. Quibus autem id vnde sunt dentes, in imo naso apparet *οὐμότης*. Quod certè non fieret, si cartilago nasi, quæ ipsi est septum rectum ac veluti paries quidam intergerinus, amborum meatuum, suo innixa fulcro maneret. Sic vlcerum vetustorum cauas necesse est cicatrices obduci, quantum subiecti ossis carie absumptum fuerit: quia nunquam reponitur cariosum idem quod antè fuit. Ipsa autem caro crescit ad ossis amissum. Ex quibus apparet, ossium exectorum vel eiectorum substantiam ibi non posse restitui ad amissum, vnde abscedit. Nam cartilago, sui iacturam refarcire non potest in epiglottide, in larynge, in vocali arteria, in narium pinnis, in septo nasi, nec vsquam alibi. In promptu Galeni est ratio: quia non potis est denuo generari substantiam quandam eiusmodi qualis amissa est. Queramus ergo, si placet, quænam & vnde illa sit *ἀδυναμία* vel impotètia regenerandi. Enimvero nulla est alia, nec aliunde petenda quàm *ἐκ τῆς ἀπορροῆς*, quæ non facit denuo quod semel absoluit atque perfecit: nec maiorem vim habet restituendi & reponendi quicquid os vel cartilago sui perdiderit; quàm reficiendi quod mancum est, vel minùs appositè conformatum. Nam *πλεονεξίας φύσις ἢ πλεονέχων*, eiusmodi sunt atque manent, *ὅτι τὸ ἀδυναμῶν τῆς ἀπορροῆς*. Cucurbitarum caput idem manet similiter vt eformatum fuit ab eadem natura quæ ipsius est conseruatrici, vt conformatrici. Ipsa verò natura *ὀργάνων* habet aquæ & ignis, quæ est fatalis portio vitæ & necis, partiumque omnium conformandarum & augendarum. In partium conformatione atque figura, tum incremento & statu, vis ea lucet naturæ quam temperatio comitatur ignis & aquæ ad motum & nutricatum, quibus omnia coagmentantur atque consistunt. Est autem naturæ artificium, sui domicilij architecta, omnia formare simul ac simul augere. Nihil enim natura particulatim facit; sed omnia simul facit fundamenta perficiendæ rei. Vt autem natura suum absoluit pensum in vtero per animati seminis ignem & aquam, in quibus est fatalis portio corporis effundendi & procreandi: sic extra vterum nihil deinceps adiciit præter augmentum & nutricatum fœtus perfecti. Ac nutricatum quidem, ipsa omni fundit ætate. Quod spectat illud Hippocratis. *Ἀνθρώπου ψυχὴ αἰεὶ φέρεται ἀπὸ τῆς γένεως*, i. Hominis anima semper fundit usque ad mortem. Vbi certum est animam dici pro nativo calore, in quo est *ἀρχὴ ζωῆς καὶ ἡ σὺν ᾧ*, i. vitale principium, siue ipsa viuacitas, *ἢ νέκταρ ἐκ τοῦ κορδὸς* viuificum. Sequitur enim. *Ἢν δὲ ἐκπύρωσθι αἷμα τῇ νόσῳ καὶ ἡ ψυχὴ, τὸ σῶμα φέρεται*, i. Si verò inflammetur vna cum morbo anima, corpus absumit. Nam præceptor solenne est, cœlestem animam, vel diuinam potius, vbiuis dicere *αὐθιγία*.

lib. 1. tit. 1.
Theoph. 1. de
caus. plant.

6. Epid. part. 5.

Sed accrescendi alia quædam ratio est quàm nutriendi. Non enim perpetua est ad interitum usque accretio, sicut nutritio. Nec verò extra vterum, sed ne in vtero quidem locus est adiciendi, si quid fortè maneat inchoatum, ex impotentiā *τῆς ἀπορροῆς*; aut redintegrandi, si quid exectum fuerit vel eiectum ex aliqua parte corporis vniuersi, ob eam quæ dicta est *μὴ εἶναι πλεονεξία*: cuius nulla esse potest accessio nec instauratio vt neque in semine; sic neque in partibus quas edidit semē ipsum. Nā semen fit actu animal, perficiendo; non autem per corruptionem. Et animal factum ex semine, est ens quod erat; sed non quomodo erat: quia seminis essentia est esse quod est, vt aliud sit, nempe animal. Vt igitur ex imperfecto semine quod inchoatum est, idem manet: sic quod ex eo perfectum est, si aliquid sui perdidit, expers est redintegrandi. Est enim seminis partiumque inde natarum eadem planè conditio: inter quas & semen ipsum, hoc vnum interest; quod reapse cernuntur illinc emerisse actu ad suum quæque opus faciendum, quæ antea illic latebant; sicut in glande quercus, & pullus in ouo.

Tum illa materia quæ adiicitur accrescendo, dum animal capax est accretionis, non sufficit redintegrandæ parti; restaurando scilicet id quod exectum est vel eiectum. Tamen enim dum corpus est *ἄετις*, i. incrementi capax, abundat calore nativo; vt certè quicquid augetur, natura calidissimum est: tum eius caloris virtute atque potentia fit cita *ἡ ἀπορροή*, i. appositio succi alibilis, qui tam citò efficitur, qualem est ipsum corpus, quam ipsa crescedi capacitas exigit: vt capacitati accretionis omnino par sit opportunitas accrescendi ex copia nutricatus; tamen non opis est nativi caloris, corpori restituere ex alimento, si quid de

quid de suo perdidit, quod ei de semine olim calor ipse impertit. Itaque sperabilis non est regeneratio partium spermaticarum, quam noster praeceptor, *incrementi* nomine intellexit. Nec verò minora sunt adiumenta crescendi à corpore *τῷ σώματι*, quam à motu ipsius caloris, cuius ea promotio esse non potest, ut is qui forma est, generet novam formam, quod factum est opus, ut os excisum reponat, i. viuum pro mortuo. Est autem os mortuum, *ὁ πῶς ἀποσταύει τὸ πῶς ἐστὶν αἰμαίνου καὶ ζώοντος*. i. quod abscedit à reliquo ossis sanguineo & viuo. Et cum in vivente una sit forma, quae unum est; efficitur planè ut cum abierit forma, ex non vivente nova gignatur, si pro eo, quod abscedit, mortuo, viuum reponitur. Quod si verum esset, ut certè non est; à privatione habitus denuo compararetur. Id autem *ἀδυνάτον*.

lib. de cap.
tum.

Existunt quidem mutuae ad incrementum operae, primum caloris, mox corporis, tum alimenti; si calor viuat atque vivificus; si corpus *αἰμαίνου*; si alimentum *ἐν πρεσβύτοις*. Sic enim praeceptor ait. *Τὰ αὖτε* 10 *τῶν πλείων ἐστὶν τῶν ἐμφοδίων* *πλείους οὖν δέονται* *ἐσθλῆς*. i. Quae crescunt corpora, plurimum habent caloris nativi, multo igitur indigent alimento. Nam eo aphorismo tria illa ponuntur quibus nutritio & augmentum absoluitur. Primum enim quod nutrit & auget, calor nativus est: inde corpus ipsum quod capax est incrementi, propter eaque nutriendo augetur: postremo id quod virtute caloris efficitur tale quippiam, quale est ipsum alimentum. Et cum sit eadem nutritrix & auctrix facultas; idemque adueniens connaturale: tamen alimenti ratio est diversa, ut nutrit, & quatenus auget. Nam alimentum, quantum est quoddam, ut auget: ut verò est hoc aliquid & substantia, nutrit. Arque augmentum nihil aliud est quam perfectio actionis nutrimenti: nutritio autem, generatio talis quale est ipsum quod nutritur, corpus videlicet animatum. Sed tamen nutritio tantum est vacuati-repletio, non autem partis emortuae restitutio. Et cum se forma extendit ad materiam quae applicatur; promouet quidem *ἰδίαν* 20 *ἐνέργειαν* ad ulterius ubi, corpusque auget: non tamen de suo adiicit novae parti. Nec verò illa promotio praescriptionis editur *καὶ λόγον* partium reliquarum, ne in pueris quidem atque infantibus qui tantum habent caloris, quantum postea nunquam, si pars aliqua latum vnguem suo loco excesserit. Declarant illud infantes & pueri *καὶ αἰμαίνου*.

6. Epid. &
3. πρὶ ἀφρο

5 *Ἐπὶ τρώματι παλαιῷ ἐπιχρόνιος κακόν.*

Convulsio traumatici superveniens; grave malum.

30 *Ὁ δὲ τῶν μὲν τῶν ἐν τῷ σώματι τῶν ἐν τῷ σώματι τῶν ἐν τῷ σώματι*

Hic MIHI scribendum est de iisdem idem, si quis exigit commentarium in hanc prognosin, qui iam pridè scriptus est in ea parte huius operis ubi leges traditae sunt & explicatae super omni convulsione. Sufficit igitur scopum indicare authoris, cur cum sententiam repetierit, ac denuo hinc posuerit: tum *ἀνακεφαλαίως* recensere cogitationum nostrarum quas literis illic mandavimus. Ergo fuit olim scopus ille authoris, illud consilium, ut convulsionem à traumate nasci ostenderet, ubi causarum omnium convulsificarum, & criseon quoque ipsius convulsione, historia est. Hic autem ubi vulnerum omniumque pertusionum catalogus recensetur: tum autem symptomatum quae ipsis merito superveniunt; convulsionem ceteris anteposuit ut signo pestiferam, sic-offensione partium sauciarum totiusque corporis intolerabilem. Nulla enim vis maior naturae *ἀδυνάτου*, quam convulsione potest inferri. Commentarij autem nostri iam pridem conscripti haec erit *ἀνακεφαλαίως*.

Coac. 9 cap.
14. lib. 2.

CONVULSION] i. Iniussa contractio artuum violenta, velegorum simplex collectio: sed tamen iniussa, quam *ἀπείρητον* Graeci vocant, quae olim naturaliter erat *καὶ πείρητον*. Ac violenta quidem artuum distentio est, nervis exhausto rigidis, aut iisdem crasso & glutinoso humore distentis, vel etiam inflammatis. Simplex autem *καὶ ἐν μέρει* collectio est iniussa, vitio musculorum, exempli causa, temporalium & maxillarum seu masseterum, dextra aut sinistra exolutorum. Hic enim pars quae convellitur, culpa vacat in causa, non in officio quod iussa obire nequit. Sic enim comparatum est, ut sana pars trahat aegram, ubi sunt pares muscoli è diverso, magnitudine, numero, 40 & virtute.

aph. 66. 5.

50 TROMATI SUPERVENIENS] Distensione nervi aut chordae, ut in fractura calicis: in vulnere musculorum qua parte nervi *ἐμφοδονται*, aut iidem *ἐκφύονται*, si nullus tumor assurgat aut evanescat parte postica corporis. Tum ab haemorrhagia quae cietur à vulnere, convulsio est; quando exhaustae venae succum è nervis attrahunt, ipsosque faciunt rigidos ab exhausto. Nam attrahendi potentia, venae carnes ipsas praecedunt. Quinetiam in pertusa calvaria, si exirum ichor non haber qui ad membranam descendit, sed inde ad nervos transmittitur; inflammationem movebit convulsificam, tum è directo, tum è diverso partis pertusae; ut eius ichoris transmissio est siue *καὶ ἔξω*, siue *αἰσταν*: sicut Hippocrates annotavit in Autonomo, & pedissequa Omilia. Sunt autem mortifera illa convulsionum genera: quoniam illa demum symptomata, citae mortis ac iamiam venturae sunt argumenta & causae, quae cum significatione fatiscentis naturae, offensionem quoque ipsi adferunt intolerabilem. Huc accedit quod partium ab exhausto convulsarum redintegratio nulla sperabilis. Nam ceterarum causarum quae inferunt convulsionem, tanta est *ἀντομία* symptomatis, ut curationis tempus expectare non possit. Ipsa verò doloris acerbitas & actio intercepta nobilium partium *καὶ αἰμαίνου* 60 *καὶ τῶν δυνάμεων*, *ὅθεν τὸ πῶς αὐτὸν ὁπότερ*. comment. ad aph. 25. 2.

6 *Ἐπὶ βῶματι, χολῆς ἐμέως ἑπιγνώμῃς· κακὸν καὶ μάλιστα ἐπὶ τῷ κεφαλαιῷ.*

Si cui à tῶmate, bilis vomitio est; malè est: idque potissimum à cephalico.

ILL A D E M V M bilis vomitio, periculosè habet eum qui vomit, vnde nulla leuatio est morbi fundentis continenter bilem ad aluum: sed graniorum malorum accessio, & gravis offensio partis ægræ, vomendo multum afflicta. Scitum est illud. *Τὰ κρίσιμα μὴ κείνῃ, ἢ δύσκειτα, ἢ θαυμάσια.* i. Critica sine crisi, aut sunt dyscrita, aut cerè mortifera. Est quidem critica sine crisi, crebra vomitio quam tῶmatis infert propagatio, ventriculū in sui sympathiam adducens, & continenter eò bilem fundentis, quam gignit sœui doloris acerbiras, vigilæ, & inflammatio. Hic tῶmatis nulla leuatio est à bile propagata in aluum, quæ inde crebra est vomitionibus. Nulla enim sympathia, nec propagatio, quam ἑπιγνώμῃς Græci vocant, leuationem adfert primigenii morbi à quo enascitur. Ac si vomitio illa symptomatica, dilutam bilem effundit, periculosè quidem habet ægrotum, sed non pro certo mortiferè: vt illa quæ difficulter & crebrò exprimit bilem meram & paucam. Nota est illa sententia præceptoris. *Τὰ σπάνια ἐμέσματα χολαία· κακὰ.* i. Exigua vomitio biliosa, malè habet eum qui vomit. Vbi Galenus annotauit, nihil criticum esse paucum. Ergo vomitio biliosa quæ cietur à tῶmate cum ipsa sympathia quæ tantum cadit in eos morbos qui inter magnos eximij sunt, mala est: tum verò pessima, humoris qualitate & euomendi modo. Quemadmodum autem vomitio tῶmati superueniat, sic aggredior ad docendum.

SI CUI A TῶMATE, BILIS VOMITIO EST] Quam ciet ventriculus bile laecessus, vnde venit etiam cardialgia siue καρδιαγῖα, singultus, & proritatio nauscabunda: vt scilicet illa bilis occupat fundum alui qua ipse natar, aut ea firmiter ipsi affixa est, vel proreperit ad stomachum sensus æccertimi. Nam fundo natante vomitio est: bile affixa, singultus & nausea: quemadmodum ea prorepente ad stomachum, cardialgia siue καρδιαγῖα. Tot enim symptomatis alui & stomachi, facta est ipsa bilis cum eò affluxit, ibique fluitat aut stabulatur. Nam irrita proritatio nauscabunda, non rarò inflammationes mouet lethales. Affluit autem bilis à tῶmate, non quidem offis perussi, cuius nulla cum aluo sympathia est, nec gentilitia in generis similitudine, nec iure vicinitatis aut societatis. Sed vitio partium affixarum offi pertuso; tum etiam vicinarum & sociarum; bilis est generatio, & in aluum affluxus, vnde prædicta symptomata enascuntur. Sic calcaneo perfracto, veniunt πυρετοὶ ὑποζῆες, ζυμῆες, ἐμψῆδες, λυγρῶδεις, γράμης ἀπὸ μετοί, ὀλγήμεροι, κτίοντες π, i. peracute febres, æsidue, tremorifera, singultuose, mentis percussa, breues, mortifera. In causa hæc sunt. Nam pars affixa calci, quæ chorda est trium musculorum suræ insignium, cum inflammari cæperit; conuulsionem ciet, doloris cruciatu intolerabilem. Sic autem inflammatur. Etenim ab insultura calcis ex alto ad saxum, circumtusio est carnis quæ circumponitur ipsi calci. Tum venulæ nauscabundæ ab ictu, ἐκχυμῶνται, i. ecchymosin edunt in cutim cui affixæ sunt; vnde sanguis non exit, neque expirat, sed intrâ corrumpitur atque putrescit. Hinc tumor asurgit, ac dolor prægrandis est. Ibi tum sympathia est venarum insignium, sociorum item neruorum, & chordæ calci affixæ. Ac venarum quidem insignium, vel αἰμορροῦν πλωσῆς, καυσῶσῆς, γαγρηπῶσῆς; vitia illa transmittunt ad cor & hepar, quæ ipsis causa sunt febricitandi, ac bilem vomendi, & singultiendi: non secus atque bilis vomitio est à nephritide; singultus, hepate inflâmato; cardialgia, in dolore lumborum, suppressis menstruis vel hæmorrhoidè: sicut iam supra sæpe ostendimus. Nam de symptomatis paraphoricis quæ infert maligni humoris è calce ad cerebrum transmissio δὲ τῷ ἑπιγνώμῃς νῦρον. i. per neruos eximios, dictum est alibi. Notabilis autem est bilis & febris mutua generatio, à cruciatu sœui doloris quem edit chordæ contractio & inflammatio.

MALÈ EST] Causa & signo. Ac signo quidem: quoniam sympathia illa partis vomendo afflicta, i. ventriculi, non excitatur nisi à magnis morbis, atque iis quidem qui magnitudine & vehementia sunt inter magnos eximij atque prægrandes. Tum propagatio illa bilis ad aluum, cacochymia est malignæ; primum quidem à tῶmate ad magnas venas transmissæ, indeque ad iecur; vnde proreperit, partim ad fundum alui, partim ad stomachum. Vt causa autem, bilis vomitio malè habet ægrotum: quia ægrè cietur & crebrò, nec tamen quiescit proritatio nauscabunda, propter perennem bilis affluxum quam eò transmittit nausea, liuor, gangræna venarum insigniū quæ adiacent parti pertusæ. Tum eo tam crebro, tamq; difficili motu ventriculi, naturæ contrario, eius præsidia labefactantur, cum offensione partium omnium nutritiarum atque vitalium: sed maximè animalium, ex capite multum repleto & proritato. Quinetiam illa contentio vomendi, & ægrè, inflammationem mouet in stomacho & aluo lethalem.

IDQUE POTISSIMUM A CEPHALICO] Nam tῶmatis eius grauiora sunt ἑπιγνώμῃς, quàm cæterarum partium pertusarum: idque cum aliàs, tum verò cum ab eo tῶmate bilis vomitio est, quæ & idea vomitus, & vomendi ægra contentione, tum assiduitate ipsa, cum perenni nausea, omnium molestissima & grauissima esse solet. Superuenit autem cephalico tῶmati, bilis vomitio; vel inflammata membrana, vel cerebro à diacope. Membranæ ac cerebri inflammatio, murò bilem gignit & febrem. Nam bilis & febris mutua generatio esse solet. Vt igitur inflammatio cerebri, stomachum habet ἑπιγνώμῃς νῦρον δὲ τῶματι: vnde sympathia est non solum gentilitia, sed etiam societate contracta: sic febris inde nata, bilem quam gignit, continenter eò transmittit, vbi est conspiratio atque consensus; nempe ad stomachum,

ad stomachum, cuius ille impatiens, concutiendo ciet vomitum, ad eam exentiendam. Est enim partium gentiliū & sociarum mutua *ὁπρὸς* boni aut mali, mutuāque syntimoria, ut bene est illis aut male. Ac super his plura iam suprà. Quemadmodum autem gravissimā sit atque mortifera, bilis vomitio à *πρωτῇ* ipso cephalico, demonstratum est capite superiore huius tractatus.

7 Νόσος ὅσα παχέα πλεθροῦνται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ χολοῦνται καὶ
 10 ῥοῦνται. Ἰσχυροῦνται μάλιστα. καὶ τῶν μυῶν αἱ κεφαλαί, μάλιστα τῶν
 ἐν μυροῖσι.

*Qui sauciantur nervis insignibus; hinc ferè illi claudicant: maxi-
 méque si vulnus obliquè acceperint. Idem accidit casis capitibus muscu-
 lorum; & maxime in femoribus.*

10 IAM VERE illud est positum ac demonstratum. Quòd actio omnis læsa, est partis afflictæ: sic
 ut ipsa læsionis species & idea, est afflictionis ipsius. Sic enim phrenitis est cerebri atque bilis: sicut le-
 thargus eiusdem cerebri & pituitæ putris. Denique morbi omnes naturam sequuntur causarum, tam
 efficientium, quàm excipientium. Symptomata autem fixorum morborum, sunt partim ipsius causæ
 morbosæ, partim etiam partis afflictæ propria. Quæ cum ita sint, hic loco querendum an *χολοῦσι* ne-
 cessariò consecutaria sit vulnerari nervi prægrandis, ut visum est præceptorī cum ait. *Αἰσθητὶ τὸ τοιαύτῃ ἔχει*, lib. 1. tit. 2
ὡς πρὸς τὴν ὁκίαν ἔχεται. ἐν δὲ πῶσι τὸ πρῶτον νοσῶντα παχέα πλεθροῦνται αἰσθητὶ χολοῦνται, καὶ ὅτι μὴ πῶσι τὰς κεφαλαί, μά-
λιστα δὲ ἐν πῶσι μυροῖσι. 1. Neceffe autem huiusmodi sunt affecta, ut scilicet ita sint, quotiescunque hi casus inciderint.
 Nam inter τρώματα, qui nervis sauciati sunt crassos, ipsos necesse est claudicare: ut etiam casis capitibus musculorum,
 & maxime in femoribus. Sed ratio eius symptomatis, cur necessariò ita sit, ostendetur in examīne ipsius
 prognoseos.

30 QVI SAUCIANTVR] Sic enim visum est, afflictionem hic positam nervi, transferre ad homi-
 nem ipsū parte illa saucium, de quo etiam symptoma dici reperio: est autem claudicatio, quam idem
 scribit accidere sauciatis hominibus, lib. 2. prorrh. cuius verba hæc sunt. *τὸ δὲ πρῶτον παχέα ἐν πῶσι ἀρσενί,*
μεγάλα μὲν ὄντα, καὶ τελείως ἀποκρίνοντα τὰ νεύρα τὰ ἐνέχοντα. ἐν δὲ τοῖς ὅτι χολοῦσι ἀποκρίνεται. 1. Vulnere autem quæ in artubus
magna sunt, quæque nervos exactè dissecant, qui continent artus ipsos; palam est quòd homines claudos efficiunt.
 Ergo. QVI SAUCIANTVR] Qui acuto telo, validis inflicto viribus, vulneratur in artubus, ossium
 tenuis: proptereaque.

NERVIS INSIGNIBVS] Quos alibi vocat præceptor *νεύρα ὁπρὸς*, i. authore Galeno, *μεγάλα:* lib. 1. tit. 2
 cuiusmodi sunt nervi quos hic vocavit crassos: cuiusmodi etiam venæ crassæ, quas alibi vocat *αἰμώρεις*
καὶ μεγάλας. Sunt autem nervi crassi & magni, omnes qui artus continent, quos idem vocat *νεύρα ἐνέ-* lib. 2. prorrh.
χοντα. Continent autem, tum qui sunt motus & sensus authores, nati è cerebro & eius propagine, spi-
 40 ritali medulla: tum qui è musculis enascuntur, & in articulos inferuntur, *πένοντες* Græci vocant: tum qui
 articulos ipsos connectunt, faciuntque illam *συμφύσεις* differentiam quæ est *ἐνέχοντες*; in brachij arthra-
 dia, in eiusdem ginglymo, in femoris enarthrosi cum ischio. Ac certè illa tria nervorum genera conti-
 nent ipsos artus: primum quidem, impertiendo mouendi vim & sentiendi: alterum, adducen-
 dis & abducendis membrorum articulis: tertium, connectendo artuum *πρὸς ἀρσενί, καὶ τὸ γνήσιον*
καὶ τὸ ἀρσενί.

HINC FERÈ ILLI CLAUDICANT] In officio partis illius quæ nervi præcisi magisterio non
 amplius continetur nec regitur: ipsa verò laborat vitio facultatis, actionis, aut connexionis. Ex æquo
 enim certant vitia quæ cernuntur in *ἐξαρσενί* artuum, & in sublata ipsorum *συμφύσει*. Ac sanè impoten-
 50 tia est æqualis mouendi, ab exoluta virtute posita in nervorum symphyisi, quàm à luxato articulo. Nisi
 quis fortasse obiiciat *αἰμώσεων* artus luxati, *δυσκινήσεων* autem à nervo præcisi; ut scilicet flectendi vis adi-
 matur, non extendendi, aut contrà; ex posito & officio nervi præcisi, quatenus ille præerat flectendo
 vel extendendo. Nam connectentis nervi præcisio comitem ferè habet artus *ἐξαρσενί*, proptereaque
πρὸς αἰμώσεων. Sed tamen nervi mouentis præcisio, partis illius adimit obedientiam, ubi telum infederit,
 qua olim morem gerebat antagoniste, dum ageret adducendo vel abducendo, flectendo vel extendendo.
 Atqui non minor est virtus obediendi quàm imperandi, cum agitur de artuum motu in omnem par-
 tem ciendo. Est enim irrita contentio nervi flectentis, nisi sit obedientia extendentis; & contrà. Itaque
 homines claudicant in officio artuum, nervis præcisis à quibus moventur. Est autè claudicatio, motus
 amissio vel depravatio: quia scilicet difficulter admodum, vel indecenter, motus cientur: atque id ne-
 60 cesse est euenire quando hæc sunt, ut cætera omnia, quorum *αἰσθητὶ* ostendit hoc familiari exemplo.
 Ut sanè illa claudicatio non sit ambigua, sicut hic ponitur, sed *ἐξ αἰσθητὶ*. Planum id facit quod sequitur.

MAXIMEQUE SI VULNUS OBLIQUE ACCEPERINT] Quod idem est planè ut legitur
 in prorrhico. Artuum magna vulnera, quæque nervos dissecant perfectè à quibus reguntur, palam est quòd clau-
 dos efficiunt. Talis enim nervorum præcisio, continuitatem adimit, qua dum se colligunt, articulos
 quibus inferuntur, adducunt: ipsamque virtutem intercipientium intrus spirituum, vel, si maius,

ἢ ἐκφυγόντων. Quod certe non eueniret, fauciatis in longum: vbi neque inferio violatur, neque vis intercipitur ἢ ἐκφυγόντων.

APH. 66.5. — IDEM ACCIDIT CÆSIS CAPITIBVS MUSCULORVM] Tum enim similiter vis tollitur efficiendi, vt obediendi. Ac sanè quidem efficiendi, diuisa continuitate musculi: vnde non se colligit nostra sponne, partemque ipsam, caput versus adducit, in quam inferitur. Obediendi autem, parta ipsius capitis, telo diuisi, contractione, qua cõrumacius est mori gerendo antagonista flectenti vel extendenti. Nam cæsis capitibus musculorum, nulla sunt commoda colligendi & adducendi, labefacta eorum virtute: maxima verò incommoda iniussæ contractionis & spasmis quem inflammatio solet inferre. Est enim maior afflictio soli dorum nervorum ἐκφυγόντων, quàm cõfusarum chordarum ἐκφυγόντων. Nota est illa sententia præceptoris. Ἡ τριαιμύτων ἰσχυρὸν καὶ ποταρὸν ἐόντων, οἷδ' ἡμᾶ μὴ φαίνεται μέγα κακόν. i. Si circum virtus magnam est vehemens, tumor non exurgit; ingens malum. Vbi Galenus hæc scribit ait de musculorum capitibus atque finibus, δὲ τὰς ἐμφύσας καὶ ἐκφύσας τῶν νεύρων. Sed illud, μέγα κακόν, i. ingens malum, partim est conuulsæ partis præcisæ, partim ipsius principatus καὶ συμπαθείας.

LIB. 2. cap. 3. — ET MAXIME IN FEMORIBVS] Quia sunt ibi crassiores nerui, quàm alibi: tum propter artuum cruris & tibiæ magnitudinem, tum propter motuum qui per ipsorum cientur articulos, difficultatem; femoris quidem per enarthrosin cum ischio, & eiusdem ginglymum cum tibia: ne interim taceam chordæ amplitudinem, quæ tribus enata musculis qui sunt in sura, in calcem inferitur. Ac de nervorum quidè cruralium & chordæ ipsius crassitudine, hæc scripta sunt à præceptore, vbi recenset incommoda læsi calcanei, de quo sic posuit. Κοινὴν δὲ φλεβὶ & νεύρῳς ὁπλίσσονται ὁ πένων ὃ ὀπίσθιος τοῦ ποταρῶντος. i. Calcaneum societatem habet cum venis & nervis insignibus: tum autem posterior chorda huic innectitur. Femoris autem nerui prægrandes nati ex tribus infernis partibus lumborum, & supernis quatuor sacri ossis; ab ortu statim miscentur, mox in nervos quatuor præcipuos exeunt. Arque inter eos, qui numeratur quartus, omnium corporis nervorum crassissimus, siccissimus, durissimus, validissimus, inter os sacrum & ilium elapsus, in musculorum capita implantatur.

8 Αποθνήσκοισι δὲ μέλιστα ἐκ τῶν τρωμάτων. ἢν τις ἐγνέφαλον τρωθῇ, ἢ ραχίτιω μυελόν, ἢ ἦπαρ, ἢ φρένας, ἢ καρδίαν, ἢ κύστιν, ἢ φλέβα τῶν παχέων.

Interit autem potissimum è vulneribus; si cui sit vulneratum cerebrum, aut spinalis medulla, aut iecur, aut diaphragma, aut cor, aut vesica, aut aliqua venarum crassarum.

UT PARTIUM quæ vniufmodi sunt, è natura egressio, incommodis atque symptomatis facta est propriis, quæ cernuntur in actione læsa instrumentorum quibus illa inferuntur: sic vitia principatuum atque propaginum, quibus vitale cuiusque officium planè collabitur, mortifera esse solent. Atque illa vitia nobilissimis partibus inferuntur, earumque viuificam adimunt facultatem, ἢ αἰσθητικὴ καὶ ἐκφυγόντων, ἢ διενέρας καὶ καὶ συμπαθείας, ἢ καὶ συμβεβηκός. i. primum & per se, tum etiam per sympathiam, vel ex euentu. Ac primum quidem & per se, collapsio repente principatu, cum amissione vitalis officij. Collabitur autem, cum amplitudo est vulneris in cerebro & in corde. Nam vulnera cæterarum partium quæ hîc ponuntur, per sympathiam cordis & cerebri mortifera sunt: cum vel inflammatione partes illæ tentantur, vnde mouetur propagatio causæ morbosicæ: vel etiam ex euentu in vacuitate sui officij, quo vitam carere diu non potis est: aut vacuitate succi alibilis, per hæmorrhagiam. Sed causæ omnes ad mortem fatales, positæ in vulneribus partium, quarum catalogus recensetur in hac prognosi, cur ita sint, & quemadmodum inde mors veniat; operæ precium fuerit examinare in singulis.

INTERIT AVTEM] Quod est eiusmodi ac si diceret. Patrefactis incommodis atque symptomatis quæ inferuntur à vulnere partium, in vitio tum ipsarum proprio, tum etiam instrumentorum quibus illa inferuntur: sequitur vt loco scribantur mortifera vulnera, quæ sunt eiusmodi, tum ipsa per se, tum per sympathiam propagatam atque μετασποιν, tum ex euentu. Ergo. INTERIT] Vel extincto calore virali per syncopen; vel eo suffocato per apoplexiam: tametsi enim reuera nemo est omnium qui absque syncope moriatur; tamen alia est consideratio extincti caloris, alia suffocati: vel potius, vt ita dicam, vtrique pariter αὐτὸ τὸ κτείνον, i. illud ipsum quod perimit: sed ne illud quidem appositè, cum vtrique sit mors ipsa.

POTISSIMUM] Græcè est μέλιστα, quo significatur causa ipsa mortifera quam intulit vulneris amplitudo in partes quarum officia sunt planè vitalia efficiendo vel inferuiedo. Significatur etiam celeritas moriendi καὶ ἦλον & μάλλον: vt annotauit Galenus ex Thucydide, ad illud vbi agitur de maxilla luxata. Οὗτο οὕτω θνήσκοισι δεκαταῖοι μέλιστα. Sunt enim celerius ad mortem fatalia partium efficientium vulnera, vt cordis & cerebri, quàm cæterarum inferuentium, vt mox dicitur.

COAC. 3. cap. 3. — SI CUI SIT VULNERATVM CEREBRVM] Ἡν τις ἐγνέφαλον τρωθῇ: quæ fauciandi cerebri ratio atque causa, euentu apoplexiæ, funesta est atque insanabilis, vt suprâ demonstratum est vbi tractatio est

lib. I. script
r. 1. 1. 1.

30

40

luxata. Ab eo phymate peruersio est spinæ isursumis, i. naturaliter atque decenter sinuosa, ad rectam lineam exporrecta. Tum spinæ partes quæ sunt natura isursumis, vt ceruix & lumbi, à phymate foras assurgunt

κατωφερει, ac suum gibberum siue τὸ κύφωμα indecorè ostendunt. Contrà quæ partes natura sunt ἰσχυφεῖς, vt carina thoracis, trahuntur in λόρδωσι, iis luxatis in partem anticam. Tamen si crebra thoracis à phymate luxatio est in partem posticam, vbi apparet τὸ κύφωμα, quod præ costatum & sterni angustia, molestissimam ac difficillimam parit dyspnœam in qua cernuntur eximie differentie paruitatis, ac repetite crebrò spirationis. Atque illi plurimùm difficultati adiicitur ex euentu, ab inflexione cerdicis in partem anticam, quæ ipsam, alioqui natura ἰσχυλορδον, indecenter facit καχυλορδον; ex nimia cavitare foris conspicua, vnde sic fiunt homines ἐξέχοντοροι, i. *prominentioris laryngis*, quæ cum stertore inducitur spiritus, vt dormientium spiratio esse solet eo iacendi habitu quo reclinata multùm ceruicæ iacent. Quæ admodum igitur magnæ ceruicis vertebræ, i. secundæ, inflammatio orthopnoicam facit anginam: sic vertebrarum dorsî luxatio nata ex phymate ipsius pulmonis, spirationem auget difficilem frequentia & paruitate: sicut & gutturis eminentia, ipsam facit καρχαδον: quoniam spirabilem omnium partium conspiratio est ad illam dyspnœam asthmaticam; gutturis, deducendo; pulmonis, excipiendo; & thoracis, mouendo. Plurimùm autem facit ad spirationis angustiam, aucta in corde spirandi necessitas, ab inflammatione pulmonis, cui morem non gerit spirabilem partium contumacia.

Sed præter symptomata impediti officij partium spirabilium afflictarum, multa quoque alia circumueniunt incommoda vicinarum & sociarum partium, in earum sympathiam adductarum. Gibberum autem lumborum à phymate illic enato symptomata sunt pariter in renibus, in vesica, in genitalibus, in mesocolo. Nam partes illæ, in lumborum sympathiam facillimè adducuntur: tum quia vicinæ, tum quia ἀσθημαί. Est autem vetus illud positum à præceptore, ὅτι συμπαγὰ τὰ ὁμογενῆ καὶ τὰ παλαιά. Et rursum, πᾶσι τοῖς ἐν τῇ καρδίᾳ, πνεύματι καὶ μάλιστα κακοῦται. Sed tamen hoc interest inter κωφώματα quæ à phymatis enascuntur in spina: quod ea quæ sunt infra πνεύματι diaphragmatis, nempe in lumbis, possunt exolui per dyenteriam aut varices; illinc, beneficio mesocoli nati è nervis lumborum; hinc verò, per μετέπεισον humoris morbifici ad vasa insignia quæ adiacent lumbis, & illac excurrunt ad crura. Cæterarum autem partium, diaphragmate superiorum, vt cervicis & dorsi, talia non sunt perfugia, ob eamque causam ἀδυναμία λέγεται, i. non potis est vlla ratione ad æqualitatem siue ὁμογενείας reuocari earum κωφώματα, i. gibbera. Verum, dicit aliquis, hæc omnia sunt violatæ medullæ, vertebrarum vitio luxatarum, aut etiam phlegmonarum. Sanè quidem: sed ea cum sint grauissima, credibile est multò grauiora fore incommoda quæ per medullæ diacopen inferuntur, tum ipsa singularis officij amotione, tum verò symptomatum acerbitate & summa difficultate curandi, ne dicam ἀδυναμία, i. impotentia, vt suprâ iam diximus.

AVT IE CVR] Η ἥπαρ, quod principatum obtinet œconomiz naturalis, partiumque nutritiarum, penes quod est ipsa nutritio in commoda eius valetudine: sicut ἀσθία & nutritus, deprauatio, in aduersa. Quinetiam in ἐνσπέρια hepatis, fundamentum est principatum ac facultatum vitalium & animalium: sicut in eius κακὴνσπέρια, illorum destructio. Malè res eunt, vitamque habent pessimè animalem, quam βίον Græci vocant; cum ab hepatis κακὴνσπέρια, frustratio est vel deprauatio sanguificandi. Sed hepatis commoda & incommoda sunt alibi explicata in hepatite, hydrōpe, dysenteria, & inflammatione illius systrophica. Superest hic quærendum ac iudicandum; si ne ipsius diacope cita morte funesta, an verò sensim mortifera, viralis officij, & αἱματώσεως κακὴνσπέρια ἢ ἐπιπύρις, qualis est eius ἀνρία ἢ ἐμδρασμός πνεύματι; in hydrōpe vel hepatite, cum impotentia ipsa curandi. Enimvero vulnus illarum hepatis quæ diaphragmati adiacet, & vbi truncus est venæ insignis, quam vocat Hippocrates ἡπατιτιον, profusio sanguinis implacabili, est omnium maximè præceps ad mortem. Quæ ratio sapientem eò mouebat Vlyssē, vt ea parte Cyclopi necando telum acutum conderet, ὅτι σπέρης ἡπαρ ἔχει, i. vbi diaphragma hepatis complectitur. Atque hæc citè mortis à vulnere ratio, primùm Iudæis cognita & scripta in factis libris, cognitionem eam comparauit Homero. Sic enim legimus Abnerum Azaeli, & Ioabum Abnerō vitam continuò ademisse, ferro ad viscus virale immisso & abdiro: quod sapientes viri de iecore scriptum existimant: tamen si ius idem necandi est in sauciato corde, vt mox dicitur. Cagarum hepatis partium sauciarum vis eadem cernitur ad interitum præcipitandi hominem qui eo telum hostis acutum excepit: ob eam causam quæ dicta est in hepatitis hæmorrhagia. Est enim ratum illud persuasumque piis omnibus Christianis; quod ab exhausto sanguine animalitas ipsa perit, ac tum humanæ actiones quiescunt, olim coniunctæ cum animali: quo pereunte, illinc discedunt, & cum parente sua mente diuina migrant ad Dominum Deum creatorem suum. Nam alta vulnera cæterarum hepatis partium, inflammationes mouent lethales, quæ vel ad interitum citò præcipitant sauciatos, vel transcunt in empyema, vnde pus exit ἀμυρσίδες καὶ βροχιδες, i. cænosum et amurcosum, quod insanabilem visceris corruptionem ostendit.

AVT DIAPHRAGMA] Septum transuersum, cui ius liberæ spirationis à Deo tributum est, præter ea commoda quibus natura vititur vt intergerino quodam muro superi ventris & inferi, separanda causa œconomiz spiritus & nutritus: ne illa præteream quibus iter est sursum venæ insigni, deorsum verò arteriæ, per foramina diaphragmatis, cuius in centro caput est nerueū, nervis adiutū quatuor ad motus ciendos liberæ spirationis: πνεύματι verò nactum est carneam, qua circum adhæret ductū obliquo, dextrâ quidem atque sinistrâ costis quas vocant spurias; pōst, metaphreno; antè, xiphoidi cartilagini. Eius quidem vitia & inde incommoda enascuntur, tum ab iis quæ intrâ sunt inutilia, tum verò extrinsecus, qualia hic sunt posita καὶ ἐξωτερικῶν hostilis teli eò transmissi. Ac sanè diaphragmatis vulnerati cæsim aut punctim, mortiferam inde causam agnosco: vel quia est insanabile ipsum vulnus, vt incoibiles: vel quia symptomatis fœtum est planè funestis; vnde vel cita mors venit, vel paulò seriùs vita sauciati excedunt. Cita mors venit, cæsa insigni vena quæ sursum per diaphragma viam affectat, de qua iam diximus: vel cordis arteria quæ illac cursum inflectit deorsum. Seriùs autem sauciati, vita excedunt, quibus diaphragmatis nerueum caput est saucium, venis illæsis. Hic enim, tum quia vulnus ipsum est incoibile, partim naturâ partis afflicta, partim mouendi perennitate; tum quia ibi fœtura est symptomatum exitialium; nulla salus vitæ sperabilis esse potest. Fœtura symptomatum exitialium cernitur in prægrandi phlegmone ac peracuta, in thoracis angustia, & summa difficultate spirandi, cum febre ardente, tum verò in cerebro sic occupato, vt exeant homines è potestate mentis, qualiter solent phrenitici atque fanatici. Quinetiam illud periculo adiicit, quod cerebri sympathia tantum abest vt aliquam morbo diaphragmatis leuationem adferat, quæ nulla expectari debet: vt per syntimoriam, grauiorum symptomatum accessionem adiungat. Denique hic desperata salus ab omni causa mortifera, quæ triplex omnino est; inflammatio; viuifici necatis dissipatio; & occupatio partis nobilissimæ, i. cerebri, καὶ τῶν ἐνσπέρων: cuius officium sic est vitale, vt eo collapsio pereat animalitas ipsa, propterea quæ spiratio amittatur, vnde mors venit. Declarant illud phrenitici, sputatores, phanatici, & ad extremum tremuli à diaphragmate inflammato, sicut à cerebro: de quibus abundè suprâ iam diximus. Sed à πνεύματι non ita est, per quam diaphragma vndique thoraci annexum est. Non enim cum cæsa est, tot eam, nec tanta, nec tam cita etiam circumstant incommoda.

AVT COR.] *Ἡ καρδία*: quod nomen hoc loco, visceris est nobilissimi quod ipsum per se micat, & in quo principium & fons est vitæ, ac principatus vitalium facultatum. Quò fit ut eo penitus vulnerato, si quidem implacabilis est hæmorrhagia, fonte exhausto, vitæ principium ipsum vanescat, & vnà funditus facultatum abeat principatus. Idem quoque accidit villis dissectis, per quos micandi potentia est, cum scilicet eorum dissectio, micandi adimir facultatem, in necessario adhuc vsu diastoles arque systoles: quarum officia sunt eò comparata; illius quidem, ad spiritum foris intrò ducendum, & sanguinem hauriendum è vena; huius verò, ad eos vitæ commeatus, per totam compaginem effundendos, & vaporem humidum expirandum. Quæ interceptio, siue officiorum vacatio, diu vitam subesse non finit. Sed ramen non tam cita est eius inde amissio, quàm à contuso cerebro, aut capite obtruncato. Hic enim continuo cessat animalitas, in absoluta priuatione sensus & motus; quæ, auulso corde, aliquantisper manet. Nulla sunt igitur mortis effugia, corde penitus, ac ne quidem leuiter sauciato. Nam si vasorum quæ sunt in corde sectio est; hepaticæ quidem venæ, cuius est illac transitus, & vnde sanguis per diastolem cordis hauritur ad nectar viuificum, hæmorrhagia præcipitem adfert interitum. Idem quoque facit, ac multò celerius, arteriæ magnæ viuificæ vulneratio. Atque illa duo sauciati cordis incommoda, extinctione caloris natini sunt cita morte funesta. Cæterarum autem venarum quæ sunt in corde, sectio, suffocationem adfert mortiferam eiusdem caloris; videlicet cum sanguis refunditur ad dextrum, & inde ad sinum sinistrum, ex vena arteriosa: tum autem cum sectio, venosæ arteriæ, viam præcludit inspirando spiritui, & vapori humido expirando. Sed alia cordis vulnera quæ ipsius excipit coagmentatio tribus intexta villorum generibus, quibus diastoles arque systoles officia continentur, existere ibi nequeunt quin ipsa villorum offensio, prædicta vitæ officia tollat ex corde. Quo vitio interceptur nutritio, remperatio & expurgatio caloris natini: vnde suffocatio vel extinctio est in promptu, quæ ipsa mors est.

AVT VESICAM.] In cuius alueo transmissum illuc serum è venis, renum attractu, ac veluti quadam multra, nomen tum habet vrinæ, nec antè: & vbi fit crassi & glutinosi humoris coagmentatio lapidosa *μετ' ὕρην*: tum facta in renibus coagmentatio calculosa eò translata: *μετ' τῆς ὕρηνος*, corticatum augetur & in maiorem molem assurgit, quando non habet exitum per aquaductum vesicæ. Est autem mortifera eius vesicæ dissectio: tum quia inde nata corruptio & inflammatio, satis est homini per se ipsa necando: tum quia eius natura neruea, sanguinis & carnis expers, multum à se distracta secando, est planè *ἀσάμηντος*, i. *incoibilis*: proptereaque officij vitæ tuendæ necessarij vacuitate, non solum insanabilis, sed etiam ex euentu lethalis. Hic ego vesicæ collum excipio, quod scinditur ac laceratur scienter atque feliciter amica manu chirurgi, calculo extrahendo. Ac de vesicæ malis atque incommodis, plurima suo loco sunt à nobis conscripta.

AVT VENAM DE CRASSIORIBVS.] In promptu causa est calamitatis mortiferæ quam venæ crassioris infert præcisio: quoniam ea tum incoibilis, hæmorrhagiam ciet irrequietam, quam *ἄτακτος* Græci vocant, donec ad vltima ventum sit animalitatis & vitæ, cum scilicet membra frigore exoluantur, vitæque ipsa fugit è corpore. De crassioribus autem venis, quæ vel quiescunt, vel micant, quas vocat eodem sensu *αἱμόρρους ἢ καὶ μεγάλας*, dictum est sæpe alibi, ut hæc sufficere videantur.

9. Αποθνήσκουσιν ἐπὶ καὶ ὡς ἐξ ὀφθαλμοῦ καὶ πλῆμονα μεγάλα σφοδρὰ καὶ πληγὰ ἰσχυρὰν· ὥστε τῶ πλῆμονι πλεονέχον ἐλασσον πνεῦμα καὶ σῶμα γίνεσθαι, ἢ τὸ ἐκπύπτον ἐκ τῶ τραύματος.

Quinetiam moriuntur si vel in arteriam, vel in pulmonem vulnera magna illata sint; adeo ut pulmone saucio, minor sit expiratio per os, quàm illac excidit ubi est ipsa pertusio.

EXPOSITÆ sunt causæ omnes mortiferæ partium sauciarum, quæ vel absument hominem insanabiles, vel ad exitum citò præcipitant: vbi vel cerebrum in vitio est, vnde collabitur animalitas; vel cordi adimitur vis micandi; vel hæmorrhagia est implacabilis quæ sanguinem totum exhaurit. Nam illa vulnera sauciatos absument, quæ inflammationes mouent lethales in partibus quarum officia sunt planè vitalia; cuiusmodi sunt hepar, diaphragma, tenue intestinum, vesica. Sequuntur nunc vulnera partium spirabilium quarum offensio spirationem adimit, indiuiduam vitæ sociam: idque prægrandi vitio vel mouendi, vel excipiendi, vel deducendi spiritum inspirando, & vaporem humidum expirando. Sicigitur visum est præceptori super incommodis respirandi, à vulnere partium spirabilium.

QVINETIAM MORIUNTUR.] Quod est eiusmodi ac si diceret. Non solum mortifera sunt illa vulnera partium prædictarum, quæ sua sponte, non nostra, sunt in vitali officio: sed etiam illa earum quæ iussu nostro mouentur, præstandis vitæ officiis, & quarum motus animali virtute profecti, animalitatem quoque ipsam tuentur, ac rationi inserviunt. Sunt autem partes illæ spirabiles quæ cordis vsui morem gerunt, inspirando spiritum, & expirando vaporem.

SI VULNERA VALDE MAGNA.] Quæ sunt eiusmodi, amplitudine diuisionis. Conside-

ratē autē posuit vulnera valde magna: quia parvorum aut mediocrium non est ea soboles expirationis terrificae, vnde prognōsis hīc scripta iniuri possit. Est autem, exspiratio maior qua parte vulnus illarum est, quā per os ipsū naturaliter consueta. Hīc scilicet cardo est ipsius prognōseos, quod exspiratio ē vulnere maior est quā ex ore, qualis esse non potest si paruum est vulnus; ac ne simpliciter magnum quidem, sed valde. Sed vulneris valde magni hāc mea sic ratio est in singulis explicanda.

INFLECTA VEL IN ARTERIAM] Quae comparata est ducendo spiritui ad pulmones, & inde ad cor, temperandi causa, & faciendi cum sanguine dextrā cordis hausto ē vena caua, nectar viuisimum: tum expirandae fuligini, seu vaporī fumido expirando. Propterea quae huic spiritus ductui maiores nostri, arteriae nomen dederunt *ἀπὸ τοῦ αἵματος πνεῦν*; non tamen ei soli. Nam & venas micantes sic vocari reperio à præceptore, i. *arterias*. Est autem vulnus praedictae arteriae valde magnum, quod non in suprema est parte, sed intrō penitus penetravit ad centrum vsque cylindri, cuius edit speciem arteria fistulata, vel ipsa potius arteriae fistula. Itaque sic diuisa dehiscit, multum à se distracta, ut vix coire possit, nec futura, nec hamo: quia vinculo non est locus, vnde strangulatio est in metu. Quae causa est cur moriantur homines eo prægrandi vulnere sauciari: quia non minor spiritus inspirandi, per illud vulnus portio evanescit; quā illac excidit vaporis fumidi per os naturaliter expirandi. Quicquid autem materiam tollit spirabilem, vitam tollit.

VEL IN PULMONEM] In alterutram partem ambarum quibus expletur pulmo, totusque absoluitur, dextra scilicet atque sinistra, quae linea mediana sunt inter se, duabusque fibris, velut alis, instructae; ac tribus intertextae valis: ante quidem, arteria venosa; post, vena arteriosa: inter quas media decurrit praedicta arteria, toti pulmoni ramosè distributa. Ex quibus efficitur, ut alta pulmonis vulneratio vel haemorrhagia venae arteriosae, vel intercepto spiritu inspirando, sectis arteriae surculis, vel expirando vapore ē saucia vena arteriosa, mortiferam inferat calamitatem. Sed tamen hīc tantum attigit causam mortiferae calamitatis causam quae violatis accidit inspirandi & expirandi meatibus: idque in libera spiratione quae suscipitur atque absoluitur *καὶ περιέρχεται*. Nam de funesto cordis vulnere quo vel micandi usus adimitur, vel instrumenta ipsa micandi, exolutis fibris, quiescunt & cessant: tum etiam de implacabili crassarum pulmonis venarum haemorrhagia, dictum est abunde in citima huic prognōsi, & supra in causis phthisiferis & haemopyssi. Atque hunc scopum authoris declarat illud quod sequitur.

ADEO UT PULMONE SAUCIO] Cum scilicet capulo tenus, exempli causa, pugio intra costas pectusve, aut aduerso sub phreno est abditus.

MINOR FIT EXPIRATIO PER OS] Per quam vaporis fumidi expurgatio esse solet, 30 cuius efflatio, *ἐκφύσησις* Graeci vocant, vocalem materiam præbet laryngi, cum laxa illius fibrae mouentur ad modulandam vocem. Vaporis copia qui expiratur per os, potissimum cernitur in spiratione sublimi, & ea quae hyeme libera est, cum scilicet expiratus vapor frigore ambientis coactus, ita spissatur, ut planè sit caliginosus, qui per ætatem inaspectabilis tenuis vanescit in auras. Ergo si eius vaporis minor est per os copia quā solēbat, nec vlla sit causa extincti prope calorē in corde, vnde respiratio est parua & rara; nec verò vlla sit in bronchiis valde obstructis impedimento respirandi, vnde respiratio est planè asthmatica; mirum videri non debet si aliò vapor effusus, paucitatem suam per os exhibeat, copiam verò illac quā contra consuetudinem foras transmittitur. Sic enim subiungit.

QUA ILLAC VBI EST IPSA PERTUSIO] Quoniam vulnere bronchiorum quae sparsa sunt per pulmones, ac venae item arteriosae via expirando per os vaporī est intercepta: spiritus autem qui per arteriam ducitur eoque vbi vulnerata sunt bronchia, denegata sui expurgatione per consuetam expirationem, nouam molitur contra consuetudinem naturaliter institutam, per amplum vulnus thoracis quā itur ad sauciam regionem pulmonis. Sed illa consuetudo contra naturam, in hoc vitali officio diu manere non poterit, quin, suffocatione vel extinctione calorē, breui funesta sit. Huc accedit, quod irrita est omnis curatio medici atque solertia: idque cum aliis, tum quia, ut scribit Hippocrates, *ἐλκυσσάντων, ἐπαρρήγνυνται*, i. agitata ulcera perenni motu, denuo lacerantur.

lib. viij
cap. viij

10 Ὀνήσκοισι δὲ καὶ εἰς τὰ ἐντὸς νεύρα, ὡς τὴν λεπτὴν τρωθῶσιν, ὡς τὴν παχέων, ὡς ὀπικάρσιος ἢ πληγὴν χυμῶν καὶ μεγάλην. ὡς δὲ μικρὴ καὶ διείρα· ὡς ἐκινούνται ἐνίοι.

Moriuntur autem & illi. &c.

NERVORVM offensiones vnde illa sunt vitae incommoda quae hīc ponuntur atque pericula; tum etiam tenuis intestini & crassi: non ita pridem sunt explicatae *καὶ διέγνυνται* præceptoris. Hīc tantum agnosco characterem scribendi quo usus est in historia sauciorum nervorum. Nihil enim hic pertinet ad intestina, de quorum vulnere incoibili, propterea quae lethali, dictum est etiam abunde supra: ut illa correctio quae mutauit *τὰ ἐντὸς νεύρα, εἰς ἐν πνεύματι*, mendum scripturae adferat, non autem emendet. Itaque nulla est à me versio, nec enarratio in hanc prognōsin: quia non sapit Hippocratem, cuius non est varia *ἑσπερία*, qualis hīc cernitur, vbi mors ponitur pro claudicatione.

Ηκιστα δὲ

11 Ημισα δὲ θήσκοιοι ὁ πρῶτοκόμοιοι ἐν οἷσι ταῦτα μὴ ἐν τῷ τῷ σώματος μερῶν, ἢ τῷ τῷ πρῶτοκόμοιοι.

Sed illi per raro intereunt qui sauciantur ubi nulla est corporis partium predictarum, vel absunt ab iis longissime.

10 IAM PRIDEM receptum est, contrariorum esse contraria consequentia. Itaque patefactis partibus quarum funesta est vulneratio ipsa per se, nec vlla prætermissa ex iis, facillimum est mente complecti cæteras de quibus non est verendum metu interitus, cum sauciatae fuerint: quia nihil habent eiusmodi unde vel homines absumantur, vel ad exitium præcipitentur, cum vel à vulnere in vitio sunt, vel suam vim efficiendi, iuvandi, aut conservandi amittunt in suo quaque officio, nisi quid inde mortiferum sit ἡ συμπελευνός, i. ex eventu. Quæ cum ita sint, facilis erit versio & enarratio huius prognoscens quæ sic habet.

20 SED ILLI PERRARO INTEREUNT] Græcum illud, ἡμισα, consulto sic vertimus, ex usu frequenti quo legitur apud Hippocratem, pro eo quod est *minimum* in lingua Latina. Talis est illa loquendi formula in aphorismis. *Senes inedia patientissimi sunt; mox homines constantis ætatis; ἡμισα μερῶν, i. minimum adolescentes, &c.* Vbi non est dubium quin illud, *minimum*, facilitatem inedia minuat, reprimatque in adolescentibus, quam senibus tribuendam putavit: non tamen in totum adimar auferatque ab iis, sicut aduerbium *minimè*, quo tollitur omnis patientia ieiunandi. Sic etiam in hac prognosi ἡμισα, i. *minimum*, non tollit in totum causam mortiferam à partibus vulneratis unde non tollitur aliquod vitale officium, nec earum incommodis adiicitur quippiam præsentaneum mortis periculo: sed tamen à vulnere non sunt in tuto, nisi cautio sit eorum quæ intrà sunt inutilia, & quæ extrinsecus enascuntur: ut non raro de illis vulneribus verendum sit, donec saucij conualuerint. Sic multos vidimus telo percussos in capite, ac ne vix quidem cute pertrusa, propterea quæ leuiter admodum vulneratos: tamen maiore periculo quàm ipso vulnere occupatos, præter spem interiisse à tempestate calida, pluvia, & austri: unde mortifera fuit capitis, eo quem dixi modo, pertrusi corruptio. Nam artuum vulnera sæpe sunt 30 ex eventu lethalia; non eò quidem quòd ibi sint magnæ venæ ac nervi; nec item quòd venenato telo inflata sint, quamuis leuissima; cuiusmodi multa suo exitio Alexandri milites, barbarorum gladiis acceperunt: sed quoniam parum propicia cæli ac soli conditio. Sic trumata capitis in Italia sunt δυστυχία; tibiarum verò ευτυχία: quæ sortem contrariam nata sunt apud Celtas, Gallos, & Belgas.

VBI NULLA EST CORPORIS PARTIUM PRÆDICTARUM] Sauciati cerebri ad apoplexiam cito morte funestam: hepaticis & aortæ: tum item crassarum venarum quæ sunt in cruribus & pulmone, ad implacabilem hæmorrhagiam: cordis, adempta micandi facultate & usu: pulmonis & arteriæ, intercepto spiritu ac vapore, tum etiam spirandi officio: hepatis, diaphragmatis, vesicæ, ac tenuis intestini, quorum vitalia sunt officia, & quorum symptomata lethalia. Hæc igitur non sunt in cæteris partibus, ut earum vulnera, ipsa per se, vel metu interitus nos exterreant; vel repentina morte, 40 amicis & medicis flebilis sint. Denique cæterarum partium ubi non sunt lethales causæ prædictæ, sicut in aliis iam explicatis, vulnera non sunt mortifera, nisi ἡ συμπελευνός.

VEL ABSUNT AB IIS LONGISSIME] Ac si diceret. Tamen si vulnus non habet mortiferè, partis vulneratæ natura: tamen vicinarum merito, καὶ τῷ ὁμοίῳ, sæpe interitus consecutionem adferre solet: quale est musculorum qui tempora continent: nec raro ἐμφύσιον τε καὶ ἐκφύσιον, quibus mouendi facultas & actio musculis impertitur. Ergo sympathia nulla sit principatuum, sauciata parte aliqua quæ est natura sanabilis ad certam securitatem salutis.

12 Τὴν δὲ ὄψιν ἀμαυρῶνται ἐν τοῖσι τραύμασι τοῖσιν ἐς τὴν ὀφρυῶν, καὶ μικρὸν ἐπάνω. ὅσῳ δὲ αἰ τὸ τραῦμα νεώτερον, μάλιστα βλέπουσι. χρονοζομῶν δὲ τῆς οὐλῆς, ἀμαυρῶσαι μᾶλλον συμπίπτει.

Sed visu hebescent à trumatis, quibus in supercilium, & paulum supra, truma illatum est: quod sanè quòd est recentius, eò minor est hebetudo: sed quia serior est cicatrix, hinc magis hebescere ipsos contingit.

60 EXTREMUM illud est de partibus vulneratis, deque ipsarum vulneribus, ut incommoda hic scribantur quibus homines occupantur eo vitio quod ex ignobili parte saucia, transit in nobilem vicinam & sociam: idque per ὁμοίῳ, unde officium labefactatur, quod simul confert ad vitæ usum & ad dulcedinem. Est autem visus obscuritas, quam inferunt sauciatae partes oculorum vicinæ. Atque hic casus, in exemplum adducitur, omnium instar quæ simili modo eueniunt. Sic enim sunt empyici, quibus tra-

ma thoracis foris quidem sanescit, intus verò minimè; aut certè intus sanatum, denuo laceratur. Sic etiam visu hebescent, vel etiam occæcantur, cicatrice obducta supercilio vulnerato, cum sanies prorepat in oculum quæ antea per vulnus exibat; non ea quidem tota è membrana calvaria seu pericranio, unde album oculi propagatur: sed ea quam ipsum vulnus edebat, quæ nunc iam fera cicatrice intro rediit atque in oculi album exudarè pericranio, sicut à parte quæ continet, in eam quæ continetur.

cap. 6. lib. 2.

Ergo. **SED VISU HEBESCUNT**] Ὅψιν ἀμαυρῶται, i. oculorum lumen obscuratur, vel splendor hebescit visificus, qui est in oculorum membranis, humoribus, & igne vernaculo, ut eo sensorio multum afflicto, τὰ δεσπῶ, i. *aspectabilia* non excepta, neque à sensu percepta, visionis obscuritatem plane ostendant. Sed plura nos alibi περὶ ἀμαυρώσεως, deque illius natura & causis.

ATROMATIS] Punctum cæsimve illatis, idque transuersim: quo vulnere palpebra semper labascit, quam tolli non potis est, nisi collecta fronte & corrugata; nec deprimi, nisi ea demissa.

QVIBVS IN SUPERCILIVM] Quod supereminet oculo; atque ipsi loco est proiecturæ cuiusdam, arcendis iniuriis quæ inferuntur supernè ad perpendiculum. Atque hoc supercilium superam continet atque dimidiam sinus partem ubi est oculus: proptereaque in eam ius habet sympathia triplicis; quia ὁμογῆς, vicinum, & locium.

ET PAVLVM SVpra ILLATVM EST] Cæsim atque transuersim: unde maior est causa & importunitas hebescenti, ut dictum est. Parui autem refert, siue illatum vulnus in supercilium, an paulum supra: quia idem manet τὸ συνεγγὺς, καὶ τὸ κοινόν, καὶ ἴσως τὸ ὁμογῆς, inter ea faucia, & fortè cum oculo, qui inde laborat vitio alieno.

QVOD SANE QVO EST RECENTIVS] Penèque dixerim, ἐναιμὸν, nec dum sordibus vllis obfutum, ut cum vulnera mutantur in vicus: præterea, quia vulnus recens illatum, amplitudinem suæ diuisionis ostentat, qua humor exit liberè ac liberaliter.

EO MINOR EST HEBETVDO] Ipsius nempe sensorij, non facultatis visificæ. Est autem minor sensorij, i. oculi hebetudo: quia tum minor est eius læsio in leuiore causa lædendi à vulnere per quod liberaliter humor, nec iam in oculum prorepat, unde minor est difficultas excipiendi ab oculo, & percipiendi à sensu, τὰ δεσπῶ, i. *aspectabilia*.

SED QVIA SERIOR EST CICATRIX] Cuius interuentu coit diuisa pars, alioqui natura incoibilis. Interuenit autem cicatrix, beneficio carnis quæ est in cure, & alimenti, cum nutrirî cœperit ipsa pars faucia. Quod certè citò non euenit; sed admodum serò, proptereaque serior est cicatrix: quoniam inflammatio diu multumque partem fauciam occupauit; cuius quidem reliquæ partes calvaria non sunt capaces: sed manent expertes, etiam multum pertusæ: ob eam sanè causam, quia illæ continent, & sola frons cōtinetur. Oborta igitur in supercilio à vulnere inflammatio; pessimè ipsum habuit, & in perpetuum habitura per quandam corruptionem & infirmitatem, unde perennis generatio est cuiusdam ichoris qui ut perennitatem habet ex eo quod fera fuit cicatrix: ita perennem affluxum in oculos, quia prohibetur exitu foras à cicatrice. Itaque substillum illud ichoris in oculum, σπυδαίρειαν eius tollit qua uti solebat excipiendo res aspectabiles societate parta cum illis, ipsasque transmittendo ad sensum, percipiendi causa.

MAGIS HEBESCERE IPSOS CONTINGIT] Quia perenni substilllo ichoris in oculum, membranarum nitor squallescit, humorum splendor caligat, & fulgor ignis oculorum proprii vnà extinguatur: unde comparatio est verè hîc positæ ἀμαυρώσεως.

49

COROLLARIVM.

De fistulis.

Ἡ σύρσις χαλεπώταται εἰσὶν, ὅσα ἐν τοῖσι χονδρώδεσι τε, καὶ ἀσάρκοις τοποῖσι πεφυκάσιν, εἰς τὴν κοίλῃ, μὴ λένται τε, καὶ ἰχωροροῦσιν αἰεὶ, σαρκίῳ τῷ ἐπὶ τῷ σώματι ἐπέσιν αὐταῖς. δι-
δεραπθῶταί δὲ ὅσα ἐν τοῖσι μαλθακοῖσι τοποῖσι καὶ σαρκώδεσι τῇ
διόδροισι πεφυκάσι.

Illa demum fistulae sunt molestissima, quaecunque in partibus cartilagineis & carne vacuis enascuntur, ibique sunt cauae, & cuniculosa, ac sanie diffiunt continenter: tum verò caruncula, ipsarum adnascitur orificio. Sed illa sanescunt facilius quaecunque in partibus mollibus atque carneis, & neruo carentibus, oriuntur.

HACTENVS

HACTENVS de natura traximus posita in officio & conditione partium fauciarum, deque symptomatis quæ ab iis enascuntur. Hic de ulceribus loco dicendum, in historia fistularum quæ instar omnium nobis erunt: quod illæ sint ulcerum quæ in conspectu sunt, velut principes ac reginæ. Sed principatus earum sic ostenditur ex hac prognosi.

ILLÆ DEMVM FISTULÆ Non illæ quidem crassa & pingui Minerua sic nominata in puris ductu quem edit phymatis empyema: quoniam longa est via qua pus effunditur, ut in abscessibus qui ex peripneumonia, sub auribus, vel in eruris oriuntur atque assurgunt: quibus tum homines occupati, periculo defunguntur, ac sine metu palindromes eò vnde venerunt, si *ἀνορύσσεται*, i. *fistulam edunt*, ut scribit Hippocrates. Vbi fistula nominatur pro incolumi puris ductu. Talis est fistula in thorace, quæ in desiderio liberæ ac liberalis anacatharsæas pleuritici aut peripneumonici empyematis, ac pure in alveum thoracis effuso; vitione fit aut sectione, qua inde pus exitum habeat. Qui sanè puris ductus, in spe angusta sperabilem facit vitæ salutem à pure laudabili: desperationem verò planè ostendit in amurco & fœdi odoris. Qua de re illud præceptum est. *Quibus à pure coloratur specillum, velut ab igne; omnes intereunt. Et. Quibus concutiendo, pus editur velut amurca eò fœdi odoris; ut plurimum moriuntur.* Sed **ILLÆ DEMVM FISTULÆ** Mox describendæ; non autem modò descriptæ quæ *καταγεννησὺς* fistulæ nominantur pro alto puris ductu.

lib. 1. progn.
& Coac. 22.
cap. 16. lib. 2.

Coac. 47. &
48. cap. 5. lib.
eiusd.

SVNT MOLESTISSIMÆ *Χαλεπώταται*, i. *κίνδυνον ἐπιφέρουσαι*, periculum inferentes, vel partis ipsius natura vbi enata sunt, vel transitu & propagatione ad propinquas & socias, vel difficultate ipsa curandi atque molestia.

Galad lib. 2.
cap. 1. & 2.

QVÆCVQVE SVNT IN PARTIBVS CARTILAGINEIS Cum scilicet partium illarum caua sunt ulcera, in modum arundinis fistulata, angusta, callosa, & altæ, vel etiam brevia: vnde ipsa fistulæ nominantur, in quibus percipitur longitudo aut breuitas, siue intus recta ferantur, siue obliquo sinu; idque vel simplices, duplicesve, aut triplices ortæ ab vno ore quæ intus tres sunt: quarum origo est phyma, vel aliud quoduis vlcus malè curatum: quamvis in ano fistularum causa est præter ceteras, ipsa contusio, quæ tum equitando; tum remigando inferitur. Ergo si aliquam partem cartilagineam fistula occupavit, quam genuit summa humoris feritas & acrimonia; vel eò pessimè ipsam habet, quod irrita omnis curatio est, vel inimica potius: quia magis exulcerat, magisque fistulam reddit effectam. Sic non in manu, sed in medicamentis præsidium est: non eò quidem quod aliis ipsa penetrat, ut ad vltima demitti collyrium non possit: sed quia naturam retinet carcinomatis nata ex atra bile. Ipsum verò præsidium, quod est in manu chirurgi, haud scio quid opis allaturum sit, vbi non est lene, nec facile, sicut in aliis fistulis esse solet: & vbi nulla est dinisarum partium incoibilibus sperabilis redintegratio. Sed illud præsidium quod ex Hippocrate Celsus expressit, mox proferetur in fistulis, in quibus appositæ ipsam præceptor dicavit. Quæ autem sint partes cartilagineæ, omnibus distincte numeris, nuper adductæ sunt: vbi demonstratum est quod earum eictio ab ulcere vel exectio, tum amica manu, tum inimica, nunquam est reparabilis.

Coac. 4. lib. 2.
cap. 1.

ET CARNE VACVIS Vti membranæ quæ carent omni carne & sanguine, cuiusmodi sunt vesica & intestina tenuia, vbi nulla est opportunitas succrescendæ carnis, ad cicatricem; quæ tamen illis in partibus expectari nequit, vbi nulla fistulæ sectio est manu chirurgi: sed ne in palpebris quidem, nec in præputio, nec in eo quod in gena est tenue; vbi vlnicris ferruminatio est potius per *καταφύσσον*, quam per cicatricem *ὀμωξέν*. In vulnere autem calloso quod fistulam edit, quamam sperabilis bona coitio esse potest, cum scinditur; vbi nec fundamentum est succrescendæ carnis, nec vllæ reliquæ succi alibilis, quò ipsa ferruminatio comparetur.

IBIQVE SVNT CAVÆ Non eò quidem quod fistulæ aliter esse possint, nisi sint caux: sed quod sint altæ multumque fistulata cavitare insignes, instar arundinum: vel quod earum cavitates obducto veluti callo, præ duritate non subsidat, neque conuieat, cum scilicet in vetustatem inciderit. Ac sanè tales fistulæ vix manu chirurgi, aut medicæ vnguentis ad sanitatem perueniunt: quia non cedunt vtrique præsidio.

AVT CUNICVLOSÆ Quæ mouent cuniculos, longius excurrentes & prorepentes quoquoque a virulenta sanie quæ ipsas continenter erodit, vnde vicinas partes inficiunt, ac sæpe tam rectæ, quam dextrâ siue sinistrâ eousque penetrant, ut ad pulmonem, vel ad vesicam, vel ad vterum, vel ad grandes venas, arteriasve; vel ad inania, ut stomachum, guttur, thoracem, cuniculatim perueniant. Hic certe curatio difficillima est, nec fortè sperabilis, quod ea præsidia quæ posita esse diximus vel in manu chirurgi, vel in collyriis fistulariis, voto medici non respondeant; illa quidem, cuniculis omnibus non excisis, ac nouis subinde orientibus; hæc verò, ad vltimas vsque latebras non demissa: ne interim taceam nobilium partium offensiones, cum eousque serpendo, alius fistula penetrant: tum etiam perennitatem virulenti humoris morbifici, quæ est in vitio viscerum sæpenumero insanabili.

AC SANIE DIFFLVNT CONTINENTER Quod sanè certum est *ἐνθαυρόμενον* fistulæ contumacis, quæque non facilem sui curationem promittit: idque vel proprio vitio, vel alieno. Ac proprio quidem, cum tanta feri vbertas aliunde venit per fistulam. Tum enim credibile est in sparsis quoquoque cuniculis, fontem subesse ichoris, quo fistula defluit continenter; quem immissa crebro collyriæ exhaustire non possunt, ac multò minùs conuerrere ad pepasum. Atque id locum habet in omni ulcerum rheumate consistente, *ἐκωιδέμενον* vocat Hippocrates, quod fuit vberius quam merito vlcis quod in conspectu est. Sed alieno vitio tanta est vbertas ichoris è fistula; cum eò perenne affluit *τὸ πρῶμα ὀμωξέν*; idque vel ab iis quæ intrâ sunt inutilia, vel quæ extrinsecus enascuntur. Intrâ sunt inutilia, viscerum intemperies & catarrhus; vnde vel à capite, vel ab hepate perennis in fistulam est vi-

3. Epid. part. 5.

fulenti humoris atque ichoris affluxus. Enascitur autem extrinsecus illa sanies siue ichor, qualis regnas-
se narratur Cranoni, à tempestate austrina, cum densis nimbis & rapido æstu coniuncta; unde prouen-
tus fuit carbunculorum. Sic enim praeceptor scripsit. *Ἰχόρες ἰσχυρότεροι ἐκ τῆς θερμότητος.* Qua duce sententia,
in initio 2. Epid.
6. Epid. part. 2.
in *τῷ αἵματι ἰσχυροτέρως*, Galenus agnouit: non illud quidem simpliciter tenue & aquosum; ἀλλὰ τὸ μὲν πρὸς ἰ-
χόρας καὶ καρκινώδους διαίτης, i. sed coniunctum cum venenata quadam & maligna qualitate. Huiusmodi etiam
4. acut.
sunt ichores quos ait Hippocrates raptos à venis, cum à labore & siti exaruerint, in iis accédere febrem
ardentem. Sed idem eos ichores paulò post, in calidorum & acrium rheumatismum nomine appellauit,
cum in priorem de causi ortu sententiam, ita scripserit. *Οὐκ οὐκ αἱ ἀκτῆρας θερμὰ φλέβια, δριμύτη καὶ θερμὰ ρεύμα-
τα ἐπιπληροῦνται πρὸς τὰς αἰσῶν.* i. Cum resiccata vena attraxerint ad sese acres & biliosos ichores. Talia autem rheu-
mata cò concitata, siue ichores; vel ibi collecta & nata, vix edunt τὸ ρεύμα συνιστάμενον πρὸς ἡέλον; sicut in
3. Epid.
pestilentia narrat Hippocrates de ichorum ad partes impulsu: sed pro eo pure laudabili, quod facit pe-
pasmus, alia quædam putredo est, cum vbertate rheumatismum variorum. Sic enim factura esse solet eo-
rum, à perennitate ichoris tam concitati, quàm consistentis, cum partem aliquam callosa fistula occu-
pauit. Quinetiam talis materiae seges est in tromate capitis, quod in conspectu non fuit, sed in occulto
latuit è diuerso partis percussæ; nec prius in conspectum venit, quàm sit prænuncium atque causa mox
affuturæ mortis. De quo illud est positum à præceptore inter signa cætera quibus se prodit, καὶ πρὸς ἰχό-
ρας ἰσχυρότεροι, i. incommoda item veniunt ab ichoribus subterlabentibus. Incommoda autem sunt explicata
vbi sunt posita.

TUM VERO CARUNCULA] Quæ est *ὑπερδερμῶσις*, quæ assurgit è fistula nimio ichore imbu-
ta, & in ore suo, quæ ichor effunditur, vlcerata: qualis est *ὑπερδερμῶσις*, fistulæ vrinariæ quam abradendo
facit venerea virulentia. Nam vlcera sanie diffluentium *ὑπερδερμῶσις* esse solet, vbi caro solida gigni
nequit.

IPSARVM ADNASCITVR ORIFICIO] Quia ibi facilius nascitur *ὑπερδερμῶσις* & assurgit,
quæ ichor exit, vbi tenèrius & mollius est orificium, quàm vbi fistula est callosa. Est autem caruncula il-
la fungosa, documentum fistulæ contumacis, & saniei ferinæ.

**SED ILLÆ SANESCUNT FACILIVS, QUÆCUNQVE IN PARTIBVS CAR-
NEIS ET NERVO CARENTIBVS ORIVNTVR]** Tales enim fistulæ facilius cedunt reme-
diis quæ vel chirurgi manu, vel collyriis, adhibentur. Atque inter ea quæ sunt in manu, solenne est il-
lud quod ex Hippocrate Celsus expressit his verbis. *Propriam etiam animaduersionem desiderat fistula*
quæ est in ano. In hac demisso specillo ad vltimum eius caput, incidi cutis debet: dein nouo foramine specillum edu-
ci lino sequente quod in aliam eius partem, ob id ipsum perforati, coniectum sit. Ibi linum prehendum ac vinci-
endum cum altero capite est, vt laxè cutem quæ super fistulam est, teneat. Idque linum crudum esse debet, ac du-
plex, triplexve, sic tortum vt vnitas facta sit. Interim autem negocia licet agere, ambulare, lauare, & cibum ca-
pere, perinde atque sanissimo. Tantummodo id linum bis die saluo nodo ducendum est, sic vt subeat fistulam pars
quæ superior fuerit: neque committendum est vt id linum putrescat, sed tertio quoque die nodus resoluendus; & ad
caput alterum, recens linum alligandum: educto vetere, id in fistula cum simili nodo relinquendum. Sic enim pau-
latim cutem quæ supra fistulam est, incidit, simulque & adsanescit quod à lino relictum est, & id quod eo morde-
tur, incidit. Hac ratio curationis longa, sed sine dolore est. &c. Secta fistula, incidere mollem spongiam oportet, &
quàm tenuissimam imponere; deinde florem aris vsu per specillum in fistulam conicere, &c. Cætera autem me-
dicamenta quibus & fistulæ curatio, & symptomatum eius correctio suscipitur atque absoluitur, sunt
apud Hippocratem.

Hipp. lib. de
fistulis, &
Cels. lib. 7.
cap. 4.

Lib. 7. cap.
4. de fistulis.

APPENDIX.

QVIBVS MORBIS QVÆ ETATES SINT AFFECTÆ.



Α Δ Ε πρὸ ἥλης ἔ γίνεται νοσήματα· πνευμονικὰ,
πλευρηκὰ, ποδαγρικὰ, νεφρίτις, κίρσος πρὸς κνήμην,
ρῶις αἱματιπρὸς, καρκίνος μὴ σύμφυτος, λευκὴ μὴ
συγκυανὴς, κατάρροις νοσήματα, αἱμορροΐς, μὴ σύμφυτος
χορδαψός. τούτων τῶν νοσημάτων πρὸ ἥλης ἔ γινέται
δέχεσθαι χρυσόμυρον οὐδέν.

I Sanè hi morbi ante pubertatem non enascuntur; peripneumonia,
pleuritis, podagra, nephritis, varix ad tibiam, cruentum profluvium,
cancer nisi congenitus, leuce non innata, catarrhus dorsalis, hamor-
rhois, neque chordapsus nisi congenitus. De quibus morbis ante puber-
tatem futuris, non est verendum.

HIC SINGULARIS animaduersio est ætatum quibus τὸ ἐπιδεκτικόν sunt in promptu, vel abfunt, morbis quibusdam arcendis vel admittentis. Sunt autem τὸ ἐπιδεκτικόν, causæ in nobis partæ, vel infusæ à natura, quæ non minorem vim adferunt morbis gignendis quorum illæ sunt capaces, & ipsos excipiunt atque fouent, quàm τὸ παθητικόν inferendo, tam intrâ, quàm extrinsecus. Ac sanè τὸ ἐπιδεκτικόν sunt in communi ac peculiari cuiusque natura, quæ cernitur in temperamento, complexionem, compagine, & humoris morbifici dominatu. Quorum in corpore per ætates sic ratio cõparatur, vt magna aut nulla eorum sit conspiratio qua morbi nascantur, incidente vi aliqua efficiendi. Maximum enim est, inquit Galenus, in corporis affectione momentum ad ea quæ cuique accidunt suscipienda. Nec minùs in vitio est τὸ ἐπιδεκτικόν excipiendi, quàm τὸ παθητικόν inferendo, cum alicuius morbi calamitas in hominum vitam inuadit.

10 Sed ea vitia excipiendi, & commoda procul arcendi morbos, aut certè non admittendi, fugiendique, præsidia sunt in ætatibus quarum conditio mutationem adfert complexionis, temperamenti, atque compaginis, & humorum: proptereaque incommoda valetudinis, tam in generatione, quàm in paroxysmīs morborum: sicut & contrâ, opportunitates atque præsidia secundæ valetudinis, dum pari ratione morbos arcant cum aduentarint; eosque cum pridem iam venerint atque regnarint, abigunt. Sic epilepsia τὸ ἐπιδεκτικόν est puerilis ætas, cuius τὸ ἀπαλλακτικόν est pubertas, διὰ τὴν ἐκράμψιν, i. propter splendorem & lumen caloris natiui qui antea sopitus erat. Talis discessio esse solet siue ἀπαλλαγή multorum morborum in senectute, quorum erant fomites, ætatum vitio exactarum; ob eamque causam ἡ σιωπῶσα nomine appellatur. Sed ea generatio & paroxysmī, morborum σιωπῶσα, quæ vitio est ætatum; sicut earum omnia τὸ ἐπιδεκτικόν καὶ ἀπαλλακτικόν, quæ ipsarum merito morbos admittunt vel abigunt, accuratè sunt tradita in Epidemiis & aphorismis: tum à nobis alibi examinata, vt illa supersint examinanda quæ scripta sunt in hac prognosi.

6. Epid. part. 5.

SANE HI MORBI ANTE PUBERTATEM NON ENASCUNTUR] Quod eorum nulla est opportunitas excipiendi, nec vlla vis efficiendi, illis ætatibus quæ infra sunt pubertatem. Sunt autem, triplex infantia & pueritia. Nam pubertatis tempus intra est adolescentiam, cum scilicet vox incipit edi asperior, & venus agnosci, quod vocat præceptor ἡ ἀγρίη καὶ ἀφροδισιάζειν.

6. Epid.

PERIPNEUMONIA.] i. Phyma pulmonis φλεγμοναδὲς, cuius hæc sunt incommoda siue symptomata; meteorismus in spirâdo, calida expiratio, dolor sub omoplate, qui prorepat ad iugulum; pectoris grauitas, febris acuta, anxietas atque iactatio, delirium quoque ipsum. Ac talium quidem nec generatio est, nec paroxysmus donec ventum sit ad pubertatem: quod illis temporibus quæ natura & ordine pubertatem præcedunt, nulla est concitatio neque collectio αἵματος ἐφθαρμένον διὰ τὴν χολίαν, i. sanguinis à bile corrupti, vnde assurgat phyma quod nomen habeat occupati pulmonis, & peripneumonia nominatur: quod illis ætatibus, i. infantia triplici & pueritia, nulla est sanguinis redundantia, qui ad incrementum simul & ad nutritionem absumentur: nulla item causa organici ad rheuma ῥευμώμενον, vbi sanguis non est tenuior, nec qualitate acrior atque calidior. Quid enim sic cum faceret ἰχθυοειδὴ ad organum in puerili corpore quod magisterio regitur caloris natiui, vel eo certè abundat; ob eamque causam est αὐξάνει καὶ αὐξάνομενον, i. incrementi capax & particeps? Atqui nullum φῦμα enascitur φλεγμοναδὲς peripneumonicum, vbi sanguis in vitio non est, μήτε ἡ τὸ πλῆθος, μήτε ἡ τὸ πάθος. Quinetiam illud adiicitur securitati, quod nullum est τὸ ἐπιδεκτικόν peripneumoniarum in natura pueri bene morata, benèque cõstituta, cuius hoc loco securus erat Hippocrates cum hæc scripsit, ratus ὅδεν ἔστι τὸ σωόνδης ὡς φῶς, i. nullam esse victus ac vitæ consuetudinem contra naturam: vt nihil aliud esset illis temporibus, more suo viuere, quàm lege institutis quæ natura. Ergo peripneumonia ἀνεύει in pueris & infantibus, considerari debet illis ætatibus, atque referri πρὸς ἐνδοίαν ἢ ἐξοίαν, i. ad penuriam & paupertatem eorum quæ intrâ sunt inutilia, vnde nullum est τὸ ἐπιδεκτικόν τῆς περὶ πνευμονίας. Penuriam autem dico ac paupertatem inutilem, non quidem omnium (nam multa sunt τὰ ἐνόντα infantia & pueritia quibus illarum ætatum morbi succrescunt atque pullulant) sed eorum è quibus nascitur peripneumonia. Cæterarum autem causarum peripneumoniarum, extrinsecus incidentium à diætâ & spiritu, quibus τὸ παθητικόν continentur, maleficientia non quidem in totum arcetur à pueritia, sed tamen infringitur contumacia excipiendi.

PLEURITIS] Quæ ab infantia & pueritia repulsam habet, quemadmodum & peripneumonia: quod illis ætatibus non est causa efficiendi pleuritidem ab iis quæ intrâ sunt inutilia, siue incommoda: nec etiam excipiendi, quia non est rheuma ῥευμώμενον, μήτε σιωπῶμενον, i. neque concitatio neque collectio humoris pleuritici. Nam puerorum sanguis non est in vitio διὰ τὸ πλῆθος καὶ πάθος, vt inde phyma pleuriticum assurgat in tunica costis intexta; vnde spirandi angustia, tussis, & febris, ac dolor pungendo asperimus excitetur. Causæ adductæ sunt modò in peripneumonia.

PODAGRA] Quæ dolor est atque febris omnium quæ in articulos incidunt acerbissima, quam excitat membranarum quæ sunt in pedibus inflammatio, nara, vt scribit Hippocrates, ἀπὸ τῆς αἵματος ἐφθαρμένης τῇ ἐν τοῖς φλεβίοισιν ὑπὸ χολῆς καὶ φλέγματος, i. corrupto sanguine qui est in venulis à pituita & bile; proptereaque talis podagra est omnium arthritidum βίαιωτάτη, ἐπὶ λήξεσσι τῶν, καὶ δυσπαλλακτοτάτη, i. vehementissima, longissima, quæque exoluitur omnium difficillimè. Sed ea corruptio sanguinis à pituita & bile in pueritia ætatum mitissima, nunquam in mentem venit medico sapienti, cum viuiter conuenienter ei ætati, sicut Hippocratis sæculo vivebatur. Vt vana sit ostentatio eorum qui nunc exultant iuueniliter, ac si fabam in placentâ inuenerint, certantque illudcere summo Hippocrati, quod eam podagraz ἀνεύει & vacuitatem in pueris, solenni aphorismo ratam esse voluerit, quem ita conscripsit. Πᾶς ὁ ποδὰρ ἐξ ἀφροδισιάζει, i. Puer non tentatur podagra, priusquam agnouerit venerem, vel exercuerit. Itaque dignam Hippocrate, i. ἀπὸ τῆς λόγῃ, sententiam volunt explodi, vt falsam; & nostraribus pueris podagram vidisse se, prædicant atroganter. Quàm autem bene, viderint sapientes, qui meâ hæc legerint.

lib. vii. cap. 26.

NEPHRITIS] i. Quadruplex renum morbus; quorum primus est inflammatus renis & calculosi. Alter venularum ruptarum in renibus, cum nimis repletæ fuerint, aut vim expertæ violenti laboris, unde nascitur vlcus *μυζων*, i. quod pariter cutim contra se afficit, cum sanguis meiendo exiit. Tertius est renum proluiem rubram fundetium, instar cuiusdam ichoris aslarum carniū bubularum. Quartus est renum dolor qui occupat lumbos & ilia, similiter vt quæ parturiunt. Atque is dolor nascitur à pituita & bile ibi collectis: tum etiam si quis immodicè venerem exercuerit. Omnium harum nephritidum ne vna quidem in pueritia locū habet; nec vlla earum generatio est *ἀπὸ τῶν ἐνέοντων* in pueris, nec *ἀπὸ τῆς ἐκείνης* nisi quis edacitatem causetur. Nam vt attingam primum genus nephritidis, non minor hīc cernitur difficultas mouendæ inflammationis in rene pueri, quàm in tunica costis intexta; vel in pulmone ipsius: quoniam nulla in puero causa subest concitandi & colligendi humorem, ad inflammationem renis mouendam. Id certè *ἀπὸ τοῦ νεφράτος* nequit accidere, vt accidit sæpe iuuenibus merito iuuentutis; sicut & renum per vrinæ ductus hæmorrhagia, & sine *νεφράτος* vel prauidentia. Sed calculosi renis materiam & occasionem in pueris præripit, ne scilicet fiat in rene coagmentatio lapidosa, meabilis humor pueri atque mearus, virtute caloris natiui, cuius officium est vitare *γλυκύναντα*, & glutinosum humorem coquendo mutare *εἰς τὴν ὀλίαν*, i. in meabilem atque lubricum. Ex quo efficitur, vt in vesica pueri, & non in rene, coagmentatio sit lapidosa quam vocat præceptor *τὸ σπύμα μετὰ τὴν ὕρην*. Ideoque scribit, *μετὰ τὴν ὕρην* coagmetari calculum, non *μετὰ τὴν ὕρην*; quod in vesica id fiat, vbi perfecta est *ὕρην*, & sero è venis illuc perducto nomen est vrinæ, non autem in renibus, vbi nondum est *ὕρην*; nec dum illud serum quod ad vesicam transmittitur, nomen habet vrinæ, priusquam fuerit eò transmissum. Coagmentatur autem ex facili humor paulò antè factus meabilis: quoniam in vesica frigida, sanguinis & carnis experte, crassus sit denuo & glutinosus; proptereaque cunctando faciliè lapidescit. Sed huius exercitationis de calculo puerorum, regula est in illa sententia præceptoris, tamen si quasira, non autem enunciata. *Τὸ μετὰ τὴν ὕρην σπύμα παρὶν (ἢ μάλλον, ἀπὸ τῆς θερμότητος)*, i. Coagmentatio pueris magis perfecta vrinæ ductu, an quia calidiores? Vbi calorem puerorum calidiorum; illum quidem intelligit, authore Galeno, cuius virtute omnis est actio naturalis bene morata, in coquendo, distribuendo, & excernendo. Cætera autem genera morborum renalium quæ ex Hippocrate modò adduximus, nulla est æquitas suspicari posse in pueros cadere, merito pueritia.

VARIX IN TIBIA] Quem facit in cruribus atque tibiis venæ *αἰσώπης*, quæ assurgit è sanguine crasso & melancholico, cuius ne vlla quidem suspicio est in pueritia.

CRVORIS PROFLVIVM] Quod cernitur vel in narium hæmorrhagia, vel in dysenteria cruenta ab hepate, vel vomitione sanguinis è pulmone, vel in cruore prorupto è renibus, cum sua sponte prorumpit: quoniam in pueritia nihil eiusmodi esse potest, *ἐξ τῆς πλῆθους*, ἢ *πύθους*, i. qualitate aut copia sanguinis quem illa fert ætas. Nec verò tanta est *ἀνία* viscerum per id ætatis, vt sursum deorsumve diffuant ea sanie quam vocat præceptor *σπέναν* in *ἐξερύπνῳ*.

NEQVE CANCER] i. Phyma quod paulatim ab atra bile assurgit, vbiuis illa exudat expressa è venis: quæ si in pueris nulla est, nulla etiam videri potest ea ætate materia, nec occasio carcinomatis effingendi, cuius idea nota est.

NISI CONGENITVS] *Μὴ σύμφυτος*, i. qui non sit vnà cum puero & cum ætate connatus, vt scilicet fomes eius sit in natura pueri, ipsum verò phyma conceptum assurgat in pueritia, vt scilicet phyma illud sit *ἐκείνη*, i. germen ingenerati in semine vitij quod vnà cum pueri conformatione concreuit. Nota est illa sententia præceptoris, qua gentilitij omnis morbi ratio continetur. *Ὁ γὰρ γένος παρὰ τοῦ σώματος ἐκείνου* *ἀπὸ τῆς ὕλης ὅπου ὁ γένος*, *ἀπὸ τῆς ὕλης ὅπου ὁ γένος*, i. Gentitura enim vndeque procedit; sana quidem à sanis, morbi da item à morbidis. Atque non inde solum temperatio est atque complexio, sed etiam conformatio; vt è macrocephalis arte factis nascantur natura similes macrocephali. Sic igitur *τοῦ σώματος καὶ φύσεως*, i. natura & constituta hominum, mutuas tradunt operas ad ideam quæ cernitur in temperamento, complexione atque figura. Nec verò mirum videri debet si è macrocephalis arte factis nascantur similes macrocephali: sic etiam virulenti ex iis quos veneris occupat virulentia. Scitum est illud Baptistæ Mantuani, quod ante me, præceptor Syluius vsurpauit.

Quæ vires in foliis, venit ab radicibus humor.

Sic patrum in natos abeunt cum semine morbi.

Sed illa morborum fœtura, non est ætarum merito, sed vitiatæ naturæ.

LEV C] i. Elephantiasis alba, vel vniuersi corporis, vel aliquarū partiū, nata ex carnis & cutis cachexia, quam vetus pituitæ putris & falsæ cacochymia induxit, ex vitio hepatis & hepatitis venæ quæ illam fundit cacochymia per venas *αἰμώδεις*, in venulas cuti & carni affixas, nutriendi causa. Itaq; rheuma consistēs leuces, nutritio est deprauata quæ partiū alendarū colorē, characterē, & molē immutat, sicut iudicium est præceptoris cum ait. *Τὴν μὲν ἰδίαν ἰδίῳ ἐξ ἐκείνης* *τὴν δὲ κοινὴν ἐξ ἐκείνης*. i. Propriam quidem edit ideam; priorem verò destruit atque obliterat. Itaque *συνεπαρτέοντες ἀλλήλοις* *ἐς τὸ κακὸν ἢ κακοχymία καὶ ἡ καχεξία*, i. mutuas tradunt operas ad perniciem cacochymia & cachexia. Vt enim cacochymia vetus, *εὐχέλιαν* immutat & labefactat: sic firmiter pressa in corpore cachexia, *τὴν εὐχέλιαν* corrumpit, & similem sibi apponit. Ergo res eunt malè in alterutro vitio cachexia aut cacochymia, pessimè in vtroque; cum scilicet huius pœnitentia, quæ est à fonte humorum; illius verò firmiter fixa impressio in complexione & statu partium solidatur, quarum naturam in lepra & leuce omnino labefactatam scribit Galenus ad prorrheticum 17. lib. 2.

NON INNATA] *Μὴ συγγενής*; ac si diceret. Leucen illam excipio cuius in vitio genitura seminarium olim fuit, & quæ cum puero nata est simul, & quæ cum ætate, positis in naturæ vitio fundamentis, paulatim, vt solet, accreuit, ac tum in pueritia suæ corruptionis signa ostendit in statu mutato partium solidarum

6. Epid. part. 3.

Ibid.

lib. de acerb. locis, & aquis.

50

60

lidarum; maximè autem aspectabilem, ut carnis & cutis. Sic enim agnosco τὴν συγγένειαν καὶ τὴν συγγενήσαντι πύριν, in complexionem & statu partium solidarum, ubi est ipsa leuce: sicut præceptor agnouit in ea corporis fabricatione, cuius à mala conformatione δὲ τὸ πλεονέκτης ἀπορροῦν ἀδυναμίει, i. ab impotentia conformandi, inclinatio est excipiendi atque fouendi phthisin. Sic enim causam interitus posuit in filia Euryanactis. Ἡ δὲ πύρινος φθισιδες. Et. Peribant illi potissimum, εἴτε ἡ φύσις ἐξέρπει δὴ τὸ φθισιδες. Inde homines dicuntur φθισιδες, qui capite sunt turbinato, angusto pectore, & dorso alato: quæ omnia sunt planè συγγενή, & mala inde nata συγγενή.

10 CATARRHVS DORSALIS] Quem ciet ἡ φύσις τῆς πύρινης, cuius hæc apud Hippocratem historia est. Ἡ φύσις τῆς πύρινης δὴ τὸ μὲν γίνεταί. λεμβάει δὲ μάλα νεογνούς καὶ φιλαλάγους. γίνεταί δὲ ἄπυρος καὶ ἐάσει ἀγαστοί, & πύρινοι. καὶ ἡ ἑρπας αὐτῶν, φθοῖ οἱ αὐτοὶ δὴ τὸς κεφαλῆς καὶ τὸν ῥάχιν κατέρχεται διὰ τὴν, εἰς μύρμικας, καὶ ἐπὶ τὴν ἑρπῆς δὴ τὸς πολεῖται οἱ πόρος πολὺ καὶ ὑγρὸς, καὶ ἡ γυνή ἐκ ἐγγίεται, καὶ οἰκίρως, καὶ συγγενή γυναικὶ, καὶ μὴ. &c. i. phthisis dorsalis à medulla est. Corripit autem potissimum nouè maritos luxuriosos. Febre carent, & cibos capiunt. Eos si interrogas, ecquid patiuntur mali; respondebunt à capite supernè deorsum secundum rachin, decurrere videri velut formicas: urinam autem emittendo, semen multum effluit humidum, ad gignendum ineptum; noctu denique polluantur, siue concumbunt cum muliere, siue abstinent. Ergo catarrhi dorsalis nunquam in puero causa erit, cum veniat à tabe dorsali, cum scilicet dorsi medulla exoluitur culpa eorum quos multum exercet crebra exercitatio coeundi. Pueros autem non incessit ea libido venerea, qui venerem nondum agnoscunt. Nec verò iis inuitis semen effunditur, & ante urinam copiosè non fluit, quod nullum est. Ex quibus efficitur, ut in dorsalis tabis vacuitate, nullus è capite per spinam excurrat catarrhus, qui sensationem excitet pererrantium fornicarum, quem hic præceptor nominat catarrhum dorsalem.

lib. 1. de morbis.

20 HÆMORRHOIS] Quia in pueris nulla est cacochymia melancholica, per hæmorrhoidas expurganda; nec vlla plethora venarum quæ adiacent lumbis, per hæmorrhoidas vacuanda. Quæ duæ omnino sunt causæ cur hæmorrhoides non sint in pueris: quoniam aliunde cieri non possunt. Nec verò pueriles morbi eiusmodi sunt ut ἀπόσπῃ ἐδὲ moueant.

NEQUE CHORDAPSVS] i. Tractabilis chorda ab ileo cruciatus, cum scilicet ad vltima ventū est intestini tenuis inflammari, vel nimia & contumaci cruditarum oppressione distenti, adeo ut in sensum veniat contrectantis; propterea que nomen habet chordapfi à chorda tractabili, quæ est veteribus tenue intestinum. De natura ilei supra iam diximus.

30 NISI CONGENITVS] Hic sanè in incerto est mihi quid statuā de chordapso congenito. Adducor enim facilius ut credam in pueritia gigni chordapsum, quàm edi congenitū. Nam ipsa edacitas pueri, ac cibi nō præmāsi ingluuies, causam & occasionem dat intestino tenui ad chordapsum: de causarum perspicientia, vnde chordapsum enascitur. Sed ipsum esse congenitū iam inde à fœtu in vtero, non hercle video quid eam oppressionē intulerit intestino, vel inflammationem mouerit, vnde chordapsum assurgat. Et verò tam crudelis ilei nō ea est diuturnitas, ut fœtū comitari possit in partu; nec si cum fœtu venerit, lucis vsuram ei vel biduum ad summum cōcesserit. Quid igitur statuam de chordapso quem author excludit à pueritia, nisi cōgenitum; quod scilicet illa ætate gigni nō possit, cum tamè reuera nō sit ἀγύμνως, sed minimè σύμφυτος, ut ipsa rei natura planè ostendit? Enimvero tāta hic fuit animi mei cōtentio, ut abstrusa veritas in nominis chordapfi aucupio, tādē in lucem prodierit. Itaque reuocaui animum ad cogitationem chordapfi quem facit latus vermis, qui tum in fœtu enascitur dum vtero geritur; nō autem ætatibus infantie & pueritiæ, postquam in lucem venit ex vtero. Eius chordapfi talis recensio est apud 40 Hippocratem. De vermibus autem latus mea sic ratio est. Ato enim ipsos nasci in puero dum est in vtero. Non enim, postquam è locis exiuit, tantum est temporis feci in aluo, ut ea cunctante ac putrescente animal tāta magnitudinis ibi concresecat. Nam homo quotidie pridianam facem excernit, ut secunda gaudeat valetudine. Sin autem diu multumque fax in aluo non ducta subsisterit, tale animal gigni poterit. Itaque multa in fœtu gignuntur hoc modo, dum vtero continetur. Nam cum in fœtu accensum pus fuerit à lacte & sanguine computrescente ac redundante; quia id dulce est, animal ibi consurgit, &c. Ex quibus efficitur, commemorata puerorum mala, non quidem nata vitio pueritiæ; sed ipsis connata iam inde à fœtu; in vtero talia exoriri, quatenus ipsa edit vel seminis fabricatio, vel nutritus, quem fœtui fœta ipsa de suo impertit.

DE QVIBVS MORBIS ANTE PUBERTATEM EVTVRIS, NON EST VERENDVM] Infantie quidem merito & pueritiæ: sed vitio concepti fœtus de semine alterutrius parentis, vel vtriusque: cum etiam ἡ τὸ βίαιον extrinsecus incidentium, & si conuenienter non viuatur illis ætatum naturis.

2. Από δὲ ἰδ. μέχρι μβ. ἐτέων· πάμφορος ἡ φύσις νοσημάτων ἥδη τῆς σώματος γίνεταί. πάλιν δὲ ἀπὸ ταύτης τῆς ἡλικίης μέχρι ξγ. ἐτέων οὐ γίνονται χοιράδες, οὐδὲ λίθος ἐν κύστει, ἢ μὴ τύχη πῶς ἑτέρῳ ὑπάρχων, οὐδὲ κατάρροις νεοπαῖς, οὐδὲ νεφελίς, ἢ μὴ παρεκκολουθῶσι εἰς ἄλλης ἡλικίης· οὐδὲ αἱμορροΐδες, οὐδὲ τοῖς αἱματηρὸς, ἢ μὴ πῶς ἑτέρῳ τύχη γενησιν. ταῦτα μέχρι γήρως ἀπέχεται νοσήματα.

Sed à decimoquarto ad quadagesimum secundum annum; natura iam morborum corporis feracissima est. Rursum ab ætate hac usque ad sexagesimum tertium vitæ annum, struma non enascuntur, nec in vesica lapis, nisi prius extiterit; neque dorsalis catarrhus; neque nephritis, nisi ex alia ætate huc deducta fuerit; tum nec hæmorrhoides; nec etiam cruoris profluuium, ni prius natum fuerit. Denique tales morbi non veniunt, donec ventum sit ad senectutem.

QVEMADMODVM pueritia & triplex infantia, suo merito sunt expertes morborum quos modò recensui; quia non sunt eorum capaces; id verò ex mente ac scopo authoris demonstrasse me arbitror. Nunc ventum est ad pubertatem, vbi τὰ ἀπαρχικά terminantur priorum ætatum, & τὰ ἐνδεκτικά prædictorum morborum ac cæterorum omnium continentur. Quænam autem sit ratio in pubertate excipiendi, sicut in pueritia propulsandi morbos prædictos, iam aggredior ad demonstrandum.

SED A DECIMOQVARTO AD QVADRAGESIMVM SECVDVM VITÆ ANNVM] Quo vitæ cursu adolescentia, pubertas, iuuentus, ad summum exactæ, successionem habet constantis ætatis. Dixi autem, ad summum: quia iuuentus eo anno 42. vltimus non excurret, quæ in plerisque finitur 35. anno. Testis est illa sententia de phthisi ab hæmorrhagia & hæmoptysi pulmonis, cuius capacitas καὶ τὸ ἐνδεκτικόν est illis ætatibus quæ sunt à 18. ad 35. annum, i. in pubertate ac iuuentute. Testis & illa de crisi quæ illis ætatibus per excretionem suscipitur: quia tum maximæ sunt opportunitates excernendi; naturæ robur, humor meabilis, & libertas meatuum. Testis & illa hæmorrhagia ephëborum quæ finem habet 35. anno, vel ad summum, 40. Ac pubertatis quidem parens est adolescentia, quam inchoari scribit exacto 14. vitæ anno; cum scilicet venus agnosci, & vox mutari incipit ex acuta in asperam, ob inæqualitatē crescentis arteriæ: quod vocat præceptor ἀγρίζεν καὶ ἀφροδιζάζεν: sicut ipsam finiri vocē asperam, graui facta. Ergo. A XIII. AD XLII. VITÆ ANNVM] Quo tempore homini vale dicitur iuuentus, ac tum regnare incipit constans ætas, comite sapientia, per quam tum homo vitam instituit.

NATURA IAM MORBORVM FERACISSIMA EST] Non eorum modò quos non excipit pueritia, sed à se propulsat; idque suo merito: sed omnium etiam quos in vitam hominum causæ immittunt morbificæ ἢ ἀπὸ τοῦ ἐνδοῦ, ἢ ἀπὸ τοῦ ἔξωθεν. Atque ab iis quæ intrā sunt inutilia, non minor vis est efficiendi, quàm excipiendi morbos qui regnant merito pubertatis & iuuentutis: & verè illarum ætatum sporadici nominantur; vt sui sunt etiam pueritiæ atque infantia, quæ tamen propulsant prædictos, sicut eos admittunt & cæteros omnes adolescentia & iuuentus. Ratio quidem efficiendi morbos ab iis quæ intrā sunt incommoda pubertatis & iuuentutis, cernitur primùm καὶ τὸ πλεονος καὶ πένος, in copia & affectione sanguinis qui regnat illis ætatibus. Copia in vitio est, quæ ampliùs non absumitur incremento, si exitum foras non habet liberalem & liberum. Hinc mulieribus atque viris fortuna est illorum symptomatum quorum vindices esse solent muliebria mulieribus, & viris hæmorrhagia; tum eius loco, hæmorrhoides. Sed variæ sunt idæ sanguinis, qualitate malè affecti, cum scilicet eiusmodi est ichorosum ἢ ἐφθαρμένον, ὥστε τὸ φλέγματι καὶ τῆς χολῆς, i. corruptum à pituita & bile: tum etiam quando est ἀκαρπύον, i. meum. Sed corrupti sanguinis vitio atque incommodis multum adicitur, cum esserus mouet organum ad eas partes quarum potentia est in ἐνδοσίῳ, i. vniuersitate, aut quarum officio vitam carere non potest. Inde nascuntur symptomata capitis, cerebrique repleti, cephalalgica, paraphorica, cataphorica, & catarrhoica. Hinc venit angina, pleuritis, peripneumonia, empyema, & phthisis. Hinc febrium genus omne, periodi, paroxyismi, atque symptomata: tum abscessus tam critici, quàm symptomatici; tam intus, quàm foris. Nam cæterorum humorum qui segregati à sanguine, morbos edunt, tam intus, quàm foris, in omni œconomia partium nutritiarum, spirabilium, & animalium, infinita esset recésio. Ponite vobis ob oculos symptomata omnia tam vniuersi corporis, quàm partium singularū; in his profectò nullum videbitis quod non principia causasque duxerit ἀπὸ τοῦ ἐνδοῦ iuuentutis & pubertatis. Quæ autem symptomata extrinsecus enascuntur; sporadica quidem, à diætā; epidemica verò, à spiritu: ne longum faciā, omnia illis ætatibus locum habēt, quas esse diximus à pubertate ad quadagesimum secundum vitæ annum. Sed tamen quorundam sua sunt ἐνδεκτικά τε καὶ νοσητικά, magis & minus in hac aut illa ætate.

RVRSUM AB ÆTATE HAC] Quæ est humanæ vitæ σωτηρικὴ, & quam ingressi homines, dicuntur σωτηρικός, i. constantis ætatis & vitæ, vbi cessat ὀρεσμός humorum, καὶ τὸ ἐνδοσυμπτικόν καὶ τὸ συμφοδές, i. concupiscentia & animositas, feritate domita, mansuescunt in viris; ac tum in corpore summa est æquabilitas atque proportio τῆς πειστικῆς καὶ τῆς ἐκπνεῖς, i. affluentia & effluentia, ne quid nimis. Tum, eā exactā, principium esse senectutis, cum iam labascit illa quam modò posui analogia τῆς ἐκπνεῖς καὶ τῆς εἰσπνεῖς: sicut aperte ostendit illa sententia præceptoris. Τέροντες εὐφοροῦνται τῆς αἵματος πέποιος· δύνανται εἰ καθεστῆναι. i. Senes inedia patientissimi sunt; mox homines constantis ætatis.

VSQVE AD SEXAGESIMVM TERTIVM VITÆ ANNVM] Quo cæterarum ætatum iam exactarum conspiratio est ad ea vitæ incommoda quæ hic nascuntur, cum primùm senectus est, ingratumque corpus, non ita meabile, vt solebat, nec perspirabile in cruditate, putredine, & concretionem humorum qui pessimè habent senes in pepasmo difficili. Nota est illa sententia præceptoris. Βεγίνοι καὶ ἀρρωστοί.

ἀνδρῶν τῶν ἀποδύα ἀρετῆς οἱ πενήτωρες, i. *Raucedines & coryza, decrepiti non matureſcunt.* Quod certe, ut aph. 39. a. fecit vitæ curriculo locum habet cum ad vltima ventum est ſenectutis: ita pepaſmi difficilis principia ſunt eius initio, & inde paulatim itor ad crudiratem extremam. Initium ſenectutis hic poſuit 63. vitæ annum, quod alibi retulit ad 60: ſicut etatis mature carceres primùm ait ſolutos 42. anno, quos alibi aperit 40. Scitum eſt illud. *Ἀποπληκτικοὶ δὲ μάλιστα γίνονται ἡλικίᾳ τῇ ἀπὸ πενήτη ἔτιον ἀγῶν ἐκκινῶνται.* i. *Apoplectici maxime ſunt ea ætate quæ eſt à quadreſimo anno ad ſexageſimum.* Qui locus eſt de apoplexia melancholica, ubi maturam ætatem ſcribit abſoluere curſum ſuum à carceribus ad calcem, exacta ætate quæ eſt à quadreſimo ad ſexageſimum vitæ annum; quo tẽpore ipſam ſenectus excipit. Quemadmodum igitur pueritia morbos nō excipit nec admittit ſuo merito, quos facit *ἐνρασμός*, humorum corruptio, & conſpurcacio ſanguinis bilioſi καὶ *ἰχθυοειδὴς* in pubertate & iuuentute, ipſumque etiam τὸ *ὀντισυμπαῖον* καὶ τὸ *συμπεδῆς* quod illis regnat ætatibus: ita conſtans ætas ſue matura modò deſcripta, rerum illarum morbiſicarum dominatu atque imperio liberata: ſi quidem illi conuenienter viuunt, ut eſt ipſa priorum ætatum, recto & inoffenſo curſu, bene morata; non eſt obnoxia morbis illis quorum his verbis recenſio eſt.

STRUMÆ NON ENASCUNTUR] Quia tum firmæ ſunt partes ac validæ, quibus naturæ commoda comparētur, atque incommoda propulſentur; ob eamque cauſam non eſt collectio, neque corruptio; non item appulſus humoris morbiſici, nec opportunitas glandularum vnde aſſurgāt ſtrumæ illa ætate, ſi regitur natura duce, & comite ſapientia. Sunt autem ſtrumæ, tubercula, vel, ut præceptor ait, *aph. 6. 3. & lib. 2. proſtræ* phymata glandularum, quæ in eam molem aſſurgunt imbutæ prouentu pituitæ putris & falſæ, quæque ſua feritate maligna inflammationem mouet acerbam, cum acceſſione tumoris, ac tenſione cuiuſdam pelliculæ qua inuolutæ ſunt illæ ſtrumæ, intra quam ipſæ augentur & creſcunt, ut viuæ quædam mola, ſecuræ omnium cataplaſmatum & emplaſtrorum quæ vulgò adhibētur chirurgorum audacia quorum temeraria medicina eſt. Tantum præſidia ſunt in manu, ſi nulla ſit inflammatio, quæ omni ratione primùm debet arceri & abigi, ne circum radicibus illæ cancriſcant, more arborum quas Theophraſtus narrat ſparſis huc illuc radicibus, *καρκινώδεις*. Sed de ſtrumatum origine, quæ rectè Galenus cenſet *καποχυμῶ* *aph. citato.* *πληθὺς ἐκ γὰρ τοῦ σπύματος, ῥέματος ἔξω π καὶ αὐτὸς τὸ δέπμα, i. cacochymia redundantia fluente in cutem:* ſolennis eſt illa philoſophia præceptoris quam ſic Latine expreſſi. Quod verò attinet ad ætates, phymata in pueris mutantur, atque hæc quidem ſtrumofa quamplurimos occupant pueros, vnde diſcedunt ex facili. Sed tamen ex pueris proueſtioribus, ex ipſis iuuenibus, ut rariùs illæ naſcuntur, ſic abeunt difficiliùs. Verùm in viris perfectis, huiuſmodi ſanè phymata non admodum oriuntur. Ergo in matura ætate, rara eſt aut certè nulla huiuſmodi phymatum generatio, eorūque tum præſidia ſunt in manu Regis Chriſtianiſſimi.

NĒC IN VESICA LAPIS] Cuius quidem generatio eſt, craſſi & glutinoſi humoris lapidoſa coagmentatio in veſica, vnde ſunt homines propriè *λιθώτες*, ex illo Hippocratis ſacramento. *Ὁν πρῶτον δὲ ἰδὲ μὲν ἡ νόσος.* Nam ſectio eſt lapidis in veſica, non autem in rene. Lapidis autem veſicæ propulſatio eſt in matura ætate: quia tum gignendi eius nulla eſt cauſa efficiens nec materialis. Eſt enim vis firma expulſrix veſicæ, & glutinoſi humoris vacuitas. Ac generatio lapidis in veſica ſuo loco ſcripta eſt conuenienter ad mentem authoris.

NISI PRIUS EXTITERIT] *Ἡ μὴ πρὶν αὐτῶν παρῆναι, i. ſi res ita non tulerit, ut prius extiterit,* quod vocat præceptor *αὐτῶν παρῆναι*. Quod eſt eiſmodi ac ſi diceret. Si antequam ventum ſit ad veſicam, lapis non fuerit; primigenia eius coagmentatio in veſica non erit: ſin autem ſit *αὐτῶν παρῆναι*, i. in rene calculus, atque is in veſicam prolapſus non exeat; dubium non eſt quin corticatum creſcat, vnde affurgit lapis veſicæ. Ergo ſi iuuenis fuerit calculoſus in rene, idem eſſe poterit in veſica, conſtanti ætate, quæ, ſuo merito, illius calculi capax non eſt, ſicut alieni eſt particeps.

NEQUE DORSALIS CATARRHVS] Qui eſt *ὀδὲς τοῦ πλάτος*, de qua nuper diximus: quia tum homines deferueſcentibus cupiditatibus vale dixerunt vitæ volupuariæ, nec ſunt deinceps *φιλοδαρμοί, i. cultores veneris*, ſed virtutis.

NEQUE NEPHRITIS] Quam excitat inflammatio ſive calculus: nam vtriuſque propulſio eſt ab ætate; illius quidem, quia non eſt tum ſanguinis *πληθὺς καὶ πάθος*, nec vllum eius rheuma *ὀρμώμενον*: huius verò, quia non eſt cauſa efficiens in renis ardore, nec materialis in *κατεία* crudi & craſſi humoris, vnde ſit coagmentatio lapidoſa in rene.

NISI EX ALIA ÆTATE HVC DEDUCTA FVERIT] i. Vitio iuuentutis parta in rene, ibi manſionem habeat conſtanti ætate.

NĒC HÆMORRHOIDES] Quia tum cauſa non eſt hæmorrhoidum à cacochymia vel à plethora; nec vlla occaſio hæmorrhoidum ciendarum ab infania, vel à nephritide.

NĒC ETIAM CRVORIS PROFLVVIVM] In promptu cauſa eſt; ſanguinis mediocritas & moderatio.

NISI RES TYLERIT IPSVM PRIVS FVIſſE] A cauſis quæ non quieſcunt in conſtanti ætate, niſi deducta parte aliqua quotidianæ diætæ: ut in iis qui altero crure ſunt mutili.

DENIQUE TALES MORBI, AD SENECTVTEM VSQVE ABſISTVNT] Quoniam tales morbi non enaſcuntur, ſed inde abſiſtunt, ubi non adſunt cauſæ illorum morbiſicæ; aut certè ſunt inchoatæ, non autem ad vmbilicum vſque perductæ. Quarum duo genera ſtatuuntur: vnum, quod efficiendi vim habet: alterum, excipiendi; τὸ *παυτῶν* καὶ τὸ *ὀντισυμπαῖον* Græci vocant. Qualia certè non ſunt in conſtanti ætate, ſicut iam diximus: ſed in ſenectute, iam inde ab vltimo ſeptenario conſtanſis ætatis qui eam attingit, cauſarum generatio diuturna ſubitam adfert impreſſionem eorū morborum qui antè non erant dum viueretur matura ætate. Eſt enim ratum illud; quòd ſubita non eſt ac velut improviſa cauſarum generatio, ſicut morborum qui ab iis naſcantur. Solenne eſt illud Galeni.

comment. ad
hist. 4. part. 3.
Epid.

Πασις καὶς δὲ
anno clima-
ctico.

Οὐ γὰρ δι' ὧν αἰσθητικῶν ἡ φύσις τοσούτων ὄντων, ἔτι καὶ ἡ τῆς φύσεως αἴτια. i. Sanè, non vt morborum est repentina generatio: sic et generationis causa.

Quæ ratio si nota esset illis magistris qui proficentur scientiam climacterici anni, quem exigit atque percurrit sexagesimumtertius; non tam ridicula essent illorum triscurria quibus vanitatem suam, impia superstitione fucata, pro veritate ostentant. Sic enim conficerent atque concluderent; ideo fatalem videri sexagesimumtertium vitæ annum, quia tum homines morbis quamplurimis occupantur, à quibus longè aberant in ætate virili. Quod vt concedam verum esse: tamen non efficitur, vt occupari absumantur ab iis morbis cum regnare cœperint ea senili ætate, quos modò diximus abstinere à virili. Nec verò si ab iis obeant suum diem; obitus causa erit numerus sexagintatrium annorum: quia tum septies nouem anni complentur. Non enim ipsi numero, cuius nulla vis est, ferri debet accepta illa necessitas moriendi; sed morbi ἐφόδω, i. insultui: nec ea quæ cadit in senectutem; sed ipsi fato quod est ἡ φύσις πνεύματος, insu Dei posita in vitæ commodis, quorum perennis iactura est, effluxus naturæ triplicis perennitate, & exhaustio humidi primigenij, quæ corporis fabricatio intra se habet à semine vtriusque parentis. Sunt autem illa vitæ commoda, partium solidarum viuacitas, & nectar à corde viuificum; quibus operam suam dicant spiratio & nutritus, per spiritum & diætā.

Quinertiam similis est obeundi causa & ratio quinquagesimosexto & sexagesimo; quibus id fato concessum est, vt senes tum esse incipiant; illi quidem, exacta virili ætate à 36. ad 56. hi verò à 40. ad 60. Nam ætas virilis, omnium excurrit longissimè, ac tres annorum continet septenarios, quorum tertius, cum propè abest à senectute, viam munit quodammodo morbis senilibus qui ab ætate virili abstinent ad senectutem vsque: quod idem est ac si diceret, ad 56. 60. & 63. Vt enim sunt carceres ætatis maturæ: sic & illius metæ, cum scilicet illa viginti annos exegerit. Itaque nostri sophistæ, fundamentum hîc suæ vanitatis nullum inuenient, nec serîo ex Hippocrate triumphabunt de numero sexagintatrium annorum, quem hîc recensuit; non eò quidem vt sit fatalis & climactericus, vt isti vocant: sed vt statuatur principium senectutis, omnium serò maximè venientis, inchoata etiam serò ætate virili, 42. vitæ anno. Sed cum tria illa senilis ætatis principia idem ius habeant climactericum necis ac vitæ, ob ea incommoda quæ tum pullulare dicuntur, quorum fuere steriles anni viriles; nulla est æquitas huc aduocare numerum septies nouem annorum, qui non est idem in annis idem potentibus; cuiusmodi sunt ij qui finiunt maturitatem & inchoant senectutem, videlicet 56. 60. & 63. vt serius aut celerius est principium senectutis, quod edit annis viginti absoluta descriptio virilis ætatis, serius aut celerius inchoata.

Iam verò climacterici anni vanitas, ad examen adducta, eò me cogit vt fatear; toto vitæ cursu, tametsi ad obitum fatales esse videntur omnes omnium ætatum anni, ob ea incommoda quorum fertura est illis ætatibus: tamen non ideo climactericos iure dici, nec esse, quòd nondum perfecerint suas climacas quæ per septenarios cursus annorum, velut quibusdam gradibus ad 63. vsque conscendunt, exactis tum nouies septem annis. Atque hic status est climacterici anni: de quo hæc vulgò feruntur. Observatum in multa hominum memoria, expertumque esse, senioribus plerisque omnibus 63. vitæ annum cum periculo & clade aliqua venire, aut corporis morbi que grauioris, aut vitæ interitus, aut animi ægritudinis. Verumenimvero quis malus genius hanc illis mentem immisit, vt credant homines ex hac vita migrare, numerorum imperio, non fato & casu; ita volente Deo, aut certè illius permissu, qui solus & necis & vitæ summum ius habet, & cuius nutu res eunt diuinæ pariter atque humanæ; & quo præeunte vel ipsa decidunt folia ex arboribus, nec fluunt capilli ex capite, nec vnus quidem perit sine illius numine? Furor est profectò, furor; omnipotentis Dei prouidentiam, momentis temporum & serie numerorum atque complexu distringere, aut velle ipsam notis quibusdam ac numeris, tum syderali scientia præuidere, cuius est illa prædictio; ipsum furtiue ad nos venturum, nec sui aduentus vllam scientiam posse à nobis teneri.

Sed vanitatem examinemus nouies septem annorum, vel nouem climacum quarum ascensu itur ad regnum climacterici anni, cui suam nimium credulitatem supersticiosi homines addixerunt. Hîc certè faciam, Deo duce, vt si quid apud vos in hoc fuit studio admirationis, id planè contemptum sit atque abiectum. Principio; numeri nullum ius & imperium est in naturam corporis, cuius origo & conseruatio suprà est posita. Et verò vita hominum vt numeris non subsistit; sic etiam non sustentatur. Ac sanè subsistit in vitali principio partium solidarum quod est ἀρχὴ ζωῆς, vnde ipsa viuacitas; & in viuifico nectare, cuius perennitas est à corde. Sustentatur autem à diætā & spiritu. Ergo per Dei clementiam, vitæ hominum custos est & conseruatix natura, quæ sustentatur atque reficitur spiritu & diætā. Ac certè vita hominum fato concedit, primùm τῇ φύσει, i. naturæ, τῇ ἀεχρίνειαν, i. effluxus perennitate, & consumptione humidi primigenij: mox τῇ ἀνάγκῃ, i. necessitate, cui suppetit spiritus & diætā, τῇ συμμιγείαν, i. commixtione cibi ac spiritus, omniumque quæ assumuntur; quæ tam conuenienter naturæ non adiunguntur, quàm illa erant quæ cōtinenter effluunt. Hinc semper aliquid naturæ decedit, & semper aliquid excrementi accedit, vnde morborum prouentus, & infirmitatis accessio. Quæ duæ sunt causæ fatales interitus, vt visum est præceptor, cuius indiuidua comes est ratio. Nam ea quæ extrinsecus inferuntur, & vim naturæ adferunt, diætā φάλη καὶ φλαύρα, cœli aduersæ tempestates, καὶ πάντα τὰ βύζα; hæc sanè non fato; sed casu mortifera sunt ante diem.

Ergo non numeris vita conficit cursum suum; sicut in numeris fundamentum non habet: sed vt præclare Hippocrates, ἐν τῇ δέξιν καὶ φύσει, vt testantur hæc verba aureis digna literis. Μόνη μὲν τῇ φύσει ἐστὶν αἰσθητικὴ αἰσθητικὴ, ἔπειτα αἰσθητικὴ τῇ ζωῇ. i. Prima vis in homines existit, Dei. deinde natura muliebri. At verò illud τῇ φύσει numeris non absoluitur, sed verbo Dei: sicut nec ipsa natura numeris comparatur in fundo mulieris; verum à semine vtriusque parentis, vt suprà iam diximus. Erit igitur causa interitus, quæ antea fuit

lib. επι φύσει
ζωῆς.

antea fuit ortus, nempe *αὐτὸν καὶ αὐτὴν ἢ φύσιν*, quam scribit Hippocrates *αὐτὴ φύσις καὶ αὐτὴ φύσις*. Loquitur autem de nativo calore in humido primigenio, unde principium est vitæ ac finis. Ergo fatalis interitus quem Dei voluntas præstuit, ac necessitatem eius in fluxa cuiusque natura fundavit; nulla numerandi subtilitate, nec vilo numerorum complexu comprehendere potest: sicut nec *μῦθος πᾶσι* quam Deus posuit in fundamento vitæ, i. in semine animato vtriusque parentis. Est enim pia & vera persuasio Christianorum; omnes homines eò conditos esse à Deo, ut pro se quisque auctori suo tandiu in servitio, quoad ipsi visum est, & quantum naturæ vivacitatis concessit ad obeunda iustitiæ & pietatis officia, quorum in illis est Dei imago cum excellentia præstantiæque animantium reliquarum.

Iam constat, opinor, quod recto cursu inoffensæ naturæ non est vitæ obitus ante diem, nisi Deus ipse suo numine fatū præverterit, ut in Rege Iosia pietate insigni, quem Deus ante diem ad patres suos collegit; ne oculi eius viderent omne malum quod brevi venturum erat Iudæis. Est igitur monstri simile, fata naturæ à Deo immissa, ipsumque regem fatorum, cuius dominatu seriùs aut celerius illa veniunt, vanissimis numerorum calculis velle complecti. Vanissimi autem numerorum calculi nunc profertur in malè subducto climacterico vitæ anno.

lib. 2. paralip.
cap. 35.

Hic primum magna est vanitas in climacterico; sed maior, in numeris, climacum imperitia. Non enim si novies septem monadibus, sexagintatria complentur & absoluntur; ob id ætates novem sexagesimo tertio continentur. Nam triplex infantia septem finitur, totidem pueritia, vndecim adolescentia, decem iuventus aut quindecim, constans ætas viginti. Nec verò septimus quisque annus ætati notam imprimit septenarij ratione: quia celerius aut seriùs nota imprimitur ut suos habet progressus natura, quam diximus *αὐτὴ φύσις*, i. de suo aliquid semper fundere, vel sensim amittere, donec ad ultima ventum sit vitæ, ubi cum morte mutatur. Ergo septem novies nihil adferunt sexagintatribus; unde tum alia mutatio esse possit, quam à natura fluxa quæ *αὐτὴ φύσις*, & à victus necessitate.


Quod si tum de natura multum decesserit, & excrementi multum accesserit, unde in promptu sint rarsæ morbificæ, cum pari coniunctæ virium infirmitate; sanè non est dubium quin ea ætate causa & occasio sit magnæ ad obitum mutationis. Sed cur in causâ sint numeri septenarij novies illuc assumpti, nò hercle inuenio. Pugnat hoc cum verbo Dei. Pugnat etiâ cum natura, fundamento vitæ illustri, adiuta spiritu & diætâ. Nihil autem in veris ducendum quod verbo Dei & naturæ, quæ ipsa vis Dei est, dissentaneum esse videatur. Nam quod obiicitur, febrium septenarios esse criticos: ut illud cōcedam, quis tamen ius adferet septenarij ad eam crisin quæ per naturæ *ἐποδὸν* septimo die incidit; significata pepasmo quem exhibet quartus dies? Omnes enim febrium crises suscipiuntur naturæ & morbi *ἐποδὸν*, i. *insultu*, illius quidem, à pepasmo secundæ; huius verò, cum cruditate ac feritate maligna humorum, sinistra. Cernitur illa *ἐποδὸς* certis quibusdam quaternariis ante vigesimum, septenariis ante quadragesimum à vigesimo, vicensariis ante centesimum à quadragesimo. Atque dierum criticorum *ὡνάφια* est quorundam, & aliorum *διέξυσις*. Quam distinctionem non agnouerunt in iis quas ponunt climacis ad climactericum. Verùm illius *ἐποδὸν* quartanæ septimanæ vicinæ causam non adferunt periodi quaternariæ, septenariæ, & vicensariæ: sed morbi & naturæ certamen quod illis periodis est in procinctu, à motu, putredine, & collectione humoris morbifici; cum scilicet natura freta pepasmo quem ipsa per se fecit, virtute partium solidarum, ad mitigari humoris excretionem vel abscessum aggreditur, atque ita morbo defungitur. Ut enim pepasmos siue concoctio, est opus naturæ per solidas partes diffusæ, quæ est ipsarum virtus: sic *ἐποδὸς* omnis critica inde à natura procedit, quam scribit Hippocrates *ἀνελεύσιν ταὶ ἐποδὸς* 6. Epid. part. 2. i. *invenire insultus*, velut aggressorem quendam, quibus expellit morbos, eosdemque quantum potest, à se propulsat. Nam superstitio vana periodi septenariæ ad crisin morborum, ibi se prodit maxime, quod febrium tertianarum crisis est 13. continuarum verò & acutarum, 14. Tum etiam quod paroxysmi non cadunt in criticas periodos septenarias, nisi malè. Scitum est. Τὰ παροξυσμὰ μακρὰ ἐν ἀπλησίᾳ, κρῖνεται ἐν ἀπλησίᾳ. i. *Quæ paribus exacerbantur, paribus indicantur*. Sed huic disputationi colophonem imponet diuina illa vox præceptoris. Νόστον φύσις, ἡ φύσις. ἀνελεύσιν ἢ φύσις αὐτὴ ταὶ ἐποδὸς, ἐν ᾧ ἀγνοίᾳ. i. *Morborum natura medica: vias enim sine consilio natura inuenit*. Et paulò post. Ἀπαιδεύτος ἢ φύσις εἶσα, καὶ ἐ μὲθοδον, & διότι μὲθ. i. *Natura non docta, quod non didicit: tamen id rectum facit*.

6. Epid. part. 2.

Supereff vanitatem risu potius quàm oratione graui explodamus eorum qui suam superstitionem natam ex faucibus Orci, non ex verbo Dei cuius est vna veritas, nec ex naturæ perspicientia quæ nunquam aberrare nos sinit; ita fundare & confirmare nituntur. Adferunt enim gratulationem Augusti, quod inoffenso cursu annum 63. exegisset. Hoc dignum est superstitioso Augusto; idque in regno superstitionis quod erat tum Romæ. Non enim Augustus imperio illustrissimus, tam erat naturæ ac Dei cognitione illustris, quàm optimus nuper Imperator Maximilianus II; à quo princeps Aulæ, quem vocant Magnum-magistrum, cum ei per literas gratulatus esset de anno climacterico secundis rebus exacto, responsum tulit; omnes vitæ annos sibi esse climactericos, ac sui conseruationem referre ad vnicam Dei prouidentiam, quam celebrare solebat illo solenni dicto Abrahami ad filium Isaac; Dominus prouidebit.

TRACTATVS TERTIVS.

DE MORBIS MVLIERV M.



Ν ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙΣΙ Ἐν τῷ τόκῳ ἰόν-
τα ὑδατώδεια κακόν.

1 In muliebribus, quæ ante partus uterina aqua flu-
xerunt; gravidas malè habent.

lib. 3. mei
ap. pur.
lib. 5. aph.

lib. de nat.
muliebri.

Hic loco & iure scribendum ἐν τῷ γυναικίῳ, i. de morbis mulierum, postquam de iis dictum est, qui sunt communes utriusque sexus. Sunt autem muliebria aluina, omniâque continentur in aluo tam naturalia, quàm quæ ipsis adueniunt. Sic enim iudicium est præceptoris, τὸ ἰσχυρὸς ὀσφίς sacri vsque ad lumbos, comparatum esse ut excipiat commodè τὰ γυναικίῳ, i. mulierum naturalia. Tum gravidas foetu mulieres idem scribit ἐξ ἑνὸς αὐτοῦ, i. gestare in aluo, aut etiâ ferre aluum. Sed inter ea quæ sunt aluina, siue illa sint naturaliter constituta, siue multum è suo egressa catorthomate; τὰ γυναικίῳ, i. muliebria, principa-
tum obrinent dignitatis. Est enim fœminarum uterus, omnium quæ in aluo continentur nobilissimus: ut non sine causa ipsum diuinus Plato ζῶον ὀρθομήκον nominasse videatur. Tum uteri concupiscentia maius bonum affectat quàm hepatis. Ipsum verò ἔργον, i. opus uteri, admirabile est quantum hepatis ἔργον dignitate præcedat. Est enim τὸ ἔργον hepatis, tantum αἱματώσει, nutriendo: uteri autem τὸ ἔργον est ἡγεσις & τελείωσις, i. generatio atque perfectio animalis. Nam ipsa virtute uteri semen animatum promouetur atque perficitur ab eo quod erat ad id quod actu esse debebat. Atqui nobilior est promotio atque perfectio feminis ad animal, quàm panis ad sanguinem. Quid verò: nonne huc spectat diuina illa vox præceptoris. Περὶ δὲ γυναικείας φύσεως ἡ τροφή των ὁδῶν λέγει· μέγιστα μὲν τὸ θεῖον ἐν τοῖς ἀνθρώποις αἶνον ἔχει, ἐπὶ αἱ φύσεις τῶν γυναικῶν. i. Numen in homines magnam vim habet: inde natura mulierum.

aph. 28. 5.

6. Epil. part. 8.

aph. 56. 5.

Partitio lib. 2.
de mulierum
morbis.

Ergo τὰ γυναικίῳ, i. muliebria, communi voce dicuntur, τὰ τῶν γυναικῶν ἰδία παθήματα, ἃ ἡ φύσις, i. mulierum affectiones propriæ, quæ tantum in eas merito sexus incidunt, non autem in viros. Tamen enim communia sunt æquè mala virorum atque mulierum quæ vitio accidunt œconomίῃ cuiusque, hoc est, nutritiæ, vitalis, & animalis: tamen in fœminis alia est naturalium & genitalium ratio atque conditio quàm in viris, propterea quæ similiter non sunt affecta ut illis. Itaque muliebria illa, vel, si mauis, τὰ γυναικίῳ, tantum ad fœminas pertinent; purgatio mēstrua, conceptio, graviditas, partus, puerperia, siue τὰ λόγια, & quæ sunt eiusmodi. Atque illa sunt χρεῖς φύσιν, i. naturæ merito naturaliter constituta, cum bene res eunt qualitate, copia, tempore; tum etiam excipiendi, continendi, & vacuandi modo. Sed tamen καὶ ἐξ ἑτέρου dici reperio τὰ γυναικίῳ pro iis quibus fœminæ ipsæ purgantur per naturalia, & κατὰ φύσιν nominantur; siue illa sint mēstrua; siue puerperia. Testis est illa sententia præceptoris. Γυναικίῳ ἔργον ἢ ἀφάρμακον ποιεῖν: vbi Galenus hæc posuit quæ annotaui.

Et verò γυναικῶν ἔργον verbum planè huc spectare videtur, vbi narrat præceptor extitisse illis temporibus quandam mulierem nomine Phaëtusam, quæ cum restibilis olim fuisset fœcunditatis, ac mēstrua illi quàm optimè respondissent: præ summo mœrore quem ex mariti concepit exilio, ante diem defuit esse mēstrualis. Et cum bene illi ciendis mēstruis medicatum fuisset; nunquam potuisse tamen γυναικῶν, i. mulierescere, vel ad muliebrem naturam redire quæ est in mēstrua purgatione. Quinetiam ipsum profluuium quod profumpit per naturalia, vocatur à præceptore ποῖς γυναικίῳ, ut in illo. Ἐπὶ ποῖς γυναικίῳ σπασμός καὶ λειποδυμία καὶ ὀρθομήκεια κακόν. i. Muliebri fluxui conuulsio aut deliquium si superueniat; malum. Sed huius propositi veritas planè lucet in hac prognosi quæ est de incommodis proruptarum aquarum ex vtero ante partum, quas inter γυναικίῳ recenset, ut æquum est, sicut & cætera λόγια, i. puerperia. Omnia autem quæ uterina sunt, tam commoda, quàm incommoda, quæ cernuntur in excrementis hystericiis, in actionibus χρεῖς λόγον ἢ ἄλλοις λόγον, i. naturæ merito vel immerito; tum in qualitate ipsius matricis, i. in complexione, temperamento, habitu, colore, caractere, & mole; omnia, inquam, nomine τῶν γυναικῶν continentur apud Hippocratem in libris illis aureo dignis calamo & scripturâ. τὰ τῶν γυναικῶν, i. de rebus morbis mulierum propriis. Ac libro quidem priore traditur primum egressio purgationis mēstruæ à suo catorthomate, i. à norma & præscriptione naturæ, in suppressione ipsius ad septimum vsque mēsem, cum ex toto perit non reditura hæc muliebritas. Atque illius absolute suppressionis causæ & symptomata explicantur; tum ratio ipsa curandi præscribitur. Idem fit cum solerti examinae in paucitate purgationis, in periodis quoque non statis; in eiusdem nimia abundantia, periodis quoque non statis, & impuritate ipsius. Tum ponitur ipsa naturæ præscriptio in qualitate sanguinis, quantitate utraque, periodo, & vacuandi modo. Sed admirabilis est norma, præscriptio, egressio, redintegratio conceptionis, graviditatis, partus & puerperiorum, cum scilicet pro fœcunditate regnat sterilitas; pro foetu concepto, mola; pro facili graviditate, summa difficultas gerendi & nutriendi foetum; pro partu, abortio vel δυστοκία; pro exitu lochiorum, suppressio aut præceps exclusio. Tum vitia quæ sunt in vtero & ex vtero, ab illis incommodis, & causis eorum quorū fœtura cernitur in omni genere τῶν ὑστερικῶν παθήματων & eorum videlicet quæ tum in vtero fixa sunt, tum inde prorepunt ad partes nutritias, vitales, & animales, carumque

les, earumque officia labefactant. In summa; purgationum, qualitatum, substantiarum, & actionum hysteriarum è suo naturæ statu & norma egressarum causæ, symptomata, & ἐκπαρσμοί, i. redintegratio, priore libro de morbis mulierum continetur. Nam libro secundo nulla est præscriptio rerum hysteriarum bene actarum; nec vlla simplex ab ea norma egressio: sed summa sunt omnia vitiorum toto genere contra naturam, quæ partim ex vtero vel in eo, partim etiam per ipsum apparent & fiunt. Huiusmodi sunt fœda profluvia diversorum generum, puerperales hysteriæ, vlcera, scirrhi, carcinomata, erysipelata, prolapsus, mola, &c. Quæ cum ita sint, aquarum muliebrium in vtero stabulantium, donec ponatur fœtus; examen hic nobis proponitur, ut quale sit earum κατάρσµα: tum autem quænam ab ipsa norma sit earundem egressio, & quorsum appareat, puerperarum studio intelligamus.

- 10 IN MULIEBRIBVS] Græcè est, ἐν γυναικείοις, i. inter ea quæ naturæ merito sunt muliebria: cuiusmodi sunt menstrua, puerperia, quorum in genere sunt aquæ illæ puerperiales, iamiam futuri partus prænunciæ. Talia enim verè γυναικεία dicuntur, ut certè sunt. Nam illa veniunt καὶ λόγῳ, i. merito naturæ muliebris, καὶ καὶ φύσιν, i. lege naturæ à qua gignuntur & cui dicata sunt, procreandi & pariendi causa. Tum ipsa muliebritas porissimum in illis apparet, sicut in conceptione, graviditate, & partu. Quæ sunt actiones & opera verè muliebria; proptereaque nomen ipsum merentur καὶ γυναικείον, similiter ut purgationes menstruæ & puerperiales. Nam vitia quæ tum in vtero, tum ab eo contingunt, κατὰ χηστίας muliebria & ἐκ γυναικεία dicuntur; si tantum exceperis molam & suffocationem hystericam. Cætera autem vitia, quæ vel intrà sunt κατὰ τὸν ἐσώτερον, vel extrinsecus enascuntur; ob id muliebria dici possunt, quod illis in partibus fixa sunt aut per eas ferantur quæ muliebritatem ipsam constituunt: non tamen iure

- 20 ipsius, ut vera muliebria, sed ex euentu.

- VTERINÆ A QVÆ] Τὰ ἐν τῷ ὕδατι δία, non quidem hydropici vteri: cuiusmodi sunt illæ quæ incuntem sanant ascitem per diarrhoeam aquosam cruditatis expertem: sed quæ funduntur à fœtu in allantoïden, & vnà cum fœtu crescente amplificantur donec effundantur cum in propinquo est partus, cui tum viam muniunt ad facilem exitum, quando is pari cōtentione suscipitur vteri atque fœtus. Sunt autem aquæ illæ collectæ à sero humorum quos habet sanguis maternus qui per vmbilicum purus ad fœtum transmittitur, nutriendi & accrescendi causa: suumque excrementum per aquæ ductus renum in fœtus vesicam deponit, indeque factam τὴν ὕδρα, non quidem meiando per colem, sed refundendo per ὑδρότην, transponit in allantoïden, vbi seruatur donec parturiat grauida fœtu mulier. Hic certè attentio medici esse debet, cum audit è puro sanguine quo fœtus vitur, perennitatem esse τῆς ὑδροτῆος, renum ductu ad ipsam vesicam. Posita enim materni sanguinis puritas, serum naturale non tollit: quo si caret, in vitio esset; ut esse solet αἷμα πῶ ἀκρῆτον, cæteri que humores qui sunt eiusmodi quando sunt αἷμα δὲ ὑδατῶδους ὑδροτῆος, ut refert Galenus. Ac super ἀκρῆτον sanguine, vetus est illud Hippocratis de Philisco: ῥέμπη πρὶν μὲν ἡμέρας μικρὴν καὶ ῥιπὴν ἔσχατον ἀκρῆτον ἐκταῖος ἀπιδαν. i. Quinto die paucus stillauit ei sanguis è nari- bus atque metus: sextum agens diem interit. Ergo non est mirum in fœtu esse τὴν ὕδρα; nullam verò τὴν ὑδροτῆον: quia ne micam quidem alimenti capefcit ex aluo, vnde est ipsa deiectio, & fæce aluus trāsmittitur, etiam ex multâ lactis nutritij, simulatque fœtus venit in lucem, ac spiritum ducit. Nam quod purissimi sanguinis portionem attrahat sibi fœtus dum manet in vtero, vnde supersunt reliquæ ad futuram purgationem à partu, quæ est λοχία καθαρίσις; planum illud faciet quod vnum præter cætera multa, ex Galeno adduximus: cuius hæc sunt verba. Ἡ γὰρ λοχία καθαρίσις ἐστὶν. ἀλλὰ καὶ καὶ τὸ νόσημα, καθαρίσις καὶ διήρησις αἵματος καὶ τῆς κυήσεως χρόνον ἡδρόσθη ἐν ταῖς φλεβί, διαπορομένη μὲν εἰς ὕδρα τῆς κυήσεως, τὸ κατὰ αὐτὰς χηστὸς αἷμα δὲ τὸ φαυλοτέρη δὲ κατὰ ἕκαστον μέλινα πρὶν ἐκχεῖν δὲ τῆς μήτρας. i. Est enim lochia, purgatio: sed tamen, ut ipsum nomen declarat, rerum alienarum purgatio, quæ per tempus graviditatis collectæ sunt; apposto quidem fatui sanguine puro καὶ ὕδατι qui erat in venis; superflue autem inutili qui solebat menstrualis per vterum expurgari. Sed tamen hoc interest inter purgamenta eorum quæ stabulantur in muliebribus locis dum fœmina gerit vterum; quod aquæ sunt partus prænunciæ; sanguis autem ipsum sequatur, secundis exclusis.

- ANTE PARTVM FLUXERE] Non quidem cum partus est in procinctu, ex pari contentione vteri atque fœtus, vnde partus ipse, puerperæ votis respondet: sed multò antequam grauida enitatur, diebus aliquot ante partum, sine vilo enixu: quo tempore, ruptis à fœtu membranis, inuisæ prorum-punt, neque à grauida fisci possunt: secus ac vesicæ urina, ope sphincteris & ianitoris musculi qui voluntatis imperio morem gerit. Ergo naturaliter fluunt vterinæ aquæ κατὰ ἀνάγκην, i. ab enixu coactæ; ut scilicet illæ sint parturientium: sicut purgamenta cætera puerperarum. Quod autem nullo enixu prorumpant, in causa hæc sunt: reuera earum nimia abundantia quam allantoïdes capere & continere nequit, quin distenta nimium disrumpatur. Est autem nimia abundantia, tum ab iis quæ intrà sunt inutilia, tum ab iis quæ extrinsecus enascuntur. Intrà sunt inutilia, sanguis serosior, tum serior fœtus conformatio, serior quoque motus à semine imbecillo; proptereaque decimestris aut etiam serior parturitio. Extrinsecus, amplificatio est aquarum, quam edit edacitas, bibacitas, fructuum usus, tum anni tempestas austri-na quam pluuiæ occupant. Quæ omnia certè inferunt copiosam ὕδρα, quæ à vesica fœtus, transmissa in allantoïden, nimium ipsam replet, distendit atque disrumpit, antequam fœmina enitatur.

- GRAVE MALVM] Quia tum peccatur graniter in commoda fœtus & fœtæ. Ac fœtus quidem, mutatione situs: quia suspenditur proruptis iam aquis, & allantoïde prorsus collapsa, qua olim repleta sustinebatur, nec erat tam gravis iis vinculis per quæ vtero coalescit. Nunc ea suspensio permolesta matri & matri, fœtum granitate abruptum è vinculis, ad exitum planè præcipitat; quem habet ideo difficilem, quod eò viam non sua virtute ac sponte affectet; sed impotentia continendi: qualem præceptor agnouit in grauidis, succi plenis, quæ trimestres fœtus abortiunt, cum scilicet moueri incipiunt, præ laxitate cotyledonum, mucoribus obsitorum. Ut enim suspensio fractarum costarum ex aluo icin-

cap. 9. lib. 2.

aph. 6. & 23. 7. lib. 1. Epid.

lib. 14. de v. m. parrium.

aph. 45. 5. lib. 3. de v. m. de v. m.

na, facit dolorem: sic fœtus suspensio ex allantoide vacua, vinculorum vteri ruptionem, unde misellus ad exitum, nec raro ad exitum præcipitatur. Sed fœtæ incommoda sunt in enitendi acerbissima contentione, & pariendi summa difficultate, quam parit peruersa fœtus collocatio qui non in caput procedit: tum ipsa locorum siccitas; & meatus, quâ exit, angustia & contumacia.

2 Στόματα ἀφθώδεια τοῖσιν ὀπιφόροιςιν, ὃ χηρὸν. ἀεὶ καὶ κοιλίας καὶ θυλάκωνται;

Ora aphthosa gravidis, nil præ se ferunt boni. Etiámne alui feruntur liquidis excrementis?

PONUNTUR incommoda quæ circumveniunt fœminas ὀπιφόροις, i. *fecunditate*, ut ita dicam, *restitibiles atque gravidas*; idque vel circa initia grauiditatis, vel ea iam affecta, quando propinquant partui quod peruenire non possunt. Hæc enim est ratio τῶν ὀπιφόρων, ut nomen ipsum ostendit. Eorum incommodorum finis est ἡ ἀπεία, i. *partus vacatio*, non illa quidem soboles τῆς ἀφείας ἢ στερησίας, i. *sterilitatis*; sed ea quæ accidit occasione præcepta τῶν πίκων, i. *perfecto partui* qui velut tempestiua maturitate ponitur suo tempore ac definito. Occasionem τῶν πίκων præripuit, fœtus ante diem exclusio, quæ est ἡ ἀποφορὰ, siue ὁ ἐκπερασμός, i. *aborsio*. Aborsionis causæ omnes, tam intrâ natæ, quàm extrinsecus incidentes, reuocantur ad duplicem impotentiam; vnam gerendi fœtum, alteram nutriendi. Ex quibus efficitur, ibi demum in promptu esse aborsionem, cum impotentia nutriendi ex æquo certat cum ea quæ est gerendi. Impotentiam infert vtramque, symptoma positum in hac prognosi. Est autem huiusmodi.

ORA APHTHOSA] i. Aphthis obsita: non qualia esse solent ora infantium nuper natorum, ex acriore lacte nutritis; non enim malignæ sunt illæ aphthæ: sed qualia edit sæui catarrhi feritas prolabantis in fauces, & inde prorepentis partim ad aluum, partim ad ipsos pulmones. Hinc venit tussis ferina tabifica; illinc perturbatio alui aphthosæ. Ac sanè illius catarrhi ferini generatio est, aut ab iis quæ intrâ sunt inutilia, aut ab iis quæ extrinsecus enascuntur. Intrâ sunt inutilia catarrhifera, viscerum calida intemperies, & vitiosa complexio; feri perennis ad caput infirmum excursus, vbi subsistit cum accessione τῆς κακότητος. Inde symptoma est catarrhoicum, perpetua scilicet destillatio, quæ huc illuc transmissa, morbos infert, partium obsessarum, & humoris morbifici proprios. Atque illa ratio, primas obtinet in generatione morborum ab iis quæ intrâ sunt inutilia. Sic enim hausimus ex Hippocrate & Galeno; quod illæ demum naturæ sunt valetudinariæ, in quibus est principiarum atque propaginum, & humorum vitiosa temperatio atque complexio. Extrinsecus enascuntur catarrhi, diætæ vitio, & spiritus inclementia. Nam tempestatis aquiloniæ pituita est acida: sicut austrinæ ac pluuiæ salsa & putris, quæ ora fecit aphthosa, de quibus hæc scripta sunt à præceptore in pestilentia. Στόματα ἀφθώδεια, &c. Vbi Galenus ait; quod ea pathemata gigni solent αἶμα κακότητος, similiter ut erysipelata quæ non sunt pestifera. Sed tamen in regno pestilentiae, κακότης exoriuntur, ὅτι συνεπιδιώδης τῷ ὁ πλεονάζων χυμός, i. *quia puridus erat qui redundabat humor*. Causa autem putredinis, posita fuit in tempestate anni torius austrina, ventorum flatu placida, quam pluuiæ occuparunt. Sed tamen ab ea tēpestate austrina, putris humor gignitur qui ora facit aphthosa, non tamē pestifera: quia non semper habent τὸ δεινὸν πᾶσι, καὶ κτετοὶ συνεπιδιώδης, in quo est regnum pestilentiae. Ergo sic ora aphthosa.

GRAVIDIS] Græcè est, ὀπιφόρος, quæ opponuntur ἀφόροις, i. *sterilibus* per impotentiam excipendi & concipiendi semen virile. Sunt autem ὀπιφόροι, quæ vel proximè absunt à partu gravidæ; vel quæ, ut agri restibiles, sunt fructuosæ; vel etiam quibus est crebra vicissitudo concipiendi & abortiendi, ut quibus mucore sunt obsiti coryledones, alioqui solidæ ac succi plenæ. Nam illæ, trimestres fœtus abortiunt, nouos subinde cōcepturæ. Ergo si gravidis in omni grauiditate, quoties fœtus gerunt, sint ora aphthosa: erunt illæ quidem ὀπιφόροι: sed vix euadent puerperæ, ut mox dicitur.

NIHIL HABENT UTILITATIS] Græcè, ὃ χηρὸν, i. *non vtile*: quod est eiusmodi ac si diceret; *nullam edunt speciem boni futuri*: sed contrā ostendunt causam aborsionis futuræ, vel vnde adiicitur consueto periculo abortiendi. Sed abortiendi causa nona & consuetum periculū declaratur his verbis.

ETIAMNE IIS ALVI FERUNTUR LIQUIDIS EXCREMENTIS? Sanè quidem, si verè scriptum est infrâ. Ora aphthosa, grauidus perliquidus reddunt aluos. Vbi enunciatum id ἀπείας, quod hic dubitanter in quæstionem vocatur. Sed illud καὶ θυλάκωνται & καὶ θυλάκωνται, idem est quod πομπήναι & πομπήναι, i. *inferre vitium esse in vitio*, ut suprâ ostendimus collatione prorrhæti & aphorismi de alui profluuii quod ex liberaliore qualibet hæmorrhagia, morbo acuto defunctis superuenit cum refici cōperit. Nam aphorismi τὸ καὶ θυλάκωνται, legitur in prorrhætico, πομπήναι, i. *cum alui maleficientia nata ex eius vitio*. Sed illa πομπήναι, siue maleficientia, vitium habet impotentiam coquendi & cōtinendi ea quæ assumuntur. Ex impotentia coquendi, est cruditas: sicut ex impotentia continēdi, præceps egestio. Vtramque adferunt impotentiam, catarrhi prolapsus in aluum, & ipsa quoque alvus aphthosa. Quæ res adduxit Hippocratem, ut postquam scripsisset, ora quibusdam fuisse aphthosa, subiecerit; καὶ αἱ τῶν ἀφθῶν, i. *alui turbata*: quod scilicet illæ cum morbi ferrentur liberaliter liquidis excrementis. Quem locum enarrans Galenus hæc scripsit. Prolabentis in fauces à capite, prauis humoris, id quod in pulmones delabitur, tabificas infert affectiones; quod verò in aluum defertur, postquam in sandum subierit, perturbationem mouet cum morbi præ-

morfu prægandem : quod sanè offendit illud ipsum, alui turbatur. Nam idem humor in transitu, appetendi vim la-
hescat, unde ipsa venit ἀπορία, i. cibi fastidium. Prorepat autem catarrhus per continuitatem interioris tu-
nicæ quæ communis est ipsi aluo cum faucibus. Sed alius aphthosa, impotentiam habet continendi ea
quæ assumuntur : proritationem verò transmittendi ea quæ prolabantur ferina è capite. Iam verò pro-
fusioris alui in granidis, præcipuum symptoma est abortio, quam edit impotentia gerendi & nutriendi
fœtum. Impotentiam infert utramque laxitas vinculorū graviditatis, ac defraudatio nutritus. Quic-
quid autem gerendi & nutriendi opportunitatem adimit, abortionem facit. Ex quibus efficitur ; ora
granidarum aphthosa, nihil habere securitatis, ne dum utilitatis : sicut author posuit τρυπώπρον in hac
prognosi.

3 Εκ κενεώνων μιδισάμυρα ἀλγήματα ἐς τὸ λεπτόν, ἐν μακροῖσιν, ἐκ
διαφορῆς, καὶ μὴ λίω κατάρδεϊσής· ὀλέθριον.

*Dolorifica mala, cum relictis ilibus, ad tenue transeunt, in longis
morbis, ex abortu non ita multum purgato; mortifera.*

10 ABORTIONIS causam posuit superiore prognosi, quam edunt laxitas vinculorum gravidatus,
& defraudatio nutritus, cum terri vaporis molestia, ex alui profluvio, & eorum quæ assumuntur præ-
cipiti egestione, ob impotentiam continendi, à ferini-catarrhi prolapsu qui & aluum facit aphthosam,
& inde prorumpit ad intestina. Nunc transit ad ea incommoda quæ infert abortio, de puerperiis non
ita multum purgatis : ut raro bene purgantur cum ea calamitas incidit abortiendi. Nihil enim votis re-
sponder parentum & medicorum in abortivo fœtu, non partus, non partio, non expurgatio : quemad-
modum in partu perfecto qui magisterio fortis naturæ suscipitur atque absolvitur in omnibus puer-
periis, quorum prima sunt uterina aquæ, mox puer, dein secundæ, tum purgamenta ipsa reliquiarum
sanguinis qui, olim menstrus, nunc stabulatur in locis gravidæ muliebribus, donec fœtus exierit. Ergo
in abortu, quem edit par impotentia gerendi, & nutriendi, summa sunt omnia infirmitatis, ex defraudā-
to pariter æqualiterque genio, tam matris, quàm fœtus ; tum ex vi locis illata, quibus ipse puer & puer-
peria continentur & connectuntur. Ab imbecillitate malè res eunt, & perperam ; ut sæpe accidat πύστρον
πρότερον ante partum, sanguinis purgandi à partu. Sed purgamenta ipsa, liberaliter non eunt ex abortivo
fœtu, quorum incommoda hic ponuntur his verbis.

DOLORIFICA MALA] Græcè ἀλγήματα : quo nomine non ipse dolor tantum ; sed eius causa &
ratio indicatur, ut suprà ostendimus : propterea quæ consultò vertimus *dolorifica mala*, quæ proferen-
tur mox.

CUM RELICTIS ILIBUS] Ex κενεώνων, i. ex eā amplitudine ossibus ilium circumscripta, ubi sunt
loci muliebres, quos primùm amplificatio reliquiarum non bene purgatarum, diutius malè habuit,
iuxta illud. in utero morbi nascuntur. Sunt autem ; lumborum grauitas, dolor hypogastrij, suffocatio
quædam hysterica, rigor, febris erratica ; tum verò incommoda partium circumiacentium à tensione
uteri quam edit inflatio vel inflammatio, cum sympathia per ὁμοίαν αἷω & κατω. Itaque cum dolorifica
illa mala relictis ilibus.

AD TENVE TRANSEUNT] Græcè est, μιδισάμυρα ἐς τὸ λεπτόν, i. quæ habent translationem ; non
quidem propagata per ὁμοίαν ἐν loco ubi sedem primùm habebant, nempe in utero & naturalibus lo-
cis (nā propagatio est fixi morbi, nec sede murati) ; sed ἐξ μετέωρου, i. ex loco priore ac domicilio in alium
locum transmissa. Est enim ἡ μετέωρος, ὅταν, τὸ πρῶτον παύσασθαι, ἔπειτα ῥῆναι, i. eum à quiete prioris morbi
alter enascitur. Atqui μετέωρος, differentia est τῆς μετέωρας. Ergo dolorifica mala, relictis ilibus, ubi sunt
loci muliebres, transmittuntur & migrant orgasmo quem ciet reliquiarum calor, tenuitas, & amplificatio
: unde fieri solet excursus per quandam palindromen ad sanguinis promptuaria, unde primùm ille
migravit ad locos muliebres. Nam μετέωρος & ἀπώστωρος crebra est vicissitudo. Et omnia quæ aliò cer-
tis è locis commigrant ; eò sæpe remigrant, unde abierint. Sic abscessus cruales peripneumoniæ, nisi fi-
stulentur, palindromen sæpe inflectunt ad ipsos pulmones.

AD TENVE] Græcum illud, τὸ λεπτόν, absolutè usurpatum hic video : sicut & alibi, ut in illo. Τὰ κατ'
ὀσφυ καὶ τὸ λεπτόν ῥεθνα ἀλγήματα, καὶ πρὸς τὸν ὀσφρῶν ῥεθόμενα, ἀπορία, αἷμα πυρρὸν. Τῷσι ἐν καρδίᾳ ἀλγῖμα
σωπῶν ἐλθόν· κτείνε δὲως, ἔπειτα σωπῶν δὲ. Diuturni circa lumbos & illa, tum qui ad hypochondria prorepunt do-
lores, ipsæque vellicant velut uncis, cum febre & cibi fastidio, si inde transierit fortis dolor ad caput ; crudeliter
convulsifico modo necat. Enimvero dici reperio intestinum tenue : sed non eiusmodi absolutè, similiter
atque illud quod in maxilla est tenue, i. bucca. Sunt enim tria ἐπεὶ λέγεται, i. intestina tenuia, de quibus non
ita pridem fuit examinata prognosi. Sed illud τὸ λεπτόν hic posuimus absolutè, cur eò tantum pertineat,
non hercle inuenio. Est quidem τὸ λεπτόν σῶμα, i. minutulum corpus eorum infantium & adultorum qui
nascuntur verè à tempestate hyberna tepida & austriana, quam venia excepit sicca & aquilonia. Sed ni-
hil apposuit ad hunc locum. Foran autem fuerit analogia τὸ λεπτόν τῆς γνάθου, i. eius quod in maxilla est tenue,
nempe bucca, ad id quod in carina corporis apparet esse τὸ λεπτόν, i. tenue, cuiusmodi est regio hypochon-
driorum ; & per metonymiam, viscerum partiumque nutritiarum quæ intrā sunt. Nullis enim firmata
sunt ossibus hypochondria, diaphragmate intersepta, quibus ipsum quoque annectitur. Atque hæc be-

Coac. 55. 1. lib.
& prorrh. 10.
2. 1.

ne constituta, nominantur *κατὰ*, cum neque distenta sunt, neque à diaphragmate inflammato sursum intrò retracta, de quibus est illa prognosis. Quibus acuta vox est, quæ fuerat antè grauis; hypochondria sursum intrò reuulsa sunt. Inde infertur phrenitis à phlegmone diaphragmatis, vnde hypochondria sursum intrò reuulsa sunt. Atque hæc significatio τῷ λεπτῷ, expressa est in eò prorrhethico quod iam adduximus. Est autem sic. Τὰ κατὰ ὀσφύϊ & τῷ λεπτῷ χεῖνι ἀγῆματα, &c. Vbi nulla est æquitas, τῷ λεπτῷ, refertur ad intestinum, quod non antè affligitur, quàm hypochondrium cœperit esse *ζεφόμενον*, i. hepar, ex quò exudat ferus humor ad tenue intestinum, qui prorepat ad aluum, & inde ad stomachum sensus acerrimi; atque in aluo quidem excitat τὴν ἀπορίαν, i. cibi fastidium; in stomacho autem, καρδία μὲν ἢ καρδία γὰρ, quæ duo symptomata sunt ferè consecutaria dolorum lumbarium, quando relictis lumbis, transcunt ad hypochondria. Sic enim sancita lex est à præceptore. Τὰ ὀσφύϊ ἀγῆματα καρδία γὰρ καὶ αἰμορροϊκά, &c.

Coac. 2. cap.
12. lib. 2.

IN LONGIS MORBIS] Et μακροῖς, i. in diuturnis, absolute, pro morbis qui sunt eiusmodi: sicut ὀξείῃς, absolute, pro morbis acutis, sine substatiuo παθήμασι. Sunt autem ob eam causam vetusta, quòd eorum vetustas consistit in vitio partium lumbis adiacentium, quarum plethora & cacochymia maligna, propria vacuatione discessionem non habet, vt in hæmorrhoidis per hæmorrhoidas; in mulieribus autem vacuis aut puerperis, per menstrua aut puerperia. Nam scripti *κενῶδες* in hac prognosi; quamvis ostendant τῷ λεπτῷ corporis vbi est ipsa vacuitas, vulgò dicta vacuum ipsum corporis: tamen, si rectè iudico, muliebrium est locorum; vbi, similiter vt in lumbis, sunt χεῖνι ἀγῆματα; non autem in tenui intestino.

EX ABORSU] Cuius occasio & causa, est tempestas hyberna tepida, pluuia, & austrina, quam huic citimi veris exceperit frigida sicca & aquilonia. Sic enim repletū caput pituita putri & falsa per hyemem, ipsam vere frigido & aquilonio, vt spongia quædam madefacta, manu compressa, exprimit ip̄ eas partes quæ nutriendo fœtui continendoque dicata sunt. Hinc duæ illæ iam posite aboritionis causæ, videlicet impotentia continendi & nutriendi fœtum. Nam cæteræ omnes causæ, tam intrà natæ, quàm extrinsecus incidentes, quarum recensio est apud Hippocratem; eò conspirant, vt comæatus vacuitate, & vinculorum grauiditatis laxitate, fœtum ante diem excludant; similiter vt ea quam cæterarum instar adduximus. Nam quod obiicitur, fœtum sibi viam moliri calcitrando, si febrem conceperit, si fœta liberaliter se inuitarit cibo & potu; vel si quid acre biberit, vnde fœtus ipse turbetur; tum si vel ira fluctauerit, vel mœrori se dederit; vt illa concedam non esse vacuitatis, nec antegressæ laxitatis ligamentorum grauiditatis; sed fœtus quem sui tædet loci, quia sibi est malè: tamen eò spectant quæ dixi omnia, nempe ad impotentiam continendi, quæ nihil interest, præcesserint, an verò secuta sit tædium ipsum fœtus.

NON ITA MULTUM PURGATO] Vnde purgamentorum superest abundantia, quòd ea cohibeantur in vasis & muliebribus locis, nec liberum liberalémque exitum habent: tum propter fariscentis naturæ infirmitatem, matæ contumaciam, vasorum angustiam, tum propter vterini oris, ex violento abortu, conuiuentiam, aut ceruicis peruersionem. Atque illa dum manent in locis, neque in empyema mutantur (vt sæpe mutantur cohibita menstrua; hæc autem vix ac ne vix quidem, quòd ea sint mortui sanguinis omni pepasmo carentis) ibi diutius & longis morbis malè habent puerperas. Sed cum, relictis locis & lumbis, ad tenue sursum transferint; vti iam demonstrauimus.

prorrh. 8. 3. 1.
& Coac. 4.
cap. 12. lib. 2.

MORTIFERA SUNT] Feritate humoris indomiri, partiumque vitalium officiis interceptis: idque cum aliàs, tum si oborta febre, *μελέσσειν* nouam ad caput habuerint; vbi crudeliter conuulsifico modo necant.

4. Τὰ ἐκ πόκου καὶ διαφορῆς πολλὰ ὀξέως ὀρμήσαντα, ὀπισθὰ δύσκολα. ῥῖζος ταύτης πολέμιον, καὶ κοιλίης τεραχὴ· ἄλλως ἔ καὶ ὑποχονδρίῃς ὀδυνώδεις.

Quæ tum e partu, tum ex abortu aliquantisper cumulatè prorupta sunt, & suppressa immeritò; difficilia. His rigor hostilis, et alui turbatio: idque cum aliàs, tum si laborent ex hypochondrio.

De tempore
expurgandi
lechia.

ECCE NOVA ratio incommodorum quæ purgamenta inferunt puerperia cum ante diem sistuntur, quamuis dies aliquor prorupta fuerint liberaliter. Sic enim comparatum est, vt pari dierum numero, continenter ferantur à partu puerperia purgamenta; quo periódicè menstrua semel tantum à fœtu concepto. Non enim profusio copiosa, primis orta diebus, repente suppressa, in vicem subit, quantitatis analogia, purgationi debita, quamuis minori, ad puerperij tempus exactum. Est enim consentaneum vt si fœta mulier fuerit menstrualis 35. die à fœtu concepto, atque id semel tantum, integris rebus pueri; eadem fœtum enixa, pari dierum numero sit puerperialis; i. inoffenso cursu exigat 35. dies in puerperis purgamentis, quæ sunt reliquæ menstruorum in venis maioribus & circa locos muliebres stabulantium. Nato perfecto partu vel abortiuo, nisi emortuæ illæ reliquæ excludantur (quas per grauiditatem incorruptas seruauit amplificatio caloris natui à fœtu concepto) suppressæ puerperam malè habent; idque

10 ex dominatu alterutrius seminis utriusque parentis, videlicet virilis foemici, aut foemine ipsius mulie-
 11 bris, virile foemineum superantis, unde nascuntur viragines, medio cres, atque mollissimæ. Certissima
 enim securitas est, quod ut in viro, sic in muliere semen virile muliebreque inest.

20 *Circa enim. Secunda. i. muliebria pallida mulieribus; duratima. Ergo & yuagēia. i. muliebria, atque puerperis atque vacuis, pro rata portione sanguinis vacuandi, cursu quæque suo & νόμος, i. lege naturæ, vel educe, præscriptas periodos debent absoluerè, nec eas transcendere, nec antecurrere; nec etiã inhibere. Secus autem mulieres male habent; præsertim verò puerperas, quarum puerperia purgamenta nunquam reguntur naturæ imperio & dominatu: nisi exitum citò habeant liberalem & liberum; vñ nihil reliquiarum supersit, quarum incommoda hic ponuntur.*

20. sunt graviditatis & partus labores.

40 etiam, vel, postquam exegerunt bis septuaginta dies à primo sepruagésimo, & compléuerunt ter septuaginta dies graviditatis; perfecti ac virales eduntur in lucem. Verus est illud Hippocratis. *Οί ποτέ τινος γένετο*

⁹⁰ mensibus nouem exactis, qui continent, suo uelut ambitu , 270. dies. Ex quibus efficitur; duplici tan-
tum periodo grauiditatis; perfectum partum absolui : quarum una est mensium septem ; altera uero,
nouem. Quo spectat illa sententia praeceptoris. Ἡ σὺν ἐπὶ τῷ πέντε μηνὲς γούρου συλλογὰς· ἐκαστὴ δὲ τοῦτο ποιεῖται
^{ἐκαστὴ μὲν καὶ ὁ ἑξήκοντα ἡμέρας.} i. Quibus nihil accidit intra praescriptum pariendi tempus ; quicquid omnes pepererint, erit vitale.
Ergo perfecti partus, qui uerus est ^{natus}, haec erit descriptio : cuius inoffensa fuit gestatio, & qui exa-
cto tempore grandituri praescipto ; sua sponte, foras affectat viam vitalis ; materna & veteri virtute
adiutus, postquam procreato liberabitur loco matris. aut potius per se ipsum, ut dicitur, in
viam salutis impetrit.

sperabilis esse potest. Cernitur autem abortus, cum editur ante diem legitimum pariendi, eum iam mo-
 ueri coeperit, i. post septagesimum in quibusdam; in aliis, post nonagesimum. Sed abortiuu sunt et-
 iam foetus qui post ipsam *τιτῶσιν* excluduntur, antequam duplicatis diebus *τιτῶσιν* moueantur, eam
 scilicet defraudantur commatu matris. De quibus est illa decisio. Οκόσιν ἔσθι φῶν ἡ ἐκείνη ἐξέσθι, ἐν γαστρὶ
 ἔχοντες· ἐκ τούτων οὐκ ἀπύλου, ὅτι ἡ παρρησία. i. Quaecunque supra modum extenuata sunt, grauidae, bimefres ab-
 oriant, priusquam ipsa habitiores euaserint. Nam de abortione à motu, quam impotentia editi gerendi,

aph. 45. 3.

simulatque motus à fœtu ciatur; scitum est illud. Οὐδὲν δὲ μετὰ τὴν πύλιναν ἐκέρχεται, οὐδὲν ἀποκρίνεται, ἀπὸ τοῦ πατρὸς φανερὸν. ὡς τὸν αἶμα κατανέμει, μὴ δὲ μασαίει, καὶ δὲ διὰ τὰς γυναικας κρᾶνται, ἵνα τὸν βῆταρ ἡ γυναικας, ἀλλ' ἀποκρίνεται. i. Quæ autem naturaliter constituta sunt corpore, ac trimestres abortiunt; hys coyle domes mucore sunt obsui, nec fœtus, ipse possunt esse potentes, quoniam foras prorumpant. Planum est igitur, abortionem fieri, cum fœtus excluditur ante perfectum partum. Atque illa exclusio nomen habet abortus, ab in-eunte nutrimento post τὴν πύλιναν; vel motu, post duplicatum tempus πύλιναν. Nam seminis concepti, nec dum descripti, excretio, vera est ἐκρυσίς, ac vulgò dictum φαῖν-germe. Certissima autem securitas est, τὴν ἐκκρυσίδα appositè dici pro abortionem descripta; nec tantum ed referri quod intra sit quadragesimum. Declarat illud modò scriptum, τριμῆστα ἐκκρυσίνονται, i. trimestres abortiunt: quòd sanè pertinet ad fœtus nonaginta dierum. Sed ne longum faciam. Iam constat, opinor, nihil edi à fœta vitale, ante perfectum partum. Est autem perfectus, septimo vel nono mense; exactis quidem illic 210. 10 diebus; hîc verò 270. Nam octimestris fœtus exclusus, ob eam certè causam non est vitalis: quia venit post diem partus qui septimestris esse debebat: ante diem verò illius qui nouimestris erat futurus. Ex quibus efficitur, sinistri aliquid contrigisse tum fœtæ, tum fœtui; quod vel septimestrem partum tardarit, vel anteuertit nouimestrem. Septimestris partus futuri remora fuit imbecillitas fœtæ ac fœtus, postquam moueri cœpit. septuagesimo, cum bene res irent à conceptione ad τὴν πύλιναν, & inde ad ἀνάστασιν: quæ obseruatio opinionem fecerat septimestris partus perfecti, quem fortè animi diuturna ægrotudo, ex opinionis errore, posita in mœrore & metu, parta imbecillitate matris & pueri, protraxit ad octimestrem. Atque ut ἀκρίβεια morborum ab irritò crethismo, malam adducit ἀνάστασιν, vel ad sinistram crisin, vel ad interitum: sic irrita fœtæ ac fœtus contentio, vel imbecilla nimum in enitendo, pro septimestri partu vitali, abortionem excitat octimestrem miseri ac moribundi fœtus, quem vltra septimum mensem, omnibus vitæ incommodis malè habuit protracta grauiditas ad mensem octauum, cuius calamitas non aliò referenda mihi videtur quàm ad incommoda fœtus ac matris, quæ vel ab iis quæ intrâ sunt inutilia, vel extrinsecus enascuntur. Sed illa τὰ ἐξωθεν, non alia sunt quàm spiritus & diætæ. Ac spiritus quidem vitia inferuntur à temporum tempestatibus presentium & exactorum, de quibus sancitæ sunt leges à præceptore, tum in Epidemiis, tum lib. 3. aphorismorum. Et suprà iam quasdam attigimus. Nam illa quæ vulgò feruntur de cœlis atque planetis, pence quos vicissim & ordine quodam ius esse volunt grauiditatis & partus; iam pridem explosa sunt à bonis philosophis & Christianis, qui tam fœlices sunt animi, tam generosi, vt iis turpissima sit quærendi defatigatio ex verbo Dei atque præceptis & institutis philosophiæ; neque committant, studio vanitatis pro veritate, vt aliquid esse videantur indoctis: sed potius ingenuè fateantur si quid nescierint, quàm velint suam ignorantiam, superstitionis fūco velare, vel eiusdem veneno fucare. De octimestri partu qui præuenit nouimestrem, expedita & facilis ratio est cur non sit vitalis, nec etiam septimestris: quia non expectauit diem legitimum pariendi, quem nono mense futurum ostendit τὴν πύλιναν, duplicatio ad nonagesimum, quo fœtus ciere motum in cepit; cuius, vt dictum est, triplicatio, diem perfecti partus denūciat. Ergo si verè illud positum est, quòd si nihil fiat & nihil appareat grauiditatis malo intra præscriptum diem, vitalia erunt quæ sata sunt: planè efficitur, sperabilem non esse vitam eorum quibus est mora vel antegressio pariendi ab iis incommodis quæ incidere dum esset grauiditas. Nec verò septimestri potius quàm octimestri partu vitalis est fœtus, si partio nouimestris ipsum manebat. Exitium enim manet ab omni exitu ante diem, atque post diem etiam, si propter infirmitatem ex aliquo 40 naram incommodo grauiditatis, irrita fuit contentio fœtus & fœtæ in enitendo ad tempestuum partum.

ALIQUANTISPER CVMULATE PRORVPTA SVNT PVERPERIA] Enimvero cumulatè prorumpunt, edito in lucem fœtu, & secundis exclusis; meatuum amplitudine, sanguinis ipsius copiosè dudum collecti gargalismo, viam ad exitum affectante, & forti contentione naturæ studentis excludere omnes reliquias, ipsam malè habentes.

ET SVPPRESSA IMMERITO] i. Ante ipsum tempus ei debitum purgationi, quod non est idem, nec iisdem definitum diebus. Nam tempus viraginum puerperarum expurgandarum, est dierum sedecim; mediocrium, vigintriquatuor; molliissimarum, quadraginta. Sic enim multiplicatio esse debet dierum quibus octimestres reliquæ expurgantur, in eundo rationem eorum iuxta periodos menstruales duorum dierum, trium, & quinque: vt scilicet bis octo, sedecim; ter octo, vigintriquatuor; quinquies octo compleant quadraginta. Nam puerperia purgamenta sunt octimestrium reliquiarum materiæ menstrualis, per id tempus, nec vltra illud, cohibetæ: quoniam primo mense vacuitas est eorum, fato conceptu à menstruorum purgatione. Iam verò sistuntur quæ aliquantisper cumulatè prorupta sunt; vel intus cohibita; vel sursum transmissa; vel intrò retracta, velut à fugitino cursu, intus cohibentur, vteri conuientia, vel oculi peruerfione: tum etiam contumacia excrementi crassioris, & coyledonum angustia, quos fortè occupat inflammatio. Sursum transmittuntur suppressa per quandam palindromen eò vnde confluxerunt. Intrò retrahuntur, viscerum accenso foco, quòd inam infectunt anadromen.

DIFFICILIA] i. Cōrumacia, quæque difficulter admodum exoluuntur, & quorum suppressio cohibitorum, transmissorum, aut retractorum, fœta esse solet fœvis symptomatis, partim circa vterum atque locos, partim ex vtero atque locis. Ταπινώπριον autè vocauit δυσκολία, quæ sunt χαλεπώτατα, & ἐπιπύκνωτα, i. quæ admodum grauiter & periculosè habent puerperas, quibus illa quouis modo sistuntur.

HIS RIGOR HOSTILIS] Causa & signo. Ac signo quidem: quia cohibiti sanguinis ostendit motu illo μᾶλιστα vel ἐπιπύκνωτα. Nam rigor omnis, motu ciatur qui cernitur in concussione. Atque vt illa con-

illa concussio, menstrualibus est amica & critica, unde cidentur menstrua: sic ipsis puerperis, quibus cohibita sunt puerperia, est planè hostilis; quia tum frustra fit, proptereaque facit *μετέσσει* vel *ἐμμήνη* ad diaphragma & caput, atque ob eam causam mortifera est. Sic enim de rigore præceptum est; quòd ille mulieribus quidem exortus à lumbis, inde proripit per dorsum ad caput, cum scilicet ca-
 10 *αποχυσία* è venis exprimitur. Nam rigoris ab ulcere vel empyemate, hinc nulla suspicio est. Et verò ille rigor exortus puerperis, februm est symptomaticus, non autem criticus, nec periodicus. Declarat illud assiduitas febriendi, atque mutatio in prauam *ἀπώσσει*. *Ἀπώσσει* prauæ causæ est *μετέσσει* atque translatio è locis ad viscera & ad caput. Transmissiois autem signa hæc posuit syllogistica in vxore Philini, de cuius historia hæc sanè prognosis expressa est. Historia sic est. *Εἰς Θάσο, Φιλίνης γυναῖκα, θυγατὶ*
 20 *ἐκ τεκίσται, καὶ κτ' οὗτι κατάρσας ἡρομένης, καὶ τὰ δὴ αὐτῆς κέφας ἀλάρουσαι, πωταρεσκαιδεκαταίην ἔσσαν μετὰ πόνον πῶρ ἔλα-*
βε μετὰ ῥήγος. ἥλκει δὲ ἀρχομένη καρδίῳ καὶ ὑποχόνδριον ἔχον. γυναῖκα ἰσχυροὶ, κατάρσις ἐπαύσατο. i. In Thaso, uxorem
Philini puerperam filiae; cum ei purgatio naturaliter processisset, ac cætera bellè haberet, decimumquartum diem
partus agentem, febris cum rigore inuasit: qua ineunte cepit vexari cordis dolore & hypochondrij. Tum aderant
incommoda muliebrium, quia cessarat purgatio. Ex quo apparet, vel eam historiam, huius prognoseos
testimonio; vel ipsam prognosin, historię breuiario scriptam esse. Ac sanè parui refert vitrauis ponatur
ad faciendam fidem eorum quæ scripta sunt. Non enim minora sunt argumenta verè assumpta de
illis historiis, quàm insita theorematum catholicorum; sicut Galeni iudicium est, cuius hæc verba sunt
ad prorrhethica, quorundam hominum exemplis firmata, ob eamque causam, veriùs ὑπομνήματα,
quàm certa συλλογίσματα, ut ille ait: mox inde subiicit. Enimvero nec in prognostico, nec etiam in aphorismis,
 30 *tum neque in libris fracturarum & articularum, nec verò in iis qui de dicta sunt acutorum morborum, ac minùs*
in doctrina traumaticorum cephalicorum, apparet Hippocratem cuiusquam hominis meminisse, causa exempli: ut
neque usquam alibi; si tantùm exceperis epidemiarum historias, in quibus id vnum habet propositi ut illa exa-
minet quæ vniuersè docuit, per ea quæ particulatim apparent in singulis morbis. Quòd fit ut bona spe ducas,
æquiores fore censores prognoseon Coacarum eos qui de illis tam fastidiosè hæctenus iudicarunt,
cum hæc mea legerint quæ sine fastidio religiosè ad eas conscripsi. Iam verò patefacta rigoris, qui cum
febre incidit, hostilitate; pergamus ad reliqua.

ET ALUI TURBATIO] Quæ liquidis excrementis profusè fluit, nec tamen dolorificum malum foras transmittit, sed eius profusionis perennitatem subesse testatur cum accessione symptomatum grauiorum & virium infirmarum. Perennitatis causa est serum quod è locis & lumbis transmissum ad hepar, inde proripit ad cor, vbi facit cardialgiam; & ad intestina, unde est
 35 alui turbatio.

IPQVE CVM ALIAS] Ac si diceret. Cum rigor & alui turbatio, pessimè habent puerperas: quoniam illa veniunt ab inexhausto fonte locorum atque lumborum, sicut annotauit præceptor in vxore Philini, cum ait, *δοσπύος πόνοι παρέμενον.*

TVM VERO SI DOLORIFICVM SIT HYPOCHONDRIVM] Concepta inflammatione quadam systrophica, cuius phyma crudum spem in angusto ponit; coctum etiam nihil habet securitatis. Nec tamen inde sperabilis est hæmorrhagia liberalis & libera, qua periculo defungantur, sicut sæpe accidit cohibitis mensruis: sed potiùs in metu noua quædam ex hypochondrio ad caput anadrome, cuius maleficientia, primùm quidem cernicis dolor, mox capitis, atque in cerebro læua deliria excitantur. Quod legimus contigisse prædictæ vxori quæ vigesimum diem morbi agens
 40 interit.

5 Τῆσιν ἑπιφόροισι κεφαλαλγικὰ καρφόδια, μετὰ βαρέος γνόμῳ καὶ ἀσπασμῷ· φλαῦρα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ.

Sic infrà meliùs & in prorrhethico.

10 Τῆσιν ἑπιφόροισι κεφαλαλγικὰ καρφόδια, μετὰ βαρέος γνόμῳ καὶ ἀσπασμῷ· φλαῦρα. ἴσως δὲ ταύτησι, καὶ ἅμα ἀσπασμῶδες ἢ ὠφελεί.

Gravidas periculose habent cephalalgia soporata, cum torpore graui coniuncta. Sed fortasse tamen ipsis conuulsio quadam adiuncta prodest.

DE GRAVIDIS mulieribus illud edictum est dictatoris. Mirum videri non debet cum audire
 20 *mulieres abortire. Nam studio & industria opus est non vulgari, ad bene feliciterque gerendum usque ad*
partum perfectum, & ad comineum fœtus subministrandum, quandiu in vtero est; tum verò ad omne in partu
periculum defungendum. Multa enim gravidas circumueniunt incommoda, quæ tam ipsis, quàm fœ-
tui exitio sunt. Atque inter pericula quæ intrà & extrinsecus enascuntur, unde non rarò fœta & fœtus
ad exitium præcipitantur; hinc ponitur cephalalgia cum sopore & grauitate coniuncta: tum ratio non
vulgaris defungendi eo periculo,

examinamus. *Κύσις ἀποκρίθῃσα ἐν τῇσι ὀξείαις κεφαλγαῖς, καὶ τῇσι παρὰ δὲ μέλα βαρεῖς ἐστὶν ἀποσφιδεῖ ἡβήσας.* Coac. 12. cap. 1. lib. 2.
vesica-intercepta in praegrandi cephalalgia; aut stuporifera cum gravitate; convulsione studet finire. Enimvero
 tanta est feritas urinae cohibita; sine illa cohibitio sit primigenia exoluta vesica, sensu in ea amissi;
 vel etiam morbi acuti consecraria, ut facilem habeat ad caput anadromen, & inde convulsionis
 euentum. Sic menstrualis materiae nimia abundantia; iam inde ab incunte conceptu circa locos
 suppressa, cum eius instaret purgatio; indeque ad caput transmissa; edit symptomata cephalalgica ve-
 ternosa.

CUM GRAVITATE] Quae est in corpore plumbeo, cuius illa *καρπώδης* vel *ἀρεῖς* accidit madefa-
 ctio nervorum principio, similiter ve à tempestate austrina quam vocat praceptor *καρπώδης* *μαλακία* *καὶ* *πνι-* 3. Epid. &
γῆς. Est autem haec etiam *καρπώδης*. aph. 5. 3.
 10 FOR TASSE AVTEM PROFVERIT CONVULSIONIS ALIQUID VNA ESSE] EXO-
 ratur hic quaestio duplex atque difficilis. Ac prior quidem est; vtrum adit convulsio aliquid in ce-
 phalgia, sicut hic legitur, & supra in Coacis; tū in prorrhethico de urina suppressa, & supra in hoc ope-
 re. Altera vero; an profit convulsionem cieri cum adest cephalalgia veteriosa, qualem praceptor po-
 suit in hac prognosi. Quaestiois vtriusque dubitatio sic tollitur. Prioris quidem, vtrum accadat *πνι-* Coac. 16. cap.
γῆς; confirmatio est affirmantis: vbi Galenus ait urinam suppressam contagione cerebri, nervos 1. lib. 2.
 inde paros, ad convulsionem adducere, si gravis adfuerit cephalalgia. Sunt autem haec ipsius verba. *προρ. 28. f. 3. 1.*
καρπώδης, confirmatio est affirmantis: vbi Galenus ait urinam suppressam contagione cerebri, nervos Coac. 12. cap. 1.
 inde paros, ad convulsionem adducere, si gravis adfuerit cephalalgia. Sunt autem haec ipsius verba. *lib. 2.*
ἀποκρίθῃσα ἐστὶν αἰνὴ τῆς ὀπρῆσεως οὐρομάζης, ἔχον οὐδὲ φησὶ τὴν ἀποσφιδεῖς αὐτῶν, ἐν τῷ τῆς διωκτικῆς ἀποσφιδεῖς ἐργάσει- comment. ad
σας, καὶ μαλακία ὅταν δὴ γῆμα πρὸς ἡβήσας κεφαλγῇ. διηλοὶ γὰρ ἐν συμπαθείᾳ τῆς κύστεως, τῶν ὅσων νεύρων ἀρχὴν γέγονται. i. Inter- *προρ. 28. f. 3. 1.*
 20 ceptionem urinarum, pro earundem suppressione, usurpare consuevit. Ait igitur illam convulsionis aliquid habere:
 quod est idem ac si dicat convulsionem efficere, praesertim si dolor adfuerit capitis. Hinc enim pater caput cum vesica
 pati. Et verò iam receptum est supra, cephalalgiam *καρπώδης*, habere *πνιγῆς*, i. quippiam convulsificum.
 Quod sanè perinde est ac si dixisset, ipsam nonnunquam efficere convulsionem, ut modò audiui-
 mus ex Galeno. Nam illud; *ἀποσφιδεῖς οὐδὲ κινῶνται σμικροῖς, ἢ ἀσπῆρας γινόμενοι τὸ λεγόμενον, i. exiguum esse ostendit,* *προρ. 14. f. 3. 1.*
aut raro evenire quod dicitur, ut paulò antè ad locum illū modò adductum scripsit Galenus; quàm bene
 sui memor, viderint sapientes qui totum illius attentè legerint commentarium. De convulsionis autem
 natura & causis, non ita pridem scripsimus.

Sed quaestiois alterius, vtrum profuerit convulsionis aliquid vna esse, difficilis admodum deci-
 sio est ad faciendam fidem conclusionis enunciatæ. Non enim credibile est commodam esse convul-
 sionem quæ nihil habet utilitatis, nec securitatis, plurimum autem periculi quotiescunque inciderit.
 30 Nisi fortè sit excusatio eius quæ finem febris adfert, exorta primo ipsius die, aut postridie, aut ad sum-
 mum perendie: & huius quæ cadit in segniciem veteriosam; non quidem ab emortua facultate, sed à
 virium oppressionem natam. De qua est illud Hippocratis & Galeni iudiciū; quod accidit bonis ægroti-
 rebus. Atque Hippocratis quidem sententia est infra & in prorrhethico, iisdem concepta verbis, qui-
 bus hic ponitur, quamvis non sapiat palato Galeni: quem ego leuitatis nomine valde commoueor, vel
 eo iudice, condemnari. Negat enim hic *πνιγῆς* prodesse, quod utilissimum esse ad idem aut simile,
 alibi iudicanit. Locus est in prorrhethico, vbi quaerit Hippocrates. *Ἀρεῖ γὰρ καὶ νέται τὰ τοιαῦτα ἀποσφιδεῖς, i. An* *προρ. 26. f. 3. 1.*
verò talia sanat convulsio? Sunt autem *τοιαῦτα*, quæ author posuerat antequam super iis quaestionem il-
 lam moveret, videlicet quæ transmissa è lumbis ad cervicem & caput, paralyin primū paraplecticam
 intulerunt; post autem facta *ἀποσφιδεῖς*, paraplegiam excusserunt. Quam sanè *μελέται* (ibi Galenus, in-
 40 constanter quidem, sed verè tamen affirmat locum habere curationis; vel eo nomine, quod ipsa con-
 vulsio motu quem ciet, maximè sit ei affectioni contraria, vbi est motus amissio. Sic enim violento
 motu convulsionis concutitur, atque vi summa excutitur omnis materia paraplectica. Praestat igitur
 convulsionem superuenire paralyin, quàm paralyin convulsioni. Nam epilepsia sperabilem adhuc
 vitæ salutem ostendit in apoplexia, quæ superueniens epilepsiae, sanari non potest, ac cita morte fu-
 nestia est.

6 Ὅσων ἐκ γυναικείων δὲ τὰ αἶμα καὶ τὸ λεπτὸν πόνοι σῶντονοι, κοι-
 50 λίας καθυγραίνουσιν, ὑποσώδεις ταύτης δὲ κρείων κατὰ φύσιν καὶ
 ἀδυνάτοι, κενεαγικῶς ἐφιδροδοῖ, καὶ δειψύχρυσιν. αἱ τοιαῦτα ὑποσώ- *ἀδυνάτοι*
 Φαὶ τῇσι πλείεσι γυνόμηναι, μὴ πλὴν ἀφῇσιν ταχέως κτείνουσι. *γυνή,*

Ex muliebrium suppressione, quibus dolorum est cruciatus supernè
 & circa tenue; us aluos ciet profusè. Atque his circa crisin veterni
 60 subanxi, & cum impotentia, ex vacuitate, sudatiuncula & perfrige-
 ratio. Ac recidiva huiusmodi plurimis, cum cessarint, oborta, citò ipsas
 interimunt.

MULIEBRIVM suppressorū symptomata hīc sunt mortifera, & inde signa funesta cirā venturæ mortis. Atq; symptomata quidem cernuntur in cruciatu dolorum quos infert anadrome muliebrium, vbi subsistit, videlicet circa tenue & hypochondria; tum palindrome, non eō quidem vnde migratur, sed ad partes inferas quæ adiacent lumbis, vnde sunt alui præhumidæ cum offensione summa æconomiz nutriticus. Signa autem funesta cirā venturæ mortis, sunt in veterino subanxiō cum impotentia, sudatiuncula, & fugaci frigore partium extimarum. Quæ omnia cuiusmodi sunt naturā & causis; tum autem quorū apparant atque fiant; iam aggredior ad docendum.

EX VITIO MULIEBRIVM Ex *γυναικείων*, ad verbum *ex muliebrim*, cū scilicet in vitio sunt, non tam circa locos vbi subsistunt, quā circa supera & id quod est tenue, quod refluant; exitū denegato, nec transmissa per vterum. Cū autem muliebria multis modis in vitio sint; hīc illud vitium agnosco quod cernitur à refluxu eorum, quo partes superæ occupantur. Sunt autem muliebria, purgationes menstruæ & puerperiz; quibus non ritē purgatis, morbi nascuntur in vtero & ab vtero, vt suprà ostendimus: maximē verō à puerperiis, quæ maleficio menstruas ipsas præcedunt cohibitz.

QUIBUS DOLORVM EST CRUCIATIVS Græcē est, *πῶς αὐτῶν*, i. *prægrandes & contumaces dolores*, qui eodem planē sensu nominantur *ἰσχυροί*, vt suprà ostendimus in cephalalgia. Est autem hīc posita *αὐτοῖς ἰσχυροῖς πόνος*, i. *dolorum acerbitas in specie & idea*, in magnitudine & assiduitate, per summam distentionem & proritationem partium exquisiti sensus quas inuasit anadrome muliebrium. Ac partium quidem illarum notatio est in iis quæ sequuntur.

CIRCA SUPERA *Πεὶ τὰ αἶμα*, quod est, in capite sublimi. Quæ ratio sic vertendi & explicandi; primū ex illo adducta est. *Τὰ ἐπ' ὀλίγον ὅξια δὲ γήματα ἐς κοιλίαν καὶ ἐς τὰ αἶμα πίνοντα ὀλέθρια*. i. *Doloris acerbitas paulisper in ingulo fixa, si ad supera transeat; mortiferum adfert malum*. Vbi non est dubium quin *τὰ αἶμα*, i. *supera*, pro capite vsurpentur. Quod ipsum ostendit consecutio symptomatum atque signorum. Nam quæ scribuntur *ὅτι τῆς αἵμα καὶ κατὰ κοιλίαν*, i. *de alio supera & infera*; cuiusmodi sunt relatiuē, non absolute: vt supra quidem sit pulmonum atque thoracis; infera verō eius quæ abdomine continetur: quamuis hæc tursum dicatur purgari per supera, vomendo; sicut per infera, deiciendo. Ergo circa supera, dolorum est cruciatus; i. in capite, per anadromen muliebrium, quæ illuc transcendit; de qua iam multa scripsimus huc pertinentia.

ET CIRCA TENUE *Πεὶ τὸ λεπτόν*, i. quod in corpore, nullis firmatum ossibus, molle est siue *λεπτόν*; quales inter vtramque maxillam sunt buccæ, propterea quæ dicuntur *τὰ λεπτά ὅς γινώσκον*. Sic in trunco corporis *τὸ λεπτόν* id dicitur, quicquid abdomine circumscribitur, videlicet ilia, umbilicus, & hypochondria; vt suprà ostendimus. Atq; id, circa tenue, pertinet ad viscera hypochondriaca, præsertim ad hepar *χρόμον*, & ad tenuia intestina. Est autem notabile *τὸ ὑπερὸν πρὸς πρὸν*, prius tentato capite, quā hypochondriis. Nam prior *μελέτης* sit ad hypochondria, & inde ad caput: nisi quis fortē agnoscat *τὴν ἑστῆσαν*. De cruciatu autem sæui doloris circa illud tenue à vitio muliebrium, satis iam multa nuper.

ALVOS REDDUNT PRÆHUMIDAS *Καίνας καὶ συρραίνουσιν*, i. faciunt vt vitiatæ alui, liquidis excrementis profusè ferantur. Nam *καὶ συρραίνουσιν* & *καὶ συρραίνουσιν*, vt suprà dictum est, in aphorismis idem est quod *ποτηρεύουσιν* & *ποτηρεύουσιν* τὰς καίνας, i. *vitiare & vitari aluos in prorrhetico*. Ergo vitiatæ alui, profusè feruntur liquidis excrementis; non quidem excretionē critica dolorifici mali: sed potius symptomatice feri exudantis ab hepate in tenue intestinum, quo ipsum sæuis torminibus excruciatum proritur ad excernendum. Aut intestinum idem, suo vitio & alieno, chylum intercipit, quem à ventriculo excipit, ac digestionem siue *αἰσθάνειν* ad hepar frustratur, inde quæ diu valde quæ oppressum ac stimulatū fatiscit cum egestionē profusa, edit quæ diarrhœam chylosam καὶ πολλὰ γόνον.

ATQVE HIS Quæ à perenni anadrome muliebriū, malis tā grauibz occupātur & circa supera, & circa tenue, cū diarrhœa symptomatice quæ est *αὐτὸ τὸ πίνον*, vt ait Hippocrates, i. *illud ipsum quod perimit*.

CIRCA CRISIN Qua defunguntur vita, non morbo: iuxta illud prognosticum, quod febres, iisdem planē diebus crisin habent, quibus omnes intereunt aut conualescunt. Nam crisis nomen pro interitu nouum non est in hac prognosi, quod suprà sæpius est vsurpatum. Quod autem hīc tali sensu ponatur; palam ostendunt omnia quæ sequuntur funesta, & nihil viuificum ac vitale.

VETERNI-SUBANXI *Κατὰ φρονίαν ὑποσώδεις*, quæ sunt cuiusmodi vel ex indigena oppressionē cerebri, vel item ex aduena quam facit afflictio partium inferiorum, quæ & *μελέτης*, & sympathia, cerebrum in societatem adducit laboris atq; molestiæ. Sunt autem illi veterni siue *κατὰ φρονίαν*, cum viribus multum infirmis à diarrhœa & sæui doloris acerbitate, ob eamq; causam subanxiæ; non quidem à leui anxietatis causa, quæ certē hīc magna est: sed prægrandi virium infirmitate qua edi non potest fortis iactatio quæ summam ostentet impatientiam omnis figuræ ac loci ex alysmo concepto. Tales præceptor in spe angusta salutis, alibi nominauit *ὑποσώδεις*, quibus non est potentia ostentandi sua fastidia cū iis effectrentur maximē, si per vires ipsiliceret; vel si tam virium satis esset, quā satis est animi. Huc spectat illud prognosticum præceptoris. *Αἱ ὑποσώδεις, ἀσπασθῆναι, ψυλασθῆναι, ὁδὸν ἀφ' ἧς πᾶν φρονικαί, i. Deliria cum tremore & palpo coniuncta, valde phrenitica*. Vide Galeni doctissimum commentarium.

ET IMPOTENTIA OB VACUITATEM Sic enim visum est emēdare vulgatam lectionem, *ἀδυναμία κατὰ φύσιν*, i. *impotentes dolorifica vacuitate*. Non enim dolorifica vacuitas est, nisi ex eūctū suspensionis: vt exempli causa, in costarum fractura, vbi vacuitas ventriculi, quem necessariō repleri oportuit ad costarum *διόρθωμα*, suspensionem adfert ipsarum: suspensio autem dolorem. Sed hīc vacuitas impotentiz, causa est ipsa per se, quam suo edit merito, secus ab illa quæ sit immerito vacuitatis, quæ aut nulla est, aut certē indigna, quæ tantam pariat impotentiam. De qua illud iam vidimus positum ab autore. *Αἱ ὁδὸν λόγον κατὰ φύσιν ἀδυναμία, κατὰ φύσιν μὴ ὅτις· καίτοι, i. Quæ immerito vacuitatis, aut certē si nulla sit, accidunt*

Coac. 1. cap. 1.
lib. 2. & lib. 3.
progn.

Coac. 7. lib. 1.

aph. 3. 7.

lib. 4. aph.

lib. 2. progn.

procr. 3. lib. 1.

lib. 3. πειλ
ἀφ' ἧς.

procr. 5. lib. 1.
& suprà in
Coac.

fit, accidunt impotentia; sunt pessime. Ergo impotentia ob vacuitatem quam peperit symptomatica diarrhoea; genij defraudatio, commeatu absumpto; sæui doloris acerbitas; tum ipsæ vigiliæ, & principatum summa offensio; signum est citæ mortis venturæ: sicut omnis infirmitas & impotentia quam edunt collapsa naturæ præsidia, ingrauescente morbo. Sed impotentia ab exhausto, hæc signa sunt.

[SUDATIUNCULA ET PERFRIGERATIO] Atque hæc duo signa sunt planè symptomatica; illud quidem, exolutarum partium solidarum, è quibus exudar succus alibilis: hoc verò emortui caloris nativæ. Nam sudatiuncula quam edit expressio à virium oppressione nata, longi est morbi: hæc autem, vitæ breuissimæ. Refrigeratio autem non critica, nec periodica, nec verò symptomatica retracti caloris à phlegmone; sed iam emortui in partium viuacitate, ac dissipati in corde viuifico; *καὶ ὅτε ἐκτὸν* edit *καὶ ὅτε ἐκτὸν*, i. frigus torpidum, ex quo ægri redduntur *καὶ ὅτε ἐκτὸν καὶ ὅτε ἐκτὸν*, vel, vt rectè scriptum est, quos tenent *καὶ ὅτε ἐκτὸν καὶ ὅτε ἐκτὸν*, i. languores, siue *ἐπὶ πύλιν*, i. infractiones subanxia, dum magna vis est anxietatis.

[AC RECIDIVA HVIVSMODI CVM CESSARINT] i. Vicissitudo frigoris & sudatiuncula, cum euanescit: frigoris quidem, appulsu hostilis caloris qui tanquam è fimo diffunditur ad imos pedes, extremas manus, & frontem ubi mouet sudatiunculam, quæ statim est frigida cum exudarit, dissipato putri vapore, superstiti autem frigore à viuacitate emortua, nec amplius recreata à cordis calore viuifico. Notabile verò hic nomen est *πῆξ καὶ ἀποπῆξ*, vnde significatur vicissitudo frigoris & sudatiuncula: tum etiam recursus amborum, vt in illo prorrhethico. *Ἀπὸ τῆς ἀποπῆξ πῆξ καὶ ἀποπῆξ*, i. Extimarum partium cita in virumque mutatio; grave malum.

[RVSVM OBORTÆ] Ab insultu caloris febrilis, non ab *ἐπὶ δὲ* naturæ & morbi.

[CITO IPSAS INTERIMVNT] Quia certamen est intolerabile, fractis iam viribus, & effecto calore ac spiritu; quorum cita extinctio ac dissipatio, citum quoque affert vitæ exitium. Sic moribundis oborti singultus, cum paulisper cessarint, ab irrita contentione virium effecerarum & languidarum; rursus, velut quodam certamine instaurato; qui venit nouissimè, vitam finit: quoniam quicquid in nobis frustra cietur, periculo adiicit, facitq; vt cum ad vltima ventū est, celerius opinione moriamur.

7 *Τὰ μὲν μυχθισμὸς ἔξω ἀναφρόδῳρα πνέματα, καὶ τῆς αἵματος ἀφροδῳρα*
λόγως τῶν φθόρον σὺν κληρώσει.

Quæ cum suspirio foras effertur spiratio, & vnà immeritò est colli-
quatio; grauidis abortiionem denunciant.

[DVO ΤΕΚΜΗΡΙΑ, i. signa syllogistica] hic ponuntur abortiionis, cum scilicet fœtus, penuria & paupertate commeatus materni, ante diem ad exitum viam affectat, liberæ spirationis & nutritus causa, quibus in vtero defraudatur. Atque hæc prior est ratio abortiendi. Nam altera in difficultate, vel potius impotentia gerendi consistit. Defraudati fœtus utroque commeatu materno, spiritus & nutritus, signa sunt; angustia spirationis, & quæ immeritò est colliquatio. Eorum signorum, cur ita sint, & quorū sunt appareant, sic visa est ratio apponenda.

[QVÆ CVM SVSPIRIO FORAS EFFERTVR SPIRATIO] Vel, vt infra legitur, *τὸ μυχθισμὸς πνέματα*, i. spiratio suspiriosa, cuius difficultas posita est in necessitate spirandi, & contumacia partium spirabilem; propterea quæ est parua & frequens. Necessitatem spirandi febris adducit, dum æstu cor incandescit: quæ quia non expletur magnitudine spirationis quæ parua est, instrumentorum vitio, frequentiam habet vicariam; cui suspirium tandem adiicitur, ob nimiam vaporis fumidi abundantiam, quæ libero exitu non cordi responder, vt neque spiritus aditu: propterea quæ tardæ est inspiratio, expiratio autem velox. Quæ sanè dyspnœa; dicitur *πνέμα ἐκτείνον καὶ κατεπνέον*. Quemadmodum autem spiratio libera quæ cordis voto responder, vim eius viuificam multum auget, vnde micant fortiter venæ maternæ per quas fœtus ipse respirat ex animi, vt ita dicam, sententia: sic parua & frequens materna dyspnœa, qualem descripsi, peius habet fœtum quàm matrem; quod in febrili æstu & aucto micandi vsu, per venas maternas imbecillo pulsu micantes, spiritum ille ducat exiguum, quem mater ore inspirat, & fumidum vaporem expirat.

[ET VNA IMMERITO EST COLLIQVATIO] Græcum illud nomen verbale, *τῆς*, non usurpandum arbitror pro eo habitu cadaueroso quem febris tabifica exprimit, per quam & solidæ partes liquuntur, nō solum caro tenera & veluti recens pressa, quod acutarum febrium est commune, qualem infra posuit noster author in hanc prognosin. Sed, meo quidem iudicio, idem est planè *τῆς*, hoc loco, quod in aphorismo *ἰσχυρὸς*: nec ea quidem vniuersalis, sed tantum mammarum, vbi sic fœtus abortio denunciatur. *Γυναικὶ ὅταν ἰσχυρὸς ἦ, καὶ οἱ μαστοὶ ἐξέλθῃς ἰσχυρὸς ὁ γυναικὶς ἐκτείνον*, i. Mulieri grauidæ si vltro *αἱ μαστοὶ* mamma subito extenuatæ fuerint; fœtus abortit. Vbi *τὸ ἐξέλθῃς*, i. vltro celeriter, idem est quod *ἰσχυρὸς*, i. immeritò, & sine prauidentia extenuandi, quod Græci dicunt *αὐτὸν ἀποφάσκοντες*. Hæc autem colliquatio, quæ est mammarum *ἰσχυρὸς* (non autem vniuersi *λεπτότης ἢ παύ*) prænuncia est abortiionis, cum incidit ante diem legitimum pariendi: sicut etiam partus perfecti, & ipsa quoque dyspnœa parua & frequens in tempestiua fœtus maturitate. Sic enim præceptor ait. *Μάλιστα δὲ ἀναπνέει πνικτὸν, ἐπὶ τὸ πνεῦμα πνικτὸν*, i. Maxime *αὐτὸν ἀποφάσκοντες* autem spiritum crebro ducit, cum est propinqua partui. Nam de mammis grauidæ quæ vltro celeriter graci-

proth. 3. c.
2. 1. & supra
in Coac.

aph. 37. 1.

aph. 44. 1.

lib. 1. aph.
7. 1.

Iescunt, hæc fuit Galeni sententia in aphorismis. Hic sanè aphorismus, inquit, de illorum est numero quos di-
ximus denunciare alimenti penuriam ipsi fœtui. Sunt enim quædam venæ communes vteri & mammarum,
quæ quidem cum laborant ex paupertate sanguinis, graciles edunt mammas. Ac tum a fœtū ex-
tinguit, vel ipsum promouet ad exeundum foras: ob eam certè causam quam ipse auctor conscripsit li-
bro de pueri natura his verbis. Alimentum, incrementumque quod à matre puerulus accipit, elapsis iam decem
mensibus, fœtūque aucto, nequit sufficere: si quidem quod in sanguine dulcissimum est, id ad se pertrahit, simulque
lactis aliqua portione fruatur. Quæ si pauciora sint quàm conueniat, ipseque puerulus auctior factus, plusquam ad-
sit alimenti desideret, sese iactat, & abtrumpendo membranas, causam & occasionem matri exhibet exonerande
alui. Sed colliquatio hæc mammarum gracilium, defraudati fœtus aniditatem vel eò denunciat, quod
a fœtū apparet vel αὐτομάτως, quod est sine αἰτίας eorum quæ vel intrā vel extrinsecus vim adfe-
runt extenuandi; vt scilicet nulla sit excusatio febris tabifica, vigiliarum, inedia, hæmorrhagiae, profu-
uij ventris, nec vllius denique vacuationis: appareat autem ἡσυχίᾳ, quod est ὑπὸ repente, vt scriptum
est in aphorismis. Ac sanè illud ἡσυχίᾳ, consulto & apposite veritatem imminit: sicut in illo. Ἀἷμα πα-
ραλόγως λυγρὸν καὶ κενόν. i. Sedata sitis immittit: grane malum. Quod idem est ac si diceret. Falso credita sitis
leuatio, manente causa sitifera, quam neque sustulit liberalis portio aquæ frigida, nec inspiratio auræ
eiusmodi, nec biliosi humoris purgatio, nec epithema, nec somnus, nec balneum; pessimè habet ægro-
tum, qui vel dementia, vel emortua portiois appetentia, non sitire se putat.

GRAVIDIS ABORSIONEM DENUNCIANT] Quoniam, vt suprà demonstratum est,
dyspnœa materna, vnde micandi vis languida, & nutritij comعات penuria, fœtū & spiritu & nu-
tritu defraudant; proptereaque ipsum præcipitant vel ad exitum, vel ad exitum: sicut Hippocrates
annotauit, cum ait. Ἡ αἰτίαρσιν, ἢ πᾶσις ἐκκρίσιν παρρημῶν, lib. de natura pueri.

8 Οδυνή κοιλίης μὲν πόκον· Ἐπὶ ταύτῃσι πνώδεια καὶ δαίρει.

His autem à partu qui venit dolor aluius, purulenta expurgat.

NON PRIMUM periculo defuncta est mulier ex abortiuo puerulo, vt vetus opinio est eorum qui phar-
macia fœtus excludunt, ad curationem febrium acutarum quæ grauidas periculosè habent. Hoc certè
qui faciunt, periculo fœtæ adiiciunt pariter atque fœtus, quem isti carnifices misere perdunt immiseri-
corditer. Temerariam huiusmodi medicinā procul arcer dictatoris illud edictum. Οὐδὲ γυναικὶ πῶτον ὀφ-
είω δόσω. i. Nec mulieri pessarium abortiuum dabo. Non enim violenta fœtus ante diem exclusio, dolorifi-
cum malum excludit quod nullum erat in fœtu. Ac sæpe sistuntur puerperia purgamenta quorum cor-
ruptio est ex abortu, quæ incorrupta seruabat amplificatio caloris natui à fœtu dum esset in vtero: si-
stuntur autem à febre & vteri peruersione & violento enixu.

Ergo. HIS AUTEM] Quibus respiratio suspiciosa & colliquatio, abortionem denunciant, à
paupertate spiritus & nutritus, quæ, vt iam dixi, fœtū præcipitat vel ad exitum, vel ad exitum.

A PARTU] Μετὰ πόκον: quod nomen καταχευῆς usurpatur pro abortione, quam ὀκνηρῶς ἢ ἀπο-
φροεῖ Græci vocant. Est autem hic tolerabile nomen τὸ πόκον, quod propriè est perfecti partus, ἀπὸ τῷ ὀκ-
νηρῶς, cuius usurpatio nusquam legitur ἀπὸ τῷ πόκον. Quod nihil necesse est multis probare exemplis
schola Græcorum & Latinorum adductis.

QUI VENIT DOLOR ALVINUS] A lochiorum systrophe circa locos, vnde non habet
exitum: sed ibi manet sine anadrome ad superas partes, ac tandem cunctando, & noua febre oborta,
suppurabilem facit humorem.

PURULENTA EXPURGAT] Ab empyemate circa locos concepto: cuius empyematis mox
venturi & exituri, hæc signa sunt à præceptore tradita. Dolor prægandus hypogastrii, venarum micantium
pulsus molesti; tactus cuiuslibet, etiam suspensi, molestia in hypogastrio. Atque si melius illi futurum sit, prorump-
unt muliebria per sinum pudoris, exitque purulentus sanguis & graueolentior, per septem, octo, aut etiam no-
uem dies. Antea verò laborat doloribus atque incommodis circa locos & partes vicinas. Caterum cui muliebria pu-
rulenta conuenienter feruntur, profuerit sanè nullum restare vlcus. Nam si fortè supersit, maiorem industriam, cum
pari coniunctam diligentia requirere à medico, ne putrescat, fiatque admodum fædi odoris. Animaduertet autem
studiosus, hæc de morbis agi quæ à lochiis sunt in vtero: sicut suprà de morbis inde ab vtero sursum.

9 Αἱ ναρκώδεις καὶ μάλιστα αὖ τῇσι κινήσει μὲν ἀδυναμίας κατὰ
κεκλασμέναι, πρὸ κρίσιν ἐνοχληθεῖσαι, αἰσώδεις· ἐφιδρῶσι πολλῶν κοι-
λίας καδυρξανθεῖσαι ταύτῃσι κακόν.

*Quæ potissimum in mouendo sunt pigra ac torpida, & cum impo-
tentia sunt incurua; circa crisin vexata, anxia; crebro exudant. His
vitiata alui perliquida; ingens malum.*

IN DVBIA SPE & angusta salutis à phlegmonica systrophe, partem aliquam nobilem occupante; recreatio est ægri & medici ab empyemate, quod est eiusmodi vt æque sit positum inter crisin perfectam, & certam desperationem vitæ ipsius. Tales euentus ipsi iam vidimus ab hepatis empyemate & pulmonum. Sic in symptomatis quorum fœtura est à lochiorum systrophe circa locos; bene res erunt, si empyema fiat quod citò exeat, exitumque habeat liberalem & liberum, nullo superstite vlcere circa locos. Hic tum natura triumphat de morbo, secuta omnis periculi: quemadmodum in empyemate principatuum, naturaliter exeunte, ac sine ipsorum corruptione quam pus ostendit fœdi odoris atque coloris. At verò si lochiorum systrophe non exoluatur, foras profusa, nec in pus vacuandum mutetur; inde mortifera venient symptomata *ἐπιγνώμενα*, & inde signa funesta mox affuturæ mortis, qualia

10 recensentur in hac prognosi.

QVÆ] Abortiuum fœtum enixæ, nec tamen conuenienter purgatæ puerperis purgamentis, ac sine fiducia empyematis: quod nullum ostendit nec edidit lochiorum systrophe circa locos.

SVNT PIGRÆ AC TORPIDÆ POTISSIMVM IN MOVENDO] *Ναρκώδεις*: quæ voce, vt dictum est alibi, partium omnium velut segnicies quædam ostenditur in officio faciundo, vel in appulsu *ἢ ἀδυναμία* excipiendo, stupor & hebetudo: quamuis hic potius ad *κατὰ καὶ* referatur, quàm ad *ἀδυναμία* *ἢ ὀδύνη*, cum ait. POTISSIMVM IN MOVENDO] Quod sanè symptoma hinc natum Hippocrates sic expressit lib. de rebus mulierum. *Εἰς τὴν ἀφ' ἧς χρέων, καὶ ἢ σπλάγχνων, καὶ τῆς ὀσφύος ἢ τῆς ὀσφύος* lib. 1. πτεῖ
ἢ τῆς ὀσφύος i. Ad manuum, & crurum, & lumborum articulos dolor procedit. Et paulo post. *Καὶ ἀκράτεια πινέ* *ἢ τῆς ὀσφύος* i. Tum artus quidam corporis impotentes euadent. Id autem est quod post segnicie
20 *ἢ τῆς ὀσφύος* i. Tum artus quidam corporis impotentes euadent. Id autem est quod post segnicie

ET CVM IMPOTENTIA SVNT INCURVÆ] i. Quæ incuruum corpus ac veluti arcuum ostendant, more anuum decrepitarum. Est enim *κατὰ καὶ* idem quod *καμπυλότης*, vt annotauit Galenus in curuatura palpebrarum, quæ vt *κατὰ καὶ* dicitur lib. 6. Epid. sic *καμπυλότης* lib. 1. prognost. Quæ de re aliàs multa scripsimus ad eum locum vbi noster author agit de voce in faucibus elisa, quam vocat *φασὶν κατὰ καὶ*, eodem planè sensu, quo lib. 3. Epid. posuit *φασὶν κατὰ καὶ*, ἢ *κατὰ καὶ* in rabidis, à prolapsu catarrhi ferini vocali materiz occurrentis in tempestate pestifera. Sunt igitur commemoratæ mulieres, *μετὰ τῆς ἀδυναμίας κατὰ καὶ*, i. incutitæ, ab impotentia τῆς φέροντος, i. portantis, & pondere τῆς φέροντος, i. corporis quod portatur. Atque hæc impotentia facultatis, cum pari grauitate coniuncta corporis quod facultatis imperio regi debet, mulieres hic descriptas facit *ναρκώδεις καὶ τὸν ὀσφύος*, i. in mouendo pigras, quod facit corporis lentitudo nata ex causis prædictis, videlicet ex facultate infirma, & corporis grauitate. Hinc venit *κατὰ καὶ*, i. curuatura mulieris incuruatæ, quæ ostentatur cervicis inclinatio ad pectus *κακοκνήης*, quæ naturaliter esse solet *ἰσχυρότης*, dorsum versus reflexa. Nisi quis fortè πῶ κατὰ καὶ hic tantum agnoscat in oculis atque palpebris, quorum diastrophe nominatur; illorum quidem *ἰσχυρότης*, harum verò *καμπυλότης*. Amborum autem peruerforum, ac veluti à distortionem curuatorum, commune nomen est ἢ *κατὰ καὶ*, i. peruersio *ἢ κατὰ καὶ*. Quò aduocari potest illud prorrheticum, suprâ iam explicatum. *Εἰς ὀσφύος ἀναδρομῆς, ὀφθαλμῶν ἰσχυρότης κακῶν*. i. Ex lumborum anadrome, oculi peruersio; male habet ægrotum. Certissima enim securitas est, lochiorum à lumbis anadromen cieri ad caput, indeque affligi nervorum originem, cuius afflictæ symptoma est oculorum peruersio. Quæ ratio est Galeni hoc theoremate confirmata. Nam illæ partes quæ à cerebro habent nervorum propaginem, vel à spinali medulla, cum tale aliquid patiuntur, affectiones denunciant quæ sunt in ipsis. Erunt igitur curuatura cervicis, à spina; palpebrarum verò & oculorum, à cerebro. Ac cerebri quidem afflictiones ostendunt hæc quæ sequuntur.

SVB CRISIN PERTVRBATÆ] Quod est eiusmodi ac si diceret, *παρὰ χῶδεις*, i. animo perturbatæ: id enim significat *παρὰ χῶδεις*, & eius nominis deriuatiuum *παραχῶδεις*, cum absolute scribitur. Est autem hæc perturbatio, dementia omnis prænuncia: quamuis hoc loco certam ostendat dementia, ex lochiorum natam anadrome quæ cerebrum occupauit, vnde apparet illa *κατὰ καὶ* palpebrarum, quam siccitas intulit, indeque conuulsio musculorum exilium, ac penè dixerim, inaspectabilem, ipsas mouentium.

ANXIÆ] Quas nauseabunda tenet anxietas, quam excirat propagata bilis à cerebro inflammato, in partem omnium sensus acerrimi, nepe in stomachum *νευρωδέσονται*, propterea quæ cerebro *συμπαθεύονται*. lib. 2. πτεῖ

CREBRO EXVDANT] Quæ vox hic non est copiosi sudoris toto corpore profluentis: sed miliaris cuiusdam exigui, vel sudatiunculæ exudantis; vt suprâ sæpe ostendimus. Atque hic sudatiuncula multa cò planè dicitur, quò pluuiæ multæ, vel *ὕδατα πολλά* in Epidemiis: quæ sunt eiusmodi, quamuis minutulæ, quia crebræ aut diuturnæ. Quò me adducit illud SVB CRISIN: quod est mortis venturæ, natura fatiscente, diu multumque oppressa. Est autem fatalis ad exitum sudorifica exolutio, quam perperit ingens oppressio, vt in sub stillo sanguinis nato à cœmate.

HIS VITIATÆ ALVI PERLIQVIDÆ] Quæ liquidis excrementis, multum & sæpe feruntur vitiatæ atque quodammodo exolutæ, cum paupertate summa caloris natiui, vt iam eas tædeat sui officij, quarum est illa *κακοκνήης* lib. 3. de morbis.

INGENS MALVM] Vel potius, illud ipsum quod perimit: sicut præceptor scripsit de phrastica diarrhœa, quæ, simulatque incidit, citæ est mortis: quoniam, auctore Galeno, *ἡντιν ἐν ἀρρώστια τῆς διουρίας, καὶ πᾶν αὐτῷ ἀπορρέεται ἀρρώστια*, i. nata ex effusa, vel admodum imbecilla virtute, ipsam rursus facit imbecillio rem.

10 Τὰ γυναικεία μὴ ἑπιστῆναι χησιμον. Ἐπληπτικὰ ἐν τῷ ποιούτων, οἶμα. κύοισι δὲ ὑποφορὰ μακρὰ, κύοισι δὲ αἱμορροΐδες.

Salutare est, muliebria non cohiberi. Nam inde veniunt epilepsia: quibusdam autem profluvia longa ventris, ut arbitror; nonnullis etiam hæmorrhoides.

IAM ILLVD suprà est positum ac demonstratum; quòd omnia quæ apponuntur ac deducuntur appositè, ius habent naturæ, ipsamque tuentur atque conseruant naturaliter instituta & consuetà. Inter ea quæ deducuntur, naturaliter instituta & consuetà; purgatio est muliebrum. Ac menstruorum quidem in menstrualibus: lochiorum verò, in ipsis puerperis. Puerperia purgamenta, nuper ad examen adducta sunt. De mensutris & menstrualibus nunc dicendum. Enimvero menstruales sunt virgines, viro maturæ: item mulieres vacuæ à puerperio: tum steriles & infructuosæ. Huiusmodi autem sunt, vacuo semper vtero; ac menstruales dicuntur, quòd menstrua sit earum purgatio naturaliter instituta & consuetà; si nulla sit excusatio morbi, mæoris, vnde sic emacruerint, vt nihil in iis vacuandum supersit; nulla item lactis nutritij. Nam grauidarum nulla est purgatio menstrua καὶ φύσιν, præsertim post πύσιν. 20 Iam verò illud quærendum, cur eam purgandi legem mulieri Deus indixerit καὶ λόγον, i. merito naturæ muliebris, vnde illa purgatio, muliebrum nomen habet: ac fortè est ipsa muliebritas, vt placuisse video præceptori, cum ait; Phaetufam, olim naturaliter menstrualem, non potuisse γυναικῶσιναι, i. mulierescere, vel muliebritatem rursus habere, quam priùs amiserat ex viri exulantis prægrandi mæore atque tristitia, cum ei sedulo medicatum fuisset ad menstruorum suppressionem. Ergo menstruorum causa est ἡ γυναικῆ φύσις καὶ χροί, i. natura muliebris & color, vel potius, superficies perpolita & læuis. Nam veteres Pythagorei, vt suprà diximus, omnem cuiusque corporis superficiem, χροίαν vocabant. Coloris autem atque naturæ summum ius habet τὸ ἥϊον, propterea que principatum obtinet causarum omnium, tam efficien- 30 tium, quàm excipientium. Et quoniam τὸ θεῖον potentia, in natura potissimum elucescit, quæ est ipsa vis Dei, ac nefas est illam ad examen vocare, nulli subiectam categoriæ, sed omnium potèntissimam; examinandi ratio nobis erit super colore tantum atque natura. Ergo, fundamentum naturæ muliebris ac muliebrum purgamentorum, est vterus; cui omnino respondet corporis vniuersitas similiter constituta vt ille. Sic enim Galeni iudicium est, vbi ait. Καίτῃ καὶ τὸ σῶμα πύσιν ὁμοίον ἐστὶ τῷ μήτρῳ. In vtero summus opifex ingenerauit amorem gignendi, propterea que fundus est concupiscentiæ, per quam expleri cupit genitura virili, vt impleatur; cuius oblectamento vicina genitalia sunt in promptu, eique de suo impertiunt; principio semen ipsum muliebre, continuò dum coit libidinose: vt id quod à viro excepit, nutriendo contineat, & continendo concipiat, sobolis procreandæ causa. Etenim ad for- 40 turam σπασσάτοικται τῇ γυνὴ ἡ τροφή, i. vna funditur cum semine alimentum. Inde succedit sanguis per venas hystericas, vnde coagmentatio est, siue παρέγχυμα viscerum, & intertexta fibris neruorum caro, vnde asurgunt muscoli & ipsa cutis. Nam iecur ἐκμάλειον, i. fons & origo gratiosi humoris, affinitate quadam concupiscentiæ & amoris voluptuarij, vtero morem gerit, eique subsidio est, illuc transmissio sanguine, quo irrigatur fundus matricis concipiendo atque gignendo, & concepito foetui nutriendo. Affinitatem matricis cum iecore, illud declarat maximè; quòd suffocationem hystericam (quæ impeditis accidit instrumentis spirandi, à diaphragmatis oppressione) ipsum iecur excitat ex vtero sibi adiacente, qui eò cursum inflexit, tanquam ad fontem gratiosi humoris, sitim explere cupiens in muliere grandiore ac vidua, nec ampliùs menstrualui, cuique profusior aluus, intestino recto collapsò, cum siccitatis & leuitatis accessione occasione dedit vtero, per locorum amplitudinem, conuertendi se & affectandi viam ad illud ἐκμάλειον iecur. Sed ipsa quoque vteri concupiscentia, & rei veneræ indulgentia, sufficit ipsa per se proliciendo sanguini & ciendo ad exitum celerius menstrua purgatione, vt scilicet ea mulier bis mense ac sæpius, menstrualis esse videatur, εὐαχουμένη, καὶ ὑμειρομένη, καὶ συνέσθη ἀνδρῶν. Hac igitur parta consue- 50 tudine ac natura excipiendi & effundendi sanguinem eò transmissum & inuitatum, vix vlla suscipitur hæmorrhagia, quin ea per vterum viam affectet. Hæmorrhagiæ hystericae ac periodicæ in causa hæc sunt: primùm repletio carniū & venarum in corpore quod est ἀδύσπερτον, i. vix perspirabile: inde nauscabunda illarum partium repletarum ac toto corpore turgidarum expressio: tum rigor abortus, vnde concussionis ad excutiendum occasio. Repletionem parit vtramque, humoris vbertas quam edit primùm edacitas, parem vim nata in hepate calor sanguifici; exigua distributio; pærennis ebrietas molliorum carniū quæ instar cuiusdam lanæ depexæ madescunt ἀπὸ τῆς ἐκμάλειος quam continenter excipiunt; otiosa vita, & penè nulla corporis perspiratio; vacuitas vteri, ad cuius grauiditatem foetura est tam copiosi humoris, cuius nimia abundantia venæ distentæ, ac nimium carnes oppressæ; quia non est ἀδύσπερον τὸ πρὸς τῆς διέσπωσης, τῷ πρὸς τῆς τροφῆς; leuationem ac libertatem anquirunt & parant liberali san- 60 guinis excretionem. Ac primùm quidem è mammarum ac ventris vicinia, quæ affinis est vteri, sanguis eò prorumpit, quò suam dicauit operam olim nutriendo foetui, continuò vt partibus illis eam legem Deus imposuit & natura. Hæmorrhagiam cœptam è mammis ac ventre, perficit & absoluit vniuersi corporis eò conspirans euacuatio. Itaque naturalis est conspiratio vacuandi sanguinis per locos & vterum, hepate primùm duce affini concupiscentiæ, mox ipsas mammis, quarum est sympathia iure societatis at- que

lib. de natura muliebri. Arist. lib. de sensu.

Parachasis de periodo menstrua.

Theoph. lib. 1. de caus. plant.

lib. 1. de caus. plant.

lib. 1. de caus. plant.

Gal. de anat. lib. 1. aph. 1.

que vasorum: tum comite toto corpore, cuius venę & carnes purgationem cęptam sequuntur, & corporis voto absolunt, superuacanei sanguinis nauseabundam plethoram ad vterum transmittentis. Atque illa transmissio memoriam mihi renouat eius hydropsis quęm *ὑδροπικία* Gręci vocant: cuius quidem aqua toto diffusa corpore *αἷα πᾶσι φλέβαις*, in aluum prorupta, ipsum exoluit. Hic enim, vt illic, menstrua cietur purgatio est tumido atque turgido corporis vniuersi habitu, per quandam *ταυσία* venarum & carniū expletarum, quę sanguinem refundunt in venas maiores, quę ipse prius in carnes effuderant. Atque hęc vacuandi ratio per menstruam purgationem, est veluti quędam palindrome, sicut in illo hydropse, quam facit *ταυσία* carniū oppressarum κατ' ὄντι, & fortis naturę contentio, vnde compaginis tollitur molesta & plumbea grauitas, atque, vt ita dicam, *καθρότης*, quam facit potius portati ponderosa moles, quā portantis infirmitas. Est igitur mulieribus naturaliter insita necessitas, & instituta consuetudo purgandi sanguinem superuacaneum per muliebria: sicut & viris altero crure mutilis, per dysenteriam *αἱματώδης*, si nullam quotidiani victus partem deduxerint ē corpore mutilo, & eius quiete. Nam vacua mulier est imperfecta, nec suis absoluta partibus, vt *ζώνι περιτραμμένον*, sicut placere video Aristoteli. Atque illa consuetudo purgandi per vterum, occasionem dedit naturę, inflectendi cursum per muliebria ad criticam vacationem acutorum morborum. Verus est illud Hippocratis. Percussum caput, aurium echo, hæmorrhagiam ciet, aut mulieribus muliebria: idque cūm aliis, tum si ardoris sensio sit à *rhachi*. Etenim naturę muliebris vnicum esse solet perfugium atque præsidium ad bonam valetudinem, aut conquirendam, aut seruandam, per muliebria, in omni affectione plethorica, tam vniuersali, quā particulari: tum in omni sanguinis gargalismo siue orgasmo: quoniam sic natura mulierum est comparata, vt earum sanguis ad locos & naturalia cursum inflectat; propter eaque si rectē valent *τῇ φύσιν κατὰ τὴν ὕλην*, i. natura & valetudinis cura, non nisi menstruorum & lochiorum cruentam purgationem experiuntur; nec vnquam varicibus, nec hæmorrhoides, nec etiam hæmorrhagia per os & nares tentantur. Itaque tanta est beneficentia hystericarum illarum purgationum, vt lochia puerperis, menstrua mulieribus vacuis atque adeo virginibus vix adhuc menstrualibus, ea secum adferant incommoda, vt morbis mortiferis defungantur.

Coac. 12. cap. 19. lib. 2.

Coac. 1. cap. 1. lib. 2.

Arist. lib. 5. cap. 19. de hist.

Coac. 35. lib. 1.

Hic supersticio esset vel ostentatio exemplis ac legibus lectorem obruere quę super hac re passim leguntur apud Hippocratem. Sufficiet igitur quod omnium instar adducendum putauī. Locus est de crisi acutorum quę septimo die, nono, vndecimo, aut etiam decimo quarto, duce natura, suscipitur; vbi mulierum propriam atque criticam excretionem annotauit his verbis. *Ἐν γυναικὶ δὲ ὁ δῆμιον ῥύσις*, i. Mulieri profluuium menstruale morbum exoluit. Nec verò tam peccatur iri comoda nobilissimę partis menstruorum ad ipsam affluxu, quod totum corpus deonerat (quod alio esset grauissimum atque mortiferum, si tantum hæmorrhagiam exceperis;) quā eius virtuti ac dignitati adiicitur, fundum irrigando ad excipiendum & concipiendum semen prolificum. Nam sætu descripto, purissimus eò sanguis attrahitur, & à fœtu per vmbilicum excipitur, nutriendi & vegetandi causa. Itaque menstruorum ad locos officiosa deriuatio, commendabilis est priuilegio legis illius quę sic à dictatore sancita est. Si quando in ventrem sanguis, contra naturam, effunditur; ipsum corrumpi necesse est: videlicet putrescendo & grumescendo, quorū in capacitatem amplam illabitur, qualis est vterus. Quod profectò fieret, si vel ad punctum temporis affusus maneret qui statim effunditur. Sunt enim grauissima sanguinis in vtero grumescens incommoda. Iam verò illa repletio *ταυσία*, quam diximus venarum & carniū, occasionem habet vomendi ac refundendi sanguinem superuacaneum, ab horrore quem ciet seri expressio ē venis lumborum ad cutim; eaque concussio carnes prouocat siue sollicitat ad excutiendum sanguinem quo imbutę madescent, nec dum illius facta est *ἐξομωσις*. Nam *ταυσία* quam ipsa facit, mulieres vindicat ab omni molestia muliebrum suppressorum. Sequitur vt dicamus cur menstrua sint muliebria.

Enimvero illa purgandi frequentia & consuetudo per singulos anni menses, vnde ipsa purgatio nomen habet muliebrum menstruorum, subinde occasionem renouat ipsi vtero concipiendi semen prolificum ad sobolem procreandam semel in anno. Sic enim subinde irrigatur atque repescit fundus sanguine, cum hiatu cotyledonum, qui antea conuiebant. Notum est illud. *Ὅτι μετὰ γυναικεία τὰ δέξια, καὶ δεξιὰ χεῖρες*, i. Quod à partu modo dextra, modo sinistra hiant. Quę ratio clariùs explicatur à præceptorē, his verbis. Postquam mulieres fuerint expurgatę, potissimum aluo, concipiunt, viri complexu gauisę. Tum enim semen earum valet, si rem cum viro, vt decet, habuerint. Ipsumque viri facilius cum eo miscetur; cuius si potens fuerit, ius habet fraternum. Quinetiam eo tempore hiat os vire & itque protenditur, exacta purgatione menstrua. Nam vena repleta, similiter semen non attrahunt. Ergo menstruorum consuetudo, accensa libidine cocundi, cuius explendę causa, mulier viam ad virum affectat; tum ab vtroque femine solidiore; tum excipiendi & concipiendi opportunitate, mirificos adfert sobolescendi fructus.

sent. 24. para. 7. 6. Epid.

lib. 1. cap. 1. lib. 2.

Sed patesfacto naturę scopo & fine in mensuris, hic iure & loco quærendum, quānam sit causa illius periodi mensurę, per quam suscipitur atque absoluitur ipsa purgatio. Hic venit in mentem *ἡ πλημμυρία καὶ ἀμπότης*: quę duo cernuntur in mulieribus, sicut in mari. Est enim affluxus atque refluxus muliebrum menstruorum. Ac *πλημμυρία* quidem hęc faciunt. Nam hepatis vena, quam accepit ab hepate crudioris sanguinis abundantiam, hæmorrhoidibus venis impertit, per totam compaginē distributis: quemadmodum hęc rursus explet per quandam *ταυσία*, eundem quodammodo euomunt in venas minores, carniibus & cuti affixas, nutriendi causa. Et quoniam tali appulsu κατ' ὄντι, carnes non gaudent; nec eius fruuntur *ἐξομωσις*, similiter vt cūm sit κατ' ὄντι. Sunt enim *σφύρες*, *ὄλεαι* καὶ *φλέβες*, vt ait præceptor: ideo multę supersunt reliquię superuacanei sanguinis tota compagine carniū molliorum atque venarum. Hinc venit duplex illa plethora, quę tum ad vasa dicitur, tum ad vires; maximē verò eūm cessat accretio corporis, penē omni perspiratione carentis, & otiosa est vita, somno & nimia eda-

citare, fortassis etiam bibacitare, sepulta. Vtraque illa repletio, perenni sanguinis accessione fit carnibus atque venis, in quibus ipsa residet. Hinc diligentis sui naturæ insultus & ἐπιδόξ, quam ipsa per se inuenit, nec ratione duce, & qua vna, certis quibusdam periodis, criticas mouet excretiones atque abscessus, quoties proritata, in sui leuationem incumbit contra omnem molestiam. Itaque natura potens causæ molestæ per ἐπιδόξ siue insultum, τὸ πᾶν μὲν εἰς τὸ ἀμύνειν conuertit: non eò quidem unde ipsa venit; sed ad fundum amoris voluptuarij, i. ad vterum, qui eam veluti ad se rapit, cupiditate nimia incitatus. At ἀμύνει primùm lucet in æstu & grauitate lumborum, ex particulari repletione venarum & arteriarum quæ adiacent lumbis, & illac excurrunt ad inferas partes. Inde obortus horror, vel etiam rigor, concutiendo excutit illam molestiam grauitatis per venas hystericas, ad fundum prædictū.

Sed πᾶν μὲν εἰς ad summum perductæ, non est tam circa repletio, nec inundatio in mulieribus, quàm in terra è mari. Illa ferè tribus, vel ad summum, quatuor absoluitur septenariis. Ac tribus quidem, in iis quæ sunt mollissimæ & otiosæ: quatuor verò in aliis quæ sunt viragines, atque in labore corpus conficiunt. Nam solidæ ac succi plenæ, quarum est habitus mediocritas, inter prædictas medium tenent locum replendi & expurgandi sui. Vt enim mollissimæ replentur celerius; viragines autem serius: ita purgantur illæ quidem diutius, hæ verò celerius: harum enim purgatio tantum est bidui; sed illarum est quinque, aut etiam septem dierum. Quem omnium, ne errarent, terminum expurgandi communem esse voluit sanctissimus Moses Dei edicto, cum ait. *Mulier menstrualis, septem dies in menstruus esto.* Est igitur menstruorum causa, τῆς πᾶν μὲν εἰς ἀμύνειν, siue palindrome καὶ νόσος, i. meritò instituta & consuetata, duce natura; cuius proritatio, ac veluti quædam τῆς νόσου, ipsam ad ἐπιδόξ, i. insultum valde sollicitat, contra humorem superuacaneum quo partes madescent imbutæ, non autem nutritæ. Non enim minus humoris affluit mulieribus κατ' ὄντα ad carnes inutilis; quàm ipsis apponitur κατ' ἐξουσίαν utilis, ad ἐκπαίαν, nutriendi ac vegetandi causa. Hic finem scribendi faciam de menstruorum natura & causis. Nam cætera quæ sunt in iis καὶ τὸ πᾶν εἰς καὶ πάθος, suo quæque loco scribentur.

SALVRE EST] i. Salubritati mulieris accommodatum; quod æquè valet ad conquirendam eius valetudinem, atque ad conseruandam. Menstrua enim multis beant commodis ipsam mulierem, quibus vitam carere non potis est, ac sine iis secunda frui & commoda valetudine. Nam corpus vindicant ab excrementis quæ ipsi sunt ægrotandi causæ. Tum nutricatus ac spiritus æconomiam, vitæ custodem, efficiunt bene moratam & constitutam. Actiones humanas quæ sunt mentis diuinæ, non sinit aberrare à scopo ipsius atque imperio. Vigiliarum & somni est certa & constans vicissitudo. Cibi, portiones, & excrementa, votis naturæ respondent. Quibus accedit fecunditas, velut agrorum, restibilis. Morbi congeneres & qui cum ætate simul accrescunt, ac αὐτῶν ἐξουσίαν nominantur, menstruorum libera & liberali purgatione quiescunt. Denique quæ intrà sunt inutilia, siue incommoda, transcunt in naturæ commoda, beneficio menstruorum. Quinetiam morbi omnes qui extrinsecus enascuntur; siue diæta, siue spiritus quem ducendo viuimus, in vitio sit; non raro spe certa salutis consolantur medicos à menstruorum ope, quos meru exterrere in viris. Bene res eunt igitur mulierum menstrualium, quibus menstrua bene respondent τῆ φύσιν, καὶ τῆ ὑγιαινεν, i. natura, & valetudinis cura. Non enim sunt varicosæ, non hæmorrhoidicæ, non item podagricæ, nec hæmorrhagicæ. Denique, vna spes medicandi atque curandi mulieres, & sanitatis earum tuendæ fiducia, in liberali & libera menstruorum purgatione consistit.

MULIEBRIA NON CESSARE] Seruata periodo menstruæ purgationis, naturaliter instituta & consuetata, ut dictum est: donec ad tempus ventum sit tempestiuæ suppressionis, quo in perpetuum cessat illa mulierum muliebritas. Vbi etiam suadet Hippocrates, mulieribus olim fecundis ac cæteris quibus erat menstruorum vbertas, bis anno sanguinem detrahendum per triennium aut quadriennium. Ac tempus illud quo tempestiuè menstrua supprimuntur; varium est pro natura cuiusque mulieris varia, complexione item atque compagine. Sed tamen illius observatio est ferè à quadragesimo quinto, ad circiter quinquagesimum ætatis annum. Nam quæ mulieres, merore aut morbo confectæ sunt; tum quibus est genij defraudatio, per abstinentiam; aut quæ in copia lactis nutritij, sæpe ad mulctram veniunt: hinc nulla est æquitas iis menstrua expectare; vel temeraria medicina, velle cingere, vbi vacuitas est materiæ menstrualis.

NAM INDE VENIUNT EPILEPSIÆ] i. Summa omnia conuulsionum, qualia esse solent earum quarum in cerebro causa est conuulsifica, ut epilepsia quæ principatum obtrinet conuulsionum. Est enim obiectionis illius depulsio facilis, qua infertur ex præceptore, hysterica, febre carentium faciles esse conuulsionem. Est autem obiectionis formula his verbis concepta. *Οἱ ἐν ὑστερίαις ἀπόρος αἱμοιομοιοὶ εὐχερῆς.* Quod ut cõcedam verum esse: tamen non minuit auctoritatem huius prognosens de graui epilepsia quam infert muliebrium menstruorū suppressio. Non enim τὸ ὄντα τῆς αἱμοιομοιοῦς, hic sunt hysterica; sed menstruorum anadromes symptomata, qualia recensentur in illa prognosi. Τα πᾶν αἱμοιομοιοῦς καὶ αἱμοιομοιοῦς, i. Sanguis fluxus stans temporibus cõsuetus, si de more nō fluxerint; epilepticō modo interueniunt. Ac stata quidem atque quodammodo periodica hæmorrhagia, cernitur muliebribus per Lunæ periodos; in mulieribus per eandem; in hæmorrhoidicis, autumno & vere; in iuuenibus, ætate & vere: tum iis quos dolorifica in lumbis mala exercent; & qui à lumborum dolore sunt cardialgici. Hæc autem stata profusio sanguinis, varia est; per vterum, per intestina, per hæmorrhoidas, & per nares. Sed ut ad stata redeam muliebria; certum est, eorum suppressorum anadrome ibi morbos enasci, vbi subsistit: quæ si ad caput cursum inflexerit, & exitum molietur, hæmorrhagiam ciet per nares: sin autem ibi subsistat, vel eius hæmorrhagia inhibeatur; epileptica primùm edit symptomata, mox apoplectica; unde cito mors venit; vt ipsi vidimus in Comitissa Manleuier. Sed inter symptomata quæ menstruorum, stans olim temporibus naturaliter consuetorum, parit suppressio, instat omnium posuit epilepsiam, cum scilicet

cum scilicet ad vltima ventum est perniciosæ anadromes eorum, de more non exeuntium, sed exitu naturali carentium: idque vel culpa non expellentis naturæ, vel cōtumacis materiæ vitio, meatuumve non meabilium, vel vteri peruersione aut conuiuentia. Nam cætera suppressionis huius incommoda, sic ordine recensentur à præceptore. Primum quidem est tensio gravis lumborum. Ex hac tensionis causa, quæ lib. 1. cap. 2. 3. est mēstruorum suppressio, mulieres tertio mense perhorrescunt; incertis febrium paroxysmis excruciantur; tum suffocatione laborant hysterica; & lumborum dolore vexantur. Sed quarto mense, nisi exitum liberalem habeant *παραίρηται*, grauioribus malis augentur; ac præter illa trimestria, crassas vrinas reddunt; venter est illis durus, ac maior solito; est quoque stridor dentium; sunt item vigilæ & cibi fastidia. Et verò mala omnia ingrauescunt prædicta, cum ventum ad ipsum tēpus mēstruum periodi. Quin-
to mense, malorum omnium prædictorum calamitosa vis, penè redditur intolerabilis. Sexto mēse sum-
ma sunt omnia symptomatum prædictorum, & grauiorū accessio: qualis est quam hic posuit epilepsia; quæ nunquam sic incidit per sanguinis ad caput anadromen, quin eam statim funesta excipiat apople-
xia. Nam cæteras epilepsias narrat Hippocrates post 25. annum *συναποθήσκειν*, i. commori suis epilepticis. Est quoque horum symptomatum sexto mense accessio. Tum enim iactantur mulieres, ac torquent se-
ipsas: crebrò vnà concidunt & consternantur; pituitam difficulter vomunt; inexplibilem sitim habent, incendio conflagrante aluo, ex repletis sanguine naturalibus. Vrinam vix reddunt, allabète vtero ad sto-
machum ipsius vesicæ. Quinetiam lumbis dolent, ceruice ac dorso. Lingua velut frano compescitur; ac sæpenumero capte sunt voce. Stomachus vellicatur atque morderetur: spiratio elisa in faucibus: toto cor-
pore peruruntur. Ac tum vrinæ redduntur cruentæ, cum vesica serum sanguinis ex vtero absorbuert: venter & crura cum pedibus intumescunt. Mors inde venit, latēribus in occulto mēstruis per illud tem-
pus semestris. Nam sexto mense curatio non est sperabilis. Omnium autem symptomatum quæ men-
struorum infert suppressio, maior est grauitas; maior item ad eam suppressionem propensio in sterilibus, quàm in fecundis. Est enim fecundæ amplitudo maior venarum, quæ & sunt magis meabiles ad effun-
dendum, & capaciores ad excipiendum, & continendum minore molestia: quoniam nouimestri graui-
ditate consueuerunt repleri, ob eamque causam minùs iis molesta est illa repletio quæ transiit in cōsue-
tudinem. Quinetiam iis multò facilius atque ampliùs panduntur claustra locorum & vteri, quò libera-
lius atque liberiùs menstrua effundantur. Vt enim fecundæ mulieres consueuerunt diu multumque repleri: sic etiam liberè ac liberaliter vacuari. Quamobrem nec tam molesta est illis repletio, si fortè in-
ciderit; nec tam difficilis vacuatio.

30 QVIBVS DAM AVTEM PROFLVIA LONGA VENTRIS] Cum scilicet diu mul-
tūmq; alius fertur liquidis excrementis; non quidē mulieris cōmodo: quia sic dolorificum malum for-
as non exit; sed intus ad hypochondria velur *χειρόματα* subesse ostenditur, vbi substitit humoris anadro-
me. Adicit autē periculo lōgum illud alui profluuium, estque ipsum sæpe *πῶς κτῆνον*, vt suprà ostēdimus. Coac. 4. hu-
ius tract.

NONNULLIS ETIAM HÆMORRHOIDES] Non quidem præsentī periculo, vt longum alui profluuium: sed fortasse subsidio. Vt enim mulieri nihil oprabilius quàm menstrua hæmorrhagia: sic nihil est illi experendū magis, cum ea deest, quàm hæmorrhoides conuenienter ductæ. Atque vt hæ-
morrhagia verè dicta, superarum partium est vnica salutaris: sic hæmorrhoides inferarum, quibus tum cācochymia melancholica, ex mēstruorum suppressione nata expurgatur: tum etiam repletio venarum lumbis adiacentium, in desiderio menstruorum depletur. Est autem hæc dianœa magistri, vt doceat menstruales quibus menstrua non respondent, non aliter vindicari posse ab illis symptomatis atque pe-
riculis quæ infert eorum suppressio, quàm per hæmorrhagiam, varices, & hæmorrhoidas: quamuis illa perfugia, mulieribus non sint naturaliter instituta, nec consuecta, ob eamque causam suspecta. Nisi for-
tè ad vindicandum sufficiat *ἡ πολυδάρκεια*, vt iam diximus.

II Τῆσιν Ὀπιφόροις ἐν ὑποχονδρίῃς ἀλγῆμα· κακόν· καὶ κοιλία τῶ-
τησι φρόνδρῳ· κακόν· καὶ τὸ Ὀπιρρίζου τῶν τῆσι· κακόν.

30 Gravidas male habet hypochondrij dolor: tum alui quæ his feruntur:
quinetiam ipsas superrigere; pestiferum.

DE GRAVIDIS illud sancitum est à præceptore, vt careant iis incommodis atque symptomatis, quibus tum fætæ & fœtui vis infertur; tum verò gerendi nutriendique fœtum adempta commoditas, periculo adiicit abortiōis. Fætæ ac fœtui vim magnam infert hypochondrij dextri dolor. Abortiōis periculo adiicit alius profusior & rigor abortus, vnde adimitur omnis commoditas nutriendi atque gerendi fœtum. An verò illa tria hic posita, huc simul aduocentur, singulane ipsa per se sufficiant ad eam calamitatem abortiendi; mea sic erit ratio in examine huius prognoscas.

GRAVIDA S] Græcè est, *τῆσιν ὀπιφόροις*: quæ vox cuiusmodi sit apud Hippocratem, dictum est non ita pridem.

60 MALE HABET] Quod scilicet multum peccat in comoda fætæ ac fœtus. Est enim τὸ κακόν, no-
men commune malorum omnium quæ fiunt quæque apparent eorum periculo quos occuparunt. At-
que hoc nomine continetur magna morborum pathognomonica: quæ sunt cuiusmodi magnitudine & idea; quibus accedit æqualitas vel intensio, tum assiduitas. Continentur etiam τὰ ὀπιρρίζοντα, quæ tārūm in morbos cadunt qui sunt inter magnos eximij; vt hepatis inflammari, singultus. Postremo, terrifica

σπυγαιόμενα sputorum, vinarum, deiectionum, & empyematum, omnia nominantur κατὰ, sicut prædicta; quod scilicet malè habeant periculose: adde, si placet, mortiferè omnes ægrotos, ut scilicet illa morbi cuiusque merito, non autem naturæ, magis aut minus apparent & fiunt. Ergo gravidas malè habet.

HYPPOCHONDRII DOLOR] Dextri præsertim, cuius est ea nominis prærogativa cum hypochondrii nomen scriptum legitur absolute apud Hippocratem. Est autem hypochondrii dextri dolor, quem vel inflatio, vel inflammatio excirant. Inflationis causa est spiritus flatulentus, atque obstructio, quam inde nata febris exoluit. Nam sectio venæ non confert ubi nulla est phlegmone. Difficilis autem purgatio est in contumaci obstructione, ubi corpus non est meabile. Sed obstructionis incommoda sunt, impedita chyli digestio, intestini oppressio, & proratio; unde diarrhœa chylosa, quam paulò post dicet malè habere gravidam, dolore hypochondrii occupatam. Inflationis autem symptomata sunt; diaphragmatis inde oppressi offensio, unde spiratio difficilis esse solet: cuius liberras porissimum gravidis, & sibi & foetui, experenda. Sed inflammari hepatis, quando sytrophica est inflammatio, sæva symptomata esse solent, quæ cernuntur in prægrandi dolore, cum hypochondrii duritate, ac tum in promptu sunt; cauarum quidem inflammatarum, tormina intestini, stomachi, cardiogmos, singultus ventriculi atque nausea, sitis inexplebilis, linguæ scabrities & nigredo: conuexarum autem, phrenitis à diaphragmate, sicca tussis, difficultas magna spirandi; ac tum hypochondrii duri dolor prægrandis qui prorepat ad ingulum: ambarum partium cômune symptoma est febris, sed conuexarum maior. Quæ omnia cum dignitate partis afflicta, officiique præstantia, & ipsa symptomatum vehemètia & calamitate, omnibus æquè naturis, omnique sexui periculosa sunt: tum verò illud adiciunt periculo foetæ ac foetus, quod ibi non est par necessitati commoditas, ubi non est ratio redintegrandi, sicut in cæteris, vacatione, neoterismo, atque diætâ; quemadmodum rectè Galenus annotauit ad illam sententiam. Γυναὶκὶ δὲ γαστρὶ ἐχθρῇ ἰσθμῷ πρὸς τὴν οὐτὴν ποσὶν αὐτῆς ἀποφθίνει κατὰ (μον. i. Mulierem gravidam acuto morbo corripit; lethale.

TUM ALVI QUÆ HIS FERUNTUR] Quæ scribendi ratio, tametsi pertinet ad vêtis profluua, quæ omnes gravidas periculose habent, periculo abortiendi: tamen non æquè ad alias atque ad illas de quibus apposuit ea profluua doloribus hypochondrii. Enimvero ferri aluum gravidis frequenter profluio, infert periculum abortitionis; non eò solum quod vacuatio est genij defraudatrix, sicut à sanguinis detractione, ut placet Galeno: sed quod ipsa vincula graviditatis laxantur. Sed ea calamitas abortiendi ex alui profluio, potissimum in iis apparet quas ante illud profluuium, hypochondrii dolor exciruit. Nam si dolorem inflatio exciruit, vnaque obstructio symptomatice; erit quæ inde nascitur diarrhœa, chylosa. Sin autem cauarum hepatis partium inflammatio mouerit dysenteriam; tum certè eueniet ut quæ sic fertur aluus, non solum impotentia foetum gerendi ac nutriendi, sed etiam summa eius molestia ipsum ante diem excludat. Ex quibus efficitur, nullum alui profluuium, quantumvis criticum, rebus integris gravidarum posse cieri; si tantum exceperis quod mox infra ponetur.

QVINETIAM IPSAS SUPERRIGERE, PESTIFERVM] Etenim rigor omnis, eò gravidas malè habet, quia cieri non debet cum in graviditate suppressio est menstruum, sicut in foetus vacuitate. Quò fit ut abortus rigor in gravidis; periodicè quidem à febris, aut etiam criticè, foetus incommodo cieatur, concutiendo: symptomatice autem, ab empyemate securitatem vitæ adimat puerulo atque matri. Ac talem rigorem ostendit ὁ ἀπὸ τῆς γαστρὸς ὀδυνῆς.

12 Ὀδυνὴ κοιλίης ἐν τῇσι τριαύτησιν ἥσων κακὸν, ἢν ἰλυώδεα καὶ αἰρή.

In talibus dolor alui non ita est malus, si expurget limosa.

EST QUIDEM concitatio alui molesta puerulo qui & foetore deiectionum offenditur, & inde loci impatiens, præcipitem habet exitum, prolapsu graviditatis, quam vinculum ipsius exolutio continere non potest. Sed tamen si concitatio alui talis omnino sit, ut eam sic esse profuerit; quia dolorificum malum citò expurgat; de illa verendum nihil est, ob impotentiam gerendi & nutriendi foetum, quam aluus profusior inferre solet.

IN TALIBVS] Modò descriptis, quarum graviditas in metu est abortitionis, ex alui dolore atque fluore.

DOLOR ALVI] Κοιλίης ὀδυνῆς, non quidem fixa firmiter & prægrandis, sed pressa leuiter atque fugax, quam alibi vocat παραχλὺ τῆς κοιλίης, i. perturbationem alui, quam exciruit illud ipsum quod infra transmittitur: non autem sursum reuoluitur, nempe humor & flatus.

NON ITA EST MALVS] i. Minus gravidam malè habet, quàm is quem ciet crebrò aluus profusior.

SI EXPVRGET LIMOSA] i. Si à tormine fugaci & leui, aluus ducatur multum & raro, quod signum est ducis naturæ, ac purgationi aluinæ quodam imperio præeuntis: ducatur autem crassiusculis excrementis, atque quodammodo figuratis, exquisitè permixtis, non liquidis atque stridulis; non item spumantibus atque meris; nec sæpe & multum, nec multum & sæpe. Sunt enim hæc toto genere symptomatice, quæque molestia damnisque pariter ægros augent: sicut illa leuationem adferunt, cum pari alacritate ac tolerantia egerendi coniunctam; idque cum aliis, tum si venter maneat solidus & succi plenus, quem εὐσχοι καὶ λαπαρόν vocat Hippocrates. Verus est illud præceptoris. Ἐν τῇσι παραχλὺ τῆς κοιλίης, ἢν μὲν αἰρὴ δὲ καὶ αἰρήνεται, καὶ αἰρήνεται. Ἐμφέρες τε καὶ εὐφώρως φέρουσι. i. Si qualia decet purgari, purgantur; cōfert et leuiter ferūt. Sunt autem

Sunt autem *πύλα*, excrementa limosa: non quidem amurcosa & nigra, velut sanguinis faciem ipsius referentia: hæc enim semper sunt prava; sed qualia modò dixi, crassiuscula, exquisitè permixta, multum & raro ducta, cum abdominis *εὐχέτω*. Nam si quis fortè, aucupio dictionis, pertinaciter contendat, *πύλα* pertinere ad sanguinis *ινωύ*, quam agnouit Galenus in nigris deiectionibus, *αἷμα*; sciat is velim, multum interesse inter *ινωύδες* & *ινωύ*. Nò enim deiectiones illæ nigrae, sunt *ινωύδες*; sed ipsa *ινωύ* τῷ *αἵματι*. aph. 22. & 25. Deinde nihil eiusmodi, potest infra transmitti per aluum, nisi pessimis ægri rebus. Nam illa quæ leguntur apud Hippocratem *πύλα* *κατωχρόματα* bene infra transmitti, pertinent ad hæmorrhoidas.

10 13 *Ἡσι τῶν τριῶν ῥηιδίως γίνεται· μὲν τὸν δύσφορον σφόδρα.*

Inter predictas quæ pariunt facile; iis à partu reliqua difficillima.

ÆNIGMATICA esset prognòsis ex antithesi contrariorum, per cōsecutionem mali ex bono, cum scilicet *ἡ εὐπνία*, i. *partus facilis*, difficultatem adfert eorum quæ consequuntur à partu. Sed eam obscuritatem rerum *ἀνόπων*, minimèquē consentientium, planè adimet diancra elegans & subtilissima præceptoris; ubi cernitur falsa & infidiosa leuatio grauidarum, fœtus ex facili deponentium. Sicigitur hæc diancra, obscuritatis nodum dissoluet.

20 INTER PRÆDICTAS] Quæ rigent affecta iam grauiditate, quarum rigorem dixit esse pestiferum: ut ipsas etiam malè habet hypochondrij dolor, & alui profluuium.

QUÆ PARIUNT FACILE] i. Quibus ex facili partus est: non quidem propria sponte pueri & locorum, quorum enixu partus est foelix, cum pari amborum contentione suscipitur; sed à rigoris concussione qua fœtus excutitur, non secus atque in *δυσπνία*, sternutamento forti oborto. Sed multum interest; rigeatne aliquis, an verò sternuter. Nam sternutando, non rarò defungimur magnis periculis quæ à rigore frustra citato & symptomatiko inferuntur.

IIS] Quæ ita pepererint facile; vel potius, ut author posuit, quibus ex facili fœtus excidit, à concussione rigoris exclusus: ut facilis exclusio est à concussione, quando est grauitas grauiditatis affectæ.

A PARTU] Edito in lucem fœtu vitali, propediem exituro; tum sua sponte, tum vteri quem tædet graniditatis.

30 RELIQUA DIFFICILLIMA] Non eò quidem quòd pariendi facilitas, causam adferat τῆς *δυσφορίας*, i. molestia ac laboris: est enim absurdum, *εὐπνίαν* facere τῶν *δυσφορίαν*; sed quòd occasio pariendi à concussione rigoris, difficultatem attulit purgamentorum quæ sursum habent *μεταστῆναι*, nec liberè ac liberaliter expurgantur; sed inde ab vtero & in vtero morbi contingunt. Nam à rigore frustra oborto, materia rigorisfera, metastasin habet ad diaphragma & caput.

40 14 *Τῇσι καύσῃσι φθινώδεσιν, ἥσιν ἐρύδους ἐπὶ προσώπῳ γίνεται· αἱ δὲ πινῶν δότωσ' ἕξιν, τὸ δότωσ' ἐποιοι γνώμεναι.*

Grauidis tabe implicitis, quibus est rubor in facie; illum substillæ de-lent è naribus.

50 ENIMVERO symptoma phthisis natum à phthoë, non minùs fœtui quàm fœtæ ipsi calamitosum est: si quidem com meatus paupertas in fœta, genium defraudat fœtus. In vtroque par est conditio atque causa exitij: quoniam in vtroque par est infectio viuifici nectaris atque consumptio. Sed præter eas emaciandi causas quæ sunt in phthoë, i. pulmonis vlcere, propterea quæ phthiseos nomen habet; perniciofa eius est sympathia & syntimoria cum capite; perniciofa item cum corde & iecore. Et sanè capitis quod in sympathiam à phthisi adducitur, signum est in hac prognòsi, cuius examen sic erit.

GRAVIDIS] Quæ iam processerunt grauiditate ultra pueruli *τύπωσιν*, ad motum vsque. Nam vix procedunt ulterius, cum emacruerint multum à phthoë tabifica. Vetus est illud. *Quæ supra modum emacruere mulieres grauidæ, bimestres abortiunt priusquam habitiores factæ sint.* Tamen non est credibile, illam concipere quæ multum emacruit, præsertim à rabe; cum scilicet eò marcoris ventum est, ut adunci vngues liuescant. Sed à conceptu adiciuntur tribus illis emaciandi causis quæ sunt in phthoë, vnde per summam corporis extenuationem abortiunt.

60 TABE CORREPTIS] *Φθινώδεσιν*: qua voce intelliguntur æquè phthisis capaces, atque participes. Hic tamen consultò de phthisi fundata in phthoë, i. pulmonum vlcere, intelligendum putauimus. Id enim declarat quod sequitur. Nam de natura phthisis, suprà in promptu sunt prognòses tredecim, fideliter explicatæ.

QUIBUS EST RUBOR IN FACIE] Quod sanè videtur *ἀνύσταν* in macie phthisis, ubi sunt tres emaciandi causæ. Nam omnis maciei signum *ἀνύσταν* est, cutis pallida & intenta, si absoluta est macies; pallida autem, si inchoata. Sed inchoatæ & absolutæ maciei, pallor est cutis, qui cum rubore eximio qui ponitur in hac prognòsi, nequit consistere. Itaque rubor & macies sunt planè *ἀνύσταν*: quo-

niam ut in secunda valetudine pars omnis vnde capit *πὺ ἐκείνῃ*, inde suauerubet; sic in aduersa inde pallefcit, vnde contrahit *πὺ καχεξία*. Et tamen hic scribuntur in eodem subiecto: quoniam illud secus fit in morbis acutis atque tabificis, in quibus per propagationem causæ morbificæ, partes quædam rubent, quæ paupertate alimenti sunt pallidæ; sicut nonnullæ calent, quæ per *ἔκρυσιν* caloris natui sunt glacie frigidiore. Iam verò malæ rubent in phthificis: quoniam pulmonum anathymiasis tussiendo expressa, ibi subsistit, propter angustiam venularum, maiorum *ταύται* in excipientium quæ non expirat.

ILLVM SVBSTILLA DELENT E NARIBVS] Quod est eiusmodi ac si diceret. Maciei absolutæ signum *ἀχέειν*, quod est in pallore cutis intentæ, rubro veneno fucatæ; signum, inquam, firmiter fixum, palam ostendet fuci deletio facilis à substilllo è naribus, quod infert sanguinis *κακοήθεια*, & partis exolutio vnde stillat, virtute omni collapsa.

15 Ἦσιν ἐν τῷ κοῦ γε λευκὰ, Ἰππιδάντα δὲ ἄμα πυρετῷ, κώφωσι, καὶ ἐς πλεθρὸν ὀδυρὴ ὀξεῖν· Ἰξίσανται ὀλεθρίως.

Quibus è partu, alba quidem cum febre substiterint; tum surditas & vis acerba doloris in latus irrepserit; insaniunt desperanter.

DE LOCHIORVM symptomatis, cum illa nec iure, nec loco sistuntur; dictum est abundè suprâ. Hic certè sufficet explicare prognosin de scripto Galeni ad illud prorrheticum, vbi est iis expressa literis quæ hic leguntur. Est autem scriptum Galeni, sic à nobis Latine cōuersum. Atque id certè scriptum hoc loco *ἐν* huic citimo, sicut *ἐν* alia multa prorrhetica huius libri, subiecta sunt catholicis theorematibus. Non enim solùm in albis quæ purgantur à partu, si eorum suppressio sit, praua est ipsa signo *ἐν* causa: sed etiam in biliosis, atque adeo sanguine ipso. Nam ipsa lochia, purgatio est; quæ, vel ipso nomine, rerum est alienarum, quæ tempore graviditatis collectæ sunt in venis: cum scilicet quicquid in ipsis est boni sanguinis, in nutritatum fœtus absumitur; inutile autem manet, quod singulis mensibus antè per vterum excernebatur. Ergo si reliquæ quæ supersunt in venis, vacuata non sint à partu, certè vel in phlegmonem magnam locos attollunt; vel etiam ad superas partes translatae, morbos inferunt proprios partium obsessarum, cum pari periculo. Sed in quam partem irrepserint, id verò de signis quæ inde apparent, intelliges: sicut hoc loco caput *ἐν* thorax prauis sanguinis quem ab vtero exceperunt, signa ostendunt. Sed pensum hic meum absoluisse non videor, donec prognosin examinauero, similiter vt cæteras omnes quæ suprâ sunt, ad examen adduxi.

Ergo. QVIBVS E PARTV] Naturaliter edito, pari contentione vteri atque fœtus: idque post tempus exactum graviditatis.

ALBA QVIDEM CVM FEBRE SVBSTITERINT] Quorum antè fuit libera & liberalis purgatio, vt in Philini vxore; quasi rerum in venis alienarum quæ stabulantur ibi dum manet graviditas, absumpto frugi sanguine ad nutritatum fœtus. Ex quo efficitur, non eam solùm videri conspurcationem rerum albarum quæ intempestiuè sistuntur: sed etiam biliosarum, ipsiusque adeo sanguinis illic cunctando corrupti. Sed puerperialis illa purgatio, cuiusmodi ea fuerit, intempestiuè sistitur ante diem 18. si purgatio menstrualis erat duorum dierum; vel ante 27. si trium; 35. si quatuor; 45. si quinque, vt suprâ posuimus. Sistitur autem à febre oborta, raptu bilis in venas, vbi collectione, motu, putredine, febrem accendit.

TVM SVRDITAS] Quæ occupato accidit auditorio & audiendi sensu: idque cita in caput anadrome biliosi humoris. De qua illud præceptum est. In febre surditas alium sistit. Ac tum impedito appulsu *ἡ ἀκουσίων*, nec iis exceptis in auditorio, neque perceptis in audiendi sensu, fœminæ obsurdescunt, simulatque purgatio sistitur lochiorum quæ sursum ad caput biliosa feruntur, febre oborta.

ET VIS ACERBA DOLORIS IN LATVS IRREPSE- RIT] Vbi anadrome lochiorum primùm subsistit, propterea quæ dolorem ciet acerbum in tunica costis intexta, sensus acerrimi. Est enim vetus illud; quod omnis anadrome ibi dolorem facit, vbi subsistit. Hic autem paulisper subsistit, & sursum ad caput inde cursum inflectit, vnde doloris qui occupabat latus, insidiosa leuatio est. Sequitur enim quod est grauissimum.

INSANIUNT DESPERATÆ] Proritato primùm cerebro ab effera bile flaua, cuius in atram facilis mutatio est. Eius autem sunt acriores morsus quàm flauæ. Tum illæ cœptis immanibus sunt efferae magis; ac tum alteratio cerebri, vertitur in alienationem & *μαεσσησιόν* insanabilem. Ac de surditate prænuncia iamiam futuræ insanie, illud est positum à præceptore. Τὰ ἐν κεφαλῇ γίνονται ἰώδεα ἐμίσματα, μὴ τὰ κατὰ τὸν κοῦ, ἀλλὰ τὰ ἐν τῇ κεφαλῇ. Cum cephalalgia, biliosi vomitus, surditas *ἐν* vigilia, insaniam adducunt. De lateris autem dolore, scitum est quoque illud. Lateris dolor à bile, qui vanescit immerito; insaniam facit. Est enim rarum illud; quod perniciofa mala, quorum sine signis leuatio est; mortem subesse ostendunt.

16 Τὰ ἐν τῇσι Ἰππιδόροις ἀλμυρώδεα, σημαίνει μὴ τὸν κοῦ δύσκολα, λευκοῖσι δακνῶδεα. αἱ τριαῦται κατὰ τὸν κοῦ δὲ ποσκληρωμένοι. λὺξ Ἰππιδόροις φλαῦρον, καὶ πύσις ὑπερῶν, καὶ σίωκτεινε.

Quæ sunt in

Quæ sunt in gravidis falsilaginosæ, difficultatem à partu fore ostendunt ex albis mordacibus. Ac tales purgationes indurant, locosque corrugant. Hinc pessimè ipsas habet singultus, atque interimit.

VETVS PRÆCEPTVM est; quòd omnia tenere oportet gravidarum τὰ ὁπρᾶν μάλιστα, cuiusmodi sint, & quòd quæque fiant arque appareant tempore graviditatis, vt inde certa præfensio compareretur futuri partus, omniumque adeo puerperiorum. Primumque tenenda est illa regula præceptoris. 2.Epid. part.3.
Τὰ ὁπρᾶ ἀνέμια ἐν αἰεὶ μὲν γίνεται· σκεῖται. i. Epiphenomena quibus mēsis apparetur; videndum. Nam multum
10 interest; fueritne grvida menstrualis πρὸ τῆς πύσης, an verò μετὰ τὴν πύσην: quoniam illic non ita periculo locus est abortitionis, sicut hic esse solet, i. post πύσην. Tum gravidæ pica in stomacho, non tam malè habet fœtam & fœtum circa initia graviditatis, quàm ea trimestri aut quadrimestri, cùm fœtus in motu est. Atque ita de aliis quæ sunt eiusmodi. Sed illa demum futura est fœlix puerpera, & cuius voto puerperia respondebunt, quæ inoffenso cursu, ac sine molestia, omne tempus exegit graviditatis. De qua scriptum illud reperio. Ἡστὶν ἰδίῃ ἔσθαι τὴν πύσιν· ἡ δὲ πύσις, ἡ δὲ πύσις, ἡ δὲ πύσις. i. Quibus inita
præscriptum tempus nihil accidit, vitalia sunt quæ sunt omnia. Vt igitur secundo cursu exacta graviditas, fœlici deponitur puerperio: sic ea sinistri est ominis, quæ signis abundat malè habitū fœtus in utero, ac fœtæ ipsius. Atque fidem faciet huius rei, positum in hac prognosi τὰ ὁπρᾶν μάλιστα, quod est huiusmodi.

QUÆ SVNT IN GRAVIDIS] i. Quæ gravidas malè habent toto decursu graviditatis.
20 SALSILAGINOSA] Non ea quidem quæ cutis pruritu, aut intestinorum, vterive, & sinus pudoris morfu molesta sunt, quæque partibus illis κνησμός τε καὶ δακνός τε esse solent, de quibus iam supra, multa audiui: sed ea quorum perceptio est gustatu palati & linguæ, qualem ibi exhibet falsilaginosa salina & sputum pituitæ putris & falsæ, quam vocat præceptor σαπρὴ φλέγμα καὶ δίκην. Nam falsilago illa cuti κνησμός τε, vel intestino locis τε δακνός τε, abortitionem infert, nec pariendi tempus expectat. Est enim falsilago illa toti corpori pruriginosa, inueteratæ cacochemiæ quam excipit cachexia & macies. De qua illud scriptum est. Pruriginosa corpora post alui suppressionem, pessimè habent phthisicos. Tum spuri falsi quod
antea sufficiens expurgabatur, fatalis ad mortem suppressio est, de qua iam illud sancitum est à præceptore. Si cui spuria falsa, τῶν τε τῶν τε quiescunt; hinc rubet corpus obstitum exanthematis, quod ante interitum exasperatur. Sed ea falsilaginosa quæ hic ponuntur, futuræ calamitatis à tempestiuo partu prænuncia sunt,
30 non autem abortitionis. Est igitur consentaneum, vt sapore huiusmodi sint, non autem prurigine vel asperitate cutis, quæ comes est cachexiæ; cùm scilicet ventum est ad vltima maciei: quamvis hic author attigerit σκληροσμός, in verbo σκληρύνει, de quo dicetur mox.

Coac. 1. cap. 17. lib. 1.

Coac. 15. cap. 7. lib. 2.

CALAMITATEM A PARTU FORE OSTENDVNT] Cùm scilicet edito in lucem fœtu, ac sanguine frugi absumpto in commearum eius dum esset in utero, quæ supersunt reliquæ sanguinis, olim menstrui, cum falsilagine foras prorumpunt, nec tamen secundo cursu: quia difficilis & permolesta earum purgatio est, & grauis locorum offensio.

EX ALBIS MORDACIBVS] Quæ abradendo & exasperando, summam exhibent locis molestiam, similiter vt pituita putris & falsa, intestinis dysenterica esse solet tenacitate & acrimonia, vnde locum habet mordendi, & abradendo exasperandi.

40 AC TALES PURGATIONES] Alborum mordacium, quæ à partu feruntur per uterum, nec ante diem suppressæ, cursum ad caput reflectunt, vbi mouet insaniam, vt scriptum est superiore prognosi.

INDVRANT] Non quòd inferant duritatem alui suppressæ, quæ sic expressa legitur in aduersariis lib. 6. Epid. ἰσχυρὸς, τὸ καὶ τὸ κοιλίῃ σκληρύνει: sicut in aphorismis dicuntur κοιλία σκληρὰ, ex aquilonia tempestate. Nec verò purgationes illæ alborum mordacium, cutim reddunt inrentam, faciuntque δέρμα κατάρκιστον, quod est in summa macie: cuius diagnosticum signum, σκληροσμός nominatur. Sed ideo σκληρύνει dicuntur, quia τρηχύνει, i. exasperant: sicut & verbum ipsum τρηχύνω, usurpatum legitur αἰτὶ τῷ ἀποσκληρύνειν, prognosi iam adducta lib. 2. Sequitur enim.

Coac. modò adducta.

LOCOSQVE CORRUGANT] i. Abradendo exasperant: atque illa duo, ἔξυς καὶ τρηχύνεις alborum mordacium, pessimè habent uterum: sicut eorum ἀναδρομή, infert symptomata quarumlibet partium occupatarum propria.

HINC PESSIME IPSAS HABET SINGVLTVS] Adducto in uteri contagionem stomacho, ἡ δὲ τὸν ὁμοιοτήτων, vel eò facta humoris ὁπρᾶν μάλιστα ab utero. Nam de singultus natura & causis dictum est alibi.

ATQVE INTERIMIT] Quia vel inflammationem mouet lethalem, cùm frustra suscipitur ab exhausto, vel ab humore nimium glutinoso & effero, vnde concussio irrita, vertitur in phlegmonem conuulsificam.

17 Ες ὀσφυῖ καὶ ἐς πόδας σπινταίσεις ἐκ γυναικείων πλήθους ἐκ πυηπ-
60 κόν. καὶ τὰ ποικίλως ἀπὸ κοιλίης ἰόντα γλιχρὰ, δυσώδεα, ὀππὸνως πιγνώ-
δεα, ὀππὸ τοῖσι περὶ τὴν μήτρην ἐκ πυηπκόν. οἶμαι δὲ καὶ ὁρᾶσθαι ἐν ταῖς
ποικύταις.

*Lumborum tensio atque pedum, ex muliebrium abundantia; in sup-
purationem abit. Tum quæ ab aluo variè pigro lapsu exeunt agrè, vi-
scida, fœdi odoris, strangulatoria, præter illa iam dicta; suppurationem
inducunt. Tales autem arbitror nonnihil delirare.*

LOCHIORVM albis mordacibus conspurcatorum incommoda quæ sunt in vtero, quæque ab v-
tero per anadromen, quocunque appulerint, inferuntur; duæ prognoses, huic suprà citimur, aperuerunt.
Sequitur eorundem in empyema mutatio, cum vel illa subsistunt, vel admodum agrè pigro lapsu fe-
runtur, glutinosa, graueolentia, quæque opinionem faciunt strangulatis. Et quoniam in osphalgia
tractatu, iam pridem hæc prognosis ad examen adducta est, & cogitationum nostrarum literis explica-
ta; sufficet ea scribere quæ huius loci propria videbuntur, quæque aliquid lucis adferant obscuritati
huius prognoscos. Est enim multis obstructa difficultatibus, quas tamen conuertere ad facilitatem
posse videmur atque speramus hoc modo.

sent. 20. part.
1. 6. Epid.

LUMBORVM TENSIO ATQVE PEDVM] Cum scilicet earum partium, ex affectione
propria, tensio est, vel etiam aliunde contractio.

EX MULIEBRIVM ABVNDANTIA] Quam facit ipsorum suppressio vel inhibitio, vnde
lumborum tensio est, tum proprio vitio, tum alieno. Primum enim repletio particularis venarum lum-
barium à sanguine ibi collecto, ipsos distendit: tum verò muliebrium circa locos amplificatio, sui quo-
que vitij participes facit lumbos, atque ipsos contrahendo distendit. Sic etiam pedum tensio est affe-
ctione propria quam ipsis infert muliebrium propagatio, vel ipsa contractio ex vitio alieno quod est in
locis & partibus vbi mulierum naturalia continentur. Sic enim comparatur lumborum *αὐτῶν* atque
pedum, ex muliebrium abundantia: non quidem eorum quæ foras exeunt, sed quæ subsistunt; vt suprà
docuimus, vbi legitur in hanc sententiam, *ἐκ γυναικείων πλεονας*: quod abundantia nomen hic non ex-
pressum est, sed subauditur in illo *ἐκ γυναικείων*. Ac supprimendi & inhibendi causa sunt eo loco à nobis
adductæ.

Coac. penult.
cap. 12. lib. 2.

PROMOVET SVPPVRATVM] Quod est eiusmodi, vt in spe angusta desperationem non ad-
ferat, statuaturque medium inter eam & salutarem crisin, vt erit ipsius conditio, & in expurgando li-
bertas ac liberalitas, atque copia, nullo superstitere vlcerè maligno in locis. Est autem difficilis ratio statu-
endi, pus effici è materia quæ non est capax pepasmi, qualis est lochiorum, vt Galenò visum est ad histo-
riam de Philini vxore, quam sustulit lochiorum suppressio cum sæuis symptomatis: sicut vxorem Epi-
cratis ab interitu vindicauit liberalis eorum & libera expurgatio. Itaque adducor facilè vt hic mulie-
brium nomen, pro menstruis positum esse putem; de quibus in empyema muratis, hæc philosophia est
præceptoris. Existunt mulieres quibus menstrua cunctando purulenta fiunt, exactis duobus aut tribus à suppressio-
ne mensibus. Atque id potissimum accidit, si æstu febrili menstrua incanduerint. Ac signa hæc opinionem faciunt sup-
purati iam iam futuri; dolor prægrandis hypogastrij; venarum micantium pulsus molesti; tactus cuiuslibet, etiam
suspensi, offensio in hypogastrio. Et si melius illi futurum est, prorumpunt menstrua per sinum pudoris, exitque puru-
lenti sanguis & graueolentior per septem, octo ve, aut etiam nouem dies. Antea verò laborat & exercetur, vt di-
ctum est. Porro autem cui menstrua purulenta conuenienter fuerint expurgata, profuerit nullum restare vlcus. Nam
si fortè supersit, longiorem & accuratam magis curationem requirit à medico, ne ipsum putrescat, fiatque admo-
dum fœdi odoris.

lib. 4. & 5.
1. Epid.

TVM QVÆ EX ALVO VARIEGATA, AGRÈ, PIGRO LAPSV DESCEN-
DVNT VISCIDA, FOEDI ODORIS, CVM STRANGVLATV] Quorum scilicet è lum-
bis in aluum refluxu, cum ibi paulisper hæserint, excretio est dysenterica, quam facit ipsorum tenacitas
& actrimonia, vnde vis noua locis infertur, & inde opinio strangulatus; cuiusmodi esse solet hysterica-
rum quæ fauces laqueo sibi præcludi putant.

PRÆTER ILLA IAM DICTA, SVPPVRATIONEM INDVGVNT] Quod est eius-
modi ac si diceret. Præter illa muliebria purulenta, quorum è locis excretio est per sinum pudoris, idque
cum vlcerè, vel etiam nullo superstitere ibi vnde manarunt; est quoque alia purulenti humoris per aluum
purgatio, de qua illud iam pridem est positum à præceptore. Quibus è dysenteria seu itur ad puriformiam; qui
superstat humor, multum albus erit & multus. Nam pituita pepasmo fit puriformis; ipsa verò bilis *αἰε-
ματώδης*, i. quodammodo pituitescit. Igitur ab egestione cruenta quæ difficulter, crebrò, & parum egeritur;
transitus fit ad puriformem, virtute caloris natui, & integritate partium solidarum, quibus materia ef-
fera mitificatur, & omnem exuit feritatem, vt iam dominatu regatur ipsius natura, nec ampliùs ipsi vim
adferat. Secus est in egestione opima, læui & pauca, partim alba, partim subflaua. Hic liquitur adeps &
seuum; quorum seuosa & adiposa egestio, febris ardore liquata, difficilis est ac fœdi odoris, nec vllum
adfert dysenterico adiumentum, sicut hæc puriformis.

Coac. 3. cap.
20. lib. 2.

TALES AVTEM ARBITROR NONNIHIL DELIRARE] Propter sympathiam cere-
bri ab vtero inflammato, quæ ipsi cum eo intercedit, *ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν κοιλίαν πυρετοῦ*, i. propter communionem &
generis similitudinem. Appositè autem sapienterque posuit, *πρὸς ἑαυτὸν*, i. vix esse apud se, ac nonnihil, siue
parumper, è potestate sui exire: præsertim cum hypogastrij dolor est cum venis micantibus, dum parvis
pepasmo natura incumbit: quoniam nullum delirium potest esse *διωκτικόν*, quando in cæteris partibus
pituitæ & bilis offensiones, cerebrum in sympathiam & contagionem adducunt.

Gal. cōment.
ad pronth. i.
fin.

18 Τὰ ὑστερὰ ἐν κοιλίῃσι σκληρύνματα ἐπώδυνα· ὅξέως ὀλέθριον.

Hysterica duritates in aluo admodum dolorifica; crudeliter atque citò pernicioſa.

HOC PRIMVM symptoma est vteri, quod ipsum proprio vitio malè habet, non alieno. Est autem systrophica inflammatio, cuius hoc signum est, hysterica duritas in aluo admodum dolorifica: sicut hepatis inflammatio, tumor durus ac dolorificus hypochondrij. Sed ratio atque causa eorum quæ scripta sunt in hac prognosi, similiter explicabuntur, ut pridem fecimus in dolorifica hypochondrij duritate ab hepate inflammato.

Ergo. HYSTERICÆ DURITATES] Quas edit prægradis vteri tensio, quam facit rheuma consistens à cōcitato sanguine: idque, ὀρσμός, siue impulsu, vel etiam illinc expulso vnde non exit, sed ibi consistit. Impellitur autem, per venas αἰμύρους, in venulas quæ ipsi affixæ sunt, nutriendi causa. Itaque in tumorem assurgit, de quo dicitur mox. Nam duritas illa, communis est inflammationis & scirrhi. Vtriusque autem distinctio est in promptu.

ADMODVM DOLORIFICÆ] Distento multum vtero, sensus acerrimi, ac proritato sanguinis glutinosi, firmiter illic infarcti, nimia abundantia. Sic enim sensio est peracerba doloris, magnitudine, idea, æqualitate & assiduitate proprii humoris morbifici & partis obsessæ; cum scilicet proprio dolet vitio, non alieno. Nam σκληρύνμα hic expressum, non est scirrholi vteri, sed inflammati; quia ἐπώδυνον: quod nequit esse in scirrho, quantumvis durissimo, propter scirrholæ partis æqualiter intemperatæ πῶς τὰ κελύκη καὶ αἰμαθυσίαν, quam infert consistens rheuma humoris torpifici: idque tum per se, tum ex euentu, quod est à phlegmone perfrigerando nimium stupefacta. Et verò conuiuentia vteri; non quidem gravidarum cum mollitudine, sed vacuarum à duritate vtriusque tumoris, commune symptoma est; inflammationis quidem, cum sæuo dolore; scirrhi autem, cum sensu torporis. Est enim τὸ σκληρύνμα, vtriusque morbi commune, ut annotavit Galenus ad illum aphorismum. Οκώσοι τὸ σῶμα ἢ ὕστερον σκληρὸν ὅτι τῷ πνεύματι αἰσάνη τὸ σῶμα ἢ ὕστερον ἐκκινῶνται. i. Quibuscumque os vteri durum est; his necesse est ut conuiueat. aph. 44. 5.

IN ALVO] i. In omni partium regione quas occupat amplitudo ventris. Sunt autem illic posita vbi symptomata recensentur vteri inflammati, quæ sunt huiusmodi. Vtero inflammato, menstrua reuoluntur, aut inde apparent praua & pauca: ipsa quoque ceruix vteri, venulis intertexta, fit araneosa. Tum febris acuta mentem inuadens. Et quoties ieiuna est mulier, vomitio quadam ipsi procedit, & omnia reuomit quæ assumpserit. Quinetiam dolor occupat intum ventrem & lumbos: tum exanimatur, ac toto corpore perfrigescit. Venter nunc durus, nunc mollis percipitur, conflagratque incendio, atque in eam molem assurgit, ut scitum gerere videatur. Itaque non minus verè quàm appositè scriptum est, ἐν κοιλίῃσι, ut ostendantur vitia & incommoda variarum in aluo partium, inflammati vteri sociarum & vicinarum; propterea quoque in eius afflictionis, quæ inter magnas eximia est, sympathiam adductarum. Quod in omni sympathia, omnibusque symptomatis quæ per ὁμηρίαν inferuntur, obseruandum præcepit Hippocrates. Hic enim nomen, τῆς κοιλίας, non est alui cibariæ, non item spirabilis; quam esse dixit κατὰ τὴν αἶσαν κοιλίαν; sed eius capacitatis & aluci quæ ab imo sterni describitur ad pubem vsque: vnde ventrosi homines περιτόρες; & sceminae grauidæ, ἐν κοιλίῃσι, cōm. ad aph. 1. in aluo gestare dicuntur. Sic enim Galenus πῶς κοιλίαν interpretatur. Est autem in aluis duritas, ab inflammato vtero, per oppressionem partium circumiacentium, similiter ut hypochondrij, ab hepate inflammato multum oppressi atque distenti, ut suprà dictum est de tēsiōne quam propria edit affectio distentæ partis, aut vicinarum sociarumve contractio.

CRUDELITER ATQUE CITO PERNICIOSÆ] Crudeliter quidem, ut planè ostendunt prædicta symptomata pathognomonica, epigenomena, & epiphænomena: citò autem, menstruorum reflexu ad principatus vitæ; subistillo vrinæ, ab inflammata vesica cum vtero, & nimis oppressa, vnde est crebra & ægra vrinæ expressio; tum sæui doloris toto corpore cruciatu; delirio, & febre acuta, &c. Ac sanè crudelis citæ perniciæ, similiter hic ratio apponi potest, sicut expressa est in cōuulsione, his verbis.

Οὐκ ἀσμένει χεῖρον πολλὴ ἢ συνώνια τῶ νοσήματος· διὰ ἐν τῷ κατὰ τὴν μὲ πῶς δυνάμει, ἔξω τῆ σάνει ἐκπύρει. i. Tempus non expectat doloris contentio: sed citò vires exoluit, citatque mortem adducit. Nam phlegmone vteri, doloris ac febris pernicioſa vi, erysipelas ipsum præcedit: nec minus funesta est mulieri grauidæ atque vacuæ, quàm scemini erysipelas. De quo hæc sententia est præceptoris. Ηγχανὲν κύστη ἐρυσιπέλας ἐν τῇ ὕστερῃ χύστει. aph. 43. 5. i. si grauida mulieri erysipelas nascatur in vtero; mortiferum est.

19 Τῇσιν ὀπιφόροισιν ἥδη, ἀφθώδεα ῥόδια ἐπώδυνα· πονηρόν. αἱμορροῖς ταύτησι κακίστον.

60 *Mulieribus nota grauiditatis, fluxiones aphthifera, dolorifica; praua. Has pessimè habet hemorrhoids.*

EXERCITATIO hîc noua est super mutata consuetudine bene gerendi fœtum, pariendique partu secundo ac tempestiuo, ad infuctam abortiionem; vnde restibilis olim fœcunditas, mutationem nunc habet sterilitatis. Ac certè hîc philologia ex æquo certat cum philosophia. Vtramq; autem sic explicare consilium est.

MVLIERIBVS NOTÆ GRAVIDITATIS] Sic enim consultò vertimus, vt inde significetur vel ipsa restibilis olim fœcunditas, quæ cuique nora est; vel iam pronecta grauiditas, cuius in aluo grauidæ cernitur meteorismus prægrandis. Nam suprâ dictum est *ἡ δὲ ἔσθ' ἐν τῷ ἔμβρυον*. Tum etiam alibi sæpe patefacta emphasis notæ illius, *ἡ δὲ*, apud Hippocratem.

FLUXIONES APHTHIFERÆ] Non ipsæ quidē aphthosæ, sed ora ipsa quibus à rheumate vlcuscula inferuntur. Sunt autem rheumata feritate *ἀφθώδεια*, i. fœta vlcusculis, quocunque illa inciderint *δὲ τὸ πῶς ἔστι καὶ ἡ φθορὰ δὲ ἀφθώδεια*, i. *abradendo & exasperando erodentia*, quorum malefica vis est à pituita putri & falsa, è capite ibi collecta; vel à viscerum & hepatitis impuritate, cum vitio capitis; vel à diuturna tempestate austrina & pluuia, quam excipit aquilonia. De qua tempestate aphthifera sic visum est præceptorî Galeno, ad illam sententiam dictatoris. *Στόματι ἀφθώδεια, κοιλίαι τεραχώδεις*, &c. Earum, inquit, omnium, quæ hîc ponuntur, affectionum, singula oriuntur *συνήτως*; nulla prædicta qualitate maligna. Deinde subiungit. Igitur aphthæ gignuntur puerulus continenter in ore: sunt autem vlcuscula pressa leuiter in superficie, quæ sanescunt facîle, malignitatis expertia. Et paulò pòst. sed cum insluit prauus humor omni ætate, semper existunt maligna: sicut omnia è malis orta semper sunt mala. Secus est de puerilibus aphthiis quæ mûlctra nutricia pullulant in ore tenerimo, si lac paulò sit acrius, donec ipsum mulgere & sugere consueuerint.

DOLORIFICÆ] Quoniam aphthæ *κακοήθεις* abortæ, & soboles putris & maligni humoris, vbiuis partium illæ fuerint, ibi putredinem secum habent coniunctam partis obsessæ: sicut & alia quæuis pathemata quæ sub dispersorum, i. *συνήθων*, specie, à tempestate pestifera inferuntur. Exempla sunt in erysipelate, aliisque morbis quorum historia recensetur lib. 3. Epid. part. 3. Sunt igitur hæc dolorificæ: quia partes quas occupant, malè habent abradendo & erodendo.

PRAVÆ] Cur ita sint, dictum est suprâ in hoc tractatu. Sed ei facili enarrationi multum lucis adicietur ex Galeni comment. ad illum locum Hippocratis, vbi narrat, aluos turbatas & cibi fastidium, proximè sequi aphthas malignas. Verba Galeni hæc sunt, Latine conuersa. *Eius qui è capite fluxu ad fauces prauis humoris quæ portio abiit in pulmonem, tabifica mala effecit: quæ autem secessit ad aluum, ducta deorsum, suo morfu prægrandem concitaturbationem, quod aperte ostendunt κοιλίαι τεραχώδεις. Sed ea portio in aluum delapsa, non antè infra transmittitur, quàm appetendi vim labefactarit, vnde nascuntur αἱ δὲ πρῆλαι*. Ergo prauæ sunt grauidis illæ aphthæ, sic natæ vt dictum est: tum quia inducunt cibi fastidia, vnde macrescunt inedia: tum quia gerendi ac nutriendi fœtum, commoditatem adimunt. Gerendi quidem, vinculorum vteri laxitate; nutriendi verò, comæatus penuria, ex alui profluuiio. Quicquid autem gerendi ac nutriendi puerum, commoditatem adimit; abortiionem facit.

HAS AVTEM PESSIME HABET HÆMORRHOIS] i. Sanguinis anagoge, quam edit pulmonū vena exesa, feritate catarrhi eò prolapsi. Nam inde phthisis venit, cuius quidem primigeniæ duas tantum causas ponit Hippocrates vbi air. Ibi demum phthisis in metu sunt maximo: tum à ruptione crassarum venarum; tum à catarrho è capite. Quod autem hæmorrhœis pro hæmorrhagia pulmonum appositè scripta sit; declarat illud quod efferis aphthiis è catarrho subiunxit in grauidis. *Hæc autem pessimè habet hæmorrhœis*. Quod certè nomen hîc nequit apponi quàm venis pulmonum, & ipsis pulmonibus, vbi non minora sunt incommoda catarrhi ferini è capite prolabentis, quàm in stomacho & intestinis. Quinetiam non minùs verè quàm appositè, nomen hæmorrhœis illuc referri potest, quod Aristoteles vsurpauit pro hæmorrhagia, vnde cunque illa cietur. Sic enim scripsit de menstruis. *Ἐστὶν οὖν ἐν ταῖς κοιλίαις δὲ τὸ ἀπὸ τῆς γένεως δὲ ἡ ἔσθ' ἐν ταῖς φλεβίαις, αἱ τε δὲ αἱμορροῖδες καὶ αἱ κατὰ μὲνιόν· καὶ ὅ αὐτὴ αἱμορροῖς ἐστίν*. Vt igitur in aluo diarrhæa ex cruditate est: sic in vena alia hæmorrhœoides, ipsaq; in primis mēstruorum.

cap. 17. lib. 2.
huius operis.

Arist. de generat. animal.
cap. 19. lib. 1.

20 *Ἡσι κοιλίης ἐσθ' ὀδύνης, ἐς αἰδοῖον ἐρῶδους ἦλθε· γυναικείων λυγρῶν ὑγρῶν κατελθόντων Ἰζαπίνης, ἐν μακροῖσι πυρετοῖσι τελευτῶσι.*

Quibus in aluo pratumida, rubor naturalia occuparit eò productus, cum muliebria alba liquida inde processerint repente; in longis febribus vitam finiunt.

ECCE ITERVM noua exercitatio super euentu muliebrium quæ fundit empyema in locis conceptum, cuius origo fuit inflammatio nata è menstruis illic collectis, cum eò confluerint, nec exitum inde habuerint. Ratio exercitandi sic erit, de verbis in hac prognosi conceptis.

QVIBVS] De nulla purgatione menstrua, aut puerperia, multum è sua norma & consuetudine naturaliter constituta egressis. Est enim mulierum omnium fœcundarum consuetudo purgandi naturaliter constituta; vel, vt præceptor loquitur, *πῶς συνήθως καὶ φύσιν*, purgandi menstrua & puerperia. Neque hoc beneficio carere possunt sine incommodo valetudinis, & vitæ discrimine.

IN ALVO PRATYMIDA] Non quidem cibaria, neque spirabili, quæ est *ἡ αἶψα ἢ κατὰ κοιλίαν*, sicut iam dixi-

10

20

40

CC

6

periculo quod hic subesse docetur his verbis.

VITAM FINIUNT] Quidam postdic quam alius ducta fuerit tabo nigro, *λευκαίαις διακρίμαται*, i. differendo nec opinantes: quoniam moriendi sensum adimit vinifici nectaris vacuatio arque vacuitas, & partium solidarum exolutio cum vitali principio.

21 Σπασμὸς, γυναικείων ἐν ἀρχῇσι φανέντων, πυρετὸς μὴ Ἰπποκράτους, λύσις.

Convulsionis finem adferunt muliebria quæ primùm, aut statim apparent: atque id sine febre.

DE COMMODIS muliebrium, illud perceptum est; quod ea mulierum sanant incommoda, quæ in viris non rarò sunt insanabilia. Et quæ in viris non sine incòmodo valerudinis abiguntur, eorù tutissima sunt in mulieribus alexiteria, hoc est muliebria, quorum aduentu non minus adiuicitur sanitati tuenda, quàm ei redintegrandæ. Muliebrium auxiliares manus, ac veluti *συν χεῖρες*, cernuntur aduersus convulsionem, illæque mulierum commodo quæ in viris non nisi oborta febre acuta quiescit, nec sine incommodo: sicut planum faciet examen huius prognoseos.

CONVULSIONIS] i. Iniussæ contractionis earum partium quæ, naturaliter, iussu nostro moventur. Atque illius quidem iniussæ contractionis causa est, nerui distentio, vel humore crudo & crasso imbuti, vel inflammari. Nerui enim distenti, cum exaruerit febris ardore; nullum est alexiterium.

FINEM ADFERVNT] Σπασμὸς λύσις. Eodem planè sensu, quo suprà dixit, *σπασμὸς λύσις πυρετὸς ἀπαρτίζομενος*, i. convulsionem sanat exorta febris acuta. &c. Nam, *λύειν*, sanare est, & *λύσις*, sanatio: vt illic annotauimus. Ergo si maius; convulsionem sanant, i. adferunt redintegrationem partibus è natura egressis, faciuntque vt dominatu nostro per voluntatem iam moueantur partes, quæ *ἀπεσπάρτην*, vi causæ morbificæ manebant contractæ.

MULIEBRIA] Γυναικεία. Quæ hic appositè pro mensruis vsurpanda: sicut & verè, aliàs, pro omnibus mulierum purgamentis, in quibus sunt menstrua; quæ κατ' ἐξοχὴν alibi, sicut hoc loco appositè, *γυναικεία*, i. muliebria nominantur. Ac sanè κατ' ἐξοχὴν pro mensruis vsurpata reperio in historia Phætulæ; quæ, cum ex mœrore ob mariti exilium menstrualis non esset, nulla ope, nec vlla industria potuit *γυναικωθῆναι*, i. ad eam muliebritatem redire quæ est in mensruis. Hic autem appositè, sicut iam dixi, ponuntur pro mensruis: quoniam mensruorum est proprium, sanare convulsionem, non autem muliebrium cæterorum. Sic enim puerilis epilepsiz finem adfert ἢ ἢ κατὰ μὲν ἡμέρας ἢ ἡμέρας, i. mensruorum purgatio: sicut & viris ἢ ἢ ἐκλαμψις, i. lumen ac splendor caloris natiui, simularque ventum est ad pubertatem. Sic legimus, mulierem illam *δυσανθὴς* Thasiam, cui oborta febris à mensruorum suppressione, cōuulsionibus crebra erat; cum nigris vrinis, graui periculo defunctam fuisse, ac restitutam, liberali exitu mensruorum. Cætera autem commoda muliebrium, quibus vtuntur mulieres aduersus pericula febrium acutarum, cum sanis symptomatis coniunctarum, ponuntur ob oculos in Larissæ virgine, quam prima eruptio mensruorum ab interitu vindicauit. Eius historia, proximè est prædictam, apud Hippocratem.

QUÆ PRIMVM AVT STATIM APPARENT] Ἐν ἀρχῇσι, i. cum primùm, aut quàm primùm: vt inde significetur vel prima muliebritas menstrualis, vel statim à convulsione oborta, de more, purgatio mensruorum. Vtrumque hic verè & appositè dici potest. Nam puerilis epilepsiz sanatio est in pubertate, cum primùm virgo est menstrualis, ac menstrua illi bene respondent. Thasia illa finem habuit convulsionum, quod ei quamprimùm à febre, convulsionibus illis crebra, liberalis incidit purgatio mensruorum: incidit autem tertio die. Ratio autem sanandi convulsionem merito mensruorum, in vacuatione consistit humoris conuulsifici, quo expediti nerui, non ampliùs contrahuntur nobis inuitis, nec cerebrum etiam quod olim ciebat epilepticam convulsionem; dum eius contractio seipsum versus, abripiebat suas spinalis medullæ, & inde neruorum propagines. Sed ea contractio cerebri epileptica quæ cadit in pueros, non est vaporis tetri, aut qualitatis malignæ, sicut in grandioribus esse solet: verum humoris crassi & frigidi, propterea quæ huius præsidia sunt in vacuatione propria humoris morbifici, & conuulsarum partium neoterismo. Ac vacuatio quidem humoris, perficitur menstrua purgatione, tum albumineis quoque vrinis, & aluo prorupta. Neoterismus autem cum primùm calor natiuus lumen suum ostendit in lanugine, voce mutata, & veneris appetitu. In cæteris autem, cœli ac soli mutatione, somno, diæta, & febre. De quibus hæc pridem sunt posita. Convulsionem sanat exorta febris acuta quæ priùs non fuit; aut si priùs fuerit, exacerbata. Quinetiam prodest vrinam fluere albumineam, aluos ferri, ac somnum inire. Sed illa præsidia quæ adferunt vacuatio propria & neoterismus; cuiusmodi esse debent, vt continuò adsint cum primùm convulsio est, neruis à phlegmone, vel ab humore crudo distentis. Est enim convulsio insanabilis atque mortifera, cuius exolutio cità non est. Atque vt febris à convulsione, statim exorta quiescit; qua seriùs incidente, mors in propinquo esse ostenditur: sic vacuatio & neoterismus, frustra vetustam convulsionem oppugnant. Quod spectat illud quod posuit, *ἐν ἀρχῇσι*, i. circa initia, cum locus est curationi à febre, aut mensruis, priusquam convulsio in vetustatem inciderit; si modò ibi verendum est de vetustate, vbi doloris grauissimi *συνπνία*, vires exoluit, & citam mortem adducit.

ΑΤΟΥΕ ΙΔ ΣΙΝΕ ΦΕΡΕ] Quod idem est ac si diceret. Ex tribus rationibus exoluendi conuulsionem quæ sit distentis à phlegmone, aut crasso & viscido humore nervis; una quidem consumptio est quam facit febris acuta quæ prius non fuit: sed hæc inflammatis nervis non est propicia, sicut purgatio menstruum; ut tantum bona spe, non tam secura tamen, medicum consolatur, quam muliebria, aut peritihæa urinæ crassa & albumineæ, ubi distentio est nervorum, & inde contractio ab humore crasso & frigido. Nam ut concedam febrem acutam beneficium adferre nervis, humore frigido & glutinoso distentis atque contractis; ipsam tensionem exoluendo, & intemperiem frigidam corrigendo; tamen eorum naturæ bellum indicit quando, iis redintegratis, & sublata conuulsione, vis eius calefaciendi atque siccandi, nervorum substantiam labefactat. Secus est conuulsioni ab aliis quæ ipsam exolunt coquendo aut vacuando: de quibus nihil verendum, sicut de ipsa febre acuta. Coquunt humorem crassum glutinosum ac frigidum, somnus, fomenta, & hapsi. Vacuant autem, muliebria, diarrhæa, & peritihæa urinarum crassarum. Inde conuulsio exoluitur, sine febre, quam nihil necesse est hinc adesse, ac fortè ipsam commodo ægri prodest abesse: præsertim cum ætatis merito regnat conuulsio. Ut enim suauecalidum, foris admodum, siue ipsum *κρυσμα*, est tetanorum, rigorum, conuulsionum *παρηγεμον*: sic etiam splendor caloris natiui, ac lumen cum micare cœperit in pubertate, cruditatem exoluit conuulsificam, & epilepticam, unde primis annis obruebatur. Idem quoque faciunt prima virginum muliebria, & consueta virginum cæterarum, si quando ipsorum suppressio causam attulit conuulsionis. Nam diarrhæa & peritihæa crassi & glutinosi humoris conuulsionem mouentis, idem facit in omni utriusque sexus ætate. Ac ratio quidem exoluendæ conuulsionis per diarrhæam, ita suscipitur, cum scilicet fortis naturæ contentio, mitificatum humorem per lumborum nervos exprimit ad mesocolum, & inde ad intestina, similiter ut in lumborum gibbero quod assurgit à phymate, cuius præsidium est dysenteria aut varix. Nam peritihæa quæ sanat conuulsionem, humore illo cietur, qui *μετέσσειν* habet è nervis ad venas: sicut ad nervos crebra est, ducta è venis quæ ciet tremorem in febribus, cui delirium inde succedit.

22 Οὐρε λεπτὰ ὑπονεφέλα, ἐν μέσῳ ἐναγώρῳ μύα· ρίγος σημάδι.

30 *Urinae tenues subnebulosæ, quarum in medio est enaeorema; rigorem denunciant.*

UT NON appositè ad hunc locum de rebus mulierum posita est hæc prognostis: ita nec verè ad id de quo scripta est. Non enim urina descripta, rigoris prænuncia est; siue ad symptomaticum referatur, siue ad periodicum; siue ad criticum.

23 Ἡν δὲ τῆς τετραδὸς, αἱμαλὸς ρύσις γήνηται· χρόνια σημάδι· καὶ κοιλίη καὶ τὰ ῥήγνυται, καὶ σκελέων οἰδήματα.

40 *Si cui quartana est hæmorrhagia, diuturnitatem ostendit: ac tum prorumpit aluus, & crura intumescunt.*

AC NEQUE hæc loco scripta est, neque appositè ad muliebria. Veritas autem prognosticæ lucret in eo; quod nulla crisis bona est quæ indicata non fuerit ad speciem & ad tempus: tum autem, quæ diem paroxysmi non occuparit. Neutrum est in quartana hæmorrhagia. Nam quartus dies, ante se indicem nullum habet. Idem verò criticus esse nequit in paroxysmi vacuitate. Nisi quis excusationem adferat sanguinis, pigro lapsu atque stillatim è nare quarto die fluentis: atque id eum pepasmo urinæ. Nam tale substillum, sperabilem crisin ostendit per liberam & liberalem hæmorrhagiam, septimo die venturam. Vbi pepasmos urinæ index est diei critici: ut stillicidium crisis ipsius. Secus est à quartana hæmorrhagia.

DIVTURNITATEM OSTENDIT] Quoniam omnis quæ frustra est proratio, vertitur in malos abscessus, omniæque secum adfert incommoda diuturnitatis, laborum, ac sæpe interitus.

AC TUM PRORUMPIT ALVVS] Propter impotentiam coquendi aut continendi, quam intulit quartana hæmorrhagia sinistri indicij, ut sanè sunt omnia *δύσκολα ἢ καὶ θανάσιμα τὰ κείνῳ μὴ κείνῳ*. Atque hæc sunt incommoda quartanæ hæmorrhagiæ non criticæ, ut aluus profusior sit suo vitio atque damno.

ET CRURA TUMESCVNT] Vel abscessu materiæ; eò mutata excretionem critica; vel paupertate caloris natiui, cuius in causa est tum hæmorrhagia, tum alui profluvium. Ergo hinc nulla est muliebritas. Est enim hoc perinde virorum atque mulierum.

24 Τῇσιν Ἐπιφόροισι κεφαλαλγία καὶ ῥέδια, μὲν βαρέως γινόμε-
να· ἴσως δὲ ταύτησι, καὶ ἄλλα σπασμωδῆς ἢ ὠφελεία.

Quae cum sopore & gravitate incidunt cephalalgiae gravidis; pessimè ipsas habent. His autem fortasse profuerit, quippiam convulsionis adesse.

SCRIPTIMVS in hanc prognosin suprā in hoc tractatu de morbis mulierum: atque ita scripsi-
mus, ut non occurrant novae cogitationes quas litteris mandare oporteat. Non est autem animus de-
nuo scribere quod iam scriptum est accuratè: esset enim abuti ocio, charta, & litteris.

25 Αἱ πρηλαγήσασα τρόπον χολερώδεια πρὸ τῶν τόκων· πικτοῖσι
μὲν ῥηιδίως πυρέξασα δὲ κακοήδεις· ἄλλως τ' ἐκ τῶν πικτῶν φάρυγες ὀχλεῖ
ἢ π τῶν ἐν πυρετῷ κακοήδων Ἐπιφανῆ σημεῖων.

Quas dolorificum malum, in cholera modum ante partum exercuit; pariunt quidem: sed ipsas pessimè habent febres; idque cum aliàs, tum si quid fauces proritet, aut si quod aliud praeiuvum in febre signum appareat.

VI PARTV secundo leuantur puerperae quibus est naturaliter constituta pariendi causa & ratio
ex pari contentione vteri atque foetus: sic infelicitur eo munere defunguntur, ac saepe in medio subfi-
stunt cursu puerperiorum, symptomatis pessimis occupatae, quamvis ex facili partum ediderint; quibus
ab eo supersunt reliquiae mali gravissimi quod ipsis causa fuit atque occasio facile pariendi. Non enim
semper id malum, partu excluditur, nec puerperiis, quod sua vi foetum excludit. Quod si verum est in fa-
cili quantumvis partu, multò minùs sperabilis videri debet leuatio ex abortu quem ægrè ciet pharma-
cum abortivum, leuandi causa mulierem gravidā, cum pessimè ipsam habet morbus acutus: & ta-
men id vulgo factitant, nec sine fastu & contumelia in pios medicos, ac medendi peritos. Sed ad rem.

QVAS] Mulieres in affecta graviditate, & partu propinquo; non tamen rebus secundo cursu ex-
actis, vel in spiritu, vel in diata: unde magna vis est eorum quae intrā sunt, inutilium.

DOLO RIFICVM MALVM] Aluina symptomata quae proritatio excitat humoris morbifici in
aluo collecti, & illac prorupti; tum illinc transmissi vel attracti.

IN CHOLERÆ MODVM EXERCVIT] Τρόπον χολερώδεια, i. quae speciem referebat cholerae, quae
morbus est inter acutos eximius, & peracutus dicitur, ac cita morte funestus, ὅς ἐστι πῶς συνοχλεῖ, nisi cum
lipyriam febrem exoluit, virtute suscepta stomachi, ubi focus erat lipyriae ac domicilium, ut alibi de-
monstrauimus. Est autem hīc posita χολερά ἢ ἀπλῶς ὀνομαζομένη, i. simpliciter nominata, quae in praegradi &
cita perturbatione alui, sursum deorsumque pariter praeuoluit humores cientes consistit. Atque haec qui-
dem, cum altera, quam vocat Hippocrates χολερῶν ἔκκρισις, cōmunem habet excretionis modum, hoc vno
excepto; quod in sicca cholera, flatulenti spiritus acerrimique proritatio est: in priore autem, humo-
ris indomiti efferique sursum deorsumque excretio. Hīc ego tamen nolim videri existimare, πὺν χολερώ-
δεια ἔσονται, idem esse quod est reapse ἢ χολερά ὀνομαζομένη ἀπλῶς, quam veteres omnino mortiferam censue-
runt; quod feritate & magisterio nata indomitorum humorum, vacuandi finem non faciat sursum vnā
pariter atque deorsum, donec ad vltima ventum sit, ubi & naturā citò exoluit, & citam mortem infert
atque crudelem ὅς ἐστι πῶς συνοχλεῖ. Haec enim citò gravidam absumeret, nec ei daret spatium expectandi
cetera quae ipsam manere ait à partu. Scimus autem, quod ipsi iam saepe suprā ostendimus, quid inter ea
interfit quae modo & specie quarundam rerum apparent & fiunt, & ea quae sunt res ipsae. Et verò hīc
ponitur alui perturbatio χολερώδεις, quae aluo proritata cietur, potius quàm exoluta: sicut fit in vera cho-
lera, ubi aluus diu multumque oppressa, humorum congerie tandem fatiscit. Atque hunc ἔσονται χολερώδεια,
non minùs inducit alui proritatae contentio, quàm ipsam πῶς χολερά exolutio fatiscientis. Exemplum est
in illa prognosi. Lipyria febris, non nisi cholera superueniente; quiescit.

ANTE PARTVM] Mox adfuturum affecta iam graviditate, ac tempore praestituto gerendi fo-
tum penè exacto, tum enim partus est siue πῶς, id quod à foeta editur, nec ante id tempus.

PARIUNT QV IDEM FACILE] Excusso foetu à cholera, quam fortis mouet naturae conten-
tio, atque id pari concussione qua sternutatio ipsa foetum excutit, cum piger est in exeundo. Solenne
est illud. Γυναὶκὶ ὑστερικῶν ἐνοχλημένων καὶ δυστοκῶν· παρμὸς ὀππρηνόμενος, ἀρσέν. i. Mulieri à secundis malè habi-
ta & difficulter parienti; sternutatio superueniens, bono est. Sed beneficio convulsionis ad excutendum, à
cholera illud adiicitur; quod hīc, fluente aluo, vincula graviditatis laxantur.

SED IPSA'S PESSIME HABET FEBRIS] Quoniam orta ē malis, grauissima infert mala, quæ sunt velut ἐχθρα & soboles quædam, tum phlegmones, tum qualitaris malignæ, & partium oppref-
farum. Nascitur autem febris ē malis, quando superuenit cholera, ab indomita feritate humorum
cholera illam cientium, qui, ea tum quiescente, trahuntur à venis arefactis ac sitientibus. Est enim ra-
tum illud; quod alui excretio, non merito quidem naturæ suscepta, sed vt symptōma, qualis est cholera;
dolorificum malum radicitus non exiirpat, quod est τὰ πάλῃος κακοῦς, ac neque inflammationem tollit
nobilium partium, vt annotauit Galenus ad historiam de Larissæa virgine. In cholera fertur aluus κακῶ-
σια ἔσθῃ, vt verbis utar Hippocratis, vbi sic ferri aluos, commemorat inter symptōmata febrium tritzo-
phyarum. Certissima autem securitas est, pessimam esse febrem natam ex alno liquida, intempestiuè
cohibita: idque cum alijs; tum quando prorupta est χολεράδεια ἔσθῃ, vbi malignus humor coniunctam
habet virium infirmitatem.

IDQUE CVM ALIAS, TUM SI QUID FAUCES PRORITET] i. Cum id locum habet
in omni febre sic nata vt diximus; tum verò maximè si manet in febre adhuc proritatio nauseabunda
quæ tantum scaturit finitur ē faucibus, non autem vomitu ē ventriculo, quam vocat Hippocrates ἐξ
ἐμπεδῶν, suprā in Coacis; καὶ τὰ ἐκτέμνεται ἐμπεδῶς, in prorrheticis. Hic stomachus inflammatur, ex irrita
contentione vomendi, & vnā fauces, ἐπὶ δὲ αὐτοῖς ἔλθοι ἐρεῖρος μετὰ φλεγμῆς, i. queruntur ex acri dolore, ipsæque
tubor occupat & inflammatio. Sed tamen hæc faucium symptōmata, hîc non sunt phthisifera: sicut illic
vbi narrantur à præceptore. Nec verò illa hîc mouet catarrhi vis effera prolabentis in fauces: non enim
sic essent ἐμολύη, aut συνακαλεῖν, febris merito, & causæ ipsius: sed propagata ex aluo, per continuitatem
interioris tunicæ quæ ipsi cum faucibus est communis. Atque hæc proritatio, memoriam renouat ex-
actæ iam cholera. Est autem hoc symptōma in febre grauissimum, vt suprā ostendimus in tractatu de fe-
bribus. Nam faucium occupatarum symptōmata, iampridem sunt alibi explicata.

AVT, SI QVOD ALIVD PRAVVM IN FEBRE SIGNVM APPAREAT] Τί τῆς κακοῦς ἔσθῃ.
Est autem signum illud, quod vel non apparet σωήτως, vel cuius tanta est è natura egressio, vt inde signi-
ficetur difficilis admodum redintegratio. Ac prauum quidem huiusmodi signum ostenditur in qualita-
te corporis, actionibus, & excrementis: cum scilicet longè ab iis absunt quæ sunt: quæque apparent
σωήτως καὶ λόγῳ, i. vt solent, merito morbi & ægri. Fuerit autem sic febris ἐρεῖρος, λυγρῶς, γάμψης ἀπὸ μόνου,
i. tremorifera, singultuosa, mentem attingens. &c. Nam propriæ qualitates prauorum signorum quæ κακοῦς
eueniunt, scriptæ sunt passim toto volumine prognῶσεων Coacarum.

26 Τὰ πρὸς τῆς τῶν ῥηγνύμενα ὑδατώδεια· φλαῦρα.

Grauidas male habent quæ ante partus aqua prorumpunt.

VIDE commentarum ad primam huius tractatus.

27 Τῆσιν θηφόροις καὶ φάρυγιά αλμυροῦδες ρύσιες· πονηρόν.

Grauidis in fauces fluxio salsilaginosa; pestifera.

Enimvero nullus hîc restat scribendi locus: quia omnis materia & occasio, non ita pridem, nobis
præcepta est in eius examine cuius hæc verba sunt. Quæ sunt in grauidis salsilaginosa; incommoda fore à par-
tu multa ostendunt ex albis mordacibus, &c. Huc pertinent quoque illa quæ antè sunt posita de grauidarum
aphthis. Sed quoniam thesauri, iisdem ferè verbis concepta, non semper eodem scopo examinanda;
neque id faciendum in hac prognosi quæ aliò spectat, aut certè vltèrius quàm quæ adducta est. Illa
enim tantum ea proponit incommoda quæ à partu vètura sunt ex albis mordacibus, quorum materiam
abundè suppeditat quæ sunt in grauidis salsilaginosa. Hæc verò præter ea quæ illic sunt posita, sceturam
continet symptōmatum omnium ex acri fluxione nascentium.

Ergo. GRAVIDIS] Inter omnes quibus idem accidit quod hîc proponitur, quod earum condi-
tio est omnium vtriusque sexus ἐνπαθέσθῃ, ac periculosius ipsam habet omnis è natura egressio, cuius
etiam difficillima redintegratio, vt mox dicitur. Latissimè quidem hîc patet quod scripsit Hippocrates.
Γυναῖκί ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, ὑπό υἱὸς ἢ ὀφθαλμῶν νοσημάτων κατὰ τὴν γαστρίαν. i. Mulierem grauidam aliquo acuto morbo sen-
tari; mortiferum. Causæ sunt explicatæ.

FLUXIO SALSILAGINOSA] Non illa quidem fugax, nec pressa leuiter: sed quæ ipsam diu oc-
cupat, malèque habet: quod ex fluxio perennitatem habet in grauidis plusquam in cæteris; siue illius
origo sit ab iis quæ intrā sunt inutilia, tam in visceribus, quàm in vasorum impuritate, ac cerebri capi-
tisque vitio; siue illius principia causæque ducantur à tempestate austrina & pluuia; siue ab ipsa dicta
vnde succrescat illa cacochymia putris & salsa. Est enim grauidarum, multum à se mutata spiritus & nu-
tritus œconomia, multum item complexio corporis iam minimū perspirabilis; tum excrementi co-
pia est, præsertim muliebris, quod exitum habere nequit, donec mulier grauiditatem sustulerit partu fe-
cundo. Et cum salsilago illa multis in locis percipitur, vt nuper attigimus; vbi nunc se ostenter, planè
ostendit quod sequitur.

IN FAUCES] Κατὰ φάρυγιά, i. secundum fauces, ad verbum, quā itur partim ad gulam, partim ad gut-
tur; & illac quidem, ad inferum ventrem; hac verò, ad superum. Atque inferi quidem symptōmata

sunt diarrhoe, lienteria, dysenteria, tenesmi & ilei. Superi autem, tussis ferina, raucitas, peripneumonia, phthisis. Sed utriusque ventris offensu symptomata sunt, abortio, partus difficilis, & gravis offensio puerperæ, ex lochiis albis mordacibus.

PESTIFERA] i. Fœtæ & fœtui calamitosa. Fœtæ quidem, in graviditate, in partu & puerperis, ut supra iam demonstratum est. Fœtui autem: quoniam leui de causa, eius abortio esse solet; aut certe partus infœlix, quo & minurulus nascitur, & in valetudine vivit aduersa, aut breui vitam finit, quem tantum terris ostendant fata, nec ultra esse sinunt.

28 Τὸ πρὸ τῆς τοῦ κων ἰσχυροῦς, καὶ τὰ ἀνωδυνῶς πικρόδυνα κινδυνώδεα.

Crebrò ante partum rigere, & indolenter partu leuari; periculum subesse restantur.

RIGORES crebrò cientur omnes ἀκρίτως: propterea que illi μετέσταν faciunt materiæ rigoriferæ, ad diaphragma & caput. Atque ut crebra rigorum concussione, faciliè partus excutitur, cum incipit esse gravis ipsa graviditas: sic opinionis errore, quem frustra citati rigores crebrò induxerunt; falsò est credita partus leuatio. Ex quibus efficitur, quòd huius rigoris & partus descripti, cōspiratio est ad periculum ipsius puerperæ, nō quidem fœtus merito à rigore exclusi: sed causa falsò creditæ indolentiæ in enixu, & lochiorum culpa & vitio: vnde tam in vtero, quàm ab vtero morbi contingunt.

CREBRÒ RIGERE] Quod Græcè est ὀσπρίζου, i. subinde rigores cieri, ut sæpe alias annotauimus. Subinde autem, vel crebrò & iteratò cientur, ac si vnus alteri superueniat, quod propriè est ὀσπρίζου, i. superrigere: quod verbum ostendit etiam τὴν ὀσπρίαν, non autem τὴν ἐκπρίαν, i. purgationem, non excretionem materiæ rigoriferæ; idque morbi merito, non naturæ. Cientur, inquam, subinde, ἢ ἀπ' ἐκκρίων, ἢ ἀπὸ τῆς ἀγέλης, i. ab empyematis vlcericis, vel à vasis. Ac sanè ab empyematis crebrò cientur, & ob id semper symptomaticos, proritata pure acri membrana quæ est acerrimi sensus: similiter ut perhorrescunt exulceratæ partes, appulsu mordacium pharmacorum. Atque hîc primùm rigor cietur vbi est causa rigorifera, videlicet empyema. Nam in rigore à vasis, distinctio est causæ ipsum cientis & excitantis: ut scilicet καὶ λόγῳ, ἢ ὡς σύμπτωμα, i. natura merito vel ut symptoma suscipitur. Naturæ quidem merito excitatur criticus & periodicus. De critico scitum est illud. Ὡς καὶ τὸν ἐχόμενῳ, ῥίγας ὀσπρίζουσιν ἡ δόσις. i. Qui occupatur à causo; rigore superueniente, liberatur. Tum illud etiam. Πρὸ ῥίγας αἱ ὀσπρίαι τῆς ἔρω, &c. i. Ante rigorem sistuntur vrina. De periodico, qualis est febris tertianæ, quartanæ &c. edictum illud est dictatoris. Οἷοντις ἐν τῇ περὶ τῆς ῥίγας ἡμέρας καὶ ἡμέρας αἱ περὶ τῆς δόσεως. i. Quotiescumque dum febris adest, rigor cietur, in eum diem febris exoluitur. Quod est eiusmodi ac si diceret. Quando emota bile in habitum corporis, rigor superuenit, ob eamque causam expurgatur & vacuatur singulis paroxysmis, iure optimo desinit in febris vacuitatem huiusmodi febrium intermissio. Sed ibi demum rigoris à vasis ratio symptomatica est, cum frustra cietur, nec vlla est vacuatio materiæ rigoriferæ. Id autem accidit motu proprio causæ morbificæ, cum eius dominatu natura tenetur, non ipsa naturæ. Tum cernitur illa, quam modò dixi, symptomatica propagatio, quæ & rigoris crebra est atque insolens concussio, & eius frustra citati μετέσταν ad diaphragma & caput, vbi symptomata excitantur paraphorica, bilis rigoriferæ & partis obfessa propria. Vetus est illud præceptoris. Ἡ ῥίγας ἐμπόδις, περὶ τὴν σφαιρίαν, ἢ ὅτι αἰσθάνεται τὴν ἡνείκετον. i. Crebrò exortus rigor in nulla febris discessione, & agro pridem infirmo; periculum morbis infert. Eum rigorem hîc positum, subinde mouet biliosa cacochymia è vasis expressa, quæ toto corporis habitu commouetur, quam fundir assidue, concepta in locis & lumbis nimia muliebrium abundantia per totum id tempus graviditatis. Atque hic rigor subinde coortus prorepat ἐξ ὀσφύος καὶ διὰ τὸν πόντον ἐς κεφαλὴν, i. è lumbis per dorsum ad caput, vbi symptomata excitat paraphorica, denegato exitu materiæ rigoriferæ per hæmorrhagiam aut sudorem.

ET INDOLENTER PARTU LEVARI] Quod certè miraculo apponendum videtur, si non est falsò credita indolentia, & insidiosæ leuatio. Sed falsò credita est indolentia, aut malè parata, ἢ διὰ τὴν ἡνείκετον νοσῆν, ἢ διὰ αἰσθητικῶν τῆς μοῦρας δι' ἃν ἡ ἐκκρίσις γίνεται, i. aut quia rei molestia sensio non excitatur in occupata mente; aut quia nullus est sensus partium per quas excretio ipsa fit. De sensus extinctione partium, solenne est illud prorrheticum. Quæ non sentienti tenuia, siue liquida, ex aluo ducuntur, cum sit apud se; pessimè ipsum habent: ut vidimus in hepatico. De sensuionis autem vacuitate ab occupata mēte, certum est in aphorismis testimoniū. Quibus quid corporis in labore est, atque eius laboris sæpe nulla perceptio est; ἢ mens laborat. Et sitis sedata immeritò, in morbis acutis; graue malum subesse ostendit: & magna & rara spiratio in acutis, delirij est.

PERICVLVM SVBESSE TESTANTVR] Quia est indolentia malè parata; vel sensus amissionem, vel sensuionis vacuitate: propterea que insidiosæ hæc ratio parienti. Ac struit quidem insidias ipsa priuatio sensuionis à delirio, quod transmissa in cerebrum materia rigorifera excitauit. Ei periculo mulrùm adiicit propagata è muliebrium à partu suppressorum anadrome, cuius incōmoda sunt in promptu, patētque omnibus ad legendum in prognosibus hac de re conscriptis & explicatis. Itaque ab hoc puerperio similiter in periculo est ipsa puerpera, ut illi de quibus legitur hæc prognos. Τὰ ὑπόματα μὴ ἐκπομπῶν ὀλέθρια. i. Quæ immemoribus vrina redduntur; perniciose.

29 Τῆσιν Ἐπιφόροις τὰ ἀφθώδεια ῥύματα · ποτηρόν · σπασμῶδους, ἐκλυθεῖσαι, μὴ καὶ αὐχθεῖσαι · ἐκδερμαίνοντα ὀξέως.

Grauidas periculose habent fluxiones aphthifera: tum item conuulsa, vel exoluta: postquam perfrixerint, acriter incalescunt.

10 FLUXIONVM grauidis κακοήγως aphthiferarum, pericula sunt pridem exposita, quatenus fluxu alui quem inferunt per impotentiam continendi ea quæ assumuntur, foetum ante diem ad exitum & ad exitum præcipitant: idque adempta commoditate grauidis ipsum gerendi & nutriendi, cum offensio- ne summa excrementorum fœdi odoris, subterlabentium per loca locis vicina & adiacentia. Hic autem sunt alia fluxionum incommoda, quæ non minus grauidas periculose habent, quàm foetus. Eorum in- commodorum siue symptomatum mortiferorum natura & ratio adducetur in examine huius pro- gnoscens.

GRAVIDAS] *Επιφόρος*, i. Quarum fecunditas planè restibilis, antea secundi partus esse solebat.

PERICULOSE HABENT] Ne dicam mortifere, dominatu morbi, ac triumphata natura. Græ- cè est, ποτηρόν, quo significatur magna vis naturæ illata, & eius multum egressæ de suo catorthomate, difficilis redintegratio.

FLUXIONES APHTHIFERÆ] Quarum aphthæ siue vlcuscula, non sunt in ore σπυήγως: sicut in lactentibus à lacte nutricum: sed κακοήγως à serino catarrho quem genuit tempestas austrina, pluuia, πυρρός, atque pestifera: vel cuius origo est ab iis quæ intrā sunt vitiosa, tam in visceribus, quàm in va- forum impuritate, quàm in cerebri capitisque vitio: præsertim cum ei generationi multum adiicitur à mala diæta, in edacitate ciborum prauorum, & meri bibacitate.

TUM ENIM CONVULSÆ] Non quidem contractis ab inflammatione nervis, vel siccitate ari- dis; nec item frigido & cōrumaci humore distentis: sed fluxionis acerrimæ morsu laceffit: ut ea con- uulsio non firmiter fixa sit, ut esse solet in ceteris; sed pressa leuiter, atque quodammodo σπασμῶδους.

30 ACTALIS CONVULSIO sæpe accidit in singultu, & alui torminibus, quibus quidem crebræ sunt conuulsio- nes κακοήγως.

VEL EXOLVTÆ] *Εκλυθεῖσαι*. Cardiogmæ scilicet, aut cardialgia quam stomacho infert acris flu- xio, suo appulsu & morsu, cum cibi fastidio. Sed huius ἐκλύσεως causa esse potest, multum & sæpe alius transmissa liquidis excrementis κακοήγως ἔσθον. Nam paralyseus aut paraplegiæ opinionem faceret con- uulsio ei contraria in eodem subiecto: non quidem simul, sed vicissim. De quarum vicissitudine inter se, dictum est supra in proprio earum tractatu. Sed nulla est æquitas sic opinari πρὸς ἐκλύσεως, neque hic, neque alibi vsquam apud Hippocratem.

POSTQVAM PERFRIXERINT] Toto corporis habitu, vel extimis artubus: idque morbi merito, vel naturæ: sic enim significatio est τῆς κατὰ φύσιν. Nam frigoris critici aut periodici alia ratio est, ut alibi demonstraui. Sed ea κατὰ φύσιν, ut semper symptoma est ἀπὸ τῶ ἀδίναν, ἢ τέκρωσι τῆς ἐμφύτου θερμότητος, i. à debili vel emorto calore innato: sic eodem statu semper non manet. Nam vna quidem fixa est firmiter, de qua illud solenne est præceptoris. Αἱ ἐκ ῥίχως κατὰ φύσιν μὴ αἰσθηματιζόμεναι κακῆ. i. Quæ à rigore perfrigeratio non recalescit; malo est loco. Altera verò fugax, de qua illud scriptum est. Οἱ ἐκ κατὰ φύσιν ἰδρώδεις, αἰσθηματιζόμενοι κακόν. i. Qui, cum perfrixerint sudabundi, æstu incandescunt; malè habent. Et, Ακρεὰ ἐς ἀμφοτέρωθεν τῶν μετέπιπτοντα κακόν. i. Extimarum partium cita in vtrumque mutatio; pessimè habet ægrum. Vbi Galenus auctor est, ideo citam esse mutationem caloris & frigoris in extimis artubus; quod extinctus eorum calor, ipsos primùm reddit marmore frigidiores, qui tamen denuò incandescunt æstu, adueniente flamma fugaci è partibus intimis; quæ cum euanuerit, ipsos, uti erant, glacie frigidiores relinquit. Atque illud est quod hic scribitur.

ACRITER INCALESCUNT] Appulsu caloris febrilis, ut flammæ cuiusdam, è visceribus in- cendio conflagrantibus. Talis est ratio falsò creditæ febris extinctæ, cum extimæ partes perfrixerint: de qua illud scriptum reperio apud Hippocratem. Τὰ ἐγκαταλημπανόμενα καύματα ἐν ὑποχονδρίῳ, πυρετὸ πρὸς ψυχθέντες κακόν. i. Quæ supersunt incendia in hypochondrio, febre, partium tenus quæ circumstant, perfrigerata; malum subesse ostendit.

30 Καὶ μέντοι καὶ δύσκολα ἀποβαίνει τῆσιν Ἐπιφόροις τὰ πρὸς τὸ λε- πλὸν οἰδήματα, οἷα πρὸς τὰς ὀχρεὰς γίνεται, ἀπολαμβάνοντα ὀρδο- πνοίῃσιν. ἄρα τὰ τοιαῦτα οἰδήματα διδυμολογεῖται ἄρα καὶ σπασμῶδες τὰ τοιαῦτα οἰδήματα ποιεῖ;

Quinetiam gravidis eveniunt graves circa tenue ipsum tumores, cuiusmodi accidunt circa scrotum. Atque illi multum difficili spiritu occupati. An tales tumores edunt gemellos? An verò quid inferunt, convulsionis?

ENIMVERO non est dubium quin à fluxione aphthifera tumores assurgant in tenui intestino, qui gravidas faciant ileosas. Nam inter causas reuoluti sursum intestini, commemorabilis illa est quam ponit Galenus, cum scilicet exulceratio lænis est intestini, si à ciborum transitu proritetur, nec exitum 10 circa habeant; tum evenire ut intestinum hac nova proritatione afflictum, transmittat sursum ea quæ ipsum læsura erant, ac mutata velificatione, cursum deinceps inflectat sursum contra naturam, quem olim naturaliter deorsum tenebat. Hoc facit intestinum sui diligens, ac sibi metuens à dolore ex rerum molestarum appulsu. Quemadmodum igitur fluxiones aphthifere faciunt lienteriam per impotentiam continendi ea quæ assumuntur: sic aphthosæ lienterię transitus esse potest in ileum, cum scilicet causæ lientericæ propagatio est ex aluo ad tenue intestinū. Cetera autem quæ ponuntur in hac prognosi, cuiusmodi sunt ut omni careat fundamēto quo extrui possit aliqua demonstratio veritatis. Omnia enim sunt 15 ἐπεροχῆν, nec aliquid habent ὁμοφρές, nihil catholicum, nihil verum, nihil etiam σωμανήσιον. Itaque superstitio hæc demonstrandi vel ostēdendi, caliginem studiosis pro Sole offunderet, Orcum pro luce adferret, ac denique summam vanitatem pro veritate.

31 Τὰ μυχώδεια ἔξαναφέροντα πνύματα ἐν πυέλοισιν ἐκλείδονται.

HIC DVA sunt causæ quibus ne aliquid scribam, impediatur. Vna solécismus prognosticus, cui emendando plus operæ mihi ponendum esset, quam ipsi sententiæ enarrandæ. Altera summi fastidium τῆς ταυτολογίας, quando non ita pridem adduximus quidquid ad eam prognosin pertinere maxime 20 videatur. Est autem sic Latine versæ à Græco.

Quæ cum suspirio foras effertur spiratio, & unà immeritò est colliquoatio; gravidis aborsionem denunciat.

32 Φευκώδεσι, κοπώδεσι, καρδιακοῖσι· γυναικῆα καταρρήνυνται.

Quæ in horrore sunt, lassitudine, & capitis gravitate; muliebria hys prorumpunt.

QUI MEDICINAM faciunt religiose, permagni faciunt, intelligere, cum ex toto suppressa est purgatio muliebrium; sit ne illa suppressio culpa & vitio rei, aut foeminæ expurgandæ; an contra merito graviditatis, & fœtus in vtero stabulantis. Nam si mulieris culpa aut vitio, muliebrium muliebritas non est in stata & menstrua purgatione, hæc subeundæ vices naturæ in vacuando. Sin autem merito graviditatis ita sit, periculosa erit molitio vacuandi. Ergo ponuntur hæc signa de quibus expectanda est purgatio experenda muliebrium suppressorum, cum ea suppressio excusationem non habet gra- 30 uiditatis.

QUÆ IN HORRORE SUNT] Φευκώδεσι, i. quæ perhorrescunt subinde; non quidem ἐφ' ἑκείων, ut nuper diximus ab empyemate quod ciet horrores qua parte ipsum subest: sed ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, i. e. vasis, unde cacochymia exprimitur crebra horroribus à lumbis per dorsum ad caput. Atque hæc cacochymia, foras inflectit cursum horrificum, cuius perennitatē edit perennis menstruorum suppressio; cum scilicet illa nihil habet utilitatis. Nam fœtu concepto prodest ipsam sic esse ad commeatum fœtus qui utilissimam partem muliebrium sibi assumit, reliquias autem relinquit in venis, ubi supersunt donec partus adueniat, ibique stabulantur sine horrida cacochymia; quam gigni non finit caloris natiui amplificatio quæ est à fœtu; nec foras efferri ad ciendū horrore, perennis ad locos attractio, nutriendi causa, quo sic introrsum mouetur, relictis in via reliquiis quæ supersunt à nutritu fœtus. Sed eius horroris quem 35 ciet inutilis suppressio muliebrium, & inde, caloris febrilis crebra est vicissitudo quam inutilis mouet in graviditate. Sic enim iudicium est praeceptoris cum ait. Ἐν γυναικὶ καθάρσις μὴ πρέουσα, μήτε φείξις, μήτε πυρετὸς ὀδυνημένῃ· ἀσπὶς δὲ παρὰ τὴν κοιλίαν ἐν γαστρὶ ἔχειν. i. Si purgationes non eant mulieri, nec horror febris ve superueniat, cibi autem fastidium incidat; cogita ipsam in vtero habere. Quem aphorismum de iis mulieribus scriptum narrat Galenus, quarum inculcata purgatio, repente sistitur sine causa extrinsecus in- 40 cidente.

cidente. Est autem inculpari purgatio in qualitate, copia, utraque periodo, & expurgandi modo; est, inquam, mulierum fecundarum. Nam vitiosa non est, foeturae capacium, ut nulla suspicio esse possit graviditatis in ea muliere, cuius purgatio repente suppressa est, quae in vitio esse solebat. Itaque sapienter scripsit Galenus ad Hippocratis aphorismum praedictum, cum ait, positum esse ἐπὶ τῇ ἀμέλει καὶ φέρειν, &c. Quod sanè iudicium est praecceptoris, ubi causas persequitur sterilitatis. Verba eius apponam. *Ἀλλὰ οἱ καὶ οἱ ἐν ταύτῃ ὁππότερ' ἔστιν ἐν τῇ ἀφαιρέσει χεῖρ, ὅταν φλεγματώδεα τε, & ὑμενώδεα, καὶ ἰχωροειδέα, & λεηλῆ, ἢ λευκὰ, καὶ σφομβοειδέα, καὶ ὅταν ῥοδαῖα τε, καὶ αἰσπρατώδεα, ἢ ζωφοειδέα, ἢ δριμύεα, ἀλμυρὰ, ῥοχέα, πυώδεα. αὐτὰ πᾶσαι αἱ παθοσύνες ὑπερβαίνειν αἰσχροῦσι γὰρ λαμβάνειν ἐν γαστρὶ. i. Sed quidquid in menstruis inest vitij, totum id auferendum, cum scilicet ea sunt pituitosa, pelliculosa, serosa, tenuia, vel etiam alba, grumosa, tum autem si nigra sunt carbunculosa, aut fusca, aut acris, salsa, turbida, purulenta. Denique omnes huiusmodi notae malorum radicibus sunt extirpandae: quia impediunt conceptionem in aluo.*

LASSITUDINE] Non quidem à labore nimio, vel desueto, vel infueto; quæ lassitudo κόπος dicitur ἀπλῶς. Sed quæ oborta est vitio, & κόπος ἀσθένειας nominatur; τὸν δὲ ἐκ τοῦ φλεγματώδους, ἢ φλεγματώδους, i. quam sensio comitatur tensio, vlceris, inflammationis. Ac primam quidem edit repletio, alteram cacochymia, tertiam utraque causa. Hic certè sensio est vlcerosa in posita lassitudine, cuius eadem causa est quæ horrores, nempe cacochymia è venis expressa per totam compaginem. Atque hæc lassitudo vlcerosa cum horrore frustra cirato in febre, non rarò est paraphorica, aut cephalalgica, ut ante demonstravimus ex quodam prorrhethico.

ET CAPITIS GRAVITATE] Quam facit horrifera cacochymia ad caput metastasis, unde non habet exitum, ibique sua edit incommoda, proritando, ac distendendo; videlicet τὴν καθ' ἑαυτὴν, quæ vox est dolorifici mali à rheumate consistente quod per ἰσοπέδιον caput afficit continenter. Vbi enim gravitas, ibi & firmiter fixum est rheuma consistens, quod inde sui detractionem molendam ostendit.

MULIEBRIA IIS PRORVMPVNT] Quoniā expletæ carnes & venæ continuo sanguinis ad eas appulsu κατ' ὅσιν; eius quidem appulsus, atque, ut ita dicam, τῆς πλημμελείας ἀμπόπι, i. reflexu experientur ad locos, unde primum transmissa est ad ipsam compaginem, siue corporis habitum, sanguinis abundantia; ubi sensationem excitat lassitudinis vlcerosæ, quam tollit exorta subinde horrores concussio, quæ ἀσθενίᾳ esse solet καὶ γυναικείᾳ, ipsisque ciendis prodest ac præest. Nam, parva graviditate, nullus est à menstruorum suppressione horror, nec febris, uti iam diximus.

30 33 Αἱ πρὸς χεῖρας νωθραὶ, κατὰ ἔξηροι, ἀδύφοι, γυναικεία πολλὰ χαλῶσαι· σίμπνηλκῃ.

Qua ad manum torpida sunt, arida, sitis expertes; cum muliebria multa laxarint, pus edunt.

PONUNTUR hinc signa quorum τὸ κατὰ χεῖρας ἐστὶν ἐμπύημα, quæ tamen illius verè non sunt ὑποκείμενα. Non enim sunt ἰδία, neque ὁμοίᾳ prognostica empyematis, ut eò spectare videantur; incerta etiam diagnostica, ut iis cum subest empyema, certo cognosci possit ac percipi. Si quæ autem sit ratio incundi πυλῶσιν ἐστὶν signis hinc positis ad παθῶσιν ἢ δόξασιν empyematis, planum faciet ipsum examen prognosticis quod sic aggredior.

QUAE AD MANVM LANGVENT EFFORTAE] i. Quæ contactu medici manent immortæ, atque quodammodo exolutæ. Nam illud πρὸς χεῖρας, i. ad manum, propriè ad eum pertinet qui manum admouet, vel erigendi causa ægrotum, vel explorandi corporis artumque qualitatem, & venæ micantis appulsus. Talis oratio est in illa prognosi, οἱ πρὸς χεῖρας ἀναιδονεὶ κακόν, i. qui ad manum exiliunt; malo sunt loco. Et, πυρετοὶ οἱ μὲν δακνῶδες τῇ χεὶρ, οἱ δὲ ὀφθεις, i. febrium alia quidem sunt ad manum mordaces, alia verò mitis. Iam verò quæ sunt ad manum νωθραὶ, i. segnes, quæque sit illa νωθρότης, i. segnicies manu percepta, considerandum. Enimvero quantum complector animo ex omni doctrina Hippocratis, duplex νωθρότης manu tractabilis est, una quidem quæ in δυσκινησία consistit partium corporis in conuertendo, partim verò artuum in metεωρίσμῳ. Altera verò ἐν κατὰ ψυχὴν νευθρευμένῃ, & venarum micantium pulsu lento, paruo & raro, ac penè dixerim ἀσφυξίᾳ. De singulis hinc scribendum. Ac primùm δυσκινησία corporis in conuertendo se, manu percipitur cum ægrè manu impulsus movetur: ei contrarius est ἀναιδισμός, de quo illud præceptum est. Sicut de Thasia quadam muliere vultuosa narrat Hippocrates, καὶ μὴ ἔρεαν, καὶ κατὰ σφοδρὴν, καὶ πᾶν ἔλαττον, αὐτὴ σὺν καὶ κατὰ χεῖρας ἐκ ἡδύατο, i. obortum est coma & inclinatio veteriosa: rursum excussa comate, & excitata, exiliit, nec loco se poterat continere. Sed illa corporis ægra & difficilis in alterutrum latus conuersio, causam habet, vel gravitatem portati corporis oppressi, vel infirmitatem portantis, i. facultatis effortæ ac languidæ, unde est ipsa ἔρριψις quæ cernitur, ac manu percipitur, cum ægri delabuntur subinde ad pedes. Hic autem, νωθρότης per manum exploratio est, cum ægri sunt νωθοὶ ἐκ ἑλαφροῦ ἐν ταῖς μεταπειρομαίῃς, i. pigri non alacres in exurgendo & attollendo artus; cum scilicet, exempli causa, manus non porrigitur expedite medico inuitanti, nec dextra ex facili iungitur amici dextræ. Sic enim proiecti artus, præ nimia gravitate, sunt verè νωθροὶ, eaq; νωθρότης est medici manu tractabilis, cum nec sua sponte, nec adiuti etiam, facile loco ubi iacent moventur. Tum deinde est κατὰ ψυχὴν νευθρευμένη, cum scilicet deiectum corpus artusque perfrixerint, id primo appulsu manus admotæ percipitur. De quo illud præceptum est. Αἰσπῆς

αφαιρέσεις ἐν κατὰ ψυχῇ περιθρυμμένῃ καὶ ὥν. i. *Detractio sanguinis in torpida perfrigeratione, mala.* Nam pulsus illi venarum micantium ὥς χυεῖ. i. *manu medici explorantis, eaque sola, nec alio indice, duce iudicio; deprehenduntur τοσοῖ, quales in lethargicis esse narrat Hippocrates.* Sic enim scripsit. Οἱ λιπαρταί, ἐμμεδῆς ἀπὸ χύριαν, ὑπὸ δέες, δὲ ὁρῶντες, οἰδηματώδεις, σφυγμοὶ τοσοῖ. i. *Lethargici, manibus contremiscunt, soporati, decolores, vnaque turgiduli, cum pulsu sepulto.*

P R A E R I D Æ] Quae nimia siccitate squalent, qualis est siccitas volæ manus ac linguæ, dum febris acuta est cruda, nec dum coepit humescere: sicut in pleuritide & peripneumonia sicca, quæ omni caret ἀνακαταρσί. Sed hîc appositè, vbi agitur de muliebribus, siccitas illa referri debet ad linguam, cuius mutatio esse solet in substantia & colore, cum malè est vtero, & malè ab vtero. Sic enim didicimus à præceptore. Γλῶσσαι χλωραὶ χλωδῆες, τὸ δὲ χλωδῆες ἀπὸ πόντος ἐρυθραὶ δὲ, ἀφ' αἵματος. ῥδῆναι δὲ, ἀπὸ ῥδαίνης χλωῆς. αἷας δὲ ἀπὸ λεγνυώδους ἐγκαύσιος, καὶ μητρῶν μοεῖν. i. *Linguae virides, biliosæ; id autem biliosum est à pingui: sed rubrae sunt à sanguine: nigrae verò à nigra bile; sicut arida à fuliginoso ardore, & à matrice.* Vbi Galenus auctor est, τὸ ματρῶν μέρος, i. *maternam partem,* poni pro vtero, cuius inflammatio, calidissimam secum habet febrem coniunctam, vnde lingua siccitate & fuliginoso ardore squalescit, cum scilicet febris adest qualem descripsit, cuius non rarò immunis est hysterica inflammatio. Ex quo efficitur, signum linguæ aridæ, tum inflammato vtero συνειδρῶν, quando apparet: sed non necessarîo apparere, nec semper, quoties ipse vterus inflammatur. Verba Galeni hæc sunt. Τοῖς μὴ οὐδ' εἰρημένους σημείοις ἀκολουθεῖ δὲ πάντες τὰ διηγήματα. τῶν δὲ περιγνησίων ἐκ ἐξ ἀνάγκης τὰ σημεία. i. *Prædicta quidem signa semper subesse ostendunt ea quæ indicantur: non tamen res ipse, necessarîo signa edunt.* Ergo lingua arida, signum quidem erit primum & per se, quod παθογνωμονικόν Græci vocant, fuliginosi ardoris: quem si transmittit vteri inflammatio, vt sæpe transmittit, fuerit quoque inflam-

S I T I S E X P E R T E S] Idque immeritò: quod est Hippocrati ὁρίζεσθαι, vt in illo. Διὰ τὸ ὁρίζεσθαι λυθῆσαι ἐν ὄξυ. i. *Sitis sedata immeritò in acutus, malum.* Est autem sedata immeritò, cum sine aqua & spiritui, sitibundus homo à febre, non putat sitire se; vel quòd nulla sensio excitatur causæ sitiferæ; vel quòd resoluta vis est cupida potionis. Adeo vt falsò putetur sitis abesse, de non excepto, vel non percepto appulsu causæ sitiferæ. Nisi quis forsitan excusationem adferat levis tussiculæ, ac leuiter proriantis, vnde sitiendi causa, vel in ipso causæ, infringitur. Sed eius obiectionis, facilis depulsio est; quòd ibi tum lingua non est perusta, vt causi merito esse solet. Sic enim præceptor ait, καὶ ἐ γλῶσσαι καὶ περιγνησίων. Hîc autem posuit linguas præaridas.

C U M M U L I E B R I A M U L T A L A X A R I N T] Vel potius cohibendo collegerint, vnde causa fuit vteri inflammati, cuius inflammatio, linguæ substantiam & colorem immutat, vt iam posuimus ex præceptore; nec tamen ea mutatio, sitibundi est hominis, vt esse solet cum lingua est ὑμωροῦς τῆς περσισσῆς, cum scilicet æstu incandescunt vicinæ partes ac focia, cuiusmodi sunt pulmones, hepar, & hypoglottides venæ. Itaque sitis vacuitas cum squalida lingua, distinctionis ergo posita est; quòd talis ab vtero sit, non autem ab aliis.

P V S E D V N T] Quia menstruorum cohibitorum intus, nec aliò transmissorum, aut retractorum, phyma in vtero sæpe nascitur, quod in empyema mutatum, saluis rebus exitum habet per sinum pudoris, si nullum manet vlcus superfices. Qua de re satis iam multa.

34 Τὰ δὲ αἰφνης λαβὼν κατὰ τρέχοντα ἐπὶ τρωσμά, ἢ πρὶν ἢ, καὶ ἐς μὴρόν ὁρμαὶ. ὅμοιος δύσκολον.

Cum ex abortu alba repente percurrunt, si quid riguerit, & in semur excursio est; malè fit à tremore.

H I C D E abortu contemplatio est causarum eius cohibitarum, & aliò transmissarum, de suo cursu quem prius tenebant. Symptomatum autem foetura est, cum vel earum causarum cohibitarum pro-

C U M E X A B O R S V] i. Foetu excluso ante diem legitimum pariendi, qua de re aliàs multa.

A L B A R E P E N T E P E R C U R R V N T] i. Cum abortiois causa quæ intus latebat, exitum foras habet. Est autem abortiois causa, purgatio alba quæ rubra esse debebat, vt omnis esse solet naturaliter instituta & consueta puerperarum, perfectos partus edentium: sed ex abortu alba est meritò, quæ fuit eius causa: quoniam illud album quod cernitur in puerperio purgationem, impotentiam attulit continendi foetum. Est autem duplex ratio atque causa puerperiorum alborum, vna quidem mucoris; altera verò puris. Ac de mucore quidem, illud præceptum est. *Quæ boni sunt habitus grauidæ, cum trimestres abortiunt sua sponte; ipsæ coryledones sunt mucore obsita.* De pure autem legimus nuper, quòd, oborta febre, materia quæ cohibetur, & qua cohibita, hypogastrij tumor assurgit cum renixu & pulsu, in empyema mutatur: cuius libero exitu, si nullum super sit vlcus in locis, mulier confestim sanatur.

S I Q U I D R I G V E R I T] Quod vel tantillum sit, nec fortè tantisper: quia rigoris crebra concussio est in empyematis velut ergastulo, vbi conclusum est. Arque hic rigor frustra abortus, transmigrationem facit, non solum pituitæ salis aut puris; sed etiam biliosi humoris, & sanguinis, primum ad latus, mox autem ad caput. Sed tamen hîc nihil de bile aut sanguine potest dici appositè. Solum de albis loco dicendum

loco dicendum, à quibus vis magna locis infertur, tam intus cohibitis, quàm excurrentibus. Nam sursum transmissa, nihil habent securitatis. Ac de alborum incommodis notæ sunt illæ prognoses iam explicatae supra in hoc tractatu. Quibus ex abortu, alba quidem cum febre subsuerint, tum surditas, & vis acerbata doloris in latus irrepserit; insaniunt desperata. Et. Quæ sunt in gravidis salislaginosa, difficultatem à partu fore ostendunt ex albis mordacibus: ac tales purgationes indurant, locosque corrugant, &c.

ET IN FEMUR EXCURRERIT] Quod ibi dolorificum sit, ut sæpe accidit cum menstrua inhibentur. Ac tum ille dolor abortus in femore, grauissima infert mala, non solum menstrualibus à menstruum suppressione: sed etiam viris quos occupat febris acuta: sicut Heropytho contigisse legimus, cui crebra erat vicissitudo surditatis & doloris in femore. Idem Caluo etiam mortiferè accidisse narrat Hippocrates, qui crudelissima morte à femoris dolore interiit, cum is, relicta parte, ad supera transiisset. Atque doloris in femore aborti, percepta sunt posita, quæ nihil necesse est hic denuo recensere. Sufficiet vnum quod iam attingimus. Est autem sic expressum. Κακοήτης, καὶ ἐκ μέρους ὀρμὴ δὲ γήματος. i. Malignus est etiam, doloris à femore excursus. Et. Ἡ ἐν αἰσθητῇ τῷ ὕπνῳ, τὸ καὶ τὸν μὲν δὲ γήματος ἀφανισθέντος. ὡς ἀκριβοῦς. i. Si quid in urina sit pendulum, vanescente cruris dolore, dementia præsagit.

MALE FIT A TREMORE] Est enim rigoris, lochia cohibentis, mala mutatio in tremorem, cuius origo est cacochymia è venis ad nervos expressa, indeque ad cerebrum ipsum transmissa, ubi delirium excitatur. Scitum est. Οἷον αὖ ἐν τοῖσι καύσοις πρόμοι ἡρώται. ὡς ἀκριβοῦς λέει. i. Quibus in causa tremor est, finiunt cum delirio. Est enim facilis atque mutua principatuum & propaginum sympathia, & syntimoria.

35 Τὰ ἀφθώδεια σόματα· τοῖσιν Ἰπιφόροις, κοιλίας καὶ θυλάει.

Ona aphthosa gravidis, perliquiditas reddunt aluos.

Huius prognos ratio repetenda ex commentariis nostris ad secundam & decimam nonam huius tractatus.

36 Αἱ δὲ τῶν κυστέων θεωροῦσιν· πρὸ τῶν τόκων Ἰπέρριζοι.

Quæ autem grvida prius egrotant quàm enitantur; iis subinde ante partum rigor cietur.

CLARA ET facilis est philologia huius prognos: sed ratio eius philosophica, multis est obstructa difficultatibus. Nec vèro adduci potest ad demonstrandum, nisi perspectum sit prius, catholicane, an hypothetica hic posita esse videatur: tamen catholica est enunciatio. Quæ utrum vera sit, plannum faciet eius examen quod sic aggredior.

40 QVÆ AVTEM GRAVIDÆ] Quæ inter gravidas ita sunt constitutæ, ut secundo cursu non exigant suam graviditatem, nec sine molestia; idque suo merito, non autem culpa ipsius graviditatis.

PRIUS EGROTANT QVAM ENITANTVR] Non quidem omni morborum genere laborantes; sed fortè doloribus hypochondrij occupatæ. Nam vxor Epicratis, ante partum ægrotavit, febre correpta, tertio die puellam feliciter peperit, cum ante febrem abortam riguisset. Ac morbo defuncta est gravi, & periculoso, quod ei purgatio puerperia bene iuisset. De hypochondrij autem doloribus huc pertinentibus, non ita pridem adducta est illa prognos. Gravidas malè habet hypochondrij dolor. Tum alui quæ his feruntur. Quinetiam ipsas crebrò rigere, pestiferum. Tametsi enim verbo ægrotandi, cætera morborum genera complexus esse videatur: tamen ab illis non æqua est rigendi necessitas ante partum, sicut ab hypochondrij dextri dolore quem fortè intulit systrophica inflammatio, quæ ante non absituit gravidam, quàm, peracto cursu graviditatis, ad enitendi pariedique tempus pervenerit. Tum enim si validarum gravidæ virium beneficio, phyma crudum hepatis expectarit pepasum, & in empyema mutetur; non antè partus erit, quàm pariendi tempus euenerit. Nam periodicus rigor febrium intermittentium, nihil aliud nisi paroxysmum denunciat, nec facit gravidam ἱπέρριζοι, i. crebrò rigere. Symptomaticus tantum hic est, de quo scriptum est à præceptore. Ἡ ῥίγος ἐμπίπτει, i. crebrò incidit, ut annotavit Galenus in commentario ad illum aphorismum. Criticus autem rigor, semel tantum in febre acuta cietur ad crisin, per hæmorrhagiam, aut per sudorem, nec recipit τὸ ἱπέρριζοι: sicut expressum hic legitur ita Latine conuersum.

IIS SUBINDE ANTE PARTVM RIGOR CIETVR] Nec ante pariunt, quàm subinde rigerint, affecta iam graviditate, cum in propinquo est partus, quem rigor quidem accelerat: sed reliqua puerperij efficit difficillima, ut visum est præceptori cum ait. Inter prædictas, quibus subinde rigor cietur, quæ pariunt facili, iis reliqua difficillima. Sed eam prognosin, penè dixerim, ænigmaticam, supra explicauimus, quo reuocanda est, ut omnis difficultas tollatur huius prognos.

37 Αἰναρκώδεις ἐκλύσεις· δύσκολοι μὲν ἐν τῷ τόκῳ ἀποβάλλοιαι, καὶ ὡδρακρυσταὶ ἔ μὲν τοὶ ὀλέθριοι. ἀπὲρ καὶ πλῆθος γυναικείων ὡροσημαῖνοι.

Exolutio cum torpore; difficilis quidem à partu contingit, delirium-que infert: sed tamen non est mortifera. Prenunciat autem copiam muliebrium.

LOCHIORVM incommoda quæ, vitio purgationis in qualitate aut copia, puerperas circumveniunt; supra sunt à nobis exposita. Vnum hic ponitur quod etiam attigisse videmur ad illam prognosin. Quæ ad manum torpidæ sunt, aridæ, suis expertes; cum muliebria multa laxarint; pus edunt. Sed quoniam eius & huius non idem est τὸ κατηγορεύμενον, quamvis idem τὸ κατακείμενον esse videatur; examinandi signum similiter erit à nobis in hac prognosi, sicut in illa.

EXOLVTIO] Non ea quidem quæ cernitur in lapsu præcipiti omnium facultatum, collapsis omnibus naturæ præfidiis, atque imprimis corde, cum ei nihil sufficit ad instaurandum nectar viuificum, cuius exhausto laborat; aut cum illius nectaris crebra est dissipatio atque corruptio ab aura pestifera, vel à fœdissima tæbe pulmonis. Atque hæc vera est ἐκλυσις, quæ vera dicitur syncope cardiaca. De qua est illud positum à præceptore. Οἱ ἐκλύομενοι πολλὰκις καὶ ἰσχυρῶς, αὐτὸν φωνῆς παρὰ φασίος ἐξαπίνης πλεοντῶσι. i. Quæ crebro & fortiter exoluntur sine causa manifesta; vitam repente finiunt. Sed illa demum est exolutio hic audienda, quam supra nominauit ὡδρακρυστα, nec ea quidem quam peperit vacuatio atque consumptio triplicis nostræ substantiæ, & frigus habet coniunctum: sed ea quæ cernitur ἐν τῇ δυσκοιῳ, i. in difficultate mouendi & cōuertendi se in alterutrum latus. Quod certè vitio accidit oppressiōis, cui præiit suppressio excrementi.

CUM TORPORE] Est autem ἡ τάρη, siue torpor, segnicies quarumlibet partium in suo cuiusque officio, vel hebetudo earum in percipiendo appulsu τῷ αἰσθητῷ, i. sensilium. Vtriusque hic ratio est quam infert vtraque plethora, videlicet ad vires & ad vasa. Plethora autem sic est.

DIFFICILIS QUIDEM A PARTU CONTINGIT] Quoniam eius in causa est, lochiorum suppressio, ubi est sanguinis τὸ πλῆθος καὶ πάχος, vnde malorum fœtura & ilias esse solet quam supra ostendimus. Sed exolutio hic descripta, particularem infert μπίσσειν ad instrumenta motus & sensus quæ sunt in toto corpore & omnibus artubus: proptereaque illi familiare symptoma adiunxit.

DELIRIVMQVE INFERT] Quæ vox delirij est, non quidem perpetui, qualis esse solet phrenitis, & inde nata infania: sed pressi leuiter atque fugacis. Exoritur enim καὶ τὸ ὀνηχέειν vitiorum quæ cerebrum in sympathiam adducunt. Atqui iam pridem illud receptum est quod in primo prorrhethico scribit Galenus. Αἱ ἐν ἐτέροις ποτὶ μέρεσι διωρόμεναι ἐς συμπάσαν ἀρχαίην πὸν ἐκτέφθον, ὅτι χολῆς καὶ φλέγματος βλάβαι, τὸ διωρεῖς ἐκ ἐχούσι. i. Quæ ex pituita & bile in cæteris partibus nata offensiones, cerebrum in sympathiam possunt adducere; nihil habent perpetuum. Nam demonstratum est supra quid intersit inter φρενιτικόν, καὶ ὡδρακρυστα.

SED TAMEN NON EST MORTIFERA] Nec suo vitio, nec alieno. Ac suo quidem: quia oppressio tantum occupat corpus tractabile, facitque ibi segnicie & hebetudinem. Alieno autem: quia delirium quod inde infertur, non eam parit in cerebro alterationem vnde ventura sit alienatio mortifera & funesta: sicut à phrenitide & infania venire solet; quod illæ in cerebro firmiter fixæ sint.

PRENUNCIAT AUTEM COPIAM MULIEBRIVM] Quam toto corpore artubusque omnibus nauseabunda vomit in vterum, venarum repletio. Atque ita παρηγεμνῆς transibit in ἐμπύον.

38 Αἱ ἐν τόκῳ, καρδίῳ παρὰ λήσασαι· ὀλίγω ὕστερ(ω) ἀποβάλλοιαι.

Quæ parturiendo, prius cor dolent; paulo post ille pariunt.

IBI DEMVM sperabilis est fœlix partus, & citò venturus à graui enixu; cum mulier diu multumque parturiendo fracta, incipit laborare cordis dolore. Quod certè ut medicos imperitos, metu exterreret: ita peritos recreat ac reficit bona spe secundi partus, & iam iam adfuturi. Sic autem ratio est huius prognoscos, quam præceptor scripsit his verbis. Quin etiam mulieri parturiendo cor dolet, quod accidit ventre circumuolvente fœtum, & opem ferente ad partum; maxime autem vtero. Sed quare à graui enixu partum in propinquo esse denunciet cordis hic dolor qui ante non fuit, in causa hæc sunt. Non enim hæc cardialgia vel cardiogmus, ab aura incidit venenata; nec verò à bilis morfu: sed à fœtu ipso qui tota grauiditate, velut sedendo, in aluo delituit; nunc autem in partu, cum foras viam affectet, se extendit atque in

atque in caput procedens, matris cor, i. os ventriculi, impetit, quod est acerrimi sensus. Est autem hoc loco, cordis nomen, pro stomacho: sicut Hippocrates vsurpauit multis in locis.

39 Τὰ Φευκώδεια, κοπιώδεια, καρδιακὰ, τραχὴλὰ ὀδυνώδεια·
γυναικεία καταρρήγνυσι. ὧς κρίσιν ἔχει τοῖς τὸν γινόμενον μὲν βηχίων
Ἰπποκράτει.

10 *Crebri horrores cum lassitudine, capitis grauitate, & colli dolore; muliebria cient profuse. Atque id sub crisin obortum, mouet tussiculam, cum rigore.*

H V I V S prognoscens nuper adducta ratio est ad 32. huius tractatus. Itaque tantum hinc nostrae sunt partes, ut attingamus ea quae supra ostendimus ad illam prognosin. Percussum caput, aurium echo; hamorrhagiam cient, aut mulieribus muliebria deorsum effundunt: idque cum aliis; tum si rhachis inde fuerit ardore accensa. Fortassis etiam dysenterica sunt hac. Ostendimus autem quod ab eadem concussione cientur variae excretiones; tam pro humoris motu, naturae impulsu, & meatuum condicione; quam pro natura & propria inclinatione illorum quibus ad crisin eadem perturbatio incidit. Quemadmodum enim signa praedicta inuenibus, ad hamorrhagiam; senibus, ad dysenteriam, in morbis acutis: sic mulieribus ad muliebria, priuilegio quodam naturae apparent; sicut etiam supra demonstratum est in historia menstruorum. Quod enim sequitur, de tussicula cum rigore, non est disciplinabile, sed ἀκαταμάχητον: quia demonstrari non potest nec verè, nec appositè.

Coac. 8. cap. 1. lib. 2.

Coac. 10. huius tract.

40 Ηοι κόρησιν ὀρθοπνοικὰ συμβαίνει· ἐν τοῖσιν Ἰπποκράτεισι, πτδοὺς
30 ἐκπύονται· γυναικεία Ἰπποκράτεισιν ἐν δεξιῇ· κακόν.

Quibus puellis orthopnoica sunt in promptu; iis dum utero gerunt, mammae suppurant. In causa sunt muliebria quae non apparent loco. vel. Malum est muliebria non apparere loco.

OPERÆ PRECIVM est discere ac tenere quemadmodum mala virginum orta ex vitiis muliebrium, transeant in magna incommoda siue symptomata grauidarum. Atque hic locum habet illa sententia praeceptoris quae docet ibi demum morbos enasci atque manere, ubi antea fuit dolor aut lassitudo. Sic orthopnoea virginum quam sera peperit muliebritas menstruum; iisdem post grauidis mammae adducit in empyema. Hoc autem cuiusmodi sit, tum verò quemadmodum iis eueniat, sic aggredior ad docendum.

QVIBVS PVELLIS] Quae viris maturae, non dum expertae sunt muliebritatem à menstruis.

ORTHOPNOICA SVNT IN PROMPTV] Quae orthopnoea tentantur, ubi non nisi recta eervice respirant. Atque id quidem, non inflammata larynge, cuius inflammatio praecipua est ad interitum: sed pulmone multum oppresso, atque distentis, sanguine illuc affuso, mammis. Nec verò hic vera est orthopnoea, quae principatum obtinet difficultatis in omni dyspnoea: sed potius quaedam sublimis respiratio, quam dicunt πνεῦμα μεταρὸν, ἢ μεταρροισμὸν, ubi, non nisi residendo, aegri respirant: quod apud Hippocratem est αἰσθαλίζεν καὶ αἰελαδαι, i. spiritum trahere verius quam ducere. Ac talem orthopnoeam supra iam attigit, ubi ait. Orthopnoeam faciunt hydropiformia dura: ibi nos hydropiformia dura spectauimus in thorace, cuius distentio est magna ex nimia humoris abundantia quae latitudinem tollit thoracis in dorso & pectore, ipsumque totum facit rotundum ac teretem, vtrius modo, distentum. Atque huius distentionis causa est πνεύμων πληθύνει, de quo haec leguntur apud Hippocratem. Ἡν πληθύνῃ ὁ πνεύμων· βῆξις ἔσται, καὶ ὀρθοπνοία, καὶ ἀσθμα. i. Si repleatur pulmo, tussis habet, recta spiratio, & anhelitus.

lib. 1. progn.

Coac. 67. cap. 16. lib. 2.

lib. 3. πνεῦμα τὰς αἰσθ.

IIIS PVM VTERO GERVNT] Trimestrem, quadrimestrem, aut eo maiorem foetum: cum scilicet copia est reliquiarum materiae menstrualis, de comœatu foetus purissimo circa locos collectae.

MAMMAE SUPPURANT] Quia cum olim virginalia mala mammae exceperint, quorum muliebria, quamuis sera, leuationem adferre solebant; nunc denegato, propter grauiditatem, exitu muliebrium, procliuus eorum est illuc transmissio, & ibi collectio, ubi πρὸ συνήθους καὶ ὁμοφύλης, societatis iam partem memoriam renouat. Sed empyema illud mammarum concipitur, tum per earum idiopathiam, tum per sympathiam à pulmone, cuius est facilis ad mammae μεταρρῶσις. Atque tum empyema in promptu est, si ea collectio sanguinis, neque in lac mutatur, neque furorem inducit. De quibus hoc fuit iudicium praeceptoris. Γυνὴ μὴ κινεῖται, μηδὲ πρηκνύται, γάλα ἔχει· πρὸ καταμύωσιν αὐτῆς ἐκλάσκει. i. Mulier non praegnant, nec

apb. 39. & 46.

50

puerpera lac habet; menstrua illam deficiunt. Et. Ταραχὴν οὐκ ὀφείλει εἰς τὴν πηρὴν αἷμα συρρέεσθαι· μάλιστα σημαίνει. i. Quibusunque mulieribus lac in mammis concrevit; insaniam facit.

MALVM EST MVLIEBRIA QVAM PRIMVM NON EXIRE] Epiphonema est, quo sanè ostendit quòd virginalia mala, muliebrium orta vitio, quàm primùm loco non exeuntium, id enim sonat, & ὁρῶν; vt nuper ostendimus; vbicunque infederint, quamuis abierint, memoriam tamen sui renouant in grauiditate, vbi naturalis & iusta est muliebrium cohibitio.

41 Τὰ μανικά· πυρετοὶς ὀξείς, ταραχώδεις, ἀχόλω καρδιαλγικῶ
λύοισι.

*Fanatica; febres acutas, turbulentas, cardialgico non bilioso ex-
olunt.*

HOC CERTE appositè non est positum ad historiam de rebus mulierum. An verò verè ad id de quo dicitur, hæc prima occurrit quæstio in examine huius prognoscens. Veritas autem sic lucebit.

FANATICA] i. Insaniæ in quibus dementiæ summa sunt omnia, cuiusmodi sunt eorum qui ad sana excurrunt, coëptis immanibus efferi.

FEBRES ACVTAS] Quæ continenter, celeriter & vehementer mouentur.

TURBULENTAS] i. Quæ inferant τὴν ταραχὴν ἀπὸ τοῦ ὀνόματός μόνον, i. turbationem simpliciter absoluteque dictam, quæ mētis & consilij est, non vrinarum, nec ventris, vt annotauit Galenus ad illud promth. Ταῦτα ὅτι ταραχώδεις ἀχόλωι ἐν τῇ ἀρχῇ, ὡς ἀρχαί, ὡς ἀρχαί, ἐν αἰσθημένῳ· ἐφ' ἰδρωπὶ φρενιτικῇ. i. Vrinæ turbulentus vigilibus decolores, vel nigra, encephalate præditæ; cum sudatiuncula notant insaniam. Hæc autem turbatio, phrenitidis prænuncia est atque insaniæ grauioris. Ac talis turbatio à febre acuta, sic expressa legitur in illa prognosi, surditas, morbi acuti turbulentique consecutaria; graue malum. Sed illic turbatio pro insania, scripta est ταπεινὸν περὶ. Non enim surditas, turbationis est ἐκτροπὴ: sed insaniæ ab exhausto quo exoluta est pars illa cerebri vnde vis audiendi manat.

CARDIALGICO] i. Cordis dolore implicito. Est autem positum hic nomen cordis, pro stomacho, seu ventriculi orificio quod est acerrimi sensus, vt sæpe ostendimus. Ac nihil interest, dixerisne cardialgiā, an cardiogmum, i. morsum partis prædictæ.

NON BILIOSO] Vt esse solet in multis: sicut in illa muliere, cuius cardialgiā contumacem exoluit pristanarium conditum succo mali punici. Nam bilis affluxu, tale symptoma excitari solet in stomacho, cum eò vsque prorepit: sicut affixæ bilis in fundo alui, nausea est & singultus: similiter vt eius natantis, vomitio esse solet. Hic autem cardialgiæ causam agnoscit, non hypochondriacam biliosam: sed eam quæ à cerebro, vbi mania est, transfertur in stomachum ταραχὴν αἰσθημένην, propterea quæ cerebro συμπαρέστυν: sicut annotauit Galenus in luxata maxilla.

EXOLVUNT] i. Sanant. Sanè quidem: sed eam sanationem non adfert redintegratio corporis è natura egressi; vt verbum illud quod est sanandi, sit planè ironicum, sicut in illo. Οἱ αὖ ἐν τῇ καὶ καὶ ἔμοι ἡρώαται· ὡς ἀποτὴν λύει. i. Quibus in caufa tremores accidunt, eos delirium perimit. Ibi enim delirio tremor sanatur; sed ægri periculo, siue interitu. Ergo fanatica exolunt turbulentas febres acutas: quia tum ad vltima ventum est, cum turbationi phrenitis, & inde huic succedit extrema dementia. His gradibus itur in requiem sempiternam.

42 Τοῖσιν ἀτοκοῖσιν αἷματ' ἐμέτος, πρὸς τὸ συλλαβεῖν ὠφέλεια.

Sterilibus vomitio sanguinis, ad concipiendum prodest.

EST QV IDEM in promptu perceptio huius prognoscens, quæ cuiusmodi sit, philologia eius prima fronte ostendit. Nihil enim clarius, nihil ad percipiendum facilius, quàm legere vel audire; quòd iis quæ non concipiunt, vomitio sanguinis ad concipiendum prodest. Sed vtrum verè id positum, aduocanda est omnīs ratio sterilitatis ad ineundum examen, quo veritas elucescat. Quot enim causarum sterilitatis idææ; tot etiam remediorum genera esse debent. Quæramus ergo, si placet; an cuius & semper, an verò tantum cuidam sterilitati, sanguinem profer vomere, ad concipiendum. Enimvero quantum complector animo, ex omni doctrina Hippocratis; mulieres omnino sunt ἀτοκοί, i. partus expectes: quia sunt ἀφοροί, i. vacuæ nec prægnantes. Non enim admitto mulieres quæ molam gerunt, ac sepe manent ἀτοκοί ad vltimum vitæ diem, si tandiu mola vixerit, donec mulier animam exhalarit, & in eam mola ipsa molem accreuerit, vt iam exire non possit; nec eius mortuæ adhuc paruæ exclusio fuerit à viuente matrice & matre, quæ confortis mortui impatiens esse solet. Vidimus enim molam molis annorum quindecim. Erat autem rotunda pedes tres cum dodrante. Eam gestabar mulier abdomine vtriformi, quale est hydropicorum. Ea mortua & dissecta, prodiit mola viuens & incorrupta, cuius conceptæ & gestatæ in vtero per quindecim annos, hoc argumento adducor, quòd mulier esset vitæ integræ, & notæ cum primis pudicitia. Exegerat autem 15. annos vidua. Nam sine coitu, coagmentatio non est mola, quicquid

10

10

44

43

1

De Steriliteit

2011.12.26

254.452

natura egressa, vtero non concipiunt; iis omentum, os vteri comprimit: neque prius concipiunt, quam fuerint attenuata. Hic sanè videndum, an vomitu sanguinis, attenuatio comparetur, quam ad concipiendum necessarium esse dixit. Sed patefacta est omnis impeditio excipiendi semen virile. Nunc de impotentia idem concipiendi, cum semel illapsum fuerit, & exceptum ab vtero. Primum occurrit iudicium præceptoris de signis excepti seminis, sed non concepti. Est autem huiusmodi. Ergo si mulier fateatur postridie, aut perendie, aut etiam quarto post die quam rem cum viro habuerit, semen ex vtero elapsum fuisse; huic natus vterus nimia humoris abundantia, ipsumque semen diluitur. Sin autem sextum aut septimum diem agens à coitu, exceptum semen effundat; certum est ipsum putrescere, & cum putruerit, elabi. Sed tamen effluvia illa, seminis recto cursu, in vteri sinum illapsi, non tamen ad generandum concepti; æquè viri accidunt malo saty, atque mulieris vitioso conceptu.

Enimuero satus eorum in vitio est, quorum spermaticus humor, semenque ipsum, temperamento & complexione non sunt naturaliter constituta. Huiusmodi ferè cernuntur in iis quibus est sanguis natura serosior, aut qui à diæta serescit: quod Aristoteli est ὀππρόθυ, vbi de sudore agit cruento. Natura serosior est in lentiginosis quorum vlcera ægrè sanescunt: tum in minutulis, quos Græci λευκοί vocant; & catarrhosis, à perennitate catarrhi, quam fundit repletio capitis, quæ à visceribus malè moratis maleque constitutis, continenter infertur: cui de proprio capitis vitio multum adiciunt. Talibus enim complexio eius materię quæ ope testium, transit in semen, ipsum vix edet prolificum. Sic enim naturæ comparata est ratio, vt coctionis vitium quod præcessit, non emendetur ab ea quæ illi succedit. Scitum est illud, *segnities ventris, est omnium confusio, & vasorum impuritas*. Diæta vitio sanguis serescit, ibique humor spermaticus testium coctione non transit in semen prolificum lentericis, leucophlegmaticis, omnibusque adeo quos occupauit hydrops; tum ebriosis atque cachecticis. Nam quibus adempta vis est subeundi vel irrigandi fundum hystericum; notæ sunt illi sterilitatis: similiter vt castrati & thlibiz, quos vocat eunuchos. Ac subeundi quidem fundum hystericum adempta vis erat illis cedmaticis apud Scythas, quibus ad cedmatis curationem, sanguis detractus fuerat, venis pone aures incisis. Quod etiam, ex instituto gentis, faciundum præcepit Hippocrates in Epidemiis. Impotentiam subeundi, facit collapsa facultas arrigendi, à seminis paupertate; vel exolutio muscutorum pudendi. Nam irrigandi vterum recto cursu, libertas spadoni adimittitur: vel potius, ne vlla quidem conceditur: vt mirum videri non debeat, si pro fecunditate regnet sterilitas in mulieribus quæ viris nupserunt in quibus prædictæ sterilitatis causæ apparent. Sunt enim aliæ multæ à viris profectæ, quæ in occulto latent, nec nisi à peritis medicis animaduerti possunt: cum scilicet viri saty hystericus fundus non gaudet, quia non est illi *υπερσφορς, i. consociatus*, temperamento, vel etiam complexione: vnde sunt illa vitia densi aut rari seminis, tum frigidi atque calidi, quæ ponuntur à præceptore in aphorismis. Itaque malo saty semen virile non minus elabitur postridie quam illapsum est, perendie, quarto die, aut quinto, & sexto; quam culpa hystericus fundi, tum proprio, tum alieno vitio laborantis. Vidimus enim quasdam primis nuptiis diu steriles, quas tamen secundæ bearunt prole pulcherrima.

Ergo tenebit is primùm notitiam sterilitatis vnde profecta sit, qui suis præsidii vult pro ea fecunditatem inducere, neque committet vt medicina quam adhibet, temeraria esse videatur. Nouerit autem præsidia sterilitatis, in medici manu non esse, nisi permissu auxiliòque Dei; cuius ea voluntas est precibus impetrata, vt summa benignitas eius appareat in regno sterilitatis, cui reginam præficit fecunditatem: quemadmodum cecinit diuinus & regius poëta his verbis, quibus ora sua in Dei laudes resoluit.

Qui maternos sterili fructus Exoratus donat, & orbos Lata renouat prole penates.

Sed quoniam vt præclare scripsit Hippocrates. Omnia quidem diuina sunt; ac nihil est aliud diuinius alio, neque humanius: nihil tamen fit sine natura, quæ est ipsa vis Dei: ac tamen si omnium redintegratio est, vnde ipsa naturæ præscriptio atque norma, nempe à Deo; tamen cognitio & scientia egressio- nis quæ infert sterilitatem, manat à Deo in medicum; & inde ratio comparandæ fecunditatis quam secum adfert redintegratio rerum genitalium, prius è statu naturæ optimo egressarum.

Ergo tenenda est primùm causa omnis & ratio sterilitatis in femina quæ suo vitio, non alieno, semen recto cursu immisum, non retinet, neque concipit. Nam de impotentia excipiendi, nihil dicendum amplius. Omnis autem causa & ratio sterilitatis ab impotentia continendi & concipiendi semen virile, sic expressa legitur in aphorismo libri quem scripsit Hippocrates *ὅτι δὲ στείον ὁρῶν ἀσφόρον, i. de sterilibus vtero non gerentibus. Quæ frigidos habent vteros, quæque densos; non concipiunt. Quæ item præhumidos habent vteros, non concipiunt: nam genitura in eis extinguitur. Tum quæ siccis nimis, quæque perustis: quia defectu alimenti semen corrumpitur. At verò quæ vtriusque contrarietatis temperiem nactæ sunt; proletrix tales euadunt. Enimuero sterilitatis causæ omnes in hoc aphorismo sunt positæ ab impotentia concipiendi semen virile. Ibi autem seminis non est conceptio, vbi vis eius prolifica nõ fouetur, nec excitatur ad τῶπρον, i. ad fetus descriptionem: sed corruptione seminis in quo inest, labefactatur atque vanescit. At verò semen corrumpitur perfrigeratum, vel nimia humoris obrutum abundantia, vel alimenti defectu exhaustum à siccitate, vel cum ardore matricis cõsumptum est. Sed patefacta omni ratione causarum sterilitatis in aphorismo, cum ea tantum explicanda supersit quæ est in frigore ac densitate vteri, operè precium fuerit super hac re verba audire Galeni. Vbi tam frigus immoderatum potens est, vt densum efficiat vterum; angustissima quoque sunt mulieribus ora eorum quæ illuc ad vterum ferantur vasorum. Itaque vel hoc nomine, steriles manent mulieres; quòd venularum osculis secundinæ adnasci non possunt. Quod vt euenerit; tamen non potis est conuenienter forum nutriti. Aut enim ne minimùm quidem purgationes eunt: aut certè admodum paucae, & illæ quidem prauæ; quòd scilicet illac tenuior sanguis & aquosior transmittatur. etenim ibi facillè oppilantur venularum oscula: tum propter naturam eorum angustiam; tum quia huiusmodi femina, prouentu ferè abundant pituitosi humoris. Nam vniuersum corpus, omnino simi-*

- omnino similiter est constitutum ut matrix. Huc accedit, quod semen virile, in locis huiusmodi refrigerari potest, nisi id forte sit natura calidius. Ergo mulieres quæ frigidos habent uteros, ad concipiendum ineptæ sunt: propter eorum substantia densitatem. Quæ cum ita sunt; planè efficitur verum esse quod scripsit Hippocrates; quod scilicet illæ demum mulieres nihil opis, nihil industriæ requirunt à medico ad comparandam fecunditatem, quibus menstrua bene respondent in qualitate, copia, expurgandi modo, & utraque periodo naturaliter instituta, hoc vno excepto. Si enim consuetudo est ori matricis continendi, exacta purgatione menstrua, ut genituram vterus coëundo non possit excipere: tum imperanda coitio est pridie quam cessarit purgatio. Nam quibus impuræ sunt purgationes menstruarum, quæque non eunt xj. iure, i. iure & loco; iis adhibere oportet cultum proli habendæ. Intellego autem cultum, non illis præ-
- 10 sidiis quæ contra sterilitatem ab impotentia concipiendi, sic à præceptore sunt posita. Ταῖς ἀνόροις πυλίσιν καὶ φαρμακείῃς. i. Steriles partim fouere, partim purgare oportet. Etenim omnis curandi ratio suscipitur atque absolvitur vacatione alieni humoris, & neoterismo corporis è natura egressi: quoniam omnis affectio sterilitatis, egressione vteri de sua præscriptione, & impuritate consistit alieni humoris; ut modo diximus in aphorismo. Ut autem sunt causæ singularum affectionum à quibus infertur sterilitas per impotentiam concipiendi, de qua hîc loquimur: sic etiam remedium genera esse debent. Egressioni corporis debetur neoterismus; impuritati purgatio: ut scilicet illis præsidiis, contrarietatum frigoris & ardoris, item siccitatis & humoris, temperies ad concipiendum idonea comparetur. Qualem natura & valetudinis cura diximus esse in iis quibus iure & loco convenienter menstrua expurgantur: propterea quæ tantum à viro, non autem à medico, cultum habendæ proli requirunt. Igitur qualis e-
- 20 gressio est vteri; talis erit neoterismus, fouendo & alterando: qualis impuritas; talis item purgatio. Ac primum eximie frigida intemperies vteri, quæ densitatem infert, unde sterilitas ipsa venit; æquali contrariorum excessu, ad iustam temperiem redintegranda: idque fouendo intus & foris. Huc valent fomenta siue θερμάματα calidarum rerum hysteriarum, καὶ ἢ ἐν ἀρόματι πυλίσιν δὲ τὴν μαλακὴν πυλίσιν; ut loquitur Theophrastus. Atque ita cum frigido & denso vtero medicatum fuerit intus & foris; tum explorare oportet num illis artibus comparata sit redintegratio, qua seminis concipiendi tollatur fixa olim firmiter impeditio. Ratio quidem explorandi sic est à præceptore tradita. Si mulier quæ in aluo non concipit, scire velit num tandem aliquando sit conceptura; circumtectam optimè vestimentis, infernè suffito aromaticis. Et si quidem odor suffiminis, ipsi per interiora corporis, prorepere videatur ad os & nates; velim existimes quod ipsa non suo pte vitio est infæcunda. Huiusmodi ratio explorandi suscipitur quoque aliis atque
- 30 pessariis, quæ in sinum pudoris immissa, odorem suum expirant ad caput, unde fucantur nocturni pileoli. Sed ea periclitatio, tantum iis accommodatur, quarum vterus frigore ac densitate causam habet sterilitatis, ut Galenus auctor est ad aphorismum. Sic enim scripsit. Μόνας οὐκίνας ἢ διὰ δόθησιν πύλιν ὅλον τὸ σῶμα ἢ διὰ θυμὰμαται ἢ πύλιν: ὅσας σκληρὸν, ἢ πυκνὸν ἔστι τὸ τῆς ὑτέρας σῶμα. i. Illis dumtaxat in corpus vniuersum non diffundetur suffitus qualitas, quibus durum & densum est matricis corpus: Nam cæterarum causarum sterilitatis, vacationem non arguit odoris perceptio à suffitu per sinum pudoris in femina circumtectæ. Non enim cæteræ causæ odorem impediunt quod minus ad nates perueniat, quem suffitus expirat aromaticum per naturalia: tametsi aliter video placuisse Galeno ad aphorismum ubi de causis agitur steriliū forminarum ab impotentia concipiendi. Eius hæc sunt verba. Διάγνωσις πύλιν ἢ ἀμέ-
- comment. 2d
aph. 62.5.
- 40 πιν ὑτέρας δυσχερεσιὼν ἔστιν, ὡς ὁ λόγος ἐμπεριέχειν εἰρηκὸς ὁ Ἱπποκράτης: διὰ τῆς ἢ ἀσυνμάται πύλιν. i. Omnis uterina intemperiei memorabilis dignotio vnica est, quam paulò antè Hippocrates posuit; per suffitus. Hic lectores viderint quàm constanter sibi vir summus consentiat. At verò caloris eximij & siccitatis in vtero mediocritas comparatur ad concipiendum idonea neoterismo, lactis asinini; balneo aquæ dulcis egelidæ fumo & odore carentis; diætā ciborum meabilium, omnis alienæ qualitatē expertium, minimæque sitiferorum. Humidioris vteri ac multa proluvie diffluentis redintegratio est procuranda catharticiis: quod spectat illud Hippocratis. Ταῖς ἀνόροις φαρμακείῃς. Superuacanci autem humoris in vtero extinguentis semen virile, signa sunt τὰ ἀνόρτα, i. quæ illinc vel illac discedant. Sic enim præceptor ait: Υγρὸς δὲ ἢ ἀνόρτος. i. Humiditas ex eis quæ abeunt. Sed ἀνόρτα sunt tam muliebria, quàm fluxus muliebres. De muliebrium impuritate, quorum est consuetudo purgandi naturaliter instituta, hæc fuit sententia præceptoris: Si velis mulierem diu sterilem, materno fructu beatè, ac renouare orbos penates prole gratissim-
- lib. 2. c. 7.
γυναικῶν
- 50 ma; primum attentio esse debet ad menstrua, num pituitosa sint, an verò biliosa. Nam talis impuritas; conceptionem impedit, donec purgando fuerit expurgata. Fluxus muliebres quorum perennis fluxio est per naturalia; sterilitatis causa, præcedunt impura muliebria. Ergo consilium est præceptoris, impura purgare muliebria. Testatur id primum aphorismus hac de re conscriptus. Γυναικὶ κατὰ μὲν ἀρχὰς καὶ μὴ κατὰ αὐτὰ αἱ εἰς γόνιμους καὶ χυδαίους δίδωται σημάδια. i. Mulieri menses decolores nec eadem fluentes periodo; purgatione opus esse indicant. Species autem catharticonum, pituitam aut bilem ducentium, ut alterutro humore menstrua conspurcantur, tum signa vtriusque humoris; nihil necesse est huc aduocare: sunt enim in promptu; patentque omnibus ad visendum apud Hippocratem. Quinetiam idem auctor, accuratissimè scripsit omnium muliebrium fluxuum differentias & ideas, eorumque præsidia. Sed inter præsidia humidioris vteri & impuri, principem locum obtinent fontes Spadenses aquarum medicatarum. Diætā siccissimā præscribitur ab Hippocrate. Profuerit itaque uti decocto radicū chinarum in epulis, loco vinæ caput fouere decocto cephalico; suffire vterum suaneolentibus aromaticis; ut Galenus posuit in aphorismis, quod est πυλίσιν τῇ πυλίσιν μαλακῆν.
2. Epid. part. 3.
- 60 Hæc sunt profecto artes fugandæ sterilitatis ab impotentia continendi & concipiendi semen virile; in causa sanabili affectionis perspectæ & cognitæ καὶ τὴν τέχνην. His ita constitutis; ad eam præscriptionem & normam, instituendum examen huius prognosticis, quod erit huiusmodi.

STERILIBVS] Quæ sunt eiusmodi suo vitio, non alieno, per impotentiam vel excipiendi, vel continendi, vel concipiendi semen virile. Atque distinctio hæc causarum omnium sterilitatis, versatur in vitro & circa uterum, qui, ut fecundus ager, fructu materno restibilis esse debet: nunc autem manet infructuosus iis de causis quæ modò à nobis sunt positz.

VOMITIO SANGVINIS] Quam ciet anadrome sanguinis è locis ad ventrem, vel ad pulmonem. Est enim utrinque vomitio sanguinis apud Hippocratem, ut suprà ostendimus. Etenim menstruum suppressio vnde sunt dolorifica mala lumborum, sæpenumero sui seri expressionem mouet in fundum ventriculi, & inde ad stomachum, vnde hæc veniunt; illinc quidem, vomitio atque nausea; hinc verò, cardialgia. Similiter etiam secundum pulmones, eiusdem sanguinis apparet vomitio, vnde symptomatum leuatio est quæ inferebat suppressio. Et verò iam pridem constat, quòd menstruum & hæmorrhoidum cohibitarum anadrome si sit ad hepar, nec inde habet *αἰματηρὸν*, ibi facit *ὑδρωπὴν*: sin verò ad pulmonem, ibique subsistat, & cæseat anagoge; peripneumoniam, empyema, & phthisin mortiferam excitat.

AD CONCIPENDVM PRODEST] Appositè dictum est, ad concipiendum, non ad gerendum, aut nutriendum: nisi fortè nimia sanguinis abundantia, seu grauidarum repletio, quæ cernitur in difficultate spirandi, ac duris mammis & turgidis, vnde abortio sæpe incidit; vomitione sanguinis periculum ampliùs grauidæ non inducat abortiendi: sed eam deducat ad puerperium, exacto tempore grauiditatis. Nam difficultas & impotentia omnis excipiendi aut concipiendi semen à repletione locorum, vnde sterilitas, cuius in vomitu sanguinis est præsidium; nuper adducta est. Ex quibus efficitur; non ad omnem causam sterilitatis prodesse hîc positam vomitionem sanguinis: sed tantum ad eam quæ dicta est; neque id sine incommodo partium, nec sine periculo ægròtantis. Est enim periculosa omnis quæ sursum fit per os, sanguinis vacuatio, *ὁραὶον αὐτὸ ἦ, i. cuiusmodi tandem fuerit.*

43 *Τὰ ἀχλυνώδεια, γυναικείων συχλῶν ἑπιφανείων· λύεται.*

Oculorum caligo discutitur cum muliebria multa prodierint.

aph. 22.2.

HIPPOCRATIS illud est in aphorismis. Qui à repletione morbi nascuntur; vacuatione sanantur: & qui ex vacuatione gignuntur, sanat repletio. Atque sic contrarietas, aliorum sanatio est. Vbi iudicium est Galeni; quòd eorum qui adhuc sunt morborum oratio est instituta: proptereaque, inquit, perspicuum est quòd vnà cum amotione causarum efficientium, ipsi quoque morbi necessario amouentur. Efficientium autem causarum amotio suscipitur per contraria. Ergo si menstruum suppressio est caliginosa; planè efficitur, quòd eorum liberalis & libera vacuatio, caliginem priùs ob oculos obuersantem discutit & exoluit: sicut est positum in hac prognosi. Quemadmodum autem caligo ac tenebræ, oculis offundantur ab iis quæ intrà sunt inutilia, tum quænam sit ratio discutiendi & exoluendi eam caliginem; in promptu fidem adducet exàmen huius prognoseos.

Ergo. **O C V L O R V M C A L I G O]** Græcè est, *τὰ ἀχλυνώδεια*; i. quæ sunt oculis tenebrosa & caliginosa, eo suffusa intus, non foris. Nam *τὰ ἀχλυνώδεια*, propriè cadunt in oculos, ac de iis dicuntur; quòd eorum sunt *αἰσθητὰ*, i. sensilia, intus percepta ab impuro sensorio: vnde est deprauatio sensus videndi. Sic apud Hippocratem, *Αἰσθητὰ sunt ἀχλυνώδεις: sicut auribus βαρύνουσι*. Est igitur oculorum caligo, quam facit impuritas & obreuebratio, vel spiritus visifici, & oculorum luminis, vel humorum trium *τὰ ὄρατα*, i. aspectabilia, excipientium, ut quædam in iis videatur esse suffusio caliginosa, tum ipsis ægrotis, tum medicis atque propinquis oculos intuentibus. Atque illa caligo nebulam & nubem contingit; nebula quidem crassior, nube verò tenuior. Est autem humorum sensoriorum visus, tum luminis oculorum proprii, ac spiritus visifici, velut aëris, perturbatio, quam *θόλασι* Græci vocant, cuius symptoma est visus allucinatio & hebetudo. Sed huius caliginis varia est origo; tum à cerebro; tum à pulmone; tum à ventriculo; tum à venarum, sanguine distentarum, impuritate. Ut autem sunt causæ caliginis atque foci, tum eius idea: sic etiam remedium generat esse solent, quæ vel naturæ imperio, vel medici artificio adhibentur. Nam si quid *ὀφθαλμῶδες* videatur ob oculos obuersari cum cardiogmæ; in vomitu præsidium est: sine cardiogmæ, in liberali ac libera expurgatione pulmonum aut capitis. Sin autem pro tenebris atque caligine, crebri sunt marmarugis oculi, atque scintillant siue micant scintillis quæ sunt *λαμπηδόνες*; tum hypochondrij fugax distentio ac sine dolore appareat; omnis spes medici & cœptæ curationis fiducia stat in narium hæmorrhagia; cuius etiam prænuncia est cephalalgia, comes illorum signorum.

DISCVTITVR] Sanatur *ἐνκρίτως*; vel, si maior, fidam habet leuationem, causa firmata critica; non autem falsò creditam nec insidiosam. Nos autem videmur appositè, *discutiendi* verbum commodasse caligini.

CVM MVLTA PRODIERINT MVLIEBRIA] Cum ei caligini multa superuenerint, vel superapparuerint muliebria, quorum suppressio ipsam caliginem oculis offundebat. Sunt enim *τὰ ἐπιφανόμενα*, quæ intus conclusa morbifica, foras exeunt atque apparent bene vel male, ad salutem, vel ad perniciem. Quale apparet sputum pleuritidis de phlegmone systrophica tunicæ costis intertextæ. Sed illud *ἐπιφανόμενον*, est morbi fixi qui eo spūto exoluitur. Quod autem hîc ponitur in muliebrium liberali purgatione;

purgatione; non est de foco caliginis, ubi est ipsa: sed de materia, quæ circa locus & lumbos suppressa, in vicio est; quæque illinc mouet, ad cerebrum & ad sensoria visus; *αἰσθημάτων ἀχρηστών*: quæ tamen firmiter fixa non hæret in cerebro neque in oculis. Nam si perennitas esset caliginosi vaporis in qualitate mala, cerebro *κακοῦ* impressa: similiter vt venenum Assyrium, lanis albis eo fucatis; nihil profectò valeret ad elucendam tincturam, muliebrium suppressorum libertas: nisi quatenus à suppressione illorum, causæ illi fixæ atque symptomati adiceretur per terram anathymiasin, sursum ad caput elaram. Sed vt lignis accidit, quæ coniecta in ignem atque præusta, detracto igne non redintegrantur: sic morbi rheuma consistens, detracto eo quod concitatur, non tamen detrahitur; nec eam partem quam occupauit, liberam esse sinit, donec ipsum discesserit amotione propria: idque superstire partis integritate, quam sæpe corrumpit. Ergo muliebrium vacuatio, caliginem discutit quam excitabat eorum cohibitorum *αἰσθημάτων ἀχρηστών*. Ibi enim, malorum atque symptomatum subinde nascentium vacatio esse solet, ubi cessat eorum solita generatio.

44 *Οσοι γυναιξὶ ἐν πυρετῇ ἀλγῖμα πτῶν γίνεται· πύσις αἱμᾶ-
λωπος ἔ τρυγώδης γμορδύη, λύει τοὺς πόνοις.*

20 *Quibuscumque mulieribus, oborta febre, dolor mammarum incidit;
inde nata sputi cruenti non faculenti expurgatio, molestiam omnem
exoluit.*

HIC SCORPVS est alter curationis eorum symptomatum quæ in mulieres incidunt à febre ipsis oborta. Incidunt autem per *ἐπιήρῃσιν*, non tantum humoris morbifici: sed eius materiæ cuius in promptu copia esse solet; vel etiam cuius virio febris enascitur. Est autem, collectio menstruum quæ foras non exit per uterum: sed febris ardore sursum transmissa, ibi morbum facit, ubi subsistit. Facit autem in mammis, eò transmissa, vnde nulla leuatio est primùm obortæ febris: sicut morborum omnium nulla esse solet ab iis: quæ incidunt *ἐν τῷ συμπίθῃ*. Est autem *συμπίθῃ*, in mulieribus, mammarum dolor à febre, qui, vt scribit Hippocrates, *ἐπὶ μαστῖμα ἐστὶ κοινῶς μάλῶν, φωνῆς, καὶ γονῆς*, i. memoriam renouat societatis *mammarum*, vocis, & genitalium. Societatis inter se mammarum & uteri multa sunt argumenta, quæ nihil est necesse recensere. Sufficiat illud vnum, quod *συμπιπῶσιν ἀήματα*, i. mutuo se afficiunt, mutuasque tradunt operas mulierum rebus tam bonis, quam malis. Nam quod hic ponitur argumentum, instar omnium esse debet ad faciendam fidem societatis inter se mammarum & uteri: tum peculiaris naturæ mulierum, in quibus est promptuarium materiæ redundantis ad *ἐπιήρῃσιν* vel *ἐκρέμασιν*. Sed huic vitio *ἐπιήρῃσιν* quod est in morbo mammarum à febre mulieris, fecus ab illo est quod in caligine est positum à muliebrium suppressione. Huic enim debetur propria expurgatio per anacatharsin: illi vero sufficit muliebrium suppressorum liberalis per uterum vacuatio. Atque sic, meo quidem iudicio, exempla sunt posita; vt iis veritas luceat splendeatque theorematum catholicorum nostri authoris, de curatione morborum atque symptomatum quæ inferuntur firmiter fixa, vel efferuntur fugacia: idque à rheumate concitato, mox consistente; vel ab humoris, suo loco manentis ac stabulantis anathymiasin. Quæ omnia, quoniam superiore prognosi & alibi sunt à nobis distincta; superest vt instituta prognosin, cuiusmodi sit *ἐν τῇ ἐπὶ καὶ ἐν τῇ δι' ἐπ.*, propalam explicemus, & ad veritatis normam examinemus.

30 *QVIBVSQVE MULIERIBVS] Cuiuscunque sint illæ conditionis, modò sint menstruales, tam viro matruæ adhuc innuptæ, quam nuptæ aut viduæ.*

OBORTA FEBRE] i. Cum febris eas inuaserit, maximè verò acuta, intermissionis expers, vnde cientur motus introrsum, sicut à tertiana extrorsum: qua motuum differentia, febres illæ ab eadem naturæ materia distinguuntur: ob eamque causam sunt participes vel expertes quotidianæ discessionis, quam Græci nominant *καθημερινὴ λύσιν*, ἢ *ἀπυρεσίαν*. Ac febrium quidem assidua crisis fit *εἶσω*, tum per excretionem, tum per abscessum: nisi forsan exceperis febrem ardentem quæ à rigore criticum habet sudorem, sicut hæmorrhagiam. Nam febrium biliosarum tertianarum quæ cum rigore nascuntur, excretionibus critica fiunt *ἔξω*: quemadmodum *εἶσω* per vomitum à rigore; nec vnquam abscessus, qui sit earum merito.

DOLOR MAMMARVM INCIDIT] i. Dolorificum malum in mammis, quod ibi facit muliebrium, quæ in muliere semper in promptu sunt, concitatio: cuius quidem causa est febris assidua, vnde materia sursum viam affectat: cursum autem eò inflectit, nempe ad mammas, propter ipsarum & uteri *κοινότητα*: tum propter societatem quæ illis partibus intercedit per vasa communia.

EXCITATA INDE PURGATIO] Græcè est *πύσις*, ad verbum, *expulsio*, quæ apud Hippocratem sæpe legitur pro anacatharsi, quæ propria expurgatio est morborum thoracis atque pulmonum. Hic autem appositè mammis tribuitur, ad sui purgationem: quod eorum qui sunt in mammis humorum, facilis intra thoracem est transitus, propter earum partium societatem quæ cernitur in vicinitate vasorum inter se, ac mutua officiorum communicatione. Scitum est illud. *Ἀλλὰ τῶν τοῦ σώματος μερῶν, ἢ πύσις, ἢ βίαις, ἢ ἄλλῃ πνίξιόνται, ἢ ἀκροῖσιν αἱ κοινότητες*. i. Quarundam partium affectiones ab aliis excipiuntur, partium labore, partim *ἐλαφύτῃ*, partim etiā quibusdam præsidij; sunt etiā certis quibusdā societates inter se. vnde hæc sunt.

i. Epid. & 6.
cuius operis
part. 1.

SPUTI CRVENTI] i. Concreti sanguinis: non quidem sputi pauca bile permixti, quale est bonum sputum pleuritici circa initia; nec pauco sanguine, cuiusmodi esse debet peripneumonici: sed meris cruor nulli sputo albo permixtus, ut præ se ferat ideam humoris morbifici alteratione carentis, omnique pepasmo; quo vertitur in empyema, cum eius collectio metum adfert corruptionis atque infamiae. Non enim tum lactis coctio esse potest, quæ vera est *ἀλκ*.

NON FACILENTI] Cuiusmodi esse solet corrupti sanguinis in empyema prauum, tam suo vitio, quam partis obsessæ mutati. Sic enim de prauo empyemate dici solet, quod scilicet est *ῥοφολογία*, i. *καρσώσις*, i. *caenosis*, vel *amurcosis*, eodem planè sensu quo hic *ῥοφώδης*. Quæ omnino praua, ut votis omnibus sunt auerenda: sic neque tamen optandum est, nec expectandum in mammis empyema, quatuor laudabile: ut neque in pleuritide, nec in peripneumonia, nisi cum desperatio est anacatharticos, in spe angusta salutis. Præstat enim citò adesse liberalem ac liberam anacatharsin, quam empyema serò venire, ubi nihil est securitatis.

MOLESTIAM OMNEM EXOLVIT] *Λύει γὰρ πῶτος*, i. leuationem adfert laborum quos intulit muliebrium ad mammas à febre concitato, ubi firmiter fixa hærent. Exoluit autem, vacuatione circa & propria humoris dolorem mouentis, vnde cita est etiam vera leuatio, non falso credita, nec infidiosa. Est autem hic necessaria rheumatis concitati & consistentis propria expurgatio; quod sola retractio per menstruum solitam purgationem sanare non potest. Nam tenebrarum atque caliginis intus natarum ex anathymiasis tetra muliebrium quæ circa locos & lumbos subsistunt; sanatio est in vacuatione liberali eorum naturaliter instituta.

45 *Οἱ δὲ ὑστερικῶν ἀνὺποισι πάσασιν, διχερεῖς· οἱ Δορκάδι.*

Quæ sunt hystericis febre vacuis conuulsiones; faciles: sicut Dorcadi.

HÆSVNT deliciae Hippocraticæ, quarum epulis soli fruuntur & saturantur, quibus discendi studium est ab vno Hippocrate, maluntque ex eius præceptis institutisque, tanquam ex fonte vberissimo, medicinam haurire, quam riuulos consecrari. Est autem hoc positum in more Hippocratis, ut iterum atque iterum ponat idem exemplum, nec tamen scopo eodem: idque *κατὰ τὴν ἀπόφασιν*, & fundamentum rei quam docere instituit. Possem hic ego, perinde ac idoneum nactus locum, meam de stylo Hippocratis opinionem de locis quamplurimis qui apud eum leguntur, lectoribus confirmare. Sed ne longum faciam, longiusve abeam; hoc vnum sufficiat, positum in hac prognosi: cuius lectio hic repetita, quæ fuerat antè scripta & explicata, sicut mouet nauseam sciolis istis qui fastidiosè indicant de scriptis quæ non intelligunt: ita discendi cupidis & studiosis qui ad scopum authoris attendunt, dianctamque ipsius callent; talibus, inquam, iucunda est, gratiofa, & fructus dulcedine leuissima. Scopum igitur ac dianctam authoris, sic aperire consilium est in hac prognosi, cur ea denovo scripta sit, cum suprà iam venerit ad examen philologiæ ac philosophiæ.

Enimvero noster author suprà eò spectauit, dum illa scriberet quæ hic ponuntur, ut fidem faceret redintegrandi ex facili certæ cuiusdam conuulsionis, quæ tantam in ceteris conuulsarum partium afflictionibus, è statu naturæ egressionem ostendit, ut difficillima sit redintegratio, ac ne sperabilis quidem, ubi summa est siccitas ab exhausto. Hic autem ratio est admirabilis quorsum adducta sit denovo illa prognosis, ubi agitur de rebus mulierum. Sanè id habet propositi noster præceptor, ut eo exèplo quod excellentia vincit cetera, naturam & causas aperiat hystericæ passionis quæ apud Hippocratem nomine *ἡστέρις* appellatur: idque *κατὰ τὴν ἀπόφασιν*, cum multa sint vteri pathemata: sed tamen illa communia partium cæterarum, hoc verò vteri proprium, cum muliebribus & genitura, vnde muliebritas quoque est ipsa mulierum. Est autem symptoma hoc conuulsionis hystericæ quod certat ex æquo cum apncea hystERICA, ut non minùs verè & appositè illa vteri passio nominari debeat hystERICA conuulsio, quam apncea hystERICA. Sed eorum symptomatum hystericorum cur ita sint, ratio inòx adducetur. Hic permagni refert studiosorum Hippocratis, obseruare industriam dictatoris, sua edicta suo quaque loco scribentis, & ad varios viri scopos dianctamque attendere, ubi diuersis in locis repetitio est alicuius edicti, quod alibi iam ratum fuit persuasumque omnibus, ac promulgatum. Non enim temerè, sed consultò; atque ut verè, sic appositè, bis tervè promulgantur hæc singularia dictatoris edicta, quæ fundamenta sunt & hypotheses veræ demonstrandarum rerum quas author ipse ad veritatis examen adducit. Et cum prognosìs hæc, theorematibus loco catholici, locum habeat in prorrhethico; nunc *κατὰ τὴν ἀπόφασιν* recensetur in quæstione pathematum hystericorum: sicut iam scripta est suprà in tractatu de conuulsione. Quoniam autem scopum authoris illic attigimus, ac rei propositæ veritatem ostendimus, hic tertè sufficiet, postquam de scopo diximus, ad quem nostra omnis attentio esse debet; sufficiet, inquam, prognosens rationem paucis docere ac veluti *ἀναμνηστικῶς* recensere commentationum nostrarum quæ literis illic mandauimus.

Ergo. **CONVULSIONES**] i. Iniussi partium motus quæ naturaliter iussu nostro ac nostra sponte, non sua, mouentur.

QUÆ FIUNT HYSTERICIS] i. Merito passionis hystericæ, quæ sola est vteri propria inter eas quæ ipsum malè habent contra naturam. Hæc autem hystERICA passio potissimum cadit in virgines atque viduas, ætate iam grandes, quarum scilicet vteri suo, ut ita dicam, genio defraudati, suæ molestiæ sensationem

fensionem impediunt partibus affinitate sibi vel societate coniunctis. Ac cernitur quidem illa sensio
 rei molestæ vtero, in dyspnœa, apnœa, i. inspiratione difficillima, vel eius amotione fugace repente ob-
 orta; nouissimè, in epileptica quadam conuulsione. Hysterici autem genij triplex est omnis defraudatio:
 vna in menstribus ibi cohibitis; altera in exhausto & siti; tertia in genitura orgasmo & inexplata
 libidine, coitu denegato. Vteri vacuati ac sitientis symptomata sic nascuntur, vt visum est præceptorum.
 Primum enim apparet in ægra, spiratio difficillima, penèque dixerim, suffocatio; cum impeditio est
 partium spirabilium, à diaphragmatis oppressione, quam facit hepar ex vtero sibi adiacente, qui eò cur-
 sum inflexit, tanquam ad fontem gratiosi humoris, sitim explere cupiens in muliere gradiore ac vidua,
 nec amplius menstruali, cuique profusior aluus, collapsio intestino recto cum siccitatis & leuitatis ac-
 10 cessione, occasionem dedit vtero, parta locorum amplitudine, conuertendi se & affectandi viam ad il-
 lud *ἐμμένειν* hepar. Hæc suffocatio naturam excitat musculorum ad summam contentionem inspirandi
 & expirandi, quibus molestiam exhibet ipsa doloris à diaphragmate *σπασμὸς*, vnde sympathia est cere-
 bri, & inde conuulsio, quæ vtero restituta in suam sedem, siti explata quiescit. Sed vteri defraudatio
 quæ apnœam inducit, i. spiritus inspirati vacationem, penè miraculo apponi debet. Hic enim respiratio
 est intercepra, quam in plerisque non potis est cernere, nec inspirando, nec expirando. Hoc certè acci-
 dit, perfrigerato cordis calore viuifico, vnde spirandi esse solebat vsus atque necessitas: superstitè ta-
 men in corde, micandi potentia & facultate, qua editur perspiratio vniuersi corporis, quæ tantisper
 sufficit impediendæ caloris extinctioni: sicut in fucis & apibus, cæterisque quæ *ὑμνα* Græci vocant:
 donec apnœa causa, ex vtero sit exclusa; vel eius venenata aura, relicto corde, ad cerebrum sit transmis-
 20 sa, ubi & vnde mouet conuulsionem. Ergo venenata aura quam semen corruptum è locis expirat, in-
 star veneni cuiusdam à morsu phalangij aut serpentis, suo ad cor appulsu, tollit spirandi vsus paulisper,
 vnde apnœa hysterica: indèque ad guttur, strangulationis opinionem facit, ac si adesset illaqueatio: po-
 stremò ad cerebrum, melancholiæ, quæ est in mœrore ac metu, ab opinionis errore; tum etiam con-
 uulsionis epilepticæ parit euentum. Itaque licet, tale parthema hystericum, nominare apnœam vel epi-
 lepsiam hystericam: quæ duo symptomata simul esse non possunt, sicut omnino sunt planèque *αἰσθη-
 τὰ*, conuulsio & exolutio: sed exolutioni à corde succedit, ab eadem causa, in cerebro epilepsia, quam
 facit ipsius proritatio atque contractio ab aura maligna & venenata, quæ ex corrupto semine circa lo-
 cos, sursum effertur. Ea conuulsio, cæterorum instar symptomatum, eò certè adducta est, vt *αἰσθητικὸς*
 deducamur ad cognitionem atque scientiam hystericæ passionis quam seminis infert circa locos cor-
 30 ruptio.

FEBRE VACVIS] Vt omnis tollatur opinio conuulsionis, quam inflammatio vteri secum ad-
 ducit: tum eius quæ venit à febre non symptomatice, qualis est ab vtero inflammato: sed quæ ipsa per
 se existit, ac vulgò dicitur essentialis. Nam conuulsiones sic natæ, faciles illæ non sunt, vt perhibentur
 esse quæ hic ponuntur ab hysterica passione. Causa est in promptu.

FACILES] i. Quæ toleranter feruntur, & facile exoluntur ab vtraque causa fugaci. Nam & citò
 vterus eò remigrat, vnde migravit, ad hepar *ἐμμένειν*, sitis explendæ causa: vnde cita vacatio est con-
 uulsionis enatæ ab vtero, iecori adiacente, propterea que comprimente septum transversum. Tum cau-
 sâ alterius conuulsificæ à venenata aura, quam semen corruptum expirat è locis ad cerebrum; facili-
 40 curatio est, cum semen excernitur: cuius excernendi præsidia nota sunt quæ pudet commemorare. Ta-
 les autem conuulsiones, *εὐχερὲς* nominauit, simili ratione, qua homines dicuntur *εὐχρῆς* aut *δυσχερῆς*,
 quòd eorum vlcera facile aut difficulter sanescunt.

46 *Ἡσιν ἐν ῥίγῃ πύρετος νοσηδὴς γυναικῶν κατὰ τρέχῃ. τῷ δ' ἀν-
 ῥῳ ἐν τούτοις ὁδυνώδης αἰμορροαγικόν.*

50 *Quibus à rigore febris est laboriosa; promouentur muliebria. His
 dolens ceruix, hamorrhagiam ciet.*

EXTREMVM] illud erat de rebus mulierum, vt muliebrum varia inclinatio doceretur, ab iis quæ
 intrâ quidem nascuntur, sed foris apparent. Tum autem quorum morborum sanatio apponi debeat
 muliebrum beneficio, cum hæc ab illis sursum deorsumve ciantur, & quæ illius variæ inclinationis si-
 gna edantur.

ERGO. QVIBVS] Mulieribus foetu vacuis, nimiaque repletis muliebrum abundantia; vt mea opi-
 nio est, ab iis quæ sequuntur.

EX RIGORE] Quem ciet muliebrum suppressorum *τὸ πλεόνος καὶ πάθος*, i. redundantium biliosa ca-
 60 *cachymia* è venis expressa, primum in lumbis rigorifera, & mox in dorso ac in ceruicibus. Quæ certè ri-
 goris concussio non est mulierum gravidarum *ἀπὸ τὸ πλεόνος καὶ πάθος* muliebrum cohibitorum, quòd ea
 vitia procul ab iis arcentur, priuilegio quodam foetus qui crescit in vtero: cuius nutritio & accretio,
 repletionem vasorum esse non finit à menstribus; amplificatio autem caloris natiui, arcet *τὸ πάθος*, o-
 mnémque adeo rigoriferam cacochymiam. Atque huius quidem opinionis meæ sequestrem habeo
 præceptorem, cuius est hoc edictum. *Si purgationes non eant mulieri, nec horror febris vi superueniat, cibi au-* aph. 61. 5.
tem fastidium sit; cogita ipsam habere in vtero. Nam de rigoris natura & causis, dictum est sæpe aliàs.

FEBRIS. EST.] Quæ continenter introrsum monetur: tamen prænuncium habet rigorem, cuius materia intus foras prorepat, forisque suam excitat concussionem, quæ per afflictionem caloris narium, febrem accendit in corde, ipsiusque prima est origo atque occasio. Sic enim veteribus ratum fuit, nunquam rigorem sine febre cieri.

LABORIOSA] Κοπιώδης, i. quæ lassitudinem habet coniunctam: non eam quidem natam vel à labore immodico, vel insueto, vel defueto. Hæc enim lassitudo ἀπὸ αἵματος dicta, sæpe ardentium febrium causa est atque comes; quæ ideo nominantur febres κοπιώδεις. Sed quæ lassitudinem habet coniunctam, sua sponte obortam, & κόπης ἀνήμετης nominatur, πυρετός, ἐκπυώδης, ἢ φλεγμονώδης, i. quam sensio comitatur tensionis, ulceris, inflammationis. Primam quidem edit repletio; alteram cacochymia; tertiam utraque causa. Hic certè sensio est utriusque rei molestia: quia molestiam edit, humorum τὸ πλεονέκος καὶ πᾶσις. Argumenta enim sunt; illius quidem, suppressio muliebrium; huius verò, cacochymia rigorifera è venis expressa. 10

MULIEBRIA PROMOVENTVR] i. Excurrunt ad exitum quem antea non habebant, cohibita; cum esset natura pigrior in excernendo, & vna contumacior materia expurganda. Promouentur autem, rigoris concussione citata, & febris ardore, ad exitum præparata in subtili substantia, qualitate acris, & calida intemperie. Ad utrum autem viam affectant, de more naturaliter instituto; & quia cohibitio est circa locos: tum quia rigoris concussio est circa lumbos, vnde muliebrium ductus ad uterum producantur.

HIS DOLENS CERVIX] Ac si diceret. Quod si à rigore frustra oborto, sursum ad caput menstrua cursum inflectant, ut sæpe fit; indeque cernicis venæ distentæ sint, ei parti dolorificæ: ut sæpe alibi demonstratum est.

HÆMORRHAGIAM CIET] Αἱμορραγίαν, alioqui cephalalgicum & paraphoricum: sicut conditio esse solet eorum qui sursum ad caput feruntur calidorum humorum. Hæc autem hæmorrhagia in vicem subit muliebrium suppressorum, facitque ut mulieres periculo defungantur suppressionis illius. Atque ut lumborum æstu significatio sit purgationis menstruæ per naturalia: sic etiam cernicis dolore, hæmorrhagiæ, i. profuuij sanguinis è naribus, ut hæmorrhagiæ nomen apud Hippocratem usurpatur. 20

TRACTATUS QVARTVS;

DE EXCREMENTIS.

DE VOMITU.



ΜΕΤΟΣ δὲ ὠφελιμώτατος καὶ ἀλυνότατος, ὁ φλέ- CAP. I.
ματος καὶ χολῆς συμμιγμένον ὡς μάλιστα καὶ μὴ
παχὺς κάρτα, μήτε πολὺς ἐμείδω.

1 Vomitus autem, multum habet utilitatis ac securitatis, qui pituitam exhibet accuratè mixtam cum bile; si id quod vomitur, nec valde sit crassum, nec multum.

FINIS ERIT laborum meorum, quos in examine prognoscere Coacarum exegi, postquam absoluero quatuor quæ supersunt disputationes de morborum omnium, quorum historiae sunt in hoc libro, communibus excrementis. Communia sunt excrementa, vomitus, sudores, urinae, deiectiones; quæ in quibusque morbis communiter apparent & fiunt; sicut in quibusdam propriè & appositè, ex quibus illorum morborum cognitio, atque futuri exitus præsentio, tum ipsa curatio comparatur. Nam quæ sunt propria singulorum morborum, omnia in eorum historiis continentur, quorum illa sunt ἐπιφανόμενα: cuiusmodi esse dicuntur sputa quæ in pleuritide ac peripneumonia expurgantur.

Ergo de vomitu hic scribendum. Stylus autem scribendi sic erit. Aio enim; quod vomitus est, eorum quæ intus ventriculum malè habent, à propria ipsius concussione, per os exclusio. Non enim hic vomitus nomen admitto, quod hæmorrhagiae pulmonum tribuitur: sicut in illo Hippocratis. Coac. i. cap. 17. lib. 2. Οσοι ἀφροδὲς αἷμα ἐμέουσι, πόνος μὴ ἔστω κατὰ τὸν θώρακα, ἀπὸ τοῦ πνεύμονος ἐμέουσι. *i. Qui sanguinem vomunt spumantem, omnique carent dolore sub diaphragmate; à pulmone vomunt.* Cernitur quoque illa cōcussio in singultu molesta & irrita, quæ est ventriculi suam molestiam non excludentis: sed frustra in excludendi conatu ac studio laborantis. Est item ventriculi proritatio nauseabunda, quæ tantum screatu finitur, malis ægroti rebus, in febre, quam supra vocavit ἐλξη ἐμπτώδης; vel in prorrhethico, τὴ ἐμπτωδῶς ἐλχόμενα: sed nihil ad hunc locum de vomitu. Nec verò ἀσπία, ἀσπείτια, καρδιαγμός ἢ καρδιαγρία, ἐξουσιὸς ἐμπτώδης, quæ sunt pathemata ventriculi & oris ipsius; pertinent ad naturam vomitus, quam in concussione potenti rerum ventriculo molestarum positam esse diximus: nisi quatenus prædictorum symptomatum curatio suscipitur vomitu atque perficitur. Ergo ventriculi concitatio est ad vomendum, quam facit ipsius oppressio vel proritatio à copia redundante, aut qualitate molesta rerum illarum quæ stagnant in fundo illius. Ac ta-

lem vomitum ciet sua sponte natura partis obsessæ, qui est Hippocrati, ἐμπερὶ ἀντιμέτωπος γιγνόμενος. aph. 1. 2. Atque stagnantium quidem rerum, vel opprimentium, vel proritantium, causa est in aluo indigena, vel etiam aduena. Indigena est, domi nata, præsertim ab iis quæ assumuntur, quorum vitia sunt in qualitate, copia, vtendi modo, & occasione. Nam in picrocholis ἄνω, cum ab inedia, cuius illi sunt impatientes, amaritudo est oris, cardiogmus, alysmus; ea proritatio causam non habet indigenam, vbi est sedes eius: sed aliunde profectam, vbi regnum est bilis, quæ illinc prorepat ad fundum ventriculi, & inde ad stomachum. Quinetiam omnes idæ proritati ventriculi atque stomachi, non raro nascuntur tam ex catarrhī ferini prolapsu è capite, quam ex ichoris bilioli aut nigri humoris appulsu; tū ex visceribus; tum ex venis. Exemplum apponam quod erit instar omnium ex Hippocrate. *Τὰ ἐν ὀσφύϊ ἀλγύματα καρδιαγρικά καὶ αἱμαρροϊκά. i. Dolorifica in lumbis mala; cardialgica & sanguiflua.* Vbi iudicium est, quod ex repletione particulari vasorum insignium quæ adiacent lumbis, quam facit hæmorrhoidum consuetarum vel mēstruorum suppressio, tenue quoddam serum prorepat in ventriculum, & inde ad stomachum, vbi excitat Cardialgiam. Atque hoc symptoma est hominum febre carētium, sicut eadem implicitorum, quibus etiam inde veniunt οἱ ἀλυσμοὶ ναυπώδεις: cum scilicet, vt scribit Galenus, τὸ σῶμα τῆς γαστρὸς, ὑπὸ μαλάρων δέχεται γυμνός, *i. ventriculi orificium, à prauis mordetur humoribus.* Hic certè dubitari non potest, quin aduena sit causa laborum ventriculi, quos edit ipsius proritatio à prauis humoribus, qui è visceribus atque venis illuc prorepunt, vt dictum est.

Ventriculi autem vomiturientis ac vomitoris ab oppressione, par est ac similis ratio quæ dicta est in crethismo. Est enim oppressionis illius causa indigena in iis quæ assumuntur pleniore manu quàm satis est. Sed aduena cernitur in catarrhī prolapsu, cum eius nimia abundantia natat aluus; tum in humorum toto corpore in aluum affluxu, vel è vicinis visceribus & intestinis. Nam ileosis vomitio quidem est oppressionis aduena, chyli occasione non permeantis vltra ieiunum, ileo inflammato; proptereaque illinc remeantis ad aluum. Ac sanè humorum anadrome, vel etiam refluxu ad aluum, vomitiones accidunt critica & symptomaticæ, quarum distinctio in hoc primo capite scribetur. Omnis autem vomitio, vel expurganda aluo, vel vniuersi corporis purgationi; tum vi naturæ aut morbi suscipitur; tum artificio

medici ad imitationem naturæ præscripto. Itaque vomitio quædam erit vniuersalis, quædam verò particularis. Vniuersalis est, quæ vitiosus humor toto corpore, vel è visceribus atque venis, sursum per os vomendo eiicitur. Talis est primùm vomitio critica, quæ febrium finē adfert, significata signis ad tempus & ad speciem crisis illius. Talis est etiā symptomatica, quæ cernitur frequens & pauca humoris prauū, ex qua leuatio nulla est: manet autem perpetua vomendi cupiditas, quæ vomitori par est vomituri- tio. Tum libera & liberalis in cholera quæ vires exoluit, & *συντολές* infert lethales. Sed artificio medici perniciofa est illa vomitio quæ ab elleboro conuulsione mouet lethalem. Illa verò salubritati est cō- modissima quam ciet elleborum eo die quo sibi quis perfregit calcaneum, quando in metu sunt illa symptomata quæ inferuntur ab ecchymosi fracturæ mortifera: nempe conuulsio magnæ chordæ affi- xæ calcaneo, febris acuta, continua, tremorifera, singultuosa, & paraphorica. Ibi enim pharmacia opus est mochlica, & pharmaco vectiario, cuiusmodi est elleborismus quo vitiosus humor, rāquam à machi- na vectis attrahitur in ventriculum, & vomendo excluditur, priusquam ipsum pharmacum ad intesti- norum anfractus peruenerit. Talem præceptor machinam ad nephritidem calculosam adhibuit, tan- quam ad morbum, vt ait Galenus, *μολχέας δόμονον*. Sed hæc exempla sufficiant vniuersalis vomitus, de quo illud superest annotandum; quod vniuersi corporis expurgatio tali perficitur vomitu: sicut & ipsa deiectione, vt Galenus auctor est in aphorismis, ex mente authoris. Tum illud venit in mentem; quod vniuersali vomitu solū æstate, cum opus est, vtrendum præscripserit summus præceptor his verbis. *Φαρμακύνει ἥρεος μὲ, πᾶς ἄνω μᾶλλον χυμῶτος δὲ, πᾶς κάτω. i. Purgare, æstate quidem, superiorem aluum; hyeme, infe- riorē. Et. Τοὺς ἰσχυροὺς καὶ εὐμεταίως, αὐτὸν φαρμακύνει ὑποστομωμένους, χυμῶτα. i. Graciles & faciliē vomentes, supra pur- gare, præterquam hyeme. Sed præceptoris consilium est; vt pituitæ vomitus hyeme cicatur. Quod certè 20 pertinet ad vomitum particularem, quo interdixit æstate: nisi cum alui repletio est, quam *πλησμονὴ* no- minauit. Hyeme autem ter mense vomendum edixit iis qui sunt humidiores: sicut bis aliis siccioribus. Nec verò ad *πλησμονὴν*, vomendi consilium est hyeme, præceptoris: sed ad pituitam hybernā, cuius ni- mia abundantia natat aluus: tamen si ad liberum faciliēque vomitum, variorum ciborum satietatem præscribit his verbis. *Χρέας δὲ καὶ πᾶσιν ἐμέτισσι τὸς μὲ ὑπερτέροις πρὶς τοῦ μήντος τὸς δὲ ὑποτέροις δις, κατὰ σιτίων παραδα- πνῶν. Ex quibus efficitur; vomitum particularem esse, cum vel pituita hyeme, vel eorum quæ assumun- tur satietas per æstatem vomendo leuatur. Nam bilis porraceæ vomitus, vt ea indigenam habet causā in aluo, vel aduenam: sic erit particularis vel vniuersalis. Indigenæ autem causæ vel aduenæ distinctio sic est apud Galenum. Nascitur, inquit, bilis porracea in aluo ipsa, propter eorum quæ assumuntur crudita- tem, vt olerum, brassicā, betæ, cæparum. Certum est etiam quod eadem bilis, tamen si nihil eiusmodi as- sumptum fuerit, tamē febris merito, morbive alterius in vasis enascitur, & inde ad superā vel ad inferam aluum confluit. Erit igitur bilis porraceæ in aluo natæ; vomitus particularis; eius verò quæ in aluum confluit, vniuersalis. Ille autem vomitus quem ciet proritatio æruginosæ bilis in aluo, quam genuit sæ- uæ nephritidis cruciatus, cum impotentia dormiendi atque vigiliis; tamen aduenam habet causā vo- mendi, sicut indigenam à corruptione ciborum; tamen videretur quodammodo *ἐπαμφωπέζην*. Nunc ad examē prognosticos veniamus.**

comment. ad
sent. 5. part. 1.
lib. 6. Epid.
comment. ad
aph. 1. 1. &
lib. 4.
aph. 4. 4.
aph. 6. 4.
lib. de dicta
idiot.
lib. 3. πρὶς
διούτων.

progn. 32.
lib. 2.

VOMITVS AUTEM] I. Eorum quæ sunt in aluo inutilia & molesta, per os exclusio: siue assum- pta sint plenior manu; siue nauseabunda; siue in aluo corrupta; vel ex aluo egressa, postliminio re- meantia, cum vltra ieiunium permeare non possint. Tum si quæ vomitu excluduntur, è capite sint illa- ipsa, vel è visceribus atque venis in aluum transmissa, aut ed attracta elleborismo. Sed tamen hic, vomitus 40 nomen tantum apponitur illis humoribus, vnde nascuntur febres; cum scilicet eorum affluxu vel critico, vel periodico, vel symptomatico, ventriculi proritati concussio est ad vomendum. Ac primùm de vo- mitu salutari & critico sancitā lex est in hac prognosi, de more institutōque Hippocratis, vt ad illius normam, symptomatici omnis egressio reuocetur. Est autem huiusmodi.

VOMITVS MULTVM HABET UTILITATIS] *ὑπερμετῶς*, i. vtilissimus, quod inde sit & ostendatur corporis è natura egressi redintegratio, morbique infractio; proptereaquæ numeros exple- omnes salubritatis, cum illi adiicitur quod in lege auctor apposuit.

AC MULTVM SECVRITATIS] *ἀλυπῶς*, i. qui caret omni molestia, aut nihil omnino mole- stia & offensionis secum adfert, nec post se relinquit illis in partibus vnde, quod, & quā exitum habet humor. Sed contrā *ὑμφορῶς* καὶ εὐφόρος φέρουσιν, i. simul confert, & ipsum alacriter ferunt ægri. Et verò de tali 50 vomitu appositè hic scribendum, quod de pepasmo verè scripsit præceptor his verbis. *Ταχύτητα κρίσεως & ἀσφάλειαν ὑγίειν σημαίνει. i. Celeritatem crisis & securitatem ostendit salus. Atque hic, de more authoris, prima vomitus commendatio est in eorum vacuitate quæ contra naturam sunt, & ἀσυμβεβηκότα vocantur: mox in eorum præsentia quæ sunt τὰ ὑπαρχόντα καὶ φάνη, i. quæ merito ac lege naturæ apparent. Τὰ ἀσυμβεβηκότα spectantur in eo quod posuit *ἐμμεναι ἀλυπῶς*, i. omnis experient molestia, vel, cum securitate salubrem. Tum verò in iis quæ apponuntur. SI ID QVOD VOMITVR, NON VADESIT CRASSVM, NEC MULTVM. Quamuis autem hic vomitus commendatus tantum sit in ea voce, quæ omnis molestia vacuitas continetur, vnde summa illius vtilitas declaratur, vt certè omnino est, cum minimè nocet cor- pori: tamen consultò visum est τὴν ἀλυπῶσιν huius, cum eo coniungere quod in prognostico legitur, ὑπερμετῶς: vt scilicet illud conuenienter dicatur *ὅτι ἂν ἀσυμβεβηκότων*; sicut hoc *ὅτι ἂν ὑπαρχόντων καὶ φάνη*. Est enim diuersa ratio vtilitatis & securitatis. Nec semper in omni crisi tantum est securitatis, quan- tum est prima specie vtilitatis. Nam criticorum abscessuum non semper est certa crisis, vt eorum qui sub auribus vel in crure à peripneumonia nascuntur.*

aph. 1. 1.
2. Epid. part. 2.

QVI PITUITAM EXHIBET ACCVRATE MIXTAM CVM BILE] Hoc pertinet ad τὰ ὑπαρχόντα λόγῳ τῆς φύσεως, i. ad ea quæ insunt quæque apparent in vomitu, lege naturæ, ac merito eius, non malefic- cio morbis

cio morbi; ut mox dicitur in cæteris. Atque hoc certum est argumentum vomitus qui cietur duce natura, cuius virtute primum est domita feritas humoris morbifici. Est enim pepasmi parens natura: sicut & critica vacuationis dux eadem optima. Eorum igitur quæ ad salutem & ad securitatem vomuntur, conditio esse debet naturaliter constituta, ut dictum est, in colore, substantia, & mixtione; ut scilicet bilis *αῖμα*, i. pallida, vel minus flava quam fuit, appareat, cui toto infusa sit corpore pituita, unde dilutior facta est. Nam bilis pepasmo *πῶς φλεγματίζεται*, i. quodammodo pituitescit. Tum verò in superam aluum affusa, sit particeps eius humoris qui regnat in alno, videlicet pituita, quando non ita exaruit. Exquisita autem mixtio pituitæ & bilis, integritatem partis ostendit, ubi miscentur, cum pari coniunctam virtute caloris nativi, cuius propria est coctio atque mixtio. Talem commendat *πῶς ἀδύρατον* thoracis atque pulmonum, si flauum sputo exactè permixtum sit. Nam excrementa mera, semper sunt praua. Huiusmodi autem cernuntur vel aquosi sui humoris, vel alienæ mixtionis expertia: idque vel ab incendio quo confla-
 10 grant & exarescunt, vel à frigore quo concretescunt. Ex quibus efficitur, ut signo appareant prauatum affectionum quæ sunt in ardore aut frigore, vel in locorum vitio ubi nascuntur, aut quæ feruntur ad exitum. Sic enim natura comparatum est ut quacunquæ ad exitum ducuntur humores, non inde abeant insalutato, ut dici solet, hospite; partiumque illarum beneficio, meliores; aut maleficio, peiores reddantur.

Coac. 13. cap. 16 lib. 1. aph. 6. & 23. 7.

progn. 44. lib. 2.

SI ID QUOD VOMITUR, NEC VALDE SIT CRASSVM, NEC VLTVM] Ut bene res eant à vomitu, eiusmodi esse debet in iis quæ vomuntur, ut careant omni vitio: quamuis in laude sint *ἐν τῷ ἀπαρρότων*, calore ac mixtione naturaliter præditorum. Non enim minor est commendatio vitiorum *ἀσυνβεβηκότων*, quam laudabilium *ὑπαρρότων*. Tamen si vitia quæ hinc ponuntur, quorum vacatio esse debet in vomitu naturali, non sint omnino *ἀσύνετα*: sicut ea quæ toto genere praua sunt; propter ea quæ *ἐκ τῶν* prauarum affectionum. Ergo ut vomitus omni ex parte sit, qualem esse oportet, ac nihil omnino vitij adiciatur humori vomendo, quod exitus libertatem impediat, molestiam ve parti exhibeat ipso vomendi modo: sanè id quod vomitur, valde crassum esse non debet à frigore aut calore; quia signo non bono adiicitur causa non bona in labore vomendi: nec multum etiam; quia ventriculi crebra concussio, quæ sæpe & parum, aut sæpe & multum per os reicitur, multa sibi & ægro infert incommoda, illinc molestiam & inflammationem, hinc verò infirmitatem. Ex quibus apparet; quòd ibi demum ex-
 20 plentur numeri omnes vomendi ad sanitatem, ubi vomuntur *ὡς αὖ*, i. qualia & sicut decet: quod est, ut alibi annorauit præceptor, *κρίσιμος καὶ καλός*. Nam ut cõcedam, *κρίσιμος* quidem vomitus, cum pituita est accuratè mixta cum bile: tamè non dixerim vomitus *καλός*, si id quod vomitur, sit valde crassum & multum.

aph. 1. 2.

lib. 2. acut.

2 Τὰ δὲ ἀκρύτερα τῶν ἐμμετρῶν κακίω.

Sed ea quæ vomuntur meraciora; peiora.

OMNIS egressio quæ est in vomitu, qualis & quanta sit, intelligitur, ad examen adducta superioris prognoscens: ubi est norma & præscriptio *τῶν ὑπαρρότων λόγῳ τῆς φύσεως*, i. eorum quæ naturaliter insunt in vomitu, bonis ægroti rebus, & longè absunt ab iis quæ maleficio morbi apparent. Quoniam autem vomitus commendatio maior est, quando in præsentia *τῶν ὑπαρρότων*, cernuntur quoque *τὰ ἀσυνβεβηκότα*, i. eorum absentia quæ in malis ducuntur; visum est præceptoris singula ponere ad examinandum, ut magis aut minùs absunt ab illa norma quæ primum præscripta est. Prima igitur ac summa vomitus commendatio est, cum in præsentia rerum ad salutem experendarum, quales descriptæ sunt, vacuitas est rerum alienarum. Res alienæ sunt hæc, magis aut minùs. Ac prima omnium quæ apparet cum desiderio eius quam posuit mixtionis exactæ. Est autem huiusmodi atque his verbis conscripta.

SED EA QUÆ SUNT MERACIORA] i. Quæ à calore aut frigore sunt crassiora quam decet: quia nimis cocta, vel nimis exhausta: vel quæ sunt impermixta partium extremitatis unde ducuntur, & quæ feruntur ad exitum. Tamen si meliora sunt verba *τῶν ἀκρύτερων*, i. meraciorum, quam *ἀπλῶς ἀκρότων*, i. simpliciter meracorum. Illa enim, quantum coniicio, respectu eorum dicuntur quæ author voluit esse permixta *ὡς μέλιστα*, i. quantum potius est, siue *ἀκερβῶς*, i. *ἐκαστὸν*. Ut certè minùs in vitio sint, ac minùs ægrum periculose haberi ostendant, quam ea quæ maleficio morbi sunt mera, ut bilis vitellina, æruginosa, nigra. Hoc igitur spectat author his verbis, ut doceat illa quæ vomitu excluduntur, non bene permixta; quamuis non ita sint sua specie aliena: tamen minus habere utilitatis ac securitatis quam prædicta.

IN IIS QUÆ VOMUNTUR] Non quidem assumpra, neque intestini vitio remeantia: sed quorum est aduena causa è visceribus atque venis; quemadmodum pituita in aluo indigena.

PEIORA] Comparatiuè huiusmodi sunt, partim quòd minùs integræ sint res naturæ unde ducuntur, partim quòd ægrius illa vomantur. Nam experenda mixtio quæ non est in vomitu, ut illa in vitio esse ostendit unde cietur vomitus: ita ventriculo molestiam infert maiorem in concutiendo se ad vomendum. Naturæ vitia, unde mixtionis expertia sunt, aut minùs accusare mixta quæ vomuntur; omnia
 30 sunt à nobis exposita superiore prognosi, ac denuo exponuntur in singulis. Molestia autem ventriculi dum ægrè vomit, sic nota est omnibus, omniæque quæ secum adfert incommoda; ut nemo sit omnium quem hæc nescire persuasum habeam.

3 Περσοςδης δ' ἐμετῶ, καὶ μέλας, καὶ πέλυτος· πομπόν.

Vomitibus autem porraceis, niger, ac liuidus quoque; pestiferus.

IN HAC PROGNOSESI descriptio est χολῆς ἀκέραις, i. *mera bilis*, quæ inter cætera bilis genera, hoc vitio eximia est. Prima quidem cernitur in porraceo vomitu; secunda in nigro vel atrabilario, quæ sunt eiusmodi ex ardore quo exaruerunt, & vacuæ omni sero, flauum colorem mutauerunt in nigrum aut viridem. Nam vomitu liuido humor apparet fucatus, partium corruptarum vitio vnde vomitur. Ratio autem cur ita sint omnes, & quorsum vomendo appareant; exponitur in examine singulorum.

Ergo. VOMITVS AVTEM] Patet facta egressione vomitus ab eo qui bellè fit atque bene, quod est κρίσιμος καὶ καλός, & ea quidem quæ est in desiderio mixtionis exactæ; tamen si materia non est omnino praua, sed paulò peior quam sit ex vsu naturæ, vt dictum est; loco à nobis exigitur ille vomitus toto genere contra naturam, qui & feritare humoris qui vomitur, & viriusque mixtionis vacuitate, vt summa ostendit morbi vnde nascitur maleficia: sic ille vomendo, multis incommodis auget ægrotum. Sic autem apparet.

PORRACEVS] Similiter viridis vt porri color in foliis, non in capite, nec in caule. Nec verò ille humor cruditate virescat eorum quæ assumuntur in aluo, vt in tryborum, betarum, & brassicarum: sed bilis vitio confluentis in aluum è visceribus atque venis. Omnium enim colorum viridium qui spectantur in vomitu, deiectionibus, atque in lingua; si nulla sit excusatio rerum viridium quæ assumuntur; omnium, in quâ, materialis causa est flaua bilis, quam genuit ipsum τὸ πικρὸν, i. *pingue*; vt visum est præcepto cum ait. Γλῶσσαι χλωραὶ χολώδες, τὸ δὲ χολώδες, ἀπὸ πικρῶς. i. *Lingua virides; biliosæ: quod autem biliosum est, venit à pingui*: quemadmodum idem scripsit his verbis. Καὶ οἱ τοὶ μὲν πικρὸν, χολὰ ἔχουσι. i. *Quibus est ipsum pingue; iis etiam bilis flaua*. Vbi Galenus auctor est; nomen illud, *pingue*, non solum complecti quæ sunt reapse pingua & adiposa, verum etiam dulcia omnia, sicut mel, sapam, & saccharum. Sed bilis porraceæ causa effectrix quænam sit; planè ostendunt hæc verba Galeni. Αὐτὸς μὲν οὖν ὁ ἰώδης χυμὸς; αὐτὸ δὲ ἐμέτων, αὐτὸ δὲ τῆς κάτω γαστρὸς, αὐτὸ δὲ πνευμάτων, αὐτὸ δὲ ἔρῳ ἐπιφαινέται· πικρὸν γὰρ χυμὸς ἐξ ἐμφύτων, δηλώσι, καὶ τὸ νόσημα θερμὸν ἐστὶ καὶ ἔρῳν ἰσχυρὸς. i. *Humor igitur æruginosus, siue is vomitu, siue per aluum inferam, siue per sputa, siue per urinas transmissus apparet; citò denunciat, & eum vnde gignitur succum siue humorem, & morbum ipsum de quo excluditur, insigniter esse calidum*. Sed in re incerta foci ac domicilij eius humoris, & vbi gignitur, & vnde transmittitur; an scilicet nulla insigni parte affecta, an contra cum alicuius offensione, quam fortè occupat inflammatio erysipelatoza; cognitio atque distinctio comparatur ex iis quæ cum ea bile symptomata sunt coniuncta. Sic hepate inflammato, nascitur ab ea bile singultus. Similiter cum ea spumans cum tussi expuitur, nec vllus est dolor sub diaphragmate; in pulmonibus focum habet gignendi & excludendi sui. Tum quæ in sæuæ nephritidis cruciatu ad vomendum cietur; focum illa quidem denunciat vnde in aluum prorepat, causamque aperit vnde tam citò gignitur, quæ est doloris nephritici multum adaucti continuata line remissione acerbitas quam vigilie comitantur; vnde corruptus sanguis in eam bilem mutatur, appareretque vomitus æruginosus è venis, qui antè fuerat pituitosus ex aluo. Nam in phrenitide quam genuit bilis flaua in cerebro & membranis, æruginosæ bilis vomitio est cum in propinquo est mortifera conuulsio ab infania, in quam phrenitidis transitus esse solet: sicut flauæ bilis in viridem, quam cerebrum exprimit in partem sibi maximè consocialem atque gentilem, videlicet in os ventriculi νεφρωδὲς πικρὸν, & inde ad fundum eius vnde vomendo reiecitur. Atque vt vomitu æruginosæ bilis à cerebro, denunciat feritas humoris phrenitici, summæque afflictio partis incendio conflagrantis, conuulsionem mortiferam mox edituræ: sic in acuta febre cum circa initia vomitio est bilis æruginosæ; primum illa phrenitidis, mox intolerabilis & summæ infaniæ prænuntiatio esse solet, vt in Philista, de quo sic legimus apud Hippocratem. Πρώτῃ ἡμερᾷ χολώδεις οὐλίαι ἔχουσι πρῶτον· μετὰ δὲ ἰώδεις πλείονα. i. *Primo die vomuit biliosa primum flaua & pauca, mox æruginosa plura*. Deinde subiunxit. Δευτέρῃ ἔξυμαίνῃ πάλιν μέσσην ἡμέραν. i. *Secundo è potestate mentis exiuit, circa medium diei: cum eo die obsidisset*. De qua historia solenne est illud prorrheticum, ac theorema catholicum. Τὰ ἐν κεφαλῇ γίνονται ἰώδεια ἐμέσματα, μετὰ κωφώσεως ἀχρηστώδεια καὶ ἐμμένα. i. *In cephalalgia æruginosi vomitus, cum vigiliis & surditate, summam insaniam mox affuturam ostendunt*. In quo prorrhethico admirabilis est Galeni doctrina de prouentu bilis æruginosæ, vnde scilicet illa succrescat: tum de symptomatis quæ illius naturam sequuntur, & partium obsecrarum incendio conflagrantium. Sed tamen Galeni iudicio stare non possum, qui eam bilem natam in cerebro, & inde ad ventriculum confluentem, vomitu sic excludi, vt in phreniticis arbitrat. Quod vt concedam verum esse, aucupio dictionum prorrhethici: tamen si eius relatio sit, vt esse debet, ad historiam de Philista, vnde collectum est & excerptum, de more Hippocratis sua edicta sic conscribentis; credibile est potius per anadromen bilis in superam aluum è venis & visceribus, vbi sunt febres acutæ, vomitionem illam cieri ὡς σπυλλισμα, tum per ἐπιρροίαν morbi & bilis ad cerebrum, insaniam excitari. Hoc tantum attraham, cætera non exponam quæ illam mihi opinionem fecerunt. Sed satis iam de bile porracea vel æruginosa, quæque sit illius causa & focus. Pergamus ad reliqua quæ supersunt examinanda in hac prognosi, de quaestione χολῆς ἀκέραις, i. *mera bilis*. Hæc autem supersunt.

lib. 2. progn.

VOMITVS NIGER] Vbi tam mera est bilis, vt nigra euaserit: sicut de sputo scriptum est in prognosticis apud Hippocratem, cuius verba hæc sunt. Εἰ δὲ ὡς ὕψους ἀκέραιον, ὥστε καὶ μέλαν φαίνεται· δεινότερον ὅτι τὸν ἐκείνῳ. i. *Sputum ita merum, vt nigrum appareat; peius est multò quàm illa*. Sunt autem illa, quæ paulò antè posuit,

re posuit, videlicet flauum merum, quod est periculofum; item rotundum glutinosum & album, quod nihil habet vtilitatis: praeterea quod valde est viride atque spumans. Est igitur niger vomitus, multum merus, qui ea qualitate ceteros omnes praecedat, ac viridem etiam viriditate saturum, cuiusmodi est *iodn*, qui ea saturitate admodum metus, vincit portaceum. Ac vomitus ille niger est atræ bilis, quam ex flaua genuit æruginosa, cuius in atram facilis mutatio est, teste Philista, qui è potestate mentis exiuit maleficio atræ bilis, posttridie quam *iodn*, i. æruginosam vomuit. Nam paulo ante, paucam vomuerat flauam. Mutatio autem bilis flauæ in viridem, & huius in atram, fit à febrili ardore, quo illæ conflagrant. Sed huius quoque origo est à nigro humore quem melancholicum vocant, nec biliosum tamen, perustum. Hic dum melancholicus erat, nec à se mutatus, nihil habebat feritatis atrabiliaræ. Non enim particeps erat, sed omnino expers qualitarum maleficarum quæ sunt in atra bile, quæ & *χολή μέλας* nominatur. aph. 32. 4.

Sunt autem, *τὸ σπυμὸν*, *τὸ ὀξέδες*, *καὶ τὸ διαβρωτικόν*, i. acris, acidum, & erodens. Et verò atra bilis ex nigro humore nata, feritate est illi inferior quam genuit æruginosa bilis: nec tam illius sunt acres morsus, nec tam symptomata sua quam huius quæ dysenteriam mouet lethalem, tum insanabilem & implacabilem cancrum edit, atque *μασίας*, i. insaniam excitat, ferocitate intolerabilem. Sed cum atræ bilis duplex omnino sit materialis causa, ex Hippocrate & Galeno; ineptiæ sunt profectò eorum qui sustinent ac defendunt ipsam gigni etiam ex pituita crassa. Sufficiet autem locum adducere quo atræ bilis distinctio continetur, tam in pronentu, quam in atrocitate ipsius, ut est illius origo vel ex bile viridi & æruginosa, vel ex nigro humore qui fæx est sanguinis, & melancholicus nominatur. Verba Galeni hæc sunt: *Meminisse oportet earum quæ alibi sunt adductæ distinctionum de atra bile. Nam una quidem gignitur bile flaua multum affa* ad aph. 32. 6.

sive perusta, quæ numeris omnibus est atrocissima. Altera verò sanguinis, ut ita dicam, facce; quæ ut illa quidem crassior est consistentia: sic multum ab ea recedit pernecie qualitaris. Verumenimvero vomitus niger in hac prognosi positus, non solum est atræ bilis: sed melancholici quoque humoris nihil à sanguinis facce mutati. Atque similiter ut deiectione, sic etiam vomitu, varietas illa cernitur atræ bilis & nigri humoris vel melancholici. Qualis est etiam sanguis ipse, qui concretus in aluo, non in pulmone; spumans vomendo eiicitur. Ac nigrarum quidem deiectionum percepta suo quæque loco scribentur, cum ad earum historiam ventum erit. De vomitu nunc scribendum nigri sanguinis & melancholici. De nigro sanguine qui vomendo reicitur, illud perceptum est. *Αἷμα αἰώρηται, ὁκιοὶ αὐτῷ κακόν. καὶ οἱ ἀγρόν τε μέλας καὶ ποικίλον.* aph. 35. 4.

i. Sanguis, cuiusmodi tandem u fuerit, qui sursum, per os, redditur (nares enim excipio) nihil habet securitatis: profuerit autem nigrum ferri deorsum, i. per hæmorrhoidas. Quod est eiusmodi ac si diceret. Nulla est bona sanguinis per os excretio, nisi fortasse cohibitis mēstruis, eius vomitio est per vasa pulmonum; non per ventriculum, quæ semper mala est atque nigra: sicut eiusdem deiectio, si tantum exceperis dysenteriam *αἷμα τὸ δν*. Nigri enim sanguinis deorsum transmissi, vnica commendatio est eius qui per hæmorrhoidas expurgatur. Nullius autem vacuatio in bonis ducenda: nisi eius qui tantum cietur è venis per nares aut per hæmorrhoidas. Nam muliebrium salutaris est fluxus per uterum, priuilegio quodam naturæ atque coloris mulierum, ex Dei edicto. De melancholico autem vomitu, qui est ipsius facis, idem iudicium quod fuit Hippocratis de nigra deiectione, cum vtriusque causa sit eadem atque idea. Sic enim Galenò visum est ad aphorismum modò adductum. Ac melancholici quidem vomitus hoc mihi exemplum sufficiet instar omnium quæ multa sunt apud Hippocratem. *Frequens è lumbis ad cor anadrome quæ causa est febris agri perhorrescentis, ac tenuis & aquosa vomitus, nec sue mentis; à vomitu nigro mortifera est.* Ibi Galenus author est; quod ut praelicimus in phreniticis apparet ad vomitum; perfrigeratio autem nigrum edit: sic & hoc loco, aquosa tenuis è lumbis ad fundum ventriculi conflentia; vomitibus quidem crebra sunt, quorum ad nigra est transitus, cum perhorrescit æger voce captus, nec lux mentis. Nam ut concedam, hunc vomitum posse cieri ab atra bile, orta ex flaua primum, mox viridi: tamè dubitari non potest quin tanta sit hepatis exolutio, ut faciem reponat pro sanguine, quæ sursum deorsumque per os & inferam aluum transmittitur. Nam uti iam posui, vomitus melancholici, & nigratum deiectionum eadem planè materia est, idemque humor ab iisdem fontibus principia causasque ducens, i. ab hepate & liene, quorum vitia in talibus excrementis cernuntur.

AC LIVIDVS QVOQVE Qui suo liuore liuidam quoque partem ostendit, unde vel affluit, vel ubi excipitur. Liuet quidem pars omnis, perfrigerata; perfrigeratur autem, emortua: postremò emortetur, per extinctionem viuacitatis in vitali principio; tum per inopiam viuifici nectaris in corde exhausti. Non enim hic liuor est, quem edit *ταυσιωσις ἢ ἐκ χύμους* in parte aliqua suggillata: sed ipsa *τένερσις* patium emortuarum. Est autem *ἡ σπύρροσις*, i. effluencia, semper omnino similis subiectæ substantiæ.

PESTIFERVS i. Præfusus: & ea quidem præditus prauitate, ut accessione signorum, alioqui optimorum, de suo iure, quod habet in ægri perneciem, nihil omnino, aut certè parum remittat. Fundamentum autem perneciei quam praua denunciant excrementa, sic positum legitur à Galenò; *ὅτι αἱ μαζαὶ καὶ κίτρινες, μαζοειδὲς διακρίων εἰσι σημεῖα*, i. quod vacuationes prauæ apparent de prauis affectionibus, quatum illa certa sunt signa.

60 4. *Εἰ δὲ καὶ πάντα τὰ χρώματα ὁ αὐτὸς ἐμὲς ἢ δὴ κέρτα ὀλέθριον.*

Sin autem colores omnes idem vomendo exhibeat; valde id pridem pestiferum.

Epid. part. 5.

VOMITVM quibus omnes prædicti colores, aut etiam plures pravi veniunt in conspectum; non est obscura nec ita difficilis ratio: cum ad exitium sint ita præcipites, vt ab authore positum est in hac prognosi, & in prognostico 41. lib. 2. Cum enim signorum syllogisticorum ea sit insita & instituta conditio, vt ea semper subesse ostendant quæ indicantur ab illis; planè efficitur, vt cum perspecta sit causa cuiuslibet prauitatis vomituum prædictorum, quæ in colore cuiusque apparet; quod plures in vomitu exhibentur pravi colores, eò plures etiam denuncientur prauæ affectiones partium colores illos edentium. Quod autem plures partes in vitio sunt; eò res ægri peius cunt & propius absunt à morte. Actalis formula prædicendi est aphorismo 21. lib. 4. Οὐδὲν αὐτὸ χρώματι ποτὶ πέρας ἢ μάλλον κακόν. i. Quod plures colores fuerint; maius malum.

5 Τάχιστον δὲ θάνατον σημαίνει ὁ πέλινος ἢ κακῶδης.

Citissimam verò mortem denunciat liuidus & fædi odoris.

SANE CITISSIMA venit & in propinquo mors est, quando putredini fætidæ, morbo satæ atque morbificæ, adicitur significatio partium emortuarum, quarum officio vitam carere non potis est: quemadmodum scire licet ex vomitu liuido & fædo, de quo ita scripsit Galenus. Σηπεδὸνα γὰρ εἰδέναι μετὰ νεκρώσεως ὁ πύλινος, ὡς γὰρ μαμμήματα τῶν περὶ θνήσκοντων. i. Putredinem hic cum extinctione indicat, si antedictorum meminimus.

6 Ἐστὶ δὲ θανάσιμος, ὁ ἐρυθρὸς ἐμέτης, καὶ μάλιστα εἰ μὴ δυνάμει ἐμέοιτο.

Est autem lethalis ruber vomitus; maximèque si agrè vomatur.

HIC PRIMVM de vomitu rubro cuiusmodi sit: tum autem quare vomatur mortiferè, vt visum est præceptor, quæstio in iudicium sic deducenda.

Hist. 1. Epid.

EST AUTEM LETHALIS RUBER VOMITVS] i. Periculosè vomitur, præter alia vomituum genera quæ maleficio morbi mera vomuntur; propterea quæ omnia periculosè habent ægros, quædam mortiferè; vt suprà ostendimus. Hic autem vomitus an sit merus, distinctione ruboris, difficultas omnis tollitur. Nam si rubor ille est bilis è flaua sic coloratæ: profectò est merus, vtræque conditione; tum ea quæ cernitur idias ἀμικτὸς ὑπερπύλινος ὑδατοδύς; tum ea qua omni mixtione caret alieni humoris. Atqui iam posita & explicata sunt omnes meræ bilis idæ in vomitu flauo, porraceo, atque nigro. Atque vt in porraceo nota est æruginosi; in nigro, atrabilarij & melancholici: sic rubri & vitellini, in eximie flauo. Sin autem ruber color est sanguinis; non est cur talis vomitus, meri opinionè faciat. Sanguis enim merus est niger, ab eo quod ipsum suo naturali sero exhausti, videlicet ab incendio quo cōflagrauit, vt in Philisci sanguine annotauit Galenus, quæ narrat Hippocrates, meri stillasse & paucū è naribus. Et verò hic denuo meros vomitus memorare, est ἀνών & indignum Hippocratis maiestate. Ergo non est dubium quin ruber hic vomitus dicatur de sanguine qui vomendo excluditur. Sed cum rubri vomitus atque purpurei, tam de pulmonibus exclusio sit, quàm de ventriculo; sanè non aliò referri debet quàm ad ventriculum, de cuius concussione ad ea vomenda quæ ipsi malè habent, instituta hæc tractatio est. Sed vtrum indigena sit res ventriculi, sanguis ille ruber qui vomitur, an verò advena; planum faciet ipsa coloris distinctio atque substantiæ. Nam ruber & liquidus, de aluo exprimitur: at niger σφαιρώδης, per aluum transmittitur. Non enim vel ad punctum temporis manet in aluo, sine concretionem, & rubri coloris in nigrum mutationem, sanguis qui eò confluit: quia non habet φύσιν, nisi vbi habet ἀσφαιρωτώ naturaliter institutam & consuetam. Scitum est illud. Si sanguis in ventrem confluat; ipsum corrumpi necesse est. Atque idem sanguis in amplitudine alui citò concreuit atque grumescit: unde cita substantiæ & coloris, vt modò dixi, mutatio est. Itaque ruber hic vomitus, quia est sanguinis nihil à se mutati, opinionem facit apertæ vel erosæ venæ in fundo ventriculi, vel in ore ipsius. Nam ruptionis nulla suspicio esse debet, sicut nulla fuit Hippocrati de vesica, cum sanguis meiedo redidit. τὸ τοῦτο μαρτυρεῖ, i. de impossibilitate, quem scribit rupta in renibus venula sic effundi, ea ratione adductus quam ponit Galenus appositè in commentario, quod sanguis communi officio transmittatur per renes: in vesica autem, tantum partis proprio excipitur, nutritionis ergo: tum, quod venulæ in vesica similiter non sunt nudæ atque suspensæ, vt in renibus; sed illi parti affixæ. Quæ omnis ratio ruptionis venarum in vesica non admittendæ, pariter similiterque locum habet in aluo, cuius officio tantum proprio venæ dicatæ sunt, ibique affixæ, non autem suspensæ. Plurimum autem facit ad opinionem delendam ex animo, ruptæ venæ in aluo, cum inde ruber est vomitus; quod liberè non vomatur, nec liberaliter. Id enim denunciat quod adiecit calamitati vomitus rubri, MAXIMEQUE SI AGRE VOMATUR. Nam agrà vomitio nunquam est ruptæ venæ, quam ferè semper facit erosæ, rariùs autem aperta. Et quoniam agrè vomitionis quæ vomitum edit rubrum, causa est venularum erosio; venit in mentem illius qui nobilissimum quendam virum mortiferè habuit & ad exitium præcipitavit, ventriculo

riticulo laniato à temeraria medicina bis terve exhibita ad fialissimum pronocandum, curationis ergo virulentia venenata luis ventres falso creditur, aut certe quo iure quaque iniuria.

MAXIMEQUE SI ÆGRE VOMATUR] Est enim vomitionis ægræ symptomta non minùs graue, quàm ipsa est causæ vnde tam ægrè cietur, vt nuper diximus, ac multò antè ad illam prognosin. Diuturna in febre, nauseabunda proritatio quæ in screatum desinit; pessimè habet ægrum, signo & causâ.

Coacc. 8.
lib. 1.

7 Οἱ ἀσώδεις ἀνέμετῶς παροξυσμοὶ κακόν· καὶ ὁ ἀπαραισθη-
μοὶ ἀνέμετῶς.

Qui cum fastidio sine nausea exacerbantur; malo sunt loco. Tum lacesiti nausea sine vomitu.

DIORISMI huius prognoscos difficilior mihi comparatio est & explicatio, quàm scopi authoris. Ac facere certè non possum quin vel à Galeno dissentiam huius prognoscos enarratore atque interprete fidelissimo; vel Scholz Coz magistros accusem qui eam minùs distinctè, minùsque appositè posuerunt, quàm de sententia præceptoris qui eam conscripsit. Enimuero scopus hic fuit eorum qui hanc prognosin ex Hippocrate adduxerunt; vt patefacta omni quâlitate praua merorum vomituum, calamitosa vis ægræ vel irritæ contentiois vomendi quam infert proritatio nauseabunda prauis humoris, proposito familiari exemplo de more institutòque Hippocratis, instar omnium quæ sunt huiusmodi, poneretur. Sed quàm bene illi ad scopum intenderint, vel aberrarint ab illo; planum faciet enarratio huius prognoscos, quam sic aggredior.

QUI CVM FASTIDIO] i. Qui fastidio efferuntur omnium ἀεσπερομένῶν, i. eorum quæ conuenienter adhibentur, tum in iacendi habitu, tum in diætâ. Sic enim conditio est τῆς ἀσῆς, ἢ καὶ ἀγῆς, i. fastidij; vt qui eo laborant, fastidiosè se gerant atque iacentur, omnis figuræ ac loci impatientes, vt ij quos tædet subinde rerum illarum quæ paulò antè ipsis placuerant: quod Græci propriè vocant ἀγῆν, vnde ἀγῆσις nomen habet, καὶ ἡ ἀγῆσις: quæ duo nomina idem sunt in natura, symptomatis, atque causis, quod ipsamet ἀσῆ; vt planè testantur verba Galeni ad aphor. 34.7. & ad prorrh. 44. f. 2. 1.

SINE NAUSEA EXACERBANTUR] Græcè est ἀνέμετος, i. ad verbum, sine vomitu: quæ dictio tamen hîc non est nò vomentis, sed minimè vomiturientis, vel eius qui non vomendi est cupidus. Est autem hîc posita vt intelligamus eos qui cum fastidio sine nausea exacerbantur, vel quorum exacerbatio fastidiosa cum tædio omnis loci atque figuræ coniunctam non habet nauseam, vomitionis critica mox affuturâ prænunciam; vt nulla inde sit vacuatio quæ adferat ægro leuationem illius iactationis in paroxysmo, quæ ob eam causam est symptomatica; proptereaque pessimis ægri rebus cietur vel excitatur.

MALO SVNT LOCO] Quia morbi exacerbatio est nouis fœta symptomatis, ipsius maleficio & incremento: non autem critica perturbatio quam edit naturæ contentio. Ac talis contentio sæpe cernitur in alysmo critici paroxysmi, cuius hîc nulla opinio esse potest: quia sine nausea est illa iactatio siue alysmus; proptereaque cietur, ὅτι ἡ δυνάμεις βαρύνεται ὑπὸ τῆς σφύρας, i. quia virtus oppressa grauatur à corpore. Est enim causâ omnis duplex alysmi; vna quidem, ὅταν τὸ σῆμα τῆς γαστρὸς ὑπὸ μακροῦ χρόνου δέχεται χυμῶν, i. cum os ventriculi vellicatur morsu prauorum humorum; vel, vt eadem placet Galeno, cum in ore ventriculi ἀεὶ ἔχεται ὡς ἰδιώτης ὑγρότης αἰσθητὴς, ἢ πολλῆς, ἢ ἐμπλεῖς τῆς αἰσθητικῆς δὲ εἰς τὴν χυμῶν αἰσθητῆς, i. continetur quædam proprietas humiditatis molestæ, non quidem illius multæ, neque stagnantis in aluo, sed in tunicas eius conuersæ. Atque hæc quidem iactatio siue alysmus, ex nausea quæ ipsum facit, dicitur ναυλώδης, i. nauseabundus; sicut alter, quem ciet virtutis oppressio sine nausea, nominatur ἀνέμετος, i. expers nausea. Et sanè fastidiosi ἀνέμετοι vel ἀνέμετῶς, periculosis multò ægrotant quàm ναυλώδης, i. nauseabundi.

TUM PROVOCATI NAVEA SINE VOMITU] i. Qui sine vomitu agitantur cum nausea. Non enim iactatio hæc vel agitatio ἀνέμετος, eò spectat quò illa prior, ἢ ἀσῆ, vel ἢ ἀγῆσις, vel οἱ ἀσώδεις παροξυσμοὶ ἀνέμετῶς, i. qui cum fastidio sine nausea exacerbantur. Nam idem esset bis dicere, quod non est Hippocraticum, in eadem prognosi, & in eundem scopum. Nec verò in omni nausea iactabunda sine vomitu, est paroxysmus: sicut nec in omni paroxysmo est iactatio nauseabunda. Sed tamen vt cum signo à febre grauis est omnis iactatio sine vomitu nauseabunda: sic etiam sine febre cum causâ: quoniam omnis ægra vomitio, aut certè irrita vomituritio, inflammationem mouet lethalem stomachi & ventriculi. Ergo secunda pars huius prognoscos, è directo intendit ad scopum authoris de calamitosa vi nausea quam comitatur iactatio; nulla autem sequitur vel admodum ægra vomitio. Non enim minora sunt vomitionis ægræ vel nausea sine vomitu iactabundæ incommoda, quàm causæ ipsius vnde illa venit iactatio sine vomitu nauseabunda, vel admodum ægra vomitio. Vt enim hæc signo editur viscerum æstu incandescientium: sic illa, vt causâ inflammationem mouente in stomacho & ventriculo.

Sic ex prorrhethico, 47. l. 2. i.

8 Τὰ μικρὰ ἐμέσματα χολώδεια· κακόν· ἄλλως τ' κ' ἢν ἐπαγρυπνήσωσι.

Exigui vomitus biliosi, malè habent agrotos: idque cum aliàs, tum si vigilias agitauerint.

ENIMVERO prauitati vomitus multum adiiçitur, cùm vitiosa qualitas rei quæ vomitur parca manu, crebrò & ægrè apparet. Nam de exigua quantitate rerum omnium quæ transmittuntur suprà & infra, totòque corporis habitu, καὶ ὅλη ὅτη δέ, i. per ἀπόρρση quam edit ἀπόρρσεις; illud præceptum est ac pridem iam ratum & persuasum omnibus, ὅτι τὸ κρίσιμον ἐστὶν ἐν μικρὸν τῷ περσόνει, i. quòd eorum quæ critica sunt, nihil conuenit esse paucum. Ad hoc theorema catholicum adducta prognòsis de vomitu bilioso frequenti & paucò, vt ad iudicium, sic deducetur.

EXIGVI VOMITVS] i. Qui crebrò & parcè vomuntur: neque id, nisi ægrè. Non enim hic vomitus est alui natantis, cibi & potus assumpti facietate aut catarrhi in eum prolapsu è capite, cuius est libera inde vomitio: sed proritata potius ab humore aduena è visceribus atque venis, cuiusmodi bilis est, vnde sunt vomitus.

BILIOSI] i. Qui à bile cientur, cuius perennis est in aluum affluxus ab hepate, illis distincta coloribus qui modò adducti sunt à præceptore; videlicet flauo, æruginoso, nigro. Non enim porracea bilis hîc audienda, quàm olerum genuit cruditas atque corruptio assumptorum. Ac de paucò vomitu flauæ bilis, & inde mox æruginosæ, nuper adducta est obseruatio præceptoris in Philistæ historia, de quo sic ait. Πρώτῃ μὲν ἡμερᾷ χολώδεια ἔμεττα, μετὰ δὲ ἰώδεια. i. Primo die vomuit biliosa flaua primùm, inde æruginosa. De nigro autem multa sunt à nobis conscripta initio huius tractatus ad secundâ prognòsin: ne confectè omnia quæ sunt plurima, fuit illud Galeni iudicium de iis qui statim à vomitu æruginoso de febre infaniunt, sicut Philista; quòd bilis flauæ per os vomendo redditæ, & inde mox æruginosæ, in atram facilis est ὁδονομία & transitus, vnde symptomatico illi vomitui succedit infania. Locus est ad illud prorrheticum quod iam adduximus. Τὰ ἐμέσματα ἰώδεια ἐν κεφαλῇ γίνονται μετὰ κωφώσεως ἀγρυπνώδεια· ἔχει ἐκμάτην. i. *Æruginosi vomitus in cephalalgia, cum surditate ac vigilis; citò adducunt infaniam.*

MALE HABENT AGROTOS] Causa & signo. Signo quidem, bilis in aluum perenni affluxu, quæ affluendi atque gignendi sui perennitatem habet in æstu quo viscera incandescunt, & à febre ipsa vires acquirit. Tum quòd ipsius bilis confluentis in aluum, ideo non est liber nec liberalis exitus, ob partis quam occupat infirmitatem, & impotentiam excludendi, quam ipsi feritas bilis inducit. Omnium enim quæ parca manu, secus ac decet, foras eduntur; causa est, partis oppressio vel exolutio vnde mouetur humoris exclusio. Sed multæ sunt calamitatis causæ à vomitu bilioso & paucò. Non enim ab eo febris mitescit: quia non est criticus nec periodicus, sed omni ex parte symptomaticus καὶ τῷ ὅτι γίνεσθαι, vnde nulla leuatio esse solet, ægritudo maior: sicut à bile nata ex melle, quæ dysenteriam mouet molestam, qua non extinguitur hepar accensum, sed magis accenditur. Itaque bilis hoc vomitu symptomatico, & ipsa effecta magis redditur, & febris vires acquirit eundo. Tum ægra vomitio sæpe oborta, ventriculum atque stomachum labefactat, & inflammationem mouet lethalem, vt nuper ostendimus ex illa prognòsi. *Diuturna in febre nauseabunda proritatio, quæ in screatum desinit; pefumè habet ægrum.*

IDQUE CVM ALIAS] i. Cùm semper calamitati locus est in tali vomitu bilioso & paucò.

TUM SI VIGILIAS AGITAUERINT] Quod verbum è vomitu symptomatico, vigilias inducente & adimente somnum, de causa vigiliarum oborto, transit ad ægrum qui vigilat & supernuigilat, causa malefica vigilandi quæ adest, procul explosa somnifera in dormiendi necessitate. Ex quo emittitur vt vigiliarum & bilis, tum etiam febris & vomitus biliosi quædam sîr, vt ita dicam, συνδυασμὸς in ægri perniciem: vt scilicet incremento febris hi vomitus excitentur, & febris adaucta vomitibus crebra sîr biliosis: tum etiam vigiliarum & bilis vicissitudo mutuam vtriusque pariat accessionem. Vt enim vigilia gignunt bilem: sic illæ rursus à bile gignuntur. Ac symptomatici vomitus biliosi & febris, mutua conspiratio est in vtriusque causam & incrementum.

9 Ἐπὶ μυχάων ἐμέπων κώφωσις ἐβλάπη.

In nigris vomitibus surditas non offendit.

POSTQVAM de vomitu dictum est bilioso in qualitate, copia, & modo vomendi; sequitur vt de nigro ea dicantur quorsum ille apparet cùm de flauo redditur, & inde mox æruginoso. His enim gradibus itur de bile ad atram, nec vltra. Sed in hac prognòsi nō est absurda mendi suspicio, nec vana opinio, vbi legitur quòd surditas non offendit. Sanè huiusmodi mendum est, vt nisi emendetur, mendax omnino sîr ipsa

lib. vii.
cap. 6. Epid.
Gal. ad prorr.
47. l. 2. i.

hist. i. part. 2.
3. Epid.

Coac. 58.
lib. 1.

no sit ipsa prognōsis. Ratio emendandi ponetur in eius examine, quod sic aggredior.

IN NIGRIS VOMITIBVS] Qui sunt ab atra bile quam genuit æruginosa orta ex flaua. Non enim sunt vomitus hīc audiendi qui ab humore cientur, cuius πωρὸν ἐστὶν ἐστὶν nigrum, cuiusmodi est melancholicus humor qui sanguinis limus est, atque quodammodo ipsa saxe nigra iam inde à prima origine. Quamuis autem sit ex hoc perusto altera bilis atræ origo: nam prior ex flaua est quam paulò post excipit æruginosa; tamen non ea mens est authoris, non etiam scopus, quo mea omnis attentio esse debet.

Gal. ad hist. de Philistæ, & prorr. 10. §. 1. 2. & 47. §. 2. 1.

SYRDITAS] Auditus priuatio de non excepto vel non percepto appulsu ὅτι ἀκουσῶν.

NON OFFENDIT] i. Non lædit, vel nihil adfert incommodi iis qui sic obsurduerunt: quod certe falsum est; plurimum enim adfert calamitatis atque denunciat. Nam surditas de non excepto appulsu ὅτι ἀκουσῶν, phrenitidi sternit viam atque insaniz, quando exoritur à vomitu æruginoso, mox nigro, & cum vigilis coniunctam habet cephalalgiam. Quod legimus contigisse Philistæ, quem scribit Hippocrates obsurduisse: mox autem fanaticum euasisse postridie quàm flaua vomuerat, & inde paulò post æruginosa. Vomuerat autem quo die primùm decubuit. Atque illius historiz breuiario & aphorismo scriptum est ab eodem prorrheticum modò adductum. Τα ἐν κεφαλῇ τῶν ἐν τῷ στόματι μετὰ κατὰ φῶρος ἀκουσῶν τε καὶ ἐκ μύτης. i. In cephalalgia, æruginosi vomitus cum vigilis & surditate; summa omnia breui ostendunt insaniz. At verò surditas de non eodem percepto appulsu, signum est citò venturæ mortis. De qua illud præceptum est. Κατὰ φῶρος ἐν ὅττι καὶ τὰ κεφάλαια καὶ τὰ ἀκουσῶν κακόν. i. Surditas quæ in acutos incidit ac turbulentos morbos; pessimè habet agrotum. Vbi Galenus author est, talem surditatem oriri τῆς ἀκουστικῆς διωδῆως, i. emortua audiendi virtute. Ac surditate aut cæcitate sic nata, ἐστὶν ὁ θάνατος, i. mors in propinquo est. Nam surditatis alterius comparata sic est natura, vt in meatu audiendi obstructo consistat, ὅθεν ἐχούσα κακότης, vt ait Galenus: propterea quæ nihil offendere videatur, sicut est positum in hac prognōsi. Sed quia vigiliz agitantur, vnde est ipsa surditas, nempe à nigro vomitu, de cuius materia, audiendi meatus obstruitur: sanè ipsa causa obstructi meatus primùm de sensorio transibit ad sensum; & inde vigiliarum; mox autem insaniz parens erit. Iam verò cū hæc surditas non sit per πῶρον pituitosi humoris è cerebro in audiendi meatum: sed per anadromen è biliosi humoris, æruginosi & nigri: sanè non video quemadmodum culpa vacet, cū simulatque orta est, alius inde sistatur. Sic enim accepimus; quod in febre surditas alium sistit. Ex quibus efficitur, multa incommoda circumuenire eos quorum aures à nigro vomitu obsurduerunt. Et quod illa surditas culpa non vacat, nihil habens securitatis; plurimum autem periculi signo & causa.

prorr. 10. §. 1. 1.

prorr. 32. §. 1. 1.

aph. 49. 4.

aph. 28. 4. & Coac. 1. cap. 3. lib. 2.

Οἱ καὶ μικρὰ ταχεῖς χολώδεις ἀκρήλοι ἐμέλοι κακόν. ἄλλως ἔ καὶ ἐν ὑποφορῇ πλείονι, καὶ ὁσφύος ἀλγῆματι σιῶλον.

Qui crebrò & parcè biliosi sunt vomitus meri; malè habent agrotos: idque cū aliàs; tum in multa deiectione et in pragradi lumborū dolore.

VOMITVM omnium qui apparent & sunt incommodo ægrotantium, complexio hīc est in qualitate, copia, tempore, & modo vomendi. Atque vt rerum omnium vomitus symptomatice, quas hæc prognōsis complectitur, singulæ malis ægri rebus apparent & sunt: sic vniuersæ pessimis. Et quoniam singularum causæ paulò antè sunt à nobis adductæ; hīc certè sufficiet philologiam examinare ipsius prognōseos quæ est huiusmodi.

QVI CREBRO] i. Qui citò, vel iterum atque iterum citò vomuntur breuibz interuallis. Non enim πῶρον, ἢ πῶρον, i. citum, vel citò, ad vomitum pertinet qui fit ἐν πῶρον in actū vomendi: sed ad eum qui subinde cietur, cū scilicet nouus exacto subinde succedit, quamuis ægrè ac difficulter vomatur. Nam πῶρον aduerbium, & nomen ipsum πῶρον, breuis est interualli: sicut exigui temporis atque spatij, tam in celeritate actionis susceptæ, quàm agendi occasione parta.

ET PARCE] i. Parum ac parum, vel parca manu, quoties illa cita venit vomitio.

BILIOSI] Flauī, porracei, æruginosi.

MERI] i. Sui feri naturalis vbi gignitur, & alieni humoris quæ feritur, & vnde vomitur, expertes.

MALE HABENT AGROTOS] Omni causâ & signo vt suprâ ostendimus: & eò peius habent; quò plura signa mala, causæ item plures concurrunt ad malè de iis merendum. Nam variæ effluentiz, diuersitatem meri coloris mutantur è variis partibus vnde manant, quarum est similis coloratio excrementi cuiusque: ob eamque causam illæ sunt prauæ; quia in iis, prauarū affectionū notæ apparent; & eò res ægri peius ire testantur, quò plures visuntur; quod scilicet in vitio sint plura naturæ præsidia.

IDQVE CVM ALIÀS] i. Cū tales vomitus ipsi per se in cæteris malis vomuntur incommodò ægrotantium, pessimisque rebus ipsorum.

TVM IN MULTA DEIECTIONE] Cū scilicet fertur alijs liquidis excrementis crebrò & multum, vbi vomitus præsidio esse solet diarrhææ sistendæ; atque id λόγος τῆς φύσεως, i. naturæ merito retrahentis de improviso, ἢ ἐν τῷ τῶρον. At verò hī vomitus non cientur ἀπὸ τῶρον, i. de improviso: sed vt symptomata grauissimorum morborum; propterea quæ ab illis τῶρον suam obtinent, vt ipsi quoque illorum vim magnam ostendunt. Ac tales vomitus in diarrhæa symptomatice morborum illorum,

aph. 16. 4.

symptomaticè ipsi etiam vomuntur, periculòque adiciunt, ut *πῆμα τὸ κρίσιμα μὴ κρίσῃ*, i. *crítica sine crisi*, propterea quæ *δυσχερὴς ἢ πασιπύδα*, i. *mortifera aut sinistra indicij*, ut in cholera morbo.

ET IN PRÆGRANDI LUMBORVM DOLORE] Quorum dolorifica mala, foras, vomendo, non exeunt: sed illis vomitibus ibi subesse docentur. Exempla sunt in nausea & cardialgia, quas è lumborum plethora serum expressum mouet in fundo vetriculi & ore ipsius; tum in lumbari medulla, cum inflammatur, & suam inflammationem communicat cum melsaræo nato ex nervis lumborum. Præterea in nephritide phlegmonica & calculosa, vnde cidentur vomitus æruginosi.

II Τὰ ἐξ ἐμέτων ἀσώδεια, κλαγγώδεια, ὀρμιατὰ ὀπιχνουῶ ἔχοντα μανικά. ὅξέως μανέστες, θήσοκοισι ἀφωνοί. 10

Sic melius ex prorrhethico 17. l. i. i.

Τὰ ἐξ ἐμέτου ἀσώδεια, φωνὴ κλαγγώδης, ὀρμιατὰ ὀπιχνουῶ ἔχοντα μανικά. οἷ καὶ ἡ Ερμολύγου ἐκμανεῖσα ὅξέως, ἀφωνος ἀπέθανε.

Quibus à vomitu fastidia sunt, vox clangosa, oculi puluerulenti, furor venit: ut etiā nupta Ermosygi, quæ ab insania, voce capta interijt. 20

QUÆ HIC ponuntur de vomitu crebro fastidiis nauseabundis, communiter quidem pertinent ad τὸ κατηρρέμενον huius prognoseos, quod est insania cui succedit ἡ ἀφασία, i. *vois amissio*: sed tamen illius propriè non sunt τὰ υποκείμενα, i. *subiecta*, nisi coniuncta cum voce clangosa, & oculis puluerulentis. Nam vomitus fastidiosus, sunt etiam febrium malignarum: sicut ipsius phrenitidis, quò hîc spectare, & ad quam referri videntur in hac prognosi. Quorsum autem, quòve authoris scopo, adducti huc fuerint vomitus illi fastidiosus, operæ precium est intelligere, priusquam iuris quæstio in iudicium deducatur. Est igitur scopus authoris, ut doceat, illis demum vomitibus pessimè agi cum ægris, vnde nulla leuatio est, sed crebra incidit vomendi cupiditas, quotiescunque vomuntur, ipsosque fastidia subinde excipiunt τανυώδη. Sed ratio huius symptomatis, cæterorumque quæ hîc leguntur; tum autem quorsum appositæ scripta sunt, propalam explicabitur in examine quod sic aggredior.

QVIBVS A VOMITU FASTIDIA SVNT] i. Quorum vomitus excipiuntur subinde fastidiis nauseabundis, ut non minùs vomendi sunt cupidi, nec minùs vomituriant, nauseabundi, quàm cum nihil antea vomuissent. In causa hæc sunt; humoris maligni succrescentis & affluentis perennitas. Succrescentis quidem, à febre maligna in hypochondriis atque venis: tum à cerebro inflammato phrenitico. Affluentis autem, in aluum & stomachum eius, vnde sunt crebri vomitus, & crebra inde vomendi cupiditas. Nam ut inflammari cerebri symptoma proprium est phrenitis: ita superuenit illi vomitus æruginosus à bile transmissa in stomachum, cerebro συμπαρέσσαν, quia est *ευρωδής*. Sic enim scriptum est à præceptore. *Φρενιτικοὶ μὲν ἀσπασμοὶ δὴ καὶ ἰσθμὸς ἐμέουσι, καὶ ἐνίοι τεχνόσαντι τρυτίων*. i. *Phreniticis quidem convulsiones: quinetiam vomunt æruginosa, vnde nonnulli eorum celeriter moriuntur. Vbi Galenus hæc scripsit. Demonstratum est pridem à nobis, quòd omnes huiusmodi deiectiones ex vomitu manant ex bile perusta. Quæ causa est, cur postea dixerit, quòd nonnulli eorum cità mors venit, i. quòd statim ab iis vomitibus moriuntur: quòd scilicet in regione cerebri ex meningum ipsa phrenitis consistat nata è bile. Ut mirum videri non debeat, exoni convulsiones de partibus illis supra modum arefactis. Ac theorematis huius exemplum est in historia cuiusdam phrenitici, de quo hæc narrat Hippocrates. Ο φρενιτικὸς τῇ πρώτῃ κατέκλιθης, ἡμεροὶ ἰσθμὸς. i. Phreniticus quo die primum decubuit, æruginosa vomuit.*

VOX CLANGOSA] i. Rauco & tremulo clangore horrifona, rubæ cuiusdā modo, quem edit asperitas instrumēti vocalis, i. arteriæ, non quidē catarrho imbutæ: sed nimia siccitate squalētis & horridæ quam cerebri & meningū intulit inflamatio. Siccitatis autem illius horridulæ, propterea quæ horrifona, facilis perceptio est in membrana vocalis arteriæ: quòd illa inflammaram cerebri meningem contingat, vnde cum cæteris omnibus membranis enascitur. Cernitur quoque talis calamitas in officio deglutienti, faucium & gulæ ipsius. De qua solenne est illud præceptoris edictum. *Οι φρενιτικοὶ βραχυπύται, ἴσθμους κατὰ τομαί. Ἐμφόδες, ἢ ἀσπασμοὶ δέ. i. Phrenitici parum ex raro bibentes, idque cum strepitu; contremiscunt, aut convulsuntur. Qualem præceptor animaduertit Theodori uxorem, de qua illud scriptum reliquit. Οι ἴσθμοι δὲ τῶν μέγιστοι. i. Magni strepitus erant bibenti.*

OCULI PVLVERVLENTI] i. Oculi scærentes pulvere minutissimo, velut polline, quales apparent iis qui cælo æstiuo iter faciunt per loca puluerulenta. Sed oculorum squalentium etiam communis ratio est, tum in iis quos tenet marasmus, tum in valde phreniticis: ramen non ita difficilis erit cognitio quibus hîc propriè tribuantur. Nam tabidorum caui sunt oculi, humiles, ac demissi; phreniticorum verò exerti ac truces. Puluerulenti autem sunt, vel ab humore proprio qui exarescit, vel ab eo qui exudarè è cerebro inflammato in oculorum cārthos, ibique signa edit squaloris puluerulenti: quem admodum idem bullas mouet in lingua.

FVRORE VENIT] i. Dementiæ summa sunt omnia, quæ cernuntur in cæptis immanibus effor- rum fana

lib. 2. cap. 1.
Epid.

1. Epid. part. 3.

hist. 4. part. 3.
3. Epid.

Coar. tot. lib.
1. & prorrh.
16. l. i.
7. Epidem.

rum fanaticorum. Sic enim homines ē phreniticis euadunt fanatici: quoniam æruginose bilis quam vomunt illapsum ē cerebro in ventriculum, facilis esse solet in aram mutatio. Atque vt bilis flauz, & inde mox æruginose symptoma in cerebro est phrenitis: sic atq; mania sine insania, quod eius actiores multo sint morsus quam flauz.

ET AB INSANIA VITAM FINIUNT VOCE CAPTI] Quod legimus contigisse illi phrenitico, cuius historia est lib. 3. Epidem. sicut vxori Ermosygi, quam loco exempli posuit in prorrhethico. Capti autem voce intereunt a conuulsione nata in cerebro, de qua id modò audiuimus ex præcepto. *Φρενιτικὸν μὲν ἀπορροιαί. i. Phreniticis quidem incidunt conuulsiones: quarum ipsi causas ibidem attingimus ex Galeno. Est autem conuulsio illa, τῆς ἀπορροιαί, i. vocis amissæ parens & causa effectrix, ὅς τὸ τὴν αὐτὴν νοσήσας καὶ μὴ φωνάζειν, i. ob tensionem nervorum & musculorum vocalium. Nam vocis amissio, est etiam illarum partium exolutarum, vt ex Galeno animaduertimus, cum alibi passim, tum verò ad illam prognosin. Οἱ παλμώδεις δὲ αἱ, ἀπὸ καὶ ἀπορροιαί παρὰ τὴν αὐτὴν; i. Qui toto palpitant corpore, vitæ terminant voce capti? Atque hæc prognosis desumpta ex casu prædicti phrenitici, non minùs de sua quæstione sapit Hippocratem, quàm illud prorrheticum huc adductum: quod verum esse testatur Galenus in commentario; tametsi quærendo non mirùs derogat Hippocraticæ maiestati, quàm illa prognosis. Vtraque autem quæstio exorta est de phrenitico. Sed hæc sufficiant. Vide commentarium ad primam prognosin capitis de conuulsione, quam modò expressimus.*

12 *Ἐν ἐμέτῳ διψώδεια ἔχοντα, ἀδύνατον ἡμέτερον κακόν.*

In vomitu sitibundum, sitis expertem fieri; malum.

HOC THEOREMA catholicum esse non potest, vt verum sit. Est enim falsum, nisi ponatur appositè καὶ ὑπόθεσις. Ponetur autem appositè καὶ ὑπόθεσις, de vomitu phreniticorum æruginoso, qui cum inexplibili siti obortus, mox habet fastidium nauseabundum atque sitiferum. Quod si eueniat, vt in perenni causa & necessitate vomendi, vel à bilis illapsu ē cerebro in ventriculum, vel eius affluxu per febrem *διψώδεια*; sitis vacuitas esse putetur in causa sitifera; tum malè res eunt ægroti.

10 Ergo. IN VOMITU] Bilioso, quem subinde fastidia excipiunt nauseabunda atque sitifera.

SITIBUNDUM] A bile in aluo sitifera: cuius in aluum perenni affluxu vel à cerebro, vel à vicino iecore, sitis ac nausæ symptomata excitantur.

SITIS EXPERTEM FIERI] De non percepta causa quæ adest sitifera.

MALUM] Quod pessimè habet ægrotum, ne dicam mortiferè, ἢ ὅς τὸ τὴν γαστρὴν νοσῶν, ἢ ὅς τὸ τὴν πρὸς τὴν διψώδεια καὶ παρὰ τὴν ὀρεξίαν, i. quod ægritudo sit mentis vel occupatio, aut quod emortua sit facultas quæ appetens rationum esse solebat. Omnia autem quæ in hanc sententiam ex Hippocrate possunt adduci (plurima autem possunt adduci, iam pridem adducta & explicata) continentur hoc aphorismo. Quibus quid corporis est in labore, & eius laboris rara pere pto; iis mens laborat.

13 *Ἐν ἀσωδέσῳ ἀγρυπνοῖς, τὰ ὑπὸ τοῖς μάστιξι.*

Fastidiosus vigilibus, ferè sub aurem tumores assurgunt.

EST QUOQUE hæc prognosis examinanda scopo earum quas proximè ad examen adduximus. Qui secus facit, caliginem habebit pro Sole. Ergo sic erit ratio examinandi & ad iudicium deducendi καὶ ὅς τὸ καὶ τὸ δι' αὐτὴν.

FASTIDIOSIS] i. Qui fastidio effervescunt omnis figuræ & loci, nec nisi tædio recreantur occupati à febre in qua est καύμα ἰσχυρὸν καὶ τὴν γαστρὴν, καὶ καρδιαν, vt verbis utar Hippocratis, i. fortis æstus ventriculi, & stomachi morsus: idque à bile flaua quæ fluctuat æstu in tunicis alui, & feritate sua orificiū morder ipsius: vnde καρδιαν, & inde ἰσχυρὸς τὴν γαστρὴν. Quæ sanè fastidij ratio visa est huc aduocanda, vbi de vomitu agitur; non autem illius quod vocat præceptor ἀίματος, siue αἰμώδους obortum.

VIGILIBUS] Non quidem sua sponte vigilas agitantibus. Quæ causa & ratio vigilandi, cernitur in omni studio & in excubiis. Sed iis qui somnum inire non possunt in dormiendi necessitate: atque id vitio somniferarum causarum.

FERE SUB AVREM TUMORES ASSURGUNT] Sanè quidem, si humor vigiliarum parēs ob feritatem, qui olim benignus erat somniferus, cum eò peruenit, exitum molitur per hæmorrhagiam, quæ inchoata, sed non perfecta, sæpe conuertitur in abscessum qui assurgit sub auribus, & nomen earum sibi adoptat, nominaturque parotis. Est enim consuetudo naturæ, vt inchoatam excretionem criticam, in abscessum conuertat; vnde sit absoluta crisis. Quod ita esse docetur illa sententia præceptoris. Καὶ τὸ μὲν πρὸς τὴν γαστρὴν καὶ τὴν καρδίαν, i. Si eorum quæ excreuantur super sit pars aliqua; tum in abscessum morbus est facilis. Atque id maxime locum habet in hæmorrhagia quæ inchoata se ad aures conuertit, ibique mouet parotidas. Testis est ille aphorismus qui docet quod febrium laboriorum finem abscessus adferunt vel in articulis, vel in maxillis, i. sub auribus. Sed omnis parotidum ca-

quod eiusdem generis sunt hac atque predicta; quod scilicet verrucae in palpebris & viceru enascuntur. Omnia autem quae tam in cute, quam in palpebris efflorescunt; sponte ab illis humoribus concitantur.

15 *Ἐπὶ ἀκρήτοις ἐμέτοις λυγρὸς κακὸν. κακὸν δὲ καὶ ἀσπερμὸς. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῇσιν ὑπερκαθάρσεσι τῇσιν ἐκ τῆς φαρμακείων.*

In meris vomitibus, mortifere habet singultus: mortifere item conuulsio. Similiter & in purgationum excessu quem inferunt pharmacia. 10

VOMITIVM signo & causa mortiferorum prognos hanc posita est ab autore; idque appositum. Signo quidem, quatenus illi sunt meri, propterea quae prauae, & indices prauarum affectionum. Causa autem, quia symptomata inferunt quae cito vires exolunt, & citam mortem adducunt atque crudelem. Ergo vomituum signo & causa mortiferorum, sic ratio explicabitur in examine huius prognos.

IN MERIS VOMITIBVS] Qui sunt eiusmodi unde cietur humor, & quae excluditur, vbi est, & inde cernitur expers humiditatis aquosae, tam propriae, quam alienae. Huiusmodi sunt bilis tria genera quae iam recensui, flauae, æruginosae, & nigrae: quarum praua qualitas, meru extetteret medicos signo prauarum affectionum quarum illae soboles esse solent. De signis quidem, illud præceptum est; quod ipsa res necessariò subesse testatur, quas indicant: ut dubitari non possit quorsum appareant. Est autem iam positum; quod omnis praua excretio, signum est prauae affectionis. Quemadmodum igitur prauae affectionis idea cernitur in mera bile, quatenus illa, scilicet, partium vbi nascitur inflammationem, atque humoris unde succrescit corruptionem ostendit: ita vomitio meræ bilis cum actione læsa, perennitatis fontem & focum denunciat, ut supra iam diximus. Sed ea vomitio meræ bilis, ut signo mortifera est ita mortiferam infert causam, quae sic expressa est.

MORTIFERE HABET SINGULTVS] Cum scilicet ille singultus, non tam ventriculi concussione, quam eius incidit conuulsione quadam. Tametsi enim praua est omnis ventriculi proritati à bile concussio irrita, quae inflammationes mouet lethales, ut sæpe apparet in febribus quas vocant πυρετῶδες, & hepate inflammato: tamen hic nondum ad vltima ventum est, nec dum singultus ille signo funesto mortifere habet ægrum: sicut is positus in hac prognosi, quem edit conuulsio ab exhausto, non autem conuulsio ventriculi proritati. Est autem illa conuulsio insanabilis ac desperatae salutis.

MORTIFERE ITEM CONVULSIO] i. Iniusa contractio musculorum qui naturaliter καὶ ἡ φύσις, nostra sponte, non sua, mouentur. Qualis contractio cadit in eos qui vomunt æruginem ab elleborismo, vbi conuulsio est in prompta ferocitate bilis in orificium alui quod est acerrimi sensus, ac cerebro συμπαθεῖται, quia est νευρῶδες. Atque illa conuulsio similiter accidit sympathia cerebri, ut à phrenitide circa initia contagio stomachi: cum cerebro inflammato crebra vomitio incidit æruginosae bilis, quae nata in cerebro, illuc demissa, exitum per os habet. Qua de re singularis est illa observatio præceptoris. Φρονιτιστοὶ μὲν ἀσπερμὸι ἀγρὰ καὶ ἰώδη ἐμέοι. Attamen scire licet idem vsuuenire iis qui purgantur elleborismo, quod ipsis choleris quibus eueniunt σπασμοί: potissimum verò in musculis qui tibiæ suras constituunt. Nam violentia pharmaci attrahentis, & succum neruorum exhaustantis, non est ἀδύναμις ex ea cacopathia conuulsionem incidere. Talis autem conuulsio mortifere habet ægrum: quia seruari non potest ab exhausto conuulsus. Tum quia doloris seuissimi σπασμὸς, & vnà cito vires exoluit, & citam mortem adducit, ut in phreniticis bilem vomentibus & inde conuulsis, annotauit præceptor his verbis. Ἀλλὰ καὶ παρὰ ταῦτα ἐν ταῖς νευρίαις. i. Quinetiam horum nonnulli celeriter moriuntur.

SIMILITER ET IN PURGATIONVM EXCESSV QVEM INFERVNT PHARMACIA] Cuiusmodi sunt ab elleborismo, cuius effrænem vim exhauriendi succum è neruis, modò audiuius ex Hippocrate & Galeno. Est autem sic nata conuulsio insanabilis, & cita morte funesta. Causae sunt explicatae. Nec solum ab hypercatharsi quam temeraria infert pharmacia, conuulsio est lethalis atque mortifera: sed illa etiam quae cietur ab hypercristi hæmorrhagica, cum scilicet ab exolutione, vel ipsa per se mortali quando superuenit hæmorrhagia, ad vltima ventum est siccitatis: cum scilicet exhaustæ venæ, arido ipsarum fonte, commeatum è neruis capessunt, ipsosque suo succo defraudant famelicæ, quae attrahendi virtute carnes ipsas præcedunt. Solennis est illa sententia præceptoris. Si largo sanguinis profluvio superuenerit conuulsio aut singultus; mortiferum.

Cosc. 11. 12. 13. libens

16 *Οἱ μέλλοντες ἐμεῖν πινυλίζουσιν ἐμπροσθεν.*

Qui vomituri sunt; prius illi saluant.

VOMITVS adfuturi, vndeunque tandem cietur, prænuncia est salua: ob eam sanè causam quod humoris vomendi portio quædam tenuior prorepat ex aluo, vbi stagnabat, ad stomachum, & inde ad fauces, per continuitatem interioris tunicae quae est illius & harum communis. Atque id cernitur in omni vomitu, critico, periodico, & symptomatico. Nam vomituri omnes, vomituriendo saluant. Non

tamen efficitur necessariò, ut saluando quis vomiturat: sicut vomituriendo saluat. Ut sanè hoc theorema sit καὶ ὑποθέσιν vomitus, cum eò vitiosus humor viam affectat: cuius quidem inclinatio, & meatus conditio, propria edit περὶ μέτρα, i. syllogistica signa, quæ in prognosticis Hippocrates annotauit. Et verò pyelismus est quidam phreniticorum, ex quo non tam vomitus significatio est, quàm insaniam, quando sputandi finem non faciunt indecorè. Tamen si & ipsa necessitas continenter sputandi, non raro idem denunciat, cum exudante quodam ichore à cerebro inflammato, bullæ minutulæ assurgunt in lingua & ore. Tum idem serum mouet saliuam, prolapsam in aluum, cuius è fundo proripit ad saliuandum per tunicam eius, palato, faucibus, & linguæ intextam. Huc spectat illa prognosis. Phrenitici sputatores, fanatici; etiá mne tremuli? Quod si eueniat ut bilis appulsu in aluum è cerebro inflammato saliuam promoueatur; in propinquo est vomitus: idque cum aliàs, tum si accesserit rigor, cuius concussio non minus adiicit causæ vomendi; quàm euomendæ bilis æruginosæ & atræ, signio apparet. Testis est illa prognosis. Qui è phreniicis cum rigore sputant; vomitum illi nigrum denunciant.

Coac. 99.
lib. 1.Coac. 107.
lib. 1.

17 Ἐπὶ ἐλλεβόρῳ ἀσπασμός· ὀλέθριον.

Quæ super elleboro venit conuulsio; mortifera.

NON ILLA quidem fugax conuulsio ipsa per se mortifera est, quam ciet elleborus in prostrato ab effera bile ventriculi orificio, quod est acerrimi sensus, ut νευροδέσσειν; propterea que cerebro συμπαθεῖται: sed illa quæ à neruorum exhausto, & rigida siccitate infertur, ob ὑπερκαθάρσιν quam facit elleborus, qui admirabile est quantum purgandi & attrahendi potentia, cæteris omnibus catharticis antecellat. Quæ causa est quamobrem elleborismi veteres tantum ad ea pathemata imperarint, quæ sunt μοχλείας δρόμους, & febris expertia. Scire autem licet, nomen ellebori significare album, in quo vis inest toto corpore humorem ciendi & attrahendi ad vomitus violentos, priusquam is subeat tenuium intestinorum anfractus. Cur autem conuulsio nata ex neruis, ariditate rigidis, per hypercatharsin elleborismi, mortifera sit; dictum est supra.

18 Ἐπὶ πάσῃ καθάρσει πλεονάζουσα, ψύξις μὲν ἰδρωτὶ· ὀλέθριον.

Si redundanti cuius purgationi, frigus adueniat cum sudore; funestum.

IBI DEMVM infirmitatis summa sunt omnia, postquam ad vltima ventum est purgationis, cum inde frigus & sudor occupant compaginem artuum. Nam frigus, extinctum ostendit calorem viuificum quo vegetari solet viuacitas partium solidarum, ex quibus efficitur illa exudat frigida sudatiuicula quam nomine τῷ ἰδρωτὶ expressit, ἀπὸ τῆς ἐφιδρώσεως. Vbi autem, collapsa virtute viuifica, languet efforta viuacitas ab exhausto; ibi mors ipsa subesse ostenditur. Est igitur sæpe mortifera hypercatharsis conuellendo & exoluendo, ut centies ipsi vidimus ex antimonio Spagyritarum, quorum est omnis pestifera medicina.

19 Καὶ ὁ ἐπανεμείοντες διψώδεις ἐν τοῖσι τυτοῖσι· κακόν.

Tum qui subinde reuomunt sitibundi; malo sunt loco.

SIGNIS prædictis mortiferæ hypercatharseos, multum adiicitur in causa perenni; cum scilicet finis vomendi non sit, siri oborta. Est enim ratum illud quod. Qui purgantur, finem faciunt sui purgandi, postquam sitiuerint: præsertim si nulla sit causa sitifera, vel in pharmaco, vel in humore, vel in ventriculo: sed tantum à siccitate parta purgando; sitis oborta sit. Nam vnde purgandi primordia esse solent; ibi vis ipsa quiescit bene morata: cum scilicet vacuatio inchoata ex aluo, ibi postremum desinit suctione, qua excitatur suctionis sensus in aluo. Quod si euenerit ut qui purgatio penè absumpti, signa dedere virium exolutarum, ac spiritus & caloris viuifici vanescentis in frigore & sudore; nunc sitibundi crebros instaurant vomitus: hinc sanè pro metu, certa desperatio est, nec vlla vitæ sperabilis erit salus, ubi lethali-
bus signis ab ipsorum causa perenni continenter multum adiicitur. Est autem causa perennis, vomitus implacabilis quem siri excipit inexplēbilis, vnde nulla lenatio est viscerum incendio conflagrantium, quæ bilem sitiferam cum ardore fundunt in fundum alui, & inde in stomachum eius.

20 Οἱ δὲ ἀσώδεις ὁσφύαλγες· κοιλίῳ καὶ θυρεῖνται.

At quibus fastidium est atque lumborum dolor; iis alui perliquidis excrementis feruntur.

VT VOMITURI saluant quibus vomendi spes est à cardiogmo: sic alius infra transmittitur iis qui, cum fastidio cardialgico, lumbis dolent. Sic enim res eunt, atque sic omnis comparata est ratio vacuandi humorem qui ad exitum viam affectat, vt inclinatio eius fiat sursum deorsum: vt est ipsius *ροπή*, naturæ contentio, & aquæductuum collocatio. Ergo quemadmodum de salua, vomitus expectatur, cum adest fastidium cardialgicum: sic in eodem speratur infra transmissio, de lumborū dolore. Sic autem ratio est à præceptore tradita. Dolores, inquit, quorum curatio purgatione suscipitur, vt supra infra ve *diaphragma* sunt: ita purgatio illic sursum; hinc verò deorsum est molienda. Vt igitur cardiogmus & oris amaritudo, per os purgandum suadent: sic alui tormina, cum dolore lumborum, infra ducendum ac transmittendum: quoniam vt ex Hippocrate scripsit Galenus, *καὶ τὰς ῥοπὰς τῆς κοιλίας καὶ τὰς κενώσεις ποιεῖται*. In omni fastidio cardialgico quæ proreperit salua, sursum *τὴν ῥοπὴν* denunciat vitiosi humoris: in eodem verò, lumborum dolor, deorsum. Vt igitur illic vomitio; hinc autem deiectio expectanda: sic etiam sursum deorsumve purgatio molienda medici artificio, ad imitationem naturæ comparato. Quod si euenerit vt cardialgia excipiat *τὴν ῥοπὴν τῆς κοιλίας*; non hæc illius: mutanda erit velificatio, vt scilicet illa *ροπή*, sursum ducatur, quò viam affectat. Est enim supra iam positum quòd. *Dolorifica lumborum mala cardialgica, sunt hemorrhagica.* Sed illa non pugnant cum hac prognosi, manetque firma sententia *καὶ τῆς ῥοπῆς αὐτῆς καὶ κατὰ*, vnde vel accidit cardialgia, vel ofphyalgia.

21 Αἱ ἔξῃθεν μὲν αἰώνων ἰσὶ ἐλλεβόροι καὶ ἀρσενικοὶ ποτηραὶ. καὶ σκληροὶ ποτῖων· κακόν.

Quæ ab elleboro prærubra nigra cientur purgationes; prauæ. Hinc exolutio periculose habet.

CVM RVBER vomitus atque niger, ipsum malè habet periculose vbi sua sponte mouetur: tum verò is maximè quem ciet elleborus, cum temerè datur opera purgationi. Est enim elleborus catharticum vectiarium, *μοχλικόν* Græci vocant, quod, attrahendo atque ciendo, vim omnem superat symptomatici omnis motus, naturam eximie lacerantis. De rubro vomitu, quem sua sponte mouet effusus humor qui eò cursum inflectit, iam illud præceptum est. *Quinetiam ruber vomitus est lethalis; maximèque si agere vomatur.* Nunc autem rubri & nigri quem ciet elleborus, examen sic erit.

QVÆ AB ELLEBORO] Scilicet albo: id enim significat positum absolute, purgatque sursum mouendo, per os: quemadmodum niger transmittendo infra, per sedem:

PRÆRVBRÆ] i. Quæ rubent eximie, siue sit mera bilis vitellina ex flaua; siue sanguis ipse, summa vomendi contentione, ex alui fundo expressus. Tamen si adducor facile vt eum ruborem eximium, sanguinem esse purem: aut etiam prærubræ cuiusdam proluuiei ex *αἱματι* hepatis, vt mox dicetur. Nam cæterorum humorum qui merè sunt flauī, æruginosi, aut nigri; vt vacuatio mala est *αὐτομάτως*: sic *αἱματι* ope cathartici, in bonis ducenda.

NIGRÆ CIENTVR PURGATIONES] Quæ vel in nigro humore, cuiusmodi sanguis est, vel in atra bile cernuntur. De quarum natura iam dictum est ac demonstratum; quòd illa tam signo prauarum affectionum, quàm sua vi calamitosa, pestifera sunt.

HINC EXOLVTIO PERICULOSE HABET EGROTV] Quod est eiusmodi ac si diceret. Siue is exoluatur cum syncope per hypercatharsin qui sumpsit elleborum: siue appareat vis exoluta nobilium partium; vt hepatis, in prærubra proluuie; lienis, in nigro humore, qualis est sanguis: vt partes illas ab elleboro labefactatas iam sui officij tædeat: profectò ad vltima ventum est infirmitatis. Tum ei periculo multum adiicitur, quòd partium exolutarum redintegratio comparari vix poterit, quarum officiis vita hominum diu carere non potest. Atque hic locum habet illa sententia præceptoris de nigris deiectionibus quæ sua sponte ducuntur, vbi est partium exolutio vnde manant.

22 Απὸ ἐλλεβόροι ἐμέσαι ἐρυθρὰ, ἀφρόδια, ολίγα: ὠφελεία ποιεῖ μὲν τοὶ σκληρύνματα, καὶ ἐμπυήσας μεγάλας ἀφίσπιν. εἰσὶ δὲ αὐτὰ ἐμέοντες, ἄλλως τε καὶ σῆθος ἐπώδυνος, καὶ ἐν τοῖς ῥίγεσιν ἐφιδρῶντες, καὶ ὄρχας ἐπαίρονται· πύτυα περὶ σκληρομύους, ἐπὶ ῥίγεσιν καὶ ἰσχυαίνονται.

Sic melius ex capite de lumborum malis. Est autem hæc Coaca prognosis 6. capitis 12. libri 2.

Εν ἀλγήματι ὀσφύος σπινθόνω, καὶ ὑποφορῇ πλείονι, ἀπὸ ἐλλεβόρου ἐμέσαι ἀφροδῆα συχνὰ ὠφέλεια.

10 In dolore lumborum præggrandi, & in larga deiectione, ab elleboro vomere spumantia multa, prodest.

HACTENVS maleficia elleborismi. Nunc beneficia sunt in conspectu: quæ quoniam suprà iam pridem sunt explicata in examine huius prognoseos, ad locum ubi est posita de malis lumborum; sufficit recensere ἀνακεφαλαιῶς in commentarij quem, ut videmur, accuratè illic conscripsimus.

Ergo. IN DOLORE LUMBORVM PRÆGRANDI] i. Qui sæui doloris cruciatu contumaciter ægrum exercet, cuiusmodi est nephritis utraque primi generis, videlicet calculosa & φλεγμονώδης; tum phyma lumborum quod gibberes ipsos facit quos occupat, quibus assurgit τὸ κύρωμα.

ET IN LARGA DEIECTIONE] Non ea quidem quam ciet longa & fortis dysenteria, quæ phyma lumborum exoluit, gibberosque lumbos reducit ad suum ἰσχυρόδες, naturaliter constitutum: quemadmodum & ipsæ varices, quod penè miraculo apponi debet. Sed illa profectò diarrhœa aquosa, quæ diu iam malè habet ægrotum. lib. 3. cap. 11.

AB ELLEBORO] Scilicet albo, qui salutariter adhibetur ad ea pathemata τῆς μοχλίας δέοντα, & febris expertia: quorum præsidia non sunt in manu, sed in catharticis, inter quæ principem locum obtinet elleborismus retrahendo atque radicitus euellendo, & ob id à præceptore hîc positus; non quidem inopia catharticorum, ut scioli arbitrantur: sed meliorum delectu.

VOMERE] Quod est opus ellebori albi: sicut nigri, deicere, & infrà per anum transmittere. Nam ea quæ albus elleborus per os vomendo transmittit; dolorifica illa sunt mala quæ vel toto corpore, vel è longinquis partibus, illac transire oportet. Ac de vi summa purgandi quæ inest in elleboro, attrahendi quæ suprà humorem qui in vitio est; diximus non ita pridem, & aliàs.

SPUMANTIA MULTA] Quoniam illa καλὰς καὶ κρισίμως ab elleborismo apparent. Spumantia quidem, ope cientis cathartici & in purgando impigri. Atque hîc secus de spuma iudicium est, quàm de spumantibus deiectionibus cum sua sponte ducuntur. Illa autem spumantia, multa esse oportet, ut medici votis respondeant: non quidem frequenter & parcè vomendo: sed copiosè, & rarò. Est enim ratum illud; quòd nihil paucum, fit καλὰς καὶ κρισίμως. Tum verò damnantur à præceptore τὰ σμικρὰ ἐμέσματα, καὶ τὰ ἑγὼς ἀνῆλθον ἴοντα, i. parui vomitus, & frequentes. proth. 26. l. 2. 1.

PRODEST] ὠφέλεια, non ὠφέλιση: ut ipsum verbum sic positum, certum præsidij adiuumentum denunciet, omnémque adimat dubitationem adhibendi. Itaque prodest vomere in diarrhœa longa, retrahendi causa id quod in ventrem confluit. Atque id conuenienter suscipitur medici artificio, ad imitationem naturæ; qua duce, per vomitum diarrhœa longa quiescit. Prodest autem vomere multa spumantia quæ humoris morbifici retractionem sursum testantur. Quinetiam prodest elleborismo, causam morbificam diarrhœæ vomendo excludi: quia ellebori magisterio melius quàm cæterorum ἐμετηρίων, velificatio, tum ipsius naturæ, tum humoris morbifici sursum infernè muratur. Ad phyma lumborum, quod vertit ipsorum ἰσχυρόδες in κύρωμα; tum ad nephritidem, elleborismus vnicè commendatur atque mirificum adfert leuationis fructum. Sunt autem rubra spumantia quæ ex lumborum phymate attrahuntur.

23 Αἱ πυκναὶ διὰ τῷ αὐτῷ ὑποσφοφαὶ ἐμετώδεις· ὡς ἐκ κρίσιν, μέλανα ἐμετῶ ποιεῖοσι. γίνονται καὶ τρομώδεις.

Crebri, cum vomitu, pari modo relapsus; nigrum cient vomitum circa crisin. Sunt etiam tremoriferi.

COMMENTARIJ nostri quem suprà scripsimus in hanc prognosin; hæc erit ἀνακεφαλαιῶς.

CREBRI RELAPSVS] Cum scilicet febris, quæ visa est vale dixisse ac discessisse, reuertitur, quod Græcis est ὑποσφοφέν. Reuertitur autem.

60 PARI MODO CVM VOMITV] i. Eadem ratione, periodo, atque causa. Ac ratione quidem, cum iisdem symptomatis atque signis; ut annorauit in Thasia illa muliere δυσανίω, cuius res ibant δὲ τῷ αὐτῷ, i. cum crebra delirij & conuulsionis vicissitudine. Sic in Heropyto crebra fuit vicissitudo surditatis & doloris coxarj. Pertinet quoque ad periodos recidiuarum, quibus crebræ sunt admodum febres, vox illa, δὲ τῷ αὐτῷ, ut scilicet veniant recidivæ: quemadmodum idem scripsit, καὶ λέγον τῷ ὑπο-

σφοδρῶν. Qui ordo & tempus in typis atque periodis recidiuarum, apparet in fratrum historia quos narrat Hippocrates vnā in febrem incidisse: qua quidem, vt videbatur, exacta; in eandem rursus, eadem hora simul ac pariter recidisse. Nam causæ recidiuarum, ob quas tam crebro eueniunt recidiuæ, meritiò ius habebunt *ἡ δὲ τῶν αὐτῶν*: cū intellexerit medicus ipsas accidere, si vel importuna est morbi exacerbatio, vel importuna excretio, vel etiam si quid exacti morbi reliquiarum superfit. Atque tres illas recidiuarum causas Hippocrates sic expressit, *ἢ αὐτὴν περὶ τῆς ἀφύπνου, ἢ περὶ τῆς ἐκκρίσεως, ἢ ἐκ τῆς ἀπείρου, ἢ ἐκ τῆς ἀπείρου, ἢ ἐκ τῆς ἀπείρου, ἢ ἐκ τῆς ἀπείρου*, i. si quid ante tempus aut erumpat, aut iudicetur, tum si quid residuum superfit.

NIGRVM CIENT VOMITVM] Quia nigrum sit excrementum, quod prius erat flauum: atque id tum febris ardore, tum crebro relapsu: quibus accedit crebro irrita ventriculi proritatio. Sic in phreniticis iam pridem ostendimus, ac nuper attigimus; quòd eorum ptyelismus cum frigore aut rigore, vomitum nigrum mox adfuturum denunciat. Vbi Galenus author est; vomitum quidem, salina; nigrum autem, rigore denunciari.

CIRCA CRISIN] Non illam quidem salutiferam, cuius est prærogatiua nominis absoluti: sed planè mortiferam atque funestam. Non enim mutatio est salutaris, nec verè critica, vomitus nigri ex flauo. Et verò nouum non est, nomine absoluto crisis, funestam ostendi: sicut in illo. *Γλαύκων δὲ σφόδρα ἀναγομένη κρίσις ἐν πεντηκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ διαί. i. Lingua autem quæ multum nigrescit; crisis decimoquarto die futuram ostendit.*

SUNT ETIAM TREMORIFERI] Porissimum manibus, dum stabulatur bilis in aluo, & ad vomendum cietur, quæ illis in partibus molestiam exhibet frigoris & tremoris, per sympathiam alui concussæ & feruidæ à bilis ardore & morsu.

DE SVDORE.

CAP. II.



ΔΡΩΣ ἀριστος μὲν, ὁ λύων τῷ πυρετὸν ἐν ἡμέρῃ κρισίμῳ. χεῖσιμος δὲ καὶ ὁ κουφίζων. ὁ δὲ ψυχρὸς, καὶ μόνῳ πρὸς κεφαλῇ, καὶ τράχηλῳ γινόμενος. φλαδρὸς καὶ γὰρ χέρον καὶ κίνδυνον σημαίνει.

1 Sudor ille quidem est optimus, qui die critico febrem exoluit. Utilis autem qui leuat. Verum qui est frigidus, ac solum circa caput & collum exudat; prauus. Etenim ad diuturnitatem & ad periculum talis apparet.

INTER MORBORVM communia epiphænomena, tum propria febrium acutarum, sudor est instar omnium, quæ vel salutis fida spe nos consolantur, vel metu exterrant difficilis aut sinistri iudicij. Nam qui, natura ducè, conuenienter cietur; præclarè ad salutem suscipitur. Atque is febrem exoluit, aut certè facit vt æger alacrius ferat morbum leuatus. Huiusmodi sudor effectricem sui causam agnoscit excretionem feri eorum qui sunt in venis humorum, per totum corpus meabilis, quòdque humescit cū fuerit antè siccum. Atque illa excretio liberalis & libera per totam compaginem, si quidem suis indicibus denunciata fuerit, qui tum ad speciem ipsam crisis, tum ad tempus apparent; morbum ex toto adimit, vt nihil omnino reliquiarum superfit, nec empyrenmatis, nec humoris morbifici. Indices qui apparent ad tempus, secundi iudicij sunt; vrina bellè colorata, & bona hypostasis; quorum illa est mitescens morbi, hæc verò naturæ mox redintegrandæ: propterea quæ crisis ostendunt sperabilem die septimo, si quarto veniant in conspectum. Vrinæ suppressio, non quidem nephritica, sed rigorifera, cū in propinquo est crisis; ipsam sudore susceptum iri testatur: vt veteres annotarunt, & in conspectu nobis est, penè dixerim, quotidiano. Ex quo efficitur, non aliam esse materiam sudoris excreti naturæ imperio, quàm vrinæ. Quòd si euenerit vt ante signa perfecti pepasmi, liberaliter sudor exeat *ἀεὶ μὲν*, discessionem adferet febris diurnam, efficietque vt æger facilius exigar paroxysmos diurnos. Atque hæc de sudoribus *καὶ φύσιν*, quorum materia est tenuis quidam humor atque serofus qui κατὰ τὴν ἐν venis ad cutim expellitur, & illac effluit, non autem ab ea elicitur: quod fieri solet *ἡ δὲ πλεονεξία* laconici, balnei, Solis, arenæ, &c. Nam sudor omnis qui effluit symptomaticus, non est moueris naturæ, nec excernentis ad crisis, vel ad ægri leuationem: sed exprimentis morbi, aut solidarum partium exolutorum. Sic enim præceptor ait de omni sudore qui symptomaticus promouetur vel excidit. *Κατανοεῖν δὲ χρὴ τὸ συμβῆναι αὐτῷ ἰδρῶτων. γίνονται γὰρ οἱ μὲν δι' ἐκφυγὴν συμμάτων οἱ δὲ διὰ συντονισμὸν φρεσμονῆς. i. In vniuersum autem, sudorum ratio est tenenda: exeunt enim alij quidem virtute corporum exoluta; alij verò ardoris vi. Et verò Galeni indicium est de omni sudore symptomatico; quòd velut symptoma est τῆς κατὰ τὸ σῶμα πλεονεξίας, καὶ ἀπὸ τοῦ χυμῶδους, i. nimie abundantie prætorum in corpore humorum. Sed idem illius sudoris vel expressi, vel exudantis, propterea quæ*

præcæque symptomatici; causas ita diffinit. Ο μὲν οὖν ἐν τῇ φύσει, καὶ μὴ ἐν τῇ κρίσει ἰσχυρὸς ὁ ἰσχυρὸς, ἢ ἀρρωστὸς ἐν-
 10 *προκτ. 8.*
1. 1.
 abundantiam, aut retentivus potentie infirmitatem ostendit. Et cum sudor omnis, causa unde cietur, aut nimiam
 exundat, & ἐκέρχεται, i. sudatiuncula nomen habet. Cernitur autem illa ἐκέρχεται, vel in toto corpore, cum
 pauco sudore tota compago est roscida; vel in thorace, capite, ac cæteris denique, ubi vis morbi firmi-
 ter fixa hæret. Tum illa sudatiuncula, vel uniuersi corporis, vel aliquarum partium, leui aut graui nasci-
 tur maleficio atque periculo; ut qualitate, copia, tempore, & exudandi modo apparet. Quæ omnia cu-
 iusmodi sint, tum duce natura, tum magisterio morbi atque humoris; tum autem singula suis quæque
 10 signis distincta, quorsum appareant; planum faciet ipsum examen prognoscos quod sic aggredimur.

S V D O R] i. Effluuium tenuis ac serosi humoris per cutim totius compaginis. Qualis enim est seri
 collectio in vesica, eorum qui sunt in venis humorum *αἷος ἔρρη*: talis eiusdem serosi humoris in tota
 compagine *αἷος ἰσχυρὸς*. Nam & sudore sistuntur vrinae: sicut vrinae profluvio sudor compescitur. Ac no-
 num non est, omnem proluuium toto diffusam corpore, ad vrinae ductus confluere, ac meiendo efflue-
 re. Nota est illa sententia præceptoris. *Ἐπὶ ῥίνας αἰ ἐκέρχεται ὁ ἰσχυρὸς, &c.* i. Ante rigorem vrinae sistuntur. *6. Epid. part. 3.*
 Loquitur autem de critico illo rigore sudorifero qui cadit in febre ardentem. De quo est illud præceptum.
Ἦν καὶ ὁ ἰσχυρὸς, ῥίνας ἐκέρχεται ὁ ἰσχυρὸς. 1. Qui occupatur causo, rigore superueniente; exoluitur. Vbi iudicium
est Galeni; quod καὶ αἰσθητὸς τῆς πύλης ἐκέρχεται ὁ ἰσχυρὸς, ἢ ἡ φύσις τῆς πυλῆος, i. purgata bile causi effectrice; fe-
bris ipsa exoluitur. Atque hæc bilis mirificata pepasmo, exitum habet per cutim, eò violententer expulsa.
 20 Nam quæ est crassior, nec ita meabilis; in cute subsistit, & icterum edit criticum, qui balneo dulcis æ-
 quæ sanatur, nec ullis eget præfidiis quæ vel in manu sunt, vel in cathartics, nec denique vllis potioni-
 bus medicatis. Commemorabile autem est quod scripsit Galenus de sudoris materia, quæ est *ἡ ἐκέρχεται ὁ ἰσχυρὸς*
δύς, ut ipse nominat. De qua sic ait. Τῆς ὀρρῶδὸς ὑπερβολῆς ἐμαθὺς, ὅταν πλεονάζῃ, τῆς (τῇ) κατὰ φύσιν, ἢ δὲ ῥίνας, ἢ δὲ ὑπὸ
τῶν δὲ ἰσχυρῶν. 1. Serosi humoris, cum eius nimia est abundantia, triplex est omnis vacuatio; una per aluum, altera
per vrinas, tertia per sudores. Sed illa solennis est observatio præceptoris, ac legibus medicinæ fundata in
febre tritæphya quæ illis temporibus Thasi regnabat, omnesque quos inuaserat, periculose habebat:
ubi narrat præceptor, multos periculo ac febre defunctos fuisse, quibus conuersio facta est ad strangu-
riolam vrinam. Ibi Galenus hæc scripsit. Ὡς περὶ δὲ ῥίνας πολλὰς οὐκ ἀπαίρεται τὸ σῶμα, ὅταν καὶ δὲ ῥί-
νας, καὶ ῥίνας. 1. Quæmodum corporis uniuersus expurgatur per aluum: sic etiam per vesicam ex renes. At-
 30 *que hæc de sudoris materia, qui natura duce in morbis, velut symptoma mouetur: nisi forte altera sta-*
tuatur quæ partibus excidit resolutis, quæ est ipsarum succus alibilis, cui appositio denegatur, quando
ad vltima ventum est. Ὡς περὶ δὲ ῥίνας πολλὰς οὐκ ἀπαίρεται τὸ σῶμα, ὅταν καὶ δὲ ῥίνας, καὶ ῥίνας.

ILLE QUIDEM EST OPTIMVS] i. Salutis fidissima, ad quam præclare apparet & facit:
 vel in quo summa sunt omnia vtilitatis & securitatis. Ac mala quidem abesse testatur doloris vacuatas.
 Bona verò inesse, solida mollitudo, succique plena, & ipsa æqualitas. Sic de vrina iudicium est, quæ di-
 citur esse optima, brevis morbi, & fida salutis, cum inoffenso cursu apparet bellè colorata, cum bona
 hypostasi. Sed ut reuertar ad summam bonitatem sudoris. Eius quidem optimi τὰ *κατὰ φύσιν* sunt hæc.

QVI DIE CRITICO] Cum scilicet naturæ & morbi certamen est in procinctu: cum nimirum
 ediris signis pepasmi ad tempus, tum iis quæ ad speciem crisis apparent, natura proritata insurgit, &
 40 summa contentione, suæ ἐκέρχεται in paroxysmo febris aduersus eam exercet. Quæ ratio critica, secundi
 iudicii esse solet, tum causa critica conuenienter naturæ & morbi suscepta, nunquam ægrotum, nec
 medicum spe lætat inani. Nam ibi demum excretio critica votis respondet medici, cum ea perfectè
 mouetur, conuenienter morbo, ac signis perfectis pepasmi iam indicata fuit illis diebus qui sunt indices
 criticorum. Excretio critica conuenienter morbo & naturæ perfectè mouetur, cum die critico denun-
 ciato ab indice, victricis naturæ sit ἐκέρχεται. Tunc enim fida est crisis, & à crisi leuatio. Nam die ἀκρίτου μο-
 tus omnis ad crisin, ἀκρίτου inducit, quæ ab irritō erethismo causa est τῆς ἀκρίτου. Notum est illud præ-
 ceptoris. *Τὰ κρίματα μὴ κρινόμενα ἢ δύνανται, ἢ θανάτῳ δύνανται. 1. Quæ sunt critica sine crisi; aut sunt sinistri iudicii; aut*
lethalia.

Ergo. SVDOR QVI DIE CRITICO] Qui suum habuit prænuncium indicem cum perfectio
 50 pepasmo, & qui cadit in paroxysmum periodi quaternariæ & septenariæ; cum scilicet irrita esse non po-
 test ipsa naturæ ἐκέρχεται: sed triumphalis in sua virtute victrice; tum in pepasmo humoris morbifici, &
 mearum libertate. Quæ tria sunt excretionis perfectæ præfidia, quæque in morbum alio die quàm cri-
 tico ius habere non possunt. Nihil enim bene fit neque apparet tunc & verè ad crisin, nisi diebus illis in
 quibus de signis mitescens morbi & redintegrandæ certò naturæ, ipsa redintegratio per neoterismum
 & per amotionem causæ morbificæ comparatur. Ac ratio quidem redintegrandi, cernitur primùm die-
 bus indicibus in signis pepasmi; post autem iudicibus, in liberali ac libera exclusionē humoris morbifici.
 Quæ cum ita sint; ne à sudore discedam, is quidem multum habet vtilitatis & securitatis, qui paroxys-
 mum finit quaternarij alicuius, si primum exceperis, intra vigesimum, aut septenarij, à vigesimo ad
 quadragesimum; aut vicenarij, à quadragesimo ad centesimū usque, & vltæ. Primam excepi periodum
 60 quaternariam in morbis imparium paroxysmorum, vel qui diebus imparibus exacerbantur: quod extra
 paroxysmum nihil bene ac criticè moueatur. Sic Thasiam illam *δυσανθίαν*, quam exercebat crebra delirij &
 conuulsionis vicissitudo, illis symptomatis ac febre ipsa defunctam fuisse narrat Hippocrates hac ratio-
 ne. *Ἐξ ἡμέρας τῆς πέτης ἰσχυρὸς πολλὸν ἔρρη δὲ ὅλα ἀπορροήματα πᾶσι κατὰ φύσιν ἐκέρχεται, καὶ τῶν πέτης ἡμέρας. 1. Sub vo-*
luntate tertia lucis exactæ, totum illi corpus calido ex multo sudore diffudit: febris exers dormiuit; omnino respiciit;
ac circa tertium diem crisin habuit salutarem. Nam Periclem Abderitam, die quarto sudorem criticum & fa-

hist. 1. part. 3.
 3. Epid.

hist. 6. part. 3.
 3. Epid.

lutarem expertum fuisse, idem præceptor scriptum reliquit his verbis. Τετάρτη δὲ μέσσι ἡμέραις, ἰδρῶσι πολλὰ θερμὸν δὲ ἄλγος ἐκέρχεται, ὅτε ἰσχυρὸς ἔσται. i. Quarto die sudare toto corpore, multo sudore calido: indicatus est febris exers, nec inde relapsus. Antea verò scripserat, quòd δευτέρῃ πάντα παρὰ μέτρον, τὰ μέντοι ἔξ παλαιῶν τῶν λυγρῶν, ἰδρῶματα δὲ μάλλον, & τὰ πάλιν ἄσπετον ἐκέρχεται, ἐκαιμῆται. πρὶν πυρετὸς ἐμαλάσθῃ, ἔρπον πληθὺς, πέπνα πολλὰ ἰσχυρὰ ἔσται. i. Secundo die omnia sunt exacerbata. Ac sanè tum crasse quidem erant vrinae, sed residentes: fastidium est leuatum; somnum iniuit. Tercio febris misuit. Copiose vrina ac multa participes hypostasceas. Vbi Galenus author est; quòd ex vrinis optimis quæ fluxerant plurimæ die tertio, perspicuum erat hominem morbo defunctum in proximo die quarto qui iudicandi ius habet in morbis qui paribus exacerbantur, & sunt acuti. Scitum est illud. Quæ paribus exacerbantur; paribus iudicantur. Plurimum autem facit ad fidem catholici theorematism, historia virginis Larissæ, quæ occupata febre καυσώδει cum sæuis symptomatis, vt in angusto spes esset ac triplici foco repletionis naturalium, capitis, & venarum; triplici vacuatione, discessionem febris omniumque symptomatum est consecuta criticam die sexto; vnā per mēstruorum liberalem & liberam purgationem; alteram per hæmorrhagiam è naribus; tertiam per sudorem toto fluentem corpore multum & calidum. Ratio autem critica eò fuit utilis die sexto à summa contentione atque conatu naturæ multum oppressæ, multumque prostratæ, cum tamen nulla subesset maligna vis, nec inflammatio: quia, vt narrat Hippocrates, οἱ πόνοι ἐν ἀρτίῳ, i. molestia omnis erat & exacerbatio paribus quibusque diebus. Sed paroxysmis dierum imparium sudor est criticus, in quo est omnis ratio τῷ ἰσχυρῶντι ad crisin. Sunt autem sudoris ἰσχυρὰ κρίσιμα, tum ea quæ faciunt vacuitatem febris, tum quæ ad ipsam apparent. Ac primum apparent diebus indicibus signa pepasmi ad tempus: tum fugax vrinæ suppressio ad speciem ipsam crisis, quando certamen est in prociectu. Discessionem adfert quæ iam sperabilis visa est, sudor quo diffuit totum corpus multo & calido, die crisis. Atque illa sudoris ἰσχυρὰ κρίσιμα, verè sunt κρίσιμα; propterea quæ εὐκρίτα. Nam cætera δύσκριτα in sudore, hæc sunt ἀσώματα. Δύσκριτος est ille sudor qui finit in nulla sperabili discessionem, quod scribit Hippocrates; πυρετὸς μὴ διδόμεντος, nec facit vt æger alacrius ferat morbum. Ergo sudor multus & calidus qui totam compaginem occupat die critico & iam sperabili antè crisi; solus est omnium qui febrem exoluit. Sudor huiusmodi, mulierem grauidam fœtus trimestris, decimoquarto reddidit febris expertem. De Abderita virgine scripsit præceptor; quòd à sudore plurimo ad 27. diem oborto, vacationem habuit febris & surditatis; superstitie tamen pedum dolore. Anaxionem sudor sanauit; 4. febris die, qui septenarius est secundus à vigesimo, quo illi primum sudor manauit, ac febrem dimisit, in quam relapsus est vigesimoseptimo. Atque hæc de quaternariis criticis ante vigesimum, & septenariis post vigesimum, qui iudicandi vim suam per sudores ostendant. De vice-nariis autem penes quos à quadragesimo ius criseon esse solet, solennis est illa Hippocratis obseruatio in Cleanactide, quem scribit octogesimo die sanatum fuisse, adiutum naturæ hisce præsidiiis. Octogesimo die riguit; febris acuta inuasit; multo sudore disfluxit; mixtus hypostasim rubram leuem: indicatus est perfectè. Ergo tum demum criticus erit sudor, qui adferet finem febris, eum eius ratio critica omnis erit in qualitate, copia, tempore, & excernendi modo. Vt scilicet calidus multus die critico per totam compaginem profluat. Secus est ægris ab omni sudore in quo aliquid desideratur eorum quæ posui ad faciendam crisin. Exempla sunt passim apud Hippocratem, tum in historiis, tum in aphorismis, quæ proferuntur post, cum ea ponentur quæ à sudore optimo iam explicato discedunt.

FEbrem EXOLVIT] Qui febrē sanat. Id enim tributum est verbo, *λύει*, vt in illo. *Λύει δυνάμει* *ἔλιν ἰσχυρῶς ἀδυνάμων*. i. sanare apoplexiam fortem non potest. Et verò nomen, *λύσις*, ab eo deductum; idem est quod sanatio, vt. *Eius qui occupatur à causo, cū rigor inciderit, λύσις*, i. sanatio. Ergo sudor optimus, die critico febrē exoluit; vel, vt præceptor loquitur in prognosticis, *πλείους τ' πυρετῶν ἀπαλλάσσει*, i. perfectè, sive totum febrē excludit. Est autem sanatio; ἢ *ἡ ἐκ τῶν ἐπιπορώσεως*, i. eorum quæ sunt egressa è norma naturæ, reintegrationio, quæ à sudore critico comparatur, postquam sunt edita signa pepsismi, & nuper cœptæ reintegrari naturæ. Alioqui frustra cietur sudor, cū manet egressio visceris in sua phlogosī, aut venenata qualitas crudi humoris morbifici. Quod annotauit Galenus in Larissæa virgine, quæ triplici vacuatione oborta de improviso, ad triplicem focum repletionis, curationem recepit morbi grauissimi, nati ex eo quod menstrua detinerētur tam intus in locis cohibita, quàm in maioribus venis collecta, & sursum ad caput transmissa. Ex quibus secuta est liberalis vacuatio menstruorum, sudoris, & hæmorrhagiæ, vnde conualuit sine relapsu. Quod non fecisset profectò, si aliqua inflammatio, vel humoris maligna cacochymia, & venenata qualitas resedisset. Ergo sudor criticus, in quo nihil deest, febrē exoluit, & per *ἐπιπορώσεως*, suum naturæ restituit *κατάρθεμα*; quo ipsa deducitur ad conseruationem sui, sine molestia; fruiturque omnibus commodis quibus vita hominū sustentatur. Tali sudore homines solent *πλείους κερταδεῖν*, i. indicari perfectè in morbis acutis, nulla superstite morbi materia, nec empyreumate. Est igitur optimus ille sudor qui febrē exoluit, atque tot commodis beat ægrotum.

Vtilis *CAVTEM*. i. Qui multum habet utilitatis, valétque ad ægri dulcedinem. Atque hic fit dor vocatur à præceptore *à ægri*, i. *bonus*, qui bene fit atque apparet, non tamen omni ex parte, nec absolute, ut prior qui hunc sanandi virtute præcedit. Subiungit enim.

QUOD SIT LEVATIO IN AGRO] Ac si diceret. Est quidem optimus ille sudor qui febrem exolevit: sed tamen hic etiam bonitatis laude non caret, qui leuat agrotum. Qualis autem sit illa levatio, tum sudor ipse qui leuat; sic in prognosticis aperietur. *Azardus de orbe igneo, lib. 6. cap. 7. p. 109.* Bonnus autem est ille qui toto effusus corpore, plane ostendit agrum alacrius ferre morbum. Atque hic sudor tantum est commendabilis qualitate, copia, & excernendi modo. Nam die critico non effluxit. Quæ dici ratio præter ceteras, imprimis necessaria est ad faciendam crisin. Huiusmodi multa sunt genera excretionum levantium, quæ cernuntur in hæmorrhagia, deiectione, vomitu, &

aph. 56.4.
hist. 13.
2. Epid.
hist. 8. par. 3.
3. Epid.

2ph.58.4.

vomitum, & urinis: ex quibus morborum symptomata minuuntur, & aegris alacritas comparatur. Omnia autem duce natura suscipiuntur & absoluntur; proptereaque dicuntur $\chi^1 \lambda \acute{o} \gamma \sigma \tau \kappa \chi \tau \acute{\iota} \epsilon \tau$: alioqui non esset fida, sed insidiosa lenatio.

VERVM QVI EST FRIGIDVS] Hæc prima defectio est sudoris à bono & optimo, à quo
 longissimè abest omnium: propter eamque pessimis ægri rebus, & signo, & causa. Signo quidem: quoniam
 excrementum in habitu corporis frigidum, contra naturam est febris acutæ, cuius insigni æstu par erat
 totam compaginem corporis & humores incanduisse. Ex quo apparet, viscera cōflagrate, aut lipyriam
 febrem subesse cum habitu alio, de quo exprimitur sudor hic frigidus, à paupertate caloris viuifici, quo
 partium solidarum viuacitas defraudata, excrementis fœta est frigidis, qualia in sudore exudat. Hæc ita
 sunt in acutis febribus quæ tamen simpliciter non sunt acutæ, vt illæ quarū prægradis æstus toto æqua-
 liter corpore est diffusus: atque hac vnica ratione differunt ab ardēribus & lipyriis, quæ inter acutas exi-
 miæ sunt in æqualitate ardoris. Sed tamen quemadmodum in causo & aliis peracutis, per tempestatem
 pestiferam, regnabant symptomata obliuionis atque soporis, febrium quidē illarū ardori minimè con-
 ueniētia, sed consentanea cataphorica tēpestati austrinæ: sic & hoc loco sudor frigidus esse potest, non
 quidem merito febrium acutarum quarum incēdio cita caloris natui extinctio esse solet: sed cruditatis
 vicio, cuius nimia abundantia prius vim expexit ardoris febrilis in effluentia, quàm mutationem ha-
 buerit sui frigoris in calorem. Quæ res adduxit Hippocratem, vt eum sudorem, *χλιδόν*, i. *pessimum* iudica-
 rit; quod scilicet bonorum signorum accessione, à mortis periculo, quod ipse ostēdit, abduci nō possit,
 cuius funestum indicium clariùs multò expressit his verbis. Ο ψυχρός ιδρώς οὐκ ὄζει ποτὲ τὸ γινόμενος ἄνακτον
aph. 37. 42.
 i. *sudor frigidus in febre acuta; mortem subesse testatur.* Est autem febris acuta, vnde cietur hic sudor,
 causa & signo mortifera. Ac signo quidem: quia ostēdit tantam humorum copiam frigidorum; vt à fe-
 brili ardore mutari nō possint; ac prius moriēdum sit ægro, quàm incaluerint; præsertim cū cita mors
 veniat, vbi cum tanta copia cruditatis, dominatū febris acutæ vires franguntur, omniæque naturæ præ-
 sidia collabuntur. Sudoris huiusmodi, cæterarūque causarū signa funesta leguntur in quadā puerpera,
 quæ cū à partu molesto pèrque difficili, in febrem grauissimam incidisset, atque die secundo febris
 sudasset in capite ac circum paucos & frigido; & cū ad septimum ventū esset, toto corpore sudor ma-
 nasset frigidus; decimo quarto interiit: celerius interitura, nisi beneficio ætatis annorum septemdecim,
 ad illum vsque diem spiritum produxisset. Verū sudoris frigidi à cruditate orti conditio est secus ab
 ea quam modò exposui; cū scilicet nactus est febrem, assiduam quidem illam, sed tamen remissionis
 participem; nec vehementia & celeritate acutam; nec viscerum inflammatione ardentem; nec lipy-
 riam, ventriculi erysipelate. Hanc febrem Hippocrates nominat *πορὴν πύρετον*, comparatione acutæ
 quam prius posuerat signo & causa frigidi sudoris funesti. Eandem simpliciter vocat *βληχρόν*, quam re-
 ctè Galenus interpretatur *χλιδόν*. Ergo sudor frigidus, cum tepida febre ac miti, ad morbi apparet lon-
 giquitatem, vbi sperabilis est vitæ salus, si vires ægri sint validæ, cum securitate, ac sine vllō infirmita-
 tis metu. Nam vbi sunt vires infirmæ, non est in tuto æger; ne à mitissima quidem febre; Ratio autem
 longioris morbi, & vitæ sperabilis in sudore frigido cū febris est mitior; spes est pepasmi, ope calo-
 ris natui, atque adeo ipsius naturæ per solidas partes diffusæ, quæque ipsarum virtus est singularis: Hæc
 autem plus valet mitificando crudum humorem, quàm febris polita, infringendo naturæ præsidia, &
 absumendo calorem natuum. Sed tamen vt læta victoria caloris natui, periculum mortis præcedit à
 febre: sic difficultas pepasmi, ob copiam & contrumaciam crudi humoris, facit vt morbus trahatur in
 verustatem. Atque hæc, de sudoris frigidi qualitate, prognostica in febre vtraque. Nam alia quoque
 huius occurrit consideratio, vbi parte aliqua tantum exudat. Est autem sic posita.

50 *Α. C. S. O. L. V. M. C. I. R. C. A. C. A. P. V. T. E. T. C. O. L. L. V. M. E. X. V. D. A. T.]* Enimvero
 sudor frigidus iam, qualitate prauus, multum adiicit prauitati ac maleficio, excretionis modo & lo-
 co. Loco quidem; si tantum in capite & collo exudet: modo autem; si exitu pigro velut miliaris exu-
 det. Est quidem sudor frigidus, febris acutæ aut mitis, toto diffusæ corpore; proptereaque sudorem il-
 lum cientis per totam compaginem; qui quorsum appareat, satis superque diximus. Hic autem sudor est
 frigidus, qui numeros omnes absoluit *ἢ ἐφιδρώσεις*, i. *sudatiuncula*, omni ex parte pessimæ, & cuius vitio
 nihil posse adiici videatur. Nam talis sudor enascitur *διὰ τὸν ἐκλιπὲν ὅβ. μορίων; καὶ νεκρὸν ὡς ἐμψύου θερμα-
 σίας*, i. *exoluta partium ipsarum virtute, et emortuo calore nativo*, unde apparet tum impotentia continen-
 di & apponendi succum alibilem; tum verò ipsius refrigeratio. Itaque talis sudor, auctore Galeno,
 non venturam solùm, vt calida sudatiuncula partibus illis oborta; sed incipientem iam syncopen planè
 ostendunt. Et verò sudor omnis qui tantum occupat caput & collum, tametsi non frigidus, semper in
 malis ducitur, & ad syncopen mox adfuturam apparet. Nota est illa prognōsis primā omnium huius o-
 peris. *Qui à rigore perfrixerint, caputque et collum doluerint; hi, voce capti; oborta sudatiuncula, vt se college-
 rint; moriuntur.* Pertinet quoque hic locus ad eum sudorem thoracis, cum empyema subest. Tum ad
 lumborum sudatiunculam, de qua est illud præceptum. *Ἐβρί ex lumbis ἡρότες, cum citæ caloris vicissitu-
 dine, vt difficulter feruntur: ita denunciant vrinæ suppressionem.* Ac tum pestifera est sudatiuncula. Ne longum
 faciam; vbi est ephidrosis, ibi & morbus Galenus auctor est; id eò fieri, quòd vel oppressæ sint partes
 humore morbifico, vel exolutæ suæ vi recitrice: proptereaque nullam ephidrosin posse videri criti-
 60 ca, sed toto genere symptomaticam. Vt igitur excretionis loco, sudor est bonus aut malus, in simili
 qualitate (nam frigidus nunquam est bonus:) sic modo excretionis, boni aut mali sudoris distinctio
 esse solet. Sic enim iudicium est præceptoris. *Οἱ κεχροειδές καὶ μῦνον περὶ τὸ πρᾶξιλον γινόμενοι ὀντροί. οἱ δὲ μετὰ
 σπασμῶν καὶ ἀτμίζοντες ἀσχοί.* i. *Miliares ac solùm circa collum; pestiferi: qui autem cum stillis vaporant; boni,*
 Quod sequitur de sudore, qui vt symptōma,

AD DIVERTNITATEM VEL AD PERICVLVM VITÆ APPARET] Ratio est
omnis adducta cur ita sit: vt longiori disputationi nullus restare locus videatur.

2 Ἰδρῶς δὲ ψυχρὸς, ἐν ὅξει μὲν πυρετῷ· θανάσιμος. ἐν πρηνιτέρῳ
δὲ· χρόνον σημαίνει.

*Sudor autem frigidus in acuta quidem; lethalis: in tepida autem;
morbi est diuturni.*

H V I V S prognoscens τὸ ἐπὶ καὶ τὸ δὲ ἐπὶ modò iam vidimus.

3 Ἰδρῶς ἄμα πυρετῷ γινώμενον ἐν ὅξει· φλαῦρον.

Qui una cum febre incidit sudor, si est acuta; pestiferus.

2. Epid. part. 2.

V E T V S illud scitum est de criticis rebus morborum. Τὰ κρίσιμα μὴ αὐτὰ ἐπιφανέτω. i. *Quæ sunt mor-*
borum critica; siue sit crisis ipsorum, siue signa eò spectantia; ne statim appareant. Omnia enim critica,
ibi sunt δέκρῃα, vbi non sunt eiusmodi qualia solent esse in crisi. At nulla quæ sunt, quæque appa-
rent; eiusmodi esse possunt, vt spectent ad crisin, sicut aliàs spectare solent; quando natura morbifi-
cis causis opprimitur, estque humorum cruditas. Atque vt paucis dicam de signis quæ solent spectare
ad crisin, si non sint eiusmodi. Quæ signa sunt hæmorrhagiæ loco edita, si ἀκρίτως apparent: ita sunt
dyscrita, vt phrenitidem ipsam mox adfuturam denuncient. Nam quod ad causas attinet; sufficet su-
dor hic positus qui speciem præ se fert criticam: sed acrisiam post se relinquit, quæ dyscritiam infert, aut
certè ad vetustatem morbum adducit. Quod si quis obiiciat; quædam existere κρίσιμα, vnde cita est
crisis cum citò apparent, vt πύρετος in plenitudine; sciat is velim, hæc locum habere vbi systrophica est
viscerum inflammatio: sicut in tunica costis intexta, vbi mortifera vis est, nisi dolorifica mala exitum
citò habeant liberalem & liberum. Est enim multò melius, rheuma ὀρμώμενον citò exire, quàm nobi-
lissimæ partis quò fertur, systrophicam & lethalem, aut certè cum spe angusta, inflammationem mo-
uere. Secus est in morbis acutis, vt febribus quæ celeriter, continenter, & vehementer mouentur;
quæ à motu, collectione, & putredine humoris morbifici ortum habent, nec sunt nobilium partium
inflammatarum symptomaticæ: vnde vel ipso febris nomine excluduntur. Huiusmodi febres acutæ
solo curantur pepasmo, quem edit naturæ redintegratio parta neoterismo; indeque humoris morbi-
fici vacuatio, vnde, quemadmodum, & quando, eadem natura duce, oportet. Verus est illud Hip-
pocratis. Ἀκρία ἢ πέπεισται δὲ τὸ συμφερόντων χρόνων πάλιν αἱ οἱ πεπασμοὶ ἐκ τῶν χρόνων. i. *Ducendum quòd est quæ hu-*
morum inclinatio est: nisi quorum pepasmi temporibus comparantur. Tum illud quod sequitur. Οἱ πεπασμοὶ
ἔξω ἢ εἰς τὸ πέμπουσιν, ἢ ἀλλῶ ὅπῃ δεῖ. i. *Pepasmi aut foras aut intus cursum inflectunt, aut aliter quòd est quæ oportet,*
videlicet ad abscessus. Atque illa præcepta pertinent ad artificem, cuius est artificium imitando
naturam. Ergo vt redeam ad sudorem, & scriptis ostendam quanti naturæ intersit, ipsum loco exire; sic
ad examen adducam huius prognoscens quæ sic habet.

QVI VNA CVM FEBRE INCIDIT SVDOR] i. Qui statim effluit febre oborta, &
cuius nulla est alià πρόφασις. i. *præuidencia* quàm ineuntis febris, ac de improviso cum febre occupat to-
tum corpus. Quemadmodum autem & quorsum id fiat; planum faciet eius quod sequitur explicatio.
Sequitur autem.

S I E S T A C U T A] Quia scilicet tum vehementer mouetur, vnde sudor exprimitur verius
quàm excluditur: quod tamén est naturæ omnia bene rectèque administrantis. Est autem talis δεικνύουσα
præceptoris. Quoniam ineunte febre acuta, sudor exortus qui febris leuationem non adfert; opinio-
nem facit, vel potius certam fidem eò venisse, vt τὸ πᾶν συνίσταται τῆς φλεγμονῆς, i. *summam ardoris vim denun-*
ciaret potius, quàm excretionem duce natura susceptam humoris morbifici; dubium non est quin si-
gno & causa pestiferus esse videatur. Ac signo quidem: quia febris ardorem testatur, quæ circa initia
debuisset mitis: proptereaque illa celeritate ac vehementia citò mortifera. Vt causa autem: quoniam
citò vires exoluit, & quia febris adiicit vehementiæ, ob effectam magis caco chymiam, & sanguinem pla-
nè syncerum, sui seri expertem. Quod si euenerit, vt simul cum tepida febre ac miti sudor erumpat; non
ita erit, vt ille, pestiferus: quia symptoma est nimis abundantia crudi humoris non æstu incandescentis;
proptereaque in spe adhuc fida pepasmi longioris est.

DE VRINIS.



ΥΡΟΝ· cū πυρετῷ λευκῷ ἔχον καὶ λεῖλῳ ὑπόστασιν CAP. III.
ιδρυμδύλῳ· ταχεῖαν ἀφαισιν σημαίνει.

1 Vrina in febre qua albam & leuem habet hypostasin atque constātem; citam illius dimissionem ostēdit.

IN HOC CAPITE signa sunt omnia quæ in vrinis cernuntur diagnostica, prognostica, critica; primum quidem febrium, quarum illæ sunt propria *ὑποστασιν*, quatenus excrementa venarum ubi sunt febres: mox aliarum partium morbidarum, per quas feruntur, & ubi excipiuntur; videlicet renum, vesicæ, & aliarum etiam superarum, de quibus aut propriè communitèrve apparent & sunt. Itaque nullus feracior locus est ad informandum medicum super natura, symptomatis, & crīsis febrium; quàm de vrinis. Nec verò vlla sunt epiphænomena renum, vterum, vesicæ; quàm de vrinis, aut per vrinās. Quinetiam nullum est morbi genus in superis partibus, de quo non aliqua significatio atque præfensio comparatur per ipsas vrinās, vel ex euentu. Sic lethargicorum periculō multum adiicitur, quādo vrinæ redduntur immemoribus, turbulentē ac iumentorum similes. Sic aluum liberatam ostendit vitio cruditaris & impotentia mitificandi cibos, quam largior infert hæmorrhagia, sanguinisve detractio; cocta vrina, cui aquosa opponitur, liquidioris alui prænuncia atque comes. In tuto sunt omnes pleurici, cū liberali ac liberæ anacatharsi accedit bella vrinæ coloratio, qui aliter graui pleuritidis periculo non essent defuncti, ac liberè liberalitèrque spuendo parum proficerent, si multa bile saturata aut inflammata esset vrina. Parotidas parum prodest in empyema mutari ac fistulari, quando vrinæ redduntur pepasmi expertes, vt in cuiusdam Synci fullonis ancilla Hippocrates annotauit. Ne plura consēcter quæ sunt innumerabilia; vnus Galeni locus conficiet atque concludet quod demonstrare institui de vrinarum iudiciis, eritque catholicum theorema omnium exemplorum quæ κατ' ἐπαγωγὴν hūc aduocari possunt. Est autem sic expressum Galeni iudicium de vrinis. Περὶ μὲν τῶν ὑρῶν αἰετὶ μίμηστο συνεισπομπῆς αὐτῶν, καὶ τοῦ κατὰ τὴν φύσιν καὶ τὴν νόσον καὶ τὴν πνεύμονα, καὶ νεφροῦ πάθος· οἷς μὲν ἀγαθὰ φανερὴν, μεγάλῳ παρεχόντων τῷ ὁσπλίῳ εἰς σωτηρίαν. εἰ δὲ μολήσῃ, συνεισπομπῶν καὶ αὐτῶν πρὸς τὸ καμνοῦς κίνδυνον. i. De vrinis semper illud meminisse iuuat, inspicendas esse eas in omnibus etiam ventris, thoracis, pulmonum, neruorumque morbis; vt quibus laudabiles videbuntur, propensionem maximam afferant in partes salutis: at quibus malæ; valeant tūm ad perniciem certio significandam. Nam crises multorum morborum thoracis atque neruorum, vt peripneumoniæ & empyematis, paralyseon item & conuulsionum, suscipiuntur & absoluntur per vrinæ meatus. Ac de neruorum morbis qui per conuulsionem sunt in conspectu; solenne est illud Hippocratis. Conuulsionem sanat exorta febris acuta, quæ prius non fuit: quod si prius fuerit; exacerbata. Quinetiam prodest vrinam fluere albumineam.

Quæ cū ita sint; magnum est nomen, magna species, magna quoque vis vrinarum. Ac certè tantā, vt verè videat esse dicturus atque appositè, quod in hanc sententiam scripsit Galenus. Talis ac tanta vis quidem est eorum quæ sunt in vrinis signorum per febres acutas, vt illi soli credatur. Omnia autem signa quæ ab vrinis petuntur, suis quæque locis in earum examine proferuntur. Hic certè sufficiet vrinarum historiam recensere, tum in liquore ipsarum & iis quæ intrā sunt aspētabilia: tum verò in locis ubi giuguantur, vnde veniunt, quā feruntur, & ubi excipiuntur. Primum scire licet id omnium vrinarum, cuiusmodi tandem fuerint, esse commune; vt suam quæque ἔρρησι non antè absoluant, quā ad vesicam peruenierint. Verus est illud Hippocratis. Τὸ σπῆγμα μετ' ἔρρησι, i. calculus in vesica: καὶ πρὸς ὑρῶνας, i. in renibus, quorum virtute liquor è venis attrahitur καὶ φύσιν, vel contrā eò cietur; aut sua sponte iniussus & concitatus, aut aliunde immissus. Itaque nomen vrinæ, quoniam eius liquor est multiplex; nihil aliud planè significat, quā in vesica collectam colluuiem, ibi stagnantem, & inde meiendo emissam. Enimvero triplex est omnis vrinæ materia; vna quidem de cruditate rerum earum quæ assumuntur; altera de liquore seroso eorum qui sunt in venis humorum; tertia de humoribus atque corporibus quæ liquuntur. Atque hæc triplex consideratio in vrina, his verbis expressa est à præceptore. Οὐρὸν ὁμοχρῶν βρώματι καὶ πόματι, καὶ ὡς εἰώθει ἔσθαι, καὶ ὅπου τὸ ὑρὸν σωπῆται. i. Vrina concolor cibo & potui; tum qualis esse solet; item cū humidi colluquatio est. Quæ oratio est Hippocraticæ breuitatis ac sapientiæ: sed breuitatis illius fecunditatem ac sapientiam quæ hic ponentur appositè, Hippocratis placita explicabunt.

Ergo iam constat, opinor, quod omnis vrina quæ in conspectu est; apparet huiusmodi aut illiusmodi, vt erat collecta & stagnans in vesica colluies, vel potionis crudæ, vel feri humorum qui sunt in venis, vel humidorum etiam liquefactorum. Potio crudā cernitur in vrina quæ est portioni concolor. Est autem eiusmodi, cū id quod bibitur, nihil à se mutatur, suam absoluit τῷ ὑρῶν. Ac talis vrinæ coloratio est qualis erat eius quod potione quis assumpsit: vt si aquam biberit, vinūve album ac tenue; albam quoque reddat vrinam meiendo ac tenuem: sin autem crassum fuerit vinum ac nigrum quod haustum est; ipsa etiam crassior nigriorque appareat: quemadmodum item flauior, si verus & fuluum sit vinum. Sed potionis à se nihil mutatur, propterea quæ crudæ, causa est coctionis prærepta occasio, vel impotentia ipsa coquendi ea quæ assumuntur in officina vtrique coctionis, i. in aluo & hepate. Præripitur autem occasio coctionis: vel quia potio est prorupta, & suo impetu concitata πρὸς ὑρῶν, vel eò

rapta priusquam mitificari cœperit. Nam liberalis portio vini albi Germanici, calce ac sulphure saporatis. Leodiensium item aquarum sine Spadensium, calcantho medicatarum; præcipitem facit vrinam κατ' ὄσιν, & ad vesicam transmittit concolorem potioni. Sed inexplibilis renum fitis, diabetem facit κατ' ὄσιν, qui fundit vrinam similem potioni, ac sanguinem omni suo sero exhaurit, ac nullus bibendi atque meiendi finis fit, donec ad vltima ventum sit. Effœta coquendi potentia in officina vtraque, concolores edit vrinæ potioni & cibo, nisi colorentur à bile morbifica: tamen neque κατ' ὄσιν, neque κατ' ὄσιν, ad exitum præcipirentur. Nam quæ sunt pellucidæ & aquosæ in morbis acutis; eò certè apparent, non quatenus portioni concolores, sed biliosæ tincturæ expertes; vel ob anadromen bilis in cerebrum, ad phrenitidem & hæmorrhagiam; vel ob deriuationem eius in aluum, ad dysenteriam.

Sequitur altera vrinæ collectio in vesica, de iis corporibus atque humidis quæ liquuntur. Nam de vrina ducta, non rapta è venis à renibus ad vesicam, quæ sola omnium naturalem retinet œconomiam, ac sola omnium naturaliter est constituta; vltimus erit dicendi locus. Quemadmodum autem liquantur & transeant ad vesicam, vnde collecta meiando redduntur; operæ precium fuerit declarare, testibus ex Hippocrate loco adductis. Primus hic erit. Crebrò vrina redditur, cum incaluerit multum caput. Liquitur enim pituita in eo: liquefacta autem, partim ad nares abit; partim etiam ad os ipsum; partim per venas confluit, quæ ducitur ad pudendum: quò simulatque appulit, tum meit is quem lacepsit, eandemque molestiam experitur cuiusmodi esse solet à stranguria. Testis est item locus Hippocratis de stranguriosa vrina, cuius materia toto prorupta corpore ad vesicam, multis restituit appetètiæ pridem collapsam. Tum ille quo perirrhœam vrinæ biliosam, purulentam, & stranguriosam, simili diarrhœæ ac dysenterici adiungit; prorupto humore morbifico vel ad intestina, vel ad vesicam, sine vlllo partium illarum vitio quæ vel vrinis vel deiectionibus sunt dicatæ. Nam de corporibus quæ liquuntur, & liquefacta, foras eduntur, tum per aluum, tum per vesicam; solennis commentarius præceptoris Galeni ad locum Hippocratis de maxilla luxata quæ inflammationes mouet lethales in musculis qui tempora continent, & inde in cerebro, vnde accenditur febris acuta. Sic autem Galeni iudicium est; quòd nouum non est in febribus peracutis bilem synceram nasci, quando & adeps, & caro tenera recens pressa liquitur ab iisdem, & vnà sanguis assatur. Ex quo efficitur, vt partium omnium febris ardore liquefactarum colorem exhibeat ipsum vrinæ colliquamentum. Nam si quid orobeum, aut aliquid simile crassioris farinæ redditur cum vrinis; id planè acceptum iecori tabescenti ferendum est: quemadmodum si quid carniforme apparet, vel si fundantur carunculae cum vrinis; fundus ipsarum est in renibus qui exoluantur: similiter vt laminae, item fursurea in crassis vrinis, vesicæ corruptionem scabièmq; denunciant; sicut in tenui, fursurea sunt venarum scabie obstarum. Sic pingues vrinæ sunt adipis colliquari. Sed tamen orobea quæ sunt eiusmodi magnitudine ac duritate, sunt argumenta carniū liquefactarum: sicut & eadem nigra, lienis.

Penè omiseram quod est grauissimum super vrinæ materia, & super crisi per eam suscepta & edita. Est autem notabilis illa sententia præceptoris quæ sic legitur in aphorismis. Quibus inter aluum & septum transversum collecta est pituita, dolorèmq; infert acerbum, nec exitum habet per alterutrum ventrem; iis per venas ad vesicam conuersa, morbum exoluit. Atque hæc de vrinis quarum origo est vel cruditas ipsa rerum earum quæ assumentur, vel humidi colliquatio, vel etiam quæ mixtione partium liquefactarum in vitio sunt. Omnes illæ quidem sunt è natura egressæ: sed inter eas multum interest ad ineundam prognosin, quo quæque euentu appareant. Nam purulentæ pituitosæ & albuminæ non rarò sunt criticae, vt iam attigimus. Quæ autem sunt conspurcatæ de partium ipsarum liquamine, vt hepatis, renum, lienis, & cæterarum; omnes ad vnum pro se quæque feruntur exitio ægrotantium. Quinetiam omnes concolores portioni, si nulla sit excusatio potionis proruptæ antequam mitificari cœperit, vt aquarum Spadensium: sed ostentatio raptae illius à dipsaco renum; vel etiam ducta à renibus bene valentibus effœta potentia mitificandi; pessimis ægri rebus veniunt in conspectum. Est enim leuior præcepta in nobis mitificandi occasio, quàm impotentia: si tantum hîc inexplibilem renum fitim exceperis, quæ portionem auidè rapiendo, ipsam in aluo & venis mitificari non sinit. Cætera autem quæ pertinent ad hunc locum, suis quæque locis ponentur.

Tertîa restat vrina, cuius materia est liquor serosus eorum qui sunt in venis humorum. Sic enim video placuisse Galenò qui eam sic definiuit, ex doctrina Hippocratis. Καὶ μέντι καὶ ὡς ὁρροῦ ἐστὶν ὅτι καὶ τὰς φλέγας χωρὶς τὸ ἔρον· αὐτὸς ἡμᾶς ἐδίδωκεν. i. Quòd vrina sit serum eorum qui sunt in venis humorum; nos ipse docuit. Quæ ratio nomen dedit veræ vrinæ, quam veteres nominauerunt τὸ ἔρον, vt annotauit Galenus ad locum illum Hippocratis. Γνωστὰ ἔρον σημαίνει. Verba Galeni sunt hæc. Τὴν γὰρ τὴν φλέγα σημαίνει ὅτι οἱ ἐστὶν ἡτοι τὸ πλεῖστον ὅπως ὀνομαζόμενοι, ὃ καὶ ἐκείνη ἡμέραν ἀποκρίνομεν· ἢ τὸ ὅτι χωρὶς ὁρροῦ. ἔκαστος δὲ αὐτὸ λόγος, ὅτι τὴν πλεῖστον ἡμῶν διακρίνει. ἢ ὅτι τὴν γὰρ τὴν φλέγα τὴν ἐν τοῖς χυμοῖς ἀεζήσας ἐστὶν ἀνακρίνει, κατὰ τὸ καὶ τὸ βραχὺ. i. Lingua indicari ait quæ sit, ἔρον. Sanè aut illud verè dictum est proprie, quod singulis diebus excernimus. i. vrinam; aut humorum serum. Vtrique ratio eòdem redit, lingua esse indicem humorum affectus: sicut et vrinæ ipsas. Hoc vnum genus vrinæ venit è bonis, vt cætera duo è malis. Hæc sola omnium venit συνήθως, cætera verò ἀνέθως: propterea quæ illa quidem συνήθως; hæc verò κακότητος. Nam illud Hippocratis, αὐτὸς εἰσθεὶς ἔον, pertinet ad τὸ συνήθως καὶ φέρον, i. ad consuetudinem naturaliter institutam. Ac talis quidem vrina, de naturali est œconomia, quæ coquendo, distribuendo, & excernendo absoluitur: cum scilicet bene constitutum est corpus; vnde consuetudo est meiendi naturaliter instituta. Nec verò si potionis & cibi excrementitia est talis vrina; iis coloratio tribuenda: nisi quatenus potio cum humoribus qui à natura gignuntur mutata & colorata, differentias exhibet vrinarum; non eas quidem de qualitatibus potulentorum, aut corporum quæ liquuntur: sed de humorum ideis qui sunt Hippocrati τὸ συνηγόντα; quòd simul de chylo, virtute sanguifica iecoris enascantur. Ergo serosus liquor humorum συνηγόντων in venis, dum in vrinam transit, in conspectum

lib. 2. cap. 2. v. 10.

1. Epid. part. 2. ibid.

lib. 2. cap. 2. v. 10.

10

20

30

40

50

60

conspēctum adducit cuiusmodi sint eorum idēa. Atque ut ille ὁππός idēam ostendit humorum: sic & πῶς ἔστιν ὁππός. Verus est illud; quod ὁμοίαν τῇ καὶ τῶν ἀπορροῶν τῇ κατασκευῇ ὁμοίαν, i. effluentiam similem esse oportet subiecta substantiæ. Ex quibus efficitur, verum esse quod in hanc sententiam scripsit Galenus. *Vrina ostendit affectionem hepatis, renum, vesicæ, ipsorumque vasorum sanguinem continentium: tum facultatis humorum procreatricis virtutem & infirmitatem.* Hic penè dixerim, sunt hypocritæ homines qui de vrina certam scientiam profitentur graviditatis quæ in conspectu non est: tum etiam sexus & partus futuri. Quæ ostentatio soboles ignorantia, fundamentum aliud nullum habet quàm aucupandi lucri & inanis gloriæ cupiditatem. Est enim ratum illud quod à Galeno est positum in aphorismis; quod scilicet ducta è venis vrina, p̄rque anfractus renum ad vesicam transmissa, & ibi collecta; si quid in ea sit præter naturam; tum necessariò venas, aut renes, aut vesicam ipsam malè habere denunciatur. Secus est in prorupta quæ partium superarum affectiones ostendit; ut iam attigimus. Atqui prorupta nihil habet diagnosticum graviditatis, aut sexus: neque prognosticum partus futuri. Sola quæ ducitur inoffenso cursu è venis, si quid de locis ostenderet; fortasse aliquam diagnòsin atque prognòsin muliebrium rerum adferret. Qualis earum est quibus menstrua detinentur intus cohibita, quorum tenuior quædam portio è locis in vesicam exudar; unde redduntur vrinæ cruentæ. Sed ostentatio talis hypocritarum, superstitionis veneno fucata, contemptu potiùs digna esset, quàm mea reprehensione: nisi fautores haberet quosdam indoctos qui suam credulitatem nugarum garrulitate vulgo suadent, quod aliquid esse vidēantur.

Haftenus de vrinæ materia, deque illius ductu. Superest ut quorsum appareat, tum in liquoris substantia, qualitate, & copia; tum verò in iis quæ intrà sunt aspectabilia, ὑπιστάμενα Græci vocant; hoc loco dicendum sit. Quæ omnia quoniam suas quæque habent prognòses; in earum examine dicuntur verè & facili orationis stylo, per Dei gratiam.

V R I N A] Ὀππός: non illud quidem quod lingua denunciat, dum eo fucatur; sed illud ipsum quod positum in sero humorum qui sunt in venis, non antè obrinet nomen vrinæ, quàm ad vesicam, renum ductu, transferit. Non enim prorupta hîc ponitur aut rapta vrina, & sic ad vesicam transmissa: sed illa solùm quæ naturaliter ducta est renum virtute. Ergo vrina, quæ ἔστιν dicitur ἀπὸ τῶν ὀππῶν, i. à sero eorum qui sunt in venis humorum.

I N F E B R E] Simpliciter & absolutè dicta, quæ ibi focum habet, unde vrina ducitur, vel ubi fons est vrinæ, i. in venis; à motu, collectione, & corruptione humorum qui sunt in vitio ipsi per se, ac febrem accendunt quæ homines malè habet, ἀπὸ τῶν μολῶν ἐξαιρέτως μεμολῶσιν, i. sine insigni partis cuiuspiam affectione: cuiusmodi esse solet inflammatio, erysipelas, aut sæui doloris acerbitas. Nemo enim pleuriticum dixerit febrem correptum & occupatum; sed potiùs, inflammatione sÿstrophica tunicæ costis intextæ: tamen si pleuritidis symptomatica est ipsa febris. Ergo febres posuè in domicilio τῆς σπυγῆς, καὶ τῶν σπυγῶν, i. caloris viuisfici & humorum, quod est in corde.

Q U Æ H A B E T H Y P O S T A S I N A L B A M E T L Æ V E M] i. In cuius liquore, fundo tenus, residit quædam substantia excrementitia, cuius est puri analogæ generatio, posita inter illud atque humores naturæ dicatos nutriēdi causa: quod scilicet quicquid de succo alibili virtutem naturæ effugit in sanguinis confectione, id in vrina residit. Est autem eiusmodi, neque à natura similiter mutatum ut sanguis: neque, similiter ut pus, in sui confectione particeps alicuius causæ contra naturam. Atque hæc summa descriptio est rerum earum quæ naturaliter sunt intra vrinam febricitantium, & ὑπιστάμενα nominantur. Hominum enim qui bene valent, ut loquitur Aristoteles, τῇ φύσιν καὶ τῷ ὕμην, i. natura & valetudinis cura, nihil eiusmodi cernitur in vrina, quod vim naturæ effugerit. Sed rerum earum quæ intra vrinam sunt aspectabiles, ortæ ab iis quæ vim naturæ in confectione sanguinis effugerunt, nec sunt excrementa corporum quæ liquuntur, sanguinisve perusti; distinctio varia esse solet colore, substantia, quantitate, loco, & situ: ex quibus etiam varia prædicendi ratio comparatur. Nam corporum & humidorum quæ liquuntur aut peruruntur, ex quibus apparent τὰ ὑπιστάμενα in vrinis; ut omnia toto genere prava sunt: sic prauitati multum suo quæque loco & situ adiiciunt. Est enim nubecula nigra & enzorema, πορρῆς, peioribus ægri rebus, quàm rerum earum hypostasis quæ in fundo residat. Sed illa non pertinent ad hunc locum, ubi agitur de vrina quæ ad securam & citam crisin apparer ex iis quæ ipsi bona insunt, & absunt mala. Omnia autem quæ insunt bona, cum exceptione malorum, his vocibus continentur. **Q U Æ H Y P O S T A S I N H A B E T L Æ V E M E T A L B A M.** Est enim descriptio hypostaseos quæ parem ostendat salubritatem loco ubi residit, & situ atque materia. Nam illa demum hypostasis est fidæ salutis, quæ numeros omnes explet bonæ materiæ, loci, & situs. Ac primùm quidē, alba materia bonitatem succi ostendit qui vim effugit naturæ in sanguinis confectione, qui est pepasmi capax, & iam nunc particeps. Eadem quoque denunciat integritatem partium solidarum, similiter colorata ut illæ quæ sunt natura albæ; propterea quæ fundunt naturaliter excrementa colore similia subiectæ substantiæ; ut semen, pus, & hypostasin albam. Inter quæ tria nihil interest efficiendi virtute: sed tantum materiæ ex qua gignuntur capacitate ad capiendam impressionem partium solidarum albarum. Nam seminis causa est πῦρ: reli quorum autem πέναντος. Semen autem est τῶν σπυγῶν: cetera verò τῶν ἀμολῶν. Sed tamen pepasmi & pepseos, naturæ vis eadem, est causa effectrix, diffusa per solidas partes albas, quæque illarum virtus existit. Ergo iam constat, quod alba hypostasis, materiæ bonitatem, pepasmi capacem denūciat, vnâque virtutem mitificandi, unde albescit, positam in partibus solidis quæ natura sunt albæ. Sed opportunitas loci quem occupat, i. vrinæ fundum; ut certum est argumentum caloris natiui, quo τὰ ὁμοῦν congregantur, & suo quæque loco apparent: ita pepasmi perfectionem ostendit, cum cruditatis vacuitate ac spiritus flatulenti: quo dūcē, τὰ ὑπιστάμενα quæ sunt grauiora vrinis, in

his volitant velut nubila. Tum lenitas hypostaseos, & ipsa æqualitas maximum signum exhibet sitis imprimis expectendi, ex eo quod magna vis lucet nativi caloris in suo subiecto naturaliter constituto, quod suo dominatu sic tenet, imperioque regit, vt nihil illius intactum relinquit, & in quamcunque partem æqualiter se insinuet. Secus est in æqualitate spuri spumatis opimarumque deiectionum æqualium, quarum æqualitas non quidem virtute naturæ perficitur, sed vi caloris contra naturam. Vt igitur nihil melius æqualitate rerum naturaliter constitutarum: ita nihil peius ea quam ardor febrilis inuexit. Quæ cum ira sint, planè efficitur; illam demum hypostasim, omnium præstantissimam esse, in cuius colore, loco, & situ perspicitur materiæ bonitas, partium solidarum integritas, & vis nativi caloris, & eius in suo quæque loco ponentis, ac sese in omnes materiæ segregatæ partes æqualiter insinuantis.

ET EAM CONSTANTEM] Græcè ἰδρυμένης: qua voce non significatur suo immota loco, i. fundo hypostasis vbi residit; sed assiduitas residendi exactum ad morbum, in quo talis apparet: quemadmodum apertissime planissimeque indicant verba Hippocratis in prognostico super hac re conscripta. Πὰρ πάντα τὸν χρόνον ἐς αὐτὴν κρίσιν ἡ νόσος, i. toto morbi tempore, donec is fuerit indicatus. Atque hæc significatio ἰδρυμένης, eò legitur in illa prognosi. Γλῶσσα τρυφῶδης σημεῖον ἔχει δρυμένης γλώττης. i. Lingua tremula, signum est non solidæ mentis: sed inconstantis, quæque diu non est apud se. Ergo descripta hypostasis quæ talem perpetuò non edit ideam; parum habet securitatis, ac semper longioris est morbi. Sic enim iudicium est præceptoris cum ait. Εἰ δὲ ἀσθενέι, καὶ ποτὶ μὲν καθαρὸν ἐρέει, ποτὶ δὲ ὑφίσταται τὸ λευκὸν καὶ λεῖον· χρόνιωτέον γίνεσθαι ἢ ῥῆτος, καὶ ἥσων ἀσφῆδης. i. Sin quandoque deficiat, ac nonnunquam pura sit vrina, nonnunquam quid album subsidat & laue; longior hic erit morbus, minusque tutus. Et verò quæ hic catholica sunt in febrilibus theoremata; particulatim leguntur ad malas tumorum crises qui assurgunt sub auribus, & parotides nominantur. Sic enim suprà iam legimus & ad examen adduximus. Οὐδεὶς τῶν παρ' ὧν τὰ γὰρ ἐν ὀλίγον πεπτηνόμενα φραγέται. i. Vrina in parotidibus citò & paulisper coëctæ; mali sunt ominis. Nam coëctionis & cruditaris vicissitudo, parem naturæ & morbi arguit dominatum: ac cerè huius maiorem, qui vires acquirit eundo, ac tandem naturæ præsidia labefactat. Hæc autem vicissitudo cruditaris, partim est contumacis materiæ; partim fariscentis naturæ.

CITAM ILLIUS DIMISSIONEM OSTENDIT] Quia vbi regnat virtus naturæ, cita exclusio esse solet causæ morbificæ. Atqui regnantis naturæ ac mirefcentis morbi firmissimum illud adferri potest, quod in proprio excremento, i. vrina, pepasmi appareant: quorum significatio est citæ crisis quæ salutem suscipit. Norum est illud Hippocratis. Πηπασμοί, ταχύτητα κελύσεως, καὶ ἀσφῆδαν ὑγίειναι σημαίνει. Nec solum virtus pepasmi, ad certam crisin atq; securam februm est in vrina: sed etiam in abscessuum empyemate, vt annotauit præceptor his verbis. Πᾶν τὸ ἐκπύου ἀνυπόσφορον. ἑαυτὸς γὰρ πηπασμός, καὶ κελύξεται αἷμα, & διαπεσθήσκει. i. Omne quod suppurat, metuit reueri. Ipse namque pepasmi est crisis & abscessus simul. Igitur in pepasmo constanti, vis est naturæ, libertas meatuum, & causæ morbificæ mitificatio: quæ tria sunt ad citam crisin necessaria. Testis est illa sententia præceptoris. Οὐκ ἔστιν ἐν ἑβδομήκῃ κελύσεται· ὅστις ἐν ὀκτωέτῃ ἔσθ' ἢ ἔρον τῇ πελάτῃ ἐρυθρόν. &c. i. Quibus septimo die crisis venit; illis sub quartum, in vrina nubecula fuit rubra. Nam de secura crisi, certissima securitas est; quod in descripta vrina significatio est fracti morbi, & triumphantis naturæ: vnde cita salus ac certa vitæ ostenditur. Et qui cum vrinæ constanti pepasmo, à febre obierit suum diem; Hippocrates vidit neminem.

2. Ταχέϊαν δὲ καὶ τὸ εἶς ἀκρίτου λίπος ἔχον καὶ εἰς υδατέμυον.

Ac citam quoque dimissionem febris ostendit vrina quæ ex confusa, quippiam pingue ostentans, aquescit.

IAM CONSTAT opinor quod nihil æquè est criticum, nec æquè certam ac citam dimissionem febris ostendit, atque pepasmi, quem lauis & alba ostentat hypostasis in colorata biellè vrina. Hic certè fidissima spes est secundi iudicii atque salutis propinquæ; iuxta vetus prouerbiū quod dici solet. σιωπῶς, quod qui intēdit, nunquam aberrat. Sed vt victricis naturæ signa sunt in vrina primum descripta, quæ cæterarum est omnium veluti canon quidam ac regula, de more Hippocratis cuius ea fuit consuetudo sic exordiri ab eo quod ille vocat τὸ αἶμα: ita secundo loco hic posita est vrina decertantis adhuc naturæ, viamque ad lætam victoriam sedulo affectantis. Est autem sic posita.

AC CITAM QVOQUE DIMISSIONEM FEBRIS OSTENDIT VRINA] Non quidem duce pepasmo, sed citæ excretionē humoris morbifici qui per vrinæ ductus cursum inflectit, ac liberaliter exitum foras habet: cum antea pauca, grumosa, & crassa essent vrinæ. Nora est illa sententia Hippocratis. Πηπασμοί, ἅπασαν τὴν πύλιναν πύλιναν δὲν ὀπταίεσθαι, ἢ καλὰ καὶ κελύμενος διαπεσθήσκει σιωπῶσιν. i. Pepasmos omnes abeuntium omnium opportunos, bellōsque & criticos abscessus conspiciere conuenit. Non enim morborum quorumlibet sunt pepasmi: sed eorum imprimis qui expertes orgasmī, symptomata inferunt partium obfessarum, & humoris morbifici propria. Scirum est illud præceptoris. Αἵματα ἢ ῥῆτος εἶδ' ἢ συμφορῶν χρόνιον, πλὴν ὅν οἱ πηπασμοὶ ἐκ τῆς γλώττης. i. Ducendi humores quò illi per commoda loca cursum inflectant, nisi quorum per tempora sunt pepasmi. Ac fuit illa tempestas ab autore posita in Epidemiis, ex qua humores morbifici qui tum regnabāt, quacunquē & quotiescunque liberum & liberale exitum inuenirent; dimissionem morborū adferebant. Atque inter cætera excretionum genera memorantur aquosa vrina multa, ac tenues atque puræ; cuiusmodi etiam quid de confusis & crassis hoc loco ponitur. Nec verò finem solum adferebant.

adferebant morborum qui homines occupabant : sed etiam illos periculis liberabant quos inclinatio morbi periculosè habebat. Nam de mortiferis icteris sexto die obortis, annotauit præceptor; quod eorum periculis illi demum icterici sunt defuncti, quibus purgatio incidit per vesicam, aut perturbatio alui. Cæteris autem qui eo beneficio non sunt adiuti, ut quidam Phanagareon, fuere mortiferi atque funesti.

QUÆ EX CONFUSA] Non ea quidem quæ apparet huiusmodi, perturbato ipsius liquore à flatulento spiritu & febrili ardore, quam ἔρον πολέρον, ἢ ἐπὶ καταύγειαν, ἢ ἀνατέταλον, καὶ ἀνυπόστατον, Hippocrates nominauit, i. perturbatam, confusam, similem iumentorum, quæ diu deposita, nunquam residit neque clarescit. Sed ea quæ prima omnium ad examen adducta est lib. 4. aphorismorum, quam vocat præceptor ἔρον παχύν, ἐλγόν, βρομώδες, i. vrinam crassam, grumofam, & paucam. Nam ex vrina confusa & perturbata similiter ut iumentorum, sperabilis esse nequit cita febris dimissio, de qua illud iudicium fuit Galeni; quod in virtute virium, diuturni est morbi; cum infirmitate, mox adfuturæ mortis: ut in Dromeade vxore quæ obiit suum diem sexto ipsius morbi, & ante obitum tentata est conuulsionibus à capite. Et verò cum tali vrina cephalalgiam adesse vel adfuturam testatur Hippocrates, & præter eam conuulsiones venisse à capite, Polyphanto.

QUIPPIAM PINGVE HABENS, AQVESCIT] Bene fit quidem, cum vrina crassa, grumosa, & pauca, mutatur in tenuem, claram & multam, quod est aquescere: vnde significatur naturæ vis, libertas meatuum, & contumacis materiæ mitificatio, ex quibus veniunt crises operatæ. Sed quod adiicitur, ἔρον ὡς λίπος, i. quippiam pingue habens, planè aberrat à scopo ad quem prognoscens author intendit, nempe ad citam dimissionem febris. Non enim quod pingue est in vrina, discessionem febris ostendit, sed vitæ ipsius. Nam pingue illud, est corporis liquefacti à febre rificatio: quemadmodum annotauit præceptor in illo prognostico. Καὶ τὰς λιπαρότητας τὰς αἰῶς ἐπιστράμοντας ἀεὶ χροεῖδας μέμφομαι. σωτηρίας δὲ σημεῖα. Ut certè quod hic scribitur, λίπος πὶ ἔχει ἐξυδατώμενον, videatur eò referri, quòd illud prognostici, τὰς αἰῶς ἐπιστράμοντας, atque nubeculam tenuem indicare supernatantem vrinæ: similiter ut araneæ subtilissima tela, vel pingue illud quod in carniū iusculis χεῖς nominatur. Quod si est verum; profectò ironica est prognosis in verbo ἀφείστος, & superiori contraria, in hoc sensu, quemadmodum prius descripta vrina, citam dimissionem febris ostendit: ita hæc citam dimissionem vitæ. Ac breuiarij quidem huius occasio esse potuit historia Dromeadei vxoris, de qua sic legitur apud Hippocratem in Epidemijs. Δευτέρῃ ἔρα παχέα, λευκά, πολλὰ, οἷα γίνεται ἐκ τῆς κατὰσπέντης, ὅταν ἀνατέταλῃ καί μενα χροῖον πολὺ ἐκαστα π. i. Secundo die vrina crassa, alba, turbata; cuiusmodi illæ sunt quæ cum subsederint, agitata ac diu depositæ, amplius non residunt. Tum illud adiecit. Τετῇ ἔρα ὁμοία. i. Tertio vrinæ similiter ut secundo turbata. Et paulò post. Τετάρτῃ ἔρα σμικρὰ κατὰ ἐλαγώδες. i. Quarto vrinæ pauca, tennes, oleose. Vbi non est dubium quin vrinis tenuibus apposuerit τὸ ἐλαγώδες, pro pingui quod in vrina cernitur: similiter ut χεῖς, in iusculis carniū.

3 Τὸ δὲ ὑπέρυθρον, καὶ πλὴν ὑπόστασιν ἔχον ὑπέρυθρον ἢ καὶ λεῖψω πρὸς μὲν τῆς ἐβδόμης χροῖον, ἐβδόματον δὲ πολὺ. μὲν δὲ πλὴν ἐβδόμην, χρονιώτερον, ἢ πάντως χρόνιον.

40 Quæ autem subrubra est, habetque subrubram hypostasim atque læuem; si quidem ante septimum diem fuit huiusmodi; septimanam febrem exoluit: sin autem serius; longiorem, vel omnino longam.

VT CERTA & cita est crisis ad ægri salutem, quam colorata bellè vrina denunciat, habetque hypostasim albam & læuem: sic in subrubra, cum pari coniuncta hypostasi, multum est quidem securitatis; sed tamen ut ea celerius-seriusve apparet: sic breuioris aut longioris est morbi. Nam propria febrium ὁρμηγόμενα, cuiusmodi sunt vrinæ, quæ citò sunt bona; citam quoque ipsarum dimissionem ostendunt. Nec solum in propriis febrium excrementis id locum habet: verum etiam in qualitate partium, quando earum redintegratio est de sua è naturali norma egressione, quæ morbus intulerat. Sic. Oculorum, eorumque alba nitentia ex nigris aut linidis; salutare crisis denunciant. Et quòd celerius puta redduntur; eò citiorem crisis ostendunt: quò autem serius; tardiore. Sic. Lingua ad medianam lineam delibuta velut alba salina; febris dimissionem denunciat: idque eodem die; si quod superinducitur, crassum est: sin autem tenuius, postmodò quod si citiam tenue adhuc, perendit. Quemadmodum autem vrinæ subrubræ cum pari coniunctæ hypostasi, argumenta ducantur, primum quidem securitatis, mox breuioris aut longioris morbi: sic ad iudicium ipsam prognosin, quam ea de re author hic posuit, deducemus.

QUÆ AUTEM SUBRUBRA EST] i. Vrina quæ modicè rubet, de sanguinis non accuratè confecti copiosiore sero, vel etiam de bile ipsa; quæ qualitate est mitis, non effera, nec syncera: sed modica, tum quantitate pauca. Ac sanè coloratio huius vrinæ, procul ab illa est quæ saturatam exhibet multa bile; vel etiam multum rubet inflammatione feri acerrimi biliosi, incendio conflagrantis in hepaticè, cæterisque venis hæmorrhoidibus, quæ sunt inter axillas & ipsos bubones, vbi est focus ardentium febrium. Ergo subrubra vrina, quæ est huiusmodi ducta è venis vbi serum abundat sanguinis redundantis, nec dum perfectè confecti; vel cuius coloratio est à bile pauca, quæ domita feritate mansueuit in venis.

Coac. l. cap. 6. lib. 2.

Coac. l. cap. 7. clus. lib. 2.

HABETQVE SVBRVRAM HYPOSTASIN ATQVE LAVEM] Cuius materia illud est quod vim effugit naturæ in sanguinis confectio: non de corporibus quæ liquuntur, vt hepatis, renum, lienis; quod lævitas ipsa declarat, & fundum matulæ vbi residit. Quæ duo sunt à calore nativo & partium solidarum virtute: quorum auspiciis veniunt pepasmi & crises. Ac certè quories illa in promptu sunt commoda mitificantis naturæ, & humoris mitificandi; planè efficitur quod subiungit.

SI QUIDEM ANTE SEPTIMUM DIEM FUIT HUIUSMODI] Vel, ut idem clarius in aphorismis, & ad prognosin magis appositè quam de diebus indicibus inire oportet. *Si quidem quarto die talis appareat*: quoniam quarti diei prima laus est ad indicandum, iuxta illud Hippocratis. *Τῷ ἑτάρῳ ἡ τέταρτη ὁρίσινος*. i. *Septenorum quartus est index*. Nam cæterorum à primo quaternario indicia, non sunt criseos intra septimum expectandæ, i. cæteri quaternarij qui sunt à primo, quinque, intra vigesimum; non æquè certi sunt indices criseos affuturæ proximo die quarto ab illis, atque is qui numeratur primus in febris historia. Sic enim nota pepasmi, si primùm secundo appareat quaternario, i. die septimo; crisin venturam non antè promittit, quàm decimoquarto, non autem undecimo, qui est quartus ab illo. Itaque dies quartus, indicandi virtute ad citam crisin pariter atque certam, cæteros omnes præcedit. Et verò si de subrubra nubecula posita in aphorismis, indicia comparantur crisis futuræ proximo die quarto, qui septimus erit totius historię; certior expectatio debet videri criseos die septimo affuturæ, quoties die quarto subrubra hypostasis ceratur in vrina pro nube sublimi. Est enim hypostasis, loco melior & fida magis ad expectandam crisin citò & certò venturam, quàm ipsa nubecula: quoniã, illa quidem, virtute caloris natiui residit in fundo; hæc autem, leuib. ventis alis volitat in vrina. Quæ cum ita sint; diffcilis ratio certè non erit quamobrem vrina subrubra quæ habet subrubram hypostasim atque lauem,

SEPTIMANAM FEBREM EXOLUIT] Quia in promptu sunt commodæ quibus ad salutem
cita & certa crisis, duce natura suscipitur atque absoluitur. Sunt autem; humoris mitigandi suauitas,
& facilis circa initia redintegratio; tum proratio ipsa naturæ, quam infert morbi acuti celeritas, ve-
hementia, & assiduitas. Nam fundamentum & ratio excretionis criticæ, quæ id adimitur quod intus læ-
debat: tum ipsa corporis est natura egressi redintegratio comparatur in bonitate pepasmi, & erethismo
naturæ consistit. Atque hæc duo quoties ex æquo certant inter se; dimissio quidem est morbi seriùs aut
celerius, ut illa serò aut citò sunt in procinctu. Ergo si quarto die, i. prima periodo, signum sit, in pepa-
simo, victricis naturæ; secunda periodo, i. septimo die, per criticam *ἐποδον*, dimissionem febris ostendit.
Et quamvis urina subrubra hic posita, non sit exacti pepasmi, ut ea quæ albam & læuem habet hyposta-
sin: tamen hæc sufficit ad criticam excretionem, ubi est fortis naturæ contentio; nec irritam finiri esse
τὴν ἐποδον, quæ seprimo die, i. secunda periodo ab indice prima suscipitur. Est enim tum maior naturæ
vis & concitatio ad ea cienda & excludenda, quæ intus lædebant: tamen non tam exactè mitigata
sunt, quàm cæteris morbi temporibus; in perfecto pepasmo. Quæ ratio mouit Hippocratem, ut septi-
mo crisin fore censuerit, quibus nubecula rubra est die quarto. Vbi Galenus author est; quòd in acutis
morbis qui & celeriter, & vehementer, & continenter mouentur; bene res eunt ad crisin septimo die
uenturam, de colorata bellè urina, vel etiam de rubra nubecula, si talis appareat quarto die. Quod certè
in cæteris morbi temporibus minimè locum habet. Tum enim crisis perfecta esse nō potest ab inchoa-
to pepasmo. Nec solum quarti diei ἐπιφάνομενα *κρίσιμα*, sperabilem septimo crisin denuntiāt, appa-
rētque, ut dici solet, ad tempus: verumetiam speciem ipsam crisis ostendunt. Sic enim vsum est præ-
ceptoris, ubi sic ait. *Quibuscumque circa initia febrium, oborta sternutatione, sanguinis stillicidia sunt est naribus;* si
quidem quarto die urina hypostasin habet albam; dimissionem morbi per hæmorrhagiam septimo fore ostendit. Est
igitur quarti diei magna vis ad indicandum; & inde septimi magnæ vires ad iudicandum, præ omnibus
aliis qui sunt de numero criticorum dierum. Sequitur enim.

SIN AVTEM SERIVS, LONGIOREM VEL OMNINO LONGAM] Nam si, exacto se-
 primo, primùm esse cœperint *ἐπιφασιόμενα* febris infractæ; ipsa naturæ infractio, vix *ἐφόδῳ* parem moue-
 bit, qua se expediat causa omni morbigica. Est enim perceptum illud catholicum de iis omnibus quæ
 sunt cuiusque morbi propria *ἐπιφασιόμενα*, vt quæ apparent circa initia λόγῳ τῆς φύσεως, suum quæq; mor-
 bum abbrevient: quæ autem seriùs, ipsum ad diuturnitatem producant. Est autem perceptum id, seu
 theorema, positum in exemplo spuri pleuritici, de quo hæc verba leguntur apud Hippocratem. *Παρο-*
ξυσμος ἐστὶν ὁ σῆτος, ἵψι προ se quisque morbi denunciant. Deinde subiungit. *Quinetiam ἐπιφανομένῃς, rerum ea- 50*
rum notitia comparatur: vt in pleuritici quæ statim circa initia (puta eduntur, sunt brevioris morbi: quæ autem se-
riùs, longioris. Sed veritate catholici theorematas ad hanc hypostasin de vrina subrubra, quatenus bre-
 uis morbi aut longi prænuucia esse solet, sic nos appositè accõmodare videbimur, cùm persuasum fue-
 rit eam vrinam circa initia, feri esse mitis naturæ, i. sanguinei; post autem illius quod priùs efferum, iam,
 domita feritate, mitescit. Ac feri quidem sanguinei, propterea quæ mitis, vt certa & cita est vitæ securi-
 tas ab ineunte morbo, tum quia mitificatur ex facili, tum quia mouetur *συνήθως*; nihil autem facit *ἀνθρώπῳ*,
 i. *contra naturæ consuetudinem*, cuius virtuti primis periodis faciliè morem gerit: ira illius quod non antè
 mitescit quàm exacti fuerint septem dies, & cui domando natura periodos illas consumpsit; non æquè
 facilis concoctio est, nec facilis item exclusio. Et verò vt concedam, *τὸ ἐπιφασιόμενον* vrinæ subrubræ post
 septimum diem, duci de sero sanguinis crudioris; tamen si multum habet securitatis, quia tum est nimia
 eius, qui humorum est omnium vtilissimus, abundantia: tamen quia serum humidius est atque tenuius,
 ob eamq; causam pepasmi difficilis, qui non perficitur nisi cum tẽpore; propterea iure optimo talis vri-
 na, seriùs exolutum iri morbum testatur quàm prius. Quò enim longius itur in cruditatis egressione, ac
 maior naturæ infractio est post irritas primas *ἐφόδους*; cõ tardior esse solet redintegratio & febris di-
 missio.

4 Τὸ ἔν τελευτῇ λαβὼν Ἰππιδέφελον ὑπερυδρον· ἐβδουμαῖον δὲ πολὺν, καὶ λοιπῶν καὶ λόγον ἔχοντων.

Quinetiam si urina nubeculam quarto die subrubram assumpserit, septimanam exolvit, si cætera convenienter sint constituta.

10 **ΕΠΙΦΑΝΟΜΕΝΑ** febrium naturaliter constituta quæ in urinis cernuntur, non solum securitate salutis medicum consolantur: sed etiã fida spe ipsum recreant citæ crisis, cum ea citò apparent prima periodo quartæ diei. Est enim par & æqualis ratio causæ mouentis & eius quod mouetur, ad crisin breui venturam. Atque hæc superiore prognosi accuratè sunt disputata in subrubra hypostasi quæ cum urina subrubra editur quartò die, ad crisin septimo die futuram. Vt nihil inter hanc & citimam huic prognosi aliud interueniat præter nubeculam, loco iam positæ hypostaseos: cui adiicitur observatio rerum omnium quæ primis periodis convenienter naturæ apparent, aut secus ab ea, unde vel expectatæ crisis impeditio, vel adiumentum. Quæ omnia cuiusmodi sint, & quorsum ab auctore ponantur, sic aggredior ad docendum.

QVINETIAM] Quod est eiusmodi ac si diceret, non solum de subrubra hypostasi edita quarto die, argumenta petuntur crisis futuræ septimo: verum etiam.

20 **SI VRINA NVBECVLAM QVARTO DIE SVBRVBRAM ASSVMPSERIT**] Tametsi nubecula indicandi potèntia cedat hypostasi: quia huius firmiora sunt argumenta de virtute caloris ipsam deponentis in fundum urinae, quàm illius quæ magisterio flatus volitat in urina: tametsi vtriusque materia est æqualis, & plena securitatis, orta ex fonte humoris *χεῖροθεν*, propterea quæ *χειροστέπν*, i. ad crisin maximè idonei.

SEPTIMANAM EXOLVIT] Quia tum sufficit ad crisin perfectam inchoata concoctio materiæ suauissimæ, facillèque domabilis, cum in procinctu est summa naturæ contentio ad coquendum & excernendum.

SI CÆTERA CONVENIENTER SINT CONSTITVTA] Quæ scilicet sunt, quæque apparent ad crisin eo die sperabilem; omniãque sint *ἐπιφανόμενα* eò spectantia in qualitate corporis, actionibus, & excrementis, ut nulla impeditio sit criseos feliciter ineunda. Nam quæ initio bona sunt epiphænomena, sæpe mutantur in peius: tum inconstantia bonitatis, quæ suo statu firmiter bona hærent, sæpe vincuntur à malis. Ergo signorum omnium quæ cernuntur in qualitate corporis, in actionibus, & excrementis; ea conspiratio esse debet ad crisin prædictam, ut certò promitti possit quando ventura, & quid ex illa sit euenturum.

5 Τὸ δὲ λεπτὸν καὶ χολῳδες, καὶ μόλις σμικρὸν ἔχον ὑπόστασιν, καὶ τὸ μεταβάλλον Ἰππὶ τὸ βελίον καὶ χεῖρον· χρόνιον. Ἰππὶ πλεῖον δὲ τῆς ἐπιουλουδὸν, ἢ τοῦ κρείσσιν χρόνων χρομδρῶν· ἐκ ἀκινδύων.

Tenuis autem & biliosa, ac ne vix quidem exiguam habens hypostasin, tum quæ in melius, modo in peius mutatur; longi est morbi. Sin autem hæc longius inuicem consequantur, & circa crisin tardiora sunt omnia; periculo certè non vacant.

30 **TENVIS AVTEM**] Cuius tennitas proximè aquam contingit, à cruditate: non quidem præterita occasione coquendi, ut in urina de nimio potu prorupta; vel etiam rapta, ut in diabete: sed facultate coquendi collapsa; cuius, dum viget, officio modicè crassa redditur; nunquam autem crassescit eximie, ut iumentorum urina.

ET BILIOSA] i. Multa bile saturata. Nam τὸ χολῳδες, bilis est multum è naturali egressa; quam febris genuit ἐκ τοῦ πυρετοῦ, i. e. pingui: sicut de lingua dictum est, quæ virescit, quia *χολῳδες τὸ δὲ χολῳδες*, part. 5. c. Epid. 2. *ἐπὶ πυρετοῦ*. Est igitur biliosa urina, non quidem *μετρίως ἀρχαῖα*, qualis est naturaliter constituta; ut Galeno visum est, ubi hæc scripsit. Τὸ ἔξ φύσιν ὑπερμασεῖας ὅτι ἀρχαῖα. Sed ea cuius tinctura & coloratio est de colorioflava, vel de syncera eximia; propterea quæ exhibet fulvum colorem, quem in prognostico Hippocrates nominavit. Ergo urina tenuis consistentia, & fulva colore quæ fit, auctore Galeno, *ἐπὶ ἡπιότατον ἢ ἐλαττὴν χολῆν τὸ δόσος*, i. *ἀπὸ τοῦ αἵματος ἰσχυρὰς ὄντος*, *ἀπὸ τοῦ αἵματος*, i. cum bilis flava nimia abundantia; vel ipsa syncera eximie permixta est cum urina.

60 **AC NE VIX QVIDEM EXIGVAM HABENS HYPOSTASIN**] De nullis chyli reliquiis ab hæmatosi quæ vim naturæ effugerint, vel in hepate, vel in venis, quibus quidem nihil aut parum apponitur *αἷος*, τὸ αἰμώδες, i. ad sanguinis confectionem. Est enim hypostasis, reliquiarum materiæ sanguinis

candæ, cum inchoata est redintegratio, & febris mitescit: quemadmodum altera contra naturam de corporibus quæ liquuntur. Atque illa quidem, subrubra, vel alba est, qua itur ad crisin, de inchoato vel absoluto pepasmo, duce natura, cuius officium est ipsa concoctio, quæ cernitur; inchoata quidem, in vrina subrubra, & subrubra quoque hypostasi; perfecta verò & absoluta, *ἢ ἀμικρύνει*, in colorata bellè vrina, crassa, cum pari coniuncta hypostasi, videlicet alba & læui. At verò cruditatis aperta, minimèque obscura significatio est in tenui & biliosa vrina, quæ glutinosam vix habet hypostasin. Est enim tenuis, vacuitate pepasmi: biliosa, ob febris indomitam feritatem: vacua hypostases etiam glutinosæ; quia de chylo nihil aut parum apponitur *αἵματι*, quæ sola est vnicum naturæ perfrugium quod tueretur & pugnat cum morbo.

TUM QUÆ IN MELIUS, MODO IN PEIUS MUTATUR Cum scilicet pari magisterio certant inter se natura & morbus; ac modò huius, modò illius dominatur res eunt: sed tamen vis maior est morbi qui vires acquirit cundo, ac tandem naturæ præsidia labefactat. Hæc autem mutatio melioris in peius, partim est contumacis materiæ, partim fatiscientis naturæ.

LONGI EST MORBI Cum scilicet par est vicissitudo atque mutatio melioris in peius, & contra huius in melius, de pari certamine, paribusque viribus naturæ & morbi; exemplo gladiatorum pariter dimicantium, quorum virtute pari, diu victoria manet anceps.

SIN AUTEM HÆC LONGIUS CONSEQUANTUR i. Si ægri res diutius eant *ἢ ἢ αὐτῶν*, i. *ἢ ἢ αὐτῶν* quæ dictæ sunt conditionibus.

ET CIRCA CRISIN TARDIORA SINT OMNIA i. Diuturna sit acrisia, de cruditate ac segniore natura: aut si crebrò fuerit irrita proritatio & exherismus ad crisin, de fatisciente natura, nec mitescente morbo.

PERICULIO CERTEN NON VACANT Nam longa tempora & multi labores morbi infracti, tum colliquatio mala naturæ; abscessuum causæ sunt vel minorum quàm ut prodesse possint, vel etiam sæpe maiorum quàm ut perferri queant. Ipsa autem irrita proritatio in nulla spe crisis, nec indicata prius; ut certè indicari non potest sine morbi infractione diebus indicibus; semper cietur *δυσεντερίας*, non raro etiam *ῥαγιστάδης*.

6. Ὑδατώδης δὲ καὶ λευκὸν διατέλεος ἐν χρονίῳ· δύσκειλόν γίνεται, καὶ ὁ ἀσφαλές.

Aquosa verò & alba exactum ad morbum, in vetustis quidem; difficilis est, nec secundi indicij.

IN HAC VRINA, cruditatis summa sunt omnia, non maleficio quidem morbi, sed infirmitate summa naturæ, ut propalam explicabitur hoc nostro examine.

AQUOSA VERO ET ALBA i. Quæ aquâ tenuitate & splendore contingit, ac nominatur alibi pellucida & aquosa, expers tincturæ biliosæ: cuius originem atque causam cūr sit huiusmodi, quoniam magni refert cognoscere ad prædicendum de morbis in quibus apparet; mea sic ratio est ad scopum authoris, quòd mea omnis attentio esse debet. Igitur aquosa vrina & alba, quæ est huiusmodi ab initio morbi vetusti, ad eum exactum (sic enim posuit noster præceptor) causam profectò ostendit, incredibilem cruditatem feri eorum qui sunt in venis humorum, collapsa virtute coquendi. Est enim sic ducta è venis, renum potentia secretrice; non eò prorupta, concolor vino albo, vel aquæ liberalius haustæ. Nec verò inexplabili renum siti ad eam explendam, illuc est rapta. Tum verò ex euentu sic esse non potest, sed ipsa per se: quia in morbo vetusto, & comparata sic eius historia; nihil est planè criticum vel symptomaticum, quod bilis tincturam deleat ex vrina. Sic enim præceptor posuit in hac prognosi.

EXACTVM AD MORBVM IN VETVSTIS Vbi tum nulla excusatio esse potest albæ vrinæ, actenuis & aquosæ, vel de translata bile ad cerebrum; vnde vel hæmorrhagia moueatur, vel ipsa phrenitis, quia febris vetusta est; nec vlla etiam de bile ad aluum delata; vnde futura sit dysenteria; ob febrem vetustam, & in vetustis: quoniam talis fluxit vrina exactum ad morbum. Nam in acutis morbis, saturata bile vrina, postquam pepasmo miruit, si ea repente bilis coloratio deleatur, ac tum vrina sit aquosa & alba; iuuenibus quidem, hæmorrhagiam mox proruptum iri testatur: senioribus autem, dysenteriam affuturam. Exempla sunt in Epidemiis, ac super his thesaurata quæ sic leguntur. *Vrina fluebat tenuis, aquosa, & pura post crisin, & multam hypostasin, ceteraque omnia bellè comparata ad crisin.* Memorabo eos quibus hæc facta sunt. In iis erat Bion qui apud Silenum iacebat. Gratias apud Xenophanem: *ἦτορ Μνηστράν, &c.* Deinde subiunxit. *His peractis, facti sunt omnes dysenterici.* An quia vrinas minxerunt aquosas, id verò considerandum. Vbi Galenus hæc verè posuit atque apposuit. *Εἴτις γὰρ τοῦ καὶ δὴ ἐν τοῖς ἐποῖς ἐκ τῆς ἀφῆς ἡ χροιά ἐστι γαστρίης πύρις τῆς δυσεντερίας ἐργασμένη.* i. Credibile est, cū vrinis expurgatum non sit biliosum, dysenterias ab eo induci. Nam hæmorrhagiæ similis ratio est in iuuenibus, quorum vrinæ similiter sunt constitutæ ut prædictorum: dissimili tamen bilis *μικροῦ* segregatæ ab ipsis. His enim sursum *πυκνῶς* esse soler: ut illis deorsum. De iuuenibus quidem, cū iis anadrome biliosa non ciet hæmorrhagiam, sed contra in cerebro mouet delirium, vbi subsistit; illud est positum à præceptore. Obortæ sunt plurimis hæmorrhagiæ, præsertim adolescentibus atque iuuenibus. Ac certè inter eos plurimi moriebantur, quibus non sanguis fluebat

aph. 72.4.

comment. ad
hust 9. part 3.
Epid.

10

20

20

30

30

40

40

40

40

40

60

60

Periculosa inter urinas quæ biliosa est nec subrubra; tum similis amylo, cum alba hypostasi. Quinetiam ea quæ & colore & hypostasi variegata est: idque potissimum, quando è capite sunt rheumatismi.

IBI DEMUM vrina pessimis ægri rebus emittitur, unde significatio est inualescentis atque immitis morbi, & partium corporis quæ liquuntur. Hæc ita esse denunciatur quæ in hac prognosi est posita: ut planum faciet ac propalam explicabit analytica eius recensio quam sic aggredior.

PERICULOSA INTER VRINAS] Non quidem periculo eximia præter cæteras: sed quæ inter alias metum adfert sinistri exitus atque ipsius exitij.

QUÆ BILIOSA EST] i. Quæ ex ardore nata τὸ πύρος, i. pinguis, quod vnica est bilis materia, nihil aliud præ se fert, nec in conspectu habet quàm bilem synceram. Sic enim τὸ χολώδες dici reperio quæ sunt vel ipsa bilis, vel saturata sunt multa bile: quales adducti sunt ἰκτεράδες καὶ χολώδες, i. icterici multa bile foedati. Ergo. BILIOSA VRINA] i. Quæ funditur de bilis regno in hepate & hepatite, ex ardore τὸ πύρος vel in hepate, vel in venis. Ac talis vrina, periculi multum habet, nihil autē securitatis: quia est immitis morbi, τὸ ἰκτεράδες καὶ τὸ ἰκτεράδες corruptentis. Nam bilem flauam nasci à febre acuta, similiter ut febris ipsa primum à bile nata est; planè testatur illud solenne Galeni ad locum Hippocratis de bilis vomitu qui malè habet miseros à luxata maxilla. Sic autem Galeni iudicium est. In febribus peracutis biliosa gigni syncera per corpus, mirum videri non debet: si quidem ab his febribus, tum adeps liquitur, tum caro tenera & recens coacta, tum sanguis ipse affatur. Sed multum interest inter biliosam vrinam febrium acutarum, & eam quæ venit ab ictero symptomatico bilis obstructæ (nam icteri critici non est biliosa vrina, sed colorata bellè.) Est enim febrium acutarum biliosa vrina, de bile τὸ πύρος: icteri autem, de naturali bile non segregata, sed mixta cum fero futuræ vrinæ. Ergo biliosa vrina febris acutæ, nata ex pingui hepatis & hepatitis à febrili ardore, multum ostendit periculi, de magisterio febris in ipsam naturam.

NEC SUBRUBRA] Quæ sit eiusmodi; modica bile tincta, vel etiam multa, de vitio simplici obstructæ bilis vesiculæ; qualis in ictero cernitur sine febre, ac sine iecoris inflammatione.

TUM SIMILIS AMYLO CVM ALBA HYPOSTASI] Polentæ similis hordei frizi, cum parte aliqua molæ tritutam effugit. Hoc enim dicitur Græcis τὸ κέλευρον: propterea quæ consultò, appositè vertimus, quod in vrina est amylo simile. Non enim liquori vrinæ tribuendum est τὸ κελευρόδες: sed eius hypostasi. Quod spectat illud prognosticum. Κελευρόδες ἐν πύσιν ἔρπον ἰκτερίαις. Nec verò illud obstat quod author apposuit. CVM ALBA HYPOSTASI] Quæ est huiusmodi, non de materia quidem laudabili à pepasmo: sed potius de liquefacta, febris incendio quo partes ipsæ conflagrant, & inde liquuntur. Atque illa calamitas, febrium est acutarum, non autem earum quæ mitiores sunt: in quibus vrina genituralis apparet, de albuminea pituita. Solenne est illud Hippocratis. Ἐν Περὶ τῶν πυρετῶν τὸ τῶν οὐκ ἔχοντων ἰκτερίαις. i. Perinthis vrina genituralis, erat eiusmodi quale quippiam criticum esse solet. Et verò Galeni iudicium est; tali vrina, febrium diuturnarum pituitam emitti quæ ipsas fouebat. Vide historiam de Sileno.

QUINETIAM COLORE ET HYPOSTASI VARIEGATA] Quia multarum est soboles affectionum; siue illa colorum varietas & hypostaseon, modò diducta sit, modò permixta sit. Atque illa varietas multum infert difficultatis pepasmo; vel etiam multum habet periculi, ut causa eius in cruditate aut colliquatione ipsa consistit. Talem vrinam refert Hippocrates emissam fuisse à quodam qui apud Dealcem iacebat. Ipsius verba hæc sunt. Οὐδε κατὰ ποτὶνα, ἐναφρηματὶ ἔχοντι καὶ σμικρῷ δὲ κεματὶ τῶν οὐκ ἔχοντων. i. Vrina tenue, variæ, encephalitis prædictæ exiguis, similibus genituræ.

IDQUE POTISSIMUM QUANDO È CAPITE SVNT RHEVMATISMI] Nam febris & catarrhi è capite, mutua est αἰνυμπελα.

9 Κινδυνώδες δὲ καὶ τὸ ἐκ μύχωνος μθισάμνον ἐς λεπτόν καὶ χολώδες καὶ τὸ ἔξ ὑποστάσιος διασώμνον.

Periculosa quoque vrina quæ transit de nigra in tenuem biliosam: tum illa quæ ex hypostasi sua diuellit.

PERICULOSA QUOQUE VRINA] Quæ scilicet metū adfert sinistri exitus, atq; ipsius exitij.

QUÆ TRANSIT] i. Quæ mutatur, deposita priore idea quam exhibebat in sui liquoris colore & consistentia.

DE NIGRA IN TENUEM BILIOSAM] Non eo quidem quod atrii coloris in flauum mutatio sit, quod est ἀδυνάτων, propterea quæ ἀπὸ τοῦ αἵματος in eodem subiecto. Est enim flauis coloris de nigro, dictū absurda παλινφρέσις: quemadmodum ratio philosophica est, καὶ ἐν γὰρ μεταβάσει de transitu bilis flauæ in nigram. Erit igitur illud scitum, quod sicut bilis flaua transit in nigram: sic hæc vicissim non redit in flauam. Vt

nam. Vt sanè hic verbum μετέσται, & inde nata μετέσταις; καὶ ἀρχηται; usurpantur videatur pro ipsa mutatione quæ in urinam cadit de alio statu naturæ. Et quamquam urinarum nigra est pessima, cum talis emittitur de sero perusto à febrili ardore; ut eius mutatio in flavam & tenuem præ se ferat speciem mutari in melius: tamen in hac etiam periculo locus est de pari naturæ infirmitate quam ostendit tenuitas cum febre inuicta, nec mitescere adhuc; unde ipsa bilis perennitas quæ biliosam facit urinam: Et verò si urina sit nigra, nigro humore perfusa & saturata, de menstruâ melancholicis, ut in muliere Thasia vultuosa, minus habebit periculi quam tenuis & biliosa quæ illi succeder. Ac sanè urina tenuis & biliosa, ex æquo certant pariter è natura egressæ, non tamen similiter; quod illa tenuitas infra naturam est quæ languet effecta in officio coctionis: coloratio autem supra naturam, est à dominatu morbi; unde bilis perennitas, qua multum fucatur cruda urina. Vt enim coctione crassescunt omnia excrementa: sic cruditate manent tenuia. Est autem positum à Galeno theorema catholicum ad illam sententiam præceptoris. Quod viris deterrimæ sunt inter urinas nigra: pueris autem, aquosæ. Est, inquam, positum hoc theorema; quod ea quæ cum natura pugnant supra modum, perniciose quoque supra modum esse solent. At puerorum aquosa urina tam est contra naturam ipsorum (qui facultate coquendi, unde crassescunt omnia, cæteros omnes præcedunt) ut nihil magis contrarium esse possit.

TUM QUOD EX HYPOSTASI DIVELLITUR] Tale est enæorema; quod vocat Hippocrates διασπασμένον, quod cum substantia prauum sit, multum ipso loco quem occupat, & sua diuulsione adiicit præiudicium atque periculo. In eo enim vis morbi pariter lucet, atque nativæ caloris imbecillitas.

10 Καὶ τὸ ἐκ σφοδρόδου ὑπόσασιν ἔχον ὑποπέλιον· ἄρα ἐκ τοιούτων ὑποχόνδριον ὀδυᾷται; δοκέω δὲ δεξιόν· ἢ καὶ χολώδες γίνονται; καὶ τὰ παρ' οἷς ὀδυώδεα; τύποισιν ἐπὶ βραχὺ κοιλίῃ κατὰ ῥαγίσσιν· ὀλέθριον.

30 Quinetiam quæ ex glomerata subliuidam habet hypostasin, etiamne tum in dolore est hypochondrium? idque opinor dextrum: aut sunt præterea biliosi? atque assurgunt paratides dolorifica? His brevi prorupta alius; pestifera.

EST ILLUD iam positum ac demonstratum, nec ita pridem, quod modò attigimus; quod scilicet inter urinas periculosa est colore & hypostasi variegata. Urinam eiusmodi variegatam hypostasi, suo exitio minxit Philiscus, qui sextum morbi diem agens, interiit. Varietas autem sic recensetur à præceptore. Urina autem varia exhibebant enæoremata, partim rotunda, partim genitura similia, partim dispersa. Igitur ad examen primùm adducta sunt enæoremata κριμαίονες, i. quæ amylo similia, seminis modò sunt alba. Sic enim πικρυνώδες λευκάς ἔχον ὑποσίσιαι, legitur apud eum qui in Dealcis horto iacebat. Tum superiore prognosi, urina vitia sunt explicata, cuius diuulsio est enæorema. Superest ut rotundum hic positum, cuiusmodi sit, & quorsum appareat explicemus.

QUINETIAM] Hic etiam non minori periculo locus est, quam in cæteris enæorematis, quæ pariter loco; materia; & ideâ in vitio sunt.

QUÆ EX GLOMERATA] Ex σφοδρόδου; quæ lectio mihi melior visa est quam illa vulgata, ἐκ σφοδρόδου, i. è torminis: ne cui formula hæc loquendi opinionem faciat de alui torminibus positam esse prognosin. Tamen si Capito ac Dioscorides, qui eam lectionem probarunt, ipsam de urina recensuerunt, hac ratione adducti; quod hypostasis nomen hic scriptum, in omni doctrina Hippocratis pertinet ad

urinam, non autem ad deiectiones, quas forte quis existimavit nasci de antegressis alui torminibus. Ac sanè Dioscorides author est, referente Galeno, ἐκ σφοδρόδου ἔρα λεγόμενα ἔχοντα ὑπὸ τοῖς ἐμφερόμενοις, i. urinas quæ intra se habent innatantia quadam, coacta. Ex quibus efficitur quod enæoremata hic coacta, eiusmodi sunt ut ea quæ in Philisco nominavit σφοδρὰ, i. rotunda: tamen si urina Philisci, modò rotunda atque coacta, modò dispersa, modò similibus genitura variegata fuerit. Et verò nos, ut videmur, verè & appositè vertimus ἐκ σφοδρόδου, glomerata: quod σφαιρῶν verbum non tam cogendo, quam circumagendo; videatur efficere πρὸς σφοδρὰς; exemplo filorum quæ glomerantur, si circumaguntur in glomos, tela texendæ causa. Ergo. QUÆ EX GLOMERATA] Coacta, si credimus Dioscoridæ; qui verbum, πρὸς σφοδρὰς, positum esse dicit ἀπὸ τῆς πικρυνώδους. Est urina coacta, rotundo enæoremate: quod in Philisco nominavit σφοδρὰ, cuius contrarium est πρὸς διασπασμένον, i. dispersam; quod ad figuram attinet, non ad materiam. Brevis glomeratisque coacti enæorematis atque diuulsi, aut, si maius, dispersi, eadem materia esse potest de his quæ partim assantur, partim liquuntur in hepate, rebus aut liene, à febrili ardore. Ac dissipantur aut diuelluntur quidem, velut σπασμῶδες, i. frustulatum diuulsi, ut carnes emortuæ quas vulgus nominat mortificatas. Glomerantur autem, & velut in orbem coagulantur à calore spissante.

Coac. 8.
huius. cap.
hist. 1. 1. Epid.

procr. 64.
1. 3.

SVBLIVIDAM HABET HYPOSTASIN] Quæ signum edit partis emortuæ, unde liquefacta excernitur.

ETIAMNE IN DOLORE EST HYPOCHONDRIVM, IDQVE OPINOR DEXTRYM:] Sanè quidem: quia inflammatione tandem liuescit, funditque *κατὰ πόρον* similem per urinas. Sanè inflammari iecoris, i. incendio conflagrantis *κατὰ πόρον* similis cernebatur in glomerato encephalate. Nunc verò eiusdem ab inflammatione liuentis, liquefacta ex eo liuet hypostasis, quæ ut emortua, fundum petit & occupat; nec ampliùs, ut solebat, volitat in urina: similiter ut phthisicorum spuria muriam conspuentium, subeuntia fundum aheni tanquam emortua, cum in propinquo mors est. Hic facillè, dextri adiectione vox *hypochondrij* caruisset: cum ipsa per se sufficeret ad hypochondrij dextri notationem.

AVT SVNT PRÆTEREA BILIOSI] Ab hepate inflammato. Sunt autem biliosi tum *αἵμα*, tum *κατὰ πόρον*, tum *ἐξω*: cuiusmodi sunt icterici multa bile fœdati.

ATQVE ASSVRGVNT PAROTIDES DOLORIFICÆ] Quales assurgunt *αὐτὰρ οἱ ναοὶ* atque vigilibus: quando anadrome sanguinis biliosi ad caput, ibi subsistit, nec foras emittitur per hæmorrhagiam; tum in parotidas mutatio esse solet.

HIS BREVI PRORVPTA ALVVS; PESTIFERA] Non illa quidem qua defunguntur periculo sænarum parotidum carentium empyemate: sed illa quam fundit hepatis *ἀπορία*, quam diuturna intulit inflammatio, significata priùs hypochondrij dextri dolore & ictero. Sic enim Galeni iudicium est de hac proluvie alui. *Accidit autem ut ager mortiferè habeat de profluente aluo: quòd scilicet illud profluuium non lege critica moueatur, ope naturæ humores qui sunt in vitio deijcientis: sed propter summam virtutis quæ est in hepate infirmitatem.*

II. Οὐρα ἑξαίφνης πρᾶλόςως ἐπ' ὀλίγον πεπαυρόμενα· φλαῦρα καὶ ὅλως ὁ πρᾶλόςως πέπον ἐν ὅξει· κακόν.

Quæ ex improviso immerito paulisper urina coquuntur; prauæ. Atque omnino, quicquid immerito coctum est in acuto; malum.

DE PAROTIDIBVS propheticum legitur καὶ ὁ ἑσθαι huius catholici theorematis. Sic autem scriptum est. Οὐρα πῶσι παρ' ὧν ἔχου καὶ ἐπ' ὀλίγον πεπαυρόμενα· φλαῦρα. i. Urina in parotidibus quæ citò atque paulisper coquuntur; prauæ. Ad quam sententiam, Galeni hæc fuit logica observatio. Quod in hac oratione dictum est particulatim, vniuersali subiaceret huic sententia; quòd scilicet quouis in morbo quæ citò & paulisper coctæ sunt urinae, sinistri aliquid præ se ferunt. Est autem hic posita vniuersalis sententia de urinarum cita, immerita, & fugaci concoctione; propterea quæ non fida, sed insidiosa.

QVÆ EX IMPROVISO] ἑξαίφνης: quod idem est atque *πρὸ αἵματος*, i. de improviso, quod in prorrhethico scripsit *ἐχέ*, i. citò: non tamen eo scriptum, ut breue tempus ostendar incipientis morbi, cum hæc apparent & fiunt. Nam illa vox, de improviso, non minùs est morbi vetusti, quàm inchoati, vel ineuntis; modò res iuerint *ἐξ τῶν αὐτῶν*, i. pari ratione symptomatum, & causis iisdem: ut scilicet maneat par & æqualis cruditas *ἡ διαφανομένη*, donec repente præter spem coctæ appareant.

IMMERITO] i. Non domita feritate humoris morbifici, nec dolorifici mali, cuius indomitam cruditatem intus subesse, modò urina denunciauit: propterea quæ falsò puratur nunc esse particeps concoctionis, cuius antea fuit expers. Non enim credibile est tam citò edi pepasum eximie cruditatis. Notum est illud, *οἱ πεπασμοὶ οὐκ εἰναι τῶν χρόνων*. Atque in pepasmo certi sunt gradus; primùm quidem inchoati, mox manifesti: tum autem perfecti. Ut sanè tam cita & repentina concoctio, & falsò credita de vi naturæ, cum pari humoris obedientia, & insidiosa esse videatur. Sic pus emissum secti thoracis aut perinæ, ferramento chirurgi, sæpe nos fallit, cum falsò creditur idem esse quod in thorace vel in vesica subest. Sic in urina prorupta aut rapta in morbis acutis, magnà discessio esse solet ab ea quæ consuetudo ductu è venis transmittitur ad vesicam: cum scilicet illic præterpita occasio est coquendi, vel inflammandi urinam.

ET PAULISPER COQVNTVR] Cum scilicet illa coctio est exigui temporis: id enim significat, *ἐπ' ὀλίγον*; ut in illo. *Αἱ ἐπ' ὀλίγον δραστήιαι καὶ ἐκφυγίαι· μεταδίδες*. i. Deliria paulisper ferocia, transiens ad immanitatem. Ergo urinae coctæ paulisper, quæ mox funduntur crudæ & inflammatae, ac multa bile saturata, quales initio apparuerant.

PRÆVÆ] Sunt autem huiusmodi, mali præsentia, & boni absentia: quoniam inde significatio fit inualescentis morbi, & faciscentis naturæ.

ATQVE OMNINO, QVICQVID IMMERITO COCTVM EST IN ACVTIS; MALVM] Non quidem vitio coctionis quæ mala esse nequit; ut neque aliud quippiam quod sit reapse bonum, qualis est ipsa coctio: nunquam enim de bonis auguria mala sunt; neque de malis, bona. Sed quòd fugax coctio versa in pristinam cruditatem, eiusmodi sit, vel de collapsa virtute coquendi, vel de humoris morbifici succrescentis perennitate. Nam illud positum, *κατὰ πόρον*; non est pepasmi beneficium naturæ carentis; sicut leuatio *μὴ κατὰ πόρον*; sed eius materię quæ vel morbifica non est, vel succrescendi perennitate respuit omnes conatus naturæ. Qualem accepimus Thasi regnasse catarrhum. De quo hæc

scit, καὶ ἀπομένον, ut aphorismo illo. Ἡ αἷμα ἢ πῶς ἐπὶ τὸν νεφρὸν, ἢ τὴν κύστην ἐκέρχεται. i. si sanguinem aut pus quis meius; vesicæ aut renum exulcerationem ostendit. Vbi Galenus fundamentum statuit veritatis in verbo præsentis, ut scilicet finis non fiat meius sanguinem aut pus; alioquin veritas non esset aphorismus. Sic etiam veritas non constaret huius prognoseos, si non perpetua esset ἐρσις, sed interrupta; cuiusmodi fuit illa quam sic describit. Οὐ γὰρ δὲ ὑδατώδεια, πικρία, κατάρσις, καὶ μὲν κλειον, καὶ ἰσχυρὰς πικρίας, καὶ ἰσχυρὰς καλὰς κακὰς κακὰς. i. Urina tum erant aquose, tenues, pueræ; idque post crism, cum iam edita esset multa hypostasis, ac cætera conuenienter apparuissent ad crism. Et mox. Μετὰ δὲ ταῦτα, δύσπεπτοι, ὅτι παύται. ἔξω ὅτι ἐρσις ὑδατώδεια. σκεπτικόν. i. Postea verò quam hæc ita fuerunt, dysenterici omnes hi facti sunt; an quia urinas reddiderunt aquosas; considerandum. Est igitur posita in hac prognosi urina aquosa; non quidem similiter ut illa Bionis & ceterorū quæ ad speciem crism, emissæ est post signa pepasim ad tempus: sed ea quæ vel fugaci & citæ concoctioni successit, vel quæ ad morbum exactum, nullo modo à se mutata, meiendo expressa est. Atque hæc quidem sic accipienda, ut nullam habeat excusationem proruptæ à nimia portione, aut raptæ urinae, ob inexplabilem sitim renū: sed quæ à renibus de instituto ipsorum ducta è venis ὡς ἐσθλόν, infra mittitur ad vesicam. Talis urina, de morbi & ægri natura multum egressa, cur ita sit; considerandum. Enimvero in hac urina, summa cernuntur omnia cruditaris. An quia crudus humor toto prorumpit corpore, vel catarrhus è capite? An verò quia venarum & hepatis virtus coquendi collapsa est? Eriamne quia derivatio bilis ad intestina, vel eiusdē μεταστάσις, ἢ καὶ ἀναδρομή, colorationem urinae deleuit? De causa postrema, authoris hæc ratio est, *ΑΤΟΥΕΡΟΤΥΣΙΜΩΝ ΙΝ ΠΗΡΕΝΙΤΙΚΙΣ*. Quem locum ut breuiter: sic verè & appositè Galenus enarrat, causasque aperit urinae aquosæ, cur ita sit; his verbis. Τα δὲ ὑδατώδεια ἔστι ἐρσις. πικρία τῶν ἐν τῇ διαφάνει λευκία. παμπικρὴν πικρὴν ἀπὸ τῆς διήσεως, καὶ ἀπὸ τῆς ἐν τῇ ἐν τῇ χολῇ ἀπασαν τὴν ὀρελὴν αἶνα γενομένην ἀπὸ τῆς κατὰ τὸν νεφρὸν. i. Aquosæ urina; eiusmodi enim sunt pellucidæ albæ, & magnam cruditatem ostendunt, & universæ bilis translationem ad caput. Idem Galenus ad locum de albis deiectionibus phreniticorū hæc scripsit. Deiectiones albæ huiusmodi sunt in istericis, interclusa bile ad aluum: in phreniticis autem, δὲ σφοδρὰν πύρωσιν ἐν τοῖς αἰσθητοῖς καὶ πάσας μελεις, ἀναπαύσαντες τὴν αἷμα σὺν τῇ χολῇ. i. propter magnum incendium superarum partium iecoris, quo sanguis una cum bile absorbetur. Quam autem periculosa sit in morbis acutis aquosa urina, dictum est circa initia comment. huius nostri. Sed de phreniticis est audire Galenum, cuius hæc verba sunt. *Quæ phreniticis conualuerit, cui talis urina fuerit in conspectu; noui adhuc neminem.*

14. Πονηρόν δὲ καὶ τὸ μὲν ποτὸν, ταχέως διαρρέμενον· καὶ μάλιστα πλεθρῶν καὶ οὐκ ἐπιπνυμονικοῖσι.

Praua est item quæ mox à potu effluit; maximèque pleuriticis & peripneumonicois.

CONTINUATA hic recensio est urinarum prauarum, de quarum numero illa est etiam quæ mox à partu effluit.

PRAVA EST ITEM i. De numero urinarum prauarum illa est etiam: sicut cætera iam explicata. Vbi coniunctio separatiua, & rectius legeretur per coniunctiuam, *καὶ οὐκ ἐπιπνυμονικοῖσι*.

QUÆ MOX À POTU EFFLUIT Non quidem ὡς ἐσθλόν, i. quemadmodum consuevit, de instituto renum ducta è venis, λόγῳ τῆς φύσεως, i. lege naturæ: sed ut symptoma præreptæ occasionis coquendi, raptæ in renes, ob inexplabilem sitim ipsorum: vel eò prorupta, ex nimia portione: ut sit urina concolor portioni, quam supra diximus ex Hippocrate, ἐροῖ ὁ μόνος πικρὸς. Ac talis urina proportionem responderet lienteria, quam impotentia ciet coquendi aut continendi ea quæ assumuntur in aluo. Atque hæc certè nobile est quod scripsit præceptor ταχέως διαρρέμενον, i. quæ citò emittitur, veluti diuretico quodā citata: quamvis eiusmodi non sit diuretica qualitate id quod bibendo assumitur. Igitur mox à potu meiendo, emittitur id quod bibendo assumitur: aut quia prærepta est coquendi occasio de impotentia continendi, tum ventriculo, tum in venis, δὲ τὴν ἰσχυρὰν φλόγην (ἢ τὴν νεφρὴν, κατὰ τὴν ἀπὸ τῆς πύρωσιν τῆς ἐν τῇ χολῇ, i. propter incendium vehementem renum, quod ad se rapit quicquid serosi est humoris).

MAXIMEQUE PLEURITICIS ET PERIPNEUMONICIS Enimvero hæc appendix quæ adiicit prauitati urinae expōsitæ, non est causarum ὁμοειδῶν, nec idem efficientium. Nihil enim facit pleuritis ad proruptam urinam vel raptam, cum talis à potu emittitur. Nam perirritica urinae straguriosa & purulenta quam fundit empyema pulmonis; iam non est peripneumonici à phymate crudo: sed potius empyici, ab eodem phymate cocto: tum nihil facit portio ad eam perirriticam. Ne quis dicat multum adiacere pleuriticorum periculo ab hoc vitio naturalis œconomia: quia quod plures principatus in vitio sunt, eò res ægri peius ennt.

15. Πονηρόν τ' καὶ τὸ πρὸ ῥίγους ἐλαγῶδες ἐρρέμενον.

Praua est illa etiam quæ ante rigorem oleosa meiendo emittitur.

HISTORIA est apud Hippocratem de Drōmeadi vixore puerpera cui cum puerperia respo-
dissent vt decet; nihilominus tamen febre oborta secundum partus diem agenti; sexto post die illius
febris acutæ interit: nihil adiuta nec puerperis conuenientior purgatis, nec etiam liberali sudore quem
rigor depunciat; quod hypochondrium illi esset intro retractedum, & vna spiratio magna & rara tum
verò quod vrinæ primum turbata, vt iumentorum, quas nominat *ἐκ τῆς κίτης*, secundo ac tertio diebus
meiando emissa; quarto & quinto ante rigorem in oleosas ac tenues transiissent. Ex quibus apparet,
nihil opis, nec adiuuenti posse ad morbos funestos adferri, ac lochiorum quidem purgatione, quæ y-
xorem Epicratis ab interitu vindicanit, quando ipsorum funesta vis cerneretur in excrementis quæ liquun-
tur è partibus, tum in earum etiam inflammatione quarum officii vitam carere non potis est. Hoc igitur
spectat prognosis, hoc vult Hippocrates; quod nulla critica, siue sint grises ipsæ, siue signa ed spec-
tantia, bene fieri nec apparere possunt in signis & causis moniferis.

hist. 11.
2. Epid.

hist. 5. 1. Epid.

PRAVA EST ILLA ETIAM] Inter ceteras hæc est de numero vinarum pestiferarum,
quotiescunque tandem meiando emittitur, nec vlla bonorum signorum accessione, de sua prauitate
concedit: sed maleficio superat omnia beneficiz.

QUE ANTE RIGOREM] Illum scilicet qui mouet sudorem, vel illum etiam qui frustra cie-
tur. Est enim rigoris sudoriferi critici ferè prænuncia vrinæ suppressio, cum incidit *ἐκ τῆς κίτης*. Hic au-
tem periculo semper est locus: nunquam autem securitati, cum hæc vrina sistitur ante rigorem. Nam
ea emissa cum rigor incidit sudorificus, nihil ab eo sperari, nec expectari potest præter incommoda cor-
poris inflammationi, vel exoluti, quoniam rigor & sudor veniunt *ἐκ τῆς κίτης*, i. e. malis. Omnia autem or-
ta è malis, ipsa quoque sunt mala: sicut è bonis bona. Sin autem hic rigor frustra cietur, quoniam præ-
senti facit ad diaphragma & caput, multum adiciet præsentis periculo, ex grauiorum symptomatum
accessione, cum signa eduntur corporis liquefacti. Sunt autem,

6. Epid. part. 1.

OLEOSA VRINA MEIENDO EMITTITUR] Quæ scilicet pinguis est de liquefacto
dipe, qualem in eo commemorat qui cum à febre incaluisse, liberaliter se inuitauit cibo & potu. Me-
morauit autem præceptor, cum ab initio febris vrinam fecisset turbatam, crassam & rubram, similem
iumentorum; ipsam die quinto, atque labentibus inde diebus, minuisse *καὶ ὁ λευκὸς*, i. oleosam leuem
vrinam, *πρὸς τὴν μετὰ αὐτὴν αὐτὴν*. Est enim genus alterum oleosæ vrinæ, i. colore & consistentia oleum re-
ferentis, quam facit ardor febrilis, non ipsa *κακὴ*: vnde qui homines *ἐκ τῆς κίτης* *ἀπὸ τῆς κίτης* *καὶ τῆς κίτης*
καὶ τῆς κίτης, i. ex aliis omnibus salutariter habent, citò indicantur.

hist. 12.
1. Epid.comment. ad
hist. 1. sect. 3.
3. Epid.

16 Πορνὸν δὲ ἐν τοῖσιν ὀξεσὶ καὶ τὰ χλωιδέα μὴ ἐπὶ χροὶ ἐόντα.

*Malum est etiam in acutis, cum virescentes vrina sunt, nec super-
ficie tenus.*

ENIGMATICA huius prognosin in virore, non in colore, vt ipsum nomen *μυρῶν* ostendit;
hæc mihi videtur non minus vera, quam appositæ explicatio. Vrina quæ toto liquore virescit; nec tan-
tùm in superficie, est febris acutæ ipsum periculosè habentis quem semel inuasit: secus ac oleosa toto
liquore quæ spem non adimit secundæ crisis, ac sæpe ad eam citò venturam apparet, cum cetera bene
sunt bonis ægroti rebus. Nam oleosa vrina superficie tantùm conspicua, cuiusmodi est *καὶ* in iussulis
carnium; quoniam talis funditur de pingui quod liquitur à febris *κακὴ*; secus ab altera quæ est fe-
brilis ardoris bilem-gignentis, ipsamque cum sero vrinæ admodum permiscens; & instar olei quo-
dammodo facientis, nihil omnino sperabile post se relinquit, nihilque securitatis ostendit; multum
autem periculi, vt demonstratum est superiore prognosi. Atque inter vrinam superficie tenus viridem,
& positam sic oleosam; tantum profectò interest, quantum inter viridem & oleosam, cum toto liquo-
re sic ambæ cernuntur. Vrina enim quæ superficie tenus virescit, febris est quidem acutæ, sua vi totam
vrinam non immutantis, propterea quæ spem non adimentis pepasmi. Similiter oleosa vt *καὶ*, domi-
nati febris malignæ ipsum etiam corpus quod liquitur, teneri ostendit: vt iam nihil sper reliquum sit
in natura. Vrina viridis toto liquore, bilis est in hepaticæ & in aorta incendio conflagrantis: vnde ipsius
primum flauæ in viridem mutatio est. Ex quibus apparet, quod varia consideratio est tertii periculi &
incertæ securitatis in vrina herbacea & oleosa, vt ambæ huiusmodi sunt in superficie, vel in toto liquo-
re. Nam in vrina viridi toto liquore, maiori periculo locus est quàm superficie tantùm tenus. At secus
est in oleosa.

Ergo. **MALVM EST ETIAM**] Vel potius, *malum est autem*: vt illa particula, &, superiori
prognosi præsentem opponere videatur super iis quæ sunt epiphænomena maioris aut minoris peri-
culi; prout illa cernuntur vel toto liquore, vel superficie tantùm tenus. Ergo. **MALVM EST AV-
TEM**] Quod scilicet nihil est peius profectum à febris incendio: si tantum exceperis vnam nigredinem
inde natam.

IN ACVTIS] Scilicet febribus, quæ & celeritate & vehementia eximia sunt, de quibus ea suc-
crescunt, tanquam de fonte perenni, quæ hic ponuntur malæ, quæque vt emittantur meiando, nullam
adferunt leuationem febris acutæ, quàm solum inuis subesse testantur, ac vires eundo acquirere. Non
sic in morbo regio febris experti, nec tamen critico: sed obstructorum bilis meatuum symptomatico,
quem sæpe vrina toto liquore virescens atque etiam nigra exoluit.

CUM VIRESCENTES HABENT VNT] *Χλωροί, i. herbacei*. Sunt autem herbe *χλωροί, i. virides*: quia distinctionem præceptorum semper apponitur mori aut corpori saturato virore, ut demon-
strauimus commentario ad *χλωροί, i. χλωροί*, contra Galenum.

N. E. C. V. P. E. F. F. I. C. I. E. T. E. N. V. S.] *Ua scilicet toto liquore vrina virore perfusa sit: nec tantum habeat* *χλωροί, i. χλωροί*, de quo iam diximus non ita pridem. Quod si recipiam nouum sit & inauditam nomen *πρὸς χλωροί* pro superficie; audiat Aristotelem, cuius hæc verba sunt. *Ἐν τῷ ἐνὶ τῷ σπέρματι τῷ ἐνὶ τῷ σπέρματι τῷ ἐνὶ τῷ σπέρματι*. *Πυρρὸν καὶ χλωρὸν ἐκ δὲ τοῦ*. *i. Cuiuscunque corporis superficiem veteres Pythagoræci vocabant* *χλωροί*. Et verò apud Hippocratem frequens est nomen *πρὸς χλωροί, i. πρὸς χλωροί*, pro æquali planicie. Pergamus ad reliqua.

17 *Ολέθριον δὲ ἐστὶ τὸ οὐρον, τὸ τε μέλαινα τὴν ὑπόστασιν ἔχον, καὶ μέλαν· μάλλον δὲ ἐν τοῖσι παῖσι τὸ λεπτόν τε καὶ παχέον.*

Pestifera autem est inter urinas quæ & hypostasim habet nigram, & ipsa quoque est nigra. Sed pueri pestifera est magis aquosa.

Ad uncturam *vrinam* de viridi transitus esse solet, ut bilis æruginea in atram, quando ad vltima ventum est synceri liquoris vrinam fundentis, & perustorum corporum quæ intra vrinam sunt aspe-
ctabilia, siue illa residant, siue suspensa sint, *ἐν τῇ ὑπόστασι*, siue superbaferent, *ὑπόστασις*. Omnia enim pariter æqualiterque nigrescunt, suis quæque locis distincta, & inde sic nominata, ut posuit quam-
uis eorum nominum significatio non semper de loco sit ubi apparent, in Epidemiis & aphorismis, tum in prognosticis apud Hippocratem, ut supra ostendimus.

PESTIFERA AUTEM EST INTER VRINAS] *i. Quæ signo pessima est inter omnia febrium* *ἐν τῇ ἀσθενείᾳ*, ut est in illo prognostico. Est δὲ τοῖσι *ἐν τῇ ἀσθενείᾳ καὶ τοῖσι γυναιξὶ τὰ μέλαινα* *ἐν τῇ ἀσθενείᾳ*. *Sunt autem mulieribus pariter atque viris vrina nigra pessima*. Sic enim τὰ *ὀλέθρια* dici reperio, vnde salutis de-
speratio est; tum ipsos ægrotos nominari pariter *ὀλέθριους*, cum desperati sunt. Prothetice est apud Hippocratem *ὀλέθριον*, quod mentis aciem Galeno exacuit in comment. Est autem sic positum. *Τὰ ὀλέθρια ἀσθενείᾳ βασιανισσάται· ἵνα τὴν σημαίῃ*. *i. Perniciosa quorum sine signis lenatio est; mortem subesse testantur.* *Quod* certè prothetice, est de morbis in quibus est multitudo prauorum signorum: proptereaque cum metito essent terrifici; nunc planè funesti sunt quando eorum lenatio est *ἀλλ' οὐκ ἔστιν ὁρμήσις*, *i. si-
ne salutaribus signis*. Ergo pestifera est inter vrinas, de qua sperabilis nulla curatio est febris acutæ, cuius ardore talis meiando emittitur.

Quæ et hypostasim habet nigram] Non quidem naram de succi reliquiis, naturæ vim effugientibus in sanguinis confectione: sed de confecti eius incendio, ipsum in cineres conuercente.

Et ipsa quoque est nigra] *Suo liquore, quem habet de sero eorum qui sunt in* *venis humorum*: quod quidem pari conflatur incendio.

Sed pueri pestifera est magis aquosa] *Quod est eiusmodi ac si dice-* *ret, omnium quidem deterrima est nigra vrina, quam facit ardor febris, perurdo serum & sanguinem:* ac tum ad vltima ventum est humorum incendio conflantium, ut in propinquo sit ipsa naturæ alienatio. Sed tamen in pueris vrina aquosa, proptereaque tenuis, longius abest à naturâ eorū, quàm nigra vrina virorum atque mulierum: ac propterea peior censenda in illis, quàm nigra in cæteris. Scitum est illud Galeni ad hoc prognosticum. *Τὰ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῇς καὶ τοῖσι ὀλέθρια τὰ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ*. *i. Vrina naturalibus ma-
ximè contraria; pessima*. Qua de re dictum est nuper in aquosa vrina. Quinetiam vrinarum nigrarum di-
stinctio adducta iam fuit.

18 *Τοῖσι δὲ λεπτοῖσιν τὸ ἀνὰ πάλιν ἢ σπινθηραμένοις, καὶ τὸ χαλαρὸν δὲς, γονοειδὲς, διαχρόμινον· τὸ δὲ αὐτὸ καὶ σπινθινόν.*

*Contra est de urinis tenuibus, quàm de concretis. Sed & grandino-
sa, genituralis, continenter effusa; laboriosum.*

Eadem tamen mali significandi vis: etsi causa est contraria; concretarum, insignis ardor; tenuium, caloris imbecillitas deuieti. Grandinosæ & genituralis hypostasies, eadem causa quæ liquoris crassi ac vehut concreti: sicut antea audiuius. Malum autem quodque, continuatione fit peius.

19 *Ολέθριον δὲ ἐστὶ καὶ πᾶν τὸ λευθαίως οὐρούμενον.*

Quinetiam perniciofa est omnis vrina quæ clam emittitur.

HACTENVS de vinarum pernicio in earum liquore, colore, & iis quæ intra ipsas apparent. Nunc ad meiendi modum transitus est; cum scilicet ea sine sensu ac voluntate meiendi emittitur: ubi periculo locus est maior quam in vrinæ virtutis quæ intra matellam fuit iussu meiendis emissæ, & ibi excepta.

Ergo. **QVINETIAM PERNICIOSA EST OMNIS VRINA**] i. Pernicie vinctæ ceteras illa vrina, cuiusmodi tandem fuerit, liquore, colore, & iis quæ intra sunt.

QVÆ CLAM EMITTITVR] i. Sine sensu ac sine vlla voluntate meiendi: secus ab ea quæ contra voluntatem egre meiendo redditur, ob impotentiam continendi, vel à vesicæ morbo, vel à symptomate; ac dicitur stranguria, quæ est iniuta vrina, quemadmodum hæc iniussa. Huius iniussæ vrinæ quæ tum αἰαδιήτως, tum ἀπογαγρέτως clam excidit, duplex est omnis ratio atque causa: vna quidem δῖα τὴν αἰαδιήσαν αἷον μολεῖον δι' ὃν ἡ ἐκκρίσις γίνεται, i. ob sensus amissionem partium quæ illi excretioni dicatæ sunt. Altera verò δῖα τὸ τὴν γνάμιν νοσῆν, i. quòd in labore sit animus. De sensus amissione in excernendo, solenne est illud prorrheticum. Ἀπὸ κοιλίης λεπὰ μὴ ἀθανομένον διέναι, ἐόντι παρ' ἐαυτοῦ κακόν. i. Ex aluo tenuia infra transmitti, nec sentienti, cum sit apud se; malum. De mentis labore in meiendo, scriptum est etiam illud prorrheticum. Τὰ ὑρέματα μὴ ἐπορησάντων ὀλέθρια. i. Quæ immemoribus vrinæ redduntur, perniciosæ sunt. Quòd autem & sensus amissio, & mentis labor appareat in hac vrina iniussa, declarat illud, κατὰ κράτος aduerbium, quòd nos clam vertimus: cum scilicet nulla vrinæ sensio excitatur; tum ex amisso sensu partium per quas elabitur; tum ex abolita seu deperdita phantasia. Est igitur iniussa vrina, iure optimo præter ceteras perniciofa, vnde ostenditur ipsa naturæ alienatio. Sed ibi demum alienatio magis lucet in omni corporis principatu, quando vrina clam reddita, iumentorum est similis: de qua in illo prorrhetico quaesitum est à præceptore. Ἀεὶ γὰρ πούτοις ἢ ὑρέται δῖα εἰ τὴν ἐπορῶσιν ἀναπαύσειας; i. An his vrina redditur plena velut perturbata hypostasis? Huius vrinæ clam redditæ, summa pernicies in illa prognosi expressa est. Quibus vrina clam illabatur ad pudendum; exoluuntur desperati. Exoluuntur enim, collapsis omnibus naturæ præsidiiis in animalitate sensus & motus: tum in nutritu partium nutritiarum; & principatu cordis vitali. Sunt autem desperati, vacuitate cuiusque vitalis officij: ob eamque causam, sine vlla spe potiundæ & perfruendæ salutis.

20 Περιπνευμονικοῖσι δ' ἐστὶν ὀλέθριον, καὶ τὸ ἐνδεχῆ μὲν πέπον· μὲν δὲ τὴν τετράδα, λεπτιωόμδμον.

Peripneumonicis autem perniciofa est etiam quæ principio quidem cocta, post quaternarium tenuatur.

QVÆ RENDA explicatio analytica huius prognoseos, Coaca 53. cap. 16. lib. 2. Nunc adducenda est omnis exposita ratio vinarum, & apponenda morbis acutis qui sunt in phlegmonæ viscerum & cum febre: quorum tamen vrinæ, propria non sunt epiphænomena, sed συνοδρεύοντα; plurimum tamen eorum periculo aut securitati adiiciunt, prout apparent bonæ aut malæ. Theorematis huius catholici 40 auctoritatem firmabit veritas hypotheseos de, primum cocta, mox cruda vrina, cum sic meiendo emittitur in peripneumonia, vnde hic positi peripneumonici nominantur.

PERIPNEUMONICIS] i. Illis quos occupat peripneumonia, quæ est pulmonis systrophica inflammatio: cuius symptomata hæc sunt; febris assidua; difficilis respiratio, parua, & frequens; calida expiratio; pectoris grauitas; dolor sub omoplata qui prorepat ad iugulum & ad mammas; angustia & anxietudo; delirium quoque ipsum.

PERNICIOSA EST ETIAM] i. Multum periculo adiicit peripneumoniæ, signo & causa: tum propter μεταστροφὴν ad pulmones; tum propter collapsam virtutem cœquendi, cum hæc mutatio incidit coctæ in tenuem.

QVÆ PRINCIPIO QVIDEM COCTA] Non quidem de febre mitificata, quæ nulla subest, nisi quatenus peripneumoniæ symptomata: sed cocta, de more institutæque naturæ, in bene morata chyloscæ & hæmatoscæ officina. Sic enim res eunt principio peripneumoniæ, vt in pulmonis vitio maneat sæpe integritas naturalis œconomiae.

POST QVATERNARIUM] In qua periodo nihil adhuc criticum peripneumoniæ, foras exire cœpit, sicut exire debuit, cuiusmodi sputum est paucum permixtum sanguine: sed contra pulmonis phyma est crudum, crescitque sicca eundo peripneumonia, & propagatur in vitium naturalis œconomiae.

TENVATVR] i. Aquefcit cruda, eo periculo peripneumoniæ, quo ipsius paratidis etiam coctæ: cum paulisper vrina cocta transit in crudam, vt supra iam vidimus.

21 Πλνθευτικοῖσιν οὖρον αἱματῶδες (χοφῶδες, μὲν ὑποστάσει ποι-
κίλης ἀδιακρίτου· θανάσιμον ἐν τεσσαρσὶ καὶ δέκα ἡμέρησιν, ὡς ὁπ-
πολύ.

Pleuriticis urina prærubra, caliginosa, cum varia hypostasi, nec discreta; maximam partem mortifera est quatuordecim intra dies.

Coac. 7. & 8.
cap. 16. lib. 2.

IAM PRIDEM constat, quod pleuriticorum res sunt in tuto cum liberalis est atque libera citò anacatharsis. Sed ei securitati multum prodest; alium mollescere, sputum colorari, strepitus in pectore nullos edi, urinam conuenienter meiendo emitti. Nam horum contraria difficilia sunt. Atque ut ea tantum attingam quæ sunt urinae contraria, qualis adducta est in hac prognosi; pleuriticorum non est tam certa leuatio ex anacatharsi, quam grauis offensio ex hac urina, siue ipsius causa vnde mouetur. Enimvero nihil prodest urinam conuenienter emitti, si manet sicca pleuritis, vel malè humescit, cum prauitate sputi. Sed non minora pleuriticum manent incommoda ex causis quæ adsunt prauæ urinae, quam ipsi beant commoda ex bona & facili anacatharsi. Tantum enim pleuritidi accedit causa morbifica ex domicilio prauæ urinae, quantum sputuendo detrahitur. Est quidem *ακαθάρτη* libera è thorace. Verum quid prodest pleuritico si eò anadrome est: perennis è foco prauæ urinae? Et verò pleuriticis de praua urina similiter accidit ut pictoris ancillæ quæ à parotide cocta interiit, quod faceret crudas urinas. Quod si pleuritidis cruditas, aut sputi prauitas, ex æquo certet cum prauitate urinae; de vitio naturalis œconomiae, aut partium quæ liquuntur, aut etiam de febris ardore; longa non erit vitæ permanstio: sed cita eius discessio, vbi collabitur vel impedita cessat œconomia, tum spiritus, tum nutritus, per quam vita hominum sustentatur.

Ergo, PLEURITICIS. Quos malè habet periculose inflammatio tunicae costis intextæ: cuius hæc signa sunt pathognomonica; lateris dolor pungens; difficilis respiratio; parua, & frequens; febris assidua; sicca tussis. Posita inflammatio tunicae costis intextæ, systrophica est: quam ibi facit rheumatis consistens, de rheumate concitato sanguinis biliosis. Nam cætera signa quæ fiunt, quæque apparent pleuriticis, veniunt propagata per *ῥευματισμὸν* rheumatis concitati & consistentis.

6. Epid. part. 1.
aph. 78. 4.

VRINA PRÆRUBRA. Non quidem cruentata de sanguine mixto urinae, qualis est calculorum qui *ὑρέουσι αἱματώδες*, ut annotauit Hippocrates: nec verò cruenta, quam fundit venula rupta in renibus: sed *αἱματώδες*, quæ instar sanguinis colorata nominatur *ῥοῦν ἔχουσαν*, i. urina prærubra, quæ sic apparet ex inflammato sero, vel ex syncera bile qua multum saturata, similiter rubet ut sanguis. Ac generatio quidem urinae prærubrae quorsum appareat, supra iam dictum est in prauis urinis.

3. Epid. part. 3.

CALIGINOSA. i. Umbrosa. Sic enim reperio *τὸ σιωδὲς* apud Hippocratem, authore Galeno, idem significare quod *τὸ ῥωδὲς*. Verba Galeni hæc sunt. *Σιωδὲς ἔστιν ἐν τῷ τῷ ῥωδὲς, ὅθεν σημαίνει τὸ μὴ λαμπρὸν, μὴδὲ καθαρόν, μὴδὲ ἀκριβῶς αἰθρῖον. ἔπ' δὲ τὸ σιωδὲς καὶ σημαίνει πάντα ὀνομάζεται τὰ πρὸς τὸ μὴ εἶναι διαφανή, πῶς πιστεύει δὲ καὶ τὸ ῥωδὲς ὅτι φέρει ὀνόμα, καὶ τὸ φεῖν ἔχει τὸ μὴ εἶναι ὁρ. i. Umbrosus dixit pro eo quod est ῥωδὲς, quod quidem significat id quod non est clarum, nec purum, nec exactè serenum. Et verò quæ sunt umbrosa, quæque opaca, omnia sic nominantur ad nigrum tendentia, quibus *ῥοῦν* ipsum nomen ῥωδὲς imponunt, ipsamque adeo fuscum quod in propinquo est nigri. Illic de aëre sermo est caliginoso nigro aut fusco, cuius appellatio de simili causa, urinae tribuitur. Ergo urina caliginosa, fusca, umbrosa, simili ratione ut aër, de nubè opaca suam agnoscit opacitatem ex fusco enporemate, vel ex fuligine sparsa per totum illius liquorem.*

CUM VARIA HYPOSTASI. Cuius varietas, variarum quoque affectionum præ se fert argumenta.

NEC DISCRETA. Vnde fit *ἀκατάρτης*: qualis est urina *σπορόδης*, affatulentis spiritibus, & summa infirmitate caloris natui.

MORTIFERA EST. Mortem subesse testatur; collapsa vitæque tam spiritus, quam nutritus œconomia: tum succrescente nona in horas recrudescentis morbi materia; ex vitio hepatis & hepaticis.

UT PLURIMUM INTRA XIII. DIEM. Qui finis est acutorum morborum, vel ad interitum, vel ad salutem. Sic autem non accidit pleuritico Anaxioni, quem scribit Hippocrates reddidisse *ἑξ ὠχρῶς πικρὰ, λευκὰ*, idque circa initia: sub crisi verò, cum expurgasset multa concretæ, exhibuisse multam & albam hypostasin in urinis, atque ita feliciter conualuisse.

22. *Θαυδασίμον τε καὶ ἐν τοσούτοις πλεονεξίαισι σιωδῆρας, καὶ τὸ ῥωδὲς εἶδες, μέλαινα ἔχον ὑπόστασιν, ἢ πιτυροδὲς.*

Sed illud confestim mortiferum est in pleuriticis: urinae reddi porraceæ, ac nigra fursureæve hypostasi præditas: cum supradictæ in pari casu pleuritidis, vitam vix antè finiant, quam ventum sit ad decimum-

NIHIL ERAT necesse huc aduocare signa funesta quæ in urinis cernuntur ad calamitatem mortiferam seu pleuritidis, & sputo carentis, vel *ακαθάρτης* prauam edentis, cum ipsa pleuritis homini necando per se sufficiat. Et verò in secuta pleuritide, merito *αἰσχυρὸς*, tantum illius securitati detrahunt signa hic posita, quantum periculo periculo adiciunt. Sed fuerit opere præcipuum demonstrare, cur hic tam citò siue confestim mortiferum sit, urinas reddi porraceas, ac nigra fursureæve hypostasi præditas: cum supradictæ in pari casu pleuritidis, vitam vix antè finiant, quam ventum sit ad decimum-

quantum

quantum diem. Enimvero, vrinarum viridium toto liquore coloratio est ab æruginosa bile per venas diffusa: hypostases nigrae aut nebulosi enzorematis materia est sanguis perustus incendio: fursurae autem cum cruda vrina, porrigo venarum; similiter vt cum crassa, vesicae. Ex quibus apparet, quod in plenitudo partem spirabilem occupante, citò ventura mors est, vbi colliquatio est & conflagratio partium nutritiarum atque humorum: sicut hic posita vrina testantur.

23 Καυσώδεις δὲ κατόχως· κάκιστον ἔρ(ω) δὲ τὸ μέλανον.

10 *Iis autem quos occupat febris ardens, aut iis qui cum febre sunt catochi; vrina est pessima, multum alba.*

HIC DE VRINA sermo est quæ, contra naturam morbi, aquosa emittitur: siue illius comparata sic ratio est de cruditate: siue tincturam eius deleuerit transitus bilis ad caput, & ipsam aquosam reliquerit. Nam raptae vrinae nulla hic mentio, nec item prorupta, quæ faciat opinionem aquosæ.

IIS AVTEM QVOS OCCVPAT FEBRIS ARDENS] i. Qui febris ardentis dominari renentur. Sic enim ponitur aduerbium illud κατόχως, pro eo quod firmiter fixum est. Sed alia quoque illius significatio est. Igitur, iis quos occupat febris ardens quæ inter acutas eximia est; rapto in venas ichore vbi conflagrat incendio: tum quia ichoris fera est qualitas: tum quia venæ labore & siti exaruerunt. Nam de natura causi & causis dictum est supra in febribus, ex Hippocratis lib. 4. de acutorum morborum diata.

lib. 1. huius operis.

AVT IIS QVI CVM EA SVNT CATOCHI] Non quidem illi propriè qui stupent attoniti, & quibus est impotentia conniuenti à siccitate, & frigida intemperie contraria comati, quod cernitur in conniuentia penè inuita, planèque iniussa: sed illi potiùs qui, catochorum more, palpebris nunquam conniuent, oculosque ostentant firmiter fixos atque immobiles; tum cæptis immanibus efferi, somnum inire non possunt, oculisve aut pectore noctem accipiunt, & sunt phrenitici, quales descripti sunt illo prothetico. Οἱ κεφαλῆ καὶ κατόχως, ὡς ἀκρόες, καὶ τῆς ἀπολαμμένης, ὄμμα θρασύνοντες, αἰτμητοὶ ὀπίσθεν πάδες γίνονται. i. Caput vehementer dolentes, deliri, alio suppressa, oculus ferocientes, rubentisque facie; opisthotonici fiunt. De quibus aliàs multa sunt à nobis conscripta.

VRINA EST PESSIMA] Periculo reddita citò venturae mortis, quod ea morbo adiciat ex euentu, & signo infirmitatis summæ caloris natiui ac virium.

MVLTVM ALBA] Cuius adducta est ratio & explicata nuper cur ita sit, cum in febre acuta, tum verò in phrenitide.

24 Οὐρ(ω) δὲ ὠμόν, πλείονα χερόν(ω) γνώμην(ω), ἢ ἄλλων σωτηρίων ἐόντων· ἀπόστασιν καὶ πόν(ω) σημαίνει· καὶ μᾶλλον ἐν τοῖσιν ὑπὸ φρεσίν.

At verò vrina cruda iam diu sic reddita, si cetera sint salutaria, abscessum denunciat cum dolore: idque in partibus quæ infra sunt sub diaphragmate.

CRISES morborum quibus eorum discessio est, suscipiuntur & absoluuntur; aliæ quidem excretionem humoris morbifici; aliæ verò abscessu, cum de humoris pepasmo & partium neoterismo natura τὴν ἐφοδὸν mouet in paroxysmo. Ac sanè diuturnorum morborum, nisi pòst exacerbentur, vt in Cleonide octogesimo; proprii sunt abscessus ad inferas partes, quando eorum diuturnitas in pepasmi difficultate consistit, meatuumque angustia; validæ autem sunt adhuc vires naturæ: alioqui pro abscessu, corruptio expectanda, quæ cachexiam inducit. Nam acutorum crises, potissimum excretionem suscipiuntur ἔξω καὶ εἰς; tum per sudores; tum etiam per hæmorrhagiam: idque iuuenibus, quorum meabiles sunt humores, meabile item corpus, ac iuueniles motus naturæ. Que tria sunt ad vacuationem criticam liberalem & liberam necessaria. Longa morborum historia est à cruditate humoris morbifici, deficiente pepasmo. Non enim hic ceteras diuturnitatis causas agnosco. Cruditas autem cernitur in proprio excremento, quod est vrina, cum diu tenuis & aquosa emittitur, qualem iam posuit superiore prognosi. Ac διαίρεσις quidem authoris est, atque scopus intelligetur examinando prognosin quæ sic conscripra est.

AT VERO] Disiunctiva particula, δὲ, aliò me conuertit ad iudicandum de simili signo.

VRINA CRUDA] i. Expers omnis pepasmi, qualis est alba: nec ea quidem sic colorata de bile aliò deriuata, sursumve ad caput transmissa; vt modò vidimus; sed cõctionis vacuitate alba & aquea, nec verò id virio coquentis naturæ; sed multum oppressa.

DIV. SIC. REDDITA.] Vt nulla sit excusatio nec ineuntis morbi, nec paroxysmi: quibus temporibus cruda meiando redditur & aquosa.

S. I. CATERA SINT SALVTARIA.] Non quidem quæ certam discessionem morbi ostendant, vt certè ostendi non potest in cruditate proprii excrementi, quod est vrina: sed quæ sperabilem vitæ salutem denunciant ex mitiori morbo: vbi nec inflammatio, nec venenata qualitas, nec irem nobilium partium occupatio, interitus metum adferunt: cætera autem votis naturæ respondent ac medicis; quæ sunt; libertas spirandi, cibi ac somni benignitas, sæui doloris & cruciatus vacuitas. Denique signa omnia quæ cernuntur in qualitate corporis, in actionibus & excrementis, proximè absint à naturali statu.

ABCESSVM DENVNCIANT CVM DOLORE, &c.] Non eum quidem qui fit κατ' ἐξοχήν, sed κατὰ τὴν ἀπόθεσιν, ab vna parte in aliam: quod vocat præceptor ἀπὸ τοῦ ὅπου δέξεται. De quo est illud præceptum. *Abcessus raro iis sunt, quibus rigores tum critici, tum periodici.* Nam calidorum morborum qui cient rigores, excretio critica esse solet. Tum illud etiam. *Οὐδὲν ἴσχυει περὶ μακροῦ πόντου ἢ φύματα ἐς τὴν ἀρσενίαν, ἢ πόνου γίνονται.* i. *Quibus longæ sunt febres; iis tumores ad articulos, aut dolores exoriantur.* Vbi Galenus febrium diuturnitatem agnoscit ductam ex crassis aut multis, aut frigidis humoribus, vnde nascuntur febres quibus ad concoctionem longo est opus tempore: propterea in iis consentaneum est phymata exoriri, &c, quod redundat, prolabi ad articulos.

25 *Αλγημέτων δὲ ἐν ὀσφύϊ πλανομένων ἐς ἰσχίον, καὶ ἐν πυρετῷ, καὶ αἰνῶ πυρετῷ.*

Dolorum per lumbos oberrantium, & cum febre, & sine febre; ad ischium transitus esse solet.

QUONIAM de abscessu dictum est qui de vrinis crudis futuris ostenditur in articulis qui sunt infra septum transuersum; hic signum est eius abscessus qui occupando ischium, facit ischiadem. Nam criticorum abscessuum communis præsentio comparatur, primum ex morbi specie, vt in assidua febre lenta laboriosa; nam intermittentium longiorum mutatio est in quartanam: mox in ætate constanti, cum iam in promptu non sunt tria commoda excretionis, vt in adolescentia & iuuentute; tum in tempestate hyberna: præterea in iis quæ sunt epiphænomena, tam excrementa, vt crudæ vrinæ; quam ipsa qualitas faciei, cum est turgidula, decolor, & venæ micantes: postremò si lassitudo sit alicuius partis aut dolor. Quibus accedit febrium acutarum inchoata excretio quæ ad ἀπόθεσιν se conuertit.

Ergo. **DOLORVM QVI PER LUMBOS OBERRANT.]** Vt oberrandi causa in lumbis posita esse videatur, nec aliunde profecta: quod certè abhorret à sensu prognostico. Sed hic loquendi modus, ὀσφύϊ, pro κατὰ τὴν ἀπόθεσιν, frequens est apud Hippocratem.

ET CVM FEBRE, ET SINE FEBRE.] Tum à catarrho simplici prolabente ad lumbos, tum facta illuc metastasi humoris morbifici.

AD ISCHIVM TRANSITVS ESSE SOLET.] Quoniam rheumatis propagatio è lumbis ad ischium; facillima est, tanquam à parte qua ischium continetur. Ac de humoris transitu sine febre à lumbis ad ischium, solennis est illa prognostis iam pridem exposita. *Quibus rectè valentibus, hyeme frigus est circa lumbos atque grauitas leui de causa; tum alius subsistit infera, & supèra in officio est conuenienter, iis vel ischias, vel renum dolor contingit, vel etiam stranguria.* Cum febre autem, de lumbis ad ischium humor prorepit, quemadmodum scripsit præceptor his verbis. *Τοῖς πολλοῖς κατὰ τὴν ἀπόθεσιν ὑπὸ ἐξέλιον ὑπὸ βάλλουσιν ἰσχιὰν καὶ φθίσις ὀστέων γίνεται.* i. *Quibus autem eodem & inde sunt crebri relapsus; iis, exacto semel labore, ischiadica tabes venit.*

26 *Τὸ δὲ ἐκπεμπόμενον λίαν ἰσχυρὸν ἐν ὑποστάσι σημαίνει πυρετόν.*

Urina autem liberaliter meiando emissa, qua habet pinguem hypostasin; febrem abire denunciat.

INCHOATA est Græca lectio κατὰ τὴν ἀπόθεσιν, cum ait ἡ πορὴν σημαίνει, i. febrem denunciat. Non enim hoc spectat ipsa prognostis, vt tantum nos doceat febrem denunciari ab urina descripta. Ne verò id nouum est, nec etiam febri tantum denunciandæ appositum: sed eius qui agrotat periculo aut securitati. Et quoniam τὸ ἐκπεμπόμενον orationis, renouat mihi memoriam secundæ prognosticæ in hoc capite posite, visum est ipsum accommodare κατὰ τὴν ἀπόθεσιν illius iam supra expositæ. Est autem sic positum. *Τὰς αἰτίας δὲ καὶ λύσιν σημαίνει.* i. Ac etiam quoque dimissionem febrem ostendit, &c. Hanc igitur ita scribendam & examinandam censeo ad normam & præscriptionem illius.

VRINA AVTEM LIBERALITER EMISSA.] Quæ olim parce reddita multum spissa & hypocrisis; nunc pleno meatu, plenaque manu emittitur, facta tenuior. Qualem fluxisse accepimus illi Pericli, de quo hæc scripsit Hippocrates. Δυνήκει παρὰ παραγωγήν ἔχει μέντοι παχέα καὶ λευκά, ἰσορρομία δὲ μάλλον. i. secundo exacerbata sunt omnia: vrina nihilominus erant crasse, & subsidientia multa. Et mox. Τέτη πορὸς ἐμυλάθη, ἔργον ἁλιδος, πένοντα πολλὸν ὑποστασιν ἔχοντα. i. Tertio, febris mituit, vrinatum copia coctatum, multum hypostasim habentium. Ac de vrina pauca & crassa, mox autem multa & renui, solennis est ille aphorismus. Οἰκτιστὶν ἔχει παχέα, σφοδρώδεις; ὅλγα ἐν ἀμπρεπίαι; πλήθος ἐπαχθὸν οὐ τεσσόν λεπτόν, ἐσθλές. μέλαινα δὲ πῖ πιαύοντα ἔργον. i. πῖ πῖον ἐξ ἀρχῆς, ἢ ἐξ ἀρχῆς βραχέων ὑποστασιν ἔχοντα. i. Quibuscumque stillant primum vrina crasse grumosa; pauca non febris expertibus; mox copiosa fluunt; magnopere profunt; Maximeque si iam ab initio, aut non ita multo post, hypostasim exhibent.

QVÆ HABENT PINGVEM HYPOSTASIN.] Non autem velut araneæ telam, enatantem in superficie: quod pinguis est proprium liquefacti, nec residētis in fundo, sicut hic dicitur de pingui hypostasi, multa & crassa, vel etiam simili genitura, in qua πῖ κρίσιμος agnuit Hippocrates, cum febris est mitior. Quod etiam suprà iam diximus.

FEBREM ABIRE DENVNCIAT.] Signo & causa discessionis. Signo quidem mitificati humoris morbifici, liberorumque meatuum. Causa autem, de copia vacuati humoris, quæ cernitur in liberali vrina, quæ fuerat antè pauca: tum in copiosa hypostasi quæ pinguis apparet similitudine; non reapse: cuiusmodi est χαλκίς pinguium iusculorum.

27 Τὸ δὲ αἷμα πῶδες ἐν δὲ ῥῆι ἔρηδεν· χροόνον. τὸ δὲ ἀναπέταραχμένον, αἰνδρῶδρον· ὑποθρήν. καὶ δὲ λευκόν, οἷς ὑποζυγίων· κεφαλαλγίω. τὸ δὲ ὑδρῶδες· σπασμόν.

Cruenta verò vrina principio reddita, longi est morbi: at perturbata, quæ non subsidit; recidiva: sicut & alba, qualis est iumentorum; cephalalgia: pelliculosa autem; convulsionis.

PARVM FIDELITER scripta est hæc prognostis, ex aphorismis: verbaque ipsa, nec vere, nec appositè possunt referri ad ea de quibus dicuntur, si quis ipsorum aucupio velit attēdere: tum quædam sunt addita, quædam detracta minùs cōnvenienter suò quæque τὸ κατὰ φύσιν. Faciam tamen sedulò ut veritas luceat ex diorsimò verborum & rerum.

CRUENTA VERO VRINA.] Cruenta, inquam, si de cruore qui vel vrinam tingit, vel in nephriticis calculosis; vel qui meiēdo syncerus emittitur, rupta in rebus venula; aut qui proluiem refert prærubram carnium quæ assando liquuntur (id enim propriè significat τὸ αἷμα πῶδες ἔρον) certè non video quomodo hæc vrina longi est morbi; quin potius citò mortiferi. Sin autem cruenta vrina significatio ad prærubram refertur, quæ sit eiusmodi, vel multa bile saturata, vel etiam rutila inflammatione serosi liquoris; profectò hæc potius brevis est morbi, quàm longi. Ergo ut vera sit clausula morbi longi de vrina quæ initio cruenta emittitur; significatio erit subrubra quam fundit liquor serosus & sanguine, qui admodum mitis, facillè mitificari se sinit: non tamen tam citò; quod eius pepasmo resistat humiditas nimia.

AT PERTURBATA QVÆ NON SVBSIDIT; RECIDIVÆ.] Hic recidiva non est in metu quæ incidit ab inchoata crisi, non autem perfecta. Qui enim sperabilis esset crisis in perturbata vrina simili iumentorum, de qua formidabilis est vitæ discessio, aut grauiorum malorum accessio, ut cephalalgia & convulsionis. Vide Galenum ad aphorismum 70.4. Ac satis iam de hac prognosi.

28 Τὸ δὲ πῖναλώδεις ἔχον ὑποστάσις οὖρον, ἢ ἰλνώδεις· ριγεῖ δὲ ἡ λωδίκον.

Vrina autem quæ sputiformes habet hypostases, aut limosas; rigorem denunciat.

ENIM VERO criticus rigor qui ad hæmorrhagiam vel ad sudorem semel tantum cietur in febre ardenti, non nisi cohibita sponte vrina, cietur, cum ea cohibitio venit ἀκχεσάν, & ad speciem crisis apparet de signis pepasmi quæ index quartus exhibuit ad septimum inde præniisum. Periodici autem rigoris nulla præuisio est, nisi de specie ac de periodo atque typo febris ipsius rigoriferæ, qualis est tertiana exacta. Quæ igitur signa ponuntur in hac prognosi; non alium certè rigorem denunciant, quàm symptomaticum; si modò vllum denunciant. Est enim rigoris vnus idēque index, qui & illius causa. Nam vbi est empyema conclusum in vomica, vel effusum; ibi cietur rigor: & vbi cietur, ibi empyema

lib. 6. Epid.
de 5. aph.

subesse testatur. Verus est illud Hippocratis. *Εἴρος ἢ δὴ πρὸς ἀγγέλων, ἢ ἀφ' ἐκείων.* Quæ cum ita sint; huc reuocanda est lectio ipsa prognosceas, vt veritas inde luceat.

Ergo. **VRINA AVTEM QUÆ SPURIFORMES HABET HYPOSTASES**] Fortasse melius, *ὀλίγαι, i. albumineas*, quæ valent plurimum ad exoluendam conuulsionem, quando materia conuulsifica fertur de neruis ad venas, vnde funduntur illæ vrinæ. Sed non satis ad rigorem mouendum; nisi conuulsio prius neruorum transeat in concussionem, forti conatu naturæ. Actum rigor ille prænunciatus esset hypostasis albumineæ; non hæc rigoris. Nam spuriformis hypostasis, non nisi de viis renum aut vesicæ apparet, quæ illis in partibus sæpe sunt rigorifera.

AVT LIMOSAS] E limo partium quæ liquuntur, aut quibus per totam substantiam diffusum est empyema cœnosum vel amutcosum: non autem in membrana collectum. Hic non est mirum, rigorem moueri *ὡς συμπίωμα*, qui empyema illic subesse testatur, vbi crebro cietur, sicut in cæteris empyematibus.

29. *Τὸ δὲ δρασχνῶδες· σιωνήξει.*
ILLA vero quæ habet velut telam aranea; colliquamentum ostendit.

PARTIVM quæ liquuntur signa sunt in vrinis funesta, vt supra ostendimus, vbi exposita colliquatio est quæ apparet in oleosa & pingui vrina quæ instar araneæ cernitur in ipsius superficie: velut pinguium iusculorum. Nam oleosa vrina distinctio est adducta. Huius prognosceas sic lectio est in prognostico. *Καὶ τὰς ἀπαρόπτας δὲ τὰς αἰῶς ἐπιστράμενας ἀεὶ χροιδέας μέμφοιται· σιωνήξει δὲ συμπίω.* Et pingues quoque suspensas araneosas hypostases improbare decet, vt colliquationis signa.

30. *Τὰ δὲ ἐν πλανώδεσι πυρετοῖσι μέλαινα νεφέλια τεταρταῖς.*

Quæ in erraticis febribus sunt nigra nubecula; quartanas denunciat.

1. Epid.
lib. 3. progn.

HIC PRIMVM in febribus quæ sint erraticæ, & cur ita, quærendum: mox exponenda est ratio signi huius quod in vrina cernitur erraticarum quæ transeunt in quartanas. Enimvero hic sunt *πλανώδεις πυρετοί*, quas idem alibi vocat *πλανήτας*, i. febres erraticas: ob eam sanè causam, quod illæ, vt idem author est, *διδίδιμιτοι καὶ καταλαμβάνουσιν, πηλασμένον ἔσονται*, i. intermittunt ac denuo inuadunt, modo *erratico*. Erratica autem ratio intermittendi & inuadendi, sic ponitur à Galeno vbi enarrat qui sint *πλανήτες πυρετοί*. Sic enim ait. *Erraticæ febres inordinatos ac certo typo carentes habent paroxysmos particulares.* Cur autem sint ita; primum ex lib. 3. prognost. tum ex lib. 1. Epid. & ex 1. lib. Coac. in tritæophya erraticæ ostendimus. Igitur febres erraticas ita esse, ob eamque causam paroxysmos habere incertos, narrat Galenus, cum vniuersi corporis non vna est, eademque affectio: sed in quibusdā partibus humor cietur, in aliis manet immotus: tum verò in aliis quidem putrescit atque feruere incipit. Huiusmodi quoque sunt tritæophyæ febres, de quibus hæc scripsit præceptor. *igitur longa erant ac difficilia; tum sine ordine vaga & errabunda; tum sine crisi, exactum ad morbum, fiebant quæ illis in febribus apparebant; videlicet rigores, sudores, vrina.* Atque rigoris quidem incerti causam ostendimus ad illam prognosin. *Tritæophyarum febrium incerti rigores qui medio febris cursu exacerbantur, valde maligni.* Ex cuius notitia demonstratur illa prognosin. *Tritæophyæ febres erraticæ, in pares mutata; sunt contumaces.* Certissima autem securitas est, quod *ἀνὰ τὴν* paroxysmorum typi expertum, inde venit, cum ex multiplici cacochymia, quam tempestatēs intempestiuæ, atque diætæ vitia pepererunt; retro sublapsa refertur naturalis œconomia; tum ipsa æqualitas labefactatur partium gignentium, trahentium, aut suscipientium excrementa, quæ non sunt amplius æqualia quantitate, similia qualitate, nec item amplius tractu eodem temporis, iisdemque collecta periodis, & exclusa vt solebant, dum bene esset morata œconomia, similiterque partes affectæ. Sed inter febres erraticas, continuarum quidem longarum, proprij sunt abscessus; intermittentium verò diuturnarum, *μεταπίπτουσιν* in quartanam. Quemadmodum autem id fiat, causa & ratio adducetur.

Coac. 27.
lib. 1.Coac. 39.
eiusd. lib.

Ergo. **IN ERRATICIS FEBRIBVS**] Quarum incerti sunt paroxysmi, & ipsæ periodi sunt typi expertes, ob multiplicem cacochymiam, variamque partium affectionem.

NVBECULÆ NIGRÆ] Ductæ è venis, in quibus tum omnibus eadem prorsus affectio est in dominatu nigri humoris.

QUARTANAS DENUNCIANT] Quæ ortus principia ducunt ex nigro humore quem genuit biliosus & varius febris erraticæ intermittentis: cum scilicet affectionum varietas in variis partibus, vbi aliter atque aliter humor putrescens mouetur, aut primum feruescit, vel contrā immotus; cum, inquam, varietas affectionum transit in vnā venarum affectionem. Sic enim *μεταπίπτουσαν* distinctio est quæ cadunt in febres, apud Hippocratem in hac prognosin. *Χρή δὲ καὶ πρὸς τὸν πυρετὸν δὲ χροιδέας, σιωνήξει ὅπως τὸ πυρετὸν. ἐς δὲ τεταρταῖον καταπίπτει, ὡς διδίδιμι τε καὶ καταλαμβάνει πηλασμένον ἔσονται, καὶ ἑὸν πρὸς τὸν πυρετὸν.* Porro abscessum expectare oportet, si continua sit febris: transiaturam verò in quartanam, si intermittat, prehensatque erratico modo; idque faciat propinqua autumnus.

lib. 3. progn.

Τὰ δὲ ἀσχετά

31 Τὰ δὲ ἀχρῶα μύχασιν ἐναυωρόμυα, μὲν ἀρεπνίνης ἢ παραχῆς
φρενιτικῆ.

*Decolores autem quæ nigra ostendant enaoremata, idque cum vi-
giliis & perturbata mente, phrenitica.*

10 VETVS EST illud Hippocratis. Positis duobus magnis, oriunda inde sunt magna. Et. Quando affecta
causæ excipienti accedit vis magna efficiendi; magnum est quidpiam quod exurgit. Nam τὸ ἐνδεκτικὸν καὶ τὸ παρὰ τὸν
ex æquo certant ad id quod instituunt efficiendum. Ergo si vrinæ decolores nigris appensa enaorema-
tis, parem naturæ fuerint affectionem cerebri ad excipiendam vim summam ardoris & bilis, cuius πῶς
τὸ ὀσμὴν ἐδὲ cieri tales vrinæ denunciant; certum est illic phrenitidem mox excitatum iri, domicilio in-
flammaro rationis ipsius. At præparatio τὸ ἐνδεκτικὸν ad excipiendam vim summam ardoris & bilis, cer-
nitur in vigiliis & perturbata mente. Quemadmodum autem hæc fiant & inde appareant; declarabit
examen ipsius prognosens quod sic aggredior.

20 DECOLORES AUTEM] i. Coloris expertes, cuiusmodi sunt τὰ ὑδατώδεια, i. aquosa, vt nomi-
nantur in aphorismis eo euentu phrenitidis quem author hîc posuit. Sunt autem decolores & aquosa;
non quidem per se coloris expertes, cuiusmodi esse dicuntur proruptæ aut raptæ, quibus præcepta sunt
occasio coctionis: sed quibus deleta est coloratio illa bilis qua prius saturata fuerant de concitata bile
sursum ad caput, vnde non habet exitum per hæmorrhagiam: sed inflammationem ibi mouet, vbi
subsistit, quæ ipsam bilem è venis denuo ad se rapit.

30 QVÆ NIGRA OSTENDANT ENÆOREMATA] i. Ad verbum, nigris appensa. Quam
dialectum Galenus exagitat vt solæcismum, qui frequens est apud Hippocratem, nec Hippocraticam
minuit maiestatem. Metonymia est rei quæ continet, pro ea quæ continetur. Nec verò absurda est hy-
pallage, vrinam dicere nigris appensam, pro iis quæ in vrina cernuntur appensa. Sed hæc indigna sunt
tanto authore Galeno, qui ad nauseam vsque, hoc ipsum repetit. Ergo vrinæ decolores quarum de lenis
colorem concitatio bilis ad caput quæ ipsas antea colorabat, mirum videri non debet si nigra ostendat
enaoremata, iis appensa de nigro humore quem genuit ardor febrilis in sanguine torrefacto, vel in
corporibus quæ ab eo liquuntur. Talis est ratio vrinarum tenuium oleosarum, quæ oleosæ non sunt
proprio ipsarum liquore atque colore: sed enatante in ipsis velut aranearum rela de pingui quod liquitur,
qualis apparet καὶ in carminum insculis; vt supra monuimus ex præceptore. Et verò de nigris vrinis, de-
que illis omnibus quæ vel subsidunt intra vrinas, vel appenduntur, vel enatant nigra; vnde ducantur &
quorsum appareant; nihil necesse est plura hîc scribere: quando iam omnia, duce Hippocrate, supra
conscripsimus.

40 IDQUE CUM VIGILIIS] Vacuitate somni, quem cerebri calida intemperies & perturbatio
mentis iniri non sinit, nec vlla superpetit conciliando somno materia, quæ tota est fumida, minimèque
suauis, vt decet. Atque hoc virium τὸ ἐνδεκτικὸν, i. excipientis cerebri, vel ipsum per se satis est phrenitidi
excitandæ, in regno febris acutæ. Plurimum autem periculo adiicit efficientis causæ, ipsa præparatio ex-
cipienti summam vim eius quam diximus esse positam in concitata bile ad caput vbi subsistit, nec exi-
tum inde habet. Cernitur illa præparatio excipienti, cum ait.

ET PERTURBATA MENTE] i. Cum perturbatione: quæ vox, cum legitur ἀπὸς, mentis
est perturbata: sicut & μετὰ πρῶτον, modò est alui, modò vrinæ, cæterarumque omnium excretio-
num quæ & cum impetu & cum morfu cientur. Est igitur nomen τῆς παραχῆς, mentis emotæ, quæ itur
ad ipsam phrenitidem, cum inflammatio cerebri est in propinquo, ab effera bile illuc transmissa.

PHRENITICÆ] i. Signo phrenitidis, quæ est delirium intermissionis expertis, quod morum fero-
citas contra consuetudinem ægri denunciat, cum impotentia dormiendi, & febre acuta. Sed multaiam
aliàs de phrenitide.

32 Τὰ δὲ κοινώδεια, μετὰ δυσπνοίας ὑδατώδεια.

At verò lixiuia, cum dyspnœa, sunt hydropifica.

SICVT VRINÆ aquosæ decolores factæ ex concitata & segregata bile ad caput, signo apparent
phrenitidis; ob eamque causam dicuntur phrenitica: ita lixiuia cum dyspnœa, sunt hydropifica ex
euentu, quatenus hydropificam iecoris labem testantur atque denunciant.

60 AT VERO] Quod est eiusmodi ac si diceret. Non sic res eunt de vrinis quæ hîc ponuntur, vt
obseruatum est in superiore prognosi de aquosis phreniticis. Nam.

VRINÆ LIXIUIÆ] i. Lixiuio similes, quia liquore atque colore similitudinem effingunt lixi-
uij facti ex lixe, quam κοινὸν Græci vocant. Non enim vrinæ sunt κοινώδεις, de ipso cinere vnde dicuntur:
sed de lixiuio facto ex lixe vel cinere. Ac tales vrinæ, vt iam non ita pridem attigimus, nominantur si-
miles iis quas edunt iumenta, quæ diu depositæ non residunt; quas etiam vocat Hippocrates δεξ γόνει, ap. 70. 4.

ἢ ἀταπεινωμένα, i. turbata. Sunt autem eiusmodi, perturbato sero in venis à spiritu flatulento, & intus incluso febrili ardore. Atque in illis cernitur cum in conspectu sunt, id quod prudenter Hippocrates

6. Epid. part. 3. annotauit, ἢ πᾶσι τοῖς οὐχοῖς καὶ τῇ ἀγγείᾳ ἀκαταστασία, i. confusio rerum omnium, vasorumque impuritas.

CVM DYS PNOEA] Quæ est difficilis respiratio, siue spirandi angustia frequens & parua, quam Odyss. 10. facit oppressio diaphragmatis ab inflammato hepate, supera eius parte, i. conuexa, ὅτι φρένες ἵππερ ἐχούσι. Quæ inflammatio superarum hepatis partium, irritam mouet tussim, laceffito diaphragmate ab exundante sero: rapta scilicet bile quæ hinc per venas diffusa, saturatas bile facit vrinas atque confusas: tum verò à phlegmone τῇ αἰῶ μερὶ τοῦ ἥπατος, plantè id accidit quod refert Hippocrates in illa prognosi. In biliosis aluus turbata, quæ pauca exhibet genituræ similia, atque mucosa, & circa hypogastrium dolorifica; tum nec vrinae faciles in metiendo; ex talibus desinunt in hydropem.

SUNT HYDROPIFICÆ] i. Abdomen aquis repletum iri denunciant & vtriforme futurum: 10 quod est hydropis causa & signum. Hæc autem nascuntur ab hepate alienato per μαλακωσάντων ἀποφύγη, cum extinctione caloris sanguifici, vnde perennis aquarum generatio est quæ per lienem in omentum depositæ transeunt in amplitudinem alui, & ibi stagnantes, ipsam faciunt vtriformem. De qua iam illud scriptum est. Si cui aquoso cum febre, vrina sit pauca & turbida; perniciosum.

Coac. 7. cap. 19. lib. 2.

33 Οὖρον ὑδατῶδες ἢ τελαραμενόν· λαφρὴν τρηχύτην· κοιλίην ὑγρὴν ἐσομένην σημαίνει.

Urina aquosa vel conturbata arenida asperitate; liquidam fore aluum denunciat.

QVORSVM appareant vrinae aquosæ decolores, ex euentu bilis concitatae ad caput, nullo præeunte pepasmo ad crisin per hæmorrhagiam; quid item præfagiant perturbatae cum spirandi angustia; dictum est illis prognosis quæ huic sunt citinæ: ac demonstratum, quod illæ quidem sunt phreniticæ; hæc verò hydropificæ, ob iecorariam labem quam intrus subesse testantur. Hic verò ambarum noua est instituta prognosis, quæ aliò nos conuertit quàm supradictæ: cum scilicet illæ vrinae cum certis quibusdam signis coniunctæ, liquidam fore aluum denunciant. Quemadmodum autem id fiat, faciam ut optimus quisque studiosus intelligat.

VRINA AQUOSA] Non quidem coloratione bilis amissa, ob eius ad caput anadromen, sine sperabili vlla crisi: sed quæ, collapsa virtute coquendi, summa præ se fert omnia cruditatis.

VEL CONTURBATA] Despiritu flatulento in venis, de quo insigni æstu quo incandescebat hepar.

CVM ASPERITATE ARENIDA] Cuiusmodi sunt carnes, quando iam dudum emortuæ sic tenescunt, ut faciliè lacerentur, ac frustulatum quodammodo discerpantur, quas vulgus nominat bene mortificatas. Vel etiam cum de venis porriginosis quidam velut furfures cum vrina feruntur, & in fundo residunt. Quæ sunt hypostases de iis quæ intus liquuntur: & nominantur; hæc quidem, πυρρώδες, i. furfuraceæ; quemadmodum illæ κρινωδεις, de quibus abundè suprâ. Iam pridem constat, quod 40 furfuracea omnis vrina, si quidem est tenuis, venit de venis: sin autem crassa, de ipsa vesica. Pertinet autem τὸ πυρρῶδες καὶ τὸ κρινωδεις ad vrinarum prauam hypostasim. Asperitas verò λαφρὴ, teneritatem significat rei asperæ quæ in vrina subsidit; estque, ut ita dicam, friabilis. Nam illud, λαφρόν, idem est quod in prothetico nominauit λαυρόν, i. tenerissimum atque friabile, vel etiam, quod frustulatum discepiatur faciliè. Qualem putauit esse pulmonem, quem alibi vocat λαυρόν.

aph. 77. 4.

lib. 3. cap. 19. lib. 2.

LIQUIDAM FORE ALVVM DENUNCIAT] Quoniam seri cruditas quæ ex ventriculo manet in hepate & hepatis; tum perturbatio ipsa ob imbecillum calorem & flatum; cœptam ventriculi κακοποροῦσαν, multum auget fouetque; vnde lienteria, quæ ex infirmitate orta naturæ, ipsam denovo infirmiore facit.

34 Τὸ δὲ ἐν λεπτῷ οὖρῳ· δασυώμεν· ἄρα ἰδρωτὰ δηλοῖ; γεχρημὺ δὲ, τὸ ἀφρῶδες ἐφ' ἐαυτὸ ὑφιστάμεν;

Quæ ex tenui, crassa efficitur vrina; an sudorem prænuñciauerit? an præcessisse spumosa in seq. subsidens indicauerit?

ΔΑΣΥΝΟΜΕΝΟΝ] οὖρον, vrinam hic toto importare liquore & crassam, & confusam; subsidentis 60 oppositione comprobatur. Huiusmodi fieri ex tenui & aquosa non potest; nisi permixtis sero, quod vrinae materia est, sanguinis inquinamenti, vel residentibus antea; vel abundè ex partium cuiusvis ergastulo deportatis. Sed permixta inquinamenta crassam efficiunt, cuius proinde vel simplici effluuio multi præter conuulsionem morbi depelluntur: turbidam autem, nihil nisi perturbatio effecerit, quæ comite & ministro flatulento spiritu, omnibus omnia permixta continet, leuibus grauique, scerni quidquam,

cerni quidquam, suāsque in sedes abire, magnopere prohibens. Eam autem perturbationem in urina
superstitem esse oportet illius quæ in venis antecessit, unde urina effluxit. Iam igitur si omnis sanguinis
intra venas perturbatio duplex est, symptomatica una, altera critica; cum symptomaticæ abesse signa
oportere intelligeret, antequam de critica concludatur; incertam fore prædictionem sciens tantisper
id inspicitur; interrogando illam dubitanter proposuit, quam affirmando non potuit absolute
extulisse. Symptomatica perturbatio erit à cephalalgia, vel simplici, cuius accuratissimam Galenus de-
monstrationem repetiuit à confusis urinis & perturbatis; vel cum insignis febris ardore vehemente
coniuncta. Critica contra quæ huc aduocata est, naturæ est morbosum succum ex sanguinea massa in
sudores elicientis. Itaque ergo sæpe fit ut ferum ibi cohibitum inhibeat urinas. part. 10. sect. 1. 6. Epid.

10 Pars propositionis altera lucem ex priore admittit. Commotionis critica quæ in sanguinea massa sudorem promouendo præcessit, argumentum erit in spuma, stabili illa quidem, vt quæ fundamentum in crassiore materia habet; propterea quæ *διεσπύηται*, i. *soluta diffidit*. Remissionis autem quæ à commotione habetur, quietis quæ iam penè quæsitæ & partæ, fiducia ex eo est, quod quæ commixta manebat antè, nunc aliquantisper deposita residere, i. quod crassius, in fundum depositum, à liquido secretum ostendere incipit. Sic intensos capitis dolores relaxari, febrilis ardoris incendia mitigari, eadem edocere vrina consuevit. De sanguinis perturbatione ad sudorem proliciendum in febribus curandis, audi quid dicat Hippocrates lib. 2. de Dieta. *Incalescente & citato intra venas sanguine; vehemens in corpore perturbatio est; ipsiusque partim spiritu abeunne expurgatur; partim, qua concretum erat, attenuatum atque ad cutim appellens excluditur; atque id sudor appellatur. Tum eo excluso, sanguis redditur priori cōditioni & quieti, dimittitque febris.*

20

35 Τὰ δὲ σὺν τεταίοισι μὲν φεύκης, οἷα νεφέλια μέλανα· φεύκης
ἀκαταστάτου δηλωτικά.

*Cum in tertianis horriferis velut nubecula nigra sunt, incertum hor-
rorem denunciant.*

30. H v i v s prognofis explicatio repetenda ex 30. huius cap. quæ fic expreffa eft. Τὰ δὲ ἐν τῷ ἀσθεὶ πα-
ρῶντι νεφελία μύαα· τετραπύς. i. Quæ in erraticis febribus nubecula nigrae sunt, quartanas denunciant. Ad illam
igitur velut normam fic emendanda & examinanda videtur, quæ nunc adducta eft ad examen.

CUM IN TERTIANIS HORRIFERIS] Propterea quæ notis: nam tertianæ exactæ dicitur rigores de bilioso humore ad cutim expressio *ἐκ τοῦ χολαίου*. Materia autem notharum, permixtionē bilis & pituitæ constat: qui sanè humores non sunt *ὁμοιογενεῖς* in pari tempore collectionis, corruptionis, & motus; propterea quæ movent paroxysmos incertos, unde nominantur erraticæ. Ac de natura erraticarum, cur sint huiusmodi, satis iam dictum est ad prædictam prognosin. Iam verò ille horror tertianæ appositus, aliò referri non potest, quàm illuc ubi discessio est paroxysmi diurni, & ipsa febris diurnæ vacuitas, quam Græci vocant *ἀπουσίαν*. Etenim semitertianæ horrifera vel hemitritæ, quæ est reapse *πεινικὴ*; esse non potest, ob febribus assiduitatem quæ intermittit nunquam, nec habet *ἀπουσίαν* diurnam. Nec verò tritæphæ febris incerti rigores, unde est ipsa quoque erraticæ, ed spectare possunt quod instituta prognosin. Nam febres illæ sunt intermissionis expertes: propterea quæ non transeunt in quartanas, ut solæ erraticæ tertianæ: quod in prognosticis annotavit præceptor.

VELUT NYBECULÆ NIGRÆ SVNT] Ratio signi huius, suprà iam dicta est, nec ita pridem.
INCERTVM HORROREM DENVNCIANT] Hic locus non caret suspitione mendii, ac pro
αἰσχρογνώμῃ. Legendum *ἐντάκμῃ*, ἢ *ἐκτακμῇ*. Nam ex incertis paroxysmis, vnde sunt febres erraticæ, nascun-
tur certæ quartanæ, quarum est etiam certa *ἐπιμονασία*, periodicus horror ac typicus: vt exactarum ter-
tianarum rigor. Ratio autem cur febres erraticæ transeant in certas quartanas atque constantes, nuper
audita est de Galeno ad illud prognosticum præceptoris de transitu febrium in quartanas.

lib.3.progn.

So $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \right) = \frac{dv/dt}{c^2 \sqrt{1-v^2/c^2}}$

36 Αἱ ὑμνῳδαὶ οὐρήσεις, ἔαι μὴ φένης ὑφίστασθαι· ἀπα-
σιμῶδες.

*Membranacea urine, & quæ cum horrore subsidunt; convulsio-
nis prænuncia.*

60 MEMBRACEÆ VRINÆ dicuntur, non quidem liquore: sed iis quæ intra sunt; & sunt eiusmodi de partibus quæ à febrili ardore liquuntur. Ac partium quidem illarum colliquamenta sunt *ὑμενώδεις*, vel eò quòd referant tenues quasdam membranas, qualia posuit in prognosticis *μεμβράναις*, i. *laminae*: vel quòd è partibus membranosis, putà è venis inæqualiter liquefactis, *πυρρώδεις*, i. *furfuraceæ* emittantur cum ipsa vrina. De quibus colliquamentis, sic ratio est Galeni. *Primum quidem liquitur tener ac re-*

lib.1.progn.

cens adeps per adurentes febres; inde mox durior atque vetustior: tum carnes sequuntur teneræ ac recentes; postillas, duræ & veteres: tandem nonisimè illis succedunt solida partes corporis, quæ inæqualiter liquefactæ, corpuscula quedam laminea cum urinis effundunt. Nam de furfuribus qui residunt in fundo urinae, vetus est illud positum à Galeno; quod cum urina tenui labuntur è venis porriginosis, quarum virtutem atque substantiam labefactavit ἡ θερμότης φλογώδης τῆ πυρετικῆ καὶ συντητικῆ; i. flammæ: febris calor atque rabificus. Hic venit in mentem mihi quod ex prothetico suprâ iam exposui & emendavi, ubi, similiter ut hic, scopo eodem leguntur ὑψηλὸς ὑμενώδης: i. repositi autem pro iis ἀφρώδης, i. spumantes. Quam lectionem Galenus sic enarravit, spumantes quidem urinae vndecumque gignantur, siue à spiritu flatulento turbata; siue à colliquatione; utrinque pariter conuulsionis mouent suspicionem. Decisio: Coaca ex prothetico simili emendata, sic legitur, ἡ πικρὸς ὁδὸς διασπῆντι ἐξέρπτεται ὡς φερόμενος: πονηρὸν δὲ ἀποσώμαδες: ἀλλὰς περὶ καὶ μετὰ ἰδρωσίων ἀποσώμαδες δὲ ὡς πικρὸς καὶ μεταφρενὴ δουλεύουσι ὑψέως, ἀπὸ καὶ ὅλη τῆ σωματικῆ. ἐν παντί οὖν ὑμενώδης ὑψηλὸς. i. Qui cum feroci turbatione animi, somno excussi, non sunt apud se; gravissimum habent malum, & conuulsificum: idque cum aliis, tum si prorumpant sudores. Conuulsificæ sunt etiam ceruicis, & dorsi perfrictiones; cuiusmodi planè videntur corporis vniuersi, Ac tum urinae sunt membranaceæ. Ex quibus efficitur, quod magis conuulsificæ sunt membranaceæ, quàm spumantes. Nam si hæc quidem spumantes, auctore Galeno, sunt conuulsificæ, ut liquamenta corporis; maior profectò vis conuellendi erit de membranaceis, in quibus maior est colliquatio partium solidarum.

ET QUÆ CUM HORRORE SUBSIDUNT] Græcè est ὑψιτάμεναι μετὰ φέλου: tamen si aliter scriptum reperio, ἐπιστάμεναι, i. quæ intus subsistunt cohibita vel intro raptæ, & inde ad caput transmissæ. Atque hæc ratio vera est conuulsionis, cum scilicet urina quæuis cum horrore subsistit, intus cohibita; nec minùs illa suppressio conuulsificæ est quàm illa quæ spumans aut membranacea meiendo emittitur. Sic enim video placuisse Hippocrati cum ait. Οὐδὲ ὅστις οἶον ῥίγας καὶ ὅτι τέτοιαι ἀποσώμαδες. i. Urina suppressio quibus rigores; quibus obortus, conuulsio incidit. Quod est eiusmodi ac si diceret. Quoties urina suppressio rigorifera est, ut symptoma; mox conuulsificæ esse solet. Nam posicarum partium symptomatica refrigeratio, conuulsionem mouet. Quineriam ut rigor urinae suppressæ: ita rigoris urinae suppressio ferè symptoma est: ut constat ex illa prognosi. Εἰ κατὰ φύσιν, ἔργον ἀπολήψεις καύσων. Est autem urinae suppressio, rigoris ad κρίσιν prænuncia, cum illa venit ἐκ χυμῶν: ut annotauit præceptor lib. 6. Epid. his verbis. Πρὸ ῥίγας αἱ ὀπτόγες αὖτ' ἔργον, ὡς ἐκ χυμῶν ἴασι. i. Ante rigorem urinae suppressio; si ex bonis ducatur. Ergo tum urinae membranaceæ quæ cum horrore subsidunt; tum quæuis aliæ quæ cum horrore subsistunt; conuulsionis prænuncia.

37. Οὐρον χρυσὴν ἔχον ὑπόσασιν, & ξαπίνης μὴ ἔχον. πόνον καὶ μεταβολὴν σημαίνει.

Urina quæ utilem habet hypostasim, & mox non habet, laborem & mutationem ostendit.

DE COCTIONIS & cruditatis vicissitudine quæ cernitur in urinis, quæ modò habent bonam hypostasim, modò nullam aut malam; vnde illa veniat vicissitudo, & quorsum appareat; dictum est abundè suprâ. Sufficiet igitur explicare hoc loco, quid per laborem & mutationem intelligat, quibus tribuitur illa vacuitas hypostaseos repentina, quæ paulò antè paulisper utilis in urina apparuit.

Ergo. LABOREM ET MUTATIONEM OSTENDIT] i. Inualescens morbi, & succrescentis humoris morbifici: tum fatiscens naturæ, vel occupatæ imperio ac dominatu morbi; certissimum est argumentum. Nisi quis fortè dietam accuset rerum earum quæ assumuntur, quale inter cætera numeratur πόνον χολώδες carniū colliquatarum. Ac sanè labor est, cum per sympathiam symptomata veniunt insueta quæ prius non aderant. Mutatio autem cernitur in humoris & morbi μεταβολῇ, de non sperabili antè crisi. Nam in sperabili, sæpe urina limpida & aquosa caret hypostasi: ac tum vel dysenteriam in senibus, vel hæmorrhagiam iuuenibus mox affuturam ostendit.

38. Τὸ δὲ ὑπόσασιν ἔχον, ἐκταραχθεὶ, καὶ διαλύθῃ. ῥίγος δὲ κρίσιν. τὰ γὰρ δὲ ἐς τεταπῶν ἢ τεταρταπῶν μετασάσιν.

Quæ autem perturbata hypostasim habet, residens; rigorem circa crisin denunciat: fortasse etiam transitum in tertianam aut quartanam.

URINÆ quam ægri meiendo emittunt, ut liquor est constans aut varius in tenuitate, crassitie, puritate, confusione: ita constantis aut variæ coctionis, aut cruditatis perfectæ vel inchoatæ, & quorsum illa sic in conspectu sit medici, argumenta profectò certissima esse solent. Nam recens facta urina quæ primo conspectu cernitur & colorata bellè, & modicè crassa, & bona hypostasi prædita, idque constanter; ut fracti

ut, ut fracti est morbi, & coepit redintegrari naturæ: ita securæ crisis mox affutura. Ac ne adducā cetera, nec longius mea excurrat oratio; quæ primo aspectu confusa est ac perturbata modò emissa, mox autem residit, paulisper deposita; quorsum illa fiat siue appareat, in hac prognosi doceatur, his verbis.

QUÆ AVTEM PERTVRBATA] i. Turbulenta vrina, quæ sic meiendo emissa est: nec tamen sic confusanea mixtione humoris cum sero, ut maneat eo statu, nec segregari possit. Qualem accēpimus illam fuisse, quam Dromeadei vxor reddebat, quæ diu deposita non residerebat, nominaturque *ἡρὸν παρὰ χροῖον, καὶ θολερὸν*. Nam residendi habilitatem, & segregati humoris distinctionem in ea quæ traditur in hac prognosi, planè hæc docent.

10 HYPOSTASIN HABET RESIDENS] i. Quæ suam veluti faciem deponit, ut vinum in cella vinaria, quod agitatum in dolio prius turbatum erat. Sunt autem visorum *θολερῶν* duo genera. Nam alia quidem residunt quæ mustea diu fuere: alia verò à tobitu perturbata sunt, in perpetuum *ἀνελάττα*. Sic vinarum quæ perturbatæ meiendo redduntur, quarundam similiter est perturbatio constituta, ut illarum quas in Dromeadei vxore ita descripsit Hippocrates. *Οὕτῃ παχύνει, λευκὰ, θολερὰ, οἷα γίνεται ἐκ τοῦ κασιγμένον, ὅταν ἀνέλκῃ θὴ καίμυα χροῖον πολὺ, ἢ κασιγὰς*. i. Vrinæ crassæ, albæ, turbidæ, quales ex residentibus fiunt cum perturbantur: hæc diu depositæ non resident. Secus est illis quæ eam emissæ fuerint perturbatæ, mox puræ & claræ redduntur, facie in fundum deposita, quam segregat virtus caloris natiui: sicut in illis manet confusio firmiter fixa & stabilis de paupertate huius natiui caloris, & summa vi spiritus flatu-

hist. II. lib. I.
Epid.

20 RIGOREM CIRCA CRISIN DENVNCIAT] Expressa febris cacochymia è valis ad cutim, unde cietur rigoris concussio critica, die critico: postquam turbata huius vrinæ, mox residentis, inchoata concoctio transierit in manifestam. Ac tum rigoris certissima significatio est, cum talis vrina sup-

6. Epid. par. 3.

30 FORTASSE ETIAM TRANSITVM IN TERTIANAM] Cum scilicet bilis regnum in vasis, migrat in habitum corporis; ac tum rigorem excitat periodicum tertianæ, non autem criticum febris continuæ, de non sperabili antè crisi ex coctione perfecta. Ex quo apparet, quod eadem febris acutæ & tertianæ materia, distinctionem alterutrius infert, ut illa introrsum per hepaticam & per aortam mouetur; aut contrà è venis ad cutim excurrit, vbi rigorem ciet. Sanè rigor omnis qui bene fit, ac duce natura suscipitur; aut febris acutæ in totum, aut paroxysmi diurni discessionem prænunciat.

AVT QVARTANAM] Non quidem primum & per se: sed interuentu febris erraticæ quæ sola omnium degenerat in quartanam.

39 *Ἐν πλὺθελυκοῖς οὖρον ὑπὲρ ὕδρον, ἔχον λεῖλιν ὑπόστασιν ἀσφαλέα κελσὶν σημαίνει.*

In pleuriticis vrina subrubra quæ hypostasim habet lauem; securam crisin denunciat.

40 VT BONA vrina, morborum omnium securitari: sic mala, periculo multum adiicit. Nec verò sperabilis vitæ salus de crisi propria morbi cuiusque, certa & fida spe medicum cōsolari potest, nisi adiuncta sit laus vrinæ quæ crisis ipsius securitatem ostendat. Exemplum adducit in hac prognosi.

IN PLEVRITICIS] Quos occupat inflammatio tunicæ costis intextæ. Quæ de re multa iam ipsi suprâ conscripsimus.

VRINA SVBRVBRA] Cuius non ita pridem causa & ratio in hoc capite scripta est.

QUÆ HYPOSTASIN HABET LAVEM] De constituta bene ac bene morata hepatis & hepatis œconomia.

50 SECVRAM CRISIN DENVNCIAT] Quæ tum naturæ mitificantis ope, tum pari opéra thoracis affecti suscipitur per anacatharsin liberalem & liberam spuri boni. Tum enim credibile est nihil de vitio partium inferarum succrescere, & ad thoracem confluere quod ei se fortiter morbo explicanti, negotium nouum faceffat.

40 *Τὸ δὲ ὑπόχλωρον θύανδες, λευκὸν ἔχον ὑπόστασιν καὶ ταχέα.*

Subviridis autem & florida, cui est alba hypostasis; ipsam quoque citam crisin ostendit.

60 VERITAS quidem lucet superioris prognoscæ quæ ponit vrinam subrubram, ac læui præditam hypostasi, ad securam crisin pleuritidis, cum ea per *ἀνακάθαρσιν* liberam & liberalem suscipitur. Hæc autem quàm verè sit posita & appositè ad crisis illius celeritatem cum securitate coniunctam, vix videor posse animo ac mente complecti. Etenim citæ crisis fiducia stat in exâcto pepasmo humoris pleuritici, & validis viribus partium spirabilium. Ei celeritati, quæ fundamentum habet in laude *τοῦ ὑπερχρόνου*

καλῶν, i. rerum earum quæ præstō sunt ad citam crisin, multum adiicitur ἐκ τῆς ἀσυνβεστικότητος καλῶν, i. absentia rerum earum quæ nocent, quæque impediunt celeritatem crisis. Absentia rerum illarum cernitur in urinis quæ commendatur laude coloris, liquoris, & hypostaseos. Quæ tria vtrūm sint commendabilia in urina huius prognoseos; planum faciet ipsius examen, quod sic aggredior.

Coac. 16.
huius cap.

SVBVIRIDIS. AVTEM] i. Urina quæ instar succi herbarum virefcit; non tam exactè tamen, nec tam saturati viroris, neque id toto liquore, sed superficie tenius urina; cuiusmodi iam esse dixit ἔρον χλωρῆς, i. urinam herbaceam superficie tantum tenius: quæ quidem, febris est totam urinam sua vi non immutantis; propterea quæ spem non adimentis pepasmi. Nam quæ urina toto liquore virefcit, bilis est in hepate & in aorta incendio cōflagantis, vnde ipsius primum flauæ in viridem mutatio est. Hæc sanè non est capax candida hypostaseos. Iam verò idem planè est τὸ χλωρόν, quod illic τὸ χλωιδές, i. herbaceum. Sunt enim herbæ χλωραί; quam dictionem præceptor semper apponit humori aut corpori virefcienti. Ergo. VRINA SVBVIRIDIS] i. Modico tincta virore; atque id superficie tantum tenius.

ET FLORIDA] i. Quæ χλωροσμοῦ ἐκ ἐχρήματων, i. quæ non est saturata virore toto liquore: sed habet ἐπιόσμοι tantum ὑποχλωιδές, siue ὑποχλωρόν.

CVI EST ALBA HYPOSTASIS] Quæ loco & situ, omne tulit punctum pepasmi.

CITAM QVOQUE CRISIN OSTENDIT] Quod est eiusmodi ac si diceret; non solum ad celeritatem crisis apparet pleuritica, vt modò dicta subrubra: sed etiam ad celeritatem. Quod sanè an sit verum, viderint sapientes.

41 Τὸ δὲ ἔρυνθρον σφόδρα καὶ θύανδες, ὑπόστασιν χλωρὴν ἔχον λεῖψον εἰλημενέα· πολυχρόνιον σφόδρα ταραχόμενα νοδσον, μέλα βάλλουσιν ἐς ἄλλω, οὐ μὲν ὀλέθριον.

Sed admodum rubra & florida, quæ viridem habet hypostasim, lævem, exactam; longi & valde turbulenti est morbi, in alium transeuntis, non tamen funesti.

PROGNOSIS huius prognosticum ex incerto certum, vt spero; efficiet fida hæc mea enarratio, quam sic aggredior.

SED ADMODVM RVBRA] Quæ saturata est multa bile quam genuit ardor febrilis in hepate & hepate; nec dum, feritate domita, mansuefcit: sed contrà incandescit.

ET FLORIDA] i. Eximio rubore suffusa, nec tamen turbata & confusanea iis quæ intrā sunt: qualis conditio est subiugaliū, quorum urina semper sunt θολαί, nec vnquam residunt: sed quæ apparet pura & limpida in suo liquore.

QVÆ VIRIDEM HABET HYPOSTASIN] i. Quæ habet χλωιδές τὸ ὑφισταμένον in eximio rubro liquore. Non enim τὸ χλωρόν aliò referendum quàm ad herbaceum, vt nuper & pridem iam posui ex Hippocrate contra Galenum, vbi agitur de linguæ coloribus. Hæc autem hypostasis venit ex bile quæ iam de flaua migravit in viridem à febrili ardore.

LÆVEM SYNCERAM] Cuius non bona materia, tantum in laude est loci quem occupat, nempe fundi: non autem situs, in læuitate quam ei non peperit calor natiuus, sed ardor febrilis. Quæ causa est quamobrem rerum malarum æqualitas maiore in vitio sit quàm inæqualitas.

LONGI ET VALDE TVRBVLENTI EST MORBI] Nam diuturnitati locus est in δυσανμία humoris morbifici, & visceris æstu incandescents afflictione. Tum perturbatio venit animi, ex humoris ad caput anadrome, quam mouet orgasmus ex partium iecoris superarum phlogosi, cuius sit participes diaphragma,

IN ALIVM TRANSEVNTIS] Κατὰ μετέωσιν, καὶ ἐπιγχεσιν, i. succeffione alterius de primigenio, & propagatione illius qui manet, in partes vicinas & socias.

NON TAMEN FVNESTI] Vnde salutis veniar desperatio. Quod certè incertum est. Nam μετέωστος praua μετέωσις esse solet: vt bona εὐεδοχία. Sed ἐπιγχεσις nunquam est bona, ac multum periculo adiicit, quæ cœptis immanibus efferum esse morbum ostendit. Scitum est illud Hippocratis. Τὸν νοσήσαντα ὃν αὐτὸς ἐπέφωχεν ἄνθρωπος ὡς ἔστι πολλὰ σκοπεῖν. i. E morbis quicunque superuenit alteri alteri; maximam ille partem interficit. In promptu ratio est præceptoris. Cum enim fractus iam viribus à præsentē morbo, alter superuenit; prius interit homo quàm qui nuper aduenit morbus defierit.

lib. 2. progn.
παθόν.

42 Τὸ δὲ λευκὸν ὑδατώδες κερυνώδεια πυρρὴν ἔχον ὑπόστασιν· πόνον καὶ κίνδυνον σημαίνει. Καὶ τὸ χλωρόν πυρρὴν ἔχον ὑπόστασιν κερυνώδεια· χρόνον καὶ κίνδυνον σημαίνει.

lib. 2. progn.
αὐτοῦ

Aquosa verò & alba qua similem habet indomita mola farina rubram hypostasim; periculo & labori locum esse significat. Ipsa autem viridis, qua rubram & instar crassioris farina habet hypostasim; longi & periculosi est morbi.

MULTVM adiicitur vitio crudæ vrinæ, cum intra se continet excrementa prauitate eximia, vel de corporibus, vel de humoribus quæ liquuntur aut peruruntur. Atque hæc quamvis primo aspectu videantur *αἰσώματα*; non raro tamen existunt: vt planum fiet in ipso examine.

AQUOSA VERO ET ALBA] Non quidem illa quæ cruditatem summam ostendat, vel de prærepta occasione, vel de collapsa virtute coquendi. Sed quæ albescit vacuata bile qua fucabatur, vel deriuata in aluum, vel concitata sursum ad caput; verè & appositè huc aduocari debet, cum ea deriuatio vel concitatio symptomatica est: non autem sit *μετὰ πύλιν* ad salutarem dysenteriam in senioribus, vel ad hæmorrhagiam in iunioribus.

QUÆ SIMILIEM HABET HYPOSTASIN GRANDINOSÆ FARINÆ, ET RVFAM] Colliquamento hepatis vel etiam renum. Nam *ὀπίσθημα* vrinarum *νεφροίδια*, similiter sunt colorata vt partes quæ liquuntur: quod suprà iam posui ex Galeno. Itaque non est absurdum, ponere colliquamenta in vrinis aquosis & albis, quæ sunt eiusmodi de bilis metastasi, qua priùs saturabantur. Et verò etiam colliquamento locus est in diabete renum ipsorum, qui auiditate sitis explendæ, summa vi, vrinæ materiam ad se rapiunt; proptereaquæ coquendi occasionem venis præripiunt.

PERICULO ET LABORI LOCVM ESSE SIGNIFICANT.] Est enim demum ibi fœtura dolorum atque laborum, quod & quæ bilis, relicta vrinâ, cursum inflectit. Exempla in promptu sunt torminum, dysenteriarum, phrenitidis, & aliorum quoque symptomatum grauissimorum quæ ibi mouentur, quod anadrome bilis, vel alia quævis *ποτὴ* transitum habet atque subsistit. Periculo autem locus est in sequi doloris cruciatu; in abscessu maiore quàm vt perferri possit; & occupatis partibus quarum officii vitam carere non potis est.

IPSA AUTEM VIRIDIS] Non superficie solum tenus: sed toto liquore vrinæ, cuius adducta est non ita pridem ratio cur ita sit colorata.

QUÆ RVFAM HABET, &c.] Argumento viscerum quæ ab eadem febre liquuntur, vnde est bilis conflagratio ac transitus etiam de flaua in viridem.

LONGI ET PERICULOSI EST MORBI] Ac certè tam periculosi, vt periculosè diu citra mortem, ipsum quem inuasit & occupat, habere non possit. Nam talis vrina, mox affuturam mortem ostendit.

43 Οὐρα ὅσι δὲ ὅτα ταχὺ καὶ ἐπὶ ὀλίγον πεπαιγνόμενα· φλαῦρα καὶ τὸ κατὰ ψύχαι ὥδε· πονηρόν.

40 Vrina iis quibus tumores assurgunt sub auribus, citò et paulisper mitificata; praua. Ibi tum perfrigerari; pestiferum.

QUANTVM periculi, & quàm parum, aut nihil omnino securitatis habeat, coctionis & cruditatis vicissitudo quæ cernitur in vrinis: tum fixa firmiter coctionis in cruditatem mutatio; dictum est abundè suprà, ac demonstratum quamobrem ita fiat. Hic verò, sicut nuper in peripneumonia factitauit; mutationis illius incommoda iis accommodat quibus assurgunt tumores sub auribus à febre acuta; qui sunt eiusmodi vt cum empyemate solo, periculo locus tollatur; tamen præsidio locus non sit in empyemate, nisi vrinæ sint bonæ *ὡς ἐκ πύλιν τὸν χρόνον*. Atque huius prognoseos documentum statuit illa historia de pictoris ancilla, cui obortæ parotides fuerunt mortiferae, quamvis in empyema mutata: quod febris, vnde venerant, careret pepasmo. Huius autem prognoseos ratio & explicatio huc aduocanda ex sect. 3. 1. prorrh. vbi similiter legitur vt hoc loco. IBI TVM PERFRIGERARI; PESTIFERVM. Quod argumentum est febris ardentis indomitæ, vt Galenò visum est ad idem prorrheticum. Verba Galeni hæc sunt. Hoc sanè symptoma eximium est ardentium febrium. Nam cum illæ sint perurientes, & vnà malignæ; partes extimas non accendunt similiter vt mansueta, quæ totum corpus incendunt equaliter. Quàm autem pestiferum sit perfrigerari foris, visceribus æstuineādescentibus; declarat illa sententia præceptoris. *Εν τοῖς ὀξέσι νοσήματι ψύξις ἀποθνήσκειν κακόν*. i. In morbis acutis, extimarum partium refrigeratio; graue malum. Quod spectant plurimi apud Hippocratem aphorismi, quos aduocare nihil necesse est, ac multò minùs causam cur ita sit, pluribus explicare.

1. Epid. part. 3.

protr. 61. § 1.

aph. 1. 7.

Sic ex prorrh. 28. l. 3. i.

44 Κύστις ἀποληφθεῖσα, ἄλλως ἢ ἢ μὴ κεφαλαλγίας· ἐχθρὸν ἀσπασμῶδες. Τὰ νερκώδεια ἐν τούτοις ἐκλυόμενα· δύσκολα, μίαν ὁλέθρια. ἄρα γε καὶ ὡρακρῆτικόν ὃ τοιοῦτον;

Vesica intercepta, quippiam habet conuulsificum: idque cum aliis, tum si accesserit cephalalgia. Quæ ibi torpide exoluntur; morosa sunt: non tamen mortifera. An vero idipsum est mentis emotæ?

VRINÆ incommoda plurima circumueniunt homines de vitiis partium quæ ipsi ducendæ, excipiendæ, ac transmittendæ suam dicarunt operam, & quarum officiis ipsa suscipitur atque perficitur ἔρησις. Ergo hic transitus est ab vrinis ad vrinarias partes quarum præcipuæ sunt vesica & renes.

[VESICA INTERCEPTA] Non quidem ipsa, cuius certè nulla interceptio esse potest: sed quæ intercepta cûrsum vrinæ, cui excipiendæ ac transmittendæ per eam dicata est. Itaque cûm interceptiendæ vrinæ, partium quoque aliarum conspiratio fit; quæ hîc vesicæ tribuitur interceptio, μέσην καὶ interceptæ vrinæ causam ibi subesse ostendit. Nam interceptæ vrinæ plures sunt causæ, de quibus dictum est alibi, quæ nihil necesse est hîc recensere. Ac noua non est, nec inaudita significatio τῆς ἀπολήψεως, αὐτῇ τῆς ἐπιτομῆς. Sic apud Hippocratem legitur κοιλία ἀποληφθεῖσα, ἢ ἀπολεαμμένη, i. alius cohibita sine suppressa, quæque nihil infra transmittit. Tamen si verbum ἀπολεαμμένην, propriè accommodatur iis quæ vel in via subsistunt, vel retrahuntur. Sic enim reperio dici ἀπολήψιν τῆς ἀναδωσέως, de chylo cui ad iecur interclusum est iter, inflammato ieiuno, vel oppilaris venis quæ itur ad hepar. Sic etiam apud Hippocratem locus est πρὸς ἀπολήψιν τῆς πνεύματιν αὐτῆς φλέβας. Nam illud retracti humoris est de suo cursu: quod ita legitur apud eundem authorem, τὰ ἐκκεχυμένα, μὴ εἰσω ἀπολεαμμένην, i. quæ foras effusa sunt, intro retrahere non oportet. Ergo. [VESICA INTERCEPTA] i. Quæ non transmittit vrinam, vel de amisso sensu, cûm scilicet nulla sensio excitatur stabulantis vrinæ; vel quia vis excernendi languet effæta; vel etiam quia vrina non habet exitum, obstructo meatu per quem meiedo emittitur. Sensus quidè amissio in vesica, tum excernendi vis exoluta, hîc demum appositè locum habent, cûm illæ causæ sunt positæ in frigida intemperie, quam intulit ardor febris acutæ. Nam si quis obijciat, cûr in vesica id fiat, alibi verò nusquam, cûm idem calor æqualiter occupet totum corpus; obiectionis solutio, inquit Galenus, in partis ipsius proprietate consistit, cuius membrana est planè αἰμαρ, planèque ἀσπερς. Itaque iudicium est Galeni, ὅτι ἡ κατὰ φύσιν αὐτῇ κύστι γίνεται, τὸ κατὰ φύσιν ἐν αὐτῇ θερμὸν ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ φύσιν διαφορῶδες, i. quod refrigeratio eximia tum in vesica fit, cûm illud quicquid in ipsa est caloris nativi, totum ab eo qui contra naturam est, fuerit dissipatum. Hinc duplex illa vesicæ affectio, nempe ἀπνοία τῆς ἀποκλεινῆς διατάξεως, vnde impotentia excernendi; & ἀναδωσία, vnde nulla voluntas meiendi, & inde posita interceptio. De quæ est illud prorrheticum, Interceptæ à frigore in acutis vrinæ; pestifera.

[QVIDPIAM HABET CONVULSIFICVM] Quod est eiusmodi ac si diceret; potest nonnunquam conuulsionem inferre.

[IDQUE CVM ALIAS] Per sympathiam quæ societatis iure intercedit illi cum nervis.

[TUM SI ACCESSERIT CEPHALALGIA] Vnde neruorum principio malè est, viciniæ & societate partis afflictæ, videlicet capitis in sua membrana cerebro adiacente. Nam cûm afflictio nobilium partium facillè vnâ secum afficiat τὰ κοινὰ καὶ τὰ ἐξῆς, i. vicina & socia: tum verò id maximè locum habet in sæua cephalalgia, cûm ei multum adiicitur de suppressa vesicæ aut alui purgatione, vt planum facit illud prorrheticum. Κεφαλαλγία καὶ κατὰ φύσιν, ὡρακρῆτοντες, κοιλίας ἀπολεαμμένης ὄμμα δρασιμόντες, αἰθροὶ ὀπποῦντες γίνονται, i. Cephalalgici cum sopore delirantes, alui suppressa efferi, rubentesque facie; opisthotonici fiunt.

[QVÆ IBI TORPIDE EXOLVNTVR] Quorum torpida exolutio cernitur in pigro motu, nec bene percepto appulsu τῶν αἰσθητῶν, i. rerum sensilium: vt sæpe accidit ipsis manibus, vel etiam cruribus, ex ea calamitate suppressæ vrinæ, lumbis molesta & graui: neque id facultate amissa, vel potius impedita meiandi spiritui animali, ob interclusum iter neruorum à cerebro; sed ab oppressione lumborum atque ceruicis, quam facit venarum & arteriarum distensio, ex ipsa humoris anadrome, dum viam ad caput affectat: quod simulatque appulit, paraphorica edit symptomata; vt præceptoris opinio est in quæstione hîc posita.

[AN VERO IDIPSUM EST MENTIS EMOTÆ] Quod profectò non esset, si torpida exolutio de impedita veniret libertate meiandi, ab intercluso neruorum meatu in cerebro. Id enim potius esset cataphoricum quàm paraphoricum. Ac talis quidem ratio est illius prognoscæ: Quibus ex dolore lumborum, anadrome fit ad caput; torpida manus; cardialgia; auriumque stans sonori; hæmorrhagia larga: tum alui profusè feruntur; ac mentes turbatæ vt plurimum.

45 Νεφερόν εξαπναῖον άλγημα μὲν ἔργε Ἰππάρχσιος· λιθιδίων ἔρησιν
ἢ παχέων ἔργον σημαίνει.

Renum repente dolor obortus, cum urina suppressa; lapillos, aut crassam urinam meiando reddendam ostendit.

10 **VRINA** suppressa de vitio renum, cuiusmodi sit, & vnde nata, in hac prognosi docetur; sicut in proxima dictum est de vesica: tamen si propria urinae suppressio, quæ ischuria dicitur, pertinet ad vesicam: quia urinae materia ducta è venis, vi secretrice renum, antè non habet nomen urinae, quàm ad vesicam peruenit, eò transmissa è renibus. Itaque κατὰ τὴν φύσιν cohibita erit urina in renibus, quando eorum vitiis interclusum est iter urinae, quæ ipsam solent transmittere ad vesicam. Vitia autem sunt hæc, quibus impediri est transmittendi urinam & emittendi meiando: quia tum vesica est vacua, nec eius vitio urina supprimitur.

20 **RENUM REPENTE DOLOR OBORTVS**] i. Sensio naturæ tristis, acuta aut grauis, vt rei molestæ in renibus generatio est, motus, aut mansio. Est enim dolor grauis, mansione calculi; acutus autem, in motu. Atque dolores illi repente in renibus enascuntur, i. de improviso, ac sine illorum præuidentia intus aut foris: nisi cum iis obortis mutua quædam ipsorum est vicissitudo. Nam grauis doloris in peracutum, & rursus huius in grauem, transitus esse solet: vt occupati renis à calculo motus est & concitatio, aut quies à motu. Nec verò antè calculi perceptio est acuta aut grauis, quàm coeperit coagmentari. Coagmentatio autem fit de improviso. Vt veritas ibi luceat catholici theorematismis, quod est huiusmodi. Non enim quemadmodum repentina est morborum generatio: sic & ipsius generationis causa. Nam causa morifica sensim accrescit & oppugnat ipsum κατὰ τὸν χρόνον: impressio autem morbi, in puncto fit temporis.

Gal. ad hist. 4.
part. 3. Epid.
& ad proth.
17. 2. 1.

30 **CVM VRINA SUPPRESSA**] Cuius suppressio est vel occupati renis à calculo, vel inflammati cruciatu doloris; propterea quæ in segregandi feri officio laborantis: vel impediti meatus quæ ducitur ad vesicam. Atque id mirum videri debet in renis vnus afflictione, sisti urinam, vel micturniendo stillatim ægrè transmitti: cum ita comparata sit ratio amborum renum, vt cessante vno, alter officium suum faciat. Sed magna vis est sympathiæ in societate officij. Propterea in sympathia renis alterius, crebrò & parçè urina emittitur. Nam occupati calculo & inflammati cessat officium. Et quibus ren socius languet effectus & marcidus, iis in sæua nephritide urina supprimitur: vt nuper vidimus in Præside Fabro Pibratio, iurisperitorum eloquentissimo, & eloquentium iurisperitissimo.

LAPILLOS] Coagmentato in renibus crasso & glutinoso humore, cuius coagmentatio est lapidosa, & nominatur λιθιασμός, vt in vesica. Sed tamen hoc interest, quòd in vesica non semper est πρὸς τὸν χρόνον λίθος, sicut in renibus. Ac renum quidem τὸ συνάγμα, i. coagmentatio, dicitur πρὸς τὴν ὑπόστασιν: vesicæ autem, μετὰ τὴν ἔρησιν.

40 **AVT CRASSAM VRINAM**] Mixtione crassi humoris, & pituitæ cuiusdam tenacis: quæ vel indigena est renum, vel aduena; idque prolapsu catarrhi è capite, vel humoris morifici, aut conuulsifici, ad renes è venis, vel è nervis per venas, appulsu, quò ductus urinae non sunt meabiles.

MEIENDO REDDENDAM OSTENDIT] Quæ vacuatio libertatem meandi urinae restituit. Ex quo efficitur necessario faciendum quòd medicinæ dictator edicto sancit. Οὐρητικὸς καὶ ἥπρας, ἀπαλύνει, λεπτύνει. i. Diureticus purgare, lenare, attenuare. Sed hæc sufficiant.

6. Epid. part. 2.

46 Τρομάδεια πρεσβυτέροις ἐν πυρετῷ, καὶ οὕτως Ἰππιδαινόμηναι·
λιθιδία ποδὶ διαρέει.

50 *Tremores qui senioribus tum in febre, tum in super sic apparent; forte lapillos meiando emittunt.*

60 **QVONIAM** senioribus calculi facilis est coagmentatio stabulantis in rene, nec facilem exitum inde habentis; μυχαλὸν illis erit concussio tremorifera excutiendo calculo cum urina. Et cum tremoris natura & causæ iam pridem sint explicatæ; ipsum verò nomen tremoris hoc loco sit positum pro rigore qui concutiendo ciatur; concussionis illius commoda videri possunt in excussione rei molestæ: modò rigendi & calescendi crebra & cita non sit vicissitudo, nata ex inflammatione spinalis medullæ & membranarum eius, vnde non rarò ac ferè semper contingit urinae suppressio.

Coac. 8. lib. 1.

TVM IN FEBRE] Appulsu cacochymia per venas expressæ ad cutim, è lumbis, per dorsum, ad caput.

TVM IN SUPER SIC APPARENT] Cum etiam sine febre ciuntur ab iis quæ dicta sunt: nempe à renum dolore, & urina suppressa, repente obortis.

FORTE LAPILLOS MEIENDO EMITTUNT] Qualis autem conuulsio est sanandæ para-

lyti, concutiendo; quale sternutamentum hysteris ac difficulter parientibus: talis & rigor nephriticis calculosis inflammatione carentibus: cuiusmodi seniores habentur, quorum natura in excernendo pigra, quodam velut *μολυσμῶ*, i. *veciario* hinc opus habet.

47 Οὐρὴ δ' απόληψις καὶ βαρὺς ἐν νεφρῇ σημαίνει ὡς τὰ πολλὰ, στραγγεῖν ἐῶν ἐσομένην. εἰ δὲ μὴ ἄλλην δ' ὁρῶσιν, ἢν εἴωθεν δ' ὁρῶσιν.

Urina intercepta & gravitas in aqualiculo, stranguriam futuram ferè denunciat: sin minus, alium morbum quo laborare consuevit.

QUEMADMODUM actio laesa, partis cuiusque afflictæ certissimum est argumentum: sic læsionis species; tum ipsa doloris proprietas atque locus, cuiusmodi sit afflictio planè ostendunt. Hic ponitur intercepta vrina & gravitas in imo ventre: quæ quorsum appareant, sic in hac prognosi docetur.

VRINA INTERCEPTA] Non quidem criticè, nec vitio renum, vel emortuorum, vel etiam calculo aut pituita crassa occupatorum: sed cuius interceptio est vel occupata, vel exoluta vesicæ. Nam sensus amissio, vnde vrina supprimitur in vesica, eò spectare non potest, quò instituta prognos.

ET GRAVITAS] Quæ semper ibi causam ipsius subesse testatur, ubi percipitur: vt. annotanimus in pleuritide, cum ei gravitatis sensio est ad brachium & ad mammam.

IN AQUALICULO] *Εν νεφρῇ*, i. in imo ventre, quem hypogastrium nominavit in aphorismis. Hypogastrium autem continet ipsam vesicam: vt sensio grauitatis in eo percepta, pertineat ad vesicam quæ continetur: sicut hypochondrij tumor, ad hepar.

STRANGURIAM FUTURAM FERÈ DENUNCIAT] i. Vrinæ stillantis inuitam & ægram meiando emissionem: atque id morbo vesicæ; non autem symptomate. Nisi quis forè dixerit, humoris collectionem, vnde vesica tumens, grauitatis molestiam exhibet hypogastrio; tandem à nimia oppresseione expressam, facere stranguriam ipso symptomate, non morbo vesicæ. Sed tamen hic tumor, est morbus vesicæ, non hypogastrij. Quòd si quis obiciat, sæpe à tumido hypogastrio reddi urinam, qua ille tumor exoluitur; vt illud concedam: tamen id non est huius prognos, quæ interceptam ponit urinam, priusquam veniat stranguria. Nam interceptæ vrinæ nulla est illic mentio vnde adducitur illa obiectio. Hippocratis verba hæc sunt. *Perinthis vrina seminiformis, eiusmodi erat quale criticum quippiam.* Et verò hypogastriorum ferè ita esse solent. Nam illa quæ meiando redduntur; ibi demum exolunt & liberant, ubi nec flatu, nec aluo transmissa multis facibus & glutinosis, pars tumefacta non adæquatur, nec restituitur equalitati.

SIN MINVS] i. Si inde non incidit stranguria, manetque gravitas hypochondrij, & intercepta vrina.

ALIUM MORBVM QVO LABORARE CONSVÉVIT] Cuiusmodi esse potest vesicæ repletio per impotentiam emittendi urinam, quæ ab effusa vi expultrice fibrarum illata est, vel cum impeditio est vrinæ ductus à calculo aut caruncula in fistula urinaria: vt iam expressa vrina foras transmitti non possit.

48 Ἐν εἰλεώδεσιν, ὕρὴ δ' απόληψις κατενέχεται θάνατος.

Cum ileosis interceptio est vrina; cita mors venit.

STRANGURIE & ilei frequens adinuicem transitus esse solet, quando nec ileum facit inflammatio; nec stranguriam morbus vesicæ, cuiusmodi est calculus, inflammatio, vlcus. Sed cum ilei causa est pituita putris & glutinosa facibus inuoluta, vnde fit reuolutio intestini motu contrario naturali, i. infernè sursum, & cibus remear qui permeare non potest; tum idem accidit vesicæ ab ileo in stranguria, quod à vesica intestinis in ileo: efficiturque vt quemadmodum stranguriæ ilcus superueniens, septimo die interimit: ita periculo ilei primùm nati multum adiiciat nouissima stranguria, nisi oborta febre, vrina fluxerit cumulatè. Transitum verò hic diximus, non κατὰ πῶσιν vnus in alterum, vt verè est transitus: sed κατὰ χεῖρας καὶ τὴν δὴτησιν: cum scilicet pituitæ illabentis in vtrumque alueum, propagatio est, aut pariter in vtroque cumulata congeries. Nisi quis forè adferat & opponat illam sententiã præceptoris. Quod pituitæ collectio dolorifica inter diaphragma & ventrem exitu denegato per alterutram aluum; si forè per venas ad vesicam cursum insitit; morbum exoluit.

49 Οὐρον ἐν πυρετῇ δάσος ἔχον διασπώμενον: ὑποστροφικόν, ἢ ἰδρωδές.

Vrina in febre quæ asperum quid habet diuulsum, recidina nuncia est, aut sudorum.

NUPER QVASITV. Est de sudore cuius prænuincia est vrina, his verbis. Το δὲ ἐκ τοῦ ἰσχυροῦ, Coac. 34. huius cap. *Quæ* verò ex tenui asperatur; virum sudoris futuri prænuincia est? Quid autem sit illud asperum, cuius hîc mentio est; declarat quod sequitur in eadem prognosi. Γεφυρημένον δὲ ἀσπράδες ἐξ αὐτοῦ ἐκσταμένον. Quod veluti spuma enatat in vrina. Sed illud ἀσπράδες, id est dicendum, vt nihil ostentet colliquamenti: sed natum potius ex crassiore humore quem agitauit spiritus flatulentus, vnde origo spumæ διουλνῆς, i. quæ non vanescit facile: qualem præceptor nominauit bullaram, cum ait. Quicquid vrinas meiunt bullatas; ostendunt nephritica, & longam fore infirmitatem. Existunt & aliæ in vrinis asperitatis idæ, quales sunt illæ. Τὸν ἄρα πλεονεχμῶν φασὶν πρῶτον. Tum illæ. Κελευώδες, πιπρώδες, ὑμενώδες, de quibus iam multa non ira pridem audiuimus. Ergo vrinæ spumantes bullatæ à flatulento spiritu ex crassiore materia, sunt recidinis crebræ; ab inchoata crisi, cuius perfectio sperari nequit cum tali vrina. Tum inde sudor expressus, finem non adfert morbi, nec eius remissionem: quia est soboles oppressio- nis. Quo tempore autem naturâ morbificis causis opprimitur, estque humorum cruditas; tum nihil bene fit excrecendo.

50 *Ἐν μακροῖσι πυρελοῖσι, λεπτοῖσι, πλεονώδεσι. λεπλῶν ἔχον ἔρησιες. αὐληνώδες.*

In longis febribus, exiguis, & erraticis, vrinæ tenues meiando emissa; lienosa.

DIUTURNARVM febrium quas facit humoris morbifici contumacia, vnde pepasmus difficilis, & vnâ difficilis vacuatio; vrinæ sunt crudæ ac tenues & aquosæ, de quibus si cætera sint salutaria, mo- uetur abscessus ad inferas partes sub diaphragmate, vt nuper ostendimus. An verò tales vrinæ sint lie- 30 nose, id certè in quæstionem adducitur. Ac primum de lienosis dicendum. Enimvero illi demum ve- ræ sunt lienosæ, quibus iam pridem viscus ipsum lienis induruit. Sic enim placere video præceptorî. Ga- leno. Sed ea descriptio lienosi tumoris apud Hippocratem sic est. Quibus magnus est lien; si quidem bilio- si sunt; sedati multum apparent, vlcenibusque obsiti, quæ difficulter sanescunt: tum illis ab ore fædus expirat odor, atque macrescunt. Lien verò durus percipitur, manetque sui similis in magnitudine, nec cibos deiciunt. Sin autem pituitosi sunt, multò minora sînt illis prædicta incommoda: tum ipse lien aliàs atque aliàs maior aut minor est. Sed illa duritas, vnde sunt homines lienosi, est κατάρροπος lienis, non ἀνάρροπος. Sic enim visum est præcepto- ri cum ait. Lien durus non sursum deorsum, rotundus, latus, crassus, longus, tenuis. Quod est eiusmodi ac si diceret. Quotiescunque lien induruit, non est sursum illa duricies quæ ortum habet à veteri congestione 40 humoris, vnde paulatim tumor accreuit: quemadmodum illa quam repentina fluxio excitauit, quæ & ipsum lienem facit ἀνάρροπον, & omnia quæ inde mouentur, ἀνάρροπα: vt hæmorrhagiam & faciem multo calore & colore suffusam. Sed illa duricies verustæ congestionis, vnde homines propriè sunt lie- nosi; deorsum percipitur, facitque lienem κατάρροπον, & omnia inde nata κατάρροπα.

Ergo. VRINÆ TENUES LIENOSÆ. i. Apparent signo lienis qui cœpit iam pridem duresce- re, ac tandem κατάρροπος factus est: non autem repentino affluxu sanguinis melancholici, qui phlegmo- nem edit systrophicam, ipsumque facit ἀνάρροπον cum duritate, ac sæuo dolore: sed cui congesta sensim pituita aut melancholicus humor; duritatem attulit tensionis, oborto scilicet eius tumore rotundo, aut lato, longo, & crasso; itémque longo ac tenui. Quæ omnes differentiæ sînt in κατάρροπῳ liene; vel po- tiùs singulæ cadunt in lienem κατάρροπον per congestionem humoris pituitosi aut melancholici. Quò 50 spectat instituta prognosis, sicut & illa. Dysenteria lienosis, non longa quidem, utilis: longa verò, pestifera. Nam quiescente illa, si vel hydropes veniunt, vel etiam lienteria; mortiferum. Sunt autem vrinæ tenues lienosæ, tum per se, tum ex euentu. Per se quidem, debili calore sanguifico hepatis, à tumore lienis, vnde & hydropes assurgunt. Ex euentu autem.

IN LONGIS FEBRIBVS, EXIGVIS ET ERRATICIS] Quarum humores varij, variè- que affecti, meatuumque angustia, & magna oppressio, parem pepasmo. difficili difficultatem adferunt: πῶς φυσικῆς πίψως, i. coctionis naturaliter instituta. Tum biliosæ tincturæ vacuitatem adfert bilis tum genitæ πῶς ad ipsum lienem: vnde vix alius transmittitur: sicut annotauit Hippocrates de lienoso tumore à bilis congerie in lienem.

60 *Ἐν πυρετῷ, ἄλλοτε ἄλλοιῶν ἔρησιες μυκηνώσι.*

In febre, interdum varias reddi vrinas; longi est morbi.

ILLUD EMVM vrina longi est morbi, quæ certis quibusdam, vel omnibus sui partibus, variorum humorum variarumque index est affectionum: ex quibus difficilis est redintegratio, difficilis item palpatus. Nam difficultas redintegrandi partes è natura egressas, & concoquendi humorem; morbos inde natos facit partim ἀκρίτως, partim δυσκρίτως, nonnullos etiam διακρίτως. Talis vrinæ calamitas & contumacia, legibus & exemplis iterum atque iterum supra est posita & explicata.

52 Τα ούρου μέρη μὴ ὑπομνησάντων· ὀλέθρια. ἀεὶ γὰρ τούτοις οὐ
πέεται, οἷς εἰ πῶς ὑπόσασιν ἀνατρεχέας;

Quæ immemoribus fluunt vrina, pestifera. An verò sic redduntur, ut si hypostasim perturbaueris?

DICTVM EST nuper de vrina iniusta, quæ scilicet ægrè destillat: idque tum morbo vesicæ, tum eius symptomate. Nunc de iniusta dicendum, quæ sine sensu ac sine voluntate clam effluit; vel, vt supra dixit præceptor, λαθράως. Sed cùm iniustæ vrinæ duplex omnino sit causa, videlicet impotentia & exolutio, & occupatæ mentis obliuio; vtriusque hîc ratio lucet in eo quod posuit, μὴ ὑπομνησάντων, i. *immemoribus*: cuiusmodi planè sunt qui ex phreniticis, fiunt lethargici, quibus iam nulla est cura decori.

Ergo. QVÆ IMMEMORIBVS] i. Quibus memoria non renouatur eorum quæ sunt quæque dicuntur ab illis, εἰ περὶ τὸ πῶς γὰρ μὴ νοσῶν, εἰ περὶ τὸ πῶς ἐκκλινῶν τῶν μορίων, i. *sine quia laborat mens; sine quia sunt exolutæ partes*. Sic enim comparatum est, vt à phrenitide quam exceperit lethargus, effceta vis langueat cerebri, omniùmque neruorum & membranarum, vt pariter voluntatis & sensus amissio inferatur. Nam & iniustæ deiectiones, supra sunt posite in lethargicis.

proth. 46.
f. 2. i.

FLVNT VRINÆ] Videlicet obliuiosis & sensu carentibus muscoli ianitoris, quem vocant sphincterem. Tamen si non cuicunque sphincteris exolutio est; eidem quoque obliuio est decori. Sic enim accepimus, cuidam hepatico aluum transmitti solitam sine sensu, cùm esset apud se. Quem locum sic expressit præceptor. Αὐτὸ καὶ τὴν κατὰ δυνάμιν, μὴ αἰσθανόμενον εἶναι παρ' ἐαυτοῦ· κακόν· οἷς, πρὸς ἡπατικόν. i. *Liquida ex aluo secedere non sentienti, quamvis apud se sit; malum, vt hepatico.*

30

AN VERO SIC REDDUNTUR, &c.] Quod idem est ac si diceret. Periculosum est certè, vrinam λαθράως καὶ ἀπροσέτιως effundi: sed ei periculo multum adiicitur, nec solum in angusto spem esse, verumetiam mortem in propinquo esse, illud denunciat; si vrina iniusta, iumentorum similis emittatur. Sic in lethargicis deiectiones iniustæ & liquidæ, sunt magis terrificæ, ac desperatæ salutis. Sic etiam proliuies alui prærubra periculosum cōma reddit funestum. Nam vitio animalitatis accedit effceta vis, & cōnomiæ naturalis. Quò autem plures principatus in vitio sunt; eò res ægri peiùs eunt.

al. διὰ βραχέος.
vel διὰ πύκνους

53 Οἷσιν οὐρα ὀλίγα θεομῶδεα οὐκ ἀπυρέτοις, πλῆθος ἐκ τούτων
ἐλθὼν ὠφελές. ἔρχεται δὲ τοιοῦτο ἢ δὲ δρχῆς, ἢ διὰ [ταχέων] ὑπόσασιν ἰσθ.

al. crassam.

Quibus vrina pauca, grumosa, febre non carentibus; tenuium copia ex his emissa prodest. Tales autem emittuntur ab initio, vel [cito] habent hypostasim.

aph. 69. 4.

IN HAC prognosi mutationum gradus ponuntur ad crisin, quæ ab vrinis primùm significata, 50
mox ab iisdem suscipitur. Mutationum gradus ad crisin, ibi demum cernuntur cùm de vrina crassa & pauca primùm quidem, statim grumosa, mox autem tenuior & copiosa emittitur, idque circa initia; vel quæ non multò pōst, hypostasim habet pro grumis qui antea sparsi & appensi erant vrinis. Hæc autem prognosis, loco exempli scripta est in aphorismis, quo theorema catholicum continetur de transitu cruditatis in coctionem; & impediti humoris morbifici præ contumacia, meatuumque angustia, in liberalem & liberam excretionem.

aph. 69. 8c
70. 4.

QVIBVS FEBRE NON CARENTIBVS] Vnde hæc veniunt quæ hîc ponuntur: vt omnis tollatur suspicio morbi nephritici, vel ab vrinis crassis ibi cohibitis, vel à lapillis qui rerum earum vacuatione liberali exoluitur, vt nuper audiuius in illa prognosi. Renum repente dolor obortus, cum vrina sup-
pressa; lapillos aut crassam vrinam mictum iri testatur. Ac nili me animus fallit, verè hîc videor esse dicturus, eò dixisse Hippocratem, ἐκ ἀπυρέτων, i. *haud febre carentibus*, ipsisque vrinas hîc positas apposuisse, non
quidem studio minuendi acerbicatem febris: sed indicandi potiùs assiduitatem ipsius: vt scilicet nullam recipiat ἀπυρεσίαν, i. *febris vacuitatem*, donec ad crisin ventum sit. Nam huic crassæ & paucae vrinæ, quam
dominatu caloris natiui paulò pōst agnoscit grumofam; mox tenuiorem, copiosam, & residentem; op-
ponit in simili febre alterum genus crassæ vrinæ, turbatæ, ac iumentorum similis, quæ diu deposita non
residit.

60

residit. Ergo. QVIBVS FEBRE NON CARENTIBVS] Qui sunt in febris assiduitate, nec vllam habent discessionem paroxysmi diurni, quam vocant *ἀπορρηξία*.

VRINÆ CRASSÆ] Non quidem liquoris mediocritate parta, virtute caloris natiui, crudas ac tenues vrinas minificantis: sed quæ sunt eiusmodi, crassamenti excessu; de copia trudi & crassi humoris, vnde spissantur atque crassescunt.

PAVCÆ] Quia non sunt meabiles, & in via subsistunt: aut quia vis renum laborat in officio fecernendi, præ contumacia feri, crasso humore perfusi.

GRUMOSÆ] i. Veluti grumis obstita toto liquore sparsis, atque quodammodo appensis, nec dum in fundo resedibus; à flatulento spiritu, & inchoato pepasmo quem vis natiui caloris nondum absoluit, nec dum humoris domuit contumaciam. Atque vt cœlum verè *Συμβάδες* dicitur in *μεταβρία*, cum in conspectu est par serenitati opacitas: sic & vrinæ sunt *Συμβάδες*, cum de confusis & perturbatis partim liquorem purum ostendant, partim humorem crassum liquori appensum, quo antea spissabatur cōfusus.

TENUIVM COPIA EX HIS EMISSA] Quod idem est ac si diceret, si quæ prius fuerant crassæ & paucae, mox autem grumosæ ob causas adductas; nunc solito tenuiores, propter eaque mediocres consistentia, parta liquoris mediocritate ipso pepasmo qui à virtute caloris natiui de inchoato transit in perfectum; si, inquam, tenuiores vrinæ ex vitiosis crassis & inde grumosis ab inchoato pepasmo; & copiosæ ex paucis liberè emittantur, per libertatem humoris, meatuum, & ipsius naturæ.

PRŒDĒST] Ad salutarem crisin quæ liberali & libera excretionē humoris morbifici victi à natura suscipitur. Atque illa excretio sic habetur, optima; si cum iis quæ in promptu sunt bona, nulla subesse vitia ostendantur. Nec verò vinarum posita liberalitas meliorum factarum, dimissionem tantummodo febris adfert: sed etiam vendicat ab abscessu partium inferarum, cuius prænuncia erat humoris morbifici contumacia, ac difficultas coquendi & excernendi.

TALES AVTEM QVAMMAXIME INITIIS APPARENT, AVT CRASSAM HABENT HYPOSTASIN] i. Vt sint eiusmodi vrinæ, crassæ & grumosæ, aut saltem crassa hypostasi præditæ; quoniam in causa est ardor vehemens; maxime circa initia: quanquam & progrediente in peius morbo, fieri possit. Quam commemorat hypostasim, est verè *γενεαδής*, i. *genitalis*, eamque Galeus negat esse probam: sicut illa esse solet quæ causa concrementi cocti & mitificati morbi.

54 Οἷσιν ὄρεα ταχέως ὑπόστασιν ἴσθ'· ταχέως οὗτοι κρίνονται.

Quibus urina citò hypostasim habet; celeriter illi iudicantur.

IN INTERITVM scilicet aut salutem: vt illa cum secundis aut aduersis notis apparuerit. Secundæ & laudabiles notæ sunt; læuitas, æqualitas, & albedo: nigredo autem, asperitas, & dissipatio, concretioque; sinistræ & prauæ. Ardoris hæ violentiam febrilis, morbifici succi corruptionem, naturæ denique imbecillitatem referunt: vim illæ contrà caloris natiui, æqualiter sese in omnes materiæ partes insinuantis; & materiæ bonitatem, cum robore coniunctam solidarum partium, quarum ipsa virtus, natura est. Vtrinque crisis est mutatio, celeriter à celere motu adueniens, in eam partem casura, in quam motrix causa inclinatam eam compulerit; hinc natura; & illinc morbus. Iudicandi septimo morbi; quarto *hypostasim per vrinas vel adhuc rubentes ferunt: de cæteris eodem modo.* Vbi Galenus illa verba, de cæteris eodem modo, in eum sensum accipit vt existimet, quæcunque quarto die coctionis corruptionisve signa inualescentis dantur; crisin promittere septimo; conualescendi morbo, vel succumbendi: quemadmodum contrà, iudicium in decimumquartum diem dilatum iri admonet, quæ die septimo indicia aduenerint.

55 Επιληπτικοῖς οὐρεα λεπτά καὶ ἀπεπτα ὥρα τὸ ἔδος, ἀνδρ. πλησμονῆς. Ἐπιληψιν σημαίνει. ἀλλῶς τ' ἢ ἦν τις ἐς ἀκρώμιον, ἢ τράχηλον, ἢ μεταφρεόν πόνος ἢ σπασμὸς ἐμπεπλώκη, ἢ νάρκη πειχρήται τῷ σώματι, ἢ ταρραχῶδες ἐνύπνιον ἐωρεάκη.

Epilepticos urina præter morem tenues & crude, si repletio nulla adsit; de instante casu admonent: idque cum aliàs, tum si ad acromium, cervicem, aut dorsum dolor & tensio urget, vel corporis obrepit stupor, vel perturbata insomnia obuersantur.

EPILEPTICOS appellat, non eos quorum natura & conformatio corporis, in epilepsiam vergit; qualiter *φριγιδής* dici est obseruatum: sed epileptica symptomata iam expertos. Instante his casu; vel translata bilis ad cerebrum, vrinam tinctura destituit; vel ventriculo inter stagnandum debilitato,

impeditam concoqui, tenuem dimittit, & crudam, i. albam, colorisque aquei. Vt epileptica conuulsioni committenda, arcem bilis cerebri petat; intellectu est vulgatum: nec ignotum profecto, oblastrum ventriculi sympathia, nexus nervorum sexti communione inducta, eandem conuulsionem inferri. Non est tamen omnino necesse, vt vel casum vrinae cruditas comitetur, vel vrinae cruditatem nouus casus necessario consequatur. Nam si bilioli faris humoris corpore conclusum continetur, quantum cerebro irritatio sufficit, & quantum vrinae tingenda; non erit ipsa vrina decolor. Et si ciborum cruditas assumptorum, cruditatis fuerit in vrina parens, non est necesse vt quis ab ea in epilepsiam incidat. Non igitur demonstratio hæc, sed coniectura fuerit, quam robustam faciunt symptomata mox deinde subiuncta; resilius ad acromium, dorsum, & ceruicem dolor, læsione exortus rhomboidis musculi, à ceruice ad octauam dorsii vertebram recta linea deducti; ad acromium autem obliqua: qui quidem hic, vel ab excurrente ad caput materia, vel consortio cerebri afficitur. Sequitur corporis stupor in mouendo, & sentiendo, cerebri soboles iam vapore offusi. Perturbata sunt denique insomnia, pectus ab Ephialte gigante opprimi, guttur laqueo constringi, certamen inire, in barathrum etiam precipitari existimantium. De quibus, vide repletionem secundam libri 3. de diætâ, & finem libri de

56 Τα σμικρὰ ὀπιφαίνεσθαι, οἷς σάξιας, καὶ ἕρον, καὶ ἐμέλιον, καὶ διαχωρήματα· κακὸν μὲν πάντως, κακίστον δὲ ἐστὶς δυνήλων ἰόντα.

Exigua quadam superapparere, velut sanguinis substillæ, vrinas, sudores, vomitus, deiectionesque eiusmodi, est quidem omnino malum: sed eo peius, quò frequentius reuenterint.

DE SANGVINIS substillò antea fuit illud. Σαξίης ὡς ἐκαστὰ κενύσαι, i. Substillæ sanguinis per exigua, praua. Sudatiunculam quoque antecedens caput condemnauit propositione prima. Et eo proximè prius σμικρὰ ἐμέσματα, i. vomitus exiguos. Deiectiones eiusmodi, insequens tractatio: vrinas guttarim stillantes, præfens hæc improbauerit. Omnibus ratio proferenda communis. Quia nihil paucum est criticum. Sed cum semper id malum, inquit; tum maximè, si crebro repetitum: vnde nimirum naturæ imbecillitas oppressa in summa excernendi necessitate declaratur. Ego vim magnam esse puto in diætione τῶ ὀπιφαίνεσθαι, i. superapparendi, qua designatur; ibi demum exiguam vacationem valde fuisse noxiam, cum larga, velut necessaria, expectata est.

DE DEIECTIONIBVS.

CAPVT
III.



ΙΑΧΩΡΗΜΑ τῆς κοιλίης βέλτιστον, μάλτακόν, σίωεσσηκός, ὑποπύρρον, μὴ σφόδρα δυσώδες. Διαχωρεῖν δὲ πρὶν εἰσισημύειν ὥριον· πληθὺς δὲ, πρὸς λόγον τῷ εἰσιόντων.

1 Deiectio alui est optima, mollis, coagmentata, subrufa, nec valde graueolens. Ipsam verò transmitti oportet qua consuevit hora, & ea copia quæ assumptis respondeat.

ERAT EX ILLIS omnibus quæ proposita sunt in hoc amplissimo Medicinæ theatro, illud extremum; vt omnis ratio deiectionum explicaretur. Est autem consilium explicandi primum ea quæ insunt bona, quæque naturaliter sunt constituta, procul ab iis quæ mala sunt: mox ea quæ sunt egressa de norma & præscriptione naturæ; propterea quæ in malis ducuntur: maximè verò quando non adimunt id quod intrus lædit, sed illud ipsum magis læsurum, intus subesse ostendunt.

DEIECTIO ALVI] Deiectionem hinc ponit alui, vel potius aluum deiectioni appositum, quam absolutè simpliciterque posuit in prognostico, religione ductus fortasse distinctionis: quod sciret ἡ διαχωρησις, solius alui non esset, vt in illo. Τὰν προφόντων αἰσθῶς καὶ ταχῶς ταχίαι καὶ αἱ διαχωρήσεις γίνονται. i. Eorum quæ confertim & celeriter nutriunt; celeres quoque sunt deiectiones. Vbi non est dubium quin nomen illud τῆς διαχωρήσεως, illic ponatur αἰσθῶς τῆς αἰσθῶσεως: sicut eidem visum est, quando scripsit, τὰ εὐδαμονόματα εὐαδμόματα, i. quæ alterantur ex facili, sic etiam facile absumuntur. Et verò Galeni iudicium est in commentario ad aph.

rio ad aph. prædictum, τὸν δὲ διαχωρῶν, tametsi de alio transmissa ferè dicatur: tamen de aliis quoque dici excretionibus. Quod non admittit ἡ διαχωρῶν, quæ soli alio transmissa semper tribuntur. Testis est illa sententia præceptoris. Ἐπεὶ χωρῶντα μίχεται, οὕτως αἶμα μίχεται. i. Deiectiones nigra, qualis est sanguis niger. Ergo. aph. 22. 4. DEIECTIO ALVI] Quæ sponte fertur aluus, non coacta, nec ægrè, vt se exoneret facibus rerum earum quæ assumuntur, ope adiuta fibrarum in quibus vis est circummagendi fæces atque ciendi peristaltico motu intestinorum proprio, donec transmissæ fuerint & exclusæ. Quòd autem hîc nomen sit τῆς κατὰ κινήσεως, non autem τῆς αἰσῆς, quæ est thoracis; nemo est omnium quæ nescire persuasum habeam.

EST OPTIMA] Numeris omnibus absoluta. Sic autem est optima deiectio mox describenda, cum vel redintegratio est functionum alui de statu naturæ incolumi egressarum, vel vniuersi corporis à febre sanatio: quoniam in ea lucet naturalis œconomiz integritas restituta in digerendo, coquendo, & excernendo. Nec verò minus adiicitur periculosa febris periculo, de prauis deiectionibus, quàm de vrinis prauis. Scitum est illud. Κακὴν τὰς αἰσῆς, ἢ τῆς αἰσῆς σύγκρισις, καὶ ἢ τῆς αἰσῆς ἀκαταρσία. i. Ventris segnicies; omnium confusio, vasorumque impuritas. Optimæ autem deiectionis hæc sunt indicia syllogistica sine τῶν μίχεται. i. Scilicet tacta subsidit, neque circumfluit, media inter duram & liquidam: quarum illa siccioris est alui; hæc verò humidioris, quæ vel diarrhœa; vel impotentia coquendi ea quæ assumuntur, continendive humescit. Sed mollitudo signum est alui constitutæ vt decet, tam in calore suauis, non igneo, nec effæcto; quàm in firma & solida complexione partium aluinarum.

COAGMENTATA] Figurata dici reperio apud Celsum, qui eam coagmentationem, molliter & naturaliter constitutam, visus est expressisse, dictionis ancupio quam sic præceptor posuit inter signa hydropis sanabilis. Τὸν δὲ κατὰ τὴν φύσιν μίχεται, οὕτως αἶμα μίχεται. ἢ τῆς αἰσῆς ἀκαταρσία. i. Aluum morigeram esse decet, ac citò ferri; cum datur opera purgationi: alias autem, ducatur mollibus excrementis & figuratur. Sed figuratæ deiectionis absurda est vsurpatio ad laudem illius, si mollitudo absit. Quod pleriq; faciunt medicinæ ignari, qui duras & pilulatas, vt ita dicam, more caprilli stercoreis deiectiones, eo commendant nomine, quòd figuratæ sint: quarum incommoda de siccitate alui, cum pari æstu coniuncta, suo dicentur loco. Sed ad rem. Est igitur deiectio molliter coagmentata, quæ suo termino continetur, non alieno; ac suis, vt ita dicam, limitibus est compressa: qualis est vaccini stercoreis coagmentatio: ne figuratam quis putet à tereti & rotunda intestinorum figura. Sed mollis illa coagmentatio, sicut calor est mitis ac mansueti, vegetarumque partium aluinarum: sic eo nihil omnino restantur confluere, quod ipsis facessat negotium in opere faciundo, aluûmque præcipit in transmittendo.

S V B R V F A] Quæ colorata est mixtione bilis, pituita permixtæ, ab hepate confluentis in aluum, ne pigra sit in excernendo; estque quodammodo vice clysteris, ad ἀντιπαρῶν διώματιν intestinorum ciendam supernè deorsum; neque committit vt eadem intestina motu peristaltico, naturali contrario, sursum infernè moueant quæ infrà sunt transmittenda. Ex quo efficitur, deiectionem subrufam sic naturaliter colorari à bile subrufa quæ moderata est qualitate, & quantitate pauca. Nam rufa aut fulua deiectio: (nihil interest vtrum dicatur) in vitio est de bile immodica vnde fucantur fæces, atque id signo hepatis æstu incandescentis. Sic enim facies fului sunt atque capillis Scythæ: ob eam sanè causam quòd, vt Hippocrati visum est, τὸν δὲ πυρετὸς ἢ κακὸς οὖτος ἐπιτελεσθῆναι, καὶ γίνεσθαι πυρετὸν, i. alba cutis à frigore peruratur, & fulua euadat. Ergo descripta coloratio deiectionis, multum ipsius adiicit bonitati, facitque vt optima iure dicatur, cum ita mollis est & coagmentata, vt modò diximus. Non sic res eunt deiectionis albæ ictericorum & phreniticorum: tametsi bona est eius coagmentatio & mollitudo: sed ne id quidem fieri posse arbitror; & vt concedam sic esse: qui tamen phreniticus cum deiectione alba euaserit, Hippocrates vidit neminem. Nulla est igitur firmior indicatio deiectionis optimæ, quàm de ipsius colore hîc posito, quem ab Hippocrate prætermisum fuisse vbi deiectio optima recensetur, iure hoc loco miratur Galenus; censetque illud prognosticum de subrufo colore, cum primo illius tractatus ponendum, vbi notarum deiectionis optimæ recensio continetur: alioqui mancam videri & imperfectam descriptionem quam prius ille probauerat. Hîc certè Galeni iudicium libens amplector: sed inconstantiam hominis fortiter opposuerim τῇ αὐτῇ κακὴν ἡν in hæc prognoses, ex quibus retexit illud prognosticum quod erat mancum, & hanc prognosin vt absolutam, pro illo reposuit: quòd ea, vt idem ait, contineat notas omnes deiectionis optimæ in consistentiâ, qualitate, copia, tempore, & excernendi modo.

NEC VALDE GRÆVEOLENS] i. Minimum fædi odoris. Nam fædus odor, est κακὸς οὖτος, quod à putredine natum, signo & causa malum est. Accidit autem illa putredo, fædi odoris parens, tum ex cacochylia rerum earum quæ assumuntur, tum ex calore igneo corruptente, tum à quiete intestinorum quæ pigra sunt in excernendo; vel cum exoluta vis est ipsorum peristaltica; vel cum à bile non præstantur ad egerendum. Sed tamen, vt liberè dicam; hîc fædi odoris nulla occasio esse potest, vbi deiectio est molliter coagmentata atque subrufa. Coagmentatio enim mollis & figurata, opinionem tollit caloris ignei corruptentis: coloratio autem subrufa, pigra esse non sinit intestina in egerendo, quæ bilis ipsa sollicitat. Nisi forte super sit cacochylia rerum earum quæ assumuntur, vnde odoris fæditas inferatur. Omnia enim διατάξεις, sunt planè κακὸν.

IPSAM VERO INFRA TRANSMITTI OPORTET] Διαχωρῶν, quo verbo, transitus significatur eorum quæ excluduntur δὲ τῶν συμφορῶν χωρεῖν, i. per loca commoda, exclusioni dicata: sed, vt iam artigi, pertinet κατὰ ἐξοχὴν, ad ventris deiectionem. Nam simplex verbum, χωρεῖν, exitus omnes conuincit excrementum: sicut est in aphorismis, τὰ χωρεῖται μὴ τὰ πλεονεκτήματα, &c.

QVA CONSVREVIT HORA] Quod est firmissimum secundæ valetudinis argumentum, ex inoffenso cursu æqualium periodorum ingerendi, digerendi, & egerendi, ex bene constituta naturali œconomia in vacuatione, suctione, & suctionis sensu. Nam vacuatio causa est suctionis; suctionio, digestionis; suctionis sensus, ingestionis. Ac bene res eunt quando sic comparata est ratio deiectionis, ut partes quæ aluntur, quoad naturaliter cõstituræ fuerint, ab eodem nutritæ alimento; æqualia quantitate, similia qualitate, ac temporis tractu eodem colligunt excrementa, & eadem periodo infra transmittunt. Talis autem consuetudo est naturaliter instituta καὶ ὁρμῶν naturæ, & καὶ παρὰ φύσιν hominum sui diligentium, ac valetudinem suam ut decet curantium.

ET REA COPIA QVÆ ASSVMPTIS RESPONDEAT] i. Pro ratione ciborum qui assumuntur, ut scilicet plenior aut parcius manu, sæpe aut rarò, hyeme vel æstate, in pueritia, iuuentute, aut senectute, consuetudo est instituendi diætæ. Ut enim de more institutòque, aut etiam contra consuetudinem, cibi sumuntur: sic maior aut minor excrementi deiciendi copia esse solet. Ex quo evenit, ut semel, bis, tervè ad summum, alius feratur; ut consuetudo est ingerendi & egerendi. Certum est autem, quòd assumendi cibi occasio commoda esse nequit, priusquam fæces pridianæ infra transmissæ fuerint. Sic enim visum est præceptorum de acutorum diætæ, & alio loco, ubi hæc scripsit. Αποπτις γὰρ τὸ πλὴν ἔσθαι καὶ παρὰ φύσιν αἰνὰ πᾶσις ἡμέρας, καὶ μὴ γὰρ ὑγιαίνει ὁ αὐθρῶπος. i. Nam pridianas fæces singulis diebus excernit qui valet, aut valere debet.

2 Παχυνέσθαι δὲ πρὸς κρίσιν.

Crassescere autem decet ad crisin.

HOC VERE quidem scriptum: sed loco minimè, nec appositè. Et verò verbum illud, παχυνέσθαι, i. crassescere, quod infinitivi est modi; cùm apponatur priori sententiæ unde ipsum dependet, verè illius subiecto accommodari nequit. Quæ enim crassitudo amplius requiri potest in optima deiectione quæ molliter est coagmentata & figurata? Sic igitur verè & appositè scopo authoris sententia hæc ponitur. In desiderio deiectionis optimæ, qualem descripsimus, profuerit aluum ferri liquidis excrementis subruffis: sed ita tamen, ut neque stridula sit, nec pauca, aut multa & frequens; sed multa & rara: nec torminosa, nec ægra deiectionio: tum ut appetente crisi, crassescat. Talis deiectionio planè id admittit quod intus lædit & magis læsurum, nec amplius illud subesse testatur. Quæ omnia sunt profectò fidæ salutis. Sed ea fiducia maior est atque firmitior, si toto morbi tempore aluum gerit ægrotus λεπιδῶς καὶ εὐχκοῦν, i. solidam, succi plenam, & molliter constitutam. Quæ cùm ita sint de scopo ac mente Hippocratis, iam ad examen prognoseos accedamus.

CRASSESCERE AUTEM DECET] Non quidem id excrementum quod siccitate obduruit, aut etiam quod iam est molliter coagmentatum & figuratum: sed humidum, quo ab initio fertur alvus in diarrhœa; ut scilicet quod antea circumfluebat ἀτυπῶν, iam fiat quodammodo τυππωμένον. Quæ figuratio posita in crassitudine circumscripta, causam agnoscit virtutem partium solidarum; quæ est ipsa natura, cuius iam incipit fieri redintegratio, quæ cernitur in excrementi pepasmo qui proprium munus est partium solidarum.

v. Epidem.

AD CRISIN] i. Ad morbi discessionem; comparata scilicet ἐπιπορεύσει partium solidarum, & excrementi pepasmo: unde crisis ipsa suscipitur atque absolvitur ad ægri salutem, ab eadem natura quam diximus esse virtutem partium solidarum. Sic enim Galeni iudicium est, ita scribentis. Διατίπτει ἡ φύσις δὲ τὸ σπέρμα πλεῖον, δυνάμει ἐκείνῃ ὅσα, &c. i. Diffusa est natura per solidas partes, virtus illarum existens.

3 Χρήσιμον δὲ καὶ ἐλμίνδας στρογγύλας ζυωξίεναι μὲν τὸ διαχωρήματος, πρὸς τὸ πλὴν κρίσιν ἰούσης τῆς νόσου.

Profuerit etiam teretes vermes una exire cum excrementis, dum morbus ad crisin progreditur.

VNDE INFRACTIO significatur morbi, & viscerum recreatio; firmissimum illud adferri potest ad ægri salutem: ut in vrina bellè colorata cum bona hypostasi, nuper ostendimus. Qualis autem vrinæ ratio est in humoribus excrementitiis venarū, ubi sunt febres, ob quam causam febrium est vrina ὀππαγνόμενον: talis est etiam deiectionum in morbis aluinis, ac cæteris omnibus quorum excrementis alui feruntur. Bene est aluo cùm figurata & mollis deiectionio est, atque subruffa. Bene est item, cùm excrementa liquida per aluum ducta crassescunt & figurantur, quæ antea circumfluebant minimè coagmentata. An non hoc satis est; nisi etiam vermes rotundi vnà exant cum excrementis, tam indigenis, quam aduenis alui? Enimvero lumbricorum nulla sunt commoda, ubi deiectionio est naturaliter constituta. Sed veniunt exoptati cùm itur de corruptione in coctionem eorum quæ assumuntur. Qualis est transitus in morbis

in morbis acutis, cum aegri periculo defunguntur, moxque morbo. Quod spectat illud Hippocratis, *χρὶς τέσσερσι τῶν τέσσερι, i. dum morbus ad crisin procedit.* Examinanda est igitur causa & ratio lumbricorum in morbis acutis, quorum infractio cernitur in lumbricis qui vna exeunt ac transmittuntur infra cum alui deiectione mitificata, ut dictum est.

Ergo. PROFVERIT ETIAM] i. Multum adiicitur commodis humidarum deiectionum quae a natura mitificatae crassescunt. Hinc salus sperabilis, etsi nondum fida spes: quoniam *ἢ εἰσιόντων ἢ πείψας, καὶ ἢ ἀπὸ πτωχῶν πιπασμῶν, i. eorum quae assumuntur, coctio; & exeuntium mitificatio vna ostenditur.*

TERETES VERMES] Lumbricos; quorum ortus & mansio est in tenuibus intestinis: ibi enim aluntur & manent ubi gignuntur. Nam lumbricorum *ἢ ἐντελέχεια* venit ab *ἐντελέχεια* excrementi chylosi, quod nusquam est nisi in ventriculo & tenuibus intestinis. Cernitur ea ratio in pueris & infantibus, quibus copia est lumbricorum, de superuacaneo chylo, ab eorum nimia edacitate.

VNA EXIRE CVM EXCREMENTIS] Non quidem cibi facibus: id enim esset satietatis: sed cum spissatis deiectionibus quae antea circumfluebant humidae; tametsi cum facibus esse possunt.

DVM MORBUS AD CRISIN PROCEEDIT] Vel cum itur ad crisin de morbi pepasmo: tum enim maior fiducia est mox affuturæ salutis, cum in eadem deiectione cernitur cibi coctio, & humoris morbifici mitificatio, cum recreata virtute partium solidarum, quae antea fractae a morbo iacebant. Cernitur cibi coctio in excremento chyloso vnde gignuntur lumbrici: nam tæniarum quae toto sunt ambitu intestinorum; & ascaridum, quae in ano carullunt, alia ratio est. Gignuntur autem lumbrici, cum excrementi chylosi putrescere incipientis, endelechia est a spiritu & calore intestinorum, sese in eam materiam insinuante. Humoris autem mitificatio siue pepasmus apparet in spissa & figurata deiectione quae antea circumfluebat termini expers proprii, ac tantum particeps alieni. Ergo profuerit vna lumbricos exire cum excrementis, dum itur ad crisin. Nam quod obiicitur ex Hippocrate; quod homo quidam qui febre correptus, liberaliter se potu & cibo inuitavit in cena; cum ei lumbricis ducta fuisset aluus die septimo, tandem vndecimo vitam finiuit: obiectionis solutio est, quod in concursu signorum omnium funestorum id accidit; tum quod eidem deiectione erat humida & torminosa, non sicut & hic, facilis & figurata de crassitudine parta coquendo. Scire autem licet, quod Aurelianus putavit lumbricis mortuis perniciem significari: sed falsò; quia vix est alibi locus viuendi lumbricis, quam in tenuibus intestinis. At simulatque in crassa descenderint, citra mors venit; nisi erethismo prorumpant: ut annotavit Hippocrates in illa prognosi. *Τὰ καρδιακά μετὰ τὸν φῶν καὶ τὴν μέλα κατὰ ῥήγνυνται.* Vide comment. ad eam. Sed Dioclis opinio est; viuis exeuntibus denunciari mortem. Herophilus autem sustinet neutros graue quippiam ominari. Apollonius & Glaucò aiunt, initio cruditatem, post appetentem crisin ostendi. Antiphanes, sine stercore malos esse defendit. Sed ita statuendum. Vermes tum viui, tum mortui, principio quidem sunt mali: nam illinc cruditas; hinc putredo ostenditur. Cum vero itur ad crisin, victrice natura; sic exeunt ut ponitur in hac prognosi.

Coac. 15. cap. 11. lib. 2.

4 *Εν ὅξέσι τὸ ἀφροδὲς πείχολον διαχώρημα κακόν. κακὸν δὲ καὶ τὸ κηλιδιον.*

40 *Spumans deiectio in acutis undique biliosa; mala: mala item praelba.*

DVO AUDIIVIMVS deiectionum genera quae fida spe nos consolantur in morbis quorum illa sunt *ἐπιφανόμενα*; vel quae adiiciunt securitati, quando sperabilis est vitæ salus de signis bonis quae cuiusque morbi sunt propria: ut in pleuritide, verbi causa, de anacatharsi qualem iam saepe supra ostendimus. Nunc audienda sunt multa malorum genera quae apparent in cæteris alui deiectionibus, quae nos ad normam earum quae adductae sunt bonae, examinabimus. Ac primum de iis dicendum quae prauis coloribus atque sita, in vitio sunt. Earum primae occurrunt biliosae, admodum saturatae viridi aut flauo colore; & omnis coloris expertes, praelbae. Quae omnes cur ita sint, & quorsum appareant; sic aggregior ad docendum.

SPVMANS DEIECTIO] i. Bullis minimis obstita quae assurgunt in superficie, tum à flatu, tum à calore contra naturam eximio. Ac biliosa quidem syncera, spumar ardore visceris vnde manat, qualem accepimus illam esse quam ciet melicratum *ἀκρατον* in biliosis. De qua sic positum est à præceptore. *Τὰ μέντοι ἀφροδὲς διαχώρημα, καὶ μᾶλλον τὸ κατὰ κατωτέρως χολάδεα, καὶ μᾶλλον δερματὶ τὸ ἀκρατον μᾶλλον τὸ ὑδαρείος ἀγνῶν.* i. Sanè spumantes deiectiones, ac magis quam decet colore saturo biliosas, magisque calidas; syncerum melicratum ciet potius quam aquosum.

3. acut.

IN ACUTIS] Quorum est bilis propria generatio, sicut iidem à bile nascuntur: de quibus hæc scripta sunt à Galeno. In acutis febribus biliosa gigni syncera per corpus; nihil est mirum.

60 MALA] Ut causa & signo. Signo quidem inualeſcentis morbi, & ad exitium conspirantis, aut certe non facile concessuri naturæ, nec medico. Hic enim duo cernuntur quae sunt grauissima; bilis eximie saturata, & spuma: quae sunt eiusmodi, ut ex ardore nata, non prius ipsum extinguere posse testentur; quam partium viuacitatem atque natium calorem extinxerit: nisi assiduo neoterismo intus & foris viscera recreentur. Atque ut breui complectar incommoda bilis hic posita; sufficit illud quod iam at-

lib. 2. cap. 4. lib. 2.

tigimus ex Hippocrate, & quod idem bili descriptæ apposuit. Huiusmodi autem deiectio sincera bilis atque spumantis, alia quoque habet mala insignia. Nam hypochondriorum ardorem non extinguit, sed magis accendit: tum anxietudinem, artuumque iactationem infert: præterea intestini & sedis ulcerifica est.

MALA ITEM PRÆALBA] Quæ non est eiusmodi de assumptorum colore, ut pulvis ex farina & lacte, tum lactis ipsius: qualem accepimus ductam fuisse cuidam Apollonio ex usu lactis caprini. Sed quæ præalba est, vacuitate omnis biliosæ tincturæ: quod ferè ictericis accidit; nonnunquam item phreniticis. De quibus est illud prorrheticum. Εἰ φρενιτικὸς λευκὴ δὲ χρώσις· κακόν. i. Phreniticis alba deiectio mala est: quoniam ex euentu talis apparet, δὲ ἀπὸ θανάτου πύρασιν ἐν τοῖς αἵματι τοῖς ἡπατι τοῖς μοῖσις, αἰσθητὰς τὸ αἷμα αὐτὸ πρὸς τὴν χολήν, i. propter inflammationem superarum hepatis partium, quæ vna cum sanguine bilem rapit. Scire autem licet, quod in hac prognosi, ἐνδοεὶς νόσος sunt posita καὶ τὸ ὅτι malarum deiectionum, colore faturo biliosarum & præalbarum. Nam illud prorrheticum, nauseam mouet Galeno, verborum confusione, ubi sententia hæc sic recensetur. Τὰ ἐν δόξαι χολώδεις ἐκλυκτα, ἀφράδεια, πειχέλα δὲ χολήματα· κακόν. Sed tamen vtriusque vitii ratio continetur in eo quod author apposuit. Αἰεὶ γὰρ τοῖσι σὶν ἡπαρ ἐπιδιδωκεν; i. An non his est dolorificum hepar?

prorrh. 13.
l. 1. r.

prorrh. 18.
l. 2. l.

5. Επὶ δὲ κακῷ καὶ τὸ ἀληπειδὲς κοπριώδες.

His peior est pultacea deiectio stercorosa.

SENSVM oppositio, mentemque scripti denudatam obscuritatis velo exponit. Plurima bile ad saturitatem tincta deiectio, est mala; peior quæ omnis est tincturæ biliosæ expers. Saltem enim cum excremento bilioso, humoris tantum abit morbifici: bilis autem quæ feces destituit, regreditur in corpus atque venas; ubi sanguinem mixtura inficit, donec febrili eum ardore accenderit. Sed à qua bilis fecernitur, omnino est duplex; diffluens vna, altera figurata. Diffluens, chylosa est: quories chylus ergastulo exclusus mesaraicarum inflammatarum, plenarum, obstructarum; effluit intestino: de qua traditur Coaca huius cap. 24. Λευκὸν τε καὶ ὕδρην μετὰ κοιλίης μετέωρον. Consistens est ac figurata quæ hic ponitur, quæque dicitur ἀληπειδὲς, i. pultacea, seu pultis similitudinem ipso colore referens; nec solum eiusmodi qualis etiam chylosa esset: sed vna quoque κοπριώδης, i. stercoracea. Talia ictERICI, obstructo vel scirrhuso iecore, deiciunt. Αληπὴν autem communiori acceptione, farina est cuiuscunque generis, inde triticea, indeque hoc ipsum quod ex ea in aqua aut lacte, cum melle, aut sine melle bullita & cocta confectum esitatur. lib. 2. de diæta, & lib. πρὸς παίδων.

6. Καρὶ τῇ τούτοις, κακόν· καὶ αἱματώδης διαχώρησις, καὶ γενεαγένει ὁρμολόγως.

Ad hac, si carus eueniat; malum: cruenta item deiectio: omnisque adeo immerita vacuatio.

QVORSVM hæc omnia sint ab authore posita; palam aperiet ipsa prognoscos explicatio. Atque imprimis constat; carum, symptoma esse grauissimum amissæ phantasie, quod inferitur cerebro admodum refrigerato. Siue autem sit verè carus, siue coma, siue νοσώτης; periculo locum esse restantur: mox adfuturæ mortis: cum iam exacta phrenitide enascuntur, quæ prius adiunctam habuit accessione deiectionis præalbæ, quam in prorrhethico narrat esse funestam, cum ei succedit νοσώτης δὲ πρὸς τὴν κρῶσιν, i. emortua facultate; vitióque portantis, non autem portati.

CRUENTA ITEM DEIECTIO] Non ea quidem quam ciet hepatis νόσος, quæ non est νοσώτης, καὶ ὅτι κατὰ γένει δέεται, i. quæ diuturna non est, nec opem requirit à medico: sed illa potius quam continenter fundit hepatis ἀπνία, qua ipsum rædet sui officij. Atque hæc nominatur à præceptore, πρὸς τὴν ἐξυδρὴν τῆς κοιλίης, i. proluuius alui prærubra. Vtraque autem cruenta deiectio, hepatica est dysenteria, ea lege distincta quæ dicta est. Hic scire licet, hepaticam dysenteriam, quæ ὡς σύμπτωμα, ἐκ λόγου τῆς φύσεως αἵ· τῆς συμπτώματος funditur, non lege naturæ; scopo eodem, prædictæ prognosi fuisse appositam, quo in prorrhethico ubi de comate agitur: quod ea non minus adiciat cari periculo nati ex phrenitide, quam vigilis comatis in phrenitidem transcentis. Quem locum iam pridem examinauimus in tractatu de comate.

OMNISQUE ADEO IMMERITA VACUATIO] i. Quæ fit, ut dixi, ὡς σύμπτωμα, ἐκ λόγου τῆς φύσεως; proptereaque non adimit quod intrus laedit: sed illud ipsum, vacationis huius accessione, magis læsum testatur: ut interim ræcam vacationis adiuncta incommoda quæ ab infirmitate orta natura, ipsam denuo infirmiore facit. Quod autem plures in vitio sunt facultates; eò res agri peiore sunt loco.

cap. 2. lib. 2.
huius operis.

Κοιλίης

7 Κοιλίης ἀπόληψις, μικρά μέλανα σπυρεώδεια πρὸς ἀνάγκην χαλῶσα· μυκτὴρ τούτοις ῥηγνύμεν· κακόν.

Cum intercepta est aluus, & quæ coacta, globulis parvis ducitur, atque nigris; velut caprarum pilulis; tum male est sanguinem profundè naribus.

QUEM AD MODUM symptomatica omnis excretio, periculosi morbi periculo adiicit, ut modò vidimus in phrenitide quam comitatur primùm præalba deiection, tum carus excipit, cui accedit proluuius alui prærubra, ex hepatis ætione. Sic vacuatio nulla, quantumvis critica, recreationem potest adferre: sed contrà ægrotum damnis augere, cum vires languent effœctæ. Atque hoc theorema catholicum est harum prognosin quas author adduxit de rubra proluvie caro adiuncta: item de narium hæmorrhagia quæ cadit in globulosas & nigras deiectiones, velut caprarum pilulas stercoraceas. Ratio autem talium deiectionum, & hæmorrhagiæ incidentis, similiter analyticals exponitur, ut cæterarum iam adductarum.

CUM INTERCEPTA EST ALVVS] i. Siccitate astricta, quod frequens est apud Hippocratem, καὶ αὐτὴν ἐξηραίνουσι, καὶ ἐξηραίνουσι: cum scilicet nihil reddit nisi coacta; & quæ redduntur, sunt dura & vi expressa. Quod vitium in excernendo, tribus de causis accidit. Ac prima quidem est digerendi vbertas de chylo accuratè confecto virtute nascenti caloris in aluo solida & robusta: vnde natura sui negligens in excrementis ducendis, quæ parca manu collecta supersunt, ipsa cunctando siccari & indurari sinir. Altera est ἡ αὐτὴ εὐκλείης ἥ ἐστὶν ἡ ἐν τῷ, i. ea quæ sursum fit reuolutio intestinorum, cum scilicet intestina suam habent φυσικὴν naturalem contrariam infernè sursum, à sedis musculo ianitore constricto & clauso. Tum enim fæces sursum transmissæ ad colum, ibi subsistunt, & indurantur aridæ; denegato exitu & excundi via quam prius ad exitum affectabant, cum esset peristole intestinorum naturaliter constituta. Sed posita astrictionis in hac prognosi, neutra est causa earum quæ dictæ sunt, quæque à frigore ortum habet aëris ambientis in aquilonia tempestate. Nota sunt illa solennia præceptoris. Αἱ δὲ καὶ ἡμέτεροι κατὰ τοὺς αἵ μὲν βορέοι κοιλίας ἐξηραίνουσιν. i. Ex quotidianis celi constitutionibus; aquilonia aluos exsiccat. Et. Ψύξις τὰ καὶ κοιλίαν στεγνώνει. i. Frigus aluum exsiccat. Nec verò aluus, quam fecit astrictiorem frigida & sicca tempestas aquilonia, fæces coacta reddit more caprarum nigras & globulosas. Nam aquilonio frigore, alui natura sunt calidissimæ, febris expertes, ac sine morbo, quem vocat Hippocrates νόσος ἐξηρῶν, i. morbum siccum; nisi aliunde incideret ut sæpe accidit. Accidit autem ut sicca sit aluus & dura, nihilque egerat nisi nigrum, caprarum more; quando, ut ait Galenus, ἢ παρὰ πνευματικὸν ὄντι, ἢ μεσεντερικόν, ἢ πρὸς τὴν κοιλίαν, ἢ ἐν τῇ ἐντρίχει, ἢ ἀπὸ τοῦ, i. cum hepar laborat vitio siccitatis atque caloris, aut mesenterium, aut aliud quippiam quod sit in ventre: puta ieiunium intestinum, aut lien.

ET QUÆ COACTA] i. Non sua sponte, ut solet naturaliter constituta, in tempore atque ordine periodorum coquendi, digerendi, & egerendi: sed proritata clystere aut balano, fæcibus vix vi ducitur.

GLOBULOSIS PARVIS ET NIGRIS, VELUT CAPRARUM PILVLIS] Quæ notæ omnes apparent in fæcibus vix vi ductis, auctore Galeno, quæ globulosæ redduntur more caprarum, aut quia diuini detinentur; aut propter ignei vim caloris. Quod si ad eam figuram nigricies quoque accesserit, igneam planè affectionem intus subesse ostendunt in corpore: ob eamque causam sunt mala. Sic autem sunt malæ, ut eius egressionis vnde veniunt, vix vlla redintegratio sperari posse videatur: sed contrà, partium diu multumque alteratarum alienatio insanabilis.

TUM MALE EST SANGVINEM PROFVNDÈ E NARIBVS] i. Sanatio nulla sperabilis ex vlla, quæ multis in morbis critica esse solet, prurptione bilis, quam morbo exhausti perferre non possunt: ac tantum abest ægrum leuari, ut opinione celerius moriatur. Scire autem licet, quod nihil bene fit vacuando, in summa virium infirmitate; cum firmiter fixa hæret infirmitatis causa.

8 Γλιγγρόν, ἀκρητόν, καὶ λευκόν διαχώρημα· φλαῦρον· φλαῦρον δὲ ἢ ὁ ἄλγος ἐξυμνωμένον, ὑποφλεγματοῦδες. πονηρόν δὲ ἢ ἐν τοῖς φλεγματώδεσιν ἐν τῇ σπλάχνῳ, ὑποπέλιον, πυώδης, μὲν χολώδες.

Glutinosa, syncera, & alba deiection; praua est: praua est item quæ multum est fermentata, subpituitosa. Pestifera autem quæ ex concretis enatat subliuida, purulenta simul & biliosa.

IN HAC prognosi recensio est siue catalogus deiectionum prauarum, quæ sunt eiusmodi, magnis incommotis ac peïssimis ægri rebus; colore, substantia, loco, & situ. Ac primum.

GLUTINOSA] i. Vix vi auulsa è fundo, vbi contumaciter adhærescit.

SYNCERA] Omni serosa humiditate vacua, & vi ardoris exhausta, nec villo permixta humore. Sic enim τὸ ἀκρητὸν dici reperio; tum per se; tum ex euentu.

ET ALBA] Non quidem pituita concretæ quantæ genuit emittitas, rerum earum vitio quæ assumpuntur: non enim pauca esset: sed vt Galenus author est, quæ gignitur πηχρῆς πηκτικῆς, ὑπὸ πυρώδους ἢ σερμίστης, ἢ μὲν κακώσεως καὶ πυρώδους, i. adipe liquefacto ab igneo quidem calore; sed non ita maligno, vt esse solet τὸ θερμὸν σερμίστον ἀδὲς, pestilentia parentis vnicus: vnde apparet alia liquefactio adipis in deiectione, idea videlicet pauci, opimi, læuis, & albi; mox autem subflauī. Accidit autem ἢ huius idea deiectionis, adipe quidem liquefacto: sed tamen qui vel incendio conflagravit; vel qui quodammodo vetustate semiputris enaserit.

PRAVA EST] Sic expressa, vel ab incendio simplici, vel cum putredine.

PRAVA EST ITEM MULTVM FERMENTATA] i. Quæ ostendit ζύμωσιν toto humoris corpore, vt in atra bile: vel quæ minutulis bullis est obrita in superficie, vt flaua spumans; quæ habet τὸ ἀφρώδες ἐπιόπισμα; sicut & æruginosa. Talium enim deiectionum indicia non minus terribilia sunt, quàm symptomata ipsa pestifera. Vt enim apparent viscerum signo; æstu incandescentium, quæ fermentata illarum deiectionis non extinguit, sed magis accendit: sic abradendo & exasperando, inflammationes & vlcera sæpe mouent intestinorum grauissima, quæ sunt ab atra bile insanabilia.

PESTIFERA AUTEM] i. Quæ nulla oppositione bonorum signorum vinci se paritur; pestiferaque signi & causæ vim habet.

QUÆ EX CONCRETIS] Græcum illud, ἐκ σφοδρώδων, consulo emendatum reposuimus ἐκ σφοδρώδων, i. ex torminosis: quoniam deiectiones hæ fermentatæ, sunt factæ torminibus dysentericis; non sicut vrinæ, quarum σφοδρώδεια suprâ vertimus, glomerata: quod σφραγισθῆναι verbum, idem sit Dioscoridi & Capironi, quod πήχυσι, i. coacti ἢ coagmentari. Locus est in prorrhético & suprâ his verbis expressus. Κινδυνώδες καὶ ἐκ σφοδρώδους, ὑποστάσιν ἔχον ὑποπύλινον. i. Periculosa etiam quæ ex glomerata, hypostasin habet sublinidam. Vbi demonstratum est, τὸ σφοδρώδες, pro tormine, non cadere in vrinam: quod proprium est alui symptomaticis, ibi demum pestiferi; cum eò progressum est vt excrementa liuida emittantur ex intestinis quæ humor efferus exulceravit, perduxitque ad νέκρωσιν. Cernitur autem hic liuor enata in deiectione, quæ non admittit hypostasin: similiter vt vrina, cuius est propria, vt visum est Capironi ad locum illum prorrhético, ex Galeno.

9 Αἷμα λαμπρὸν διαχωρεῖν· κακόν· ἄλλως τε καὶ ἐν ὁδῷ
τοῦ.

Sanguinem deiciendo clarum emitti; malum: idque cum aliis, tum si quis dolor adest.

SANGVIS emittitur deiciendo clarus & splendidus; rupta, exesa, vel aperta vena in aluo. Talis deiectionis est cruenta, non cruentata: vt esse solet aluina dysenteria quam mouet exulcerando, vel pituita putris & salsa, vel atra bilis, aut flaua syncera. Omnis autem cruenta deiectionis, pestifera est: si eam tantum exceperis quæ staret periodo, duce natura, cietur λαύρως καὶ ἰσχυρῶς καὶ πλεῖν εὐρωσάν τὴν ἥπατος, i. larga manu ἢ fortiter à forti hepatis contentione: vt in iis qui altero crure sunt mutili. Tum si exceperis hemorrhoidas conuenienter fluentes. Scirum est illud. Αἷμα αἰσθῆναι μὲν, οὐκ αἶμα αὐτὸ κακόν· κατὰ δὲ ἀσθῆναι, τὸ μὲν ὑποχωρεῖν. Cum hinc discefferis; nulla occurrat cruenta deiectionis, quæ non sit pestifera.

IDQUE CVM ALIAS] In ἀπνίᾳ hepatis, vnde πλείπλινος ἐξέρουσι, i. proluuias alui prærubra.

TVM SI QVIS DOLOR ADEST] Qualis infertur, venis mesaræi exesis: vt ipsi vidimus in Polemarcho Brissacio, cui suppressa in aluo materia quæ olim mouebat sæuam arthritin; venis exesis in mesaræo, deiectiones mouit cruentas quadriduo ante obitum.

10 Τὸ ἀφρώδες πείχρῳ διαχώρημα· φλαῦρον· καὶ ἐκ τρυφῶνται
δὲ ἐν τοῖς οὐτῶν.

Spumans deiectionis eximie biliosa, aut circumfusa bile; praua. Tum inde fiunt icterici.

SPVMÆ IDEA cernitur in humido circumfuso à spiritu flatulento. Sic enim Galeni iudicium est, vbi pompholygum siue bullarum causam recēset in vrinis bullatis. Et quamuis hæc ira sint καὶ ὑπὸ bullarum quæ in vrinis emicant: tamen καὶ ὅλα id locum habet in omni humore bullato, vbi coitio densa

tio densa minutularum bullarum, spumam edit. Nam in humore calido nulla bullarum generatio est à calore, nisi cum flatu, sine quo non est humidi circumfensio; proptereaque nec spuma. Quod superest; causa & ratio huius prognoseos repetenda & aduocanda ex ea quæ iisdem ferè lriteris, & scopo eodem scripta est 4. huius cap.

11. *Επὶ τοῖσι χολώδεσι καὶ ἀφρώδεσι ἐπαιθισμα· κακόν· μάλιστα δὲ οὐσφυῶ πεποννηκόσι καὶ ὡρενεχθέντι· ἀρα δὲ τούτοις καὶ ἀλγυμῶ;*

In biliosis cum spuma enatat efflorescens; malum: idque potissimum, si lumbi doluerint, & mens emota fuerit. Etiamne dolores in metu sunt?

OMNIS DEIECTIO graue malum subesse ostendit, cum ei naturâ iam effera, feritas maior adijcitur, ipsaque tantum abest ut morbi leuationem adferat unde manat, ut ei multum adiciat, & grauiorum malorum accessione damnis augeat. Ecce biliosa deiectio in biliosis, peior est spuma rutila quæ ab incendio viscerum efflorescit. Tum exudante cacoehymia in aluium è lumbis dolentibus; vel ea demissa è cerebro in æstu dementiæ; biliosa & spumans deiectio inde nata, non illud adimit quod intus lædit, sed illud ipsum eò magis læsurum ostendit, quod ipsa peior apparet. Postremo talis deiectio non minus calamitosa est intestinis & sedi exulcerando; quàm cerebri, lumborum, & hepatis unde venit, calamitatem ostendit. In cruditate & feritate humorum, nihil criticum esse potest: tum vacuatio nulla, doloris aut morbi leuationem est allatura, cum ea cietur καὶ πῶς ἐπιφέρειν. Verus enim opinio est; sapientum consensu pridem firmata, quod ἔστιν καὶ συμπαθεῖν, λυπικόν ἐστι καὶ ἐξ ἀρχῆς παθόν, i. Eorum quæ sympathia fiunt; nihil soluit priores morbos.

12. *Λεπτὸν ἐπαφρον διαχώρημα, ὕδατος χολῶν ἔχον ὑπόστασιν· πονηρόν.*
Tenuis valde spumans deiectio, cuius est aqueabiliosa hypostasis; praua.

ΑΤΟΥΕ ΗΙC significatio est cruditatis eximiae quam edit naturæ infractio, febris æstu incandescentis. Ac tenuis quidem, indicium est cruditatis, καὶ πῶς ἐπιφέρειν πῆψας, i. coctionis priuatione: vel de precepta occasione coquendi, vel de collapsa virtute. Sed valde spumans deiectio, spumam habet æqualem, proptereaque prægrandem & pessimam à spiritu flatulento quem in spumantis materiæ partes omnes pariter æqualiterque mouet calor febrilis. Declarat id ipsum aqueabiliosa hypostasis, quæ quidem tenuitate ipsa, cruditatis sobole, planè est aquea: sed bilioso colore, est viscerum febris calore ardentium. Aqueam verò & biliosam dixit hypostasim, pro liquida consistentia quæ à febrili calore, bilis parente, spumat & liquitur; nec ab effera virtute partium solidarum crassescit. Nam hypostasis nomen, tantum vrinis tribuitur apud Hippocratem: ut annotauit Galenus ad illud prorrheticum. Ex σφοδρόδους καὶ ὑπόστασις ἰσχυρόδους, ὑποπέλους κακὴ i. Ex concreta, hypostasis cænosa subliuida; mala. Quàm autem calamitosa sit, ne dicam funesta, tenuis & valde spumans deiectio biliosa in morbis acutis; passim docetur in Epidemiis, & in historia de Sileno, ubi tenuem & minutissimam spuma obsitam deiectionem biliosam, ἀκρη- πην nominauit, i. sinceram.

proth. 64.
c. 1. &
Coac. 10. cap.
superioris.

13. *Πονηρόν δὲ καὶ τὸ πυώδες· καὶ τὸ μύχαι αιματώδες πονηρόν, σπὺν πυρετῶ, καὶ ἄλλως.*

Praua est etiam purulenta, & sanguinis atrii deiectio: idque tum in febre; tum aliàs.

ENIM VERO prior pars huius prognoseos de purulenta deiectione, quod absolute simpliciterque praua sit; verè dici non potest. Hic certè opus est diorismo. Ac diorismus sic erit. Nam purulenta hepatica de cocto phymate aut corrupto, erit sinistra iudicii vel ancipitis: ut apparebit pus ipsum meiendo emissum. Ac cænosum quidem & foedi odoris, funestum est: quia visceris unde manat, corruptionem ostendit. At verò album, æquale, minimùmque graueolens; ancipitem habet euentum; non quidem suo pepasmo & visceris unde manat integritate: sed partium offensione, per quas non tutò infra transmittitur: quamuis non rarò eueniat ut comparato sic empyemate, multi periculo defungantur, cum in angusto spes esset à phymate crudo cauarum hepatis partium. Nec verò semper aluina deiectio purulenta, est praua, quæ finem adfert optatum crudelis dysenteriae. De qua Hippocrates ita cen-

Coac. 3. cap. 20. lib. 2.

sunt. Quibus est dysenteria seu itur ad puriforma, qui superstat humor; multum albus erit & multus. Sed illa demum prava est omnis purulenta deiection, quæ puris formam ostendat, partis corruptæ indicem unde venit. Tum ea quæ à laudabili empyemate, nobilium partium officia labefactat, quæ puri deiciendo ad sedem est transiit. Talis est illa deiection empyicorum, quorum ab ea deiectione calamitatem Hippocrates sic expressit. *Empyici à pulmone pus duci per alium; lethale.* Est autem lethale id, non semper signo pulmonis corrupti à phymate peripneumonico; sed vitio partium nutritiarum, quod à pure infertur, dum ille fertur. *Idem similiter accidit iis quibus à vulnere brachiorum in empyema mutato, purulenta sunt deiectiones.* Nam vxor Berjotij perit lienterica, cum ei brachium erysipelate occupatum; & ab empyemate purulentum atque corruptum, pus effudisset in alium. Secus est in peripneumonia quæ phyma in pus mutatum, & intra vomitum adhuc conclusum, ad purulentam & stranguitiosam perirrhæam conuertit. Similiter etiam periculosa est ab hypochondrij empyemate, puris deiection; tum per se; tum ex euentu, cuius periculum continetur in commentariis nostris ad hanc prognosin. *Abcessuum siue empyematum hypochondriacorum, lethalia sunt illa quæ pus effundunt intro.* Sed mesenterii, pancreas, & epiplo, tum hypogastrij empyema, intro conuersum, & illac deiectionum; spem vitæ admittit, quam prius iniecerat dum phyma crudum transiret in coctum. Id enim medium est inter citam crisin atque perfectam, & desperatam salutem. Lumborum à *κίρμα* quod iis intulit phyma ibi conceptum, sine præfidiis quæ sunt in manu sæpe sanatur, cum coepit fieri empyemate, purulenta fortis & longa succedit dysenteria: sed ea curatio rura non est, nec cita, nec facilis. Nunc loco se offert purulenta deiection quam mouet vlcera intestinorum: quæ quia *συνέχουσι* partis oblesæ corrumpit, vlceri multum adicit, nec illud naturæ præfidiis sinit curari, quæ posita sunt in generando ac restaurando.

1575. Iul.

1. Epid.

Coac. 8. cap. 11. lib. 2.

ET SANGVINIS ATRI DEIECTIO] Ut eo nomine non sit conscripta nec comprehensa purgatio hæmorrhoidum, sanguine atro suscepta, de qua est illud præceptum. *Κατα δὲ ἀγρόν τὸ πύλον τοῦ σπένδον.* Nam hæmorrhoides infra ducuntur sine vlla peristole intestinorum: nulla autem deiection carer peristole. Quod fit vt nulla deiection atri sanguinis, bene fiat vel ipso deiciendi modo: quia peristole intestinorum sæpe grumescit periculo ægrotantium. Sed atra bilis nulla coherere esse potest, nec grumus. Quod vt concedam, certum est tamen, grauiora mala inferri dum bilis atra exulcerat intestina, quam cum sanguis niger grumescit: qui tantum feritate bili atræ concedit; quantum; vt ita dicam, frigidum ferum candenti. Ac certe bilis atræ nulla hic mentio. Sanguinis autem nigri deiection prava est atque pestifera: quoniam insanabili vitio exolutorum viscerum hepatis & lienis, infra transmittitur, quæ tum in febre à tempestate pestifera, unde viscera ipsa liquuntur: tum alias ac sine febre, illata paulatim visceribus *ἀπνία*, cuius impressio est repentina cum ipso symptomate: sicut & causæ morbosæ alterantis inueteratio esse solet.

aph. 25. 4.

20

30

14. Καὶ τὸ ποιμίλον κατὰ κορὴς διαχώρημα. Φλαῦρον.

Varia item, saturataque deiection; prava.

QVEMADMODVM syncera omnis deiection sanguinis atri, per se ipsa ducitur vitæ exitio: sic aliorum quoque humorum, synceritate insignium, pestifera esse solet infra per sedem exclusio; quæ etsi quam illa seriùs exitiosa est, minùsque præcept exitio, quod sæpe est postridianum: tamen non minus periculum subesse ostendit. Quod spectat illud Hippocratis. *Æquè periculo locus est deiectionibus synceris & variis, atque nigris à sanguine: sed tamen hæc ocyùs; illa verò seriùs precipitant homines ad exitium.* In promptu ratio est: quia deiectiones atri sanguinis opimæ, tum liuidæ & aruginosæ fædi odoris; omnes ducuntur partim ex *ἀπνία* viscerum; partim ex iis partibus quæ liquuntur, aut sunt emortuæ. Talium autem grauiores sunt casus, magisq; funesti, quam earum quæ ab incendio, dum alterantur, nec dum, vt illæ, sunt alienatæ; synceras & varias edunt deiectiones. Sed quænam sint variæ & synceræ deiectiones, paulò post aperit idem præceptor his verbis. *Ἐστὶ δὲ τὰ πιαῦτα, ἔνσυματώδεια, καὶ χολώδεια, καὶ αἱματώδεια, καὶ πορρεώδεια, καὶ μέλαινα, ποτὶ μὲν οὖν διαχωρήματα, ποτὶ δὲ καὶ μέρος.* I. Sunt autem eiusmodi, abradentia, biliosa, cruentata, porracea, nigra; eaque partim simul deiciendo emissa; partim ipsa per se deducta ab aliis. Scire autem licet, quod harum omnium deiectionum consideratio, ineundæque huius prognoseos ratio est in iis quæ sua sponte ducuntur, non nostra, i. artificio medici dantis operam purgationi: vt visum est, præceptori. Causæ adductæ sunt alibi.

aph. 23. 4.

progn. 23. lib. 2.

aph. 21. 4.

40

50

15. Καὶ χεῖρον ὅσω φοβώτερον τῇ χροίῃ.

Ac tantò peior, quantò coloris est magis horrendi.

QVANTO humoris cuiusque maior est è natura egressio: tantò est magis colore terrificus. Vt si bilis flaua syncera eò deueniat synceritatis, vt iam appareat nigra; dubitari certè non potest, quin metu maiore exterreat medicum, signo & causâ, quam olim cum esset flaua. Ac signo quidem: quod iam ad vltima ventum sit viscerum igne ardentium, siue incendio conflagrantium. Causa autem: vitio insanabili quod

60

bili quod intestinis inferitur, dum aliis infra transmittit humorem tam effertum. Sunt enim actiores morbus bilis atræ quàm flauæ.

16 Πλὴν ἐν φαρμακείῃσιν. ἐν γὰρ πύττεισιν ἀκίνδυνον, μὴ πλῆθι ὑπερβάλλον.

10 *Secus in pharmacia. Tum enim periculo locus non est, nisi sit nimia abundantia.*

CLARA EST lectio sic recensenda. Est quidem sincera omnis deiectio prava; & eò peior, quod eius color est magis terrificus, atque imprimis niger. Hoc certè rarum est persuasumque omnibus: sed ea lege, ut sponte sua, non medici, niger hic humor deiciendo exeat. Causæ adductæ sunt. Qui autem ducitur pharmacia melanagoga, cum scilicet datur opera purgationi ad melancholiam, vel ad insaniam; καλῶς ducitur καὶ κρίσιμος: non secus atque varices & hæmorrhoides; quæ finem adferunt illorum symptomatum, conuenienter, sponte ac duce naturâ obortæ. Nam illud; τὸ μὲν καὶ τὸ ὑποχωρεῖν, quod ἀγασθὲν esse dixit Hippocrates, beneficio fit hæmorrhoidum; minimè autem deiectionum. Nulla enim, quæ sua sponte mouetur, sanguinis attri deiectio, in bonis ducenda: semper omnino pestifera est, ac cita morte non rarò funesta. Nam qui à morbo emacruerunt; cum nigra deiecerint, postridie moriuntur. Sed mirum illud, ac, penè dixerim, miraculo apponendum; quod hæmorrhœicus ater sanguis, tot commodis beat agrorum; & idem deiectus augeat multis damnis, tantumque periculo vitæ adiciat, ut cita inde mors veniat. Tum illud etiam subit mirari; quod nigra deiectio sponte ducta, periculo & maleficio est apponenda: sperabili autem salutis ac beneficio, quam mouet pharmacia conuenienter præscripta. Enimuero sanguinis attri iniussa deiectio, hepatis ἀπώλειαν denunciat; quod officij sui tradet, nec sanguini vacuando præit amplius, ut solebat, per sua περὶ κλάσματα, i. per suas propagines, quæ sunt venæ. In hæmorrhœide ius suum retinet, potens adhuc humoris atque suarum propaginum, i. venarum. Tum sanguis ater de vitio suæ stationis, mesaræo vim adfert; & è venis egressus, intestina pererrat: ubi magis corrumpitur, ipsisque suam corruptionem impertit, ut locis incommodis ubi suam φουακλεύει, quam in venis habebat, prorsus amittit. Hinc finis non fit exitus exitiosi. Hinc etiam summæ infirmitatis & corruptionis amplificatio, donec ad vltima ventum sit, & ad vitæ exitium. Sed attri sanguinis iussa deiectio per pharmaciam melanagogam, secus ab illa quæ est iniussa, excipitur bonis aegroti rebus, ut signo & causa. Nam ea perficitur viscerum ἐνρώσις, & simul adimit & expurgat id quod lædebat intus, & magis læsurum erat: præsertim si non pigro lapsu & continenter, & largiter & paucis horis, qualis est critica deiectio.

NISI SIT NIMIA ABUNDANTIA] Quæ est ὑπερβαίνεισιν: ut in vacuatione critica; ὑπερβαίνεισιν. Nam omne nimium est inimicum naturæ.

17 Καὶ τὸ ψαφαρόν μαλθακὸν ἐν πυρετῷ διαχώρημα. Φλαῦρον. Φλαῦρον δὲ καὶ τὸ ξηρόν, ψαθυρόν, ἀχλοόν· καὶ ἄλλως, καὶ ἐν κοιλίῃ κα-
θυχεῖται. μὴ δυνάων δὲ περὶ δυνάων, κτείνει.

10 *Quinetiam mollis friabilis in febre deiectio; praua est. Prava item sicca, discerpta, expers caloris: idque cum aliàs; tum verò si liquidam aluum reddit. Tum enim perimit, cum nigra prodierint.*

UT OMNIS deiectio naturaliter coagmentata, i. figurata & colorata ut decet, est optima: sic ubi abest quæ prius aderat coagmentatio; magnum subesse malum testatur; ob eamque causam est pessima. Est enim coagmentatio omnis naturaliter constituta, soboles natiui caloris atque humoris: quæ admodum eius dissipatio quæ est quodammodo frustulim discerpta; in mollitudine quidem, putredinis; in duritate autem, summi ardoris, humorem quo velut glutino coagmentata erat deiectio, ex-
haurientis. Quæ omnia cuiusmodi sint, propalam explicabit ipsum examen.

QUINETIAM MOLLIS FRIABILIS] Exemplo carniū pridianarum, & asseruando re-
nerefcentium, atque quodammodo emortuarum, propterea quæ ex facili discerptarum, quas Galli vo-
cant mortificatas. Nam ψαφαρόν, idem est quod in prothetico ψαθυρόν: ut supra iam diximus. Est autem id, referente Galeno, quando τὰ κρέα τῆς σκληρότης, καὶ ἰσχύος, καὶ διεξελύττοις, καὶ δυσμασσίης, ἐναντίας ἐστὶ δια-
κείμενα, cum scilicet carnes similiter non sunt affectæ, ut esse solent, duræ, fibrosæ, quæ nec faciliè dissoluntur,
nec faciliè item mandantur. Quarum dissimilis est caro pulmonis, quem vocat Hippocrates ψαφαρόν. Huius-
modi carnes vocantur à Græcis, τὰ ἑωλα κρέα, ut iam attigimus cum pridianas diximus. Cernuntur eius-
modi deiectiones in nucibus, pyris, & malis præmanfis, quorum firma non est, nec tenax coagmetatio:

sed quæ discerpitur siue diuellitur, deiciendo emissa. Sed id locum habet in sanis qui fructibus illis tantum vescuntur & victitant. Non ita in febre fit, ubi nulla mansorum de pomis excusatio esse debet.

ERGO. IN FEBRE] Cuius est πὲρ θερμὸν σπινθηρῶδες, quod corrumpendo dissociat atque resoluit coagmentatas & figuratas fæces, ipsasque reddit frustulatim discerptas in putri humore: similiter ut cum arena in aquam coniicitur, quæ ibi residit.

PRAVA EST] Sicut omne colliquamentum, quo nihil à febre calamitosius esse potest.

PRAVA ITEM SICCA DIVVLSA] i. Quæ antea fuit globulosa & dura, more caprarum; nunc est frustulatim diuulsa & incoibilis, vacuitate humoris quem ardor febrilis exhaustit, vel de visceribus quodammodo iam emortuis & saniosis ichor exudans dissoluit.

EXPERTS CALORIS] Sic enim rectè videmur interpretari quæ idem posuit in prorrhethico, πρὸς τὰς ἀσθενείας ὅτι τὰ διαχωρήματα παρὰ τὸν πυλῶνα, &c. tametsi Galenus eam παρὰ τὸν πυλῶνα refert ad cutim qualitate illa perceptam, visceribus æstu incandescentibus: quia scriptum est, ἐκ ἀπύρας. Sed pace viri dixerim; pertinet illud potius ad frigidam viscerum intemperiem & ἀπύρας partem febrili ardore viscera occupante, unde prius fuerat globulosa & nigra deiectio. Et verò πρὸς τὸν πυλῶνα in habitu corporis, non sunt eorum qui febre non carent, nec habent ἐκ ἀπύρας: sed eorum potius quorum est illud prorrheticum. Τὰ ἐγκαταλημμένα καύματα, πυρετὸς παρὰ τὸν πυλῶνα ἐκ ἀπύρας καίων. i. Incendia quæ supersunt in hypochondrio, perfrigerata febre ad manum in cute; malum subesse testantur. Est igitur experts caloris deiectio, quæ antea fuit καυστικὸν διαχωρήμα: similiter ut frigida expiratio ab extincto cordis calore, quæ antè fuit calida, dum cor incendio conflagrabit.

IDQUE CVM ALIAS] i. Cum semper diuulsa deiectio prava est, quæ fuerat siccitate arida, globulosa.

TVM VERO SI LIQVIDAM REDDIT ALVVM] Quod est symptoma partium morbo calido effectarum, & καυστικὰ excrementa, more caprarum parua & globulosa, ichoris quem fundunt nimia abundantia dissoluentium, & vnà mouentium diarrhoeam ex aluo quæ fuerat antè sicca, nec nisi παρὰ τὸν πυλῶνα, i. coacta ducebatur fæcibus globulosis ac duris.

TVM ENIM PERIMIT CVM NIGRA PRODIERINT] Quod est eiusmodi ac si diceret. Globulosa & dura deiectio versa in liquidam, cum illis fæcibus frustulatim discerptis, si ex ardore nimio nigra fuerit; quia nihil æquè facit corpus infirmum, nec ipsum calorem natium extinguit atque febrilis ardor, unde illa nigricies in fæcibus globulosis; tum in propinquo mors erit, cum liquida illa deiectio duram & nigram excipiet: quoniam diu ferri non potis est vllam excretionem, ne criticam quidem, cum vires languent effictæ.

18 Ὑγρὸν διαχωρήμα, καὶ ἀδρῶν, καὶ κατὰ μικρὸν κακόν. καὶ μὲν γὰρ, ἀγρευπνίλω. καὶ δὲ ἐν λείῳ τάχ' αὖ ποίησιν.

Deiectio liquida quæ multum ac sæpe mouetur, aut sæpe ac parum; malefica: hæc enim vigilias, illa autem virium exolutionem fortè intulerit.

DEIECTIO liquida etsi longè abest ab ea quæ est naturaliter coagmentata, figurata, & colorata; hæc quoque tamen bona spe recreat medicum & consolatur, si copiosè, liberè, ac rarè ducatur, crassescientibus excrementis, dum itur ad crisin; idque in aluo solida & succi plena, quam εὐνογον vocat κατὰ λαπαρῶν, i. neque contractam, neque distentam. Hæc prima lex fuit sancita de humida deiectione secundi euentus, initio huius cap. Quod si euenerit ut ea deiectio humida, sæpe ac multum, aut sæpe ac parum, semper eodem modo, eodèque liquore atque colore ducatur; quid inde sit euenturum, docetur his verbis.

DEIECTIO LIQVIDA] Siue sit ventris indigena, de impotentia coquendi aut continendi: siue illius aduena, de humore prorupto, tum è visceribus, vel è venis, totòque corporis habitu; tum ex capite ipso. Quò spectant omnia lenterica, diarrhoica, & dysenterica. Quorum incommoda quæ hic ponuntur, veniunt merito deiectionum malè euntium, non causâ ipsarum. Ergo. DEIECTIO LIQVIDA] Quæ sui semper est similis, colore, liquore, copia, & exeundi modo; nec villo crassescit pepasmo.

QVA MVLTVM AC SÆPE CIETVR] Prorupta è capite vel è visceribus atque venis, totòque corporis habitu: quamuis hæc sæpe ducatur ad crisin morborum; qualis aquosa est diarrhoea, quæ circa hydropis initia morbum exoluit; qualis est etiã quæ sanat leucophlegmatiam, ducta è venis in aluum, ut dictum est in hydropse: modò ne vires exoluat frequentia deiciendi, & nimia abundantia. Quò spectat illud præceptum; quò frequens omnis & plurima vacuatio est periculosa: quia omne nimium, naturæ est inimicum.

AVT SÆPE AC PARVM] Quæ ratio vacuandi, nunquam fit λόγῳ τῆς κρίσεως: quia nihil paucum est criticum, ut in teneismo & aluina dysenteria, ubi est crebra & irrita cupiditas egerendi; nec vllus penè finis fit deiciendi ab expressione quam facit oppressio & proratio intestini & ani.

MALEFICA] Ipso symptomate deiiciendi, quod multum periculo adiicit periculosi morbi; unde symptomatica venit deiectio.

HÆC BENIGNI VIGILIAS FORTE INTVLERIT] Tum impotentia dormiendi, vacuitate caufarum somniferarum: tum quia somnus adimitur crebra & ægra deiiciendi cupiditate. Id autem grauissimis damnis auget ægrotum. Nam somni de nocte vacuitas, cum ipsa per se morbus est; tum verò ad hoc malum illud accedit etiam; quod, vt præceptor docuit, *foris vigilia potionem & cibos, omniaque quæ assumuntur, cruda omnino reddit, & coctionis expertia.* Tum illud etiam; quod ægra & crebra deiectio, cum somni vacuitate; & ynà corpus facit infirmum, & feritatem humoribus maiorem adiungit. Hinc noua seges & vicissitudo symptomatum grauiorum.

4. de acutis

ILLA AUTEM VIRIVM EXOLVTIONEM] Quoniam diarrhœa omnis prorupta, nec iussa imperio facultatum; ab infirmitate primùm orta naturæ, ipsam denuo infirmiore facit, & ad lipothymiam præcipitat, vel potius ἐκκρίσις, præcipiti lapsu virium. Scire autem licet, quod eo spectant incommoda liquidarum deiectionum hic posita: vt cum perspecta fuerit mala earum mutatio ex coagmentatis; quantum periculi etiam symptomate ipso inferant, dum ita deiiciuntur, intelligamus, ac mente atque animo complectamur.

19 **Ενυχερον ὑποψαφαρόν διαχώρημα, ὡς ἐνυχόμενον, μὴ ἀπὸ**
20 **ρῶ· φλαῦρον. τὰ δὲ πρὸς τούτοις ῥήγεια· κύστιν, κοιλίην δὲ πηλαμβάνει· ὕδα-**
τῶδες δὲ σφόδρα διαχώρημα μὴ παυόμενον ἐν ὀξέσει κακὸν. ἢ μᾶλλον
εἰ καὶ ἀδινεύσει.

al. περὶ φλεγμῶν

Egestio subdiuulsa in multo liquore, perfrigescens, nec febre carenti; pestifera. Tum si rigores veniant; sistunt vesicam & aluum. Perliquida autem deiectio, neque quiescens in morbis acutis; mala: idque potissimum sitis expertibus.

al. perfrigescens

MALE RES eunt cum faeces duræ, globulosæ, paruæ, & nigrae transeunt in diuulsas, velut minutal quoddam; à multo liquore, quo primùm dilutæ, post modum discerpuntur in ea frustula similia minutalis. Tum enim ventum est de ventris ardore ad vltimam τῆς ἀπνίας, vnde liquuntur & emittuntur liquores, qui τὰ ἀνωτέρω δύνανται faciunt ὑποψαφάρων. Est autem grauissima pestiferaque siccitatis mutatio in ἀπνίαν, quæ fundit ichorem, vnde symptomatica omnis deiectio est; cuius incommoda modò vidimus, nata ex ipso symptomate quod multum adiicit maleficio atque periculo causæ ipsius.

ERGO. DEIECTIO SUBDIVVLSA] Cuius diuulsio est inæqualis, frustularim dispersa. Ex quo apparet τὸ ὑποψαφαρόν idem esse quod in prorrhethico ὑποψαφάρων; vt iam attigimus.

40 **IN MULTO LIQVORE**] i. Ichoris copia quam continenter fundit ventris & viscerum ἀπνία quam peperit inueteratio cæci cuiusdam ignis, humidum primigenium seu vitale principium, ipsamque adeo viuacitatem exhaurentis. Huius ichoris nimia abundantia quæ prius fuerat ἀνωτέρω δύναντος, nunc est deiectio ὑποψαφάρων; propterea quæ ipsam vocauit ἐνυχερον, i. liquore stagnatam.

PERFRIGESCENS, NEC FEBRE CARENTI] Περυψυγόμενον, iure syntaxeos, hinc deiectioni apponitur: quod tamen Galenus tribuit ægrotanti, quem nulla mouit religio solæcisimi, qua nec ipse moueor: sed tamen adductus maiore religione, non dubitavi hoc refrigerium ad excrementum referre, quod prius erat καυστικόν. Sit ita sanè, vt video placere Galeno: sed illud videor verè dicturus, refrigerij foris percepti causam non esse positam in ardore intrus accenso, sed potius in paupertate natui caloris atque viuifici nectaris quod est in corde. Sed hæc sufficiant: plura enim iam diximus.

50 **PESTIFERA**] Ipso symptomate, & causa ipsius. Ac symptomate quidem ipso quod cernitur in deiiciendi modo: vnde vel tædia vigiliarum intolerabilia, vel cita morte funesta virium exolutio, vt crebrò & multum, aut crebrò & parum aluus transmittitur. Causa autem: quia subest vitium insanabile partium quarum iam nulla sperabilis redintegratio esse potest in alienatione ipsarum quam longa & fortis intulit alteratio.

PERLIQVIDA AUTEM DEIECTIO] i. Aquosa liquore atque colore, quam alibi vocat διαχώρημα ὕδατος καὶ ῥῥα, i. deiectionem valde aquosam, vnde summa cruditas denuncietur, vt refert Galenus.

lib. 3. progn.

NEQVE QUIESCENS] i. Quæ nihil à se mutatur liquore, colore, copia, & exundi modo.

60 **IN MORBIS ACVTIS**] Quorum naturæ contraria est decolor atque tenuis: quod signum est raptæ bilis ab inflammata parte connexa & supera hepatis, vel bilis eiusdem concitatur sursum ad caput, quæ ibi mouet inflammationem phreniticam, vnde non rarò præalba est phreniticorum deiectio. Tum illa deiectio tenuitatis aquosæ in morbis acutis quæ non crassescit, ac similis manet sui; cruditate illa, collapsam ostendit facultatem coquendi; propterea quæ spem adimit omnis pepasmi: quo vno, morbi acuti, duce natura, inueniunt viam ad crisin, per criticam excretionem.

MALA] Inualecente morbo, & fatifcente natura.

ΙΔΟΥΕ ΠΟΤΙΣΣΙΜΟΙΣΙΤΙΣ ΕΡΡΕΤΙΒΥΣ.] Quibus in causa siuifera; nulla est siuifensio; non tam à partis vitio quæ potionis est appetens, quàm occupata mente: vt in phreniticis qui ab Hippocrate ἀφρονοί nominantur, à siuif expenes in fensione ipsius; non autem in causa siuifera, quæ in phreniticis eximia esse solet.

20 **ΕΞΕΡΟΥΘΟΝ ΟΥ ΦΕΥΠΛΥΣΟΝ ΔΙΑΧΩΡΗΜΑ ΦΛΑΥΘΟΝ.**

In alui proluvie, prærubra deiectio, praua.

ΗΙΕ ΕΤΙΑΜ sunt maleficia & mala signa deiectionum quæ cernuntur in proluvie saturata rubro colore. Hæc autem proluuius saturata rubro colore, signo & causa pugnat cum ea quæ modo descripta est præalba & tenuis, instar aquæ. Sed pari exitio, vtræque formidabilis.

ΕΡΓΟ. ΙΝ ΑΛΥΙ ΠΡΟΛΥΒΙΕ] Quæ venter proluitur, sicut in diarrhoea aquosa, ferturque liquidum excrementum.

ΠΡÆΡΥΒΡΑ] i. Saturata rubro colore à sanioso sanguine quem continenter fundit hepatis æstis, facitque dysenteriam hepaticam vulgò dictam, de qua iam pridem multa conscripsimus quæ nihil necesse est hîc denuo recensere. Sunt enim in promptu, patentque omnibus ad legendum, cum alibi passim, tum in cap. de dysenteria.

ΠΡΑΥΑ] Cuius quidem prauitas in signo & causa, illic expressa est; vbi iam diximus.

21 **ΦΛΑΥΘΟΝ ΔΕ ΚΥ ΤΟ ΣΦΟΔΡΑ ΧΛΩΡΟΝ, Η ΛΕΙΔΙΚΟΝ, Η ΑΦΡΩΔΕΣ, Η ΥΔΑΡΕΣ. ΚΥ ΤΟ ΜΙΚΡΟΝ Τ ΚΑΙ ΓΛΙΧΕΡΟΝ, ΚΑΙ ΛΕΙΟΝ, ΚΑΙ ΎΠΟΧΛΩΡΟΝ ΚΑΙΚΟΝ.**

Præua est etiam multum viridis: item alba, vel spumans, vel aquosa. Tum ea quæ parca & glutinosa est, vel eadem leuis atque subflaua; grane malum ostendit.

SYMPTOMATICARVM quæ hîc ponuntur deiectionum (nulla enim earum ducitur λογως quæσως) incommoda, signa, & causæ quorsum & vnde appareant atque fiant; non ita pridem sunt ad Momi lucernam examinata: vt iam fore neminem persuasum habeam qui hæc nesciuerit, cum hîc appulerit ad ea discenda quorum memoria reuouatur in hæc prognosi. Nam deiectionum viridum, albarum, spumantium, & aquosarum calamitates, penè ad nauseam sunt disputatæ ac demonstratæ. Quæ autem leguntur in altera parte huius prognoseos, sunt illæ quidem aluinæ deiectionis indigenæ ac dysentericæ, quibus ostenditur summa illius dysentericæ calamitas, quam inflammatio solet inferre partis obfessa, vel colliquatio. Vtriusque distinctio nuper adducta est; illius quidem, in pauca & glutinosa; huius vero, in pauca opima, leui, subflaua, & alba.

22 **ΚΑΙ ΤΟ ΚΩΜΑΤΩΔΕΣ ΙΝΩΘΡΟΥ ΜΕΛΟΥΣΙΝ ΥΓΕΡΟΝ ΔΙΑΧΩΡΗΜΑ ΚΑΙΚΟΝ.**

Ac liquida quidem deiectio veteriosis iacentibus; pessima esse solet.

ΙΛΛΑ ΔΕ ΜΥΜ deiectio periculosè habet ægrotum, ne dicam mortiferè, quæ aquosa fuit ex aluo in veteriosis, eo iacendi habitu collocatis vt dilabantur subinde ad pedes: nam eo sensu apponitur κωματώδες ινωθρευμένοισιν. vt planum faciet ipsum examen.

ΑC LIQVIDA QVIDEM DEIECTIO] i. Aquosa, soboles cruditis eximie; de facultate collapsa coquedi, à vitio partiū naturalis œconomie, quæ digerèdo, coquèdo, & excernèdo absoluitur.

VETERIOSIS] i. Somno sepultis; vel quibus est inclinatio veteriosa in somnum, quæ cernitur in conniuentia palpebrarum inuita, quam peperit exolutio; non autem oppressio simplex, aut mixta; ex pari magisterio pituitæ & bilis, vnde sunt κωματώδες ἀγρυπνέοντες.

VETERIOSIS IACENTIBVS] Νωθρευμένοις, i. iacentibus tanquam emortuïs: id enim iacere est patièdo; non autem decumbere; in quo agendi vis lucet. Cernitur autem potissimum ille iacendi habitus, omni sublata vi decumbendi, in iis qui dilabantur subinde ad pedes, præ impotentia decumbendi; non tam portati corporis plumbea grauitate, quàm vitio facultatis effectæ, ipsum portare amplius non valentis. Tamen si enim verbum, νωθρευέσθαι; & ipsa νωθρότης; de pigro corpore in mouèdo à plumbea grauitate quæ facultati vix morem gerit, non minùs dicatur, quàm de mouendi facultate effectæ: hîc tamen cōiuncta cum cōmate & alui profluvio, tribuenda potiùs exolutio corpori, quàm oppressio. Et verò cōmatosis & pigris à pondere & oppressione, profuerit aluum ferri liquidis excrementis. Hîc autem secus, vbi νωθρότης & κώμα veniunt ab exolutione, quorum periculis multum apponitur ex diarrhoea, quæ ab infirmitate orta nature, ipsam denuo infirmiore facit, donec ad vltima ventum sit. Hoc spectat autem prognosis, vt quisque intelligat tum in angusto spem esse, cum illa duo præsidia sunt collapsa, nutriticus & motus.



10 IOANNES DVRETVS,
LVDOVICI FIL.
LECTORIBVS S.

20 **P**AVCAS, quæ de tot supersunt, Coacas prognoses, prærepti morte parentis mei stylo non excultas, quod à me elaborari posse desperarem; dolebam profecto, & ægre ferebam; hoc opus tam alacriter susceptum, tam acriter & laboriosè perductum & affectum, perfici tandem minimè potuisse. Sed illam tamen aut sustulit aut lenauit aegritudinem meam, quorundam honestissimorum hominum studiosa & diligens opera, quorum è scriptis mecum benignè communicatis, partem eorum aliquam excipere potui, quæ author in has easdem prognoses optimè sibi meditata, publicè olim differebat. Quod quidem videre mihi si datum maturius fuisset; quem sententiis sermonem; & verbis ordinem, ex enarrantis ore manus tardior seruare non potuit, accuratius longè restituissem. At enimvero in re plus a quo difficili, facultatem agendi gnauiter, quæ ocium denegabant, negocia ademere. Ad rem verbis meis subornandam cum accessi, excudebatur pagina huius operis tricesima supra quadringentas, 13. Cal. Decembr. 1587. quo tempore, etsi subducebam me sponte oneri profitendi grauissimo; assiduus tamen scripta parentis mei, priusquam transcriptori, indeque typographo committuntur, cognoscendi & recognoscendi labor (ut interim agrotos taceam) improbè adeo urgere me non destitit, ut parum admodum spacij ad cogitandum reliquerit. Fore igitur ut huic vos necessitati ac festinationi veniam errorum, vel atati detis; spem habeo in vestra aequitate & humanitate certissimam.

30 23 ΘΑΝΑΤΩΔΕΣ δὲ, αἱμορροεὶν αἱματώδες πολὺ σφοδρώδες.

Est verò, sanguineum multum grumosum fundere, lethale.

60 HVMOREM grumosum, seu concreſcendo conglobatum ac veluti coagularum qui posuit; corruptum voluit. Propterea etsi grumescere, proprium est sanguinis: quia tamen à corrupto forma abest, denominandi causa & auctrix; sanguis ipsam non vsurpauit nomen: sed sanguineum maluit; αἱματώδες, terminatum similiter ut ea quæ rerum magis similitudines, quàm res ipsas repræsentant. Sanguinei isti grumi si nigrescunt, deteriores erunt, vel potiùs deterrimi: cum peior nigro sanguis non sit. Sed enim ut ne nigrescant (neque enim nigrescunt semper) adeo mali iudicantur, ut mortem intendant. Quod namque grumescat sanguis, in intestinis commorari necesse est: itaque ex alto per eorum gyros & anfractus deuolui, quod propriè est ἐς κοιλίαν ἐκχέσθαι, i. in ventrem effundi, aph. 21.6. non ex infima intestini parte, vnde celeritas delabendi, antecederet grumescendi spacium: multò quæ ex hæmorrhoidè minùs; ad quam quidquid atinet, 20. capitis lib. 2. disputatio complexa est, quæ de ipsa fuit, veluti est

Gal. ad aph.

21.6.

Idem ad

23.4.

Gal. ad aph.

24.4.

Idem ad aph.

21.6.

lib. 2. de ortu
animal.

aph. 27. 6.

hæc de deiectionibus. Nam verbum *αἱμαρρῶν*, ut sæpe alias; ita hoc loco, largitarem & copiam annotat effundendi: sic magnæ venæ *αἱμορρῶν* dictæ: sic utrinæ, Aristoteli *αἱμορρῶν*. Et hæc nimirum est copia & largitas quæ ad malum accedit per grumos significatum. Referatas grumi demonstrant, ut ex iis patet quæ comprobata sunt, mesaraicas venas; ac referandi occasionem datam esse putredine, per quam retinendi facultas amittitur. Huius vitij eo suspicio maior est, quò maior est copia effluxus, qui naturam hoc quoque nomine deficit, quæ sibi prodesse aliter non potest quàm commeatus effluvio. Quàm grande malum, sanguinem copiose effluere: si hydropicorum aquas, si empyicorum pus confertim exire est mortiferum? Non est hic tamen omnino deplorata salus, quæ retrahendo, abstergendo, putredinem corrigendo, & corroborando potest nonnunquam retineri. Quod quidem hoc anno experti sumus, dysenterijs huiusmodi non infrequente, ut nec pestilentium plerique solent.

Porto huius prædictioni non est quod opponat quisquam clausulam illam aphorismi 25. 4. *καὶ δὲ ἀγὰρ, καὶ μὴ ἀνὰ τὸν πόρον*, i. bonum est nigra duci deorsum: eum ipsa, Galeno iudice, vel de hæmorrhoidibus intelligantur quæ melancholiam sanguine nigro excluso abigunt; vel priori clausulæ (quæ sanguinem, cuiusmodi is tandem fuerat, per superiora, i. ore excerni, malum esse proposuerat,) ita opponuntur, ut satius esse iudicet, pessimum nigrum deici (etsi id in malis ducendum est) quàm omnium optimum, qui floridus est, ore, spuendo aut vomendo, reici.

24 *Λευκὸν τε καὶ ὕγρον μὲν κοιλίης μετεώρης.*

Sic album liquidum, ventre intumescente.

progn. 20. 2.
Coac. 4. hu-
lus cap.

progn. 2. lib. 2.

SUBSTITVENDVM ex antecedente, *εὐτατώδες*, i. lethale: fortassis etiam & *τὸ αἱμορρῶν*, si sic accipimus; sanguinem qui in aluenum algi effunditur, in pus esse conuersum, *αἱμορρῶν*, ex aph. iam adducto 21. 6. Ita namque album videbitur & liquidum, quod excernitur. Sic coniungebat; *καὶ τὸ αἱμορρῶν*, huius cap. *Πομπὴν δὲ καὶ τὸν πόρον*, καὶ τὸν πόρον αἱμαρρῶν. i. Malum quod purulentum: sanguineum item nigrum, malum. Sed quia salutaris est omnis, undecunque sit, puris boni & laudabilis exitus: nec cur exeunte pure, alius intumesceret, ratio vlla appareret: loco *τὸ αἱμορρῶν*, fuerit satius, *τὸ σφραγισμένον*, ex capitis instituto, reposuisse. Quod si est; vinculum aliud nullum, quò quidem cum præcedente coniungatur, hæc propositio habebit, quàm mortis ex deiectione qualicumque denuntiabit. Affirmationis autem vis istius est tota in verborum nexu minimè dissoluendo. Exempli causa, alba deiectio est contra naturam omnis: sed *αἱμορρῶν* esse potest, i. figurata, qualis *δυσπενδής*, i. *πυλταία*, quæ propria est ictericorum: hic liquida proponitur. Et liquida, ut ex natura non sit, per eandem prognosin, potest esse alia quàm alba; & alba quidem, à cerebro fieri nonnunquam ut sit, ipsa quidem longa, sed nequaquam lethalis. Iam igitur ita composito; cum alba & liquida deiectione venter intumescit atque in molem attollitur, quod est *μετεωρισμός*, illa igitur neque simplicem biliosa tinctura privationem arguit, neque cruditer ventriculi solam, neque catarrhi prolapsum; his enim descenditibus, saltem alijs subsideret, sed elabentem chylum quem inflammata tenuia intestina transitu ad hepar prohibent, dum prostrata dolent artatu rei quamvis mirissimæ. Tum attolli hypochondria non est mirum, totumque ex continuitate abdomen. Hincque versantur homines in discrimine vitæ magno, tam chyli elapsu, unde alimento priuantur quo vitam sustentent; ut illis comedisse, nulli rei nisi labori sit: quàm elabendi causa, quæ ardor est qui postquam hepatis & intestinorum calorem extinxerit, nisi mors forte præuertat, ipsorum substantiam in aquas resoluet, ad hydropis, morte peioris; generationem. Sic enim Hippocrates prænuncias hydropis posuit *διαρροίας πολλὰς καὶ νύκτας καὶ κατὰ τὸν πόρον*, i. diarrheas diuturnas per quas venter non detumescit: in quarum exponenda generatione ex causa, quæ proposuimus, cum Galeno consentiunt.

25 *Διαχώρημα μὲν οἷον αἷμα, καὶ οἷον πυρετῶν, καὶ αἷον πυρετῶν πομπόν.*

Deiectio nigra velut sanguis, cum febre, & sine febre; mala.

NIHIL EST quod adferam ad prognosticum hoc demonstratum à Galeno in libris aphorismorum, præter lumen explicandi quoddam: ut candidatis pateant quæ ipse in illius commentario, non sine attentione magna, perspexi. Ergo de quinque cõclusionibus quas super deiectionibus nigris, aphorismorum quartus extulit, in quibus hæc quoque habetur, sic statuendum animaduerti. Quæcumque sede pelluntur; illa vel intestinum, vel hæmorrhoids capiebat. Hæmorrhoidem attigit pars posterior 25: ad vacationem intestini, superiores referantur. Iam verò cum ea quæ intestino excreta nigrescunt (exceptis fecibus, excrementis alij propriis, quæ sæpe ab ardore iecoris conglobantur in similitudinem pilularum veruecinarum) omnia aut sanguis sint, aut purgamentum sanguinis: de sanguinis purgamento sunt omnes illi; de sanguine, eorum nullus: ut plus sit quod in aphorismis, quàm quod in Coacis desideres, quæ super sanguine priorem huc proxima ediderunt. Purgamentum sanguinis nigrum ut sit

10

10

30

40

5

23

—lib. H. v. s. capitis. Coaca 4. & 10. *πείχων ὁ γχώριμα*, 8. *ἀκρητιν*, 11. *ἀφρώδες ἐπὶ ἄσπασμα*, 12. *ἐπ' ἄσπρον*, 14. & 26. *κατακρητιν* damnarunt: quæ omnes eodem redeunt cum prognost. 22. & 23; lib. 2. & proth. 11. f. 2. lib. 1. Hæc autem propositio desumpta est ex protheticorum lib. 1. cuius in partis 2. particula 19. cum scriptum esset. *τὰ πλεονήματα ὑποχώριμα ἐς ἀφρώδα ἀκρητιν· παρ' ἐξωκλά*. i. A dejectionibus quæ in spumantes

*synceras desinunt; ingrauescit morbus: 17. & 18. part.: ita legitur. Οὐκ ὁμίσαις, εἰσι πύλα, καὶ ὅτι πῶς ἀπορρί-
δει· καὶ αὐτὴ φελέσσα ἐφίδησεν. αἱ ἀκρῆτοι περὶ τῶν κατὰ τοὺς, πῃ μὲν παροξύνει· τοῖσι δὲ, καὶ πῶς ἐκ τῶν, καὶ
πρὸς αἰσχυρὰ, i. Supprimuntur autem vrina, quibus rigor adest, et quibus conuulsio: sicut ei contigit quæ, cum
perhorruisset, sudatiunculam habuit. Purgationes synceræ sub finem descendentes, alicubi morbum irritant; illisque
inter reliquos; et eis maxime; vnde et parotides affurgunt. Erga quod protheticum si vr se gessit Galenus:
ita erga hanc prognosin gerere me voluero; iam sum officio functus. Sed quò plus difficultatis in pro-
posito fuerit, eò animi mei vim irritare magis decreui, vt ad facilitatem conuertatur.*

Deiectiones initio pallidæ, in febre aut citra eam, flavescent; dierum lapsu æruginosæ metæ fiunt, spumantque; intellectu est facile, ex miribus acres & efferas esse factas, ab incremento ardoris: in visceribus concepti: quomobrem exacerbatum esse morbum. Maxime autem si conuulsionis aliquid adeft; *πῖσι ἀσπερσέει*: legi posset *ἀσπρὲς δει*, i. *macilentis*, rarioris texturæ, quorum natura vergit *ὅτι τὸ χολώδες*, i. *ad biliosum*: vt intemperiei præcalidæ actas esse radices altas demonstretur, quæ vitio accedentis morbi altiores factæ, graciosum hepatis humorem absumpserunt, & exuccum dederunt. Vel melius *ἀσπρὲς δει*, vt deiectionem accipiamus omnino pro symptomatica adaucti plurimum morbi, quæ non faciat vt æger alacrius ferat morbum: sed contrâ vt magis inquiete iactetur. Legamus tamen *ἀσπερσέει*, & conuulsionem interpretemur leuem, à cerebro leuiter proritato & contracto, aut neruis similiter affectis: qualis conuulsivus motus, *ἀσπρὸς ὤσμος* dicitur, simillimus *πλῆρ*, & comatosus est familiaris, quorum cerebrum aut bilioso humore acerrimo imbuitur, aut vapore eius, infernè sursum educto, lacescit. Sic enim quero; si spumans omnis & syncera deiection, biliosas antecedentes multas excipiens, ad exacerbationem appareret cuiuscunque morbi; annon præsertim illius febris, cuius progressum esse factum à venoso ad nervosum genus, vel leuissima conuulsio declarat? præsertim si ea conuulsio manet adhuc cuiusmodi antè fuit: sic enim *ὅτι χυμὸς ὁμογύει*, adiunctam esse ostendit: secus, *μετέπειτα* argueret, i. *transitum*, dimissa priore sede. Ex quo iniquus factum viderur, habuisse ludibrio prorrheticum r. sect. 3. lib. 1. quod ita proponit. *Ὅτι κῶμα, ἐν ἀφρώδιν ἀνελγόντων πύρετος παροξύνεται ὄξυς*. i. *Quibus sopor; iis à spumante deiectione morbus exacerbatur*: nimirum si humoribus istis ducta aluo, istiusmodi sopor perseverat. Quod cuiusmodi sit, parebit magis explicando quæ sequuntur.

ATQUE EX HIS SÆPE ASSURGUNT PAROTIDES.] Primum $\pi\tau\iota\varsigma$ ἀσπιδος, quibus, ex iis qui ardent & febricitant, potissimum exoriri parotides, dictum est in prorrhethico & in Coacis supra. Tum leuiter conuulsis, si ita legi necesse est, ex propositione 6. cap. 14. lib. 2. Coac. τὰ ἀσπιδόεσσα ἐμνυρίζονται καὶ πύρρος. τὰ παρ' οὗ ἐπαίρει. i. Quæ cum febris incremento comatosi, quodammodo conuelluntur; iis assurgunt parotides. Et quoniam conuulsuos motus, comatosis familiares esse diximus; reuocemus in memoriam quæsitum fuisse, vt ratione expōsita affirmaretur. Anne parotides comatosis fluente aluo? Magna profectō copia humoris cerebrum opprimitur, cuius oppressio fluxu alui nulla ex parte leuatur & immittitur. Hic locum habet vetus illud, ὅτι ἐν ἡμυρίωντων, & παρ' οὗ, i. ex inchoata fluxione, nec perfecta; paratides: quod reliquum est humoris, in partes vicinas natura deponente, & vacationem effluxu fuscepam, decubitu perficiente: naturæ commodo an incommodo nihil dicam; ne iam pridem confirmata, hoc tempore disceptentur.

28 Τὰ δὲ ἔξωθεν ὁμόρρα, καὶ πάλιν ἐνιστάμενα ἀκρήια, κοπερ- 40
δεα· μήκος νοῦσου σημαίνει.

At quæ ex diffluentibus liquidis figurata sunt, in modum stercoreis; longitudinem morbi significant.

SUPRA expositionem doctissimi & clarissimi viri Iacobi Hollerij, nihil hic habeo novi quod adferam: si verbis hæremus prognoscos. Sic enim commentatur. In febre aut citra eam, si quantum humidi, venarum & alui excrementa diluebat, tantum profluuium vacuatur, remanente crassiore parte quæ subest (id autem factum esse indicat succedens exicca deiection, tantò minùs frequens, quantò minùs quàm antè liquida) contigit idem quod phymatis vnde tenuior pars, superstite crassa exhalauit, vt in diuturnitatem morbus pertrahatur. Id accidere iis qui cum aluo astricta, per longum tempus vsi sunt æstatis fructibus, quorum recrementis tum primùm exoluere se natura gessit, cum penè oppressa fatiscit: ab oppressione autem exprimitur magis per initia quod tenuius; crassamentum subsistit.

Sed nomen τῶν ἀσπληνῶν, i. syncerorum, appellat in examen deiectiones nigras, paruas, veruecinarum
 similes, quæ siue omnium primæ, siue superaduenientes liquidis, aluinorum viscerum ardorem celare
 non possunt: nec igitur magnitudinem morbi dissimulare, si præsertim adiunctam febrem habuerit.
 Audiamus loquentem Galenum. σπυρῆθος appellant deiectiones caprarum. Sunt autem sicca illa rotunda, figu-
 ra sua quæque et propria circumscripta. His similiter sicca et circumscripta si quis excreuerit, σπυρῆθος dicitur ex-
 creuisse. Porro euadunt huiusmodi, suppressæ diutius, et propter caloris vim ignei. Sed si nigra insuper fuerint, ardo-
 rem ostendūt in visceribus mediis accensum: atque idcirco sunt prauæ. Et paulo post, ubi quàm prauæ sint, decla-
 rat. Qui sic exsiccati fuerint, ut hæ ferunt deiectiones pilulæ, illi neque rigore, neque alui solutionem, neque parati-
 das magnas, neque alium quemuis decubitus suo commodo ferre possunt: i. nullo abscessu, nulloque in vniuer-
 sum modo iuari.

29. Τὸ δὲ ξέρον ἐν πυρετῷ· ὡρανοπὴν.

Prærubra in febre deiectio; delirium.

SYMPLE, arguit: delirium autem phrenitidis; nec solum illius, sed etiam τῆς μανίης. Εξέρουρον namque accipimus, non illud δὲ ξέρον; sed de vitellina bile affara, quam quidem transfertur in cerebrum nihil necesse est ut delirium faciat, cui creandis satis est viscerum & venarum sympathia, cum ardore conflagrantium. Sunt autem hæc febris pestilentis, de quibus infra eodem proposito amplius.

30. Τὸ δὲ λευκὸν κοπρῶδες· ἰκτέρο δύσκολον.

Sed alba stercorosa; ictero difficilis.

ΚΟΠΡΑΝΑ, κοπρῶδες, deiectiones sunt puriores, ductæ in formam intestini cylindraceam; Latine *stercus*. Hac consistentia fricticis albas deiecit; duo de se ostendit: albedine, magnitudinem & cōrumaciam obstructionis ἐν τῷ χολικῷ χύματι, meatu effundente bilem in intestina; vnde ne tantillum ipsius bilis in ipsa intestina descendere permittitur, ad deiectionem flauo leniter inficiendam: consistentia autem cylindracea, siccitatem a febre ictero adiuncta & copulara. Id tamen cuiusmodi tandem fuerit, quia mortem non concludit, δύσκολον appellari meruit; minimè θανάτωδες. Quibus sit necessarium mortiferum; require ex propositione 2. cap. 26. lib. 2. quod caput de phymatis fuit.

31. Τὸ δὲ ὑγρὸν ἐν τῷ πεδίῳ λαβὸν ἐρυθρῶς.

Tum quod liquidius redditum rubet.

30 SYBAVDI, malum est ictericis: opponendo stercoroso liquidum; rubens, albo. Est enim λαβὸν ἔρως idem quod ante ἐν πεδίῳ ξέρον, argumentum exoluti hepatis, in quo inchoat exclusio bilis diffusio, per visceris imbecillitatem; a sanguine non secretæ: vnde & defædario icterica, longè proxima peior, quæ existerat a meatu obstructo.

malè fuit λαβὸν; quod ante patens meus, quàm Hollerij commentaria, viderat.

32. Αἱμορραγίαι γλίχρον διαχώρημα, μέλασι διαποικίλον κακοήδες· μάστιγα δὲ [ἐκ λευκοῖς.]

al. ἐν λευκοῖς

40 *Qui sanguinem profudere è naribus, viscida illis deiectio, nigro sparsa, maligna: maximè subalbidis.*

LIBRO SECVNDO scriptum de hæmorrhagia caput est, quo admonitum diligenter, istud ipsum nomen absolute positum, pertinere ad sanguinem effluentem naribus. Illa igitur si morbum non imminuit, periculum adauget, ut cætera omnia iudicatoria quæ non iudicant. Atqui morbum minimè imminuit, si deiectione excipitur viscida nigricante, seu nigro sparsa, quæ est, authore Galeno, ἐκ τῆς πυρρῆς παλαιᾶς καὶ ἡμισυαποξηρῆς δὲ δερματὶ σφοδρῶς καὶ κακοήτης; 1. ex adipe vetustio & semiputrido, quæm liquavit calor vehemens & malignus. Maligna ergo & malefica ipsa hæmorrhagia est. Quod sequitur. ΜΑΧΙΜΕ ΣΥΒΑΛΒΙΔΙΣ] Mente duplici constat; vel pituitosos indicans, quorum in corpore, minimè perspirabili, redundant hîc posita excrementa putria biliosa; vel, quod puto esse satius, ad eos intendens quos implacabilis sanguinis effusio reliquit exangues pallidos: ex quo effici & concludi puto, præter significationem maioris mali, periculum maius deiectionis viribus esse creatum. Quibus cumque morbo acuto vel longo, aut tromate, aut aliter extenuatis, nigra bilis siue simile quid sanguini nigro secedit; illis postridie est moriendum.

33. Εκ λευκὸν διαχώρημα ἐν πυρετῷ· οὐκ ὠφέλιμα.

60 *Præalba in febre deiectio, non est iudicij fausti.*

AVDIVIMVS decissione tricesima, quid alba deiectio statuatur de ictericis: quid de febricitantibus in uniuersum concludatur, hæc prædictio adducit. Malè suo nomine illis esse, quæ contra naturam appareat & morbi, & ægri. Est verò eiusmodi, biliosa tincturæ expers: translata ad cerebrum bile; vel in

venis suppressa: quorum hoc mirius, vnam obstructionis cōrumacissimæ querelam relinquit, vnde novus putredinis febriferæ fomes: illud grauius, non tam phrenitide aut consecrata aut comite timendum, quàm febrilis ardoris inextinguibili vehementia expauescendum, quæ omnia sursum violenter rapir, quibus subductis ad salutem recuperandam opus fuit.

34 Κοιλίη παρεχώδης σμικρῇσι πυκνῇσιν δυνάσεσι. (σηρόνας ἐντέ-
 rei. λυγρὰ δὲ καὶ ἰσχυρὰ πρὸς ἡσυχίαν.) [Ἐξανθημάτα.]

Sic perturbata aluus, ut pauca sapissime subducatur, distendit buccas: delet autem faciei exanthemata, vel, sistitur autem faciei exanthematibus.

QVID TINNIAT VERBUM παρεχώδης κοιλίης; si aphorismo tantum 2. lib. 1. explicatum Galenus reliquisset, non alibi sapere; dicerem pluribus. Contentus ero verbis positis. ALVI PERTURBATA QUÆ PAUCA EGERIT SAPISSIME. Qui egerendi vitiosus est modus, siue intestina mucro abraduntur, siue humore æruginoso vruntur; à tantillo proinde ad excernendum sollicitata & coacta. 20 Pauca igitur sic sæpe excerni, præter malum quod conceptum ostendit, illud producit etiam; quod vires vigiliis & exurgendi molestia frangit, corpus denique extenuat: cuius quidem extenuati signa omnium maxima in facie conspicua dantur: inter cætera contractis buccis quas (παρὰ) vocat, Gallicè les ionès creuses: vt hic ad propositum nihil faciat, cutis laxitas vel corrugatio, ab extenuatione inchoata aut perfecta. Annon eò referendum putamus prognosticum 14. lib. 2. quod deiectionem verat μήτε πυκνὸν πῖν, καὶ κατ' ὀλίγον. κατὰ γὰρ ὁ αἰσθητὴς ἔστω ἡμῶν ἐξ ἀνασφάλης ἀρχὴν αἰ, i. frequentem esse et paucam (nam copiosa frequens de lipothymia, vt pessima metuitur:) propterea quod in crebro exurgendi labore vigilandum ægro est.

Iam verborum prognosin claudentium, quemadmodum interpretationem duplicem institui: sic duplicem enarrationem dabo quæ vtrinque subsistat. DELET, inquam, HOC ALVI PROFIV- 30 VIVUM, FACIEI EXANTHEMATA: subducta vnde assurgunt & incrementum capiunt, materia. Aristoteles ait, mulierum facies menstrualium vt decet, nec maculari, nec verrucis fœdari, lib. 3. hist. animal. λειοτέρως ἔστω καὶ ἀγλαότερας, i. politas, laues, illustres. Hippocrates lib. 2. de diata, causas in medium adducit faciei, ab exercitatione matutina quæ aluum deiecit, nitidioris & splendidioris factæ, εὐαγίας. Όταν κεραδῆ ἡ κοιλίη, ἔλκε ἐς ἐαυτὴν ὅτι πῶς ἔστω, καὶ τῆς κεφαλῆς, τὸ ὕψος, θερμὴ εἶσσι. κεραμένη δὲ τῆς κεφαλῆς, ἀποκαθαίρεται ἡ πύξις, καὶ ἡ ἀκαθία, καὶ γίνονται εὐαγίαι αἰσθητῶσι. i. Exinanita aluus, humorem ex reliquo quidem corpore vniuerso, ex capite autem præferim, ad sese attrahit, cum incaluit. Vacatione autem capitis expurgantur tum oculi, tum aures: ipsa autem facies clarior fit ac nitidior.

Vel (vtrumque enim Græca dictio per amphibologiam admittit) SISTITUR AUTEM EXANTHEMATIBVS] Vel potius sisti per ea declaratur, velut argumento humoris sursum auocari, & 40 retrahi incipientis. His analogum fuit illud. surditas in febre aluum sistit.

Coac 3. cap. 3. lib. 2.

35 Κοπρῶδης μὲν τὸν διαχώρησις· κοιλίης πορνείω σημαίνει.

Stercorosa cum tensione deiectio; laborem alui denunciat.

EIVSDEM esse tensio intelligitur, cuius πορνείη ponitur; ponitur autem τῆς κοιλίης, i. alui, seu vastitatis illius quæ ensiformi cartilagine, pubisque ossis, & non his costis circumscribitur; & cum aliis quibusdam, tum ex magna parte intestinis oppletur, quorum liquidior subductio, πορνείη vocata est, vnde πορνείω verbum, eiusdem cum τῆς καθυστερήσεως significari. Ergo capacitas illa abdomine tegitur, cuius si distentio fuerit, eaque simplex, cuiusmodi animo capitur ea in qua neque scirrhi, neque inflammationis mentio vlla auditur; etsi tum stercorosa, siue duriuscula, eaque pauca egeruntur: diarrhoeam tamen affuturam expectamus, distentionis molestæ leuamento. Hypochondriorum dolores, tumores ve, re- 50 cens obortos, inflammatione carentes, borborygmus tollit auditus sub hypochondrio: maximèque si cum stercore, vrina, et flatu abierit: prognosi 25. lib. 2. progn. & Coaca 11. cap. 11. lib. 2. Neque ab his aliena fuit species Coacæ 164. lib. 1. Κοιλίης ἐμφυσμένης, μετὰ δυνάμει· τούτοις κοιλίαν καθυστεροῦται. i. Aluo inflata, pauca reddente: & paulò post; his alui profusè feruntur.

36 Φλεγματώδης δὲ ὀξείως, μὲν καρδιωγμῶ· δυσεντερίω. τάχα δὲ καὶ ὀσφυαλγίω.

At pituitosa facta protinus, cum pectoris morfu; dysenteriam: fortè & lumborum dolorem.

PRODICO, Hippocratis magistro, in more loquēdi fuit, flauam bilem & æstuantem humorem omnem, appellare φλέγμα, ὅθεν τὸ πφλέχθαι: author Galenus lib. de facultatibus naturalib. Græcorum quibuldam eadem religio fuit, ne humorem frigidum, pituitam, ardoris nomine donarent, quod est φλέγμα: sicut Aristoteli vsu venisse comperi, qui frigidam humidam portionem sanguinis, ἰχθὺς dixit; quod autem crassum atque viscidum, βλέτας; ἢ μύζαν: lib. 3. hist. animal. Contrariam tamen sententiam maior pars secuta est, atque in consuetudinem recepit, ut φλέγμα esset vnum ex congenitis & congeneratibus humidis, à sanguine, & bile vtraque quartum. In his Hippocrates fuit, in eo, ut in aliis pluribus, à præceptore discedens: lib. de hominis natura. Excidit ei tamen nonnunquam, ut φλέγμα haberet καύματος loco & sensu, ut Galenus ad secundum prognostici annotauit: obseruauimus ipsi semel atque iterum in ἐλ παρῶν lib. vbi; ne alia conlecter, πρὸς σήσιμα; καὶ ταφίς: κόμιστα; καὶ φλεγματόδεα vocitantur, quæ lib. 2. de diæta agnita inter καυσικά fuerant. Vtroque sensu accepta propositio erit. Patet enim, compertum vsu, quod quibus cum torminibus pituitosa seu mucosa, aut contrà biliosa flaua, viridiave excrementa se produnt, dysenteriam illa secum adducunt: intestinis abradendo exulceratis, siue à pituita putri & falsa, siue à flauo humore bilioso qui tormina prius faciebat, vnâq; morsum pectori, i. tenuibus intestinis & stomacho inferebat. Idem ille humor, si non solum intestinis coeretur, sed mesenterio quoque ipso; inde vi extirpatus & auulsus, dolorem ex distentione facit lumbis, quorum è neruis mesenterium originem ducit.

37 Τοῖσι τοῖς τοῖσι κοιλίης πείσασιν πρὸς ἀνάγκην ὑγρὰ χαλῶσα, τάχον κυλλομένη· ἐχὲν πᾶσαισι μῶδες. τὸ ἐπὶ πύριον τούτοις· ὀλέθριον.

His distenta aluus quæ coacta & ægrè, liquida reddit, ocyusque intumescit; habet aliquid conuulsorium. Iisdem superrigere; mortiferum.

HVIC SIMILE quid adferebat 91. lib. 1. In diuturnis moles alui sine causa assurgens; habet aliquid conuulsificum. Cæterum ex promth. 8. f. 3. 1. πείσασιν emendo, & πείσασιν repono: & κυλλομένη per ὀγκουμένη interpretor. Sed illud ipsum, ὀγκουμένη, & illud, τάχον χαλῶσα, hîc & illic, aut in casum gignendi verto, aut ad πείσασιν conuerto. Iam propositi sensum sic accipio.

HIS I. Dysentericis; vel sanè quibus distenta est aluus cum torminibus & pectoris morfu; his, inquam, si quæ liquida biliosa vel pituitosa falsa statim apparuere, nō nisi paulatim & ægrè cum tenesmo, idque necessariò per clysterem, demittuntur; vnâque aluus magis ac magis intumescit: humoris efferi translatione facta; ad cerebrum quidem, conuulsio epileptica; ad neruolum autem genus, propriè dicta continget. Sic euenit, inquit, Aspasij filio. Ac de dysenteria quidem biliosa, quæ pituitosam cum falsilagine continet, auditum est suprâ, si intempestiuè supprimatur, vel artificio medici, vel sponte naturæ, ut hoc loco, abscissum in articulos facere: per progressum ad mesenterium ab intestinis, à mesenterio autem ad lumborum neruos qui propagantur ad femur & vltra. Sed quæ ratio dysenterie, eadè est biliosi profluij, & torminum quorum materia bilis, diarrhœam erat allatura, nisi suppressa & translata esset. Atque hæc quidem de conuulsione propriè dicta. Iam ut ipsa vtrinque suppressio & translatio, à dysenteria, inquam, & torminibus, epilepsiam afferant, videndum. Ergo si dolores circa lumbos & ilia diuturni, qui ad hypochondria prorepunt cum febre & cibi fastidio, vbi fortiter ad caput trāseunt, epileptico modo necant: cur mirum id videri debeat de obortis repentè torminibus & stomachi morfu, ac lumborum doloribus, cum intumescente aluo ab excrementis quæ statim biliosa conspecta, statim substitere? Excrementorum huiusmodi suppressio, hydrōpem facit: hydrōpis propagatio, epilepsiam.

IISDEM SUPERRIGERE; MORTIFERVM Iisdem, inquam, vel iam conuulsis; vel dysenteria aut tormine laborantibus. Nam superrigere, si rigorem indicat superuenientem; ducetur in malis, ut crisis non propria mali quod profluuium vel vomitu sanandum est: sin crebrò rigorem repeti, condemnabitur sententiis 1. libri, vbi de rigoris crebrò repetiti significatione & causis est philosophatum. Nec dubium esse debet quin ab eiusmodi rigore frustra citato, irruptio in neruos facta, conuulsionem accersat: ut antiquos interpretes Hippocratis, super conuulsione proposita rigorem causantes, Galenus iniuria reprehenderit; vtilitates frustra prætexens rigoris cuiuscunque periodici.

Nunc vide quo nexu & vinculo propositiones tres contineantur. Intumescit aluus cum deiectione stercoreosa, non magni incendij teste, sed excrementi copiosi; alui profluuium expecta. Intumescit cum biliosis mucosisve; à dysenteria verendum, si illa excerni pergunt: sin subsistant & transferantur, lethalis conuulsio expectanda; si præsertim intercidat atque interueniat rigor.

prom. 9. f. 3. 1.

Coac. 5. cap. 29. lib. 2.

ad promth. 8. f. 3. 1.

38 Οἱσι μέλανα διαχωρές ἐφιδρῶσι ψυχροῖς.

Qui nigra egerunt; frigidum illi exudant.

MENTIONEM fecit cum 32. huius cap. sectio 3. lib. 1. prorrh. nigrarum deiectionum excipientium hæmorrhagiam; 24. aph. lib. 4. earum quæ fractis iam diurnitate morbi viribus adueniunt: hic de iis refertur ad nos, qui nigra egerendi finem non faciunt, in verbo διαχωρές: quod est privilegij eiusdem cum πύρεϊ aphorif. 79. lib. 4. Generationem perpetuam vacuatio ostendit: perpetua autem generatio viscerum alienationem, quam exolutio tandem sequitur, frigido exudante nunciata.

39 Οἱσι κοιλίη κατ' ἄρχας ταρασσεται, τὰ δὲ ἔρα μικρά, παρα-
ζόντων κοιλίη μὲν ξηραίνεται, τὸ δὲ ἔρον πληθύνει λεπτόν. Τύποισιν ὁπο-
δαίσεις ἐς ἀρδρα.

Aluus initio perturbata cum paucis urinis, labentibus inde diebus facta siccior, cum urinis copiosis & crudis; abscessum in articulos praevidendum exhibet.

CUM EX more dicendi, tum ex oppositione siccioris, intelligimus aluum perturbatam esse profusam, ductam multis & liquidis excrementis. Eam procedente morbo astringi sic ut sicciora deponat, ad longinquitatem ægrotandi apparere monuit huius capitis 28. Hoc loco in considerationem urinae proferuntur, initio paucæ, quanquam alui profusio ex colluvie erat excrementorum: sed hæc nimirum vicissim fiunt: mictio noctu multa exiguum secessum habet; secessus largus mictionem paucam. Itaque etiam progressu temporis, subsistit aluus, urinae profluunt: quæ si crassiores essent, morbum, exclusa materia, abigerent (sic enim conuulsionem liberant à crassis frigidis humoribus natam:) sed existunt tennes & crudæ à repletis humore immodico venis, per cuius spissitudinem ut transcolenter, suam ipsæ deponunt. Vbi necesse est morbificam materiam vel à calore retineri, vel naturæ virtute & potentia aliò conuerti. Hic igitur futurum est, si superesse æger debeat, nec diurnitate morbi aut vehementia absumi, ut quas in partes morbifica materia inde nata recubuerit; calida quidem in aures, frigida in articulos femorum & tibiarum, abscessus fiat. Quibus urinae diu tennes & crudæ fluunt, vnaque, ad sunt cætera salutis signa; abscessum expectare decet in partes diaphragmate inferiores. Vbi Galenus illam abscessus distinctionem, pro humorum dissimilitudine quibus morbi constant, loco produxisse visus est.

progn. 34.
lib. 2.

40 Αἱ κτ' μικρὰ δύσασαίσεις ριζώδεις, καὶ οἷς φλαῦρον διαχώρημα
δυσκολώτατον, τεταρτάμοισιν ἄρχομενον.

Qui crebrò paucam ad egestionem surgendo perhorrescunt, si quidem ipsa deiectio prava fuerit; in periculo sunt sinistri indicij: præsertim si quarto die id fieri incipiat.

Coac. 34.
huius cap.
progn. 14.
lib. 2.

SI PERTURBATA aluus, pauca sepius subducatur, distendit buccas, i. extenuationem parit: quia crebrò exurgendo, vigilandum ægro est. Hæc sunt quæ superfluum redundanti copia oppressa multum natura exprimit. Quod si vitiosa insuper excrementa fuerint, tenuia, foedi odoris, glutinosa, viridia, vitellina, aut nigra; quorum tanta feritas fuerit, ut membranosa intestina vellicando, rigorem cieant, vel profectò horrorem (frustra namque est illa hypothesi, qui surgendo perhorrescunt, si quidem ipsa deiectio vitiosa fuerit: cum aliter quàm à vitiosa deiectione, perhorrescere exurgendo non possint) res est difficillimi negotij, quæ ad efferam vim morbi, magnam sic parat virium imbecillitatem. Præsertim si quarto die id fieri incipiat: quo tempore cupienda, non expectanda materiae concoctio fuit: ut res humoris impetu, non naturæ imperio regatur eo die quo quæcunque sunt, ut cæteris criticis, maximi esse solent ponderis ac momenti.

41 Αἱ πυκναὶ καὶ μικρὰ ἀναστάσεις ὑπὸ γλίστροι, [ἔχουσαι] μικρὰ κο-
 ρεφάδια μὲν ὑποχονδρίαι ἀλγέματος· ἐκ τῶν δὲ αἵματι δὴ πᾶντων ἔτοι-
 μήσονται;

Qui crebrò ad paucam egestionem surgunt, aluiusque fertur par-
 10 tim veluti viscidis, partim exiguis stercorosis, cum hypochondrij
 dolore; sunt icterici. An his illi subsistentibus, viridi colore infici-
 untur?

HIC ETIAM crebra, penèque inanis exurgendi cupiditas, certos facere nos debet de natura plu-
 rimùm oppressa. Additur hypochondrij dolor, & hypochondrij quidem dextri, quandoquidem vis
 ea est istius nominis, quoties absolurè ponitur: ut qua ex parte oppressio sit, designatum habeamus; ex
 iecore nimirum, cuius siue contumacem obstructionem, siue magnam inflammationem, bene est quod
 20 icterum putat adducere. De concepta si non φλεγμονή, saltem φλογὸς admonent excrementa stercorosa
 recocta, multòque magis quæ velut viscida simul descendunt. Sic enim à Galeno accepimus, ὅτι ὅσα ὑπὸ
 τῆς θερμότητος δημοῦται περιμένα περιλαμβάνει πᾶσι τῶν χύλων γλίστροιται, καὶ ἐξ ὧν μὲν αἵματι ἔχουσαι, i. quod quæcumque à
 calore alterantur, inter coquendum, viscida quòdammodo fiunt, cum talia ab initio non essent.

Nunc super ictero sciscitatur, an incrementa in peius capiat, & pro flauo, croceo & viridi corpus in-
 ficiat, subsistentibus istiusmodi excrementis. Cui quidem quæstioni satisfaciendum affirmando id de
 quo dubitat; siue subsistere, supprimi est; siue in alia excrementa mutari, ut pro globulenti liquidida
 chylosa, pro biliosis subrubra descendant. Namque illinc, humoris qui intestinis effluere nonnullus
 consueverat, maior per corpus restitantis diffusio: hinc alterationis cæptæ, in alienationem facta con-
 uersio. Vtrinque in causa erit, morbi iam pridem concepti noua propagatio, biliosi humoris perenne
 geniti inexhausta scarurigo. Plura legito in comment. parentis mei ad 23. Coac. cap. 11. lib. 2. quæ cum
 30 hac eadem, sic vario scopo scripta est: quod hypochondriorum causa posita illic fuit; hinc autem de
 iectionum. Cum ambabus conuenit prorrh. 54. f. 3. 1. mutatis paucis, quorum vis eadem est, ὑπὸ γλίστροι
 γλίστροι, pro ὑπὸ γλίστροι, primùm leue est discrimen. Sed duo quæ sequuntur grauiora, ad quæ mecum sic
 attendito. Pro eo namque quod explicauimus ἐκχολοῦνται, sic habet, ἐκχολοῦνται, ἀμὰ πεισμορροῦσιν, i. exol-
 uuntur, vnàque sanguinem fundunt è naribus: quod idem est ac si diceret; superueniente hæmorrhagia fa-
 nantur: iuxta Coacam illam 25. cap. 11. lib. 2. Hypochondriorum, hepatis, cordis, partiumque umbilico cir-
 cumpositarum dolores; excluso sanguine, discedunt: non excluso, interimunt. Vbi excluso sanguine, cum parente
 vertimus, extendentes διαφύσσεως nomen ad vacationem omnem, ex aph. 18. 2. Et sanè dolores istius-
 modi, ῥῆσις αἵματος διαφύσσει, καὶ πᾶσι ὡφελεί, i. sanguinis iuuat è naribus prorruio. Quod & illa etiam tuetur.
 40 Quibus cum rubore faciei, hypochondrium in febris non est molle; effluente naribus sanguine, conualescunt. Et
 illa etiam. Sanguinem ex aduersa nare fundere; malum: ut in liene magno è dextro; ac similiter in hypochondrio.
 Sed & hepatis oppressionem leuat dysenteria larga, breui conquiescens. Quid dicam de hæmorrhoi-
 dibus & mensutis? Hæc nota sunt omnibus. Quamobrem rectè idem qui nunquam quidquam malè.
 Quibus continuò in febris vacatione, hypochondrij & ventris dolor, crutum, & partium inferiorum, vnàque ven-
 ter in molem assurgit; phlebotomia exoluit. Ex quibus efficitur, ut probabilis ram sit Coacarum, quàm
 prorrheticæ lectio; vtrique sanè veritatem continens: hoc vnum intrerit, quod si illam retinemus
 prorrheticæ; ὅτις αἵματι verbum, de excrementis quidem alui accipiemus; & suppressus; ut antè, cum na-
 tura viam aliò conuerterit; & mutatis etiam: modò ne, ut illic in peius, cum dysenteria adest merè
 sanguinea.

Hoc iterum Coaca amplius prorrheticum illud attulit, quod ictero significando, dolorem lateris
 50 dolori hypochondrij adiunxit. Id verò in illa Coaca fundamentum habuit. Quibus lumborum & lateris
 dolor repens sine causa manifesta incidit; icterici sunt. At ille lateris dolor, non punctorius est, qualis pleu-
 ritidis: sed tensius, symptoma iecoris inflammati: vnde apparet neque prorrheticum redundasse, quod
 cum elocutum fuerit; neque mancā Coacam fuisse, quod siluerit.

Quæ omnia sum diligenter ita persecutus, quo lectores cautiore efficiam in adhibenda fidè Ga-
 leno, quoties de Prorrheticæ & Coacarum autoritate detrectat. Nò est, inquam, Galeno protinus cre-
 dendum, si quod prorrheticum falsum esse dixit; multò minùs mihi, si verum. Esto fidei ratio ipsa vin-
 dex. Coacas plurimas parens meus ab eius censura vindicauit; ipse quasdam superiùs defendi: nec verò
 quæ sese deinceps offerent, suo parrocinio destitutas sinam. Tantam apud me auctoritatem habet, non
 Hippocratis modò nomen, sed & eius etiam quæ ab illo profecta, illius fama floruit; Scholæ Coæ: ut
 60 veritatem putem, cum oculis hominum subiici veller, sese vtriusque & viri & scholæ chartis ac literis
 credidisse.

42 Τα δὲ ἐς ὄφρυ ἀλγέματα, ἐν τύποισι αἰμορροῦσι· αἷμα διαχω-
 ρεῖς λαμβάνειν.

Lumborum dolores, hæmorrhoidicis illis, purum sanguinem effundunt.

HOC EST signum hæmorrhagiæ criticæ iecoris dolentis & oppressi, quod ita exprimebat pro-
rheticum nuper adductum. Τὴν πρὸς τοὺς ὀστέους ἀγκύματι αἱμορροϊκῶν. i. His lumborum tensio, hæmorrhagicus est do-
lor. Est enim lumborum illa tensio ab oppressione musculorum ipsis adiacentium; oppressio autem ex
repletionem magnæ, quæ illac excurrit, venæ, in quam omnium primam redundat iecur. Vide comment.
Galenī ad proth. 37. f. 3. 1. In lumborum prægrandi dolore, cardialgia & cibi fastidia, signa sunt hæmorrhagiæ,
aut antegressæ, aut futuræ. Et quæ parens meus scripsit ad illam Coacam 2. cap. 12. lib. 2. Dolorifica in lum-
bis mala; sanguisiva. Vt autem oppressioni iecoris, lumborum distentio adsit, non contingit nisi πλεονα-
μίας, i. sanguine abundantibus (sæpe enim iecoris oppressionem facit simplex humoris biliosi aut pituitosi
si, quem exitu contumax obstructio impedit, collectio; nec quibus lumborum distentio ex repleta san-
guine est magna vena, illis protinus sanguis erumpit: visuntur plurimi eo suppresso, atque ad caput aut
laryngis partes translato interire: præditos esse oportet natura, sanguinis profusio alicui obnoxia,
quales mulieres, quales qui hæmorrhoidas habent, quales quibus familiaris narium hæmorrhagia; quos
omnes vno nomine citavit αἱμορροϊκῶν. Αἷμα κάμωσεν non est hic sanguis lucidus, siue suauerubens, siue
splendidus, nomine lucidi accipitur; sed sanguis purus: nec purus quidem, segregatus à concrezione
humoris alieni; sed purus, inquam, i. non cruentum quid, sed ipse larga copia cruor. Gallicè, *ils ten-
tent le sang tout clair.*

43 Μὲλὰ κάρη καὶ κεφαλᾷ τῆς ὀπχλιαίνεσθαι· ὁλέθριον.

44 Τὰ γλῖζα χολώδεια· μᾶλλον π τὰς δόποσας ὡς οἷς ποιεῖ.

Febricula cum comate & capitis dolore, mortifera.

Viscida biliosa, ad aurium magis abscessus prompta sunt.

SIC DVAS prognoses coniungere visum est, ut mutuò vnius ex altera sensus eliciatur; utriusque
autem, ex antecedente. Docti enim tumus, icterum à iecoris oppressione natum, accedente hæmor-
rhagia, deleri: sed illo beneficio frui, non esse icterici cuiuscunque: at eorum duntaxat quibus ex na-
turæ aut beneficio, aut præscripto, vel familiaris aliqua vacuatio sanguinis est, vel sanè facilis accessus
reliquos, si minùs copiosa & laudabili alui solutione curantur, incommoda experiri potius maxima;
exempli causa, parotidum lethaliū. Parotidas igitur illas hæc theorematata docent à bilioso viscido hu-
more aduenire potius quàm à pituitoso vel melancholico: significari autem febricula cum comate &
cephalalgia coniuncta. De humore quidem bilioso, intellectum est antè, incallescendo glutinosum
fieri: inclinatum præterea esse in parotidas, ex Galeno ad progn. 34. lib. 2.

Febriculam autem interpretati sumus τὸ ὀπχλιαίνεσθαι; quod est ὀπχλητικῶν, proth. 10. f. 2. 1. Gale-
no interprete, ἐκ οἷς καὶ θερμός; ἀλλὰ βληχρὸς πυρετός: cuius proprium est, humorem commouere ac duce-
re sursum in caput, non discutere. Inde igitur contractum coma, parotidas fundit. Comatosi enim, fasti-
diofi, hypochondrium dolentes, sæpe & parum vomentes; aurium habent abscessus. Et. Comatosi, fastidiosi, dolen-
tes hypochondrium, sputa excernentes crebra & pauca; tumorum pone aures præunci. Annon est illa. proth.
H ὅτι ἰκτεροῦ μέρους. i. Ictero supernata hebetudo? Annon & illud cap. 26. lib. 2. Coac. Τὰ ἰκτεροῦ καὶ πᾶν τι ἐπι-
δαύματα. i. Icterici inde non admodum sentientes? Est enim coma, debilitatio phantasie, sensationem cogno-
scentis rerum obiectarum.

45 Οσα; κοιλίης καὶ θυρεαγομῆνης, οἰδήματι μετεωρίζεται μετὰ
ἀλγυμάτων· κακόν.

Quicunque tumores, fluente aluo, dolenter assurgunt; mali sunt.

VICESIMA QVARTA huius ad abdomen, fluente aluo, intumescens pertinet, & hydropern
prædixit, tympanitem, ab imbecillitate intestinorum, ascitem, ab eorundem aut iecoris inflamma-
tione. Hæc decisio est phlegmonarum sypstrophicarum quæ intra vel extra concipiuntur. Quis enim ne-
scit dolorificos tumores esse phlegmonicos? Non philosophabor obscurius. Fundit alius aut cruda,
aut cruditatis expertia. Cruditatis expertis est materiæ portio, seu pridem collectæ, seu recens productæ
& genitæ quæ ad tumorem atrollendum properabat. Hic & symptomaticus tumor est; & symptoma-
tica diarrhœa; vtrumque, inquam, symptomaticum humoris efferi, impetu potius suo concitati, quàm
ducti naturæ motu. Natura enim si sua sponte res gerit, abscessum alterutrum procurabit, non vtrum-
que, & decubitu factum, & effluxu. Cruditatis autem parriceps est lienetia, soboles inflammationis
magnæ, cuius tanta vis est, ut ipsam deiecerit alui, intestinorum, & iecoris: μήτε ἐλκερῶς ἐκ τῶν πῶ ἐξ ὧν δυ-
ναμένα τὸ ἥπαρ, μήθ' αἱματωῶ. ἐπὶ δὲ ὅτε καὶ τῆς κοιλίης ἀναφύσσει αὐτῶν, i. impotente iecore alimentum attrahendi, &
in sanguinem

in sanguinem conuertendi; quod alimentum saepe hic aluus ipsa corrumpit. Loquitur autem de diarrhoea quæ pleuritidi & peripneumoniæ superaduenit. Quem aphorismum in exemplum illastre relinquam theoremaris huius vniuersi: sicut pestilentes bubones qui cum fluente liquidis, maximèque aquosis, cruditaris participibus excrementis aluo, lethales fiunt: ut vidi nuper in quodam chirurgo qui tertio sic morbi die interit.

46. Κοιλίης ἑπιστάσις, ἀλλὰ δὲ πινος μὴ νέωτερ᾽ αἰθέριος· ταχέως κατάρρηγνυται, καὶ κακοῦδέτερον.

Eandem aluum si quando suppressi contigerit, illa nisi quid noui forte superuenerit; deinceps soluetur deteriore in modum.

SI SUPPRESSA aluus quæ antè cum dolorifica ferebatur sytrophica phlegmone, coniunctam adhuc retinet vinarum cruditatem, qua permanente, excrementa crassescere non possunt ad rariorem deiectionem; nec hæmorrhagia, apoplexiæ, aut parotides, translato humore exorta fuerint; nec verò phymatis crudi facta sit in coctum mutatio: sic enim interpretor illud, ἡν δὲ πινος μὴ νέωτερ᾽ αἰθέριος: fore spera, ut deinceps illa ipsa aluus perturbata feratur: vel dante inducias labore, cuius acerbitas, quos ad partem affectam spiritus attrahebat, illis destitutam sinebar virtutem expellendi; vel ne dante quidem inducias dolore; sed excrementis, quæ suspensa ad tempus & collecta fuerant, pondere tandem veluti suo excidentibus atque excedentibus, præ retentricis potiùs imbecillitate, quàm expultricis facultate & potentia. Fluit igitur aluus, ut antè: sed in deteriore in modum: quo scilicet progressus maior in cruditate & putredine fuit.

47. Τα ἐμούρμα ἑπὶ τύποισι πονηρὰ καὶ θνητώδεια.

Ad hæc solent esse vomitus difficiles & ferini.

FERINVM est, aluo fluente vomere; tam occasione vomendi, quàm noxa cum vomendo illata. Hic enim vomendi causa, redundantia non est, quæ si non tumore exorto, certè alui profluuium imminuitur. Qualitas igitur maligna & venenata, quæ vel chymate, vel vapore suo stomachum inficit ac refouit. Talis æruginosus humor & atrabilarius, qui sulphuris in modum accensi intra venas, retro cuncta vapore & compulset & disperdit. Atque hi quidem aluum vomitus non sistant. Iam cum vomendo ea noxa infertur, quod rumpitur stomachus, cuius dolore, cordis vitalem vim dissipari non est nouum. Huius sanè prognoscos, & duarum quæ proximè antecessere, scopus est idem, apertus iis qui peste correptis interfuere.

48. Οἷσι, ἑπὶ φλογώδεσι καὶ ἑξερύθρσις λυομόροις, δυσώδες λαύρον ὑπερβουθεν· ἔλπις ἐκμανῆναι.

Quibus, in rutila & rubente facie, soluta aluo, foetidorum subrubrorum copia secedit; spes est fore ut vehementer delirent.

HANC demonstrabunt relatæ in superiores, propositiones duæ: quarum prior fuit 4. cap. 5. lib. 2. Προσώπου εὐχροία καὶ σκυθρωπότης ἐν ὀξείᾳ κακίᾳ. i. Egregie colorata facies in acutis; mala: desumpta è proth. 14. 2. 1. Προσώπου εὐχροία, καὶ τὸ λίαν σκυθρωπὸν πονηρὸν. i. Rubori faciei saturato, si caperatio frontis accedat; prauum. Vbi εὐχρωῖ interpretatur Galenus ἑξερύθρσις, cui φλογώδεις hic adiungitur; ὑπὸ θερμασίᾳ πολλῇ, i. ab ingenti calore, ait Galenus eodem locò. Quorsum autem spectet illa σκυθρωπότης, documentum Thasia mulier dementata tradidit. Altera propositio est 29. huius cap. Τὸ δὲ ἐξερύθρον ἐν πυρετῇ ὡδυσσολύ. i. Præ rubra in febre deiectio; delirium portendit. Vbi delirium explicauimus dementiæ summæ; vel à translatione profectum humoris symptomatice; vel à sympathia simplici inflammatarum venarum & artieriarum quæ à visceribus ad cerebrum ascendunt. Duo sunt igitur hic signa quæ separata delirium promittunt: multò magis si coniuncta, cum videlicet ad præparationem suscipientis causæ, i. cerebri, genarum & faciei insigni rubore testatam; magna vis affertur efficientis, i. bilis à viscerum incendio genitæ & depositæ. Propterea hanc etiam Coacam prorrheticum imitatur est, vel potiùs prorrheticum Coaca; quod regulæ iam dictæ de vultuosa facie & rubra, istam ipsam nulla interposita, subiunxit: Τὰ πλεονόντα καὶ περιμάτα ἐς ἀφρώδεια ἀκρῆτα· παραξυνώδεια. i. Malum (illud prædictum scilicet) exacerbant deiectiones spuriosæ.

49 Ο αὐχμώδης χρώς· σημαίνει κοιλὴν πονηρομυρμήν. Ἐπὶ τούτοι-
σιν, ἐξέρυθρα σαρκώπια, μάλιστα δέισι.

*Squalida cutis, ventris labem significat. His purulenta carnes præ-
rubra, ut plurimum, secedunt.*

QVANDO QUIDEM à terra indurescente situ, squaloris nomen transsumptum ad cutim est; terra autem situ indurescens, rimis multis finditur, & hiulca redditur: idem sub nomine illo intelligamus de cute. Scabra primum ea est ἀπὸ κτησιμῶ καὶ ψώρας, i. à pruritu & scabie: inde ulceratur: nonnunquam fissa, ex nulla præcedente aut scabie aut prurigne, visitur; maximè in manibus & calcaneis. Pruritus facit affluxus pituitæ putris & falsæ, qua quidem veriùs inficiuntur, quàm nutriuntur partes solidæ; cuius ut appulsus & adhesio esse possit, nulla perficitur à natura assimilatio. Hinc assurgentes quædam veluti squamulæ. Idem de atrabilario retorrído sanguine statuendum, ea crassitie prædito ut insinuari in cutim nequeat, nutriendi causa: sic illam proinde exuccam & aridam, scindi & rimosam fieri est necesse; præsertimque in manibus ac pedibus: quod eæ partes omnium primæ destituantur operâ caloris nativi, in cuius virtute posita est vitiorum sanguinis emendatio. Eandem etiam cutim contingit, affluente, nec subeunte sanguine, in tuberculos attolli; quibus apertis, sanies quædam exit, haud puri similis, sed putredini valde alienæ. Hæc illa est leproforum, elephantiorumve (nihil interest) conditio; quorum de alimento, descripto suprâ, edita sententia est; quod suam adduxit speciem atque ideam, priore inducta & oblitterata. Vitia autem sanguinis, aliunde non sunt quàm à viscerum labe, quæ τῇ κοιλῇ author est complexus: aliter hîc πονηρομυρμήν, quàm per κατὰ χεῖρας cupiens explicari. Viscera igitur, aluina quidem omnia, imprimisque autem iecur, eam ob causam per initia non opprimuntur, quod facultatibus concoctricæ & secretricæ corruptis, validam retinent expultricem, qua in corporis habitum sese fœda illa & putri colluie exonerant: donec illa etiam, ut necesse est, postremò languescente, copia obruantur, quæ flaccida iam, indigena acrimonia multò antè exedebat. Ita per profluvium abeuntis quasi per frustra hepatis, quæ purulentas appellat carnes subrubras, vivendi fit finis.

lib de alim.

50 Ἐπὶ κοιλίῳ χολώδῃ μαλακίῳ, κοπρεώδῃ· κόμαλα ἔμφα-
νέντα, ὧς οἷς ποίει.

*Biliosis liquidis ex alio primum descendantibus, post stercorosis, co-
ma superueniens, tumorem ad aures facit.*

PROXIMA huic sententia fuit prorrh. 73. f. 3. 1. Κοιλίης μαλακὰ, κοπρεώδῃ δέισις· κόμα ἐμφανὲν, ὧς οἷς αἰσθῆται. Vtrumque desiderat particulam ἔπειτα, quæ succedentia faciat liquidis sicca. Coaca autem prorrhethico melius habuit τὸ χολώδῃ: quod ad demonstrationem quantum faciat, declarant quæ sequuntur. Sic enim visum est mihi; quod quemadmodum mali urina est ominis, si ex rubra nuper, mox aquosa decolor euadit: sic aluus liquida, biliosis lata, repente indurescens. Propterea quod neque hinc, neque illinc, biliosi humoris cessans generatio: sed aliò facta translatio ostenditur. Maximè si quæ dura, liquidorum loco dantur, dant ardoris adustione notas, qualia κοπρεώδῃ, ἀκροῖτα, σπυρρεώδῃ. Biliosi autem humoris translatio fit potissimum ad caput, quod sese in glandulas quæ sunt pone aures exonerans, parotides facit: Coac. 44. huius cap. à qua aliena 27. non fuit, cum prorrh. 18. f. 3. 1. Sed parotides inde assurgere ait, comatis sæpe interuentu. Vide Coac. 5. cap. 4. lib. 2. Ex his insuper apparet huic non idem quod 28. fuisse propositi, quæ aluum posuit exsiccata, postquam liquida serosa morbi initio profudisset, non biliosa.

51 Χολώδῃα διαχωρήματα· κόφωσις παύει· κόφωσιν δὲ παύει χολώδῃς διαχώρημα.

Biliosa profluvia surditas sistit. Et surditatem tollunt profluvia biliosa.

VIDE aphorismos 28. & 60. lib. 4. tum Coacam 3. cap. 3. & 5. cap. 2. lib. 2. Quibus iungito aph. 17. 6. Lipientem, alui profluvio corripitur, bonum. Quo nempe familiari exemplo, crisi aperit symptomatum capitis omnium, à repletionem originem ducentium.

52 Τὰ ἐρπυστικά ὑπὲρ αἰώ βελῶνος, πρὸς κενεῶνα καὶ ἥλην γινόμενα· σημαίνῃ κοιλὴν πονηρομύθη.

Serpentes pustula supra bubonem, ad pubem & ilia; ventrem accusant vity.

16 QVO IN sensu 49. huius, ποτεῖλεν κοιλίης accepit, eodem hæc quoque admittit. Ερπυστικά autem leguntur, αἰτ' ὅτι ἐρπυσθέν, & eorum quidem κεχεῖν ἢ φλυκταίναν, quæ sunt phymata bilis flauæ tenuioris, quæque supra bubonem ad pubem & ilium, imò verò dorsum, pertinentia; ἡσπῆα, i. zonam exhibent, à Scribonio Largo inter sacros ignes commemoratam, cap. 62. Hanc igitur propinquam ventri, ventris labem indicare constat: quia credibile est, bilem illam venis esse exclusam eius loci cuius est in vicinia. Propinqua quæ sunt, omnium prima afficiuntur. Et, vbi sudor; ibi morbus.

aph. 34. 4.

53 Εκλιεῖς ὀδυῶν λύσει· κοιλίῳ μάλα καδυχεῖν.

20 Exolutio quæ dolorem soluit; ventrem humidiores facit.

ΕΚΛΥΣΙΣ, facultatum vitalium repentina debilitatio, qua quidem cor exiguo velut filo pendere creditur, languescente vita, Gallicè foiblesse. Illa si, cessante pulsu, lapsum quoque habet virium animalitatis; citra sudorem, λειποθυμία, λειποψύχια; cum sudore præsertim frigido, συγκοπή nominatur, Gallicè défaillance. Vide Galenum 1. ad Glauc. & comment. ad aphorif. 41. 2. vbi συγκοπήν, circumloquendo Hippocrates extulit, ἐκλύεται ἰσχυρῶς, i. vehementer exolui. Ab exolutionibus huiusmodi, dolores cessant, specie minùs tū representata effingendi virtuti per spiritus qui ad eam, tum dissipati, minimè deferuntur. Quod sponte factum naturæ, imitata ratio est, sedandis doloribus magnis, phlebotomia aut purgatione ad lipothymiam perducta. Εν ταῖς ἰσχυροῦς ὀδυῶν, ἐδὲν οἶδα μείζον βοήθημα, ὅς μὲν λειποθυμίας ἐκκινῶνται; διεκλεισμένοι, εἴτε φλεβοκομῇ, εἴτε κατὰ τρεῖς ἀχει λειποθυμίας παροσκή. Quamquam hoc non solum artificio dolor fallitur, adempto sensu: sed ipsa doloris causa tollitur vacuatione & retractione humoris dolorifici. Sed ut ad rem redeam; talis exolurio ventrem humectat: humoribus tum ad alium vndique confluentibus, cum debilitati spiritus eos non retinent, & relaxantur partium recenteres fibræ. Εν ταῖς θερμότητις πυρετῶν ἡ μὲν λειποθυμίας φλεβοκομῇ· κατὰ ψυχὴν τε παρὰ τὸν σπλῆνα τῆς ὀλῆς ἐξέως ἐράζεται, καὶ σβέννυσιν πῶν πυρετῶν. καὶ δὴ καὶ ἡ γαστήρ διεκχωρεῖ τοῖς πλείστοις, καὶ ἰσχυρῶς παροσκήται. i. In ardentissimis phlebotomia febribus, animi deliquium attingens, totum repente habitum refrigerat, febremque extinguit. Et sanè quàmplurimis eorum soluitur venter, ac sudores effluunt.

Gal. comment.
ad aph. 31. 1.Gal. comment.
eodem.

40 54 Τὰ κατ' ἐδρῳ ὀδυώδεια ἐκπυήματα· κοιλίῳ ἐνταράσσει.

Suppurationes sedis dolorifica; aluos perturbant.

ILLATA vi motui intestinorum peristaltico, per protritionem crassioris intestini, tenesmi ad instar, qui pro balano esse solet.

50 55 Θανατώδεια ὅτι τῶν διαχωρημάτων, τὸ λιπρὸν, καὶ τὸ μέλαν, καὶ τὸ πελιδνόν, μὲν δυσωδίας· καὶ τὸ χολώδες ἔχον ἐν ἑωυτῷ φακῶν ἢ ἐρεβίνθων εἶγμα· παρὰ πηλίκια.

Lethales sunt deiectiones pingues, nigra, livida; maxime si graueolentes fuerint: sed & biliosa permixta velut ramentis lentis cicerisque freforum.

60

SUPER prima prognoscæ parte, vide progn. 22. lib. 2. cum Galeni cōment. ad eam. In altera parte qua subiiciuntur similia ramentis cicerum, lentiumve freforum, seu contritorum & conquassatorum (granula scilicet albicantia;) notatur ingens superassatio facta humoris biliosi, in angustissimis

diu coerciti venæ portæ ad hepar anfractibus: quod esse nequit nisi à viscerum incendio, quo conflagrare ea necesse est; nec nisi cum interceptione chyli deducendi ad hepar: quorum ab alterutro intereundi metus, ab utroque maior.

56. Η' οἷον δέμβου αιμαλὸς διανδρῆς.

Et quod splendidum, simile est sanguineo grumo.

VIDE QUID agitem animo. Si sanguinem suauerubentem, *αἷμα*, lego; in eo fuit Coaca huius: si grumofum, 22. Omnino si sanguinem propositio norat, nihil adfert noui. Id fortasse absurdum non est, dici nunc occasione data, quod iam dictum sit prius: sed grumofus sanguis non floridus est nec lucens, qui multum obscurus nigricat. Et illud, *δ*, vel me inuito, designat aliquid simile concreto sanguini, quod tamen sanguis non sit. Dicit quispiam; adductas fuisse in examen deiectiones ad instar sanguinis nigras, 25. huius. Respondeo illas, Galeno iudice, fuisse humoris melancholici, neque concreti, neque lucentis; sanguinem tamen concretum nigrore referentis: attendere me ad atram bilem, quam lucere nisi Galenus fateretur comment. ad aphorif. 24. 4. probarem ex priorē de mulierum morbis. At negat concrefcere posse. Infantium igitur recens natorum *μικρότερον*, i. *papanerulum*, pici simile, cuiusnam rogo tribui, nisi atræ bili debeat? concreuit tamen. Ego similia huic excrementa proferri iudico: vt prior hæc sit deiectionum in proiectionibus, cum deiectionibus infantium comparatio in colore & consistentia: quemadmodum quæ sequitur, in odore erit.

57. Καὶ τὸ πλὺν ὁσμὴν ὅμοιον τῷ τῆς νηπίων.

Et quod odore simile est foris infantium.

HIC VERO supra commentarium philosophari non decreui doctissimi viri Iac. Hollerij. Is periculosum censet quodcunque alienum à conditione est morbi, & naturæ, & ætatis. Sic periculosa fuit, vt aliena à conditione morbi, sitis immeritò in acutis fedara, extimorum perfrigeratio, tinnitus aurium. Morriferæ verò ducuntur sordes aurium quæ dulce sapiunt, vt alienæ à conditione naturæ per quam amarescunt. Esse autem in conditione positum ætatis proiectionis, vt foetidiora excrementa quam infantia deponat. Horum namque blandior est calor, nascentis sui magis similis; illorum acrior, & à seipso velut discedens in naturam ignei: horum alimentum simplex, nec valde elaboratum; illorum varia edullia, mixtionis præstantis & elaboratæ, quorum perinde putidior corruptio; velut in contrarium profecta, lib. *περὶ παθῶν*, & cap. 5. 1. physicorum. Sunt autem excrementa, corruptæ partes de iis ex alimento residuæ, quæ solæ coctionem admiserunt, ex 4. Meteor. *πέθεται μὲν ἐν τῇ αἵματι, σίπηται δὲ ἐν τῇ χύμῳ*. Atque hoc quidem si in secunda valetudine locum habet, profecto in aduersa, multo potiore obtinebit: maximèque in febribus, quarum ardoris est omnia corrumpere & putrefacere. Per eas igitur, si reliquæ alui egerantur proiectis non magis quam infantium, foris foetida; mortem significant, vt signa à conditione ætatis & morbi plurimum abhorrentia. In prognostico certè vbi foetor ingens accufatur vt magnæ putredinis quæ ipsa est febris magna; de excremento ad salutem poscitur, vt sit *μὴ λίαν δυσώδης*, non multum graueolens; sed *δυσώδης* tamen: secus extingui properantem deferret cum febrili natium calorem.

58. Καὶ τὸ ποικίλον· τὸ δὲ αὐτὸ καὶ χροῖον. χροῖο δὲ ἂν τοιοῦτον αἱματώδες, ξυσματώδες, χολώδες, μέλαν, πρῶσιδες, καὶ ὅμοιον, καὶ ἐναλλάξ.

Sic & varium: est autem hoc ipsum morbi diuturni. Et huiusmodi quidem fuerit, sanguineum, ramentosum, biliosum, nigrum, porraceum; siue illa exeunt simul, siue vicissim.

VBI CUNQUE ingenium Galenus exercuit; in eo reliquorum mentes oportet conquirere. Est autem ab eo editus commentarius ad hanc Coacam scriptam ordine 23. lib. 2. prognost. vbi quod *κῆρος* legitur, hic audimus *ἐνδιμάξ*.

59 Θανατώδεις δὲ ἔστι καὶ πᾶν τὸ ἀναμδήτως διεξίον.

Lethale est etiam quodcumque sine sensu exit.

ADIECIT^r PROTH. 42. §. 2. 1. ἔστι παρ' ἑαυτοῦ, i. manenti apud se, seu mente constanti: quasi ita indicet, iudicetque; quod sponte sua, nec iussu ægri elabatur deiectio, si in causa est alienatio mentis agentis aliud, nec intendenti specierum representationi; minus intentari periculum, quam si, mente sana nec aberrante, ab extincto istud ipsum contingat sensu earum partium per quas excretio illa fit. Propterea
 10 quod alienata mens reuocari potest: sentiendi amissa vis non potest. Sed tamen, quandoquidem certe alterutrum cum periculo vitæ coniunctum; admittitor Coaca ut habet, ipso quamvis amplior & generalior prorrhetico. Non si quid lethale, moriendi hoc ipsum protinus necessitatem adfert. Verum enimvero super excrementis quæ cum nulla cogitationis culpa clam abeunt, exemplum adferebat Hippocrates in commemorato prorrhetico, hepatici cuiuspiam qui tenuia dum aluo egerebat, non sentiebat. Ei in eo Galenus illud, cum ait exolutionem iecoris nihil ad sensus hebetudinem facere: si quidem sentiendi vis ad partes reliquas à cerebro influit per nervos, quibus & iecori nulla est commodorum ac viriorum communicatio. Mihi verò est quod Galeno pro Hippocrate reponam. Iecoris opera cerebrum carere non posse; neque ipsos igitur nervos: omnium minime intestina, quæ dicata nutritionis officii, cum reliquis subiiciuntur iecori ut principi. Ut cerebri virtus influat, sentiendi vim excitare non posse nisi in partibus ita ut decet concretis & temperatis. Temperiei conservationem esse à iecore, fonte alimenti & caloris nutricarui convenientis. Quid est quod elephantiorum sensum hebetat: an cerebri denegatus calor & spiritus? Atqui ille vberimus affluit, & nullam corporis partem, sui expertem sinit. Vnde igitur, inquam, ille stupor? A deprauato partium temperamento, ex quo ad excipiendam facultatem sensificam adhuc idoneæ, ad eam in suos usus percipiendam tum ineptæ fiunt. At enim temperamenti illa in vniuerso corpore deprauatio, cuiam tandem attribuenda, nisi ἡπατος πονηρία, de qua extitit 49. huius? His accedit adempta liquidis excrementis acrimonia, quæ hepatici, iecore exoluto, & bilem non gignente, aut aliò deportante, fundunt: res à natia conditione aliena, non minus quam perditus fœtor, propositione 57. huius cap.

30 60 Ποτὸν χαλεπῶς κατὰ βροχθίζοντι πνέματι βηχῶδὲ ἐρδύμιθ ὑποσπώμιθ, εἰσὼ κατειλούμιθ. σημαίνει πόνον κοιλίης.

Si cui difficulter potum haurienti, cum tussifero anhelitu, ructus est intrò referens ac reuolutus; laborem alui denunciat.

PONITVR hic difficultas hauriendi potum, aliunde ducta quàm à vitio faucium inflammatarum, aut infirmitate musculorum deglutitioni inferuentium: sed inde vnde & tussiferus anhelitus & ructus intrò referens ac reuolutus; nimirum à flatulento spiritu qui humore glutinoso, tanquam ergastulo, continetur, toto eo ductu qui est à ventriculo ad œsophagum & laryngem. Ab eo, inquam, spiritu, exitum sibi moliente per os, nec obtinente, ructus intrò reuolutus; ab eodem laryngem irritante, tussis molesta & anhelosa, quæ tussis est ex materia ascendente dicta: ab occupante autem & obstruente fauces, in modum bullæ cuiusdam assurgenti nec ruptæ, difficultas hauriendi, sorbendi, deglutiendi. Quæret fortasse quispiam; vnde tanta vis spiritus crassi & soluti difficilis? A cruditate & nimia humoris abundantia, ventriculo innatantis & stagnantis: quem si naturæ calor perdomitum vicerit, nec se opprimendo suffocari permiserit; amandabit foras alui profluuium, aut vomitu excitato, quorum uterque vel alterutrum est ἡ τῆς κοιλίης πονηρία.

50 Notabis, lector, hæc tria; tussim, ructum referentem intrò, difficultatem spirandi, faucibus nec re-solutis, nec inflammatis; quæ singula εἰκότα sunt, simul iuncta, esse τεκμήρια fluxuræ alui.

61 Πονηρόν δὲ καὶ τὰ ἔξερυθρά ἰώδεα τέλαρταίοισι. καὶ αἱ ποιαῦται αἱ μορράγαι κοματώδεις. ἐκ τούτων σπασμῶ τῆς βίῃς, μολύνων πρεσβυτέρων.

60 EX TRIBVS quæ extabant Coacis, feci vnam, ad exemplum proth. 35. §. 1. & Coacæ 5. cap. 13. lib. 2. Ex quibus sic reponendum duco.

Μεθ' αἱμορραγίῃ, μολύνων διαχώρησις κακόν. πονηρόν δὲ καὶ τὰ ἔξε-

ρυθρα ἰώδεα . τελαφαῖσι *ἢ* αἱ τοιαῦται αἰμορρᾶγίαι . κωμωπώδεες . ἐν
τούτων σπασμῶ τελεβίῳσι , μύχαιων πρεσβυδόντων .

*Ab hamorrhagia , nigrorum deiectio ; prava : prava item quæ pra-
rubra aruginosa inde subducentur . Quartam igitur diem agentibus ,
eiusmodi hamorrhagia sunt soporifera . Atque inde conuulsi intereunt ,
si nigra antè exierint .*

S V P E R quibus omnibus vide tu comment. Galeni & parentis mei ; meminerisque vna eorum
quæ ad 32. huius cap. edidimus.

62 Οἷσι μύχαια διαχωρέει· ἐφιδροῦσι ψυχροῖς.

Qui nigra egerunt , frigidum illi exudant .

L E G E comment. nostrum ad 38. huius.

63 Αἱ Ἰξάφνης ἀλογοὶ ἐκλύουσιν κοιλίης ἐν τοῖς τετηκόσι χρόνοις ,
ἀμα ἀφωνή θρῆναι· ὀλέθριοι .

*Quibus morbi diuturnitate iam extenuatis , alius repente sine cau-
sa soluitur , obmutescantibus , tremulis ; illis est moriendum .*

H O L L E R I O, viro doctissimo, hic assentior : sed quid velim tamen, exponam verbis meis. Si in
maxima medici cura esse deber virium conservatio, quæ sunt naturæ præsentis testes, ut lucis lumen ; la-
bantibus illis, omnis est vacuatio periculosa, quippe quæ illas etiam atque etiam frangit ac deicit.
Sponte nata, nullo medici artificio, nec pharmacum propinantis, nec clysterem iniicientis ; sine noxa
quam inducit, iam actum esse de ægro ostendit : videlicet se natura vix amplius capiente & continen-
te. Fatiscantis eius accedunt hæc argumenta. Primum impotentia fandi, per exolutionem nata vocali-
um musculorum, materiæque vocalis paupertatem, i. vaporis fuliginosi, quem exiguum facit paucitas
aëris ad inspirandum attracti, quo ferè nullo, cordi insitus & nativus calor iam penè extinctus indiget.
Tum deinde totius corporis, omniumque artuum tremor ; quibus ferendis iam esse incipit vis naturæ
& facultas impar. Non est pluribus verbis opus ; exolutionem facultatis naturalis, diarrhoea, extenua-
to pridem, sponte nunc nata ; vitalis, vocis carentia ; animalis, ipse denique tremor confirmat. Qua-
nam igitur superfit viuendi spes, viuendi facultate omni collapsa & perditæ ? De aphonia cum exolu-
tione, lege Galenum ad prosth. 25. l. 1. & 5. l. 3. eiusdem lib.

ἢ ἀπρόνοια.

64 Αἱ λεπταί, μελάνων, διαχωρήσεις αἱ [φρικώδεες] βήχες τοῖσι
τοιούτοις . αἱ τοιαῦται ὠφελούσι μάλιστα καὶ πλεὺς ἡλικίῳ ἢ πρεσβυτέρῳ .

vel, spumantes.

*Potiores his sunt deiectiones tenues [horrifera] quàm nigra . Tales
ætatem potissimum iuvant , vitæ statui propinquam .*

C V M OMNIBVS morbo iam extenuatis malum est omne alui profluuium ; tum verò pessim-
um nigrum, quod quidem moriendi postridie quàm venit, necessitatem summam inducit, aph. 23. 4.
Intellectum est bis suprâ, quod qui nigra profundunt ; frigidum illi exudant, i. breui est ut syncopæ cor-
repti moriantur. Itaque his satius est biliosa deicere, etsi prava illa ; tumque maximè, cum ita ab ardore
spumant acerrima, ut nervosas partes horrere vellicando faciant. Saltem gradu vno, à nigris superantur
virides aruginosæ, si ab incendio eiusmodi nigræ sunt : sin eas extinctio caloris peperit, ut credibile sit
in corporibus pridem extenuatis & languidis, non est quod cum iis aruginosarum omnium & viri-
dium pessimæ in maleficientia conferantur. Nunquam non periculosa sunt deiectiones nigræ : at viri-
des ætate virili quæ constantem proximè antecedit, non semper sunt cum maximo damno coniunctæ :

ἢ τὸ πλεονέκτημα

65 Πᾶσι τὰ κητομώδεα, μνησίων διαχώρησιν σημαίνει, καὶ ἔμετ(ω)
10 θρομβώδεα.

PRURIGO, inquam, nouè adueniens, non antè molesta; corporei habitus macie confecti ex-
 lutione nascitur, cum solidarum partium alimentum putridum quod contineri nequit amplius, effun-
 ditur in cutim. Tum credibile fit, vt solidas partes, sic & viscera ipsa resolutum ini; ac resoluta iam nunc,
 relaxatis claustris, ad vitam in profluuium alui terminandam accelerari. Sic extenuatis longo morbo
 20 corporibus prurigo; non quidem excrementa quæ demittentur, fore nigra promittit; nam quid haber
 ea quod nigredinem concludat? sed excrementa nigra, i. ea quæ longo morbo extenuatis frequentiora
 sunt, breui affutura. Frequentiora dixi longo morbo extenuatis esse nigra excrementa: quia morbum
 qui remediis optimis tempestiue adhibitis non cessit, omnium contumacissimum & deploratissimum
 esse oportuit, cuiusmodi sunt ab humore nigro. Adde quòd crassus & limosus natura sanguis, liene
 conclusus, morbi ipsius longinquitate magis magisque coinquinatus & conspurcatus, inuenta per na-
 tui caloris extinctionem perfrigeratione, quæ horum exitum perpetuò manet, facillimè nigrescit.

*Qui unà cum morsu & cephalalgia contremiscunt; nigra excernunt. Sed ea vomitus praece-
dit: quo peracto, copiosa huiusmodi deorsum pertrahuntur.*

67 Οἷοι δὲ ἐπὶ Ταραχῆς κοιλίης, ᾧροξύνεται διὰ κρίβιν· κάπω
60 μέλανα διέρχεται.

Et quibus à perturbatione alui, exacerbatio est sub crisin; nigra infernè prodeunt.

Si toto est morbi decursu, quibuslibet humoribus profuse cum alui torminibus ducta aluiis (id perturbationis indicat nomen) & adueniente crisi, quam vel vrinæ significant, vel remissus & mitescens morbus; aluinorum torminum exacerbatio est; affore nigra expectaro. Sic enim fit verisimile, cum per ea quorum exitus fuit antea, morbi leuationem consequi minimè datum fuerit; morbuscum malum fuisse quid illis omnibus deterius: nigrum igitur, omnium quæcunque offerri possunt pessimum. Sed ea tamen sub crisin amandari, non est calamitosum; quemadmodum circa initia aut morbi progressu foret: illinc semel exonerata prodeunt; hinc perenne genita. Κατὰ τὰς ἀρχὰς ὁδὸν ποτε ἐπ' ἀγασθὸν φαίνεται ἐκκρινόμενα τὰ ρέματα, μετὰ δὲ κακῶς ἐκδιδόντα τὰ ἀπὸ αὐτοῦ. τῆς δὲ ἀρχῆς ἐπεται πολλὰ καὶ ἐκκαθαίρουσιν τὰ ἀπὸ αὐτοῦ τῆς φύσεως.

68. Ἐπὶ κοιλίῃ μακρῇ ἐμείωδεθι, χολώδεσιν, δόποσίτοις, ἰδρῶς πολλῇ μὲν ἀδυναμίας. Ἐξ ἀπίνης κτείνει.

Si cui, post diuturnum alui profluvium, biliosa vomiturienti, & cibos auersanti, sudor effluit multus, repente interimit.

REPENTE INTERIMIT] Quia tantam sudoris vim effert vires ferre nequeunt. Atque iis quidem criticum nihil aduenire potest. Hic profecto est sudor alter symptomaticorum, natus ex ἐκκρίσει καὶ σωματικῇ, i. exolutionem corporum. Iccirco sudorem multum posuit μετὰ ἀδυναμίας, i. cum impotentia, seu potius virium præcipiti lapsu & animi deliquio. Et quid aliud expectari potuit à deiectione appetentiæ, vomitus excipiente crebros, successores longissimæ diarrhœæ? Longa diarrhœa, quæ καλὴ μακρῇ, quia succedaneum habuit vomitum; morbi magis quàm naturæ ratione, quæ contrariis sine violentia motibus non agitur, data esse ostenditur: itaque ergo ab imbecillitate nata naturæ, ipsam denuo imbecillioem fecit: quam longè imbecilliam fecere vomitus vehementes iterati: vt δόποσίτοις stomachi κέρως, vel magna infectio intulisse videatur. Hæc sunt maximatum febrium & pestilentium propria.

69. Ἐν φαρμακείῃσιν ἐν περὶ ῥῶ, λεπτὸν συχνῶς αἷμα ἐκτικτόμενον, ἐπειτα δὲ φλαῦρον.

Ab assumpto medicamento si, tum in ipso purgationis fluxu, tum postea, sanguis liquidus confertim exit; malum.

ΕΚΤΗΚΟΜΕΝΟΝ, i. liquidum sanguinem proposuit, quem opponeret ab hæmorrhoidibus effluenti, crasso illi & plerumque nigro. Hunc hæmorrhoidis à medicamento commoueri est promptum: nec mirandum igitur. Ille autem vt aliter quàm venis exetis exprimatur non habet; aut sanè quàm omni reliquo humore exhaustis & vacuis. At enim uero venas intestinorum exedi, dysentericum sanguinem ab iis exhaustis & omni alio humore vacuis relaxari, dum purgante vi medicamenti sollicitari non desinunt; id verò est cum primis damnosum. Vacuationem, inquam, arguit, utilis omnis & pro futuro, imò verò & tolerabilis limites egressam Hippocrates lib. de hominis natura, part. 30. Qui medicamentum, inquit, assumere quo ducitur bilis; primam quidem bilem, tum pituitam euomunt; inde et humorem atrum: tum deinde reiecto sanguine intereunt. Idem eiusdem lib. part. 31. Expeririuntur hoc ipsum, ait, qui medicamenta hauserunt, pituitam attrahentia. Primum namque pituitam vomendo reijciunt, tum bilem, flauam et atram; inde tandem, ubi moriendum fuerit, sanguinem sincerum et purum. Galenus in comment. Exclusio tumori cum quo medicamenti familiaritas intercedit, succedit alius; is scilicet qui ductu facillimus omnium fuerit. Post hunc, qui habilitate ad exeundum secundus ab eo erit et primus. Postremus omnium venit sanguis, tanquam omnium succus naturæ charissimus. Quasi hoc verè possit enunciari, quod vi naturæ hominis totum non absorbeat, at partem eius sanè præcipuam facit atque summam. Est igitur iam penè de vita actum & exclamatum, cum violentia medicamenti sanguinem exprimere non desistit. His superuegunt conuulsionēs lethales omnes, vt ab exhausto. Σπασμός δ' ἐξ ἐλατῆρος γινάσκειν. aph. r. 5. Sanguinem, Galenus dicebat, incisa effluentem vena, inhibemus cum volumus: medicamenti vim effrenem assumpti non coercemus. Estimeatur igitur à medico, priusquam exhibeatur, nec remedia tuctiā comparata, perden de viis consulatur.

70. Τὰ ἐν κοιλίᾳ σκληρύνματα μὲν πόνος, πυρετοῖσι αἷμα φεικώδεσι, δόποσίτοις, σμικρὰ ἐφυλαγμένορ ἐς κένταρον κοιλίης, & τὰ ἐξ ἐμπύησιν.

Melius sic, Coaca 33. cap. II. lib. 2.

Τὰ κ' κοιλίην σκληρύνουσα μὲν πόνος, πυρετοῖσιν ἅμα φρενὸς δέσιν, ὑποσίτοι, σμικρὰ [ἐφ' ὅθεν νομίζουσιν,] κέκασιν & δίδοντα ἐς ἐμπύησιν ἤξει. malè fuit, ὅτι ὑποσίτοι.

10 *Alui tumores duri & dolorifici, cum febre horrifera, ciborum fastidio, & ephidrosi; nisi expurgentur, abeunt in suppuratum.*

20 *TUMORES*, hoc ipso quod duri & dolorifici, phlegmonici seu inflammatorii apparent; præsertim si ἀνέντοι, i. renitentes; proptereaque in suppuratum prout & prompti existunt. Et abibunt profecto in suppuratum, nisi expurgentur; alui profluuium, hæmorrhagia, aut insensibili transpiratu: hæmorrhagia quidem magis, si supra umbilicum fuerint; vacuationes duæ reliquæ sunt totius abdominis æquæ communes. Empyematis autem mox affuturi tria subiiciuntur, conjuncta signa; febris horrifera, i. crebra horribilis, quorum causa est in parte primum omnium horrescere, pus scilicet vomitum erodens: cibi fastidium, quem ne quidem in conspectum admittunt, à venenata suppurati aura stomachum inficiente, & resoluere: ephidrosis denique, i. exudans sudatiuncula, indidem commota, per exolutiones frequentes quas ab illo pati vapore tetra necesse est. His iunge, partis quæ dolebat, doloris loco, pondus & grauitatem magnam. Sed plura videto in comment. parentis mei ad citatum locum. Nam commentarij hæc tantum fuit summa quam proposui.

71 Ἄμα πυρετῷ κοιλίη παρεχόμενης τρόπον ἀλμυροφθία· κωματώδης νωθροῖς & πᾶν ὀρέγεται.

30 *Alui cum febre salislaginosum profluuium; non est comatosis torpidis frequens.*

INTELLECTUO istam propositionem, necessaria est recordatio distinctionis posita comment. ad Coacam 1. cap. 2. lib. 2. de comate vigili & soporato, ἀγρύπναι καὶ κοιμάσθαι: quorum illud est, quoties commissis inuitò palpebris, nec lucem accipientibus, ægri nihilominus vigilant, ἀσώδεις, inquieti & iactabundi: hoc autem, quando non minus cerebro & pectore, quam oculis dormiunt, qui sunt alibi κωματώδεις καὶ πᾶν ὀρέγεται. Illud sanè non sola aut simplex pituita facit: sed vel bili permixta, vel ipsa per se putris & salsa, quarum vtraque quantū copia & crassitie ac visciditate opprimit ac 40 soporat, tantum exsuscitat temperamento acriore. Hoc à simplici pituita nascitur, viscida & cruda, nihil aliud quam cerebrum obtundente, & somnos suadente vel coacto inducente. Id animaduertens philosophorum cōsultissimus, et si alui perturbationem quæ febris non adimitur, propter perennem humoris in hypochondrio generationem, & perennem ad caput appulsum; comatis esse posse comitem nouit, iuxta id quod ipse retulit. Ἐστὶ γὰρ κοιλία καὶ πᾶν ὀρέγεται, καὶ κωματώδης; i. An comatosis alio profluuii? Sociam tamen esse posse negauit comatis soporari, si salislaginosa sunt quæ per eam secedunt, multoque minus si biliosa: sed forte inde potius coma vigil & inquietum. Biliosorum indicia certa. Salislaginosa phlegmata acuti colore griseo separant à crudis quæ sunt albidiora. Sed hanc forte diarrhæam, fluxus è palato in linguam pituitæ salsæ aphthasque facientis aut præcellerit, aut comitata fuerit. Ἀλμυροὶ δὲ πόνος ὁμοῦ μὲν πᾶν ὀρέγεται, πᾶν ὀρέγεται. i. Carnes gustanti salis creditur salsæ; indicant redundantiam; biliosi humoris, inquit Galenus in commentario: ego etiam putris pituitosi.

Coac. 1. cap. 2. lib. 2.

Coac. 5. cap. 4. lib. 2.

72 Ἐπὶ κοιλίᾳ ὑγρῇ, κοπιώδῃ, κεφαλαλγίᾳ, διψώδῃ· ἀγρύπνοι, ἐξερυθρῷ χρώματι λυόμενοι· ἐλπίς σήμερῃναί, ἢ δὲ σπνοοὶ ὧσι.

50 *Alui perliquidia, sed ultrò oborta lassitudine, caput dolentes, sitibundi, vigiles, si facie rubent, spes est fore fanaticos: præsertim si difficultas spirandi adsit.*

MORBIFICÆ materiæ, quàm effera quammaxima copia, & quàm continenter in hypochondriis genita; fluentè aluo lassitudo adest & capitis dolor. Iam verò vigilæ exsiccatum fuisse cerebrum confirmant. Ergo redundantis istius effera materiæ si translatio fit ad cerebrum, ita vt dixi affectum;

Eoac 33. cap.
16. lib. 2.

quid tum sequetur deinde? ut in maniam exitus morbi feratur. Atqui rubentes genæ cum spiratione sublimi; excursus illius ad superiora neminem ignarum esse sinunt. Quemadmodum quæ pars in se-
cunda valetudine laborarit, in eam se morbus adueniens obfirmat: sic quæ ab insultu morbi doluerit,
in eam sæpe irruit abscessus. Hic autem indoluit caput. Itaque incalcescentes & oppressos si quis dixerit
pulmones, genis ruborem ipsos per se conciliare posse, meminerit anteaatarum vigiliarum, dolentis
antè capitis: tum deinde sciat, per pulmones ab hypochondrio esse ad caput iter. Non dubito imbu-
tum humore bilioso ab oppressione expresso diaphragma, homines in rabiem & furorem agere, libro
narratum *πρὸς πρῶτον*: sed hic ubi cerebrum omnia appetunt, eius labem augeat si potest diaphragma:
sanè eam nec delet, nec vetat agnoscere.

73 *Πρὸς τὸ ἐκχλωιδῆται βύπνοον σινόν τε κοιλίης ἐπεισελθούσης.*

DESPERATIO est assequendi mentem magistrorum in proposito: nisi verborum, *εὐπνοοῦ σινόν τε*,
transmutatio fiat in *εὐπνοῦσιν ἢ τῆς*, &c. atque ira prognoscens voces simul omnes efformentur.

Πρὸς τὸ ἐκχλωιδῆται βύπνοοῦσιν, οὐ τῆς κοιλίης ἐπεισελθούσης.

Virore suffusi non liberè spirant aluo regressa.

VBI regressam aluum, pro subsistente accipimus, *ἐπεισελθούσιν*, cuius est contraria *ἐξέρχουσα*. Ictericus
inquit, etiam eò progressi, ut corpore toto viridi esse occipiant; libertatem nihilominus sæpe retinent
spirandi: nisi fortè à subsistente aluo, iccoris iam onusti oppressio maior fuerit, vnde & impedimētum
magnum spirandi. Hoc de iis intelligito quos meatum bilis obstructio ictericos fecit: talibus enim
nihil esse potest vnde inspirandi expirandive cōmoda adimantur fluente aluo; non int̄o compressi
cum diaphragmate pulmones; non etiam impedita latera. Sed & eos in eadem intra & priuilegia referu-
uato, quibus iccur velut in silicem induruit. Nam de illis secus est quibus à systrophica iccoris phle-
gmone ducta icteri primordia fuerunt, effuso per habitum corporis, qui ab immodico ardore supra
modum incandescit & bilefcit, venarum omnium sanguine. Hic cur difficulter admodum spirent, non
longè sunt à iecore ipso inquirendæ causæ. Et eas quidem minùs sæpe remouet, sed adesse potiùs testa-
tur, importunum & longum ab intestinis effluuium.

74 *Τὰ κρυματώδεια διαχωρήματα, τὸν (ω) ἴχοντα κοιλίῳ πονη-
ρομορμύῳ σημαίνει.*

Prausta cum tensione alui deiectio; ipsius labem alui demonstrat.

RECURRE ad commentarium nostrum in 35. Coacam huius capitis.

malè fuit,
πρώτα.

75 *Τοῖς χλωιδῆσι κοιλίᾳ παραχώδης μικρὰ πικρὰ διαδιδόσσει [χο-
νώδεια] μικροῖσι μυζώδεσι, τὸν (ω) πρὸς τὸ λεπτόν ποιεῖοσι· καὶ οὐρ (ω)
οὐκ ἐκλύπτως ἰ (ω) ἐς ὑδρωπα ἐκ πύτων ἀποτελῶται.*

*In biliosis aluius turbata quæ pauca exhibet conglobata similia ge-
nitura, atque mucosa, & circa tenue dolorifica; nec urina faciles in
meiando; ex talibus desinunt in hydropem.*

VERSIONEM agnoscis datam à parente meo Coacæ 6. cap. 19. lib. 2. quod scilicet illa eadem cum
hac ipsa est. Itaque libenter illinc *χωνώδεια* transfuli huc, in locum *πρὸς τὸ πικρὸν*. Sunt autem *χωνώδεια*, *κρυμώδεια*,
ὀροβοειδῆ, *φακιδῆ*, *ἐρεβινθῶδεια*, *χαλαζώδεια*; penè significantia idem. Cætera pete ab eo qui tibi versionis
author. Ni quod hic *πρὸς τὸ λεπτόν* dictum, *πρὸς τὸ λεπτόν* fuisse illic, observatu dignum putas, & Coacæ 3.
tract. 2. huius lib. percipiendæ profuturum. *Ἐκ κρυωίων μεδιστάμενα δόχηματα ἐς τὸ λεπτόν*, &c.

Αἱ προμώδεις

76 Αἱ προμώδεις γλῶσσαι· σημεῖον ἐνίοις κοιλῆς καταρράγματος.
μύτης.

Lingua tremula, nonnullis signum est alui proruptura.

TREMUIT lingua, ut reliquæ partes, eodem penè momento subleuata & depressa, dentibus obfirmandi sese impotens, certasque voces signandi & efformandi: qualis ἀρετής, aphor. 40. 7. Subleuatur momento atque deprimitur, per inæquabilem motum quem ciet facultas hinc attollens, & illinc grauitas deorsum detrudens. Id accidit, vel lingua facta grauiore & ponderosiore, dum virtus mouēdi quæ fuerat antè integra retinetur; vel ipsa quidem lingua æquè ac prius apta & habili ad motum, sed facultate infracta & multum debilitata. Linguae ponderi pondus adiicitur à defluxu pituitæ, humorisve biliosi aut melancholici; vel à sanguine supra modum opplente venas quæ sunt à radicibus eius in ipsam subtus deductæ. Debilitatæ facultatis mouendi linguam, est ratio duplex; quod cerebrum aret ea præsertim parte vnde mouendi sentiendique vis per neruos influit; sermonis gratia & gustatus: quod spiritu & calore natiuo exhaustum destituitur, ut senectute confectis, ut ardente febre consumptis: quod nimia humoris abundantia vel imbutum languet, vel oppressum fatiscit. Tolle copiam sanguinis, tolle cerebri exhaustum vndeunque consumpti; reliquæ omnes, quæcunque adductæ sunt & excogitari possunt, linguarum tremularum causæ, accersunt alui profluuium. Eam ob rem, nonnullis dixit, non omnibus. Fluit, inquit, profusè & liberaliter aluus quibus lingua contremiscit à copia humoris pituitosi, biliosi, melancholici, quo ipsa vel cerebrum aut imbuitur, aut grauatur; siquidem conualescere ab eo malo debeant. Procliuis est humoris à lingua in aluum descensus, per tunicam communem & continuatam. Sic vomituro obseruata est suprà, inferioris labri palpitatio. Tum quod in conditione cuiusque naturæ, cætera bene habentis, ad sanitatem conseruandam natura posuit; eius ipsius moliendi meminit ad morborum, cum aduenere, depulsionem. Atqui de balbis aphorismus edixit 32. 6. quod diarrhææ obnoxios eos natura fecit plerumque λόγᾳ. Τραυλοὶ ἐπὶ διαρροίῃς μέλιστα ὀλίγοιται μάκρῃς. Vbi πὲρ τραυλίζεν καὶ ψαλλίζεν Galenus definiuit impotentia voces accuratè & distinctè dearticulandi, eas præsertim quæ literas ττ coniungunt.

77 Οἷσι καῶμα γίνεται ἐφιδρῶσι δὲ ἐλθόντων πυρετὸς παροξύνεται.

NON EST dubium quin hæc Coaca ex deprauatione orta sit prorrh. i. f. 3. i. quod sic habet.

Οἷσι καῶμα ἐπὰ φρων ὡελθόντων· πυρετὸς παροξύνεται.

Quos super spumantibus deiectionibus inuadit coma; iis est febris exacerbata.

QUOD RATIONE robustum, & experientia magis ac magis confirmatum, cur exploserit Galenus, omnia disquirens, hercle non inuenio. Quoties humor biliosus spumantis, propterea quæ efferi, vbertas ea corpore toto per venas funditur, ut satis sit quod excludatur aluo, satis quod in capitis arcem à febre subleuatum ascendat; quid mirum si inuadentibus accessionibus, aut si febre supra consuetum modum exacerbata, inde soporantur, & comatosi fiunt? Per accessiones consuevit humor, venarum antè ergastulis coërcitus, commoueri; tum vel affatim assurgens vapor, tenebras cerebro obducere, coma inducere poterit. Itaque sub finem accessionis, veterno excitantur, quo erant antè sepulti. Ac de iis alibi ob eam causam Galenus statuebat, quod bile soporantur, non tam in cerebro stabulante, quàm alibi, ubi concepta est, putrescente. Quod autem cōsuecta inducitur exacerbatione, ad spem cum ea discendendi; id ab insuetæ, ad diurnitatem etiam apparere poterit. Memineris hoc loco spumantium biliosorum, non minùs quàm pituitosorum, materiam esse vaporosam: sed & cerebrum appetere citius.

78 Ἐπὶ κοιλήσιν ὑγρῇσι, κατὰ ψυξίς μὲν ἰδρῶτος· κακόν.

Perliquida aluo perfrigeratio cum sudore incidens; mala.

IMO LETHALIS, signo naturæ, profusione alui immodica exolutæ. Hic ego namque perfrigerationem accipio extimarum partium, caloris natiui inopia laborantium, vnde exudat sudor, miliaris ille, atque, ut sentio, frigidus. Non enim perfrigerationem hîc commentatur membrorum, febre extincta, suauiter aluioforum: quæ nihil habet non magnopere laudabile. Non etiam nunc meminit rigen-

res artus frigore inuadentis prehendentisque paroxyfmi. Id enim frigus, etsi cum sudore insurgens, malum minatur & portendit: tamen sic intelligere certo debemus, nihil hic appositè nisi ad deiectiones posse de frigore sudoreque excogitari; atque ad deiectiones quidem alui quæ diu multumque ducta est crudis liquidisque copiosis. Pertinet igitur ad *κατάρσει* proposito commotam sponte, aut artificio concitaram.

79 *Ἐπὶ κοιλίῃσιν ὑγρῆσι, τὰ δὲ πρὸ οὐλῶν αἵματ' ἀπὸ πύρευντα. θανάτωδες.*

Qui è gingiuis, in super aluo liquida, sanguis exudat; lethalis.

VIDE Coacami 13. cap. 7. libri 2.

80 *Διαχώρημα καθαρόν ἀπὸ πύρευντος. λύει πυρετὸν ὅξιν μὲν ἰδρῶτ'.*


Deiectionis pura cum sudore; febrem exoluit.

DEIECTIONEM appellat puram & synceram, i. expertem omnis alienæ mixtionis & tincturæ; deiectionem, inquam, pallidam, mollem, figuratam, quàm minimùm graueolentem, quæ & naturalis est, & in febre optima censetur, progn. 13. lib. 2. prognost. Ad hanc si sese sudor adiungit calidus multus, per criticum diem toro corpore guttatim rosceus effluens; crisin adferet febris acutæ, certam ac nesciam recidivæ: ut sit, quam induxit præpotens causa, signo præmōstrata & comirata fidelissimo, quod est in naturali deiectione. *Crascescere*, inquebat ille, *deceat excrementum*, *progreddente ad crisin morbo*. Huc adesse vnā purato vrinæ bellè coloratas, hypostasi præditas alba, læui, & æquali: sed eas siluit de quibus non habebat dicere hoc capite.

COACARVM PROGNΩSEΩN, ET LVD. DVRETI ENARRATIONVM, FINIS.

Errata sic emendanda.

Pag. 3, lin. 37, *καταρσει*. Pag. 10, l. 10, *καταρσει*. P. 39, l. 41, quod *est* sint. P. 56, l. 41, *Tertij* in. P. 87, l. 29, duplex est *capitulum*. P. 133, l. 21, in *colore*. P. cad. l. 62, *Genuino*, scilicet. P. 165, l. 39, *sex* quaternarios. P. 178, l. 54, non *lateris*. P. 192, l. 24, 29, 40, *καταρσει*. P. 194, l. 29, *Hic* enim. P. 201, l. 25, sic esse *malis*. P. 214, l. 23, & *unum*. P. 222, l. 38, in *his* quæ. P. 225, l. 9, in 11. huius. P. 294, l. 3, & *solidio* te aluo. P. 298, l. 19, sit *partium*. P. 305, l. 54, *internam*. P. 337, l. 59, *exoluit* quæ. P. 346, l. 57, *per* vacat. P. 368, l. 39, *incommoda multa*. P. 376, l. 7, pro *veris*. P. 408, l. 10, continuè vocè capiti non. P. 410, l. 2, *confusi* atque *conculsi*. P. 416, l. 8, non *exit*. P. 465, l. 13, leui *offensatur*. P. 473, l. 51, *partim* corporis. P. 508, l. 5, in acuta quidem febre. P. 518, l. 17, nihil *autem*. P. cad. l. 46, *vrinæ*, *tenues*, *varix*, *canore* matibus *prædite*. P. 521, l. 31, non *periculosa*. P. 552, l. 40, à *petu* effluit. P. cad. l. 47, *certè* *notabile*. P. 538, l. 40, à *frigore*. P. 547, l. 18, *qui* in ano. P. 553, l. 35, *sed* *largitur*.



COMMEMORABILIVM

IN HIS COMMENTATIONIBVS

CONTENTORVM, AMPLISSIMVS
& certissimus Index.

Paginem prior numerus; lineam alter indicat.

A



A B S O M E N, vnde diffenditur. 327, 20.
cius tumores, non citò mortiferi 165, 12.
Aborsio fit, cum fetus excluditur
ante perfectum partum 446, 5. ibi est
in promptu, cum impotentia nutriendi
ex æquo, certat cum ea, quæ est gerendi
442, 23. 443, 7. 451, 37. 464, 33. abor-
sionis vtramque causam inferunt ora, aphthosa grauidis
442, 24. causa, alba purgatio, quæ rubra esse debebat 474,
54. prænuncia, mammarum 451, 62. periculo
adiicit alius profusior & rigor obortus 457, 56. aborsus
vbi cernitur 445, 60, &c. in aborsu, quem edit par impo-
tentia gerendi & nutriendi, infirmitatis summa omnia
443, 29. aborsio octimestris, vnde 446, 20, &c.
Abscessus omnis, qualis esse debet 230, 14. edi igitur in
nulla meatuum euidencia; bene: ἀνεπαλιν verò, male 341,
23. expectandus, si morbus diem vigesimū excederit 89, 17.
omnis futuri spem adimit vrina multa, crassa, & alba 266,
33. raro sunt lege critica, in dominatu biliosi humoris
266, 19. raro iis sunt quibus rigores tum critici, tum pe-
riodici 266, 27. 528, 12. sperabilis in ætate constanti 79, 8.
bubonis, ferè frustra oboritur. 42, 52. non boni nota,
prope abesse à morbi domicilio 385, 42. in febre, qui die-
bus primis non exoluuntur, diuturnitate ostēdunt mor-
bi 42, 48. partium inferarum, finem morborum adserūt,
nisi recurrant intrò & sursum 384, 47. meliores quàm su-
perarum 384, 46. prænuncia humoris morbifici contuma-
cia, & difficultas coquendi & excernendi 543, 21, 22. par-
tium superarum, morbos non exoluunt, nisi per empyema
384, 46. non abeunt sine noxa 384, 47. abscessus per ossa,
natura molitur 203, 61. in abscessu omni rubor & dolor
principem locum obtinent maleficientiæ 264, 63. semisuo
nec repēdēte, periculo semper locus 116, 50. in abscessum
tum morbus est facilis, si eorum quæ excernuntur superfit
pars aliqua 497, 62, 63. abscessuum criticorū quænam laus
& commendatio 265, 27. cōmunis præsentis vnde compa-
ratur 528, 30. non semper certa crisi 488, 62. crisi quando
certa 395, vlt. abscessum maiorum quàm vt perferri que-
ant, quænam causa 516, 22, 23, 24. in abscessu maiore quàm
vt perferri possit, periculo locus 537, 26. abscessum mino-
rum quàm vt prodesse possint, quænam causa 516, 22, 23. ἡ-
μῶν ὁρῶν καὶ ἀνεπαλιν exitus ferè funestus 384, 25. ischiadi-
corum successio in febribus trizaphyis 180, 28. abscessus
in malos conuertuntur cruda, non costia 268, 41.
Accrescendi ratio alia quàm nutriendi 420, 49. accretio
ad iacturæ substantiæ pertinet 419, 47. necessaria coalescen-
dis partibus quæ vel minimam sui iacturæ fecerunt 419, 48.
τὰ ἀλλυμένα, quid proprie 482, 41.
ἡ ἀχρεία, genus omne fœdi coloris continet 214, 24.
τὴν ἀχρείαν quænam causa 214, 28.
ἡ ἀκραία eadem quæ ἡ ἀκράτης 241, 3.
ἡ ἀκραία, quid 43, 19. 142, 60. duplex 142, 63. morbo-
tum ab irritò erethismo, malam adducit ἀποσσωσιν, vel ad si-
nistram crisin, vel ad interitum 142, 46. 182, 33. 446, 19. 505,
46. inter praua signa continetur 45, 46. acritæ in fe-
bribus, in causa sunt diuturnitatis 142, 45. ἀκρίτως nihil
bene fit 215, 24. ὁ ἀκρίτως, idem quod παραλύτως 76, 50.
ἡ ἀκρίτης, quid 550, 4, 5. τὰ ἀκρίτη, idem omnino si-

gnificant quod ἀκρίτης 244, 44.
Actio quælibet indecora κατὰ πρῶτον, & infuera; de-
mentis signis apposita 380, 30. actiones tum sponte nô-
stra, tum sua sunt 33, 27. quænam πρῶτον ἡσυχίας suscipiun-
tur 33, 28. quænam verò ἀποσσωσιν 33, 29. ἡ ἡμῶν
ἡσυχία, in cerebri domicilio 393, 15. actio læsa, parvis affectæ
certissimum argumentum 48, 37. 62, 59. 273, 29. 386, 16.
423, 19. 540, 15.
Adeps vnde liquitur 338, 56.
Adolescentia, ætatum omnium temperatissima 359, 24.
ætatum omnium maximè intemperans 359, 25. puberta-
tis parens 436, 26. quo anno regnare incipit 359, 24. 436,
27. vndecim annis finitur 439, 17.
ἡ ἀδυναμία, ἀτονία, ἐκλυσις; synonyma 241, 5. ἀντιτὴς
ἐκλυσις 33, 52.
Ægri nomen, vnde 303, 7. ægro bene est, dum manet
virtus atque integritas trium principatuum 392, 61. ægrum
oportet faciliè conuerti, & alacrem esse in exurgendo 392,
60. ægri aliquando partium obfessarum nomina sibi ad-
optant 321, 40. æger non est in tuto, vbi vires sunt infir-
mæ 507, 35. ægri quinam ante diem mori dicantur 146, 62.
ægro cō peius est, quò sapius frustra proripatur natura 212,
63. ægri res peius eunt, quò plures partes & principatus
in vicio sunt 240, 7.
Ægritudo ex metu & metore concepta, falsæ ac prauæ
opinionis causa 375, 36.
Æqualitas in rebus naturaliter constitutis, optima: in
aliis quæ contra naturam sunt, pessima 257, 56. 512, 6. 536,
46. æqualitate quæ ardor febrilis inuexit, nihil peius 512, 6.
Ær qualis circumfusus, tales spiritus & humores mor-
talium 147, 39. iis materia ad respirationem, quibus spiri-
tus ærii 147, 33. æris temperatissimi & purissimi, homini
necessaria respiratio 147, 36. ære tenuissimo vtuntur volu-
cra 147, 35. paulò crassiorē vtuntur terrestria 147, 35.
crassissimo vtuntur hypogæa 147, 36.
Æris succus, aquæ marinæ confocialis 312, 64. ærugi-
nosum excrementum quid denunciet 257, 50. 284, 49.
Ætas calidissima & siccissima, & propterea bilis acer-
rimæ procreatrix 345, 38. morborum intermittentium
procreatrix 85, 60. ætate purgare decet ventrem superum
383, 20. inflammationis & corruptionis causæ & sympto-
mata magis in promptu, quàm ceteris anni partib⁹ 414, 29.
moriendi solet esse maior celeritas, quàm hyeme 415, 6.
Ætas nulla tam prona ad conuulsionem, quàm puerilis
infra septennium 227, 1. quænam morborum omnium ca-
pacissima 359, 26. quænam phymatis porissimum fœta 359,
16. quænam sytropharū omnium feracissima 359, 22. æta-
tes quot & quænam 316, 28, 29. annorū numero certo non
definiuntur 316, 29. actionum varietate vel diuersitate suc-
cedanca definiuntur 316, 30. successio cadit in septenarios
annos 214, 12. successio mutationem adfert complexionis,
temperamenti, & habitus 214, 11. 316, 26. omnium anni o-
mnes ad interitum fatales 438, 31. ætatibus quibuscum na-
turaliter sanguis fluit, è naribus 344, 39. ætatis profectionis
in conditione positum, vt feridiora excrementa quàm in-
fantia deponat 570, 34. ætas constans, omnium longissimè
excurrit 438, 18. tres annorum continet septenarios 438, 18.
quando regnare incipit 436, 30. absoluitur viginti annis

21,7, &c.
H. AUGUST 1911

Apnoea & epilepsia simul esse non possunt 485, 25. ab apnoea, vitalis caloris suffocatio atque extinctio 409, 17. *ἡ ἀπνοῖα*, scilicet est ab intempestiva exclusione corruptionem habentis 445, 58. *ἡ ἀπνοῖα*, quid 250, 26. *τῆς ἀπνοῖας* Græcis quænam 212, 10. *τῆς ἀπνοῖας*, proprie iis accommodatur, quæ vel in via subsistunt, vel retrahuntur 338, 24, 25. *ἡ ἀπνοῖα*, *ἀπνοῖα* *τῆς ἀπνοῖας* 338, 23. *ἡ ἀπνοῖα*, quid 20, 28. 186, 36. 183, 50. 279, 15. 352, 21. vnde 279, 16. species *τῆς ἀπνοῖας* 39, 41. *τῆς ἀπνοῖας* causa, morticinum naturalis facultatis 39, 46. *ἡ ἀπνοῖα*, à catarrho in alvum prolapsa 443, 2. 444, 8. symptoma vel ventriculi exoluti, vel humoris pravi è capite procumbentis in fauces 388, 45, 47. à ventriculo exoluti, pessima 388, 50. gravissimum malorum accessionem adiungit 186, 51. in morbis omnibus gravissima 279, 19. 284, 39. *καὶ ἡ καρδιαγία*, ut differant 325, 12. per *τὴν καρδίαν* alui, mortifera 283, 51. symptoma terrificum 186, 37. 325, 14. *ἀπνοῖας καὶ κοίτης* discrimen 39, 42. in *ἀπνοῖα* à prurititione ichoris quem genuit febris, venæ sectio confert 388, 55, &c. à stomachi facultate vitata vel emortua, venam secare, est ægrum iugulare 388, 52, &c. *ἡ ἀπνοῖα*, qui cibos respuunt atque averfantur 186, 34. *τῆς ἀπνοῖας καὶ κοίτης*, crebra vicissitudo 443, 50. Appetentia naturalis, quando in *καρδιαγίᾳ* mutatur 214, 47. Aqua iis materia ad respirationem, quibus spiritus aquei 147, 34. & igne omnia coagmentantur atque constituunt 420, 38. pluviæ, omnium leuissima 312, 54. multa pestifera omnibus *καρδιαγίᾳ* 322, 41. aquarum matrix cruditas maior & frigida intemperies, quam statuum 330, 39. Aquæ vterinæ vnde collectæ 441, 25, &c. quomodo naturaliter fluunt 441, 50. & lochia purgatio, ut differunt 441, 44, 45. cur nullo enixu prorumpunt 441, 52. ruptis à sætu membranis, iniussu prorumpunt 441, 48. quæ ante partus fluxere, gravidas male habent 440, 10. 441, 59, &c. aquarum vterinarum nimia abundantia, vnde 441, 53. *ἀπνοῖα*, signo & causa salutare 392, 10. *ἀπνοῖα* in ægris quæ 4, 21. & quibus opponantur. ibid. *ἡ ἀπνοῖα*, *ἀπνοῖα* *τῆς ἀπνοῖας* 248, 40. *ἀπνοῖα* *καὶ τῆς ἀπνοῖας*, mutuò se afficiunt 2, 51. ab Ardore totum corpus omni ex parte nigrescit 288, 47.

Arteria, vnde dicta 275, 31. 428, 9. quibus commodis comparata 428, 6. per arteriam, ærem ducere, commune omnium vocalium animantium 148, 7. arteria absolute, aspera 275, 30. aspera, *βρόγχις* vel *βρόγχις*, dicta 275, 36. arteriæ asperæ propagines, dictæ *βρόγχις* vel *βρόγχις* 275, 36. arteria aspera in pulmonem diffunditur 275, 35. catarrho imbuitur perenni prolapsu 323, 57. fistulata cylindri speciem edit 428, 11. ab arteria lauciata, cur moriantur homines 428, 14. arteriæ catartides secundum asperam arteriam procedunt ad caput 239, 60. 265, 14. arteriarum lumbarium maior amplitudo quam cæterarum 189, 34. *τῆς ἀρτηρίας* medicamenta, quænam 275, 35. Arthritici, non raro sunt colici & dysenterici 223, 22. *ἀρτηρίας* causa, rigor, *κρίσιμος* *μη κρίσιμος* 23, 33. Artuum est exercitatio; carniū cibus, & somnus viscerum 404, 42, 43. & corporis indecora est collocatio, cum vel iniuria est, vel iniussa 400, 18. omnium vis lucet potissimum in meteorismo 394, 30. meteorismus difficultis, facultatem in vitio esse testatur 400, 14. simplex *καὶ ἐγλυφὺς* collectio, quo pacto iniussa 427, 45. distentio violenta, quando 421, 44. artus amputati, nulla sperabilis coactio 428, 33. artuum vulnera sæpe ex euentu lethalia 429, 29.

Ascarides gignuntur tantum in ano 174, 33. 347, 18. non raro ferarum nomen obtineant 352, 26. 353, 30. putredinis fœdæ soboles 353, 24. ascaridum quænam causa 218, 18. de Ascite hydrope, vide ad nomen *Hydrops*, sub littera H.

ἡ ἀστία, species *τῆς ἀστίας* 39, 41. *ἀστία* *τῆς ἀστίας* 299, 37. *ἡ ἀστία*, qui cibos non capiunt 186, 34. & *ἀστία*, ut differant 186, 33. *ἡ ἀστία*, *ἡ ἀστία*, *καὶ ἡ ἀστία*, eadem in natura, causis, atque symptomatis 493, 31. duplex 3. penult. *καὶ τῆς ἀστίας*, vel *ἀστίας* 3, 64. 65. 4. 2. 4. 199, 33. *πρὸς τὴν καρδίαν*, quæ 4. 7. *καὶ τῆς ἀστίας*, quænam 102, 50. ægri est anxij 402, 54. quænam mortifera 4, 3. *τῆς ἀστίας* domicilium, ventriculus

136, 54. condicio tam in iacendi habitu, tum in dicta 493, 28. *ἡ ἀστία* *τῆς ἀστίας*, quænam 197, 52. Asphaltes mare, Oceano ponderosius 312, 34. Assimilatio nulla succi alibilis, effecta viucacitate partium solidarum 372, 51. quæ Assumuntur, tam convenienter naturæ non adiunguntur, quam illa erant quæ continenter effluunt 438, 55.

in Asthmate, residendo ducitur spiritus 145, 20. 300, 3. *ἡ ἀσμία* levis & fugax non est melancholica 375, 2. *ἡ ἀσμία*, quid 40, 18. *ἀσμία*, *ἐκασμία*, synonyma 241, 5. *τῆς ἀστίας* omnem, vitium materiam, non intemperici esse; falsum 312, 28. *ἡ ἀσμία*, idem quod *ἡ ἀσμία* 126, 30.

Atrophiz facillis transitus in cachexiam 352, 40. Audiendi meatus, in causitate ossium temporalium 107, 5. in audiendi meatus sinu, qualia contenta 107, 8. auditus instrumentum, ærium 124, 22. auditorium instrumentum, quodnam 409, 14. auditus interceptio, vnde 297, 22. auditus priuatio, vnde 297, 20.

Augetur quicquid; natura calidissimum est 420, 62. 421, 11. augmentum, quid 421, 17.

Aura venenata è semine corrupto in locis 222, 35. Aures, sponte nostra non mouentur 122, 9. exteriores, nominatæ auriculæ 107, 4. aurium nomine intelliguntur interiores 107, 4. aures frigide, pellucide, inuerte, mortifera 109, 12. 122, 8. frigide, cur 109, 17. 122, 6. quomodo inuerte 109, 32. quomodo pellucide 109, 30. grauius admodum morbis obnoxia 106, 61. obfufcescere in acuta febre; furiosum 111, 22. per aures & ab auribus plerique tertio die moriuntur 107, 31. aurium bombus, foras non exit 107, 61. echō, vnde 93, 15. inflammationes ad dementiaem aut mortem sæpe præcipiant 106, 11. malis inter initia succurrendum 107, 3. sordes quæ dulce sapiunt, mortifera 570, 33. symptoma præcipuum cernitur in surditate 108, 3. in auribus quam in oculis, aliquantō maius periculum 107, 1.

Aurum portabile celebrare; ostentatio & superstitio 147, 11.

Austri graues auditui, caliginosi, caput grauantes 9, 30. &c. 482, 43. segnes & resolucentes 368, 58.

Autumnus inæqualis 79, 25. quartanis abundans 79, 32. per autumnum, humoris melancholici generatio 79, 33.

Auulsiōes, vnde 300, 50. de auulsiōibus vide plura sub nomine *Spasmi*, ad litteram S.

B.

B A L B O S longa exercent alui profusio 136, 15. 177, 2. Belgis, capitis tromata *δυσκλῆς*; ribiarum, *δυσκλῆς* 429, 33.

Bene nihil fit, quod critica lege non fit 206, 62. 266, 43. Bilis *ἀπλῆς*, sero suo dilueta intelligitur 257, 24. quæ feces destituit, regreditur in corpus atque venas 542, 24. multi gradus 134, 54. abundat ex carniū bubularum edacitate, & vini immodica portione 324, 49. 338, 35. 345, 39. æstare, sursum mouendo, purgatur 66, 43. causi effectrix, misticata pepasmo, exitum habet per cutim, eò violenter expulsa, in rigore 505, 19. continenter à febre succrescit 416, 34. 521, 15. 551, 40. feruescit in somno diurno 404, 41. in alvum confluens, quodammodo vice clysteris 545, 33. in alvum superam affusa, fit particeps pituitæ 489, 78. inflammationem ibi mouet, ubi subsistit 331, 23. metaplasin crebram huc illuc habet 293, 60. pepasmo quodammodo pituitescit 348, 7. 462, 13. 489, 6. quod & quæ, relicta vrina, cursum inflectit; ibi dolorum atque laborum fortuna 337, 22, 23. feri participatione, *ὄψα* 257, 23. sero destituta, redditur flaua & vitellina 257, 23. substantia tenuis, temperamento calida, qualitate acris 30, 13. tertio quoque die mouetur 23, 1. vnde gignitur in vomitione crebra quam tromatis infert propagatio 25, 7. 48, 4. 422, 15, 30. ut gignit vigilias: sic illa rursus à vigiliis gignitur 49, 4, 53. ad caput translatio cum cruditate, delirium adferre solet 47, 19. ad caput translatio cum pepasmo, hæmorrhagiam 47, 20. affluxu, cardialgia excitatur 422, 27. 478, 33. appulsa in alvum, cerebro inflammato, si salua promoueatur; vomitus est in propinquum 501, 9. concitatio ad caput; ibi mouet inflammationem phreniticam 555, 60, 61. concitatio sursum & deorsum perraro fertur 170, 39. delectio damnis auget ægrotum; cum ea cernitur nimiam saturata & spumans

& spumans 498, 44, &c. dominari homines tenentur meridie 404, 59. effusio siue diffusio phyma facit vniuersale quod totam occupat compaginem 386, 7, 8. & febris generatio munda 422, 63. vtraque gignitur, à cruciati seui doloris 422, 46. à membranis ac cerebri inflammatione 422, 62. bilis perennis in aluum affluxus ab hepate 494, 22. ab eo inflammato 173, 15. ab eo inflammato diffusa; metra 387, 1. in cerebrum translationis causa, incendium superioris hepatis partis 52, 53. natantis in fundo alui, vomitio est 478, 35. à bile ventriculo affixa, singultus & nausea 422, 17, 478, 34. bilis promptio, multis in morbis critica 549, 49. vomitio, à nephritide, quo pacto fit 422, 43. quoniam periculosè cum habet qui vomit 422, 10, 11. bilem febris gignit ex pingui 515, 56. à bile nascuntur morbi acuti 547, 59. flaua, soboles *τὸ νέον*, i. *pinguis* 134, 54, 490, 22, &c. bilis flaua, causa materialis omnium colorum viridium qui spectantur in vomitu, deiectionibus, atque lingua 490, 20, &c. bilis flaua ad caput translata, ibique æstus, phrenitidem parit, & mor insaniam 296, 29. flaua & glutinosa, intestinorum & sedis vlcerifica 178, 44. flaua ac viridis feracissima, doloris acerbitas 356, 60. eius & febris acuta munda generatio 518, 18, 19. bilis flaua in viridem, & huius in auram, facilius mutatio 160, 4, 296, 30. 387, 3. 491, 7. 494, 62. 518, 65, 523, 52. bilis saturata, abraddendo & exasperando, sedis & intestinorum vlcerifica 225, 1. nimium saturata & spumans, non minus calamitatem arguit visceris vnde venit, quam partibus ipsis cui fertur, molesta est 498, 47. nimium saturata & spumans, sua feritate, intestinorum & sedis vlcerifica 498, 47. saturata qualitates duæ, quoniam 178, 41. bilis viridis & æruginosæ causa materialis & efficiens, quoniam 257, 46, 460, 47. bilis æruginosa proximè abest à nigra 94, 33, 44, 206, 56, 491, 5. 497, 2. 524, 19. æruginosa, qualitate, copia; excernendi modo; calamitosa 94, 32. æruginosæ à cerebro, vomitu, denunciant feritas humoris phrenitici 490, 44. bilis metra, inter cætera bilis genera, hoc vitio eximia 490, 7. metra, vnde 257, 22. metra vomitio cum actione læsa, perennitatis fontem & focum denunciat 500, 24. bilem synceram in febribus peracutis nasci; non nouum 510, 24. bilis porracea spumans cum rufi expulitur, nec villi est dolor sub diaphragmate; in pulmonibus focum habet gignendi & excludendi sui 490, 35. porraceæ causa effectrix quoniam 490, 27, &c. porraceæ in aluo causa indigena vel advena; & quomodo ea distinguenda 488, 29, &c. à bile porracea hepate inflammato, singultus 490, 34. bilis atra, acida, erodens, mordax 39, 64. 206, 36. 559, 3. ab æruginosa nata, dysenteriam mouet lethalem, & insanabilem cæcæm edit, atque insaniam excitat ferocitate intolerabilem 491, 13, 14. autumno potissimum ad hepar proripit 322, 43. dum exulcerat intestina, graniora mala inferuntur; quam cum sanguis niger grumescit 552, 26. bilis atra & niger humor, vt differant 40, 1345, 61, 377, 20. bilis atra & melancholicus succus à sanguine feceruntur, cœctione 552, 25, 559, 3, 4. ex nigro humore nata, feritate est illi inferior quam genuit bilis æruginosa 491, 11, 12. 495, 5. non redit in flauam 518, vlt. pessimum excrementum 39, 62. si sursum deorsumve: exeat circa morbum initia; desperatio 345, 60. splendet 559, 4, 18. 570, 18. terram fermentat, in eam effusa, ac veluti excoquat 559, 2. bilis spumans, effera 577. bilis atræ aciores morfus quam niger humoris 377, 16. morfus aciores quam flauæ. 38, 30. 49, 39. 183, 47. 296, 30. 314, 55. 378, 11. 497, 4. 553, 1, 2. eius, in cerebro, proptatio magna 377, 18. bili atræ feritate tantum concedit sanguis niger; quantum frigidum ferrum, candenti 552, 7. bilem atram ex picuita crassa gigni; ineptiæ 491, 16. à bile atra, dysenteria, lethalis 39, 65. ab ea, *μελαγχολικὴ ἐκκρίσις* 51, 15. in bile atra qualitates maleficæ 491, 10. summa omnia feritatis 345, 62. bilis atræ excretio, omnium maxime mortifera 39, 61, 40, 13. biliosum excretio manet potius quam abscessus 266, 25. biliosa profluvia surditatem tollunt 568, 55. viscida; ad aurium abscessus magis prompta 566, 24. biliosorum spumantium materia; non minus quam pituitosorum; vaporosa. 577. biliosum cum expurgatum non est vniuersi, credibile est dysenterias ab eo induci 516, 60. biliosus humor incalecendo fit glutinosus 566, 37. biliosus, sunt, vel *ἄνω*, vel *κάτω*, vel *ἐξω* 520, 11, 12. biliosi sursum, quoniam 317, 44. aut tēperamento, aut habitu, aut diætā; vel simul his omnibus 338, 25, 38. biliosi tēperamento, qui hepate sunt calidissimo, & hepate turgida sanguine bilioso 338, 26. diætā; vel instituto, vel vi-

ctus ratione 338, 30, 32. instituto, qui in labore & animi contentione, sæpe irarum æstu fluctuantes, ac summe defraudantes genium, corpus conficiunt 338, 31. victus ratione; ex bubularum carum edacitate, & vini immodica potione; idque potissimum ætate 338, 32, 35. habitu; qui huiusmodi sunt *ἄνω καὶ κάτω* 338, 27. biliosis habita, sursum alius restrictior 386, 64. in biliosis, ad hydropem causatum est concursus 338, 25.

Bombus, quid 109, 53. bombus & echo vt differunt 110, 2. in acutis, & echo in aure; mortiferum 109, 40. 195, 23. bombi in aure, vnde 190, 16.

Bona sunt omnia è bonis orta 523, 20. in bonis nihil ducendum, quod *κατὰ λόγον* nature non fiat 136, 43. de bonis nunquam sunt auguria mala 520, 61.

Borborygmus, vnde dictus 175, 62. arguit meteorismum hypochondrij 356, 14. signum cruditatis victæ, & restitutæ virtutis peristalticæ intestini 389, 11. sæpe à febre excitatur 174, 20.

Bregma & synciput eadem 411, 41.

Bronchia, per pulmones sparsa 275, 18. 428, 40.

Bubo, pro ipso inguine 436, 386, 47. pro quibus vsurpatur 42, 62. Bubones mali, qui statim initio febrium acutarum efflorescunt 43, 1. pestilentes; cum alio stente liquidis excrementis, maximè que aquosis, cruditatis participibus; lethales 567, 34.

C

CACHEXIA causa quoniam 317, 11. Cachexia firmiter pressa in corpore, *διὸ ἐνερμα* corrumpit 434, 59. quæ in tabem incidit, miserrima 317, 17. 320, 17. cachexiam in aduersa valetudine pars omnis vnde contrahit, inde pallescit 258, 27.

Cacochymia & cachexia mutuas tradunt operas ad perniciem 434, 58. cacochymia omnis pépalsm non recipit 213, 52. vetus, *ἐνερμα* immutat & labefactat 434, 58. cacochymia purgatio debetur 213, 51. malignæ frustra vacuatio fit, quam fouet nobilissimæ visceris praua affectio 284, 41. malignæ translatio sæpe à venis ad neruos, & contra 72, 11.

Cæcitas, quale symptoma 108, 5. vnde 130, 10. cæcitate ab emortua videndi virtute, mors in propinquo 495, 20.

Calcanei societas cum venis & neruis insignibus 414, 20. fracti mollis adhuc *μελαγχολίης*; vnde 124, 35. Calcaneo perfracto quoniam superueniunt symptomata 488, 9, 10. à calcis fractura, febres peracutæ 17, 58, &c. 422, 34.

Calidum conuulsiones teranósque lenit 227, 43. neruis amicum, & iudicat 227, 44.

Calculus, quid 359, 49. Hippocrati lapis 359, 48. calculi coagmentatio facilis à glutinoso & crasso humore 359, 56. ad calculum gignendum tēpus idem opportunum, atque ad inflammationem in vesica 359, 13. de calculo opinio Fernelij, partim vera, partim fallax 360, 1, &c. calculi atque vrethre phymatis, dionisius quomodo comparatur 362, 49. torio, curandi celeritatem exposcit 360, 37. curatio, ad chirurgum pertinet 361, 13. in calculi curatione cautio magna 360, 40. calculi curatio crudelissima 360, 39. coagmentatio in renibus fit de improviso 359, 23. coagmentatio & matrix in renibus, *καὶ ὁρμησις* 359, 53. 427, 25. 509, 46. 539, 37. in rene stabulantia, facilis coagmentatio in senioribus 539, 51. calculus puerorum, in vesica enatus, non eo gaudet ætatis beneficio, quo puerilis epilepsia 360, 51. calculi puerorum *μετ' ὁρμῶν* coagmentantur 360, 61. eius coagmentatio in vesica, duplex matrix, vna in rene; altera in vesica 359, 51, &c. coagmentatio & matrix in vesica, *μετ' ὁρμῶν* 359, 55. 427, 25. 509, 46. 539, 37. generatio in vesica, vnde 437, 31. calculus in vesica enascitur quæ ætate potissimum 359, 58. in vesica quomodo accrescit 360, 14. calculi vesicæ propulsio in matura ætate 437, 33. in vesica non capax suo merito ætas constans 437, 42. in vesica non semper est *τὸ πρὸς πύλιν*, sicut in renibus 539, 36. in vesica coagmentati; signa 360, 27, &c. calculus in vesica, vel ei affixus, vel oberrans 361, 34. modo duplici ad vesicæ cœuicem descendit; appulsu vel illapsu 361, 35. quomodo appulsu ad cœuicem vesicæ descendit 361, 36. quomodo illapsu ad eius cœuicem descendit 361, 37. calculo curatio nulli medicioæ locus 360, 54. vesicæ frangendo quæ adhibentur medicina, temeraria, pestifera, & sæpe mortifera 361, 4. à calculo pericula quoniam vesicæ inferuntur 361, 2, 3. calculosi, quoniam 361, 17. vnde

de dicti 359, 42, 51. ea figura fiti ut ac calculus procidat in vrinæ ductum; facilius incipit 359, 33. calculosis nihil opis adfecti potest, quam incidendo 361, 4, 6. calculosorum dolores leuissimi

Caligo, nebula crassior, nube tenuior 125, 25. vnde 38, 55. caligatio accessionem habet caliginis intus conceptæ & genitæ 125, 27. caligatio & hebetudo ad visionem obscuram pertinent 125, 27. caligantes omnes, hebetes sunt; non contrariæ 125, 23.

Calli fundamentum, in osse perfractio 418, 21.

Calor natiuus, forma est 421, 4. calor natiuus, cum viuificus, tum viuax 230, 217, 54, 55. ut foras vel intro viam affectus, sic inclinatio esse solet vigiliæ, aut somni 404, 26, 27. cum spiritu, naturaliter horis diurnis foras excurret, vigilandi causa 494, 40. calorem cum spiritu intro cogi ad somnum diurnum, contra naturam 404, 40. à calore quæcunque alterantur, inter, coquendum, viscida quodammodo sunt, cum talia ab initio non essent 565, 22. in calore natiuo est *ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς*, *ἢ ἡ οὐσία* 420, 45. calore natiuo *ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς* congregantur 511, 64. calor infantum blandior, & sui nascenti similis magis 570, 35. illorum qui ætatis sunt prouectioris, acrior; & à seipso velut discedens in naturam ignei 570, 35, 36. natiuus, subiectum suum suo dominatu sic tenet, ut nihil illius intactum relinquat, & in quamcunque partem æqualiter se insinuet 512, 3. calor natiui magna vis lucet in suo subiecto naturaliter constituto 512, 2. officium, vitare *ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς*, & glutinosum humorem, coquendo mutare in meabilem 424, 15. propria coctio atque mixtio 211, 88, 489, 9. calore natiuo abundat corpus *ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς* 278, 38, 420, 61. calor natiuus in pueris tantus, quantus postea nunquam 227, 3. 433, 35. calor natiui splendor lucet in pubertate & adulescentia 214, 13, 227, 12. splendor ac lumen cum micare cœperit in pubertate, crudelitatem exoluit conuulsificam & epilepticam 467, 15. amplificatio per testes 296, 41. eius & nectaris viuifici amplificatio, coniunctam ferè habet thoracis amplitudinem 271, 9. ipsius & humoris soboles, coargumento omnis naturaliter constituta 553, 54. tantum habent partes extimæ, quantum à corde viuifici nectaris 202, 39, 391, 51. in calor natiui virtute natiui posita vitiorum sanguinis emendatio 568, 19. calor natiui instauratio nulla, in spiratione amissa, vel in scitore 371, 40. vnde extinctio; inde mors in propinquo in morbis acutis 399, 6. suffocandi periculum positum est in oppressione 331, 23. suffocatio vel extinctio, mors est 122, 15, 427, 31. calorem natiuum nihil æquè extinguit atque febrilis ardor 329, 60, 554, 28. calor natiui retractio maior à visceribus inflammatis, quàm à venis febre ardentibus 392, 1. extinctio irreparabilis 125, 15, 394, vlt. calor natiui ac spiritus cita extinctio ac dissipatio, citum quoque adfert vitæ exitium 451, 22. extinctio in parte vna, ad extinctionem apparatus totius 122, 16. calor duplex; inimicus & pestiferus, vnus; alter amicus & salutaris 391, 45. calor natiui vis, ut continenter moueat, nec vllam quietis partem impertiat 137, 32, 171, 63. æqualitas in omni morbo experienda 392, 41. calor & frigus, præter cætera, in partibus sentiuntur 31, 12. calor natiui & frigoris in extremis artubus cita mutatio, vnde 471, 46, &c. calor firmiter fixus vbi multus inest, ibi & morbus 304, 5. febrilis, humores prauos effert ad caput 102, 25. calor natiui contra naturam, persequitur spumantis & opimarum deiectionum æqualitas 512, 45.

Caluaria, duplici osse constat 415, 25. cum rectè habet, nulla sui parte in superficie, aspera; nisi ad suturas 411, 53. caluarie fracturarum differentie & ideæ, in quibus cernuntur 412, 21. caluarie grauis omnis perfractio, quo pacto ad interitum fatalis 414, 25. pars nulla inflammationis capax, præter frontem 430, 31. caluarie, in occulto sistit corruptio omnis, sua fundit symptomata, suo quæque loco pestifera 414, 32. os si purulentum fuerit, aut pustulæ assurgunt in lingua, aut ipse faucibus cum delirio vitam finit 415, 38. *ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς* qua exhibetur *ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς*, sub stillo in membranam tantum periculosa 410, 3. caluaria vbi in vitio est fracturæ illatæ, nec tamen tractabilis, neque aspectabilis; querendo non debet defatigari medicus, donec inueniatur 414, 21.

Cancer, quid 434, 35. exulceratus, letalis 39, 65, 346, 1. cancri insanabiles à bile atra ex flaua 206, 38.

Capillorū ē capite effluuium, vnde 312, 3, 313, 31, &c. capilli ē capite fluunt, sicut ē plantæ folia 312, 2. capillorum ē capite effluuiū, *ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς* prauis rheumatis cōcitari 311, vlt.

Caput, quid 87, 26. id ē cerebrum multum inter se differunt 408, 45. capita hominum similiter non affecta, nec constituta 406, 20, 407, 12, 61. caput cum vena patitur, vnde parit 449, 21. ad caput, ab hypochondrio, per pulmones est iter 576, 6. capitis & pulmonum, facilius *ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς* 313, 37. caput dolenti parte postica, vena frontis recta incisa profuit 191, 47. caput vnde repletur 166, 35, 323, 38. capitis repleti symptomata sunt vel cephalalgia, vel cataphorica, vel paraphorica, vel catarrhoica 105, 56. capitis symptomatum à repletionem originem ducendum, crisis; alui profuuium 568, penult. repletio, cataphorica, soboles viscerum afflictorum, & impuritatis vasorum 324, 64. repletio omnis, cataphorica & cephalalgica, fundit parotidas 324, 60. percussio, vnde 93, 15. euacuatio, per hæmorrhagiam 14, 34. vacuatio expurgantur tum oculi, tum aures: ipsæque facies clarior sit ac nitidior 162, 37, 38. eius & cerebri lésiones ut differunt 408, 48. lésio est cephalalgia 408, 48. vulnera cū grauiora 417, 15. sanati cū trāma exaruit, pustulæ biliosæ pullulant in palato & lingua 54, 10. perfractio corruptio & inflammatio mortifera, contagione cerebri & membræ 417, 11. in capite, perfractio quædam signa desperatæ salutis 399, 1, &c.

Cardialgia, vnde 196, 9, 198, 16. 422, 25, 28, 471, 32. cæ & cardiognmus, eadem 478, 30. symptomata coarctationum dolorum 196, 25. non raro à lumborum quibusdam malis 324, 54. in dolore lumborum, suppressis mēstruis, vel hæmorrhoidæ, quomodo accidit 422, 43. in cardialgia cum torminibus, ferè alui prorumpunt 353, 29.

Cardiognmus & cardialgia, symptomata oris ventriculi 173, 21. cardiognmus, vnde 173, 24.

Caro amplificatur facili 418, 21. pro pericranio 415, 23, &c. Carnis interuentu, membrana carnea coalescit 418, 10. carnes attrahunt ex ventre & extrinsecus 343, 24. carnes gustanti falsò creditæ falsæ, indicant redundantiam humoris biliosi 525, 49. carniū est cibus sartuum exercitatio, & somnus viscerum 404, 42, 43.

Carnositas vulgò, quid 362, 23.

Cartilago, quid 420, 6. naturam ossium suscipit rustare 420, 8. Cartilagine quædam sic manent 420, 35, &c. cartilagine exectæ vel electæ, nulla sperabilis restitutio 429, 19, 33, 420, 15, 27, 30, 431, 34. cartilago quæ ingulum colligat cum omoplatæ spina, solius hominis 420, 10.

Carus, quid 99, 17, 324, 61. vnde 324, 61. symptoma phantasiæ abolitæ 99, 60, 548, 45. cerebro admodum perfrigerato inferitur 484, 45, 46. eximius inter cataphorica mala 99, 11, 15. 448, 38. cari natura & *ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς* 99, 19. & apoplexiæ quædam communia 99, 21. carus, pro comate mixto, vigili. 448, 42.

Cataphorica symptoma, qualia 99, 12, 54.

Catarrhifera intrā inutilia, quædam 442, 29, &c. Catarrhi à quibus extrinsecus enascuntur 442, 35. catarrhus dorsalis, à phthisi dorsali 435, 8, 16. trauicitaris author & iussus feriat 378, 36. sæpe distorsionem adfert rhacheos 298, 15. in febre non prius subsistit, quàm ipsa quiescit 228, 39. catarrhi & febris consensus vbi apparet 62, 48. catarrhi ē capite & febris, in *ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς* 518, 47, 48. ferini generatio aut ab iis quæ intrā sunt inutilia, aut ab iis quæ extrinsecus 442, 28. prolapsus, vbi infederit, & vnde vel quæ exierit incidere, sæpe insanabiles morbos facit 315, 59. vis erodendi, merum adfert ferini vlcus 292, 44. in pulmonem prolabentes, incommoda 292, 51, &c. catarrhi prolabentes in superiorem aluum, viginti diebus suppurant 168, 8. catarrhi & sternutamenti vis pestifera omnibus qui ex pulmone laborant 272, 30. in aluum deiciuatio, primum oxyregmiam, mox lienteriam parit 293, vlt. in aluum prolapsus & coquendi impotentiam adfert; & continendi 442, 61. perennitas, vnde 323, 58. mansio diuturnior periculosa, vbi non potest pepasium habere 292, 46. vis effera, in quibus cernitur 293, 39, 378, 37. à catarrho eodem possunt homines tabidi fieri; & alius turbati 294, 4. diu vexati, tabidi iacere coguntur 293, 40. per catarrhos quædam naturæ valetudinarie 271, vlt.

Catoche, symptoma est cerebri 57, 56. & *ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς* consistit 90, 35. 99, 20. 144, 10. 224, 17. ea ac delirium, lésiones cerebri 408, 49. catoches & comatis discrimen 27, 56. catoche & exolutio existere simul nequeunt 144, 9. ea & delirium non semper *ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς* 57, 46. catochi omnes, quales 90, 40. catochi pessimo sunt loco, cur 27, 59. catochorum

Clavicula & iugulum, synonyma 274, 35.
 de Climacterico anno, disputatio pulcherrima, pag. 438, & 439. climactericum annum exigit atque percurrit 63. annus 438, 3. climacterici anni quinam status 438, 34. climacterici iure non esse, nec dici possunt anni omnes 438, 32. de climacterico anno quæ vulgo feruntur 438, 35, &c. præclarum responsum Maximiliani I. Imperatoris 439, 56. in climacterico anno, vanitas magna 439, 15.
 Clinica mulieres nihil rectum putant, nisi quod ipse præscribitur 78, 44.
 Coacæ prognosæ quis author 1, 12. coacæ quinam in volumen vnum redegerunt 1, 12, 13. coacæ quid continent 1, 14. coacæ liber primus quid continet 1, 16, &c. secundus 1, 19, &c. tertius 1, 22.
 Coctio, reapse bonum 520, 60, 61. nulla in malis duenda 520, 60, 521, 25. fugax versa in pristinam cruditatem, vnde 520, 62, 63. particularis, frustra suscipitur in cruditate vniuersalium excrementorum 118, 35. coctionis officina vtraque, aluus & hepar 509, 64. eius & cruditaris vicissitudo, parem naturæ & morbi arguit dominatū 512, 22, 23. eius corruptionisve inualescentis quæcunque signa dantur die quarto; crisin promittunt septimo, conualescendi morbo, vel succumbendi 543, 42, 43. vitium quod præcessit, non emendatur ab ea quæ illi succedit 480, 18. coctione crassescunt omnia excrementa 519, 10. coctum quicquid est immeritū in acutis; malum 520, 30. ex coquendi impotentia, cruditas 442, 60. coquendo, pituita & bilis puriformes euadunt 268, 28.
 Cælum *ἡρωικὸς δὲς* in *μυστήριον* 543, 10.
 Cognitio omnis comparatur duce iudicio, comite experientia 411, 10.
 Coitio pertinet ad solutionem continui. 419, 47.
 Colici sunt arthritici, conuersa colica in arthritidem 346, 58.
 Colliquario habitus, principatus nutritij colliquamentum ostendit 323, 54. colliquamentum quod cernitur in deiectionibus & yrinis, est à febre tabifica 323, 51.
 Colores quinam funesti 91, 43. colores mali in vomitionibus, quam in deiectionibus, & sputis, peiores 24, 50. coloris flauis de nigro, dictū absurda *παλινθροισ* 518, 63. color talis, qualis humor diffusus 75, 44. 115, 10. 170, 56. 214, 32. 234, 34. 387, 4. similis humoribus 134, 26. similis alimento clucet 214, 33.
 Coma, quid 99, 58. 324, 63. symptoma phantasie infirmæ 99, 60. 566, 45. cephalalgici crudoris prima soboles 92, 33. ab exolutione 57, 35. à materiæ crassitudine 48, 61. *ἡ ἰσχυρὰ* consistit 207, 21. 220, 58. 224, 17. in conjunctione cernitur pene inuicem, planèque iniussa 220, 57. 527, 25. id & catocæ vt differant 27, 56. 224, 16. phrenitidis & causo *ἀσύντων* 48, 64. quoddam, phrenitidis consecutæque 49, 21. id & conuulsio, an simul existere possint 207, 20. id & parotides, ab humoribus crassis & frigidis 36, 13. cum furdicate, cephalalgia consecutarium, facit vt assurgant parotides 92, 29. 103, 13. periculosum, reddit funestum, proluuiis alui prærubra 542, 36. superueniens biliosis liquidis ex aluo primū descenditibus, post stercoreosis, tumorem ad aures facit 568, 33. quos inuadit super spumantibus deiectionibus; iis est febris exacerbata 577, anxiosum, quoddam 176, 37. anxium, homini necando ipsum per se satis 199, 22. duplex, *ἡ πῦρ* & *ἡ γῆρας* 99, 56. simplex aut mixtum 99, 61. simplex, vnde 99, 63. semper *ἡ πῦρ* 99, vlt. simplex quoddam mortiferum 101, 60. comatis simplicis *ἡ πῦρ*, in resolutione 104, 6. coma mixtum, monitum biceps phrenitidis & lethargi 99, 62. 101, 17. mixtū, semper *ἡ γῆρας* 99, 64. 100, 24. mixtum, tremore & conuulsione potest finire 207, 23. ab oppressione natum, quomodo excutitur 102, 62. genus alterum symptomatis cataphorici 99, 53. veterosum, primum oppresso cerebro, mox exolutio, accidit 401, 25. vigil & soporatum 272, 34. 575, 35. vigil, à pituita & bile permixtis 556, 53. 575, 38. soporatum, à simplici pituita, viscida & cruda 575, 40. in comate vigili cernuntur pathognomonica cerebri multum oppressi 285, 22. comatis vtriusque commune, oculis, veluti in somno arctissimo, conuincere 100, 1. comatosi etiāque quid habent conuulsificum? 103, vlt. comatosi qui cum febris incremento conuelluntur; iis assurgunt parotides 560, 30. comatosi, fastidiosi, hypochondriac dolentes, sæpe & parum vomentes; aurium habent abscessus 566, 41, 42. comatosorum oculi quales 90, 26. 99, 56. comatosi familiaris conuul-

sius motus 560, 17, 31. comatosi & pigris à pondere & oppressione, profuerit alium ferri liquidis excrementis 556, 61. comatosi vigiles, & vnā possunt esse phrenitici, & phrenitidis successione habere 100, 32.
 Complexionis mutatio frequens ab intemperie 312, 30.
 Communia & vicina, prima omnium & maxime laudantur 126, 40. 380, 34.
 Concoctio, naturæ officium 516, 3. partium solidarum manus proprium 288, 30. 358, 15. materiæ, frustra in parte aliqua suscipitur, si vniuersitatis excrementa sint cruda 29, 52.
 à Concretionem, nulla suspicio duritatis, nisi per accidens 300, 27.
 Concussio, caloris viuifici afflictionem infert 1, penult. fortis, signum *τὸ ἰσχυρὸν* in substantia; *τὸ δὲ δυνάμει* in officio 290, 33. non omnis bona 248, 18. in concussione, natura potens causæ morbificæ 290, 30. à concussione eadem variæ cientur excretiones 477, 20. concussio in sternutamento, singultu, rigore 290, 32. in tussi, vel sponte sua, vel nostrâ excitatur 290, 31. inter concussionem *ἀνγύρῃ*, & nauicam quæ facit *ἐκ τῆς ἀνγύρῃ*, quid interest 34, 22. concussui motus ubi cernuntur 272, 44.
 Coniectores veri, qui fuerunt 52, 19.
 Consuetudo naturaliter instituta, vt naturam indicat bene moratam; sic ipsam reficit, recreat, & conseruat 404, 22. consuetudinis naturaliter institutæ ratio, naturæ conseruatix 404, 44.
 Contagio facilis principiorum & productorum 100, 19.
 Contentio nulla naturæ, quantumvis iure & loco suscipiatur, sperabilem crisin ostendit, nisi *ἡ πῦρ* 203, 7. ex Continendi impotentia, egestio præcepta 442, 60. Contumacia sunt, ex ancipiti alea vtriusque iudicij 29, 57.
 Contraria contrariorum consequentia 119, 12. 124, vlt. 151, 16. 163, 60. 248, 9. 258, 16. 264, 38. 429, 10.
 Conuulsio, quid? 17, 15. 84, 44. 157, 19. 221, 29. 222, 24. 225, 30. 378, 49. 407, 33. 421, 42. 466, 21. 484, 61. 500, 33. musculorum propria 27, 14. 193, 52. symptoma nervorum principij 57, 57. nervorum symptoma, præ siccitate nimia contractorum 213, 21. nervi inflammati symptoma proprium 416, 46. consistit *ἡ πῦρ* 104, 7. 193, 51. 107, 21. 220, 59. laxitati contraria 220, 52. nascitur à repletionem vel inanitione 27, 14. conuulsionis causæ quænam 221, 64. vis in motu iniussa 193, 54. eius & concussionis idem genus 27, 11. eius & concussionis discrimen 27, 11, 12. conuulsio sæpe consecutaria magnorum & prauorum vulnorum 213, 62. nulla bonis ægri sit rebus 17, 11. puerorum formidabilis, quamvis sæpe non funesta 16, 60. 84, 43. conuulsionibus quando corripuntur pueri 16, 63. conuulsione in febre non tentantur septem annis profectiones: sin autem, desperati 226, 34. in conuulsione, motus amissio, non sensus 373, 34. doloris summa omnia 228, 15. natura impotens causæ morbificæ 290, 31. parumper obmutescere, aut linguæ apoplexiam, aut brachij, partiūque dextræ lituram denunciat 369, 61. diu obmutescere; malum 229, 21, 43. 369, 60. conuulsio paralytica, quid 193, 55. ea & paralygia simul in eodem subiecto existere non possunt 193, 50. paralygiam sanat 272, 39. à stultento spiritu 221, 1. melancholiz soboles 5, 47. quibus adest, vrina supprimitur 560, 3. febrium acutarum prænuncia, ferè habet symptomata paraphorica 226, 56. in phreniticis, quoddam symptoma 150, 8. quænam vitilis 449, 31, &c. quænam febris finem adfert 17, 13. 84, 33, 56. 157, 33. 373, 38. ab hæmorrhagia quæ cecidit à vulnere, quando accidit 421, 52. in mania, vnde 378, 51. conuulsionis difficilis redintegratio 222, 16. repentinæ remedium, febris & alui profuuium 229, 9. in concussione mutatio salutaris 221, 42. 272, 40. in tremore metaptoxis, melior quàm contraria 224, 37. eius & paralyticos par & æqualis immobilitas 229, 54. motu violento concutitur, atque vi summa excutitur materia omnis paralytica 449, 43. exolucendæ ratio per diarrhoeam, quomodo suscipitur 467, 20. conuulsioni febrem superuenire melius, quàm febri conuulsionem 17, 11. Conuulsionem conuulsione exolui, absurdum 193, 64. & crassis frigidis humoribus natam liberant vrinæ crassiores 564, 32. quæ sit distentis nervis humore frigido & glutinoso, exolucendi ratio triplex 228, 47. resolutioni superuenire præstat, quàm contraria 194, 5. 449, 44. sanat exorta febris

orta febris acuta, quæ prius non fuit: quod si prius fuit, exacerbata 227, 33, 325, 45, 358, 2, 466, 25, 56. verustam frustra oppugnant vacuatio & neoterismus 466, 62. sanare, proprium menstruorum; non muliebrium cæterorum 466, 34. conuulsiois finem adferunt muliebricia quæ primum aut statim apparent; atque id sine febre 466, 11. conuulsio in viris, non, nisi oborta febre acuta, quiescit 466, 19. conuulsiones mulierum hysteriarum fugaces 17, 8. quæ sunt hysterici febre vacuis; faciles 484, 22. sine febre quæ cadunt in hystericas; faciles 222, 11, 22. *δι- 368*, simili ratione, qua homines *δυσχεῖς* aut *δυσχεῖς* 485, 40. conuulsiois & singultus, ab æquali siccitate, paroxa 27, 17. conuulsiones quænam lethales 17, 19, 421, 58. *νεκρώσεις*, crebræ singultibus & alui torminibus 471, 30. omnes per iniussam contractionem natæ, crudelissimæ 337, 54. conuulsio ventriculi ab exhausto, insanabilis 500, 32. à siccitate, mala 84, 54. ab exhausto, lethalis 17, 24, 325, 47, 500, 43, 574, 55. omnis ab inanitione, mortifera 213, 29. ab hypercrisi hæmorrhagica; mortifera 500, 50. ab hypercatharsi; lethalis 27, 19, 500, 49. quæ super elcboro venit; mortifera 501, 14, 20, &c. principii febris superueniens, metienda 17, 2. febris superueniens, omnino funesta; perfero puerulis 156, vlt. 157, 2, 226, 33. insanabilis & mortifera, cuius exolucio cita non est 466, 60. insaniam cæcatoria; pessima *ἡπέρθετος* 378, 6. à tramatæ quando nascitur 421, 36. à tramatæ exorta; mortifera 225, 17, 226, 20, 305, 51, 421, 29. è diuerso partis præcisi in tramatæ temporum, vnde 407, 51, &c. 415, 49, 416, 3, &c. conuulsiois quæ tramatæ capitis superuenit, tam è diuerso, quàm è directo, quænam causa 226, 11, 415, 44. conuulsio partium quæ sunt è diuerso pertusæ, miraculo quibusdam visa 415, 42. conuulsionem mortiferam & sæuos dolores denunciant testes & pudenda contracta 396, 29. conuulsarum partium vel iniussa est contractio, vel simplex collectio 337, 16.

Cor, viscus nobilissimum, ipsum per se micans 276, 36, 309, 26, 427, 1. cordis coagmentatio tribus intexta villorum generibus 427, 19. cor, caloris natui fons & officina 139, 31. domicilium *τῆς σπύης* 111, 34. in corde principium & fons vitæ, ac principium vitalium facultatum 427, 2. cor etsi principium vitæ, ramen principatum non habet sensus & motus, vt cerebrum 408, 61. à corde perennitas nectaris viuifici 254, 63, 438, 51. cor consentit per arterias 139, 30. iracundiæ inseruit 374, 61. pro stomacho, apud Hippocratem multis in locis 477, 2, 478, 29. pulmonum fibris circumuolutur 276, 38. cordis & pulmonis sympathia & syntimoria magna 276, 28. frigidior temperatio, angustiam secum adfert partium spirabilium 271, 10. villis, diafoles & systoles officia continentur 427, 19. diafoles quænam commoda 427, 6. per cordis diafolem sanguis vnde hauritur, ad viuificum nectar 427, 13. cordis systoles quænam commoda 427, 7. cordi micandi potentia per villos 427, 4. cordis villorum offensio, vitæ officia tollit ex corde 427, 20. dolores, exclusio sanguine discedunt: non exclusio, interimunt 565, 35, 36. vis efficta, vbi deprehenditur 5, 12. prægrandis vulneratio; mortifera 409, 55, 418, 7, 424, 32. corde penitiùs, ac ne leuiter quidem læsiato, mortis nulla effugia 427, 3, 11. abulso, aliquantisper manet animalitas 408, 62.

Corporis vniuersitas, ex quibus consistit 392, 28, &c. principatum trium potentia regitur 392, 61. expurgatur per aluum, atque per vesicam & renes 332, 49, 364, 36, 505, 29. corporis constitutio optima, quæ 38, 47. bene constituti quænam argumenta 394, 4. qualitas in quibus certitur 391, 43. vniuersi vitia, tam intrâ, quàm extrinsecus, per diarrhæam aut perirrhæam exolui; non nouum 343, 40. eius & artuum indecora collocatio, cum vel inuita est, vel iniussa 400, 18. corpus vniuersum omnino similiter constitutum vt matrix 480, vlt. 481, 1. effectum & languidum, vnde 386, 23. graue & plumbeum, vnde 386, 21. impurum quò magis nutritur, eò grauioribus damnis augeatur 46, 4, 213, 53, 392, 26. tuberculis obsitum, cum excretionem biliosa; intus ægrota 392, 23. corpora exercitata & coacta, celerius intereunt quàm quæ in otio consistantur 270, 63.

Coryza, quid 130, 27, 271, 59, 272, 3. vnde 271, 61. coryza nomen, omnem catarrhicam repleti capitis expressionem complectitur 382, 32. coryza & raucedines de crepitis non maturescunt 437, 1.

Costarum fracturarum suspensio ex aluo iciuna, facit do-

lorem 441, vlt. 450, 61.

Coxx, quid 41, 3. coxa interarticulos principatum obtrinet 79, 60. coxx pro lambis, Celfo 180, 27.

Crassi natura qui sunt, celerius, & raro & casu, moriuntur, quàm graciles 271, 25.

Crisis, vnde veniunt 393, 10. à calore natui & partium solidarum virtute 514, 3, 4. crisis, mutatione perficitur 167, 21. ad crisin faciendam, dici ratio in primis necessaria 506, 64. dum itur, spissari oportet excrementum 294, 47. breui venturam, par & æqualis ratio est cause mouentis & eius quod mouetur 515, 12. sperabilem, signorum omnium quæ cernuntur in qualitate corporis; actionibus & excrementis, conspiratio esse debet 515, 33, 34. crisis bona ferè fit in ordinario paroxysmo 25, 37. crisi bona nihil melius 378, 1. crisis certa & cita ad ægri salutem, quam colorata bellè vrina denunciat, habetque hypostasim albam & læuem 513, 47. cita morborum, quorum cita mutatio 248, 31, 50, 252, 20. cita & perfecta, non sperabilis ex imperfecto signo 135, 51. citò aut serò ventura, pro gradibus coctionis 135, 47. crisin citam adfert cita concoctio & expurgatio 250, 45. ad crisin citam, quænam tria necessaria 512, 33, 34. crises celeritatem morborum illorum qui celeriter, continenter, & vehementer mouentur 165, 24. crisis fida, quando 505, 45. firmissima, quænam 82, 40. crisin firmissimam denunciant somni arctiores, nec turbulenti 377, 48. crises operatæ ex quibus veniunt 513, 17. crisis ad ægri salutem suscipitur atque absoluitur à natura 546, 43. pariter & similiter fit hebdomade altera, sicut prima 253, 38. morborum acutorum, quibus diebus suscipitur 455, 28. crises acutorum, potissimum excretionem suscipiuntur *ἐξω καὶ εἰςω* 527, 54. morborum quibus eorum discessio est, suscipiuntur & absoluntur aliæ humoris morbifici excretionem; aliæ abscissu 527, 49, 50. crisis per excretionem quibus ætatibus suscipitur 436, 24. occasione & causa per excretionem præcepta, inclinatio sit ad abscissum 79, 4. crises multorum morborum thoracis atque neruorum, suscipiuntur & absoluntur per vrinæ meatus 509, 35, 36. morborum diuturnorum, nec simplices, nec vniuersi modi 70, 27. non raro sunt variæ 14, 14. variæ, morbi eiusdem esse possunt 22, 1. variæ sæpe cadunt in morbos acutos 217, 46. *crisem* varietas vna eademque rigoris confusione denunciari potest 14, 16, 22, 2, 204, 54, 217, 47. futurarum argumenta non minora in qualitatibus corporum, quàm in pepasmo humorum morbificorum 124, 59, 135, 41, 249, 1. inclinationes eò sunt, quò natura & humor cursum inflectunt 50, 38, 89, 13, 166, 50. crisis salutaris, liberali & libera excretionem humoris morbifici victi à natura, suscipitur 543, 18. septimo erit, quibus nubecula est die quarto 512, 35, 514, 34. quænam propria febris ardentis 71, 43. perfectæ instrumenta duo, quænam 74, 43. perfectio sperari nequit cum vrina spumante bullata 541, 14. verè semper est *ἀλυσίτη* & *πυρίτη* 182, 10. crisi instanti, alimentum non exhibendum 33, 15. in crisi secunda, decimi quarti diei magna laus 254, 4. à crisi leuatio fida, quando 505, 45. à crisi, post diuturnum somni vacuitatem soporari, non malum 401, 27. in crisi omni non semper est tantum securitatis, quantum prima specie utilitatis 488, 61. crisis semisua propriè non cadit in morbos absolute acutos 74, 44. crises, diurnum anormes, faciunt *δυσκρίσιαν* 45, 47. crisis, pro sinistro indicio 134, 39. pro interitu, non nouum 381, 47, 450, 46, 504, 15. nulla ad salutem fit, vbi ad calamitosam vim morbi accedit summa naturæ infirmitas 231, 52. nulla bona, quæ indicata non fuerit ad speciem & ad tempus; tunc, quæ diem paroxysmi non occuparit 467, 47. nulla bona sperabilis, ex sudatiuncula 19, 56. nulla sperabilis crisi initia 215, 58, 347, 38. nulla sperabilis in humore crudo 9, 41, vlt. 14, 13, 46, 40. nulla post quadragesimum expectanda ante sexagesimum 281, 44. crises non sperabiles à 40. ad 60. ætatis annum 375, 23. tardæ tumorum mollium & doloris expertum 167, 24. crisin difficilem, inchoatam, relapsus capacem, variam, nec ita securam efficit tarda concoctio & expurgatio 250, 46. incertam nec stabilem denunciant somni turbulentis cum labore corporis 377, 49. ad crisin motus omnis dic *ἀκρίτη*, *ἀκρίσιαν* inducit 505, 46. cum crisi, grauis rigor 198, 41. de crisi propria morbi cuiusque, vitæ salus non sperabilis, nisi vrinæ laus adiuncta sit 535, 41, 42. sine crisi nihil quiescit bonis ægri rebus 184, vlt. sine crisi quæ dolorifica residunt, praua sunt 296, 44. critici dies, quinam 24, 3 & 4. critici dies, indicantes, iudicantes, in-

terecales 45, 60. critici dies, velut arbitri & indices disceptationum naturæ & morbi 74, 34. criticorum dierum ratio quomodo in eunda in acutis 253, 39. criticorum dierum quorundam est *σωατῆρας*; aliorum *δυσωατῆρας* 439, 33. criticis diebus certamen naturæ & morbi in prociūdu 202, 13. iis quæ apparent & fiunt, firmiora quàm quæ aliis morbi temporibus 9, 54. 202, 21. 205, 24. 236, 13. 263, 22. 564, 59. 60. 224, 1. critica ratio, quænam secundi iudicij 505, 40. critica perturbatio à naturæ contentione 493, 41. critica causæ omnes exiguæ, pessimæ 173, 41. criticum nihil paucum 7, 9. 19, 56. 74, 11. 94, 35. 191, 59. 212, 56. 215, 25. 230, 14. 295, 31. 338, 47. 372, 53. 494, 16. 503, 35. 544, 30. 554, 63, 64. critica omnia ibi *δυσωατῆρας*, vbi non sunt eiusmodi qualia solent esse in crisi 508, 21. critica, ne citò appareant 46, 39. 42. 235, 52. 55, 248, 55. 508, 20. nulla bene fieri nec apparere possunt in signis & causis mortiferis 523, 10, 11. quæcunque sunt signa, si eadem non sint eiusmodi; sinistram sunt crisi 347, 26. sine crisi, mortifera aut sinistri iudicij 286, 42. 347, 23. 496, 1. 422, 12. 505, 47.

Crotaphitarum tendinum, subter zygomate insertio 133, 14. de crotaphitis, vide sub litera M, ad nomen *Adysculi crotaphita*.

Crudititas, statum parens 332, 38. 389, 8. cernitur in proprio excremento 527, 58, 59. tarditatem crisis & recidivam denunciat 98, 7. cruditis quando mutatio est in pepasmi, bene res eunt 347, 60. eius & pepasmi vicissitudo pessima 295, 34. eius & coctionis vicissitudo, paræ morbi & naturæ dominarum arguit 512, 22, 23. victæ, & restitutæ virtutis peristalticæ intestini, signum, borborygmus 389, 11. in egressione quò longius itur, ac maior naturæ infractio est post irritas primas *ἰσώδεις*; eò tardior esse solet redintegratio, & febris dimissio 514, 63, &c. cruditate tenuia manent excrementa 519, 11.

Crura perfracta, in lecto extendi debent 400, 17.

Culices, vermiculi alari 498, 63. culicis aculeo, cutis bullatur 498, 59.

Curandi leges nullæ pro iis qui vitam sectantur voluptuariam 327, 15. curandi ratio omnis suscipitur & absoluitur vacatione alieni humoris, & neoterismo corporis è natura egressi 481, 12. curatio est, morbo resistere ac repugnare, nec conspirare cum eo 330, 4.

Cutis alba à frigore perurit, & fulva euadit 545, 40. dura, quando 122, 11. rigida, quomodo fit 4, 41. rigida quando existit 4, 45. rigida quomodo dicta Hippocrati 4, 58. scabra, à pruritu & scabie 568, 12. ad squalorem, quibus gradibus peruenit 568, 12, &c. squalida, ventris labem significat 568, 3. similiter in bullam assurgit punctioibus apum & vesparum, vt stimulus & aculeis culicum 498, 62. corrugatio, ab extenuatione perfecta 562, 24, 25. laxitas, ab extenuatione inchoata 562, 24. fedatæ lichēnibus, alphis, leuce, & lepra; alia ratio quàm exanthematum 499, 11. vitia quorum cita est impressio, quibus nominibus appellantur 499, 2. vitiorum quorum cita est impressio, materialis causa ad ichorem collectionem refertur 499, 3, 4. cuti bullandæ veneni vis par inest insectis aculeatis, quanta infertur ab acri & venenato ichore 498, 64. cutim bullando magis quàm vlcerando, idonei humoris crassi 499, vlt. cutim vlcerando magis quàm bullando, idonei humores tenues 499, vlt. in cute squamulæ assurgentes, vnde 568, 16.

De Cynanche, vide sub litera A, ad nomen *Angina*.

D

Δe particula, quid indicat 114, 28. 163, 3. 331, 39. Decubitus, actio quædam 112, 4. 556, 55. decubitus naturalis, in alterutrum latus 56, 37. 56. 304, 18. perficitur officio facultatis 393, 49. decubitus priuatio, *ἑπὶ πλάγι* 112, 4. decumbendi ratio illa demum est optima, quam vnusquisque seruat dum valet bene 399, 11. in actione posita virtutis quæ portat & mouet 399, 31. vegetæ animalis potentia imperio perficitur 399, 30. in decumbendi habitu omni, nullus est maior è natura egressio, nec magis actio indecora, quàm eius qui sit in ventrem 401, 55. in decumbendo, meteorismi alacritas quid ostendit 394, 27. quænam commoditas querenda 399, 36, &c. decumbentem ægrum oportet deprehendi à medico 399, 27. 402, 44. non decumbit, qui supinus iacet in lecto 399, 59.

Degluendi & spirandi libertas necessaria ad vitam tuendam 236, 61. degluendo, multi violentè intereunt 243, 52.

Deiectio, quid 178, 36. vnde 441, 35. est optima, mollis, coagmentata, subrufa, nec valde graueolens 544, 49. in deiectione optima lucet naturalis œconomia integritas, in digerendo, coquendo & excernendo 545, 10. deiectionis optima naturaliter coagmentata; optima 553, 52. deiectionis optima indicia syllogistica quænam 545, 13, &c. nulla firmior indicatio, quàm de ipsius colore subrufo 545, 44, 45. deiectionis coagmentatio mollis & figurata, opinionem tollit caloris ignei corruptentis 545, 58, 59. deiectioni vbi est molliter coagmentata atque subrufa, fecdi odoris occasio nulla esse potest 545, 57, 58. molliter coagmentata, suo termino continetur, non alieno 545, 26, 27. deiectionis mollitudo, signum alui conficitur vt decet 545, 17. deiectioni mollis, quænam 545, 15. deiectionis figuratæ vsurpatio absurda ad laudem, si mollitudo absit 545, 23. deiectioni vbi naturaliter est constituta, lumbricorum nulla commoda 546, 64. deiectionem transmitti oportet, qua consuevit hora, & ea copia quæ assumptis respondet 544, 50. 546, 1. deiectioni nulla, caret peristole 552, 23. alba, quomodo fit 22, 46. alba, quænam dicitur 22, 43. alba, à pulcritudine filiginea 22, 44. deiectiones albæ ictericorum & phreniticorum, vt differant 52, 55, &c. albæ in ictericis, interclusa bile ad aluum 22, 12. 38, 12. 522, 24. deiectionis æruginosæ quænam causa 206, 55. deiectioni à qua bilis fecerunt, duplex; diffuens vnæ altera figurata 548, 26. diffuens; quoties chylus ergastulo exclusus melaraicarum, effluit intestino 548, 26, 27. figurata; pultacea stercorosa 548, 28, 29. deiectioni pultacea stercorosa, peior spumante biliosa 548, 20. deiectionem pultaceam stercorosam deiiciunt icterici, obstructo vel scirrhuso icore 548, 30, 31. 558, 33. deiectionum biliosarum duplex ratio 25, 53, &c. 159, 62, &c. deiectiones biliosæ, indurata sorditate, subsistunt 109, 6. 208, 49. permixta velut ramentis lentis, cicerisque stercorum 569, 54. deiectionis coloratio subrufa, pigra esse non sinit intestina in egerendo 545, 59. deiectionem crassescere decet ad crisin 546, 21. deiectiones caprarum, quales 560, 59, &c. deiectioni dura, sicioris est alui 545, 16. deiectionum duritas, siccitatis nuncia 178, 47. deiectiones cur duræ 334, 56. deiectionum durarum & vi expressarum tres causæ, & quænam 549, 22, 25, 35. deiectioni fermentata, quænam 550, 13, &c. deiectiones fermentatæ, torminibus fortæ dysentericis 550, 22. deiectionum genituræ similium ratio diuersa 338, 53. deiectioni glutinosa, quænam 550, 3. larga, mictionem paucam habet 564, 30. liquida, humidioris est alui 545, 16. liquida si copiose, libere, ac rarò ducatur, crassescitibus excrementis, dum itur ad crisin; bona spe recreat medicum 554, 5. liquida, duplex; ventris indigena, & illius aduena 554, 50, 51. liquida, ventris indigena, de impotentia est coquendi aut continendi 554, 51. ventris aduena, de humore est prorupto, vel è visceribus, atque è venis, totòque corporis habitu; vel ex capite 554, 52. liquida, ventris aduena, sæpe ducitur ad crisin morborum 554, 58. deiectionem, si liquida est; profuerit non stridere 397, 39. deiectiones quæ ex diffuentibus liquidis sunt figuratæ, in modum stercoris; longitudinem morbi significant 560, 42. deiectioni liquida quæ multum ac sæpe mouetur, aut sæpe ac parum; malefica 554, 39. liquida quæ multum ac sæpe mouetur, vigilias infert 554, 40. liquida quæ sæpe aut parum mouetur, virium exolutionem infert 554, 40. liquida veteriosis iacentibus, pessima 556, 42. perliquida, neque quiescens, in morbis acutis; mala 555, 25. deiectionum optimarum æqualitas, caloris vi contra naturam perficitur 512, 45. deiectioni pura, quænam 578, 13. pura cum sudore; febrem exoluit 578, 12. rufa eadem cum fulua 543, 37. subrufa sic naturaliter coloratur à bile subrufa 545, 36. rufa, in vicio est de bile immodica, vnde fucantur faeces 545, 37. in deiectione spissa & figurata quæ antea circumfluebat, apparet pepasmi humoris 547, 20, 21. deiectioni cur spyrathosa 61, 42. stercorosa cum tensione, laborem alui denunciat 562, 43. symptomatica, vnde 555, 12. tenuis, indicium cruditaris, coctionis priuatione 551, 35. deiectiones vix vi ductæ, globulosæ paræ, & nigrae 549, 42, 43. deiectionis foedus odor, vnde 545, 54, &c. deiectionis foedus odor, *ἡκεῖν οὐ μὲν ἔχοντες* 545, 53. cum deiectionibus profuerit teretes vermes vnà exire, dum morbus ad crisin progreditur 546, 51. quodcunque deiicitur sine sensu; lethale 571, 2. deiiciendi crebra & ægra cupiditate, somnus adimitur 555, 4. deiectioni omnis à qua absit naturalis coagmentatio, magnum subesse malum testatur 553, 53. graue

grane malum subesse ostendit, cum ei natura iam effecer, feritas maior adiicitur 551, 17. alba omnis, contra naturam 558, 32. alba stercoreosa, ictero difficilis 561, 12. alba phreniticis, mala 9, 34. 548, 7. cum deiectione alba qui phreniticis euaserit, Hippocrates vidit neminem 545, 43, 44. deiectione prae alba funesta in phrenitide, cui succedat vomitus 548, 48. deiectiones albae in phreniticis, propter magnum incendium superatum partium iccoris, quo sanguis vna cum bile absorberetur 522, 24, &c. deiectione, bile plurima ad saturitatem tincta; mala 548, 22, 23. biliosa omnis tincturae expertis, peior saturata plurima bile 548, 23. biliosa syncera, spumant ardore visceris vnde manat 547, 54. bilis spumantis atque syncerae quamquam mala habet insignia 548, 1, &c. deiectione cum biliosa, quibus premittitur morsus pectus, amarescitque os; malum 498, 41. in deiectione biliosa, spuma rutila ab incendio viscerum efflorescit 551, 19, 20. deiectione copiosa frequens, de lipothymia metuitur 562, 27. deiectiones quae plenius colorantur, prauae 559, 25. quae plenius colorantur, nigrae; pingues; liuidae; arguminae, foedi odoris, praerubrae, & pluviam flauae 559, 34, 35. deiectione tanto peior, quanto coloris est magis horridi 552, 60. crebra & aegra, cum somni vacuitate, & corpus facit infirmum, & feritatem humoribus maiorem adiungit 555, 8. cruenta, duplex vnum ciet hepatis *δυσχολία*; alteram fundit ipsius *αίτιον* 548, 50, 52. periodica & fugax, sit virtute iccoris 100, 56. 206, 54. ab hepatis *αίτιον*, Hippocrati est, *πύρεξιν αὐτὴν ἐκ τῆς κατὰ τὴν φύσιν* 548, 52, 53. cruenta omnis, pestifera; ea excepta, quae statim periodo, duce natura cietur *λαύρος καὶ ἰσχυρὸς κατὰ τὴν φύσιν τῆς φύσεως* 491, 31. 550, 44. non minus adiicit cari periculo nati ex phrenitide, quam vigilis comatis in phrenitidem transeuntis 548, 56. perennis, torminosa, & carniem loturam similis; exoluti iccoris & pene emortui argumentum 206, 54. diuulsa, semper praua 554, 20. subdiuulsa in multo liquore, perfrigidescens, nec febre caret; pestifera 555, 23. multum fermentata, subpituitosa; praua 549, 61. mollis, friabilis, in febre; praua 553, 44. cur nigra 61, 43. nigra, à pulicula leporina 22, 45. nigra bona, de haemorrhoidibus intelligenda, non de faecibus 553, 19, 20. deiectiones nigrae viris & iuuenibus minus tristes, quam reliquis 573, 2. nigrae, post arguminae 98, 40. deiectionum nigredo, ardoris quo consagrant viscera, nuncia 178, 47. deiectione nigrosum omnis per intestina, calamitosa 219, 9. 571, 64. nigrosum, *μυρῶν καὶ τὴν ἡλικίαν* viscerum denunciat 206, 45. nigrosum ab haemorrhagia; praua 572, 3. nigra sponte ducta, maleficio apponenda; sperabili salutem, quam mouet pharmacia conuenienter praescripta 553, 24, 25. Deiectiones nigrae quae sponte sua, & pigro lapsu exeunt; damnantur 210, 6. nigrae, cuiusmodi est sanguis niger, quae vna sponte cum febre, & sine febre ducuntur; pessimae 345, 59. 558, 51. deiectione sanguinis attri nulla bene fit, vel ipso deiciendi modo 552, 24. sanguinis attri iniussa, hepatis *αίτιον* denunciat 553, 26. deiectiones sanguinis attri optimae, cum liuidae & arguminae foedi odoris; partim ex *αίτιον* viscerum; partim ex iis partibus quae liquantur aut sunt emortuae 552, 45, 46. qui deiciuntur nigra; frigidum illi exudant 564, 2. 572, 20, 59. deiciuntur nigra, qui vna cum morsu & cephalalgia contremiscunt 573, 33. cum deiecerint nigra qui à morbo emacruerunt, postmodum moriuntur 553, 21. deiciendo, sanguis emittitur clarus & splendidus; rupta, exesa, vel aperta vena in aluo 550, 42. deiciendo, sanguinem clarum emitti; malum; idque cum aliis, tum si quis dolor adest 550, 33. deiectione sanguinis grumosi vnde 188, 23. parca & glutinosa, vel laevis atque fluuiana; graue malum ostendit 556, 24. deiectiones pingues, nigrae, liuidae; lethales; maxime si graecolentes fuerint 569, 53. deiectione pituitosa facta protinus, cum pectoris morsu, dysenteriam; forte & lumborum dolore denunciat 563, 1. prae alba in febre, non est indicium fausti 561, 60. praerubra in febre, delirium arguit 561, 2. 567, 56. praerubra in alui proluuie; praua 556, 6. praerubra cum alui tensione; ipsius labem alui nemonstrat 576, 40. purulenta quae finem adfert crudelis dysenteriae; non praua 551, vlt. in deiectione purulenta, pus album, aequale, minimum graecolens; ancipitem habet euentum 551, 61. Deiectione purulenta, & sanguinis attri; praua; idque tum in febre; tum aliis 551, 51. purulenta hepatica de coctophymate aut corrupto; fini-

stri vel ancipitis indicij 551, 59. purulenta illa est praua, quae puris formam ostendat, partis corruptae indicem vnde venit 552, 2. in deiectione purulenta, pus aeternum & foedi odoris, funestum 551, 60. deiectione puris ab hypochondrij empyemate; periculosa; tum per se, tum ex euentu 552, 11, 12. quae ex concretis enatat subliuida, purulenta simul & biliosa; pestifera 549, 62, 63. sicca, dissepita, caloris expertis; praua; idque cum aliis, tum si liquidum alui reddit 553, 45. spumans, quoniam & vnde 547, 53, &c. spumans iniussa, in vicio est 192, 1. in deiectione spumante biliosa, duo granissima; bilis eximie saturata, & spuma 547, 62, 63. deiectione spumans in acutis, vndique biliosa; mala 547, 40. spumans eximie biliosa, aut circumfusa bilis praua 550, 55. deiectiones spumantes, ac magis quam decet colore saturata biliosas, magisque calidas, melicraurum syncerum potius ciet quam aquosum 547, 57. deiectione spumans valde; spumam habet aequalem, proptereaque praegrandem & pessimam 551, 36, 37. à deiectionibus iis quae in spumantes synceras desinunt; ingranescit morbus 559, vlt. 560, 1. deiectiones quae in spumosas & synceras desinunt; morbos exacerbant omnium; maximeque conuulsorum 559, 53. deiectione tenuis valde spumans, cuius est aqueabilis hypostasis; praua 551, 31. syncera, quoniam 550, 4. deiectiones syncerae, à feri naturalis exhausto 559, 36. deiectioni syncerae, dysenteria superuenit 42, 11. deiectiones syncerae prauae 24, 40. 553, 13. 559, 53, 56. in diuturno morbo, malae 42, 10. deiectione humorum synceritate insignium, pestifera 552, 41. deiectionibus synceris & variis aequo periculo locus est atque nigris à sanguine: sed haec ocyus, illae serius praecipitant homines ad exitum 552, 43, 44. deiectiones variae & syncerae, quoniam 552, 48, &c. deiectione, varia, & saturata; praua 552, 34. deiectiones variae & variegatae, ad diuturnitatem sunt morbi 24, 48. variegatae omnes prauae 559, 25. deiectione variegata, signum perniciosum affectionis prauae in visceribus multiplicis, & varias partes occupantis 559, 38. multum viridis; item alba vel spumans, vel aquosa; praua 556, 23. deiectiones virides aetate virili, non semper sunt cum maximo damno coniunctae 572, vlt. deiectione viscida, nigro sparsa, illis maligna qui sanguinem profudere è naribus; maxime subalbidis 561, 41.

Delirium, vnde 100, 27. 139, 32. symptoma cerebri proprium 87, 32. symptoma cerebri, effera bile perfusi 72, 16. symptoma alterati vel proritati cerebri 314, 50. 380, 40. symptoma phrenitidis nae & procreatae in cerebro 49, 50. delirium & catocoe non semper *αὐτοματὴ* 57, 46. deliria est haemorrhagiae, ab humoribus calidis & tenuibus 36, 12. delirij notae, cur potissimum luceant in deprauato & feroci oculorum motu 12, 47. signa quatuor, & quoniam 398, 1. proprium signum, magna & rara spiratio 149, 48. 150, 22. nulla suspicio, cum laeui doloris acerbitas, vincit exultant in omni vita modestiam 398, 6. deliria quoniam circa res necessarias versantur 55, 30. quae continuè exoriuntur, cum iactatione coniuncta, haemorrhagiam ciet 103, 19. delirium non perpetuum, symptoma humoris morbifici proprium 103, 33. nullum perpetuum, praeter phrenitidem & insaniam 103, 34. nullum potest esse *διωκὲς*, quando in ceteris partibus, pituitae & bilis offensiones, cerebrum in sympathiam & contagionem adducunt 462, 64. somno miscetur 96, 30. grauius malum quam tremor 72, 26. superuenire tremori; melius quam contra 37, 2. 43, 52. 126, 50. 138, 39. 224, 36. 378, 61. fractis viribus superueniens, pessimum 13, 15. in difficultate spirandi cum singultu coniuncta, mortiferum 51, 30. in spiratione minutula, & sudariuncula; citam mortem denunciat 51, 29. in delirio qui vocem canoram edunt, lingua conuelluntur 55, 58. deliria comarorum vigiliam, typhomania 314, 52. lethargicorum, cataphorica, & cum cita obliuione coniuncta 314, 51. melancholicorum, silentes dementiae 314, 57. nugigerulorum, dementiae à sanguine non ita multum acri, nec multa bile perfuso 314, 56. phavaricorum, insaniam summa omnia 314, 54. phreniticorum, perpetuae cum vigiliis & febre dementiae 314, 53. omnia cum sopore coniuncta, con-

nulifica 42, 51, 91, 2. cum palpo coniuncta, valde phrenitica 57, 33, 97, 52, 156, 34, 450, 58. paulisper ferocia, mox erunt immania 142, 31, 197, 60, 398, 3, 520, 54. cum exolutione virium firmiter fixa; mortifera 112, 25. deliriorum idea varia, pro varia suscipientis & efficientis causæ natura 314, 50. superuenientium signa quatuor 28, 34. primum, 35. secundum, 36. tertium, ibid. quartum 37

Dementia, quid 149, 46. dementiae omnis prænuntiatio *ἡ ταραχή* 453, 44. signum, respiratio magna & rara 380, 58. quæ primigeniam in cerebro causam habet, signum *ἡ ἀνοήτης*, spiritum sublimè foras, vel intrò ducere 380, 51

Dens, quid 138, 54. dentes quot 138, 11. vtriusque per gomphosin dearticulati 138, 12. dentium differentia tres 138, 11. dentes exarescere, pestiferum 138, 3. dentium fragor & stridor, vnde 138, 50. in dente quænam symptomata conspicua 138, 57. dentis sphacellismus, quid 138, 59. vnde 138, 62. abscessum in gingiva exolvit 138, 43. dentes collidere, convulsivis argumentum 138, 20. dentibus stridere, tremoris argumentum ibidem.

Desperati, qui 36, 61, &c. Destillatio ferina, statim malefica, & statim tabifica 293, 57, 311, 6. destillationes malignæ, in pulmonem prolapsæ, exitumve habeant, aut non: semper malæ 292, 34

Deus solus, & necis & vitæ summum ius habet 438, 39. Dei providentiam, momentis temporum, & serie numerorum atque complexas distinguere: furor 438, 41. dominatu, serius aut celerius fata veniunt 439, 12. nutu res eunt diuinæ pariter atque humanæ 438, 39. permissu, non numerorum imperio, homines ex hac vita migrant 438, 38. prædixio, ipsum futuri ad nos venturum, nec sui aduentus vllam scientiam posse à nobis teneri 438, 43. verbi veritas vna 439, 50. in homines prima vis existit, deinde naturæ muliebri 438, 63. sine numine, capilli ex capite non fluunt 438, 40

Dextra dextris *ὁμοφυλὰ καὶ ὁμόφωνα* 203, 57. 230, 7. Diabetes fundit urinam similem potioni, ac sanguinem omni suo fero exhaurit 510, 4. Diabete facit *καὶ ἄλγιν*, inexplibilis renum sitis 510, 3. in diabete, urina rapitur 515, 52. bibendi atque meiendi nullus finis fit, donec ad vltima ventum sit 510, 4, 5. etiam colliquamento locus 537, 20

ἡ διαχωρῆσιν, καὶ ἐξῆλθιν, ad ventris deiectionem pertinet 545, 64. *τὴ διαχωρῆσιν* verbo, transitu significatur eorum quæ excluduntur per loca commoda, exclusioni dicata 545, 62, 63. *ἡ διαχωρῆσιν* non semper pro deiectione 206, 41. 241, 62. 297, 31. 544, 62. *τὴ διαχωρῆσιν* nomen non raro significat vacationem omni ex parte 181, 5. 545, 1, 565, 37. *ἡ διαχωρῆσιν, ἀντὶ τὴς ἀναλώσεως* 181, 8. 544, 64

ἡ διακοπή, quid 409, 48. Diacope & apocope, ut differant 419, 44.

Dietæ, victus rationem & vitæ institutum continet 338, 25. dietæ ratio, ex quarum rerum distinctione inuitur 209, 14. in morbis acutis lex duplex sancita 448, 26. dietæ, morbo incunte acuto, si validæ sunt vires, tenuissima esse debet 448, 21, 28. tenuis, oppugnando morbo dicata 448, 23

ἡ διακοπή, quid 76, 18. *ἡ ἀλάτεις*, causa formalis *τὴς ἐκλύσεως* & *τὴς καθάρσεως* 241, 9

Diaphragma, quid 426, 40. veteribus vnde dictum *αἰ φρένες* 32, 16, 172, 49. *διάπταις*, καὶ *διαπνὴν* *τὴς κοιλίας*; Hippocrati 275, 7. diaphragmate natura vitur, ut intergerino quodam muro superi ventris & inferi 426, 41. diaphragmati ius liberæ spirationis à Deo tributum 426, 40. diaphragma, nervis adiutum quatuor ad motus cientes liberæ spirationis 426, 43. quibus partibus connectitur 426, 45, 443, vlt. Diaphragmatis caput in centro, nerueum 426, 41. offensio nulla paraphorica, præter inflammationem sypstrophicam 183, 54, 220, 18. offensio paraphorica, lege sympathiæ quæ habet cū cerebro 291, 46. inflammatio, quibus percipitur 163, 54. 291, 43. in diaphragmate, sicut in cerebro, dementia; generis omnis focus 185, 9. diaphragmatis inflammari consecraria, vtrius-

que hypochondrij sursum intrò retractio 318, 61. inflammatio, planè phrenitica 291, 43. diaphragma dissecari, mortiferum 418, 7. 424, 32. diaphragmatis capite sauciato vulnus cur incoibile 426, 53. capite sauciato, quænam symptomata superueniunt 426, 55, &c. sauciato, salus desperata tribus de causis 426, 59. vulneratio prægrandis; funesta 409, 55. vulnus quodnam cito seriùve mortiferum 426, 52. *περίσφον* vulneratum, tot nec tanta incommoda circumstant 426, 64

ἡ διαφθορά, factus est iam incipientis corrumpi, aut corrupti 445, 57

Diarrhœa, quid 131, 2 332, 45, 340, 64. vnde 314, 13. quomodo fit 328, 62. in alio est ex cruditate 464, 45. licentia, dysenteria, ut differunt 332, 45, &c. 340, vlt. chylosa, cruda 341, 29. sepe numero critica 351, 19. critica, omnis cruditaris expers, lumborum sanar gravitatem 382, 59, 63. quæ sponte citetur lipienti, salubris 130, 52. aquosa circa hydropis initia, morbum exolvit 554, 59. hydropis critica, omnis esse debet cruditaris expers 337, vlt. hydropicorum, exigui est temporis, profusè peracta 332, 52. fortis, si cui leucophlegmatia implicito superueniat; morbum exolvit 331, 34, 332, 53. longa in hydropse sicco, toto genere symptomatica 332, 55. diarrhœa causam morbosam, vomendo excludi elleborismo; prodest 503, 41, 42. diarrhœa plerumque longæ obnoxios balbos natura fecit 577. diarrhœa longa quæ prætumidum ventrem non adæquat, signum syllogisticum, hydropis tympaniæ 334, 50. diarrhœa diuturnæ per quas venter nō detumescit, hydropis prænuntiatio 558, 45. in diarrhœa longa vomere prodest; retrahendi causa id quod in ventrem confluxit 503, 38. diarrhœa extenuato pridem, sponte nunc nata, exolutionem facultatis naturalis confirmat 572, 41. quæ à melicrato meraciore biliosis accidit; mala 332, 63. nulla edi potest cruditaris expers, cum partes nutritiæ in vicio sunt 343, 3. prorupta omnis, ab infirmitate orta naturæ, ipsam infirmiorē facit 555, 11. 556, 63. 574, 26. vnde, pleuritici aut peripneumonici 42, 3. malè habito à pleuritide aut peripneumonia, superueniens; mala 41, 63. in phthisi, vnde 313, 21, 43. phthisica, citæ mortis 41, 62, 453, 60. in phthisi, ipsum *κατὰ τὸν* 313, 51. 314, 10. 316, 58. 323, 33. *καὶ ὑπὸ διαρροῆς ἐκέρχεται* quid significet 191, 50

τὴς διαφθορῆς nomine continentur *ἡ ἰαλὼσις* & *ἡ κατὰ τὸν* 194, 58

Dies horis duodecim absoluitur 404, 56. diei & noctis causæ contrariæ 277, 63. diei pars ab hora sexta matutina ad decimam, præ se fert analogiam veris 404, 56. meridiana, æstatis præ se fert analogiam 404, 57. vespertina, autumnii analogiam præ se fert ibidem. diei parte matutina, sanguinis dominatu homines tenentur 404, 50. meridiana, bilis dominatu homines tenentur 404, 59. vespertina, nigri humoris dominatu homines tenentur ibidem. dies criticus, sæcundus 120, 35. dies quartus, periodus est prima 514, 27. infœcundus 206, 64. septenorum index 514, 9. ante se indicem nullum habet 467, 48. criticus esse nequit in paroxysmi vacuitate 467, 49. iudicandi ius habet in morbis qui paribus exacerbantur, & sunt acuti 506, 8. diei quartæ prima laus ad iudicandum 514, 8, 14, 42. epiphænomena *κρίσιμα*, non solum septimo crisi venturam denunciant; sed speciem ipsam crisis ostendunt 514, 38, 39. die quarto quæcumque coctionis corruptionisve signa inalescentis dantur, crisi promittunt septimo; conualescendi morbo, vel succumbendi 543, 42, 43. dies sextus tyrannus 205, 26. 205, 36. maxime in dierum paritate 253, 9, 20. sexto die nihil bene fit 253, 43. nihil *κρίσιμον*, nihil *κρίνον* 253, 20. dies septimus, periodus secunda 514, 28, 31. diei septimi magnæ vires ad iudicandum 514, 42. indicantis analogia ad crisi decimiquartæ 288, 21. die septimo quæ indicia adueniunt, iudicium in decimumquartæ diem dilatum iri admonent 543, 44. dies decimusquartus, morborum acutorum finis 255, 28. 263, 3. 526, 46. terminus inchoandæ expurgationis 249, 58. vigesimus, finis morborum acutorum 246, 29. quadragesimus, morborum acutorum *ἐκ μετακλίσεως*, terminus 255, 56

Digestionis causa, suctio 546, 3. digestio vnde incipitur 328, vlt.

Dissecta, quænam sunt 409, 50

Distinctio & diorismus, veritatis parens 197, 26

Diuturnitati

Diuturnitati locus in *diuturnitas* humoris morbifici, & visceris aestu incandescens afflicciónē 336, 47, 48.
δυσήγμος, absolute, ad pectus refertur 373, 40.
δυσήγος, absolute, ad pectus refertur 373, 40.
 Doloris causæ dæ 227, 47. nomine morbus ipse intelligitur 197, 27. 198, 62. 291, 34. nunquam morbus & tormina appellatur 352, 30. natura, in continui solatione, aut intemperie prægrandi 197, 28. dolor partis cuiusque, afflicciónem eius denunciat 387, 39. sæuus, aures non habet 360, 37. doloris acerbitas, corpus facit infirmum, & humores corrumpit 41, 59. 88, 30. 228, 11. 301, 15. 302, 22. 336, 28. 357, 22. cruciatur sit acrior phantasia 405, 44. cur vigilans ægri ibid. locus est periculo 537, 25. 26. doloribus magnis sedandis prodest phlebotomia aut purgatio ad siphoniam perducta 569, 29, 30. dolores per sympathiam, faciunt tensionem, non grauitatem 41, 25. doloris grauitas, signum concitati & consistentis sanguinis 274, 41. dolores à flatibus, ipsorum subita dissipatio quiescunt 291, 55. horiferi, cum suspensio anhelitus, signa sunt tabis 10, 57. dolor, *τὸ σκληρόμακρον*, signum sylogisticum 186, 18. symptoma eximium phlegmonatum 18, 56. 152, 62. 174, 6. in phlegmone occulta, symptoma præcipuum 37, 57. capitis, non minus sympathicus, quam idiopathicus 111, 1. affixus pectori cum corpore, pestiferus 195, 11. inguli, symptoma commune pleuritidis & hepatis inflammationi 41, 18. an sit symptoma pleuritidis, an hepatis inflammationi notæ 41, 19. doloris acerbitas paulisper in ingulo fixa, si ad superiora vertatur, mortifera 41, 12. 450, 20. dolorum, qui supra diaphragma sunt, curatio, sursum suscipienda 502, 10, 11. qui infra diaphragma sunt, curatio, deorsum molienda ibid. dolor pleuriticus, vnde 39, 25. liberali alui profusio non exoluitur 39, 26. lateris qui cum spuito bilioso sine causa euauit, excessum adfert mentis 41, 37. dolores qui ventrem tenent, cum tumore lenissimi, sine eo grauiissimi 164, 2. dolor bubonis in febris, ad diuturnitatem morbi apparet 42, 42. doloris à femore excursus, malignus 41, 5. 475, 15. dolor ani mortiferus, in diuturnis morbis exitialibus 41, 42. dolorum qui & in lumbis fixi sunt, & è lumbis oriuntur, vis calamitosa 197, 41. Dormiendum noctu, vigilandum interdum 403, 59. 404, 10. dormiendi noctu, consuetudo naturalis, tum per se, tum ex euentu 404, 26, 30. ad dormiendum interdum, non supererunt naturales causæ somniferæ 404, 46. non dormire interdum, nec noctu, pestiferum 405, 21. in dormiendi etiam necessitate illius qui vigilauit noctu, somni diurni maleficientia est 404, 4. in Dorso mala difficulter sanantur 191, 5. Dorfi gibbera, ad æqualitatem reuocari non possunt 426, 11. in dorso rigor, quid significet 190, 51. ex dorso malum, differt ab eo quod in dorso 190, 47. Duritas, communis inflammationis & scirrhi 463, 17. *ἡ δυνάμεις*, *καὶ ἰσχύς*, *καὶ ἐνέργεια*, vicissim & mutuò in vitio sunt 322, 19. *ἡ δυνάμεις*, in officio 333, 37. 95, 1. 124, 8. 290, 33. 321, 55. *οἱ ἀναισθηταί*, quinquam 111, 54. *τὸ ἀναισθητόν*, quid 88, 16. 190, 63. 211, 9. *ἡ ἀνορεξία* in hepar cadit primum & per se, aut aliunde superuenit 322, 32. Dysenteria, quid 340, vlt. 344, 19. dysenteriaz nomen, communi voce, ad vitia pertinet intestinorum 344, 3. dysenteria ab Hippocrate ad quid relata 344, 15. dysenteriaz descriptio ex Galeno 344, 10, &c. dysenteria quid Celso 344, 4. dysenteriaz causæ multæ 344, 21. dysenteria posita in cruenta deiectione 344, 7. diarrhoea accedit 333, 5. *αἱματηρὴ καὶ αἱματώδης*, eadem 346, 32. *αἱματώδης*, *δολιγήμερος* 347, vlt. *αἱματηρὴ*, naturæ fortis merito, non morbi vitio accedit 346, 30. *αἱματηρὴ*, vt similis, & vt differat ab hæmorrhoidibus 346, 31. *αἱματηρὴ*, *ἀναερόμωσιν* habet in anfractibus vel inuolutis intestinorum 346, 32. diarrhoea, lienteria, vt differunt 332, 45, &c. 340, vlt. acuta ea tantum, quæ est cum cruciatur 348, 1. cur regnat autumnio 345, 23. cur longa & sæua 345, 1. quanam salutaris 344, 37. 42, 45. deiectioni syncera quando superuenit 333, 4. senum, critica 66, 42. 93, 44. 194, 60. ingrauescentis ætatis, vnde 345, 17. symptomatica vnde 344, 46. 346, 26. in dysenteria symptomatica, vel vlcus est intestini, vel hepatis *ἀρρώστια* 344, 48. dysenteriaz

causa morbifica, non semper vlcus, nec tormentum 344, 8, 16. in dysenteria à rheumate consistente, exulceratio est intestini 344, 59. dysenteria longa, vindex lumbarium gibberum, à tuberculo enatorum 350, 45, 47, 48. longa, vnde 350, 23, &c. non longa, vnde 350, 3. dysenteriaz quæ sanant tubercula, vnde 191, 39. in dysenteria, vomitio biliosa vnde 347, 36. egestio primum fit sine vlcere 344, 22. exulceratio quando 344, 23. dysenteria quæ intempestiuè sistitur, abscessum facit vel in lateribus, vel in visceribus, vel in articulis 343, 58. 499, 22. dysenteriaz curandæ ratio ab Hippocrate tradita 346, 36, &c. in articulo transit quomodo fit 347, 9, &c. dysenteria si cui implicito carnes deiciantur, funestum 345, 52. dysenteria omnis, vel hepatica, vel aliua seu intestinalis 346, 25, 33. 348, 38. hepatica, ipsa per se cruenta 347, 7. hepatica, vnde 356, 16. duplex, non habet vlus intestini 344, 8. egestionis cruentæ, vbi cernitur 344, 35. in dysenteria egestionis cruentæ, egerendi ratio facili 344, 32. in ea quibus remediis pugnandum 344, 33. dysenteria merè cruenta & impermixta, triplex 344, 56. hepatica prima, ab hepatis *ἀρρώστια* 344, 30. secunda, ab hepatis *ἀρρώστια* 344, 36. dysenteria, ab hepatis oppressione, quæ est longa 344, 53. dysenteria ex melancholico humore facta, non est aliua cum vlcere, sed tantum hepatica 345, 58. ab humore melancholici putredine quadam arrabilaria, quò longior, eò peior 350, 64. hepatica, pestifera 141, 5. dysenteriaz hepaticæ & hydropis fons idem, & causa eadem 330, vlt. dysenteria intestinalis seu aliua, vnde 345, 59. quanam 344, 57. dysenteriaz aliua deiectione cruentata 347, 7. causæ omnes *ἡ ἀπὸ τῆς ἐνέργειας*, *ἡ ἀπὸ τῆς ἐνέργειας* 345, 14. causa effectrix, *ἐνέργεια*, *ἡ νομὴ* in aluo 353, 37. causa prima quanam 344, 62, &c. quæ secunda 345, 2. quæ tertia 345, 4. dysenteria aliua exulcerando fit à bile flaua, ab atra, & à pituita putri & salsa 344, 27. 345, 33, 34. quomodo fit à bile flaua 345, 41. 347, 33. biliosus, est à diatræ vicio 345, 21. biliosa, intempestiuè suppressa, abscessum facit in articulis 352, 43. quomodo fit ab atra bile 345, 60. arrabilaria, signo & causa, mala 339, 37. quam facit bilis atra, lethalis 39, 65. 210, 14. 345, 65. cur mortifera 345, vlt. 346, 1. dysenteriaz inter causas mortiferas princeps atra bilis 345, 33. intestinalis quomodo fit à pituita 346, 8, &c. 20. 347, 33. primum exorta, dolorum lumbarium, & inde articularium proleteria 347, 13. symptoma semper rheumatis consistentis, & sæpe concitati 344, 58. in lienosis, duplex: vna longa & mortifera; altera brevis & critica 345, 6. lienosis, non longa quidem, vitilis à longa verò, pestifera 328, 57. 349, 3. 541, 50. non longa cur vitilis lienosis 350, 17. lienosis longa, lienteriam parit vel hydropem 330, 45. 345, 8. lienosis quiescente, si vel hydropes veniunt, vel lienteria mortiferum 349, 4. 541, 51. dysenteria sæua quibus itur ad puriformiam, qui superstat humor, multum albus erit & multus 462, 52. 552, 1. dysenteriaz intestinalis malum quando insanabile 345, 50. dysenteria apud Segufianos coorta, anno 1538. multis viribus arque pagis internecina 345, 26. dysenteriarum tempestas feracissima anni 1578. 345, 25. pestilentium feracissimæ temporum defectio in tempestatum alteratione & alienatione 345, 23, 24. dysenterico bene est in deriuatione 346, 39. numquam bene est in *μακροσμία* 346, 53. bene est cum è dysenteria sæua iur ad puriformiam 347, 62. dysenterica vomitio biliosa, cum rectè sit, crisis ministra, vel potius effectrix 347, 27. vomitio biliosa iniuria, graue malum 347, 19. cur circa initia vomitio biliosa graue malum 347, 41, &c. *ἡ ἀνορεξία*, vnde 311, 50. nimia, signum putredinis, non pepasmi 118, vlt. 119, 2. *τὴν ἀνορεξίαν*, planè *κακοχολία* 545, 61. *τὴν ἀνορεξίαν*, plura vide ad Odoris nomen, sub litera O. *ἀνορεξία* quanam sub se continet 4, 10. ægri est iactari 402, 54. vbi cernitur 4, 14. cuius frigoris comes 355, 46. dysphoria cum frigore, pessima 347, 46. Dyspnœa, quid 532, 4, 5. frequens & parua in crassis, nimium exercitatis, periculosa 271, 28. Dyspnœæ summæ omnia in stertore 370, 45. ad dyspnœam astmaticam,

partium omnium spirabilem conspiciat 425, 62. dys-
pnœa omnis in quibus versatur 148, 53
Dysuriæ causa omnis posita vel in vesica, vel in vrethra
363, 17. in vesica, causæ, exolusio vel sensus amissio 363, 17.
in vrethra, causa, oppilatio; quæ est à phymate aut calculo
363, 20. Dysuria & ischuria, differunt tantum per magis
& minus 363, 11. dysuriam sanat phlebotomia 357, 60.
362, 36. dysuria, commune symptoma multorum morbo-
rum 361, vlt. in vesicam plenam, non in vacuam cadit
363, 12.

E

EBRIVS si quis repente obmutescat convulsus, mori-
tur, nisi febris exoritur 227, 53
Echo in aure, quid 109, vlt. echus distinctio à statu so-
noro & murmure 76, 16. nomen, sæpe κατὰ χερσιν vsur-
patum 110, 5. echo in aure, non raro hæmorrhagiæ præ-
auncia 190, 19, 20. non raro fortis delirii præauncia 190,
20, 21. & bombus in acutis, moriferum 109, 40.
195, 23.

ἐκ vel ἐξ, apud Hippocratem, quid significet 190, 47
ἐκ χειρὶν ἢς νοσήσιν, quid propriè 557, 63
ἐκ χειρὶν, veteribus quid 124, 33
ἐκ χειρὶν, quid 13, 14. 313, 42. quid propriè veteribus
241, 7. propriè & verè ad cordis principatum pertinet
241, 9. facultatum vitalium est debilitatio, qua cor exi-
guo velut filo pendere creditur, languescere vita 569, 23.
si cessante pulsu, lapsus habet virum animalitatis, citra
sudorem; ἀποθυμία, 569, 24, 25. cum sudore præferim
frigidus; σφυγμοπία ibidem. ἡ ἐκλυσις, ἀδυναμία, ἀτονία sy-
nonyma 241, 5. ἐκλυσις ἰσχυρὸς, idem quod σφυγμοπία
569, 26.

ἐκφυσις ipsa ad vocem edendam, vt sit 15, 60. τῆς
ἐκφυσις imbecillitas, vnde 90, 2
Ecphyfis, chylo inferuit transponendo 417, vlt.
ἐκφυσις vera, quid 446, 7
ἐκφυσις, quid 38, 27. τῆς ἐκφυσις distinctio triplex
379, 52. ἡ ἐκφυσις ἢ ἀπλὴς, ἢ στυγνὴ, ἢ φρεσινική 379, 57.
infantæ tantum fanaticorum propria 314, 61. ad melan-
cholicam pertinet egressionem 377, 14. μολαρχική, vnde
38, 32. 141, 40. cerebri alteratio ab atra bile 183, 48.
ἐκφυσις 51, 14.

ἐκθύσας, quid 96, 28, 29. 499, 10. Ecchymata, sunt ab-
cessus qui repente cooriantur 499, 12. vnde 499, 9.
ecchymatum pallulantium causa & ratio, quænam 499,
61, &c. in ecchymatū regao, prima ferè omnium in oculis
pullulant 499, 50
τῆς ἐκφυσις vsurpatio, nunquam legitur ἀντὶ τῆς φύσεως
452, 41.

ἐκδοξία in futura, perpetuò coniunctam habet fissuram
& contusionem 410, 1
Efficiens quoties habet simile suscipiens, quæ inde na-
scuntur mala, granissima 382, 53

Effluencia semper similis subiectæ substantiæ vnde ma-
nar 309, 34. 348, 21. 491, 52. 511, 2

Efformandi vis imbecilla, vnde 292, 37

Effracturæ cum fissura, inuentio non difficilis 414,

49
Egestio adiposa, febris ardore liquata; difficilis, ac odo-
ris foedi 348, 12
Egressio omnis è natura, speciei corruptio quædam
214, 61

ἐλεφαντινὴ, quid significat 20, 2

Elephantorum quænam conditio 568, 21. sensum
quid hebetat 571, 22, &c.

Elleborus, catharticum veteriarium. 502, 31. inter
cætera cathartica, præstantius trahit atque validius 192, 5.
503, 29. quantum purgandi & attrahendi potentia, cæte-
ris omnibus catharticis antecellat; admirabile 501, 23. at-
trahendo atque ciendo, vim omnè superat symptomatici o-
mnis morus, naturæ eximie lacescentis 502, 33. ellebori ma-
gisterio melius quàm cæterorū ἐμπυριών, velificatio tū ipsius
naturæ, tum humoris morbifici, sursum infernè mutat
503, 42, &c. elleborus valet ad retrahendum & detrahen-
dum 192, 9. absolute vsurpatus, albus 192, 7. 501, 25.
502, 27. purgat sursum mouendo, per os 502, 38. 103, 27.
quænam vomendo per os transmittit 503, 28. salutariter
adhibetur ad pathemata τῆς μοχλίας ἀδυναμία, & febris
expertia 503, 23. elleboro albo quænam vis inest 501,
26. elleborus niger purgat deorsum, infra transmitten-

do per sedem 502, 38. 503, 27. præstantissimus ad
pleuritidem inferiorem 192, 6, 10. elleboro purgandi,
quibus est à capite defluxus 346, 39. ab elleboro vomere
spumantia multa, in dolore lumborum prægrandi, &
in larga deiectione; prodest 503, 10. quæ cietur præ-
rubræ nigrae purgationes, prauæ 502, 23. lethalis con-
uulsio 190, 49. 501, 14. elleborismus, pharmacia est
mochlica 488, 11. ab Hippocrate non positus, inopia
catarticorum; sed meliorum delectu 191, 10. 503, 26.
vnicè commendatur ad phyma lumborum; tum ad ne-
phritidem 503, 44. elleborismo, diarrhœæ causam mor-
bificam vomendo excludi; prodest 503, 41, 42. ab el-
leborismo spumantia multa, καλὸς καὶ κρείσσις apparent
503, 31. elleborismo qui purgantur, idem: vniuenis
atque cholericis 500, 40. ab elleborismo convulsio,
in prompta ferocitate bilis in orificium alui 500, 35

Emaciandi causæ quænam 325, 7, &c.

ἐμμησιν quodnam vicus 200, 64

ἐμμησιν aphorismi 463, 4. quid significat 7, 51

Empyema quid Hippocrati 170, 12. 236, 27. 306, 46.

commune nomen omnium corporis partium suppurata-
rum 255, 48. empyematis origo quænam 305, 30.

duplex significatio 60, 52. modus duplex 255, 32, 42.

notitia vnde comparatur 308, 37, &c. περὶ τῆς, hor-
rores 10, 36. empyematum terminus, umbilicus 162,

45. 186, 57. empyemata vt consideranda 170, 25. em-
pyema, medium inter citam veram crisin, & certam despe-
rationem 287, 62. 304, 37. 453, 2. 465, 29. 552, 15.

factum vigesimo die, non amplius retinet naturam morbi
acuri 281, 31. quò celerius fit, eò rumpitur cè-
lerius 281, 19. empyemata cur breui rumpuntur 279,

40. empyema horrores ciet, qua parte ipsum subest
472, 53. 529, vlt. in empyematis strepitu multo, non ita
rubent malæ, quàm in exiguo 308, 16. ad empyema quod
foras non exit, frustra fit pepalsmus. 285, 64. empyema-
tis, adurendo, curatio citò ineunda 279, 51. empyema

quodnam spei plenum 296, 53. quodnam anceps spei
plenum an desperatum 296, 55. quodnam mortiferum
11, 45. 296, 54. prauum, περὶ τῆς ἢ ἀμφοτέρωθεν 434, 57.

empyemata internarum partium, primum rigore & noua
febre denunciantur 8, 10. empyematum signa quo die
eduntur 11, 6. empyematis mox affuturi signa; febris
horrida, cibi fastidium, ephidrosis 575, 17, &c. inchoati
signa quænam 282, 1. inchoati atque confecti signum
ἀσπρῶς, quodnam 283, 7. perfecti signa quænam

282, 2. inueterati quænam signa 277, 10, &c. em-
pyema confectum factum & ruptum, tribus signis cogno-
scitur 279, 63. 280, 20, 28. empyema pulmonis, quid
11, 1. empyematis in pulmone confecti quænam signa
299, 20, 26. empyema costarum & pulmonum, crebrius
horroribus 277, 43. expurgatio difficilior quàm peri-
pneumoniz 307, 2. ab empyematis, peripneumonici
quidem, seniores intereunt: ab reliquis autem, iuniores
306, 31. ab empyemate peripneumonico facilius sanesc-
cunt iuuenes 306, 39. empyema multò ante phthisin,
sputum edidit foedi odoris 311, 55. empyemate facto à
pleuritide, pus citò exeat 303, 45. empyema thoraci-
cis, non vno in loco stabulatur 279, 53. qua parte sta-
bulatur, vt dignoscendum 279, 55. empyematis circa
locos concepti, venturi & exituri, signa, 452, 47, &c. à
plegmone, crisis quænam 11, 8, &c. empyema ab vl-
cere factum, facilius quàm quæ veniunt à pleuritide aut
peripneumonia 306, 5. empyema & empyi, vt differ-
rant 277, 35

Empyici quinam propriè 60, 51. 236, 26. 237, 41.

255, 49. 287, 22. 304, 47. quinam; per antonomas-
iam 170, 13. quibus signis deprehenduntur 255,

44, &c. sunt quibus thoracis troma foris sanescit,
intus minimè: aut intus sanatur, denuò laceratur
430, 1. vnde surdi 297, 26. quinam euadunt 290,

60. 326, 25. quinam moriuntur 326, 27

empyicorum leuatio, quænam recidiuæ obnoxia 287, 17.

pus confectum exire; mortiferum 558, 7. pectora
rubris maculis superparsa, mortifera 317, 18.

empyicis, vi naturæ, anacatharsis fit puris in thoracem
effusi 305, 3. 341, 22. expurgandis si desit anaca-
tharsis, vitio necessaria 273, 38.

à pulmone; pus citò per alium, lethale 304, 31.

552, 5

ἐνέριον, ad quid refertur 52, 22

ἐνέριον, 52, 22

τὰ ἐνδοτὰ, quænam 345, 14. αἱ δὲ σπληνίτις, ἡ σπληνίτις, 345, 16.
 ἡ ἐνδοτὰ, ἡ δὲ σπληνίτις, ἡ δὲ σπληνίτις, vicissim & mutuo in vi-
 tio sunt 322, 19.
 ἡ ἐνδοτὰ, quid 323.
 ἡ ἐνδοτὰ, ἡ δὲ σπληνίτις, quid 345, 44.
 τὰ ἐνδοτὰ, eadem quæ τὰ σπληνίτις 371, 54.
 de Ephemeris, vide ad nomen *Febris*, sub litera F.
 ἡ ἐνδοτὰ morbi & naturæ, vbi cernitur 439, 32. critica,
 quomodo à natura procedit 439, 40. τὰς ἐνδοτὰς quarta-
 na, septimanæ vicinæ, quænam causa 439, 35.
 ἡ ἐνδοτὰ, quid significet 54, 38.
 ἡ ἐνδοτὰ, idem quod ἐνδοτὰ 156, 39.
 in Epidemiis, Hippocratis quodnam propositum 447, 22.
 οἱ ἐνδοτὰς, quid 161, 14.
 ὁ ἐνδοτὰς homo, qualis 154, 51. ἡ ἐνδοτὰς, quid 79, 30.
 113, 6. 287, 26. nequid nimis 374, 64. medium inter ἡ
 ἐνδοτὰς, ἡ ἐνδοτὰς, ἡ ἐνδοτὰς, & ἡ ἐνδοτὰς 53, 19. medium
 inter symptomata spei plena, & terribia; Galeno 154, 50.
 ἡ ἐνδοτὰς, quid 375, 53. Epigenesis, causa synrimo-
 rix malefica 337, 48. nulla, causam deducit morificam
 386, 6. nulla, leuationem adfert primigenij morbi à quo
 enascitur 422, 16. omnis pessima 159, 13. 536, 54.
 numquam incidit nisi in magnas affectiones 225, 42.
 graniorum symptomatum sit in morbis grauissimis 334,
 12. grauissimorum morborum, varia esse solet 337, 1.
 per Epigenesin nata, metu exterrit sinistri iudicij 295,
 44. τὰ ἐνδοτὰ omnia, per sympathiam veniunt
 335, 38.
 Epilepsia, quid 337, 11. vnde 337, 12. magnum ma-
 lum, Hippocrati 337, 45. conuulsionum regina 337, 55.
 456, 50. conuulsio vniuersi corporis 90, 11. Epilepsia &
 apnæa, simul esse non possunt 487, 25. corporis est 375,
 48. Epilepsia & melancholia, se mutuo cōsequuntur ibid.
 Epilepsia causa in cerebro conuulsifica 456, 50. Epilepsia,
 pro conuulsione. 218, 44. in Epilepsia cerebrum ipsum
 in vicio est 225, 31. Epilepsia ἡ ἐπιδόκησις, puerilis ætas
 433, 15. ἡ ἀπιδόκησις, puerilis ætas 433, 15. atrocitas quan-
 ta 337, 52. Epileptica cerebri contractio quæ cadit in
 pueros, non est vaporis tecti, aut qualitatris malignæ 466
 50. Epilepsia puerilis finem adfert iuuenibus, caloris na-
 tui lumen ac splendore 214, 13. 466, 36. mulieribus men-
 struorū purgatio, 466, 35, 44. Epilepsia primigenia, ægritu-
 dinem parit animo, ex diuturno morore morbi, & metu
 cadendi 375, 54. non raro ex anadrome vrinarum nata 15,
 8. grauis, à muliebrium menstruum suppressione 456,
 54. sperabilem adhuc vitæ salutem ostendit in apople-
 xia 449, 44. Epilepsia quænam suis epilepticis commo-
 uentur 457, 13. Epilepsia quæ superuenit hydropicis; fu-
 nestia 336, penult. 342, 22. Epileptici, quinquam 543, 61, &c.
 ve plurimum melancholici. 375, 46. paroxysmi in ster-
 nutamentum mutatio salutaris 272, 40. Epilepticam
 causam putare in mentem migrare; nefas 375, 56.
 τὰ ἐπιδόκησις, quænam 215, 17. 482, 63. τὴν ἐπιδό-
 κησιν conditio quænam 238, 47. τὰ ἐπιδόκησις om-
 nia bona, meliora sunt cum citò apparent 259, 54. quæ
 apparent circa initia morbi, λόγος τῆς φύσεως, suum quæ-
 que morbum abbreviant 514, 47. in expurgatione qua-
 lia; talia in colore apparent partium fucatarum 273, 58.
 quibus mensibus appareant; videndum 461, 10. ἐπι-
 φανόμορον vnum curis prauum, pluris esse debet ad interi-
 tus præfensionem, quam multa communia 263, 59. τὰ
 ἐπιδόκησις symptomata, quænam 199, 54. quæ initio
 bona sunt, sæpe mutantur in peius 315, 31, 32. parua; pra-
 ua 219, 45. mala, eo peiora, quò citius se produnt 259, 57.
 φανώσις, quænam 104, 55.
 αἱ ἐπιδόκησις, oppositæ τὰς ἀφόρησις 442, 44.
 ἡ ἐπιδόκησις, idem quod ἡ ἐπιδόκησις 158, vlt. οἱ
 ἐπιδόκησις, qui nam 195, 42.
 ἡ ἐπιδόκησις, quid proprie 324, 470, 24. τὴν ἐπιδόκη-
 σιν ostendit, non τὴν ἐπιδόκησιν 470, 25. semper symptomatice
 apud Hippocratem 353, 50. ad mortem fatale, si à vasis
 385, 34.
 ἡ ἐπιδόκησις, quid 120, 3.
 ὁ ἐπιδόκησις, quid 338, 26.
 ὁ ἐπιδόκησις, quid 377, 55. vnde 154, 36. τὰ ἐπιδόκη-
 σιν, quænam 154, 36. partim ἀπὸ τῆς φύσεως, partim ἀπὸ τῆς
 φύσεως 154, 38, &c.
 ἡ ἐπιδόκησις, quid 400, 35. vnde, & vbi cernitur 393,

47, 473, 59. iactationi contraria 150, 45. mor-
 bo incunte, symptoma madefacti & inebriari nervorum
 principij 195, 40. morbo affecto, symptoma effec-
 ti & exoluti nervorum principij 195, 40.
 Erysipelas, quid 115, 24. Erysipelatis causa quæ-
 nam 115, 26. propria ἡ διαφύλαξις 237, 8. Erysi-
 pelas intrus foras conuerti, commodum: at foris intro, 28
 moriferum 236, 48. 293, 26. 301, 28.
 ὁ ἐρύσιπelas, quid 37, 34, 37. τὰ ἐρύσιπelas, simpli-
 citer pro suffusione rubra 123, 27. ὁ ἐρύσιπelas ἡ ἐρύσιπelas,
 non raro pro erysipelatosa phlegmone 246, 1. ἀπὸ τῆς
 ἐρύσιπelas ἐρύσιπelas 234, 35. τὰ ἐρύσιπelas ἀπὸ τῆς οἰδη-
 τος φλεγμονώδους 115, 6. ὁ ἐρύσιπelas κωσσυγγών, faucium
 inflammatio 115, 7.
 Euacuatio bona, quænam 50, 41. optima quæ-
 nam 50, 40.
 ἡ εὐχρησία, quid 308, 15, &c. ἡ εὐχρησία, aliquando ἡ ἐ-
 ρύσιπelas 567, 54.
 οἱ εὐχρησίαι ἡ δὲ σπληνίτις, quinquam 111, 55. 222, 47.
 εὐχρησία in secunda valetudine pars omnis vnde capit,
 inde suauescit 278, 26.
 τὰ εὐχρησία, quænam 223, 12.
 ἡ εὐχρησία stabilis & firma, vnde 261, 16. nunquam
 è prauis signis 261, 14.
 ἡ εὐχρησία corpus, meabile 65, 26. 67, 49.
 ἡ εὐχρησία, quid 50, 26.
 ἡ εὐχρησία, ex opinione pia & sancta 375, 19.
 ἡ εὐχρησία, vnde 315, 49. πᾶσι τῆς εὐχρησίας, vide plura ad
 nomen O doris, sub litera O.
 Exacerbationis contra naturam morbi, quænam causa
 45, 21.
 Exacerbari & ingrauescere, vt differant 253, 4, &c.
 exacerbati in ordinario paroxysmo, non nouum, nec terri-
 ficum 253, 5.
 ἡ ἐξάφνης, quid significet 179, 28. ἡ ἐξάφνης, ἡ
 ἐξάφνης; idem quod ἐνδοτὰς 465, 42. 520, 38.
 idem quod ἀπὸ τῆς φύσεως 161, 54. 179, 29. idem quod
 λατρεία 465, 47. idem quod ἡ παραλόγως 451, 60.
 vltro repente 452, 12. non minus morbi est venusti,
 quàm inchoati, vel incutis 520, 40.
 Excessus fanatici quænam notæ 380, 14. in Ex-
 cessu maiora vitia officiorum animæ intelligentis, quàm in
 melancholia 379, 42.
 Excreatio, faucium propria 236, 9. Excreantia dif-
 ficultas, spirandi, & glutinosum pus, operas tradunt mu-
 tuas in ægri perniciem 288, 27.
 Excrementa omnia coctione crassescunt 519, 10.
 Excrementum crassescere decet; morbo ad crisin progre-
 diente 294, 47. 577, 49. Excrementa bilis & pituitæ,
 accuratè permixta, laudabilia 24, 51. corruptæ sunt
 partes de iis ex alimento residua, quæ solæ coctionem ad-
 miserunt 570, 38, 39. communia, quadruplicia; vomit-
 us, sudores, vrinæ, deiectiones 487, 23. propria mor-
 borum singulorum, eorum ἐπιδόκησις 487, 26. Ex-
 crementum è fluo nigrum, vnde 577, 136, 63. æru-
 ginosum, quid denunciet 257, 50. Excrementa sunt
 glutinosa in morbis acutis, à febrili ardore: in frigidis, à
 crudore 257, 28. tenuia cruditate manent 519, 11.
 mera, quænam & vnde 141, 32. 257, 21. 489, 11, 12. me-
 ra semper praua 489, 10. quando intrus cohibentur
 498, 27. mordacia intro retrahuntur, sicut venularum
 exhausta 498, 29. amurciosa & nigra, semper praua
 459, 1. Excrementum in habitu corporis frigidum,
 contra naturam est febris acutæ 507, 6. Excrementa
 quænam vicerifica sedis & intestinorum 42, 7.
 Excretio salubritati corporis quænam accommodatissi-
 ma 130, 61. sperabilis in iuuentute 79, 8. excretionis
 futuræ, quænam opinionem faciunt 80, 20. perfectæ præ-
 sidia tria 505, 52. excretionis inspectæ & insuetæ per
 iter, quas natura molitur & perficit, miraculo apponi solitæ
 340, 45. varia ab eadem concussionem 92, vlt. 477, 20.
 excretionum omnium laus, per iuuentutem & pubertatem
 89, 10. criticarum quinquam finis 316, 47. excretio critica,
 vbi nam votis respondet medici 505, 42. excretionis qui-
 nam modus, criticus 230, 16. excretionem critica admittit
 quod intrus lædebat 514, 24. excretio nulla, lege critica
 suscipitur, quæ antè significata non fuerit 166, 12. nulla
 salutaris, initis morborum 81, 25. nulla, morborum ini-
 tiis, imperio naturæ suscipitur 40, 15. nulla, quænamois
 critica, potest videri salutaris, cum vires efficitur languent
 Ddd iij

178, 63. 371, 36. 554, 30. excretiones, quales duce natura non sunt 159, 46. excretio omnis incommoda à perturbatione critica, mala est 24, 39. omnis iniussa, duplex 6, 22. iniussa, quæ dominatu naturæ non regitur, quid denunciet 107, 14. omnis prava; affectionis pravae signum 284, 42. 312, 1. 500, 22. symptomatrica est, qua minimè vacuantur quæ vacuari prodesset 332, 61. symptomatrica, periculum morbi periculo adicit 549, 12. excretionem desperatam quænam faciunt 21, 35.

Exercitatio maritima, alium delicit 562, 34. exercitatio est artuum; carniū cibis, & somnis viscerum 404, 42, 43. exercendi corpus & artus consuetudo naturalis; interdiu 404, 43.

Exolutio, quid propriè 476, 19. propria hæmorrhagiæ profusioris 213, 12, 18. exolutio & catocoe existere simul nequeunt 144, 9. *ἀπὸ τῆς υἱοποιήσεως* 476, 25. exolutio & conuulsio, *ἀδύναται* 485, 26. exolutionem conuulsione tolli præstat, quàm contrà 115, 36. exolutio virium à conuulsione contentione, cita & funesta 232, 22. corporis à bilioso humore fieri nequit 52, 60. ab exolutionibus cur dolores cessant 569, 27, 28. exolutio quæ dolorem soluit; ventrem humidiorē facit 569, 20. & cur 569, 33, &c. quænam pessima atque mortifera 366, 49. sudorifica. fatalis ad exitum 453, 54. exolutiones à rigore, cum cephalalgia; mortifera 33, 56. 142, 22. qui exoluantur crebro & fortiter, sine causa manifesta; vitam repente finiunt 175, 26. 372, 10. 476, 24.

ἡ ἐξῆς, opposita *τῇ ἕξει* 320, 49. *τῇ ἐξῆς* genera multa 368, 9. *τὰ ἐξῆς* omnia, dicta & spiritu quem ducendo viuimus, continentur 345, 18. 368, 20. *τῇ ἐξῆς* magna vis ad morborum procreationem 345, 17.

Experientia & iudicium, duo inueniendi indicandique propria instrumenta 411, 10.

Expiratio & inspiratio, contrariis editæ motibus 148, 44. 149, 2. per expirationem, vaporis fumidi expurgatio 428, 30. expirationis multum properatæ & citæ, quænam causa 380, 63.

Expurgationis & expuitionis ratio eadem 256, 43. expurgatio sera, nunquam medici & ægri votis responderet, in copia & expurgandi modo 286, 4. tardior neque simplicem, neque perfectam crisin edit 259, 28.

Extenuatio primū cutim relaxat, postea verò distendit 278, 47. 320, 5. extenuationis signum quoddam 20, 3. extenuationem inchoatam denunciat laxitas cum pallore 278, 46. absolutam denunciat tensio 278, 46. extenuationis absolutæ signum, facies cadaverosa 325, 10. perfectæ signa in pallore ac rigida tensione 323, 50. perfectæ signum, digitorum asperitas 278, 47. extenuata breui tempore corpora, confestim reficienda 320, 4. 349, 43. extenuata longo tempore corpora, sensim reficienda 320, 4. 349, 43.

Exteriora, quæ 64, 9. extimorū cita in utrunque mutatio; prava 30, 33.

F

FABRICATIONIS humanæ fundamenta tria 146, 64.

Facies, nitidior & splendidior facta à maritima exercitatione 562, 34. ægroti, prima omnium venit sub aspectum medici 120, 24. ægroti, bene valentium similis esse debet, & sui potissimum 120, 24. Faciei cita & stabilis mutatio in morbis acutis, vnde 121, 3, 4. facies pleuritici, quare plena mororū 254, 46, &c. vnde macrescit 121, 11, &c. rubore suffusa, vnde 77, 13. faciei rubori saturato, si caperatio frontis accedat; prauum 567, 53. facies rutila, signum plethoræ cephalicæ æstuantis 90, 64. pallida collapsaque, vnde 121, 27. egregiè colorata & vultuosa, pestifera 122, 23. 254, 52. 348, 63. 567, 52. vultuosa, certissimum signum melancholiz 122, 47. cadaverosa, quænam 121, 51. ex fugacibus causis, vno die finitur 135, 14. prima morbi periodo; funesta 121, 22. mortifera 120, 60. faciei cadaverosæ contrariæ, succi plena atque decora 121, 9. corruptio, idem quod cadaverosa facies 121, 5. in facie potissimum cernitur morticinæ naturæ significatio 121, 19.

Facultates tres in nostris corporibus ex eorūdem principis 321, 56. 146, vlt. facultatum trium mutua *σωτηριότητα* 147, 3. facultates vegetæ, bene constitutis visceribus 94, vlt. facultatum efficitur vires, vnde 94, 62. læsarum casus, grauiorē quàm instrumentorum 116, 20. 366, 51.

facultates quò plures in vitio sunt, eò res ægri penitus eunt 8, 27. 108, 63. 146, 1. 548, 61. facultas afficitur læso principio 180, 34. perditur, virtutis & roboris exolutione 322, 8. facultatis perditæ symptoma, vacuitas actionis 322, 9. facultas hepatis, nutritia 321, 57. auctrix & nutritrix eadem 421, 15. facultatis nutritrix perditio, mortifera 321, 57. naturalis exolutionem confirmat diarrhoea, extenuato pridem, sponte nunc nata 572, 41. facultate coctricæ cessante, fit excretio proluuii rubræ 323, 14. facultas cordis, viuifica 321, 57. facultatis viuificæ perditio à phthisi, mortifera 321, 58. vitalis exolutionem confirmat vocis carentia, extenuato pridem, sponte nunc nata 572, 42. facultas cerebri, animalis 321, 57. facultatis animalis exolutionem confirmat tremor, extenuato pridem, sponte nunc natus 572, 42.

Fæces, excrementa alui propria 558, 62. in crassiore intestino stabulantur 355, 45. pridianas, singulis diebus excernit qui valet, aut valere debet 546, 16, 17. sæpe ab ardore icterici conglobatur in similitudinem pilularum veruecinarum 558, 62.

Famem caninam potio meri exoluit & sanat 351, 53.

Fanatici ex phreniticis, vnde 56, 7. homines, ab atra bile ex flaua 206, 38. propriè, ex mania melancholica 378, 44. qui cum immanitate contremiscunt, proximè absunt à morte 51, 9. fanaticorum immanitas, in quibus cernitur 49, 40.

Fastidiosi *ἀνέμωτοι*, periculosius multo ægrotant quàm *ναυτιώδες* 493, 50. fastidiosus vigilibus, ferè sub aures tumores assurgunt 497, 42.

Fatuus quæ in icterum cadit, prava 386, 19.

Fauces, quid 235, 19. per fauces itur partim ad gulam, partim ad guttur 469, 64. faucium æqualitas & stragularus, quid significant 160, 23. irritamenta satis molesta, parotidas eructant, aut adæquant 154, 31. erysipelas, si nulla lege critica euanescent, funestum 236, 15. in faucium inflammatione *θύμωται καὶ θύσονται*, quænam 117, 57. asperitas, inflammationis consecutaria 156, 4. fauces exulceratæ in febre, cum alio signo difficili; periculosum 161, 3. faucibus in laryngem transitis quænam mortiferis 117, 58.

Febris, à corde 139, 31. vnde excitatur 511, 29. febres in venis sunt 509, 15. 546, 59. febris ibi accenditur, vbi calor vitalis domicilium 299, 4. 5. focum habet, vbi fons est vrinæ 511, 28. febres, positæ in domicilio *τῆς οὐροῦ καὶ τῆς σπυγγώδους* 511, 33. febrium *ὑπαρξίς* in quibus consistit 239, 8. febris, sine pepasmo non exoluitur, nisi sit *δυσωστέα* 521, 40. febrium aliæ ad manum mordaces, aliæ mites 132, 63. 252, 59. 473, 48. febres, quibus ad concoctionem longo est opus tempore, vnde nascuntur 528, 15. 16. iisdem numero diebus indicantur, quibus homines intereunt aut exoluntur morbo 282, 53. 450, 46. eodem ipso die exoluntur, quo rigor in iis dicitur 655, 470, 35. quænam periodice aut criticè abeunt, quociens in iis rigor dicitur 298, 63. febrium propria *ἐπιφανέστατα*, vrinæ 513, 50. 546, 59. quæ citò bona, citam ipsarum dimissionem ostendunt 513, 50. crises omnes suscipiuntur, naturæ & morbi insulæ 439, 30. crises secundæ, à pepasmo 439, 31. finitæ, à cruditate ac feritate maligna humorum 459, 31. crisis assidua sit *σῶσις*; excepta febre ardente 483, 50. critici septenarij 439, 28. febris propria & vera discessio, quænam 283, 41. febres quibuscunque non critica lege quiescant, postliminio reuertuntur 68, 40. die critico non quiescentes, reuertuntur 45, 41. pepasmo & prostratione carentes, crises non habent 43, 18. vnde renascuntur 342, 51. quænam relapsus non habent 46, 8. febrium initium, crisis nulla sperabilis 47, 22. initium, oppressionis summa omnia 84, 1. initio, si cui bilis atra sursum deorsumve exeat, mortiferè ægrotat 39, 53. insidiosa lenatio, sine signis lenationis 29, 29. febris, *πλέμων καὶ κτείνων* 227, 54. febrilis calor, bilis parens 551, 40. ardor, maximè infirmum quæ corpus 554, 28. ardoris quænam incommoda 278, 41, &c. febrium ardoris est, omnia corrumpere & putrefacere 570, 41. febris, bilem gignit ex pingui 515, 56. febris & bilis generatio mutua 422, 46. 62, 63. in febre, magna vis citandi catarrhum 228, 37. febris & catarrhi è capite, mutua *σωτηριότητα* 518, 47, 48. consensus vbi cernitur 62, 48. febris dum viger, frustra humoris in parte aliqua suscipitur concoctio 261, 3. dono nullus sit pepasms 299, 9. dono, suppuration non fit 299, 8. febres quæ à suppurato quiescunt, sudariunculam multæ habent 296, 50. febris, quomodo dolorem exoluit 325, 64. ægrum quomodo exercet grauius

et grauius 45, 12. his est exacerbata, quos super spumantibus deiectionibus inuadit coma 577, in febribus, malum quod circa ventrem est incendium 34, 10. febris & inflammatio viscerum hypochondriacorum, mutuas tradunt operas in perniciem ægri; & quomodo 19, 14, &c. febris & vomitus biliosi conspiratio mutua in vtriusque causam & incrementum 494, 53, 54. quædam æstus in ægri perniciem 494, 50. febris adaucta, vomitibus crebra est biliosis 494, 51. calamitosa vis, in quibus cernitur 130, 14. à malis orta, grauiissima infert mala 469, 1. symptoma inseparabile inflammationis systrophica 269, 13, 410, 27. in angina, vnde 239, vlt. cerebri vulnerati, vnde 410, 26. ab inflammato cerebro, quænam maleficia 410, 30. exorta in phlegmone tromatis, vbi salubris 369, 39. vbi periculo adicit 369, 25, 39. exorta in tromate, post 7. diem, æstus; post 14. hyeme; ad interitum fatalis 369, 19. quomodo à vesica inflammata 357, 9. febrium quænam commoda in melancholicis qui euasere fanatici 377, 27, &c. febris superueniens, conuulsionem sanat 194, 1, 225, 4. 227, 59. 466, 60. quænam conuulsionem sanat 615, 157, 4. 221, 48. 358, 2. 373, 51. oborta, æquè benigne facit conuulsificæ tensioni, atque apoplecticæ laxitati 373, 39. febrem superuenire conuulsioni, melius, quàm contrà 117, 11. 129, 53. 227, 58. febris superueniens, hypochondriorum dolores sine inflammatione, exoluit 19, 11. 325, 44. in febribus, quibus hypochondrium non est molle, cum faciei rubore; effluente maribus sanguine, conualescunt 365, 39. febres ex hypochondriorum doloribus; terrificæ 130, 16. 163, vlt. 174, 7. 180, 2. 196, 64. 325, 49. quæ ex aluinis doloribus nascuntur, terrificæ 180, 3. febris nata ex aluo liquida, intempestiue cohibita; pessima 469, 9. in febribus, aluo inflata, si status exitum non habet; malum 26, 23. 210, 22. febres quæ superueniunt bubonibus omnes, præter ephemeræ, præter 42, 64. febrem superuenire buboni præstat, quàm bubonem febri, in peste ac lue venerica 43, 2. febres quænam veniunt, calcanæo perfracto 175, 8. 42, 34. cum vertigine tenebrosa coniuncta, fuerint illi, necne; mortiferæ 38, 34. febri conuulsio finem imponit 70, 39. 84, 38. febris, à malis nascitur, quando superuenit choleste 469, 3. eximie tantum phlegmones ictericæ symptomata 179, 36. in nulla dissectione, cerebrum exortus rigor, & ægro pridem infirmo; periculum mortis infert 470, 44. periculose periculo non minus adicitur de prauis deiectionibus, quàm de vrinis prauis 545, 11. à febribus quænam morbi iuuantur aut cutantur 365, 24. in febre furditas alui sistit 208, 45. 460, 45. 495, 28. 498, 33. 562, 48. tremorem ciet, humoris à venis ad nervos pertransit 467, 23. interdum varias reddit vrinæ; longi est morbi 541, vlt. mitoribus vrina genituræ, de albuminea pituita 518, 37. acris, diuturnitatis quidem sunt causæ, non tamen funestæ 43, 13. sine febre, nihil suppurabile 299, 8. in febre deiectione prærubra, delirium portendit 567, 56, 57. conuulsio terrifica 16, 44. 16, 58. conuulsio non semper desperata 16, 60. à conuulsione ferius incidente, mors in propinquo ostenditur 466, 61. crurum dolores terrifici 240, 29. expurgationes liuidæ, nigre, biliosæ, cruentæ; omnes omnino malæ 257, 14. fandi impotentia mala 20, 37. cum febre quibus vox hæret post acrisiam, tremuli moriuntur 142, 41. in febre, manuum ac pedum labores terrifici 16, 44. à febre, grauis omnis iactatio sine vomitu nauseabunda 493, 56. & sine febre 493, 57. nihil salubre expectandum, nisi ad eos morbos qui vel à frigore simplici nascuntur, vel cum humore crudo 377, 34. à febre & segnicie veteriosa periclitatur animus 401, 17. in febre, abscessuum signa, si ex animo medici non fluunt, præter 80, 11. cardiognus malus 34, 11. ardor ventris ingens, cum cardiognis; malus 26, 7. palpitatio ventris, infaniam facit 184, 51. 402, 9. qui contremiscunt, non sunt apud se 224, 44. causæ funestæ quot & quæ 65, 8. à febre calamitosos nihil esse potest colliquamentum 554, 6. in febribus, quæ cum dolore micant in collo venæ, dysenterie habent euentum 69, 11. quæ liuent, mortem significant breui venturam 38, 44. à genium dolore, leuatio nulla sperabilis 16, 45. furarum dolores mentem præcipitant 16, 50. terrifica irruptio doloris à femore sursum 16, 45. strangulari repente, nec deglutire posse, sine tumore; malum 161, 39. febres ἀκνῶδες, quænam 21, 37. comatosæ, malæ 27, 55. κωφῆς; ingrauescentes, malæ 27, 56. febricula cum comate & capitis dolore; mortifera 566, 23. febres acutæ, celeriter, vehementer, & continenter mouen-

tur 64, 7. 107, 16. 228, 15. 403, 20. 478, 20. 508, 32. 523, 61. vnde ortum habent 369, 2. 508, 33. in venis & visceribus 69, 53. 490, 58. febris acuta & causis, vt differant 119, 34. febris acutæ materia quænam 64, 47. febris acutæ & tertianæ materia eadem 483, 48. 535, 25. febris acuta & tertiana, mortuum differentia distinguuntur 483, 48. febris acutæ crisis, 14. dies 74, 29. iuuenibus, per hæmorrhagiam: senibus, per dysenteriam 345, 3. febris acuta prægrandis, citam crin adfert, salutis vel interitus 30, 31. febris acutæ insigni estu par est totam corporis compaginem & humores incandescere 507, 6, 7. febrium acutum initium paroxysmi remissiores 53, 25. febres acutæ, solo curantur pepasmo 508, 35. febris acuta, apoplexiæ mox assumptæ causam & occasionem præcipit 369, 45. ab hepate exhausto & tosto 329, 45. febris acutæ paroxysmi, meliores diebus imparibus quàm paribus 206, vlt. paroxysmi, qui paribus diebus cidentur; mali 44, vlt. à febre acuta, intermissionis experite, motus introsum cidentur 483, 47. in febre acuta omni, corpus quodnam salubre 393, 35. nihil laudabilius pepasmo 239, 13. à febribus acutis quænam morbi iuuentur 369, 42. in febribus acutis, residendi cupiditas affectata 403, 22. sanguinis bile perfunctum regnum 109, 51. 195, 19. cum anxitudine sudor miliaris exudans; periculosum 32, 59. febrium acutarum funesta symptomata, quænam 40, 35. in febre acuta, liuor digitorum & pedum, semper apparet ad mortem citò venturam 395, 55. febris acuta vnde cietur frigidus sudor, mortifera 507, 20. conuulsifica, monstri similis 61, 4. vnde accenditur in maxilla luxata 510, 23, 24. febrium acutarum incendio, cita caloris natui extinctio 507, 15. in febre acuta, foris pariter, atque intus, calefcunt eximie quos occupauit 402, 30, 37. rigor criticus, semel tantum cietur ad crin: nec recipit 211, 20, 21. 475, 55, 56. manuum ac pedum rubores funesti 37, 33. bilem gigni synceram, non nouum 232, 7. 510, 24. 618, 20. 547, 60. à febribus peracutis tum adeps liquitur, tum caro tenera & recens coacta, tum sanguis ipse afflatur 518, 21, 22. febris ardens, quænam 73, 12. vnde 527, 19, &c. inter acutas eximia 74, 3. 507, 11. 527, 19. febris ardentis vbi focus 43, 7. 72, 17. 513, 63. febris ardens, inflammati cerebri sæpe consecutaria 88, 13. non raro in cerebro focum habet 49, 7, 10. aliquando raptis ichoribus à venis 432, 6. in tempestate austriua 36, 6. rigore superueniente, exoluitur 46, 41. febrium ardentium, quænam humor morbificus 217, 28. crisis propria, per plenam & liberam excretionem 74, 4. vis quomodo mitescit 32, 48. in febre ardente, non semper in promptu est triplex opportunitas τὸς διόπαις 73, 63. rigor criticus, non nisi cohibita sponte vrina, cietur 529, 60. semel tantum cietur ad hæmorrhagiam vel ad sudorem rigor criticus 529, 59. in febribus ardentissimis phlebotomia animi deliquum attingens, totum repente habitum refrigerat, febrémque extinguit 69, 36, 37. febris ardentis initio rigere, qualitatibus malignæ proprium 46, 41. febres ardentes, perurentes & malignæ cum sint, partes extremas non accendunt similiter vt mansuetæ 537, 55, 56. febrium ardentium quænam incommoda 71, 13, 50. 332, 32. symptoma eximium perfrigerari 537, 55. febres ardentes, symptomatis phreneticis potius replentur quàm comatosi 36, 4. febrium ardentium tremores, delirio soluuntur 72, 5, 23. febris ardens acuta, circa initia facit oculos concavos, collapsa tempora, & nares acutæ 320, 2. nata ex alui dolore; pestifera 498, 32. in febre ardente si alius profuse feratur, mortiferum 71, 2. 184, 34. febricitantes ardentem, quænam 73, 6. febricitantibus ardentem, caput ex euentu afficitur 48, 63. febris perurens, citam mortem adfert 134, 37. continua, quænam 64, 41. febris continuæ focus vbi 64, 52. febrium continuarum & acutarum crisis, 14. die 439, 43. febris continuæ symptomata, totidem morbi 85, 59. febres continuæ diuturnæ, relapsibus & abscessibus crebræ 79, 56. abscessus faciunt per materiam decubitus 180, 24. continuæ, tertio quoque die ingrauescentes, supra modum periculose 64, 32. 68, 63. 253, 7. quæ tertio quoque die exacerbantur; aut sunt tritæ, aut hemitritæ 64, 60. 188, 36. à febre continua periculum est mentis percussæ 448, 52. febris non discedens, & rigor cerebrum citius, ægro iam infirmo; lethalis 284, 33. febri non desinenti si rigor superueniat, mortiferus 44, 19. in febribus quænam discessio nulla est, intus ardere, & foris frigere atque sitire, mortiferum 392, 15. febrium diuturnitas, vnde 528, 15. febres cur longæ 465, 51. febrium diuturnarum materia

crassior 78, 51. febris ex acerbis doloribus nasci, diuturnior 43, 31. in Febre diuturna, nausabunda pruritatio; screatu finiens; mala 34, 1. 493, 5. 494, 44. in Febribus longis, exiguis, & erraticis; vrinæ tenuis, menciendi cunctis; lienosa 54, 1, 22. Febres quibus sunt longæ; suis tumores ad articulos, aut dolores exoriantur 528, 14. Febres quænam erraticæ 530, 34, 53, 54. Febris erraticæ, sola degenerat in quartanam 535, 29, 30. Febres erraticæ, ex incertis paroxysmis 533, 46. inordinatos ac certo typo carentes habent paroxysmos particulares 530, 36. ex Febrium erraticarum paroxysmis incertis, certæ nascuntur quartanæ 533, 46. inter Febres erraticas, continuarum longarum proprii abscessus 530, 51. in Febribus erraticis quæ nigrae sunt nubeculae, quartanas denunciant 530, 29, 53, 31. Febris essentialis, quæ ipsa per se existit 485, 33. in Febribus essentialibus rigores critici & periodici, exoriantur à vasibus 255, 36. rigores symptomatice, ab viceribus exoriantur 255, 37. Febris hæcticae atque tabificæ signum syllogisticum, manuum digitos extremos exasperari 278, 39. Febres horridæ, continuæ & intermittentes 277, 44. Febris horrida continua, hemitritæ ibid. horrida intermittens, quartana ibid. in Febre horrida, sæpe & multum sudore diffuentes, miserandi 9, 2. Febres *μη διαλειπτους*, quæ 19, 50. Febris intermissionis particeps, spei plena 64, 39. intermissionis expers, omnino mortifera 64, 38. Febrium intermittentium paroxysmi quomodo mitescent 32, 48. rigor periodicus, nihil aliud nisi paroxysmum denunciat 475, 53. longiorum mutatio est in quartanam 180, 24, 528, 31. Febris intermittens in continuam transiens, periculosissimus. 85, 56. Febris laboriosa, maligna & multiplicis cacochymiae particeps 22, 4. Febres laboriosæ, singultuosæ, cum cacochymia; malignæ 26, vlt. 27, 1. cur dicantur *κοπιώδεις* 486, 7. *κοπιώδεις* cui horrendæ 21, 25. Febrium *κοπιώδεις*, genera duo 11, 19. Febres *κοπιώδεις*, quænam in vetustatem incidunt 21, 22. Febris *κοπιώδεις* cuiusnam difficillima curatio 21, 33. Febre laboriosa laborantibus, ad articulos & maxillas abscessus expectandi 69, vlt. 497, vlt. Febris lenta & longa, partium esse exolutarum, & inde humoris morbifici 465, 52, 53. lypiria, inter acutas eximia 507, 11. Febris lypiriæ materia biliosa, ubi habet focum 665, 3. Febris lypiriæ, maligna cacochymia, proximè ad pestilentem accedit 66, 37. in Febre lypiria, non est calor æqualitas 392, 45. Febris lypiria, interiora perurit, exteriora ne modicè quidem calefacit 173, 30. 402, 39. Febris lypiriæ cœlestiarum frigus extimor 66, 50. Febres lypiriæ, non nisi superueniente cholera, exoluntur 66, 32. 67, 17. 77, 40. 468, 58. Febris lypiria, quando maximè mortifera 67, 14. Febres malignæ, vnde 385, 11. 498, 31. ex hypochondriorum dolore 18, 12. inter Febres erraticas, intermittentium diuturnarum propria *κοπιώδεις* in quartanam 530, 51, 52. Febres manucæ, totum corpus incendunt æqualiter 537, 56. Febris quartana, omnium vetustissima 332, 18. quare longissima, hyberna præsertim 167, 30. Febres quartanæ hybernæ, nonnunquam in acutas transcunt 85, 52. autumnales, longæ 414, 56. æstivæ; breves ibid. Febrium quartanarum *επισημασία* certa, periodicus horror ac typicus 533, 47. Febris quartanæ horror, paroxysmi discessionis prænuncius 196, 18. Febris quartana, sanar epilepsiam 64, 42. 129, 51. 227, 59. Febre quartana superueniente; magno morbo correpti, liberantur 271, 54. in Febre quartana, temerè purgationibus opera datur 46, 44. Febris rigorifera, tertiana exacta 529, 62. Febres singultuosæ, quænam 27, 4. vnde 27, 21. exituosæ 27, 20. Febris symptomatice, quando nascitur 19, 1. continuò vanescit, ut morbus vnde veni exoluitur 387, 62. Febrium symptomatarum ortus, non nisi ex magnis morbis 357, 8. Febris tabificæ ardore, partes linquuntur 278, 18. Febris tertiana exquisita, quinque, aut septem periodis, aut novem ad summum, iudicatur 80, 59. à Febre tertiana, motus cidentur extrorsum 483, 48. Febris tertiana, adolecentes facit incrementis augescere 129, 52. Febrium tertianarum exactarum *επισημασία* certa, rigor 533, 47, 48. crisis 13. die 439, 43. Febris tertiana exacta, citæ est crisis, & nullius periculi 64, 43. exhausta & sistit catarrhum 129, 51. Febres tertianæ exactæ cident rigores de bilioso humore ad cutim expresso *εξ τῆς βίλης* 533, 33, 34. erraticæ, solæ in quartanas transcunt 533, 43.

horridæ, erraticæ 533, 36. horridæ nothæ 533, 35. Febrium tertianarum notharum materia, permixtione bilis & pituitæ constat 533, 34, 35. in Febribus tertianis horridis cum velut nubeculae nigrae sunt; incertum horrorem denunciant 533, 23. Febris hemitritæ; propriè *σπινώδης* 8, 53. 186, 29. 196, 17. 533, 39. horrida, nonquam intermittit 533, 39, 40. Febres hemitritæ, continenter in acutus ductæ 64, 60. 188, 36. exacerbationes habet horridas atque stas 15, 30. inter omnes maximè mortifera 65, 2. Febres tritophyæ, vnde nascuntur 15, 39. cacochymia multiplicis vitio & corruptione accenduntur 23, 2. qualiter malignæ 20, 21. quomodo erraticæ 23, 22. natura sunt *πενασαί* 22, 63. Febrium tritophyarum *πενασαί* in *ἀρτιασύν*, vnde 45, 6. Febres tritophyæ, quæ, per initia, imparibus paroxysmis habent, aut diuturnitatem morbi indicant, aut pessimam crisin sexto die venturam 23, 46. intermissionis expectes, tertio die ingrauescentes, sine rigore periodico 15, 28. non transcunt in quartanas 533, 41, 42. Febris tritophyæ medius cursus, qui 23, 29. Febres tritophyæ, fastidiosæ, terrificæ 20, 19. foeliciter paucis diebus iudicari non possunt 23, 36. nullas exacerbationes habet, aut certè incertas 15, 30. perpetuò in peius accrescentes. 188, 35. Febris tritophyæ particularis periodus, quoribus absolvitur 23, 30. Febres tritophyæ, periodorum particularium paroxysmos habent diebus imparibus 23, 35. erraticæ, in pares mutatur, contumaces 45, 3. 64, 45. 253, 51. 530, 45. Febres tritophyæ, semper in paroxysmis aliquid mali adferunt 253, 8. Febrium tritophyarum paroxysmi erratici 15, 35. rigores inordinati & erratici 15, 38. incerti rigores, valde maligni, cur 15, 42. incerti rigores qui medio febris cursu exacerbantur; terrifici 23, 28. 205, 46. 530, 43. calamitas in quibus consistit 41, 50. Febris tritophyæ periculo defuncti multi, quibus conuersio facta est ad strangulosam vrinam 505, 27. Femoris articulus cum tibia, per ginglymum 424, 16. cum ischio, per enarthrosin ibid. in Femoribus nervi crassiores quàm alibi 424, 14. Ferini nomine quænam continentur 353, 31, 32. Fernelij opinio de calculo 360, 1, &c. Ferocitas, quid 48, 10. 49, 27. prima inter omnia perturbationum genera 48, 25. in quod delirij genus cadit 48, 27. phreniticam affectionem denunciat 48, 39. Ferula 413, 42. Figura omnis teres atque rotunda, ægrius consistit loco, quàm plana 399, 43. Figuræ leuantes, quænam 361, 30. Finditur quicquid, idem contunditur 406, 29. 411, 36. Fissuræ à quibus telis, ossibus inferuntur 412, 30, 31. fissura ubi cernitur 411, 37. in fissura longius excurrit rima, quàm ubi telum infuderit 411, 25, 37. 412, 24, 63. fissura, suturæ impressa, non nisi à sciente animaduerti potest 412, 9. fissuræ, quæ vel in suram incidit, vel proximè ipsam, inuentio difficillima 411, 7, 43, 56. ad suram curatio temeraria, non raro *αὐτὸ τὸ κτείνον* 411, 56. fissuram inueniendi difficultas, non raro interitus causa, & quomodo 411, 53. fissuræ non spectabilis nec tractabilis, dubitatio, quomodo tollenda 412, 52, &c. de fissura non inuenta, cum ea subest alibi quàm in offe periculoso; medici excusatio accipienda 413, 1. fissura neglecta, aut perfunctione ac negligenter quæstita, non prius apparet, quàm signa ediderit mortis in propinquo 424, 33. fissura est occulta, vel sede ipsa, vel rimæ idea 414, 47. fissuræ causæ sunt, corruptio & inflammatio 414, 37. Fistula, quid 165, 35, &c. fistulæ vnde dicantur 431, 22. fistularum origo, phyma, vel aliud quoduis viciis male curatum 431, 24. fistula à summa humoris feritate & acrimonia 431, 26. fistulæ, aliter esse non possunt, nisi causæ 431, 43. quænam facilius sanescunt 432, 26. quænam molestissimæ 430, 59. cur molestissimæ 431, 17, &c. quo pacto cuniculosæ 431, 48, &c. vicerum quæ inconspicue sunt, velut principes ac reginæ 431, 3. fistula aliquando pro incolumi puris ductu 431, 9, 16. naturam retinet carcinomatis, nara ab atra bile 431, 29. continenter diffuit, vel proprio vitio, vel alieno 431, 58, 60. fistulæ contumaces, quodnam certum *επισημαστέον* 431, 57. contumaces & sanici ferinæ documentum, caruncula fungosa 432, 25. in quam parte facilius nascitur caruncula 432, 23. fistula, nimio ichore imbuta, & in ore suo vicerata, caruncula assurgit 432, 19. fistularum in ano, quænam causa 431, 24, 25. curatio 432, 30, &c. inflammam

Flammam sudore accendi, monstro simile 32, 47

Flatus, quid 397, 26. sine flatu non est humidi circumtentio 551, 2. flatuum in intestinis parens, cruditas 329, 5. 389, 8. 397, 29. flatus sonorus in auribus, unde 71, 53. flatuum in ventre permanens, unde 329, 6. flatus alui, nutriticus œconomiam cuiusmodi sit, ostendunt 397, 19, &c. flatuum alui, triplicis omnino idea, *στυφνός, φαρμάκων, καὶ πνευματικός* 397, 41. exclusio absque sono & strepitu: optima 397, 10, 45. flatum cum sono transire, melius quam sursum reuolui 397, 11. flatus sonori ægro traiectione, vexantur ægri 397, 61. flatuum interceptio nulla, dispositionem infert inflammationem 179, 44. 184, 61. 207, 51. 291, 49, 58. flatus translatio nulla, inflammationem parit affectionem 291, 58. à flatibus alui, subsistitibus, termina læna 397, 52. flatus reuoluti, foras non exeunt sed intus lædunt atque subsistunt 397, 50. cur subsistunt 397, 51. unde traiciuntur infra, & sine sonitu excluduntur 397, 47. infra traiectione, quantumvis ægrè & inconsideratè, cum sono; incommoda multò minora, quam reuoluti sursum 397, 55.

Fluxionis concitatur fons & origo, caput & cerebrum 157, 30. fluxiones in superam aluum, suppurant intra viginti dies 236, 24

Fœtus tota graviditate, velut sedendo, in aluo delinuit 476, vlt. dum manet in vtero, purissimi sanguinis portionem sibi attrahit 441, 37. alimenti ne micam quidem capescit ex aluo 441, 35. fœtus in vtero nutritio & accretio, repletionem valorem esse non finit à menstruis 485, 62. genium defraudat, comæatus paupertas in fœta 459, 47. per venas maternas respirat 451, 50. suspensio ex allantoide vacua, vinctulorum vteri ruptionem adfert 442, 1. in partu, cum foras viam affectet, sese extendit 476, vlt. facilis exclusio à concussione, quando est grauitas grauiditatis affectæ 459, 28. simulatque venit in lucem, fœtus aluum transmittitur 441, 36. fœtum excutit sternutatio, cum piger est in exiendo 468, 62. in fœtu esse *τὴν ἔρσην*, nullam autem *ὑποχώρησιν* 441, 34. fœtus, deiectionum maternarum fœtore offenditur 458, 46. mares cur dextro vteri sinu gignantur, & gerantur 203, 57. fœtum peius habet quam matrem, materna dyspnoea parua & frequens, & quare 451, 51. fœtus, non vitalis potius septimestri partu quam octimestri, si partio nouimestris ipsum manebat 446, 39. octimestris, cur non vitalis 446, 12, 13, 34. leui de causa abortio esse solet 470, 5. ex fœtu abortiuo, purgamenta liberaliter non eunt 443, 32. in fœtu abortiuo, nihil votis responderent parentum & medicorum 443, 25. vita non sperabilis 445, 59. ad fœturam vnâ funditur cum femine alimentum 454, 38

Fons idem multos fundit riuulos 337, 2

Forma se excedit ad materiam quæ applicatur 421, 20. à corrupto abest 557, 57. vna in viuente, qua vnâ est 421, 6

Forus, pulmonem exciscat, & suppurat accersit 381, 53

Fracturæ ampliores, minus periculose quam exiles & minus angustæ 408, 18. fracturarum differentiarum quatuor, *ἡ ἔδρη, ἡ φλάσις, ἡ ῥύγξις, ἡ ἀσυνέσφλασις* 106, 3. medicina omnis, quò spectat 417, 59

στυφνός, iidem qui morbo acuto correpti 8, vlt. 9, 11

Frigus & calor, præter cætera, in partibus sentiuntur 31, 12. frigoris propriū, partes in mouendo pigras & segnes reddere 137, 31. 172, 62. frigus vel criticum, vel peridodicum, vel sympromaticum 391, 48, 49. cum metu & merore, immerito conuulsione finitur 5, 19. ex rigore non incallescens; malum 202, 42. 471, 43. quodam peius iactatione non iudicant 24, 20. cum rigida cute & artubus; funestum 4, 30. extimorum, calamitosius quam totius corporis 239. partium extimarum, febriū acutarum symptoma malum 30, 59. comes febrium ardentium & lypyriarum 1, vlt. in morbis acutis; graue malum 392, 16. signum mortiferæ inflammationis proprium 30, 61. mortis est propinquæ 391, 60. cum liuore coniunctum, cum in propinquo mors est 276, 51. eximium ex hæmorrhagia critica, lethale 389, 34. cum sudore si cui purgationi redundanti adueniat; funestum 501, 31. posteriorum, conuulsificum 13, 45. 24, 61. 48, 45. 131, 45. 534, 24. symptomaticum, duplex 391, 50, &c. torpidum, duplex 389, 20, 21. ad frigus torpidum neutrum, bene sit à phlebotomia 371, 46. 389, 18, 21, 34. ex frigore, suppressio vrinæ pestifera 5, 50. frigidum, neruis inimicum & necat 227, 45. frigidum perimit omnia

quæ sunt à calido

Frontem contrahi, in facie vultuosa, phrenitico 122, 24. 348, 63. frons sola inter caluarie partes, inflammationi exposita 106, 13. 406, vlt. ad frontis arcendam inflammationem, repellentibus interdiciendum 212, 21. fronte pertusa mortiferè, vitam finiet sanciat, 14. die 406, 40.

Fuliginosi coloris quænam causa 260, 18. 288, 48. fuliginosum, multum differens à nigro 260, 17. fuliginosa lingua, læuis 260, 19. à fuligine, superficies tantum fucatur 260, 17. 288, 46

Fundus, unde 65, 43. 188, 27

Furor, quid 496, vlt. à melancholico sanguine 40, 9. furiosi, quinam 381, 20, 29. furibundis, hæmorrhoides aut varices, propè iam alienato cerebro, nihil prodesse 381, 44

Fuscum, in propinquo est nigri 526, 35, 36

G

GALENVS vbicumque ingenium exercuit, in eo reliquorum mentes oportet conuiescere 570, 61. cogitationes suas cur literis mandauit 18, 19. censor actori promthetorum 18, 31. Galeni eruditio singularis in explicatione promthetorum 18, 29. Galenus, ex Coacis multos flores collegit 293, 54. Coacis & promthetico bellum indixit 305, 5. Galeni pertinacia in deroganda fide Coacarum prognosticon 293, 54. iudicium de crassescens excrementis 24, 58. iudicium *πὸς τὴν ἀσπῆν* 43. opinio de febre maligna ex hypochondrij dolore 18, 36, &c. scitum de bilis effusione 10, 4. Galenus inter *ἀδυναμία* & *ἐκλυσήν*, nihil interesse putat 33, 53. negat ærem dici *θελερόν*, sed errat 30, 47. *ἀναδιρρυνήσας* interpretatur *ἀναπυρέσας* 2, 37. vt interpretatur *κακοήθης* 16, 54. negat vllum delirium, ferocitatem editum; fieri causa febris 49, 49. *ἡ ἐρύσας*, quomodo interpretatur 20, 1. qualiter ait maniam gigni posse ab humore melancholico 40, 4. *ὁ μῆκος κατεκλάσιν* interpretatur *τὴν βλεφάρων διασπορὴν* 127, 48. vt interpretatur *ἡ παραλόγος* 14, 9. negat ex peripneumonia oriri abscessus, cum biliosus est humor 266, 25. vt interpretatur *ἡ φλέγμα* 59, 37. vt explicat verbum *προσέδυναμίας* 13, 16. Galeni de vrina iudicium 112, 57. Galenus negat ex vrinarum signis, quippiam certò ad delirium apparere 18, 3. Galeno qui *ἀναυδὲς* & *ἀφρονος* 20, 41, 42. *τὴν ἀρροήσας* quæ causa 39, 46. delirium & carochè, non *ἀσύντα* 90, 50. *τὰ ἐκθῆματα*, quid, & unde 63, 43. quid, *ἡ ἐπιγνώσις* 53, 14. garrulitas in morbis, est phrenitica 12, 25. quid significet, hypochondrij tractabilis tensio *ὑποκαταρροή* 19, 29. *ἡ λυγρὸς*, quid 58, 41. *ἡ λυγρὸς*, quid 96, 17. *ἡ μύρωσις*, *ἀπὸ τῆς νεφροπνοῆς*, vbi 113, 24. parotidum dolorificarum causæ, quæ 114, 31. Galenus *τὰ φλυγῆματα* vt interpretatur 63, 35. Galeno in morbis silentium est melancholicum 12, 15. *τὰ οὐκὰ* sunt *αἱ ἐπινευστικὲς δὲ καὶ οὐκὰς* 128, 56. *βάρος*, quid 41, 24. *βραχυπύτη*, qui 54, 57.

καλαγχώνες infantes, unde 139, 3. 420, 20 apud Gallos, capitis tromata *δυσλαλία*, tibiurum *ἀλγία* 429, 33

Gangræna propriè, carnis corruptio 105, 4. 138, 61. gangræna & *καὶ γρῶν ἔδρη* vt differant 105, 7. cum amputatur, nulla restat basis nec fundamentum accretionis 419, 58. partium spirabilium, mortifera 290, 44. in vesica, mortifera 357, 24, 62

Garrulitas in morbo; phrenitica 12, 15. 20, 53. 374, 35. phrenitica, vbi consistit 12, 31

in Gena tenue; quidnam 419, 3, &c. 443, 58. in gena quod est tenue, resectum, non coalescit 418, 44. genæ rubentes cum spiratione sublimi; excursus ad superiora, neminem ignarum esse sinit 576, 2. sublimis ebriosus diuturno somno excoctis, unde 75, 54

Genitura, vnde cunq; procedit 434, 42

Genua, crisis non capacia 17, 45. genuum dolores, vbi in bonis censendi 17, 50

Gibberes, vt plurimum, iuxta pulmonem enascuntur 192, 41. Gibberos qui ante pubertatem sunt, ex asthma te vel tussi, moriuntur 293, 22

ἡ γίγνησις, *φύξις*, *ἡ φύσιν*; idem 188, 26

Gingiuarum caro simplicissima 96, 60. 97, 2. 141, 3. è gingiuis qui cum alio liquida sanguis exudar; pestiferus 318, 8

Gladiatorum pariter dimicantium, virtute pari, diu victoria manet anceps 516, 16
 in Glande quercus latet 420, 59
 Glutinosum, commune omnium excrementorum crassorum 257, 27. glutinosa excrementa sunt in morbis acutis, à febrili ardore: in frigidis, à crudore 257, 28
πύρρα prima, & *τῆς ὑπερχύτης*; postrema *τῆς ἀσπυρῆς* 193, 30
 Grauedo, proprie dicitur de coryza 272, 1. Symptoma est catarrhico cerebri humorem tenuem exprimentis 272, 13. cur lienosis materiam & occasione præcipiat 272, 7. grauedinosis raro sunt lienosi 272, 5
 Graviditas totam occupat amplitudinem epigastrii 465, 6
 Granitas corporis, quid 394, 16. vbi cernitur 394, 24, 56. totius corporis, manuum item ac pedum; pestifera 395, 53. ad grauitatem omnem partium sanguis nõ detrahendus 382, 43. grauitas numquam per sympathiam 157, 22. vbi; ibi morbus 275, 5. 304, 21. vbi; ibi firmiter fixum rheuma consistens 473, 22. 540, 20. in qua grauitate sanguis detrahendus 157, 22. grauitas doloris acerbis succedanea, signum syllogisticum mutatae phlegmones in suppurati 280, 9. succedanea doloris acuti, signum syllogisticum pleuritidis in empyema conuersa 304, 20. grauitatis sensio in hypogastrio, pertinet ad vesicam 540, 23
γαῖς, proprie pinguium in sculorum 529, 18. 530, 21.
 531, 34
ρεῖσος, rete piscarium 196, 61. 201, 23. 329, 26
 Grossis à cruditate, impeditur accretio atque maturitas 479, 15
 Guaiaci visus, quod contra virulentiam, è viscerum inflammatione sudores exprimit, explodendus 230, 60
 per Gulam itur à faucibus ad inferum ventrem 469, 65
τῆς γυναικείας significatio multiplex 200, 11. *τῆς γυναικείας*, vide plura ad nomen *Muliebrium*, sub litera M.
γυναικείων verbum, quod spectat 440, 41. 466, 33
 Gustatus instrumentum, aquosum 124, 23
 Guttæ crampæ, cruciati sæui doloris penè intolerabiles 300, 63
 per Guttur à faucibus itur ad superum venter 469, vlt.
 guttur vbi dolet, papulæ per corpus erumpunt 155, 1

H

HABITUDO corporis vbi cernitur 317, 40
 Habitior cum sit pars omnis, suauiter 278, 25
 Habitus, à priuatione denuo comparari non potest 5, 43. 124, 33. 288, 38. 312, 9. 331, 50. 378, 64. 395, 1. 416, 56. 421, 8
 Hæmorrhagia absolute, ad sanguinem pertinet nariibus effluentem 201, 50. 486, 25. 561, 46. partium superiorum vnica salutaris 219, 1. 457, 37. Hæmorrhagiæ & deliria, à calidis & tenuibus humoribus 36, 12. à venis tantum magnis diuisis, non à paruis 309, 58. 310, 1. 315, 53. hæmorrhagiæ tria genera 201, 54. similis ratio esse non potest in epigastricis tumoribus, vt in visceribus hypochondriacis 168, 24. ad hæmorrhagiam propensio nature, vbi cernitur 62, 3. hæmorrhagiam ciet ceruicis dolor cum oculorum rubore 94, 14. 95, 16. 486, 24. hæmorrhagia, in excussione consistit 73, 34. hæmorrhagiæ signa obscura & varia 62, 1. signa, loco edita, si *ἐκάλειος* apparent; ita sunt *δυσπεψία*, vt phrenitidem mox adfuturam denuncient 508, 24, 25. vis magna ad immutandum corporis habitum 217, 19. finis 35. ætatis annus 316, 47. hæmorrhagia omnis, iure & loco per nates prorupta, salutaris 210, 10. hæmorrhagia, iuuenum est 89, 10. 93, 44. 294, 59. Hæmorrhagiæ commodis iuuenes fruuntur à 18. ad 34. ætatis annum 371, 28. per hæmorrhagiam, iuuenes febribus ardentibus defunguntur 66, 42. hæmorrhagia ephelborum, quo anno finitur 436, 25, 26. hæmorrhagiæ; duce natura, & critica lege peractæ, quænam commoda 217, 21. hæmorrhagia optima, omnino morbum exoluit 205, 53. bona, efficit vt æger alacrius morbum ferat 205, 53. bona est, quæ iure & loco fit, sanguinis suo sero diluti 206, 16. tercio die bona 100, 42. ab hæmorrhagia vires sunt vegetæ 95, 8. hæmorrhagia omnis lege critica, salutaris 219, 6. hæmorrhagiæ particularis critica, quædam 201, vlt. 202, 1. &c. hæmorrhagia, crisis propria causi 71, 6. 201, 57. hæmorrhagiæ in cauo,

quænam singularis causa 69, 54. hæmorrhagia ardentem febricitantibus, vnde 77, 35. crisis propria morborum acutorum 202, 15. propria cephalagiæ prægrandis & symptomaticæ 92, 46. liberalis, sæpe cephalagiæ finem adfert 66, 21. post 20. diem non sperabilis in cephalagiâ 130, 42. vbi sperabilis 94, 9. sanat hypochondriorum dolores inflammatorios 66, 22. surditatem exoluit à febre natam 114, 5. non raro morbos exoluit qui videbantur lethales 166, 3. Hemorrhagiæ multæ, difficilia multa dissolunt 215, 42. hæmorrhagiæ *κρίσις*, & *ἀμφύπνοος* 215, 17. hæmorrhagiæ largæ, quænam causæ 50, 59. largæ, vnde 190, 25. hæmorrhagia largæ, à magnis morbis vindicat 50, 38. largæ, non cadit in venulas 310, 10. hæmorrhagiæ largæ ex lumborum dolore, quibus signis denunciantur 189, 42, &c. quæ ex lumborum dolore cidentur; largæ 189, 28. 192, 60. 205, 28. largæ in criticis exacerbationibus, pessimæ 216, 42. hæmorrhagiæ largæ si superuenierit conuulsio aut singultus; mortiferum 500, 54. hæmorrhagia crebra, vnde 209, 52. liberali superueniente quiescunt nictatio & aphonia 44, 10. hæmorrhagiæ symptomaticæ species tres 204, 21. hæmorrhagia superuenit vehementi pulsui in visceribus 69, 29. 189, 20. 30. 204, 32. conuulsificæ aut singultuosæ, non raro à vulnere *ἐκάλειος* 204, 33. phlegmonarum initii, morbo defunguntur ægroti 107, 43. *κατ' ἔξω*, in bonis ducenda 166, 26. 202, 58. *κατ' ἔξω*, verum *ἐντὸς* phlegmonarum systrophicarum 203, 45. quæ fit è diuerso, mala 166, 28. 202, 61. 203, 6. 29. 229, 64. 274, 24. 305, 4. conuenienter non fit stillarum & parca manu 72, 45. vi suppressa, conuulsionem facit 83, 218, 43. 189, 26. quartana, loco non fit 72, 44. quartana, iudicii sinistra 45, 48. 205, 22. 206, 59. 207, 1. 467, 57. hæmorrhagiæ quartanæ quænam incommoda 467, 58. hæmorrhagia quartana si cui est, diuturnitatem ostendit 467, 41. horrida, quænam 83, 59. quodammodo periodica, in quibus cernitur 456, 57, &c. plethoræ propria vacuatio 95, 29. 302, 9. plethoricarum affectionum propria, vbi parum prodest 216, 11. ab hæmorrhagia immeritò cohibita, minora mala, quàm ab immoderate profusa 218, 20 hæmorrhagia profusa, vnde 209, 54. profusa corpus infirmissimum reddit 83, 19. hæmorrhagiæ profusioris tres causæ 206, 32. hæmorrhagia quibus profusior est, labentibus inde diebus, iis in vicio sunt alui 322, 56. profusior terrificæ 201, 42. 205, 10. caloris dissipationem & paupertatem adfert 211, 38. hæmorrhagiæ profusioris symptomata quænam consecraria 209, 39. 217, 22. hæmorrhagia inchoata, sed non perfecta, sæpe conuertitur in paratidem 497, 59, 63. si morbum non immittit, periculum adauget 561, 46, 47. quænam funesta 302, 25 quæ non iuuat, pestifera 302, 23. pestifera, cum præterbra illuie fertur aluius, 322, 58. pessima, sanguinis meraci 24, 40. 206, 16. temporalis musculi sauciati, intra decimum diem funesta 226, 2. ab hæmorrhagia, nigrore deiectio; graue malum 209, 62. 322, 58. 572, 3. ex hæmorrhagia critica, frigus eximium, lethale 389, 34. ex hæmorrhagia, hydrops 190, 49. 331, 29
 Hæmorrhoids, pro hæmorrhagia vndeunque illa citatur; Aristoteli 464, 42. pro hæmorrhagiæ pulmonum 464, 38. hæmorrhoides fluunt, aperta vena in ano 346, 31. infra ducuntur, sine vlla peristole intestinorum 552, 23. menstruæ purgationes, & dysenteria *αἱματώδης*, partium inferarum 219, 2. in hæmorrhoides, hepar suum retinet, potens adhuc humoris & venarum 553, 28. per hæmorrhoidas quænam partes expurgentur 370, 59, &c. hæmorrhoides cur non sunt in pueris 435, 21, 22. hæmorrhoidum nulla causa in constanti ætate 437, 52. hæmorrhoidum commoda, potissimum; quando nigra illac effluunt 371, 21. conuenienter fluentium commoda quænam 289, 20. hæmorrhoides conuenienter ductæ sanant & arcent grauissima quæque mala 210, 11. 219, 7. ad vtrunque vitium, repletionis & melancholicæ cacochymia, bene faciunt 371, 31. per *μετὰ πόνον* obortæ, bonæ 219, 10, &c. 371, 4, &c. quæ per *ἐκάλειος* & sympathiam feruntur; malæ 219, 14. quæ veniunt apoplecticis; salutares 370, 20. earum commodis apoplecticis omnes non fruuntur 371, 8. hæmorrhoides, quibus apoplecticis commoda 371, 14. furibundis, propè iam alienato cerebro, nihil profunt 381, 44. aut varices insanientibus exortæ, insaniam sanant 315, 5. 378, 24. melancholicis & nephriticis, bonæ 543, 4. 315, 3. hæmorrhoidum cohibitarum

cohibitarum anadrome si fit ad hepar, nec inde habet *ἀναδρομή*, ibi facit hydræpem 482, 11. si fit ad pulmonem. ibique subsistit; peripneumoniam, empyema, & phthisin mortiferam excitat 482, 12. ab hæmorrhoidum vacuitate hæmorrhoidis, quænam accidant mala 218, 41. hæmorrhoides cum inconsideratè fiunt, eadem prorsus inferre solent symptomata, quæ ab iis arcentur dum convenienter feruntur 212, 16. 289, 21. 371, 1. ex hæmorrhoidæ quantumvis parum & parumper aperta, oboitæ vertigines; paraplecticum quippiam ominantur 289, 19. 370, vlt. 371, 11.

Hebetudinis nomen generalius, quàm visionis calliginosæ 125, 26. hebetudo nullam concretionem ostendit humoris contra naturam 125, 28. hebescenti constructo, vnde. 367, 43, &c.

Hemitritæus; febris acuta, continua, horrifera 161, 26. de Hemitritæa, vide ad nomen *Febris*, sub litera F.

Hepar, fons & origo gratiosi humoris 454, 40, 45. 485, 8. fons alimentis, & caloris nutritivum conveniens 571, 22. principatum obtinet œconomiz naturalis 426, 16. voluptati inseruit 374, 61. hepatis opus, *αἰματώσις*; nutriendo 440, 24. opera carere nō possunt cerebrum, nervi, intestina 571, 19. ab Hepate, conservatio temperici 571, 21. penes hepar nutritio est, in commodatius valetudine 426, 17. hepatis functionis impeditæ, duæ causæ proximæ 322, 15. penes hepar est *ἀστροφία* & nutritus depravatio, in adversa valetudine 426, 17. in hepatis *ἀστροφία*, fundamentum principatum ac facultatum vitalium & animalium 426, 18. in *κακὴν ἀστροφία*, destructio principatum ac facultatum vitalium & animalium 426, 19. à *κακὴν ἀστροφία*, sanguificandi frustratio vel depravatio 426, 20. hepatis *κακὴν ἀστροφία* triplex 67, 43. hepaticæ functionis impeditio in quibus cernitur 328, 52. hepatis propagines, venæ 203, 50. 553, 27. hepatis nocentissima, carniū bubularum edacitas, & ingluvies vini fortis 345, 39. hepatis partium cauarum, propria per alium expurgatio 325, 24. in hepar *ἡ δυσκρασία* cadit primum & per se, aut aliunde superuenit 322, 32. hepatis dyscrasiz incremento, omne genus accidit symptomatum hepaticorum 322, 40. ipsius dyscrasia primigenia, vel congener est, vel coætanæ & coætuæ 522, 33. congener dyscrasia, iuris est gentilitij elephantia & virulentia 322, 36. coætuæ dyscrasia, omnis adversæ valetudinis parens 322, 37. dolores, excluso sanguine discedunt; non excluso, interimunt 565, 35, 36. oppressionem facit sæpe simplex humoris biliosi aut pituitosi collectio 566, 11. oppressionem leuat dysenteria larga, breui conquiscentes 565, 41. tumor, tractabilis in hypochondrio 356, 45. hepar durum, vel ab oppilatione, vel ab inflammatione, vel à scirrho 386, 2. prætumidum suo appulsu multum opprimit diaphragma 334, 16. 336, 1. hepatis inflammatio, tensionem facit. 41, 27. phlegmone systrophica, primis morbi periodis mortifera 358, 51. hepatis inflammari signum, tumor durus ac dolorificus hypochondrij 463, 11. hepate inflammato quò citius venit hæmorrhagia liberalis; eò res ægri melius eunt 248, 53. ab hepate inflammato, hypochondrij duritas multum oppressi atque distenti 463, 42. hepatis inflammationis eximie tantum, symptomata febris 179, 56. hepatis inflammari & pleuritidis, diuersa doloris proprietates 178, 50. hepate inflammato, pleuritidis falsò creditur ibid. inflammato, ab æruginosa bile, singultus 490, 34. hepatis inflammari à systrophica inflammatione, seu symptomata; & quædam ea 458, 12, &c. eius caui inflammatio, vix hypochondrij distentionem habet tractabilem 164, 42. in hepatis cauo, phlegmone systrophica quænam symptomata 325, 54. hepatis coæxi inflammatio magna, facilem exhibet in hypochondrio contagionem 164, 42. in hepatis coæxuo phlegmone systrophica quænam symptomata 325, 54. exhausti atque tostii quænam causæ 329, 44. ab hepate exhausto & tosto, febris acuta 329, 45. hepate inusto quibus velut amurca prodit; funestum 326, 21. hepatis *ἀστροφία*, ab extrema visceris intemperie 322, 24, 32. 343, 63. *ἀστροφία* omnem comitatur coloris fœditas, atrophia, & cachexia 323, 1. *ἀστροφία*, saniosum sanguinem continenter fundit 556, 15. exolutionis causæ sunt, vel primigeniæ, vel ipsi accedentes 329, 39. exolutionis causæ primigeniæ, vel intrinsecæ, congeneres & coæquales, vel extrinsecæ incidentes à dietæ vitio 329, 40, 41. exoluti cacopragia, prolucem facit sanguinis non grumescens 188, 46.

humorem gratiosum depopulatur cæcus ignis 329, 51. marasmus à febrili ardore, aut citò mortiferus, aut hydro-piscus 329, vlt. marasmi causa prima, cæcus ignis 329, 44. causa secunda, ardor febrilis 329, 44, 59. hepar dissecari; mortiferum 418, 7. 424, 32. hepatis quæ diaphragmati adiacet, & ubi truncus est venæ insignis, vulnus illatum; citò mortiferum 426, 25.

hepatici, quinquam. 321, 50. Hepatitis, Hippocrati quænam vena 426, 25. hepatitis cum corde facilis communicatio 339, 45.

Hepatitis, quid 321, 51, 53. generatio duplex; una, hepatis impedita functio; altera, substantiæ ipsius primigenia exolutio 322, 14. generatio tria 322, 42. &c. earum quales colores 323, 1, 2. hepatitis & hepaticus, ab hepatis *ἀστροφία*, sine systrophica phlegmone 321, 45. in hepate & hepatis *ἀστροφία*, spui cruenti, aut biliosi meri copia, mortifera 323, 32. Hepatitis homini necando ipsa per se satis 324, 2. à phthisi generatur 323, 46. hepatitis & phthisis mutua conspiratio in ægroti perniciem 323, 45. incommoda paria 321, 58. in hepate, phthisicum est, continenter rursus cum raucitate 323, vlt.

Heropyti Abderitæ cephalalgici historia 108, 30. Hiare, quid 401, 3. Hiaris oris in morbo vnde 401, 3, &c.

Hippocrates omnium primus, admirationem sustulit 220, 30. veritatis medicæ tribunal 280, 3. *φίλαστρομος* 33, 44. Hippocratis benignitas quanta 415, vlt. *ἡ δὲ δόξα*, legibus grammaticorum, nec poetarum, nec rhetorum verbis astringenda 301, 61.

τὰ δὲ ὅμματα, νοήματα 301, 62. solertia & sapientia quanta 415, vlt. 416, 1. Hippocrates in pluribus à præceptore Prodicò discedens 563, 11, 12. primus τὸ *ῥήματα* nōmē τὸ *ἀστροφία* imposuit 247, 52. Hippocratem ducem si sequamur, nunquam aberrabimus 181, 12. Hippocrati solenne, animam coelestem vel diuinam potius, dicere *ἀναδρόμω* 420, 47. Hippocratis consuetudo, exordiri ab eo quod ille vocat *ἀστροφία* 512, 51, 52. Hippocraticum non est, idem bis dicere in eadem prognosi, & in eundem scopum 493, 54. Hippocratis in more positum, viteritum atq; iterum ponat idem exemplum; nec tamen scopo eodem 484, 29. Hippocrates, pulsuum notitiam habuit 75, 49. Hippocratis consuetudo, explorandi manū qualitates corporum 132, 60. Hippocrates pharmacæ quamplurima nōnerat 388, 30. febricitantibus catharticum non exhibuit, nisi summa necessitate coactus 179, 61. non inopia pharmacorum, sed meliorum delectu, peplicū & veratrum simul mixta, ad pleuritidem inferam præscripsit 388, 30. neminem vidit qui cum pepalmo intericrit 29, 37. Hippocrati familiaris, affectionis & rei affectæ mutua vsurpatio 19, 42. 324, 18. apud Hippocratem frequens causarum morbosicarum vsurpatio pro morbis 91, 26. Hippocrati humores *συγχευόμενοι* 510, 64. Hippocratis iudicium de humorum exitu 203, 59. iudicium de abscessibus criticis 79, 15. Hippocrates, de natura febris tritæophyæ 15, 34, &c. febrium ardentium quot indicatorias statuit causas 71, 10. Hippocrati quomodo dicti reuertentes morbi 46, 1. apud Hippocratem, *ἀστροφία* quænam, quid 21, 11. Hippocrati, phrenitides ferinæ, quæ 31. penult. vrinæ aqueæ & pellucidæ, potissimum ad phrenitidem apparent 112, 60. vrinæ iumentorum similes, cephalalgiam præsentem, aut breui futuram denunciant 112, 61.

Homines à Deo cur conditi 439, 6, &c. in homines numen, magnā vim habet; inde naturæ mulierum 440, 29. Horror vilis à frigore 62, 22. à sudore hæmorrhagiam denunciat salutarem 204, 46. horror & rigor, nunquam sine febre ciuntur 277, 47. 299, 3. pro rigore, quid denunciat 22, 6. Horror, *ἡ ἀστροφία*, *ἡ ἀστροφία* 186, 25. 298, 62. horrores *ἀστροφία* *ἀστροφία*, in febribus 277, 45. *ἀστροφία*, in purulentis ibid. horror signi fer suppurati 10, 36, 277, 46. horribus crebrum empyema costarum atque pulmonum 277, 43. horror à pure effuso in thoracem, febrem accendit 284, 33. empyematis symptomaticus est 7, 30. 186, 23. ab hæmorrhagia, terrificus 204, 47, 62. Horrores crebri ex lumbis, ideo symptomatici, quod partis ipsius, vitio enascantur, ubi & vnde ciuntur 7, 29. cum cita caloris vicissitudine, calamitosi 7, 13, 28, 4. symptomatica inflammata medullæ spinalis, & membranarum eius 7, 31. horrores & sudatiuncula vicissitudo crebra, pessima 255, 41. 297, 3. 325, 20.

Horriduli, quinquam 11, 36. horriduli, anxij, membris

perfracti, lūbos dolentes, profusore tādē sunt aluo 11, 22
in Humido primigenio sita parium solidarum viuacitas 264, 24. humidi primigenij iactura maior sit 7. diebus à febre acuta; quàm 70. annis à calore natino 329, 61. à cæco igne depopulatio vbi conspicua 329, 54, &c.

Humores simul enascuntur de chylo virtute sanguifica iccoris, 10. 64. in humoribus animalium, mutua quædam inest mouendi & quiescendi vicissitudine 404, 60. humor unusquisque naturaliter suo sero diluitur 257, 19. humoris cuiusque quanto maior è natura egressio; tanto magis est colore terrificus 552, 61. humorum quò & quā inclinatio est, ducendum; nisi quorum pepasmi temporibus comparantur 502, 18. 508, 37. 512, 61. humores ad exitum quacunque ducantur, inde non abeunt hospite infalutato 489, 14. humorem quicquid ciet, neque dissipat, nec exhaurit; oppressionem infert maiorem 373, 48. humor biliosus spumans; effusus 577, 44. calidus, *δυσήχμος*, non *δυσήχμος* 386, 24. calidus qui sursum ad caput fertur, vel hæmorrhagiam ciet, vel paraphorica edit symptomata, & cephalalgica 2, 49. humores calidi ac tenues, qui sursum ad caput feruntur, vel hæmorrhagiam cient è cerebro; vel in eo phrenitidem 448, 59. 498, 45. qui ad caput feruntur, crassi ac frigidi comata & parotidas edunt 448, 60. Humor sine calore aliquo, in aërem statulentum mutari non potest 330, 40. in humore calido, nulla bullarum generatio à calore, nisi cum statu 551, 1. humores tenues, ad excretionem nati 79, 39. crassi, empyemate tenuantur 350, 53. humorem crassum, glutinosum, ac frigidem coquunt, somnus, fomenta, & hapsi 467, 11. vacuant muliebria, diarrhœa, peritrocha vrinarum crassarum ibid. humores hybemi crassiores, procreandis abscessibus accommodati 79, 38. humoris crudi ad caput translatio, euentum habet comatis atque parotidum 102, 45. collectio ad palatum, ferè purulenta 139, 49. humor diffusivus qualis, talis & color 387, 4. humorum qui sunt in mammis, facili transitus intra thoracem 483, 62. humoris morbifici generationis & affluxus perennitas; superfluitate foco priore 236, 57. humoris morbifici semper recurrit eò sit, vnde primum excursum habuit 11, 49. humoris nigri dominatu homines tenentur vespere 464, 59. nigri, iracundiarum, non melancholici, quænam materia & causa efficiens 188, 40, 41. humor æruginosus & atrabilarius, sulphuris in modum intra venas accensus, retro cuncta vapore & complet & disperdit 567, 36. humorum omnium superuacueorum, expetenda concoctio 169, 54.

Hydrops, symptoma est coctionis secundæ deperditæ 351, 30. absolute dicitur tam de tympania, quàm de ascite 327, 30, 31. cum adiuncto, quinam 327, 33. hydrops & hyderus, idem 327, 18. hyderos, propriè ascites hydrops 339, 34. Hydrops vnde dictus 300, 19. vnde sit 41, 49. hydropis essentia quænam 327, 41. fons triplex 187, 38. hydropum omnium veluti matrix, frustratio operationis sanguificæ 333, 28, 61. hydropis idea vbi cernitur 327, 18. verè formam & ideam exhibet abdomen viriforme, intentum vel repletum 335, 3. in Hydrope, abdomen vnde distenditur 327, 20. Hydrops non solum accidit alienationis facultatis sanguificæ; verum etiam impedimento functionis hepaticæ 322, 11. hydropes ibi in metu, vbi causarum hydropificarum est concursus 338, 22. 339, 23. hydropificarum causarum perennitatis duo capita; impedimento multiplex functionis hepaticæ; & alienatio virtutis sanguificæ 330, 16. genera duo & quænam 327, 44, 45. & quor modi 328, 50. Hydropis causæ mortiferæ & significationes, quænam 339, 28, 29. hydrops nascitur in ipse affecto, & in totius corporis malo habitu 329, 20. vel è morbis acutis venit; vel à lumbis & illibus; vel ab hepate 326, 62. Hydropes qui è morbis acutis, permolesti & mortiferi 326, 62. 327, 3. hydrops grauissimus, qui morbo alteri, tam acuto, quàm vetusto superuenit 332, 17. hydropem facit anadrome lumborum 329, 21. hydropis hepatici signum syllogisticum, aluum non deicere 334, 49. in hydrope hepatico, aluus cur nihil deiecit 334, 50, &c. hydropum ab hepate vel ab illibus, nullæ vrinæ, cruditatis expertes 341, 43. hydrops ab hepate aqua repleto, mortiferus 328, 31. à sanguinis suppressione venit, vab eiusdem profusione 331, 18. à febre tritrophia aliquando oritur 331, 55. hydrops à febre generatio, descripta ab Hippocrate 328, 19, &c. sanabilis descriptio egregia 328, 7, &c. hydrops & dyenteriz hepaticæ, fons idem & causa eadem 330, vlt. hydrops quomodo sit à diarrhœa

328, 61. ad hydropem, causarum est concursus in biliosis 338, 23. hydropes è morbis acutis veniunt, tum *κατὰ τὴν φύσιν*, tum *κατὰ τὴν ἐξέλιξιν* 331, 53. hydropum quorumnam signa, multò ante sunt in albo & molli pedum tumore, quàm in abdomine viriformi 334, 38, &c. in hydrope, pedes primi omnium turgidi 335, 13. remedia circa initia adhibenda 340, 62. 342, 39. in hydropem quænam salutaris vacuatio incidit 340, 37. in hydrope quonam spes aliqua secundæ valetudinis 340, 25, &c. hydrops omnis qui per se incipit, grauis 332, 17. hydropis calamitas quæta 327, 6. in hydrope stabulum corruptionis quæ facit cerebrum lascessendo, consecutionem adfert epilepsiæ 337, 42. Hippocrates crebrò dabat operam purgationi, sursum, deorsum 340, 54. hydrops, inter symptomata hypochondriaca periculosa, principatum obtinet mortiferæ corumaciæ atque molestiæ 327, 2. hydropi omnis terrificæ *ἐπιπληξιος* 335, 42. hydropis epigenomenon graue, epilepsia 337, 55. hydrops qui medicinæ concedit, ac reuenit; desperatus 269, 1. 342, 30. à *μαρμαρυγῇ* *πλεονεξίας*, funestus 101, 63. in hydrope, vrinæ panca ac turbida, mortiferæ 340, 2. hydropis tres idææ, pro eorum diuersa materia, *τυμπανία*, *δυσήχμος*, *ὕποπληξις* 328, 49. 331, 43. ad hydropis tres species quænam remedia accommodata 342, 39. hydropum tympanitarum & ascitarum commune, abdomen viriforme 330, 41. 339, 37. hydrops siccus Hippocrati, idem qui *τυμπανία* *ὕδρες* 327, 23. hydrops tympanites, cur ab Hippocrate siccus dictus 327, 39. propriè dicitur à sonitu quem edit pulsatus intrâ spiritus 327, 38. 335, 47. 342, 6. est etiam viriformis 327, 38. hydrops siccus, vnde 187, 51. 217, 65. hydropis tympaniæ causa eadem, quæ torminum statulentorum 329, 9. hydrops tympaniæ, cur statulenti spiritus statulantur 330, 29. ad hydropem siccum, vena non secanda 389, 16. hydropes sicco iam denunciato, si tormina sint circa rene, ingens malum 341, 53. in hydrope sicco, praua vrina quæ hypostasin habet exiguum 335, 23. stranguria praua 335, 23. 342, 8. hydrops ascites, propriè dicitur *ἀπὸ τῆς ἀσπίδος* 327, 34. 339, 42. nullus oritur sine consensu & conspiratione lienis 330, 63. 339, 54. affurgit ex aquarum collectione, illis exitu denegato 327, 50. 339, 9. hydropis ab inextinguita aquæ potione, pulcherrima descriptio Hippocratica 327, 53, &c. ascitæ humor, & pituitosus sanguis anasarca, ex eodem fonte conflunt 331, 21. hydrops sanabilis, caueat oportet illis vitis vnde aqua subinde enascitur 343, 6. hydrops prænuiciæ, diarrhœa diuturnæ, per quas vter nō detumescit 58, 45. ascites omnis vitatur & abigit diarrhœa cruditatis experte 330, 64. 339, 8. 340, 13. 341, 5. 343, 2. hydropis diarrhœa sit *ἡγυγία*, non longa, sed liberalis & libera 340, 31. critica diarrhœa omnis; esse debet cruditatis expertis 337, vlt. dominatu si quis tenetur, per venas aqua profuente in aluum, sanatur 332, 54. 337, 63. 340, 30. in hydrope, diarrhœa aquosa, quo modo & qua via incidit 341, 13, &c. chylosa, symptomatica est 341, 4. hydrops consecratorius longæ dyenteriz, per sympathiam tum hepatis, tum lienis, atque adeo generis omnis venosi 330, 49. hydropis, secando, curatio citò ineunda 279, 50. in hydrope, visceribus adductis in corruptionem, frustra inscipientur aquarum vacuatio 340, 47, 51. translatio sursum aquarum, tussifera & mortifera 341, 9. 342, 37. hydropis *ὕποπληξις* forma, cachexia corporis vniuersi 331, 10. nomina 331, 8. hydrops *ὕποπληξις*, vetustate *ἀποφύσιν*, *κατὰ τὴν ἐξέλιξιν* 331, 52. leucophlegmazi superuenit 343, 14. in hydrope *ὕποπληξις*, nutritionis deprauatæ quænam causa 343, 21. hydropis *ὕποπληξις* aqua, toto diffusa corpore, in aluum prorrupta, ipsum exoluit 455, 4. hydrope *ὕποπληξις* si cui implicito superueniat, fortis diarrhœa, morbum exoluit 331, 34. 332, 53. 337, 63. 340, 29. ad hydropem *ὕποπληξις* inchoatum, sanguis detrahendus: ad cæteras hydropis species, minime 331, 30. hydropes sunt particulares; vt capitis, pulmonis, vteri, testium 327, 25, 26. Hydropici quinquam sanabiles 328, 1. quinquam statim secandi 328, 3. 340, 49. hydropicorum pedes, omnium primi tumescunt, cur 31, 4. hydropicus pedum tumor, in quibusdam *κατὰ φύσιν*; in aliis *ἀνὰ φύσιν* 334, 47. hydropicorum aquæ, vi naturæ, refuunt ad intestina 305, 2. 341, 22. hydropici qui sunt secundum venas, prorrupta in aluum

alium aqua sanantur 342, vlt. hydropicorum aquas confertim exire; mortiferum 558, 7. hydropici, alui profluvio sine cruditate, & urinarum peritrocha, *αὑρῶδες* sanantur 242, 1. hydropici diarrhoea sit aquosa 341, 38. in hydropicos quæ cadit epilepsia; & causæ ipsius propagantur hydropem, & propagari hydropis symptoma est *εἰς ὅσον* 337, 40. ex hydropicis quæ veniunt epilepsia; mortiferæ 336, 64-342, 22. Hydropicorum electio in tussiendo, ubi cernitur 334, 22. Hydropicum si tussis malè habet, desperatus 334, 9, 10. in hydropicis urina turbida, pessima, signo & causâ 339, 61, 62. hydropico si cui, cum febre, urina pauca sit atque turbida; perniciosum 339, 20. Hydropicum tam nocenter lenteria afficit, quàm pleuriticum diarrhoea 338, 6. hydropica hepaticorum coniectaria 331, 38. hydropiformia dura, orthopnoeam faciunt 299, 60. Hyems, pituitæ procreatrix 382, 17. morborum continentium feracior 85, 62. hyeme somni longissimi 404, 48. hyeme ventres natura calidissimi ibid. hyeme purgare decet ventrem inferum 383, 21. Hypercatharsis sæpe mortifera, conuellendo & exolendo 501, 40. Hypochondrium, quid 163, 4. 180, 55. 289, 4. 318, 3. absolute vsurparum, de dextro intelligitur 163, 14. 172, 33. 174, 3. 175, 63. 140, 54. 458, 4. 565, 17. hypochondria, in suprema sunt abdominis regione 169, 16. hypochondriorum œconomia, secundum respirationem, necessaria ad vitam tuendam 163, 1. ab hypochondrio, ad caput, per pulmones est iter 576, 6. hypochondrium, multiplici significatio distinctum 163, 5. hypochondriorum nomiae, intelligis viscera 18, 62. hypochondria, nullis firmata ossibus 443, vlt. hypochondriis diaphragma annectitur ibid. hypochondrium, ubi naturaliter constitutum 18, 54. hypochondrij propria, mollitudo 164, 41. hypochondria quando *ἀναπαύε* 444, 1. hypochondrium *ἀπὸ τοῦ*, quodnam 162, 61. 163, 16. hypochondria, bene constituta esse debent in substantia, in quantitate, in qualitate 309, 39. &c. hypochondriorum æqualitas, triplex 26, 32. hypochondrium inæqualitas triplex, semper verenda 66, 6. 319, 8. dolor, vnde 325, 60, 61. dolores, excluso sanguine, discedunt, non excluso, interimunt 565, 35, 36. hypochondrij quibus dolor est, sine phlegmone; iis superueniens febris, dolorem exoluit 325, 39. dolor inflammatorius, primis periodis hæmorrhagiam habet salutarem 102, 58. hypochondrij dextri dolor, fortæ ac foetui vim magnam infert 457, 55. intemperies, vnde 163, 33. hypochondrium quibus cum tubore faciei in febribus, non est molle; effluente naribus sanguine, conualefcunt 565, 39. hypochondria externa, hæmorrhagiæ criticæ non capacia 166, 32. hypochondrium vnde exsuffans 163, 40. in hypochondriis quæ superfluit incendia, extincto febris ardore; malum 40, 50. 216, 62. 376, 63. 389, 25. 471, 54. 554, 16. hypochondriis, dispositionem inflammatoriam nunquam infert statum interceptio 163, 46. 291, 49. in hypochondrio pulsus cum perturbatione, demeritæ est 172, 12. hypochondriorum reuulso sursum intro, vnde 32, 24. hypochondria sursum intro reuulsa sunt, quibus acuta vox est, quæ fuerat antè grauis 318, 62. 444, 2. intro sursum retracta, cum voce acuta, diaphragmatis inflammati propria 176, 30. 267, 32. hypochondrium in meteorismis, quid 26, 14. meteorismi distinctiones quædam 318, 38. meteorismus sponte natus, malus 26, 34. meteorismus firmiter fixum qui gerit, non est in tuto 319, 10. meteorismus, cum cæteros malè habet, tunc verò eos pessimè, quos phthisis exciret 318, 19, 26. meteorismi tres causæ; inflatio, inflammatio, scirrhus 26, 35. 318, 41. 328, 64. meteorismus ab inflatione, duplex; cum borborygmo, & cum torminibus 175, 45. 318, 42. meteorismus ab inflatione, alio suppressa; malus 175, 44. meteorismus ab inflatione, cum lenis torminibus assurgens; transit ad hydropem sicum 389, 14. hypochondrium humidum ad recitari inflatione, cum borborygmo, vaica spes redintegrandi in purgatione consistit 289, 3. hypochondrij meteorismus ab inflammatione, febrem semper habet coniunctam 179, 43. ab inflammatione duplex, una fugaci & simplici, altera firmiter fixa & systraphica 318, 48. alio suppressa; terrificus 175, 43. meteorismus à scirrhus, ubi est ipsius inueteratio, & doloris, borborygmi, ac torminum vacuitas 318, 60. distentionis quæ causa 163, 32. distensio & mollitudo; *ἀσθενεία* 164, 41. tensionis intro & sursum quænam causa 19, 63. tensio, ubi hæmorrhagiæ signum 93, 33. 181, 48. tensio cum fastidio,

comate, & cephalalgia; fundit parotidas 69, 59. 103, 14. 324, 59. tensionis foras conuersæ, ratio duplex 20, 8. tensio, ubi diurnorum causa malorum 181, 47. tensio, ubi cruralem abscessum fore ostendit 181, 50. tensio, horrenda; quæ 19, 59. hypochondria, vnde tumore affurgunt 175, 38. hypochondrij tumor, ad hepar pertinet 540, 24. præsertim dextri, tumores duri ac dolorifici, per initia; mortem in propinquo esse denunciant 289, 60. inflationis quænam symptomata 458, 10, &c. inflationis ab obstructione, quænam incommoda 458, 8, 9. *καὶ αὖτε*, detractione sanguinis prius cutatur quàm purgatione 163, 42. partium ambarum inflammationum cômune symptoma, febris 458, 17. phlegmone fugax primigenia, nuncia *τῆς ἀναπότῆς* 267, 23. Hypochondrium, inflammatione tumidum, non nisi phlebotomiz concedit, si desit hæmorrhagia *καὶ τῆς* 388, vlt. inflammatione tumidum, insanabile redditur si quis antè operam purgationis dederit, quàm venam secuerit 389, 11. inflammatione tandem liuescit 520, 4. hypochondriorum mala quibus suppurat, malè res eunt 136, 26. 255, 18. hypochondrij in abscessu, adhuc periculo locus 165, 9. empyemata lethalia, quæ pus effundit intro 552, 13. Hypogastrium, abdominis totius pars ima 465, 1. continet vesicam 540, 23. in hypogastrio, grauitatis sensio percepta, ad vesicam pertinet 540, 23. ab hypogastrio tumidum, sæpe urina redditur *πορρῆς*, quæ ille tumor exoluitur 540, 29, 30. Hypostæsis nomen, in omni doctrina Hippocratis, pertinet ad urinam, non ad deiectiones 519, 50. 551, 41. Hysterica passio, sola vteri propria 484, 63. à seminis circa locos, corruptione 485, 29. in virginis potissimum atq; viduas ætate iam grandes, cadit 484, 64. in hysterica passione, stragulationis opinio 485, 22. epilepsia, vnde 485, 27. hysterici pathema nominare licet apocæ, vel epilepsia hysterica 485, 24. hysterica apocæ vnde 485, 21. hysterica suffocatio, impeditis accidit instrumentis spirandi, à diaphragmatis oppressione 454, 43, 44. hysterici genij triplex omnis defraudatio hystericarum purgationum beneficetia 455, 23, &c. hysterice durities in aluo, admodum dolorifica; crudeliter atq; citò perniciosæ 463, 2. Hystericæ hæmorrhagiæ ac periodicæ quænam causa 454, 52, &c. de hysterice mulieribus, vide infra, ad nomen *Mulieris*, sub litera M. I ACENDI ratio, in passione posita virtutis quæ portat, & mouet 399, 32. 556, 54. iacere in ventrem, consuetum pueris & melancholicis, de nocte pauitantibus 401, 61. quibus est insuetum, delirium indicat, & circa ventrem labores 401, 58. supinum, quid 399, 60. supinum, curibus extensis indecorum 399, 51. iacentem, residendi cupidum esse, dum viget morbus; pestiferum quidem in omnibus morbis acutis; pessimū verò in peripneumoniciis 403, 9, &c. Lactatio duplex; cum nausea, sine nausea 24, 8, 9. cum frigore, expers sudoris, diebus criticis; mala 23, 53. 40, 54. Ixos, sanguinis portio humida frigida, Aristotelis 563, 8. Ichores quid significant apud Hippocratem 196, 21. Ichoris nomen, pro virulento sero atque maligno 63, 39. 499, 6. Ichores, aliquando acrium rheumatum nomine comprehenduntur 432, 7. ichor crassior, bullas facit ubi subsistit 498, vlt. 499, 25. diluitor, cutim maculis fœdat 499, 2. tenuis, feritate acrior crassiore, cutim exulcerat ibid. Ichores intrinsecus, vnde veniunt 279, 3. extrinsecus, vnde enascuntur 278, 64. 432, 1. mali sunt, qualitate acres, & temperamento calidi 279, 13. Ichore malo replentur, in aduersa valetudine, musculorum interstitia 279, 13. ab ichoribus raptis à venis, febris ardens 432, 6. ex ichorum venenatorum collectione, pustulæ, toto erumpunt corpore 197, 46. 278, 61. 385, 17. ad ichoris collectionem referendum cutis vitia quorum cita est impressio 499, 3, 4. ichorū collectione, eroditur corporis superficies 197, 45. ichores venenati, vnde colliguntur 278, 63. ichoris in oculum perenni subtillo, quænam incommoda 430, 39. ab ichoribus in pertusa caluaria quænam symptomata veniunt 415, 38, &c. ichore à cerebro inflammato exudante, bullæ minutulæ assurgunt in lingua & ore 501, 6. Icterus, quid 67, 52. vnde dictus 385, 62. proprium symptoma hepatis vel obstructi, vel inflammatione obfessi 178, 52. primum in oculis cernitur 254, 54. à icteris, oppressione natus, accedente hæmorrhagia, deletur 366, 31. quinquam morbum exoluit 385, 63, &c. criticus alius, alius symptomaticus 385, 63, 65. 386, 4. criticus quinquam 22, 50. E c c

Icteri critici causa est, bilis effusio, sine exclusio intus foras 113, 19. icterus criticus, vnde, & quomodo sanabilis 505, 20, &c. qui attulit finem febris; bonus 386, 5. icteri critici materia, pepsimo miscere solet 113, 18. vrina non est biliosa, sed colorata bellè 118, 23. icterus quinam symptomatikus 385, vlt. icteri symptomatiki causæ multæ 386, 1, &c. icterus symptomatikus sit, bile per cutim diffusa, firmiter fixa, quò affluit continenter 113, 19, 386, 12. ante & post septimum diem, calamitosus 68, 11. icterum symptomatikum bilis meatuum obstructorum, vrina toto liquore virescens atque etiam nigra exoluit 523, 64, 65. icterus ante septimum diem, insidiosus 10, 2, 22, 34. 45, 48, 67, 31. die sexto obortus, curatus purgatione per vesicam aut alui perturbationem 513, 3. die sexto obortus; mortiferus 10, 5, 513, 2. acutus & lethalis, quinam 22, 41. in icterum quæ cadit fatuitas, praua 113, 11, 386, 19. icterici sunt, quibus lumborum & lateris dolor, repente, sine causa manifesta, incidit 565, 50, 51. icterici etiam eò progressi, vt corpore toto viridi esse occupant; libertatem nihilominus sæpe retinent spirandi 576, 24. sunt *χλωδεις* *εξω*, *φλεγματοδεις* *εσω* 386, 54. icterici principatus neruorum madescit 386, 52. durum iecur fieri, malum 22, 37. 62, 12. 386, 3. icterici quinam moriuntur 22, 28, &c. multum fecdari, vnde pereunt 22, 22. 38, 12. 68, 8. 113, 17. 386, 59. icterici moribundi qualis color 387, 7. ictericorum *μυρωσις* & *ωσρωσις*, vnde 386, 55. propria deiectio pulracea 558, 33. icterici quod liquidius redditur rubet; malum 561, 25, &c.

Ictus obliqui, fere inualidi 412, 40
διδρωσ, *απριτης* *επιδρωσως* 501, 39
το *ηκμα*, minimum, non minime 429, 18, &c.
το *ηδν*, quid significet 313, 49

De Iecore, vide sub litera H, ad nomen *Hepatis*.

Ignæ & aqua omnia coagmentantur atque consistunt 420, 38. ignis cæcus, vbi fundamentum habet 329, 46

Ignoratio, quid 6, 13. à rigore, ab intemperie frigida cerebri 6, 16. à rigore, mala 6, 10

Ileus, quid 355, 11, &c. vnde sit 364, 63. 365, 13, 10, &c. vnde nomen habet 329, 8. ilei nomen, ad intestinorum

ελλην contra naturam pertinet 354, 55. Ileus & lienteria,

vt differunt 354, 52. fœtus torminibus 354, 50. præceptis

ad interitum morbus, & periculosus admodum 355, 4, 365, 9.

ilei proprium & inseparabile, nihil deorsum ferri, cū alui torminibus, & cardiogmo 58, 51. 115, 56. 116, 9. 177, 57. 355, 29.

viciū inexpugnabile, *η* *αυα* *ελλους* 355, 2. in ileo, reuol-

utionis quænam causa 355, 13. Ilei grauelentia, in quibus

percipitur 355, 56, 57. grauelentis parotides consecrariæ,

vnde 355, 56. symptoma productum cū in propinquo

mors est, vomitus 58, 52. in ileo vomitione cibi & chyli

tolлитur nutriticus 355, 49. cibus & fæces primum in aluo

subdistant, mox remeant sursum, vt etiam per os reddatur

354, 58. ileus cū inueterauerit, stercus per os redditur

355, 6, 364, 63. in ileo maius periculum cibi vomitu, quàm

stercoris 355, 47. ilei consecraria symptomata, quænam

355, 55. ilei & stranguriæ frequens adiunctus transitus 540,

48. ileus stranguriæ superueniens, 7. die perimit, nisi ob-

orta febre, vrina fluxerit cumulatè 364, 9. 540, 52. in ileu

transitus esse potest aphthosæ lientericiæ 355, 34. ileosi ho-

mines vnde sunt, inde non raro sunt stranguriosi 356, 15.

ileosis vomere & obsurdescere; malè 354, 42. cū inter-

ceptio est vrinæ, cita mors venit 540, 43

δ *ι* *λ* *υ* *γ* *ο* *ς*, nihil aliud quàm *η* *σ* *κ* *ο* *ρ* *ο* *δ* *ι* *ν* *ι* *α* 89, 65,

η *ι* *λ* *α* *ω* *σ* *ι* *ς*, oculorum diastrophæ 91, 29. 119, 19. 144, 36,

453, 33. *η* *ι* *λ* *α* *ω* *σ* *ι* *ς*, eadem quæ *η* *κ* *α* *τ* *α* *κ* *λ* *α* *ω* *σ* *ι* *ς* 194, 56

ι *λ* *υ* *ς* & *ι* *λ* *α* *υ* *δ* *ο* *ς* vt differunt 459, 5

ad incrementum, mutæ existunt operæ caloris, corpo-

ris, alimentii 421, 9

Indicatio quæ à viribus, cæteris omnibus antepōneda,

quorum 33, 26

Indolentia falsò credita, vnde 470, 52, 33

Inediæ patientissimi senes; mox homines constantis

ætatis, minimum adolescentēs 429, 19. 436, 60

Infantes tantum caloris habent, quantum postea nun-

quam 421, 23. infantum calor blandior, & sui nascenti si-

milis magis 570, 35. alimentum simplex, nec valde elabora-

tum 570, 36. infantia triplex 227, 3. 433, 24. 436, 14. septē

annis finitur 227, 12. 439, 17. infantie sui sunt morbi 436,

35. *π* *α* *δ* *ι* *σ* *υ* *δ* *ι* *α* multa, quibus ipius morbi succrescit & pul-

lulant 433, 44. infantia sæpe calculosa à trimatu 359, 14.

infantie natura, vnde consilioni obnoxia 227, 3

Infirmiratis accessio, vnde 438, 57. infirmiratis corpo-

ris causa quænam terrificata 94, 60

Inflammatio duplex; vna per systrophem nata; altera

sicca, quæ *φ* *λ* *ο* *γ* *ω* *σ* *ι* *ς* 175, 64. à sanguinis rheumatici consi-

stentate 234, 34. vera quid, iuxta recentiorum placitum 152,

vlt. 164, 45. inflammationis quidnam proprium 274, 28.

magnæ symptomata, quænam 114, 33. 153, 46. 356, 40. 357,

17. 244, 26. à *τ* *ρ* *ω* *μ* *α* *τ* *ι*, expertes caluarie partes omnes,

præter frontem 430, 31. Inflammatio fixa, nullam exhibet

commoditatem sanguini remeando aut permeando 357, 57.

inflammationis fixæ quænam remedia 39, 19. inflamma-

tio sub auribus, vera parotis 115, 8. in inflammatione omni,

tenuior exudat portio humoris phlegmatici, modò partis

obfessæ densitas non impedit 252, 6. 258, 62. inflamma-

tionis systrophicæ duæ causæ 244, 27. inflammatio omnis

systrophica dura 168, 58. systrophica omnis, mollior ab

empyemate 358, 36. systrophica magna, tactu omni, quan-

tumuis leui, offenditur 465, 13. in inflammatione omni sy-

strophica, partium tumidarum durities & dolor prægradis

356, 34, 35. inflammationum omnium systrophicarum mu-

tatio quadruplex 165, 48. 255, 14. 357, 54. inflammationes

conuenienter naturæ, terminantur diaphoresi & suppurato

255, 15. contra naturam terminantur gangræna & scirrho

255, 16. in inflammatione idem faciendum, quod in edibus

conflagrantibus 166, 14. in omni magna, vnicum naturæ

perflugium, suppuratum 117, 22. ab inflammatione per-

frigerando nimium stupefacta, scirrhus 463, 25. inflamma-

tionum omnes partium nobilium, quando horrore cietur

255, 38. inflammatio nulla partium nobilium, alui profuuiio

exoluitur 39, 27. inflammationum interiorum suppuratio,

ancipitè habet euentum salutis aut mortis 255, 17. systro-

phicarum, & inde nascentium suppuratorum, grauiores morbi

appulsi tenebrarum, quàm lucis 277, 58. inflammatio hypo-

chondriaca interior, per se funesta, vt sanescit tamen 168,

36. inflammationes non raro mouet lethales irrita nau-

seabunda proritatio 422, 29

Immerito, *α* *λ* *ο* *γ* *ω* *ς*, *α* *σ* *ή* *μ* *η* *ς*, *μ* *η* *κ* *α* *τ* *α* *λ* *ο* *γ* *ο* *ι*, *π* *α* *ρ* *α* *λ* *ο* *γ* *ω* *ς*

synonyma 296, 19

Impotentia omnis quam edunt collapsa naturæ præfi-

dia, ingrauescente morbo; signum citæ mortis venturæ

451, 34. impotentia quæ immerito vacuitatis, aut certè si

nulla sit, accidit, pessimè 450, vlt. 451, 1. impotentia ab

exhausto, quænam signa 451, 4, &c.

Ingestionis causa, suctionis sensus 546, 4

Ingrauescere & exacerbari, vt differant 253, 4, &c. in-

grauescere, malū in omni paroxysmo, pari aut impari 253, 7

Initia morborum acutorum, fere crebra metapne-

sis & orgasmis 211, 43

Insaniæ cacoehymia, cæteris omnibus antecellit 54, 42

signa potissimum lucent in oculis 380, 32. insania, sym-

ptoma cerebri fortiter alterati 52, 22. bilis atra in cerebro

symptoma 185, 9. 497, 3. insaniam adducunt; cum cepha-

lalgia, biliosi vomitus, furditas & vigilie 460, 57. facit,

lateris dolor à bile, qui vanescit immerito 460, 58. insanie

summa omnia in ecstasi melancholica 94, 43. feritas tanta

vt superstitè empyemate vix depellatur 54, 27. insania à

phrenitide, delirium perpetuum 476, 37. quomodo phre-

nitidis consecraria 111, 30. cum silentio, symptoma deprau-

atæ animi, potius quàm cerebri sicci 38, 39. racturina, su-

perstitè vocis libertate; mortifera 38, 27. insaniæ crisi

bona per *μ* *α* *τ* *α* *κ* *λ* *α* *ω* *σ* *ι* *ς* timoris melancholici, nō autem phre-

nitidis 378, 4. infantibus hæmorrhoides aut varices

exortæ, sanant insaniā 54, 35. 371, 17. 378, 24. qui insaniunt

melancholicè, si tremor superueniat; malo sunt loco 378,

54. infantes, cæptis immanibus effecti, vinculis coër-

cendi 378, 46

Insectorum materia quæ transpirando ducitur, non

vnusmodi 147, 27

Insomnia, quid 52, 11. quomodo sunt 52, 18

Inspiratio & expiratio, contrariis editæ motibus 148,

44. 149, 2

Intemperiem similem facilius excipit pars omnis in-

temperata, quàm temperata; contrariam 7, 24. 382, 51. in

temperies frigida, febris ardoris consecraria; insanabilis

6, 5. 101, 63. 331, 49. principatus frigida prægrandis, planè

mortifera 410, 55

Intereunt omnes crudeliter, quicunque voce capti in-

tereunt 220, 54. de interitu, vide plura sub litera M. ad

nomen *Mortis*. intestinorum vis peristaltica, quænam 354, 57

Intestina, minimè omnium iecoris opa carere possunt 575, 19

intestinum

intestinum tenue, *ἡσυχία* 418, 9. venis abundat, non sibi, sed hepati 418, 12. veteribus chorda 435, 27. intestina renna, tria 443, 58. quanam 417, vlt. 418, 12. Ecphyfis, transponendo chilo interuit 417, vlt. ieiunum distribuēdo chilo ad hepar, per mēlarcas portæ venas, inferuit 417, vlt. 418, 12. Ileo, segregandæ faci à chilo, transmittēdæ ad colum, & inde ad rectum, dicatur 418, 1. intestinis tenuibus officium vitale tributum, quo vitam diu cārere non potis est 417, 62. 418, 36. intestini tenuioris malaleuia, sunt graviora quā crassioris prægrandia 351, 50. intestini ieiuni phlegmone, digestionis officium adimit venis mēlarcis 331, vlt. intestinorū renuium si quod præcisum fuerit; nō coalescit 417, 50. 418, 28. intestini tenuis continuitate amissa, symphyfis neutra expectenda 418, 27. intestinum tenue discari; mortiferum 418, 7, 40, 41. intestini alrē diuisi quanam symptomata 418, 19. Ionica dialecto, *ὁ πόσις τῆς κοιλίας*, est eius *ἡ σκληρότης*, *ἡ ἀπλυσ* 61, 9. Iosiam Regem, pietate insignem, cur Deus ante diem ad patres suos collegit 439, 10. Iracundiæ inferuit cor 374, 61. Ischiadas credibile est ex frigore & cæcoethia succorum nasci 383, 37. Ischias nata ex frigore & grauitate lumborum, non raro protrahitur exactum ad anuū 383, 38. iuuenum quomodo sit 383, 45, &c. doloris acerbitate nō cedit ischiadi grandium ætate 383, 43. discedit 40. die 44. qua conditione 383, 44. *ἡ ἰχνη*; faucium æqualitas 36, 42. *ἡ ἰχνη*, ad æqualitatem pertinet naturaliter. constitutā partis cuiusq; 387, 54. Ischuria, ad quas partes pertinet 158, 29. Ischuria quæ nā *καταχρηστικὴ* καὶ *κατὰ πλῆθος* dicitur 363, 13, &c. ischuria quæ bona 5, 61. quæ mala 5, 63. ischuria & dysuria, differunt tātūm per magis & minus 363, 11. ischuriæ causa omnis posita vel in vesica, vel in verethra 363, 17. ischuriæ in vesica, causæ, exolutio vel sensus amissio ibid. ischuriæ in verethra, causa, oppilatio; quæ est à phymate aut calculo 363, 20. ischuria vera, vesicæ propria 339, 1. in vesicam plenam, non in vacuam cadit 363, 12. *ἡ ἰχνη*, καὶ *δύναμις*, καὶ *ὁρμή* ymo, vicissim & mutuū in vitio sunt 322, 19. *ἰχνη*, in substantia 33, 36. 95, 2. 124, 7. 290, 33, 321, 54. in Italia, capitis tromata *δυσλεκία*; tibiarum *δυσλεκία* 429, 32, 33. *ἡ ἰσχυρία* rhacheos in longum exportectæ 192, 30. *ἡ ἰσχυρία*, à diaphragmate ad magnam ceruicis vertebrā 592, 32. *ἡ ἰσχυρία*, in lumbis ad diaphragmā 192, 31. *ἡ ἰσχυρία*, in osse sacro ad magnā liborū vertebrā ibid. in Iudicio, regnum animi 375, 35. 383, 57. iudicium & experientia, duo inueniendi iudicandique propria instrumenta 411, 10. Iudicatoriæ causæ omnes pauca, prauæ 100, 35. 116, 48. 201, 44. 132, 45. 206, 20. 210, 57. 212, 56. iudicatoria non iudicantia, aut difficilis iudicij, aut lethalia 24, 15. 50, 21. 110, 12. 166, 49. 467, 17. non iudicantia, qualitate quidem non aliena; sinistri sunt iudicij 286, 42. non iudicantia, quæ qualitate in vitio sunt; mortifera 286, 44. Iugulum & clauicula, eadem 274, 35. Iuguli dolor fixus, symptoma partis conuexæ hepatis inflammatæ 20, 12. Iuuentus, decem aut quindecim annis finitur 439, 18. plerisque finitur 35. anno 436, 22. vltius nō excurrit anno 42. 436, 21. iuuenibus biliosum & calidum temperamentum 107, 26. alius strictior, in senectute laxatur 316, 27. iuuenes morbis acutis correpti, tres habent opportunitates excretionis 166, 52. iuuenū excretionis propriæ in morbis acutis 78, 63. Iuuenibus, sursum esse solet *κατακρίσις* 516, 62. anadrome biliosa ad cerebrum, si nō ciet hæmorrhagiam; mouet delirium vbi subsistit 516, 63. 64. sanguinis spūionis, phthifis 290, 5. iuuenes inflammatoribus mirum in modum exercentur 107, 27. Super *κατ' ἴσιν* contentio magna inter priscos medicos 202, 64. *ἡ κατ' ἴσιν*, semper significat rectitudinem, in lōgum modū, modū etiam in latum 202, 60. 203, 20. *ἡ κατ' ἴσιν*, oppositum τῇ ἀνὰ πλάτη 166, 26. 203, 13. κατ' ἴσιν si consideratur, nihil medicorum votis responderet 203, 8. *ἡ κατ' ἴσιν* admirabile, ex impulsu naturæ, humoris moru, & partium affictarum loco & situ 274, 22.

KΛΟΝ, nomen commune malorum omnium quæ sunt & quæ apparent eorum periculo quos occuparunt 457, 62, &c. κακὸν in ægris ea sunt, quæ à bonis vincuntur 420. κακὸν in ægris ea sunt, in quibus omnia quæ adsunt mala, & ab iis absunt bona 421.

ἡ κακοήθεια καὶ *ἡ κακοήθεια* in morbis quid significant 16, 55. 199, 8, &c. 204, 59. 223, 12. *τῆς κακοήθειας* in morbis, significatio triplex 199, 9, &c.

ἡ καθυγραίνουσα, profusiores aluos significat, quæ crudis excrementis feruntur 83, 43. *ἡ καθυγραίνουσα* καὶ *καθυγραίνουσα* κοιλίῳ, idem quod *ἡ ποτηρότης* καὶ *ποτηρότης* 128, 36. 251, 24. 442, 55. 58. 450, 36.

ἡ καμπυλωτική, palpebrarum diastrophe 453, 34. *ἡ καρδία*, veteribus stomachus 26, 5. 77, 51. 159, 54. 173, 21. 196, 9. 299, 43.

ἡ καρδιαλγία in stomacho, idem quod *ἡ καρδιωγμία* 324, 49.

ἡ καρδιαλγία καὶ *ἡ ἀρεστία*, vt differant 325, 12.

καρδιωγμία, symptoma est stomachi 28, 5, 55. 77, 51.

idem quod *ἡ δῆξις* τῆς στήθους 159, 51.

πῶς τῆς καρδιαλγίας, καὶ τῆς *καρδιωγμῆς* plura dicta sunt ad literam C.

ἡ καρδιαρρία, quid 93, 57.

ἡ κάρως, veteribus vnde 99, 15. *ἡ κάρως*, quid 99, 23.

ἡ κάρως quodnam salutare 99, 30, &c. quodq; pessimum 99, 26, &c. de Caro, vide sub litera C.

ἡ καταρροή omnis, ibi morbi facit, vbi subsistit 382, 39.

ἡ κατακλάσις, quid 223, 50. oculorum & palpebrarū peruersio communis 453, 35. eadem quæ *ἡ διαστροφή*, καὶ *ἡ καμπυλωτική* 144, 31. 453, 22.

ἡ κατακλίσις καὶ *ἡ ἀνὰ κλίσις*, vt differant 399, 28.

ἡ κατακλίσις, quid denunciat 333, 19. 479, 29.

ἡ κατακλίσις καὶ *ἡ ἀνὰ κλίσις*, vt differant 479, 23.

κατακρίσις, quibus denunciat 11, 54.

κατακρίσις, morbi cuiusque historia 44, 58.

κατακρίσις, quid 9, 22.

ἡ κατακρίσις, quid significet 376, 53. 54. semper symptoma à debili vel emortuo calore inparto 471, 40. vna firmiter fixa; altera fugax 471, 41, 43. ἀντὶ τῆς πῶς ὑφίσταται recensetur 376, 56. accessionem habens *κατακρίσις*, quod refertur 216, 57.

ἡ κατακρίσις, quid 521, 41.

ἡ κατὰ, pro eo quod firmiter fixum est 527, 18.

ἡ κατὰ, febris ardēs 386, 48. de Causa, vide ad literā C.

κατακρίσις, quanam 101, 32. 386, 39. οἷοι μακροχρόνιοι 386, 38. *ἡ κατὰ* vis, morbum indicat acutum & *κατακρίσις* 63, 44.

ἡ κατὰ, quid 289, 22. quomodo vsurpatā 33, 45.

κατακρίσις, quid 87, 31. De Cephalalgia, require ad literam C.

ἡ κατὰ, ad vinarum prauam hypostasin pertinet 532, 42.

ἡ κρίσις καὶ *ἡ κρίσις*, secundi aut sinistri iudicij dicuntur 248, 58. *ἡ κρίσις*, absolute simplicitateque positum, quid 68, 3. 124, 39. *ἡ κρίσις* verè, quanam 202, 9. non verè *κρίσις*, ante septimum diem 87, 55.

ἡ κρίσις, quid 214, 52. vnde 214, 49.

ἡ κρίσις, aliquando pro supra & infera aluo 463, 39.

aliquando pro amplitudine ea, quæ subiacer rhoraci 26, 43.

κόπος, quid 11, 41. 21, 17. τῆς κόπου causæ duæ & quæ 21, 19.

ἡ κόπος duplex; ἀπλῶς dictus, & ἀνὰ μέρος 21, 31, 32. *ἡ κόπος* ἀπλῶς, à labore nimio, vel desuetudo vel insuetudo 473, 12. *ἡ κόπος* ἀπλῶς, triplex; *πονώδης*, *φλεγμονώδης*, *ἐλκώδης* 11, 44. 45. 473, 13.

ἡ κόπος, *ἡ κόπος* τῶν ὀνύχων, edit repletio 473, 14. 486, 9. *ἡ κόπος* τῶν ὀνύχων, edit cacoehymia 473, 14. 486, 9. τῆς κόπου ἐλκώδους causa eadem quæ horrois 473, 15. *ἡ κόπος* φλεγμονώδης edit repletio & cacoehymia 473, 14. 486, 9. κατὰ μέρος, qui 11, 40. 21, 16.

οἱ κατὰ μέρος homines & febres, quæ 21, 16.

ἡ κύρσις lumborum, æquè per varices atque per dynteriam, curationem recipit 188, 21.

LΑΒΡΥΜ, quid 140, 41. ex confusanea cute & musculo 140, 42. Labij concussio, vnde 140, 52. biliosam aluum proruptram ostendit 140, 37. inferioris palpitatio, vomituro 57, 5. 577, 24.

Lachrymarum iniussa profusio, quanam non terrifica 194, 45.

Lactis coctio, vera *πέψις* 484, 5.

Læſionis ſpecies, cuiuſmodi ſit ipſa affectio denunciat
48, 38. 62, 59. 273, 30. 380, 6. 423, 20
Λαπίαις, quid 117, 60. 333, 8. Λαπίαις ἢ καὶ ἄλλοις
ῥανίς, ut differant 118, 3

Laryngis carnes, modolandæ voci dicatæ 220, 37. c-
minencia, ſpiratione facit κερχυδὴ 425, 62. muſculi duo-
decim proprii 148, 22. inflammatio, præceps ad interitum
477, 46. tumor non habet ἀφ' αὐτῶν aſpectabilem in qua-
litate corporis 241, 48. prominentioris, vnde ſunt homi-
nes 425, 58

Laffitudo vlceroſa & phlegmonoſa, dementiæ opinio-
nem facit 129, 22. de laſſitudine, vide ad litteram K. ſub
nomine, ὁ κόμος.

in Lateris æqualitate, nulla ſuſpicio inflammatæ mem-
branæ coſtis intertæ 387, 59. tumor in pleuritide, non
tractabilis 356, 44. dolor & pleuritis, aliquando eadem,
aliquando differunt 298, 6. dolor, pro pulmone afflicto
299, 35. punctioris, pleuritidis 565, 51. tenſius, ſympto-
ma iccoris inflammati 565, 52. dolor qui cum ſputo bi-
lioſo euannit; inſaniam facit 296, 1. 316, 56. 460, 58. cum
febre, non ita reſpuit venę ſectionem, quàm ſine febre 387,
49. cum febre diuturna, pus eductum iri ſignificat 298, 2.
ſine febre, videri nequit pleuritis 387, 50. lateris dolor,
nec tamen pleuritis, quomodo ad phrenitidē tranſit 291,
30. in lateris dolore à prolapſu catarrhi, ſanguis non de-
trahendus 388, 14. dolorem nullum, niſi vnicō phleboto-
miæ alexiterio, poſſe ſanariſſimum 387, 33. inſirmitatem
inſer reſperita carniſcum phlebotomia 388, 39 morbus,
& de phlegmone & de empyemate dicitur 286, 47. mor-
boſi ſanguinis ſubſtillū incidat ē narib; graue malū 286, 33

ἢ Λιποθυμία, eadem quæ Λιποψυχία 569, 25
Lemæ, quid 126, 55

in Lepa, partium ſolidarum natura omnino labefacta-
ta 434, 62. Leproſorum conditio, quænam 568, 21

Λεπτόν abſolute, quidnam 196, 54. 443, 63

ὁ Λεπτοψυχία, quid 4. 45. eius cauſæ 4. 46

Lethale ſi quid eſt, non protinus moriendi neceſſita-
tem adfert 571, 13. lethalia quæ ſine ſignis quieſcunt;
mortem ſignificant 238, 61. 316, 55

Lethargus, quid 75, 30. à pituita putri in cerebro 90,
16. 185, 10. 423, 21. inter cataphorica ſymptomata capitis
repleri numeratur 75, 30. ſymptoma cerebri malè affecti
per idiopathiam 75, 38. à phrenitide, funeſtus 105, 64. in
lethargo, facultates principes labefactantur 90, 14. lethar-
gici, non ſunt ſuæ mentis 75, 59. lethargici delirium, vbi
conitit 75, 31. lethargici aluius tumida 75, 60. lethar-
gicorū genæ ſublimis 99, 58. lethargici, cur videntur leu-
cophlegmatici 75, 47. vnde conuemiſcunt 75, 39. qui
ex phrenitici ſunt, planè ſunt immemores 542, 20. ma-
nibus cōtemiſcunt, ſoporari, decoloris, vnaque turgiduli,
cum pulſa ſepulto 474, 4. lethargico immemori ſi aluius
feratur liquidis excrementis, vel vrinæ fundantur ſimiles
iumentorum; ſi ſeruari non poteſt 372, 44. 509, 20. in le-
thargicis deiectiones iniuiſæ & liquidæ, terriſſicæ, ac de-
ſperatæ ſalutis 542, 35. ex lethargicis quicunque ſeruân-
tur, ferè purulenti redduntur 75, 23

Leuatio fida, quænam 507, 2, 3. omnis quæ criſin non
habuit, etiam in ſpe certa ſalutis; ſuſpecta 266, 43. iis quæ
leuant immeritò, nō eſt fidēdum; nec vereri valde oportet
quæ ſine cauſa mala inuadunt 29, 26. leuatio nulla ſalu-
taris nec ſtabilis, quæ non ſit κατὰ λόγον 185, 1. nulla cum
bonis ſignis fugacibus non periculofa 521, 30, 31. perni-
cioſa ſine ſignis, quomodo ſit 338. falſo credita, cum praui
ſignis; mortifera 521, 30

Leuce, quid 434, 51. vnde 434, 53. in leuce, ſolida-
rum partium omnino labefactata natura 434, 62

de Leucophlegmatia, vide ad nomen *Hydroph* ὑποφλε-
γματος, ſub littera H.

Lien, natura rarus & ſpōgiouſus 327, 57, 63. 330, 57. lie-
nis ſitus 327, 57. 330, 57. lien, officij præſtantia & dignitate,
iccoris inferior 164, 58. criſin non adeo citam habet
quàm iecur 164, 60. non tam celeriter ac facilè periculo
locum cedit, q̄ iecur 164, 60. lienis conſuetudo, continē-
ter humorem ſuperfluum attrahendi, & redundantiam de-
ponendi 327, 63. 330, 61. lien, ſanguinis impuritate ru-
meſcit 272, 8. nimium expletus, redundantiam ſuam de-
ponit in omentum & in oculos alui 327, 60. 330, 58. ſit
magnus à bile aut pituita 329, 16, &c. lienis magni, ma-
gna cum hepate ſympathia 329, 11, &c. lien quæ cauſa
& occaſio fuit congerendi humorem melancholicum aut

pituitam 350, 9. lienis durities eſt, vel à veteri cōgſtione
humoris, vel à repentina fluxione 543, 39, 40. à veteri cō-
gſtione humoris, non eſt ſurſum, ſed deorſum percipitur
541, 39, 43. duritas, vnde homines ſunt lienofi; eſt κατὰ
πόρον lienis. nō ἀναπρόσπον 541, 37. durities à repentina flu-
xione, ipſum lienem facit ἀναπρόσπον 541, 40, 41. tumor, aut
rotundus, aut laſus, aut longus & craſſus, aut longus & te-
nuis 349, vlt. 350, 1. à lienis tumore, obortus bubonis abſ-
ceſſus κατ' ἴκον 203, 39. lienofi verè ſunt, quibus iam pridè
viſcus ipſum lienis induruit 349, 32, 35, 51, 62. 541, 32. lien-
ofi, vnde 272, 8. 349, 36, &c. 541, 42. lienofiſis dyſenteria non
longa; vilis, longa, peſtifera 185, 19. 345, 8. 349, 3. 541, 50.
cur vilis dyſenteria non longa 350, 17. lienofiſis quānam
ſuperueniente dyſenteria, ſaneſcunt 40, 2. lienofiſis dyſen-
teria quieſcente, ſi vel hydropes veniunt, vel lenteria; mor-
tiſerum 345, 8. 541, 51. vrinæ tenues, cum per ſe, cum ex
euentu 541, 51, 52. lienofiſis & melancholicis, non eadem
curatio inſtituenda 349, 32. lienofiſis oxymel ſaluberri-
mum 349, 34

Lienteria, quid 340, vlt. ventriculi morbo adfertur;
non inteſtinorum 351, 35. in lenteria, læuitas inteſtinorū
nō ſemper eſt 351, 34. inteſtinorū aſperitas quādoq; 351, 34.
lienteriz natura, in fructura & abolita cōctione prima 217,
54. 328, 55. 351, 25, 29, 30. ſignum vnum pathognomonicū,
præceps crudorū vel imperfeſtorū ciborum egeſtio 351, 16.
lienteria, ſymptoma aluium toto genere ſympromaticū,
& nulla ratione critium 351, 18. lienteriz morbus & ſym-
ptoma, non minùs in vitio eſt, quàm ſi manūs ægro adfer-
ret 351, 27. lienteria, nunquā bono ventris apparet 251,
24. ſemper meretur malè de iis quos inuaſit 351, 20. ex
imbecillitate orta nature, ipſam reddit denuo inſirmiore
350, 39. 351, 20. 532, 48. in lienteria inteſtina maiore in vitio
ſunt, quàm in hydropē ſtultento 330, 46. lienteriz cuiuſ-
dam intemperies, maior quàm tympanitæ 330, 47. lien-
teria cōſecratia lōgæ dyſenteriz, à ſolo inteſtinorū vitio
330, 48. tam nocenter hydropicum afficiſſimū quàm plenitri-
cum diarrhœa 338, 6. lienteria, dyſenteria, diarrhœa, ut di-
fferunt 332, 45, &c. 340, vlt. lienteria & ileus, ut differunt
354, 52. lienteriz & phthiſeas differentia vna, ab eodem
fonte 353, penult. 354, 32. in lenteria, torminum & dolorū
diſtinctio 353, 39, 43. lienteriz cauſa duplex; vna, cōctio-
nis fruſtratio; altera præceps egeſtio 351, 37. à cōctionis
fruſtratione, quænam cauſa 351, 41. & quæ κατὰ πόρον 351,
43. & quæ ſigna comitantia 351, 46. à cōctionis fruſtra-
tione ſymptoma primum, alui grauata oppreſſio 351, 42.
quieſcentis & vale dicentis proprium ἐπιφαινόμενον, ἢ δὲ γε-
γυμία 351, 48. lienteria à cōctionis fruſtratione, omni mo-
leſtia caret in excernendo 352, 34. 353, 12. ad lienteriz à cō-
ctionis fruſtratione, curatione, neoteriſmo tantum opus,
nec vacationi opera danda 351, 51. lienteriz à præcipiti
egeſtione, cauſa duplex: vna, catarrhi prolapſus crudæ; alte-
ra, ventriculi tunica aphthoſa 351, 57. 352, 5. à præcipiti ege-
ſtione, κατὰ πόρον 351, 57. ἢ δὲ γεγυμία 351, 49. lienteria à ſerino
catarrho, abortionis cauſa 352, 23. in lenteria à præcipiti
egeſtione, à catarrho, ut purgandū 351, 62. lienteriam fa-
ciunt fluxiones aphthiſæ per impotētiam continendi ea
quæ adſumuntur 472, 14. lienteria à præcipiti egeſtione,
à ventriculi tunica aphthoſa, ſimiliter ſit ut ſtranguria in
veſica 352, 6. in lenteria à ventriculi tunica aphthoſa, cibi
apulſu, exulceratio proritur 352, 37. articuli puſtulati
velut ambuſti, corporeæ habitudinis phthiſin offēdunt 352,
45. lienteriz aphthoſæ, tranſitus eſſe poteſt in ileū 355, 34.
472, 15. lienteria calamitoſa, ſuperueniens ori aphthoſo
141, 6. interdū ægros trahit, interdū eos præcipitat 351, 23.
Lienteria vnde lōga 353, 19, &c. lienteriam longā macies
ſequitur 354, 35. in lenteria lōga, ſi acida eructatio ſit, quæ
prius nō fuerat, bene ſit ægro 353, 11. lienteria ſaneſta, vnde
145, 8. in lenteria aſcarides exiſtere poſſunt, non lum-
brici, nec tæniæ 218, 9. lientericū eſſe, planè idē, quod ge-
nio defraudari, & fame abſumi 351, 28. lienterica, cum ſpi-
ratione difficili, & lateris vellicatione coniuncta, tranſeunt
in phthiſin 353, 60

Ligamentum, quid 418, 63. ab offibus 192, 43

Lingua, organum ſermonis & guſtatus 333, 32. 273, 44.
nouem monetur muſculis 238, 49. 133, 36. 229, 49. muſcu-
lorum miniſterio, verborum dædala 229, 37. linguæ par-
tes duæ, linea mediana coniunctæ 133, 32. 273, 44. linguæ,
tunica habet cōmunem & continuatam cum alui 577, 23.
linguæ membrana cōmunis, vnde 133, 34. linea mediana,
vnde 248, 4. membrana propria, à nervo 3. & 4. coniun-
gationis

gationis 133,35. lingua spongiosa, triplici contexta fibrarum genere 133,33. linguae naturaliter constitutae genitus color, qualis 133,52. depravati motus, vnde 172,60. impotentia, quando existit 368,49. paralyfis, homines facit *εναυδους* 111,64. ponderi pōdus addicitur à defluxu pituitae 577,14. lingua, index affectus humorum 510,56. serum denūciat 134,42. yrinam indicat 134,75 plurimum valet ad comparandam *διήγνωση* & *πύθνησι* pleuritidis & peripneumoniz 273,47. concolor partibus vicinis & focis 134,2. 248,42. 273,53,55. linguae coloratio, humores denūciat, quorum magisterio corpus tenetur 134,5. linguae colorationis opportunitas, vnde 134,27. lingua, coloribus variis, vnde fucatur 134,25. ad medianā lineā delibata velut alba salina: febris dimissionē denūciat 135,54. linguae mutatio esse solet, cum malē est vtero, & malē ab vtero 474,9. lingua molinifcula, vnde 137,49. arida, signum pathognomonicum fuliginosi ardoris 474,19. signum *ουσιφθόρου* vteri inflammationi 474,20. lingua fucari, non tam graue, quam exasperari 174,1. lingua, à quibus partib. fucatur 133, vlt. 134,1. linguae pars non fucatur, nec exasperatur ē diuerso pulmonis inflāmari 174,21. lingua fuliginosa, laetitatis & æqualitatis semper comes 160,19. 274,3. *φινυδής*, multū differt ab ea quae *περρυμένη* 133,54. linguae suffusae signum, coloratio 273,63. lingua & voces, pariter vnā exasperantur 273,63. linguae resiccatae & ab exhausto laborantis signū, asperitas 273,64. asperitas multūque: sicca, phrenitica 137,41. asperitas, sitis, tussis, à somno solēt exacerbari & irritari 328,12. lingua *περρυμένη*, vnde 134,18. primū percipitur rigidifcula; inde exasperata postmodū, hinc 273,64. tremor eodem pene momento subleuata & depressa 577,4. tremula fit, infirmitate potentiae animalis 137,19. signum vel paralyseos affuturū, vel mentis non solidae 369,59. signum non solidae mentis 137,11, 28, 43. 172,59. 182,50. 369,63. 512,14. nonnullis signum alui proruptur 577,3. *χλωρή*, Galeno *ωχρά* 134,46. *χλωρή*, herbacea 134,57. virescit, quia biliofa 134,52. 474,11. 490,23. 515,56. bile fucata cōtinuū; discēssione morbi fore denūciat septimo die aut nono 252,46. linguae virides, à bile: rubrae, à sanguine: nigrae à nigra bilis: aridae à fuliginoso ardore, & matrice 474,11, 12. lingua *δυσία*, quando 137,50. *δυσία*, eadē quae *περρυμένη* 137,50. perusta, causi merito esse solet 474,28. linguae liuor, vnde 134,20. lingua liuore bullata, morte subleue testat. 252,47. nigra, asperitatis semper comes 260,19. 274,2. quae multū nigrescit; intra 14. diem, crisin fore ostendit; i. exitiū 381,47. 248,60. 504,16. calamitosissima, nigra & virulenta 133,29. vnde vlceraur 137,52. Lipopsychia, vnde 131,53. Lippitū diarrhoea quae spōte cieit, salubris 130,52. 568,64. à *δυσία*, quid 360,23. aliquando *λέπες* dicta 360,24. à *δυσία* proprie, calculosi in vesica 360,23. 437,32. *τὴ δισύπνοτος* nomen, aliquando pro calculoso in renibus 365,22. Liuor, color est sanguinis subtilissimi 275,52. à frigore 125,48. coloris suauicubenti oppositus 308,35. liuidus color, puniceo proximus 385,43. nigro proximus 275,53. liuor, peior nigrore 38,60. duplex, vel ab expressione sanguinis ē venula in cutim, vel à perfrigeratione 284,44. 394,60. 61. 491,51. semper ē malis per mala 395,52. liuidi vngues, vnde 308,33. liuor, cur primū in vnguibus apparere 308,34. in morbis acutis, à *νεκρωσιν* vniuersitatis 257,64. digitorum & pedum in febre acuta, semper apparere ad mortem citō venturam 395,55. in offe, vnde 415,29. liuor & siccitas in vlceribus, vnde 398,53, &c. partium extimarum, quid aliter 38,58,59. partibus extimis accidit per progressum 38,64. liuidū, quodnā foedi odoris 284,47. Lochia, purgatio à partu 441,38. quarum rerum purgatio 441,41, &c. Lochia purgatio, & aquae vterinæ, quo pacto differunt 441,44, 45. lochiorum materia, peapismi non capax 462,32. suppressorum vitia, intra 45. diem mortifera 445,3.

Locus vis magna infertur ab albis, tam intus cohibitis, quam excurrentibus 475,1. Locus, locati conseruatio 159,3. à *Δόρος* in genere *τῆς φωνῆς* continetur 182,54. *Δόρος*, quid 55,34. à *Δρόν*, in cernicis connexione 192,32. à *Δρόβωσι* vnde 393,15, &c. Lumbi, quid 60, 23. lumborum vertebrarū quinque, in homine tantum 188,6. 192,34. 382,22. à lumbis, *μεσάρων* & *μεσocolον* 188,10. lumbi interiores, vt dolent

11,55. lumborum vitia, nullam partem corporis sinant ex-
pertem sui 332,27. lumborū & intestinorum facilis sym-
pathia & *συμπάθεια* 347,13. lumborum & renum dolo-
res, se mutuū vicissim excipiunt 383, vlt. 384,1. in lumbo-
rum sympathiam facillimē adducuntur renes, vesica, geni-
talia, *μεσocolum* 426,4. è lumbis ad ischium, rheumatis
propagatio facillima 528,41, 42. lumborum excursus,
caput replet 189,53. dolores hæmorrhoidis purum san-
guinem effundunt 566,1. dolor in omni fastidio cardial-
gico, deorsum *τὴν πόσιν* denūciat vniuersi humoris 502,15.
dolor, nulla incidente causa, crebrō reuertens; signum ter-
rifici morbi 198,51. in lūbis mala facilius sanescūt quā in
dorso: per opportunitatē venæ insignis 191,6. in lum-
bis dolorifica mala; sanguifusa 188,57,59. 192,59.
210,2. 219,18. 370,58. 382,60. 487,50. 502,18. 566,9. lum-
borum mala dolorifica, multis modis certifica 197,22. 198,
62. 199,36. quæ propagantur ad ceruicē & ad caput, vicif-
situdinem adferunt cōnūssionis & paralyseos 337,27. e-
uadunt nephritica, quando humor transit ad renes 384,3.
dolor cum cōmate anxio; pestiferus 199,18. de lumbo-
rum dolore, in fastidio cephalalgico, speratur infra trans-
missio 502,9. per lumbos oberrantium dolorum, & cum
febre, & sine febre; ad ischium transitus esse solet 528,22.
lumborum dolor prægrandis, quinam 503,16. in lum-
borum dolore prægrandi, cardialgiæ & cibi fastidia; signa
sunt hæmorrhagiæ, tum fururæ, tum antegressæ 198,29,
388,60. 566,8. ex lumborum dolore quæ cūtur hæmor-
rhagiæ: largæ 189,28. 292,60. quæ ex lumborum do-
lore principia morborum ducuntur; pestifera 197,40.

Lumbricorū *ή δισύπνοτος*, venit ab *δυσία* excrementi
chylosi 547,9. lūbricos vnā exire cum excrementis pro-
fuerit, dum itur ad crisin 546,51. 547,22. in lumbricis qui
vnā exeunt cum alui deiectione mitigata; cernitur mor-
borum acutorum infractio 547,3. lumbricorū nullā cō-
moda, vbi deiectione naturaliter est constituta 546,64. lū-
brici tum viui, tum mortui; priuācio, mali: cum verō itur
ad crisin profunt 547,33,34. de lumbricis opiniones variz,
Antiphanis, Apollonij, Aureliani, Dioclis, Herophili, Glau-
conis 547,26,30, &c.

Lux calori natio maximē consocialis 277,51. lux
facit, vt suppurati feritas infringatur 277,52. luxatio ne-
quit existere, quin coniunctum habeat perversione 192,28.
Λυκαρπία, *ἀπαιρησία*, *μυσηρπία*, gradibus tantum
differunt 381,21,22. à *Δύει*, *καὶ ἡ Δύσις*, in omni doctri-
na Hippocratis; sanatio est 72,25. 96,16. 182,10. 228,3.
358,2. 466,25. 506,39,391,40. à *Δύει*, aphorismi 26,6. quid
significat 15,62. 96,18. ἡ *Δύσις καὶ ἡ πύσις*, *δυσία* 144,10.

M

MACIES & rubor, *δυσία* 278,25. 459, vlt. maciei
inchoatæ signum *ἀχρόσιον*, cutis pallida 459,64. ab-
solutæ signum *ἀχρόσιον*, cutis pallida & intenta 459,63.

Magnum quidpiam exurgit, quando affectū causæ ex-
cipienti, accedit vis magna efficiendi 531,12. magnis duo-
bus positus, oriunda inde magna 341,18. 531,11.

Mala omnia, esse necesse est ē malis orta 305, vlt. 311,21.
328,42. 464,18. 523,20. mala ē malis orta, vbi pessima
395,55. malē orta, pessimē ipsos habent quos inuaserunt
337,50. de malis nūquam sunt auguria bona 520,61. ex
malis, nihil boni componitur 559,37,38. mala non sunt
reapse, si veniant ex *χρυσίν*, quæ mali speciem præ se ferūt
395,38. quæ *περὶ λόγον* apparent, non semper talia 455,54.
malum nullum formidabile, quod *περὶ λόγον* morbi appa-
ret 136,44. in malis ea ducenda, quæ olim profutura, no-
cent quando apparent & sunt 347,22. mala quæ in ve-
tustatem incidunt, nō facillē curationem recipiunt 175,10.
malum quodque, continuatione fit peius 524,64.

Malæ rubentes, cum ad extrema ventum est maciei;
monstri simile 278,23. à *μαλίστα*, qd 300,31. 424,59. quomodo explicat 359,8, &c. à *μαλίστα*, idem quod à *πύσι* 252,60. idem quod à *δυσία* *τῆς ἀντιβόσεως*, & à *δύσιν* καὶ *λαπείρ* 392,52. *τῆς μαλίστα*, inter *ἀνδύσι* 252,61.

Māma & vterus, mutuū se afficiunt 483,33,57. māmis
& vtero societas intercedit, per vasa cōmunia 483,58. mā-
marum & vteri societatis, multa argumenta 483,32. mā-
mae graciles vnde euadunt 452,3. māmarum *γρίφες*, ab-
offionis prænuncia 451,62. in māmis qui sunt, humorum,
transitus facilis intra thoracē 483,62. māmarum morbo
à febre, propria debet expurgatio per anacardasin 483,38.
in māmis empyema nō expectādū, quānis laudabile 484,9.

Mania, bilis atræ in cerebro symptoma 497, 3. in mania consulsio, unde 378, 51. mania melancholica, ipsa per se non infert *ἀμαρῶσιν*, sed consulsionis interuentu 378, 55. mania & melancholia parthematum fœtura vere 378, 42. mania parthemata infert fœtiora quàm ipsa phrenitis 378, 12. ad maniam à phrenitide fœtiora facilis egressio 378, 14. mania quædam phrenitica, à bile atra ex flaua perusta 378, 10. quæpiā sanfcit per hæmorrhoidas & varices 40, 6. Manuum munus & officium quale 111, 57. manus perfractæ, in mitella collocandæ 400, 16. manuum torpor, signum *δυσῆς*, prænuñciū delirij aut hæmorrhagiæ 190, 10. manus vel digiti extimi, primi omnium sensum exhibent perfrigerationis, in caloris retractione vi febris ardentem acutæ 332, 41. ad manum qui exiliunt, malo sunt loco 473, 47

δ μαλακός πιδερμῆς, à febre ardente, irreparabilis 134, 32

Mare, pro aqua marina, vel muria 312, 19, 32

Mares, celeritate cresendi puellas præcesserant dum essent in utero 479, 17. maribus nuper natis, verbum *μολύσσει*, appositum 479, 16

Margaritorum & gemarum apertiores maculæ, quàm silicum obscurorum 254, 55

Maxilla superior, capiti inneditur: sed non infinuatur ut articulus 231, 38. inferior cum superiore & capite committitur 231, 39. maxillarum sœui dolores, excessuri ossis periculum adferunt 140, 29. maxilla, inferior tantum, luxationis capax 231, 35. luxata, citò reponenda, & quare 160, 60. maxilla luxatio quæ oscitando accidit, mortifera; & cur 401, 14, 15. inferioris simplex & sola, per se ipsa mortifera 231, 54. maxilla luxata, inflammationes mouet, lethales in musculis qui tempora continent 510, 23. maxillæ coarctatio non minùs mortifera, quàm luxatio 231, 47

Maximiliani II. Imperatoris responsum præclarum de anno Climacterico 439, 56

Mediastinum, quid 304, 10, &c. cartilagineū est 291, 50

Medici officia tria, *ἡ διὰ γνώσεως, ἡ περὶ γνώσεως, καὶ ἡ ἐπερὰ* 164, 17-36 2, 13. officium, itaquæ è specula, præuidere futuras morborum successiones & trāsitus 62, 57. officium nunquam aberrantis à scopo, certò statuere quid euenturum sit 120, 4. medicus, quinam in prænoscendo numquam errat 257, 4. medicus excusatio nulla accipienda, qui de signis errauit in prænoscendo 254, 24. excusatio nulla accipienda in errore *τῶ ἔργῳ* 412, 61. error intolerabilis, cum erat *τῶ λόγῳ* 413, 3. excusatio accipienda de inuenienta fissura, cum ea subest alibi quàm in osse perculso 413, 1. prudentis est, cum non attingere qui seruari non potest 310, 27. 315, 24. 370, 36. cuiusdam nobilis festiui dictum de hydropico quodam 327, 11, &c. medico nihil magis necessarium, quàm cognitio rerum insolētiū 109, 47. inter medicos, bona opinionum dissensio, pessima voluntatum 203, 2

Medicamenti vim effrenem assumpti vix coercemus 574, 57

in Medendo omnia quæ sunt, quem scopum habent 280, 50. circa multum & præcepis occasio *ibid.*

Medium, syllogismi argumentum 162, 20

Medulla dorsalis, propius abest à neruo 7. paris, quàm ab aliis cerebralibus 20, 58. de medulla spinali, vide sub litera S.

δ μελὸς πλάγῃος, viscerosus 165, 36

Miei di molestia, proximè ad tenesmū accedit 364, 27

Melancholicus humor, sanguinis limus atque fæx 491, 18. 495, 4. obscurior est 559, 4. melancholici humoris nulla feritas 345, 62. 491, 5. melancholico succo, & atræ bili commune, nunquam concrefcere 559, 3. melancholicus humor & bilis atra, vt differant 345, 61. 377, 20. Melancholici humoris non ita acres morsus, quàm bilis atræ 379, 40. in bilem atram trāsitus 377, 17

Melancholia quid 375, 33. melancholia sic dicta, quòd ab humore nigro, non ab atra bile nascatur 375, 10. nomen est morbi, non nigri humoris 375, 10. melancholiæ nomen & ratio, duplex apud Hippocratem 375, 26. mēlancholia, animæ peccatum, potius q̃ vitium cerebri 374, 14. melancholiæ descriptio ex Auicenna, ab arculano 378, 2, &c. authores & fautores, tres casus; ægritudo animi; spirituum tenebræ; & cerebri complexio frigida atque sicca 376, 20, 11. fons in liene, mēscēterio, & toto corpore reliquo, sæpius quàm in cerebro 374, 16. domicilium

in mente 375, 42. melancholia, mentis ægritudo, quæ cernitur in assiduo mœrore & metu 376, 1. melancholiæ & mania parthematum fœtura vere 378, 42. signum *ἀκρίβειαν*, metus pertinax 377, 3. Melancholia ibi demum est, vbi quis in mœrore & metu, longum tempus exigit continenter 376, 24. 485, 23. propriè, ægritudo perpetua 375, 39. ægritudo, ex opinione praua 375, 58. febris expers, & cur 375, 41. 377, 3. in melancholia nulla inflammatio, nec antegressa febris aut comes 377, 2. melancholia per ægritudinem, æquè in humidos cadit atque in siccos 376, 12. in melancholia laborat primum pars illa animi quæ mentis & consilij est 377, 4. mentis egressio vbi cernitur 365, 34. melancholiæ *ἐκτονα* & *ἐκτονα* parthemata, metus & mœror 375, 40. in mēlancholia, mœroris & metus nulla vacatio 375, 39. à melancholia illud est quòd metus & mœstitia perdurent 376, 26. melancholiæ delirium cernitur in mentis egressione 375, 34. melancholica egressio violenta atque fetina, gignitur à flaua bile perusta, cerebrum imbuente 375, 31. melancholiæ soboles, consulsio 5, 47. melancholia & epilepsia, sc̃ mutuò consequuntur 375, 48. superstes, humorem gignit melancholicum epilepsiæ 375, 53. hypochondriaca quædam: & vnde 376, 16, &c. melancholiæ, cuius ad vltima ventum est, signa 375, 4. in melancholico excessu, infelix anima, vix vnquam soluitur in somno 377, 42

Melancholici vulgò, quinam 375, 11, 12. multi in adulescentia, à mœrore & metu 376, 13. melancholicus, omne tempus exigit in ægritudine 375, 38. omnia ruita timet 374, 21. malitiosè odit quos metuit, ac perisse expetit 374, 23. melancholici verè dicti, à scopo aberrant veritatis 375, 12. in melancholicis, quænam opinionis errorem inducunt 376, 46. melancholici, terribiles aspectu 374, 27. cur taciturni 374, 31. melancholicis de nocte pavitantibus, consuetum, in ventrem iacere 401, 61. melancholici vnde metum exterrentur 376, 19. melancholicis vnde visa apparent mendacia 376, 18. melancholici, nihil nisi perperam oppinatur & faciunt 376, 6. mente capti, eiusmodi sunt, morbo melancholiz occupati 375, 25. quidam habent *ὀφθαλμὸν*, & febre carent 375, 27. quidam, quos febris acuta inuasit 375, 27. non raro sunt epileptici 371, 13. 375, 45. tandem euadunt fanatici 377, 21. in melancholicis qui fanatici euasere, febrium quænam commoda 377, 27, &c. melancholicæ qui insaniunt, si tremor superueniat; malo sunt loco 375, 28. 378, 54. melancholicis & lienosis non eadem curatio instituenda 349, 32. à mentis ægritudine vetusta, remedia quænam adhibenda 376, 41, &c. melancholicos, seriò per inferam alium purgare oportet 375, 15. melancholici cur seriò & *ἀδπορῆς* purgandi, à 40. ad 60. zratissimum 375, 18, 22. melancholico oxymel nocentissimum 349, 34

Melicratum, syncerum potius quàm aquosum, spiritumantes ciet deiectiones, ac magis quàm decet colore saruro biliosas, magisque calidas 547, 57. à melicrati vsu, hepar biliosum æstu incandescit 498, 37.

Membranæ nulla amplificatio in forma priore, vnde redintegratio continuitalis amissa 418, 22. multum distracta diuisio incohibilis 425, 4. *συνδύσσις* difficilior, quàm carniū *συνσπῆσις* 305, 55. membrana purris, à cerebro abscedit 435, 18

Membræ virilis descriptio 396, 43, &c.

Menynx cerebri, membrarum omnium parens & origo 411, 30. 495, 53

Mens, diuina 426, 55. 456, 28. humanarum actionum parens 426, 35. mentis essentia *ἀναστασις, ἐκφρασις, ἀνῆρασις* 28, 24. 375, 57, 60. mēs *ἀπὸ βίτης*, quia *ἀναστασις* 377, 4. mentis vt sunt propria instrumenta: ita homines aliter atque aliter opinantur 376, 20. mens, affectionum omnium secuta, præterquam opinionis 375, 57. alienata, reuocari potest 571, 11. in mentem migrare epilepticam causam putare; nefas 375, 56. mens iis laborat, quibus quid corporis est in labore, & eius laboris rara perceptio 367, 34. 497, 38. mentis in officio laborantis signa aperitissima, quæ 55, 45. perturbatio alia atque alia 48, 9. è mentis potestate qui exeunt cū silentio, nec voce sunt capti, mortiferum habent malum 377, 11

Menstruorum causa quænam 454, 25. 455, 55. 456, 18. menstrua *κατ' ἐξοχὴν*, muliebria dicta 466, 30. multis commodis ipsam beant mulierem 456, 25, &c. actiones humanas quæ sunt mentis, non sinunt aberrare à scopo 456, 28. nutriticus ac spiritus œconomiam efficiunt bene morantur

ne moratam 456, 27. corpus vindicant ab excrementis quæ ipsi sunt egrotandi causæ 456, 27. menstruum confuendo, accensa libidine coeundi, mirificos adfert sobolescenti fructus 455, 52, &c. menstruis irrigatur atque repescit fundus, cum hiatu coryledonum, qui antea conuiebant 455, 46. menstrua purgatio, vnde, & quomodo fit. 455, 5, &c. menstrua purgationis per naturalia significatio fit lumborum æstu 456, 24. menstruum purgatione, fecunditas accedit 456, 30. cibi, portiones, & excrementa votis naturæ respondent 456, 30. vigiliarum & somni certa & constant vicissitudo 456, 29. purgatione libera & liberali quiescunt morbi congeneres & σύντροφος 456, 31. à menstruium ope, morbi qui extrinsecus enascuntur, non raro spe certa salutis consolantur medicos, quos metu exterrant in viris 456, 33, &c. beneficio, quæ intra sunt inutilia, transeunt in naturæ commoda 456, 32. menstrua purgatio, & τὸ πρῶτον, nulla granidarum, præsertim post τὸ πρῶτον 454, 20. in muliere grauida, non sperabilis, nec uita 193, 32. epilepsiz puerilis mulieribus finem adfert 466, 35, 44. proprium, sanare convulsionem; non muliebrium cæterorum 466, 34. menstruum muliebrium affluxus est & refluxus 455, 57. ad uterum affluxus, totum corpus deonerat 455, 31. affluxum quænam faciunt 455, 58, &c. ad se rapit uter, cupiditate nimia incitatus 456, 6. affluxus inundatio, tribus, vel quatuor, ad summum, absoluitur quaternariis 456, 11. tribus absoluitur quaternariis in mollissimis & otiosis 456, 12. quatuor absoluitur quaternariis in viraginis, & quæ labore corpus conficiunt 456, 12. ad uterum affluxu, non tam peccatur in ipsius commoda, quàm eius virtuti adicitur, fundum irrigando 455, 30, &c. refluxus, vbi primum lucet. 456, 7. menstrua quibus non expectanda, vel temeraria medicina cienda 456, 45. menstruale profusum, mulieri morbum exoluit 455, 30. ad menstrua profusencia retrahendum, prodest vomere sanguinem 479, 52. menstrua quo tempore tempestiue supprimuntur, id varium est; pro natura cuiusque mulieris varia, complexionis item, atque compagine 456, 43. menstruum reliquæ, à partu perfecto vel abortiuo suppressæ; puerperam malè habent 444, 64, 65. suppressæ sæpe sui seri expressionem mouent in fundum ventriculi 482, 7. suppressionis quænam incommoda 457, 4, &c. ab eorum suppressione, dolorifica lumborum mala 482, 7. nullus horror, nec febris, parta grauiditate 473, 27, 28. suppressionem minus moleste ferunt mulieres fecundæ, quàm quæ nunquam grauiditatis & partus labores sunt expertæ 445, 29. ab eorum suppressione, symptomatum grauitas & propensio maior in sterilibus, quàm in fecundis 457, 22. trimestris aut etiam bimestris suppressio, quibusdam mulieribus inducit empyema. 465, 9, 10. trimestri suppressione, rhachis, lumborum intolerabili dolore cruciatur 93, 39. suppressorum, sexto mense desperata curatio 200, 7. 457, 21. collectio, febris ardore sursum transmissa, ibi morbum facit vbi subsistit 483, 27, 28. à suppressorum anadrome, ibi morbi enascuntur, vbi subsistit ipsa 456, 61. cohibitorum anadrome si fit ad hepar, nec inde habet ἀναγωγὴν, ibi facit hydropem 482, 11. si fit ad pulmonem, ibique subsistit; peripneumoniam, empyema, & phthisin mortiferam excitat 482, 12. menstrua cohibita, sæpe in empyema mutantur 444, 36. in empyema mutata, quibus signis dignoscuntur 462, 36, &c. menstruum prima eruptio, Larissam virginem ab interitu vindicauit 466, 40.

Meraca, quænam 489, 46, &c. Merum verè, quoddam excrementum 257, 21. Meri conditio duplex; tum ea quæ cernitur propriæ expers humiditatis aquosæ; tum ea quæ omni mixtione caret; alieni humoris. 492, 36. merum nihil in bonis ducendum 288, 43. meraciora, meliora quàm meraca 489, 48.

Mesenterij origo 187, 38. mesenterium diuiditur in mesarzon & mesocolon 187, 37. mesarzon vnde oritur 329, 29. Mesocoli ortus, vnde 11, 56, 85, 25, 329, 29, 330, 27, 343, 36, 426, 8. Mesocolum ex quibus constat. 350, 61.

Μεταπείσις, quid 31, 6, 41, 34, 375, 52. μεταπείσις, triplex 56, 33, &c. η μεταπείσις est, cum à quiete morbi prioris, alter enascitur 443, 46. τὴς μεταπείσεως species duæ; μεταπείσις, mala; θύλακxή, bona 536, 54. η μεταπείσις θύλακxή, quomodo fit 236, 55. η μεταπείσις, omnis morbi ficæ materiz, in bonis ducenda 171, 27. melior extra, quàm intra 266, 46. per metapείσιν nata, spem adferunt bonæ crisi 295, 43. μεταπείσιν bonam habere non pos-

sunt, quæ toto genere praua sunt, & primigenia prauarum affectionum signa 262, 60.

η μεταπείσις, differentia est τὴς μεταπείσεως 443, 47. iuuenibus sursum esse solet; deorsum senibus 516, 62, 63. vnde, ibi μεταπείσις ἀπόπείσιν ἀντιπείσις 230, 8. τὴν μεταπείσιν καὶ ἀντιπείσιν, crebra vicissitudo 443, 50.

η μεταπείσις, quid 558, 36, 37. in meteorismo contentio maior, quàm in decubitu 393, 42. meteorismi alacritas in decumbendo, quid offendit 394, 27.

Merus, quid 522, 27. ut fit 523. causa duplex, 524, 25. melancholiz symptoma 5, 30. non sine causa parit odium 381, 24. immerito, ex frigore, conuulsione finitur 5, 19.

Mictio noctu multa, exiguum secessum habet 564, 30. cruciata vbi sistitur, in dolore dorsi & pectoris; crudeliter mortifera 557, 53. mictu quæ redduntur impemioribus; lethalia 363, 45.

η μίσηρπια pugnat è directo cum φιλαρπία 374, 41. μίσηρπια, λυγερπία, ἀπαιρπία, gradibus tantum differunt 381, 21, 22.

Mixtio ventrem indurat 186, 7. 217, 61.

Moderati hominis proterua responsa; mali ominis 398, 3.

Modiolus, cur ossi caluariz adhibetur 408, 16. modiolus admoduendos ossi suturæ vicino 406, 56.

Mæror, quid; & quomodo fit 5, 27. mæroris duplex causa 5, 24, 25. mæror, symptoma melancholiz 5, 30.

η μόρα περσμένη, quid 146, 53. τὴν μόραν περσμένην Deus posuit in fundamento vitæ 439, 4.

Mola, quid 479, 3, 4. vnde dicta 479, 5. velut quædam μόλωσις 479, 14. molæ coagmentatio non est sine coitu 478, vlt. 479, 39. mola viuit more tuberum, non stirpium 479, 6. in mola, discretionis & accretionis veræ impeditio à seminis cruditate quod in matrice conceptum est, nec foras elapsum 479, 8. Mola diu gestata, fere ἀποκίαν inducit 479, 33. molis annorum quindecim 478, 61.

η μόλην δαμν, maribus nuper natis appositum 479, 16. abscessibus immaturis qui paulatim subsidunt atque vane-

scunt, appositum 479, 20, 22, 25.

Morbi cuiusque quænam causa 185, 3. morbi omnes vel ἀπὸ τῆς ἀσθένειας, vel ἀπὸ τῆς ἰσχυροσύνης 244, 36, 305, 36. morborum ἀπὸ τῆς ἀσθένειας, species quatuor 305, 36. morbi omnes partim à diæta, partim à spiritu quem ducendo viuimus 345, 20. vnde συγγενεῖς, 214, 10. quinquam σύντροφος 433, 17. quinquam παύσις 322, 40. morbis propriis, facile omnes corripuntur 227, 4. in morbis periclitantur minus, quorum naturæ illi sunt congeneres 227, 7. morborum generatio atque impressio repentina, & in puncto fit indiuisibili: causæ morbi ficæ, paulatim 174, 17, 198, 57. 438, 1, 539, 24, &c. eo firmiter & periculoser, quò diuturnior generationis causa 21, 33. 198, 58. ibi facilis generatio, vbi causarum concursus 358, penult. corporis natura feracissima à 14. ad 42. annum 436, 1, 2. morbos omnes admittunt adolescentia & iuuentus 436, 36. morbi quinquam ante pubertatem non enascuntur 432, 59, &c. quinquam à 42. ad 63. annum non enascuntur 436, 3, &c. morbis quamplurimis occupantur homines 63. anno. 438, 6. morborum proventus, vnde 438, 57. morbi omnes, naturam sequuntur causarum tam efficientium, quàm excipientium 423, 21. aliquando partium obfessorum nomina sibi adoptant 321, 40. morbi genus nullum in superis paribus, de quo non aliqua significatio comparatur per ipsas vrinas, vel ex euentu 509, 19, 20. morborum vnde comparatur διάνοις, πένθος, καὶ θέρπεια 316, 25. medicæ naturæ 439, 57. paroxysmi, vnde 404, 60. morbi ipsi, pro se quisque denunciant paroxysmos & status 514, 50. morbi eiusdem multæ causæ 361, 61. morbus idem, multa symptomata epigenomena fundit 337, 2. morbi multi eiusdem symptomati 361, 61. ibi enascuntur atque manent, vbi antea fuit dolor aut lassitudo 301, 4. 477, 40. morbus ibi inest, vbi calor multus firmiter fixus 304, 5. ibi, vbi grauitas 275, 5. ibi, vbi sudor 3, 10. 7, 9, 84, 2, 101, 48. 278, 11. 297, 6. 299, 49. 507, 59, 569, 15. morbi periodus prima, quaternarius primus 294, 51. principium, primo absoluitur quaternario 256, 36. morbo ineunte, natura morbi ficæ causis opprimitur 46, 52. 100, 11. 206, 63. humorum est cruditas 40, 17. morborum initium nulla critica perturbatio 215, 58. excretio nulla suscipitur imperio naturæ 40, 15. excretio nulla salutaris 46, 53. επιφαινήσθαι,

non possunt esse iudicatoria iudicantia 46, 31. toto tempore si alium gerit agrotus *λαμπρὴ καὶ δύσμορος*; fiducia magna atque firma 546, 33, 34. depulso à pepassmo, triplex 65, 21. discessio ostendi non potest in cruditate proprii excrementi 528, 4. infractio & viscerum recreatio vnde significatur, firmissimum illud adferri potest ad ægri salutem 546, 57. historia est longa, à cruditate humoris morbisici, deficiente pepassmo 527, 57. quorumlibet non sunt pepassmi 512, 59. in morbo omni, caloris æqualitas expectenda 392, 41. mentem valere, ac cibis gaudere; bonum 393, 22. morbi *δυσχερὲς καὶ δύσμορος*, qui 23, 11. *ἀκαταστατοι καὶ δύσμοροι*, qui, & vnde 23, 16. omnes sanabiles, curationem recipiunt nouando & vacuando 342, 17. quidam sanabiles decubitu materię 78, 29. qui à repletionem nascuntur; vacuatione sanescunt 482, 31. morbos qui ex vacuatione gignuntur, sanati repletio 482, 32. Morborum calidiorum qui cient rigores, excretio critica esse solet 528, 12, 13. à bile, naturę *πύρραι* 523, 14. quorum materia bilis est, exacerbatio fieri debet diebus imparibus 233, 14. morbis in multis, bilis proruptio critica 549, 49. morbi & naturę certamen in prociuctu, die critico 505, 38. morbo cuique sua debetur crisis 96, 7. ad crisis progrediente, crassescere excrementum decet 577, morborum quę sunt critica, ne statim appareant 508, 20. cita crisis, quorū cita mutatio 248, 50. cita mutatio vbi cernitur 248, 51. exolutio criticis diebus, *κατὰ τὴν φυσικὴν ἀλλοίωσιν* 45, 58. diebus nō criticis *κατὰ τὴν βίαν ἀλλοίωσιν* 45, 57. morbus, tolerabilior, qui validis venit viribus, quàm qui effectus 270, 35. morbi primigenij materia mitior, quàm secundarij, per metastasin nati 270, 34. morbi qui non diebus criticis dimittunt ægros, cur reuertuntur 45, 65. morbus recidivus, vnde 73, vlt. morbi omnes symptomatice, excursus & recursus confectarij, primigenij peiores 60, 12. 191, 3. morbus tum in abscessum est facilis; si eorum quę excernuntur supersit pars aliqua 497, 62, 63. morborum principia quę ex dolore doli ducuntur; difficilia 190, 41. morbi *ἐφ' ὅσον*, moriendi necessitas accepta ferri debet 438, 11. nullius leuatio ab iis quę *κατὰ τὴν συμπτωτικὴν* ipsi adueniunt 118, 23. 483, 30. 498, 35. 551, 26. in vigore, virium virtute opus 403, 35. exacerbatio, nouis est fecita symptomata 493, 40. successio, vel per *ἐπὶ πρὸς*, vel per *μεταπρὸς* 13, 10. morbi omnes qui aliorum successione veniunt & propagatione, primigenij peiores 13, 10. 159, 15. 233, 54. morbus omnis qui superuenit alteri; non raro mortiferus 331, 59. 337, 51. 350, 40. 357, 27. 365, 8. 536, 56. morbi qui nulla incidente præiudicia oriuntur; terrifici 198, 55. in morbo quouis quę cito & paulisper coctę sunt vrinę, sinistri aliquid præ se ferunt 520, 35, 36. morbus erit longior & minus turis; si vrina quandoque deficiat, ac nonnunquam fit pura, nonnunquam quid album subsidat & læue 512, 18, 19. morborum omnium, principatus naturę sic occupantium, vt inde ipsorum officia perueriantur; expectanda in peius mutatio 379, 29. 416, 59. morbi lethales, si non cito exeant crisi propria & secunda, mox edunt signa iamiam futurę mortis 379, 31. à morbo qui emacuerunt, cum nigra deiecerint, postmodum moriuntur 533, 21. morbo aliquo occupati, ea remedia expentur quę lethifera esse solent 373, 10. morbi acuti, cur sic nominati 331, 41. celeriter, vehementer, & continenter mouentur 514, 35. morborum acutorum funestę causę quot & quę 40, 38. non vna est manifestio 81, 61. initia fere crebra metamorphosis & orgasmis 211, 43. 294, 54, 63. initia, sine orgasmo, temere purgationi opera datur 46, 45. non vna est crisis idea 81, 62. morbi acuti, celeriter omnes iudicantur 414, 55. morborum acutorum finis citi crisis, vel cita mors 386, 40. 239, 39. 358, 47. crises, potissimum excretionem suscipiuntur *ἐξω καὶ ἐνὶ ὧ* 527, 54. in morbis acutis, quomodo ineunda erit ratio dierum criticorum 233, 39. morbi acuti, intra quatuordecim dies iudicantur 80, 48. 214, 5. 255, 27. 263, 6. 270, 13. 281, 32. 302, 33. 326, 46. celerius exstat, quàm hyeme iudicantur 414, 55. *ἐκ μεταπρὸς*, quadagesimo die iudicantur 214, 6. 255, 56. omnes, diebus imparibus paroxysmos habent 44, 62. 45, 20. morborum acutorum propria, bilis generatio 547, 59. morbi acuti, pepassmo vno, duce natura, viam ad crisis inueniunt, per criticam excretionem 555, 64. morborum acutorum infractio in lumbricis cernitur qui vnā exeunt cum alui deiectione mitificata 547, 3. qui sunt in viscerum phlegmone, & cum febre, propria non sunt *ἐπιφαινόμενα*, vnde 525, 39. in morbo acuto quicquid immerito coctum est; malum 520, 30.

partium extimarum frigus; graue malum 392, 16. 537, 58. male res eunt, quando perennis accessio fit causę morbificę 294, 28. male sunt res ægri, quando naturę præsidia collabuntur 294, 29. morbi acuti, præ cæteris, ad mortem sæpe fatales, si pestem exceperis 448, 12. morborum peracutorum celerissimi motus ac vehementissimi 358, 47. morbi peracuti, intra septimum diem, decisionem faciunt interitus aut salutis 107, 28. morbus peracutus, intra primam periodum, crisis habet funestam 233, 56. morborum diuturnitas in pepassmi difficultate consistit 41, 53. 214, 8. morborum diuturnorum, nisi post exacerbentur, proprij abscessus ad inferas partes 527, 51, 52. in morbo vetusto nihil est planè criticum vel symptomatice, quod bilis tincturam delect ex vrina 516, 47, 48. morbi diurni exitiales; qui, & vnde 41, 47, 53, 55. ab humore nigro, omnium contumacissimi & deploratissimi 573, 23, 24. morbi potius quàm abscessus sunt, lichen, lepra, leucæ, pustulę virulentę luis venereę 499, 14. quānam siccī 335, 54. siccī venarum & arteriarum, in asperitate linguę, & cutis squalore 334, 61. morbus siccior, multifariē potest cognosci 246, 56. de morbo sicco verendum, donec à pepassmo humescere coeperit 335, 58. morbi quānam iuuantur aut curantur à febribus 365, 24. quānam à febribus acutis iuuantur 369, 42. morbosicarum causarum generatio non subita 437, vlt. 438, 2. genera duo; vnum, quod efficiendi vim habet; alterum, quod excipiendi 437, 60.

Mors à suffocatione vel extinctione caloris natiui 42, 39. 372, 30. 395, 2. 398, 45. 424, 56. 427, 21. 491, 50. mortis duę causę fatales; morborū prociuctus, & infirmitatis accessio 438, 57. causa eric, quę antea fuit ortus 438, vlt. 439, 1. fatalis necessitas, in fluxa cuiusque natura fundata 439, 3. mortem fatalem voluntas Dei præstituit 439, 3. mors certa atque cita, inde ostenditur, vnde significatio fit extinctionis caloris 395, 3. in propinquo est, si cum accessione causarum mortiferarum, euidentia quoque est signorum lethaliū 340, 7. inde in propinquo in morbis acutis vnde calor natiui extinctio 399, 6. in propinquo est, si præter corporis artuumque omnium grauitatem, vngues ac digitū liuent 394, 43. mortis citò venturę summum argumentum, cū ipsa dementię vis, tremorem infert 380, 39. iamiam venturę signa, in qualitate & actionibus corporis multum à se mutati 42, 23. mors quibus cita, citra etiam crisis 74, 30. mortua, viuens inimica 396, 18. mortuę & fœtidę rei nihil esse potest consociale, quod sit integrum 312, 50. mortifera quęnam casu, non fato: sed ante diem 438, 59, 60. mortifera omnia quę abs re mitescunt; mortem in propinquo esse testantur 29, 27. 296, 4. 460, 59. moriendi sensum quęnam adimunt 466, 3. *ἡ μάστις καὶ ἡ νεβρότις*, aliquando eadem apud Hippocratem 386, 36.

Morsus nomen, dolorificam vim suam, ipsum per se, ostendit 325, 57.

Morum dissimilitudo, in nullum aliud delirij genus cadit, quàm in phrenitidem 172, 54. mores insituri; vel insiti 397, vlt. insiti, qui 31, 43. morum insitorum, leuis mutatio 31, 43. mores insituri, qui 31, 46. morum institutorum comparatio difficillima 31, 57. institutorum mutatio, difficilior quàm insitorum 31, 51.

à Motu fit mutatio omnis 282, 51. motus à cerebro 393, 15. motus deprauati quatuor genera; & quęnam ea 219, vlt. amissio paralytica, vnde 425, 47. motus & nutritus præsidia cū sunt collapsa; in angusto spes est 556, 64, 65. iussi in iniustum mutatio, inala 221, 18. iniussi quàm iussi, conditio peior 224, 55.

Muliebrietas, quid 454, 22. vnde 484, 46. in quibus potissimum apparet 441, 14.

Mulier bene olent, quę nihil olent 119, 1. mulier vacua, imperfecta 455, 13. mulieres, calculosę 129, 63. ophthalmia laborant 129, 63. mulieri tabes vnde 465, 61. mulierum genitalia, vbi continentur 465, 21. in muliere, semen virile & muliebre 445, 12. mulieribus naturaliter insita necessitas, & insituta consuetudo purgandi sanguinem superuacancum per muliebria 455, 10, 11. mulieres purgationis menstruę beneficio carere non possunt, sine incommodo valetudinis; & vitę discrimine 464, 64. in mulieribus, materię redundantis promptuarium ad *ἐνδομήτριον* vel *ἐνδομήτριον* 483, 36. mulieres si recte valent, menstruum & lochiorum cruentam purgationem experiantur 455, 21. mulieri nihil magis expectandum, si menstrua desunt, quàm

sunt, quàm hæmorrhoides conuenienter ductæ 457, 36. mulieribus non minus affluit humoris *κατ' ὄσον* ad carnes iuuenilis, quàm ipfis apponitur *κατ' ἔλεον* vtilis 456, 21. in mulieribus, sicut in mari, cernuntur *ἡ ἀλμυρρίτις, καὶ ἡ ἀμυρρίτις* 455, 57. mulieribus, vnde plethora duplex 455, 64, &c. 456, 1. quibus impuræ purgationes mēstruæ, quæ quæ non eunt iure & loco; iis adhibendus cultus proli habendæ 481, 8, 9. mulieri menses decolores, nec eadem fluentes periodo; purgatione opus esse indicant 481, 54. sanguinem euoment, mēstruis profluentibus, sanatio est 289, 15. 479, 52. mulieres quæ multum crassitudine ē natura egressæ, vtero non concipiunt; iis omentum, os vteri comprimant: nec prius concipiunt, quàm fuerint attenuatæ 480, 1. quæ ad manum torpidæ sunt, aridæ, sitis expertes; cum muliebrica multa laxariunt; pus edunt 473, 32. 476, 16. mulier *ὀδενταρὶον*, quænam 445, 19. mulieribus quibusque lac in mammis concrescit; infaniam facit 478, 2. mulier si non prægnans, nec puerpera, lac habet; mēstrua illam deficiunt 478, 1. mulieres aliæ viragines, aliæ mediciores, aliæ mollissimæ 445, 11. viragines, vnde 445, 15. vt replentur seriùs; ita purgantur celerius 456, 14, 15. mollissimæ, vt replentur celerius; ita purgantur diutius 456, 14, 15. mulierum mollissimarum purgatio, quinque aut septem dierum 456, 16. mulieres solidæ ac succi plenæ, medium tenent locum replendi & expurgandi sui, inter viragines & mollissimas 456, 13. mēstruales, quænam, 454, 16, 17. cur sic dictæ 454, 18. mēstrualibus, amica & critica confusio, vnde ciuntur mēstrua 447, 1. mēstruales, semper sunt vacuo vtero 454, 17. quæ biduo, octodecim diebus sunt puerperiales 445, 3, 15. 456, 15. quæ triduo, 27. dies in puerperiis exigunt 445, 4, 17. quæ quadriduo, 36. dies exigunt in puerperiis 445, 4. quinque dierum, ad 45. diem à partu ferè puerperiales 445, 4. mēstrualis si fuerit 35. die, à foetu concepto; eadem foetum enixa, pari dierum numero sit puerperialis 444, 61. mēstruales vltra quintum diem nō agnoui Hippocrates 445, 6. mēstrualis bis in mense, quænam videtur 454, 49. mēstrualisne *πρὸ τῆς τῶν ὀστέων* fuerit grauida; an *κατὰ τὸν τῶν ὀστέων*, multum interest 461, 11. mēstrualium vt decet, facies nec maculatur, nec verrucis foedatur 562, 32. mēstrualibus quibus mēstrua bene cuit; non varicosæ, non hæmorrhoidæ, non podagricæ, nec hæmorrhagicæ 93, 23. 455, 22. 456, 36. mēstruali, cui mēstrua non respondent; prodest ē naribus profuere sanguinem 289, 16. cui mēstrua non respondent; sanguinem vomendo profundere, nouum & extraordinarium 323, 24. mēstrualis, in mēstruis se contineat septem dies, edicto Dei sancitum 445, 7. 456, 17. foecundarum consuetudo purgandi, naturaliter instituta 464, 62. foecundæ vt diu multumque repleti consueuerunt: sic etiam liberè ac liberaliter vacuari 457, 27. foecundis, amplitudo maior venarum 457, 23. facilius atque amplius multò panduntur claustra locorum & vteri 457, 26. repletio non tam molesta, si fortè incidere: nec tam difficilis vacuatio 457, 28. mulier quæ in aluo non concipit, quo modo sciet, num tandem aliquando sit conceptura 481, 26, &c. mulierem in vtero habere cogita, si purgationes non eant, nec horror febriue superueniat; cibi autem fastidium incidat 472, 63, 64. 485, 64. mulieres quænam statim à coitu semen effundunt, quale iniectum est 479, 44. grauidarum mēstrua purgatio nulla *κατὰ φύσιν*; præsertim post *τῶν ὀστέων* 454, 20. grauidæ quæ prius ægrotant quàm enitantur; iis subinde ante partum rigor cietur 475, 31. grauidarum, multum à se mutata spiritus & nutritus economia 469, 59. complexio corporis, iam minimum perspirabilis 469, 60. grauidas multa circumsuauientur incommoda 447, 62. grauidarum periculosa grauiditas in morbis acutis 93, 26. grauidæ si erysipelas nascatur in vtero; mortiferum 463, 54. grauidas malè habent quæ ante partus aquæ prorumpunt 469, 32. periculosè habent cephalalgia soporata, cum torpore graui coniunctæ 447, 52. in grauidis cephalalgia veternosæ, vnde 448, vlt. grauidas, malè habet hypochondrij dolor 475, 46. grauidis diæta exacta, exquisita & tenuis præscripti nequit, sine incommodo foetæ & foetus 448, 17. grauidæ si vltro mammæ subito extenuatæ fuerint foetum abortit 451, 60. grauidæ quæ supra modum emacruere, bimestres abortiunt, prius quam ipse habitiores euaserint 445, 64. 459, 54. quæ boni sunt habitus, cum trimestres abortiunt sua sponte; iis coryledones sunt mucore oblitæ 442, 47. 474, 58. grauidæ mortiferum, si eam

morbus aliquis inuadat acutus. 448, 11. 458, 32. 469, 53.
 gravidæ, vnde illoſæ 472, 8, 9. gravidis aphthæ, vnde
 471, 23, &c. mulieribus notæ grauiditatis, fluxiones aph-
 thiferæ, dolorificæ; prauæ 463, 61. 469, 39. 471, 3. grauidis
 ora aphthoſa, perliquidas reddunt alioſ 475, 22. graui-
 darum ora aphthoſa, terriſica. 294, 7. 318, 8. 442, 10. 443, 8.
 abortus prænuacia 352, 22. mulieres abortire, cur non
 mirum 447, 60, &c. mulieri peſſarium abortiuum non
 dandum 452, 33. mulierem hyſtericam, ad tempus, nul-
 la reſpiratio 147, 24. 372, 6. hyſtericis, vnde reſpiratio in-
 tercipitur 485, 16, &c. in hyſtericis reſpiratio eſt interce-
 pta, quam in plerisque non potis eſt cernere 485, 15. per-
 ſpirationi vniuerſi corporis ſufficit impediendæ caloris ex-
 tinctioni 485, 17. hyſtericæ, laqueo fauces ſibi præcludi
 putant 462, 48. hyſtericarum ſerè comes eſt conuulſio.
 epileptica, fugax tamen & facilis, ſine febre 337, 36. febre
 carentium, conuulſiones faciles 456, 31. mulierum par-
 tus, quæ puerperam iuuant 46, 7. mulieres omnino par-
 tus expertes: quia ſunt vacuæ nec prægnautes. 478, 17.
 479, 32. quæ parturiunt, prius cor dolent; paulò poſt il-
 læ pariunt 476, 53. mulieri parturienti cor dolet, vnde
 476, 61. puerpera quænam felix futura 461, 14. puer-
 perarum perfectos partus edentium, naturaliter inſtituta
 & conſuetæ purgatio rubra 474, 54. puerperarum puer-
 peris purgamenta nunquam reguntur naturæ imperio, niſi
 exitum citò habeant liberalem & liberum 445, 24. puer-
 perarum viraginum expurgandarum tempus, diærum ſe-
 decim 446, 48. puerperarum medicorum expurganda-
 rum tempus, 24. diærum 446, 49. puerperarum molliſſi-
 marum expurgandarum tempus, 40. diærum. 446, 49.
 puerperis quibus cohibita ſunt puerperia, conuulſio hoſti-
 lis 447, 2. puerperialis in puerperis ſe contineat 40. dies,
 edicto Dei fanctum 445, 8. mulieri à ſecundis malè ha-
 bitæ & difficulter parienti; ſternutatio ſuperueniens, bo-
 no eſt 468, 63. mulieres quæ frigidos habent vtros, ad
 concipiendum ineptæ: propter eorum ſubſtantiz denſita-
 tem 481, 2. cur ſteriles à frigore vtəri 480, 60, &c. ſter-
 les, ex menſtruorum ſuppreſſione grauius, facilius, & pe-
 culioſius laborant 200, 14. ſteriles ſuo vitio, per impoten-
 tiam vel excipiendi, vel continendi, vel concipiendi ſemen
 virile 482, 1. ſterilibus vomitio ſanguinis, ad cõcipiendum
 prodeſt 478, 45. ſteriles partum fouere, partim purgare
 oportet. 481, 11.

Muliebricia omnia continentur in alio, tam naturalia,
 quàm quæ iſis adueniunt 440, 16. principatum obtinent
 dignitatis inter ea quæ ſunt aliuina 440, 20. menſtrua &
 puerperiz purgationes 450, 11. communi voce, mulierum
 affectiones propriæ, quæ tantum in eas, merito ſexus, inci-
 dunt 440, 30, 31. muliebrium nomine apud Hippocra-
 tem, quænam continentur 440, 50, &c. muliebricia, ali-
 quando pro menſtruis, aliàs pro omnibus mulierum pur-
 gamentis 466, 29. vnde dicta menſtrua 455, 44. *μυϊως*
 dicta, pro iis quibus ſceminæ purgantur per naturalia; ſiue
 ſint menſtrua; ſiue puerperia 440, 38. *μεταχρησιν*, di-
 cuntur vitia quæ tum in vtro, tum ab eo contingunt 441,
 16. cur dici poſſunt cætèra vitia quæ vel intrā ſunt, vel ex-
 trinſecus enaſcuntur 441, 18. muliebrium nomen merent
 actiones muliebres; ſimiliter vt purgationes menſtruar
 & puerperiales 441, 15. abundantia, vnde 200, 8. fluxus
 per vtèrum, ſalutarius, priuilegio quodam naturæ atque co-
 loris mulierum, ex Dei edicto 491, 34. omnium fluxuum
 differentias & ideas, eorumque præſidia, accuratiſſimè
 ſcripſit Hippocrates 481, 58. in muliere concitatio, ſem-
 per in promptu 483, 56. purgatio, inter ea quæ deducun-
 tur, naturaliter inſtituta & conſuetæ 454, 14. muliebricia
 promouentur, rigoris conuulſione citatæ 486, 14. ea mu-
 lierum ſanant incommoda, quæ in viris non raro ſunt in-
 ſanabilia 466, 15. non cohiberi; ſalutare 454, 3. ciente
 proſuſe, crebri horrores cum laſſitudine, capitis grauitate,
 & colli dolore 472, 41. 477, 11. muliebrium naturalis &
 iuſta cohibitio in grauiditate. 478, 6. muliebre excre-
 mentum in grauidis, exitum habere nequit, donec mulier
 grauiditatem ſuſtulerit partu ſecundo 69, 81. muliebrium
 aduentu non minus adicitur ſanitati tuendæ, quàm ei red-
 integrandæ 466, 17. beneficio, quorum morborum ſana-
 tio apponi debet 485, 53. muliebricia quæ primùm aut ſta-
 tim apparent; conuulſionis finem adferant: atque id ſine
 febre 466, 11. multa cùm prodierint; oculorum caligo
 diſcutitur 482, 24. muliebrium reliquiæ quas ſecus ſibi
 non aſſumit, cur non mouent cacochymiam rigoriferam

395, 60. nonnunquam liuore præstat 257, 63. in nigris digris minus periculi quam in linidis 38, 63-394, 63-395, 23. ea è malis exorta, longè liuorem pernecie præcedit 395, 54. nigra lingua, aspera 260, 19. nigra infernè deici: bonum 210, 10. 358, 12. quænam, non nisi alio coacta, redduntur 209, 57. nigra vomunt sputatores, phrenitici, & inde fanatici 381, 20. ad nigrum tendent omnia quæ sunt umbræ, quæque opaca 526, 35.

Nimium omne, quantumuis criticum, periculolum 201, 43.

Nitor desperabilis in parte emortua, vel quæ gangrænam concepit 124, 51.

ἡ Νεμὴ, quid 344, 60.

ἡ Νωβέρτης, quid 36, 19. 241, 11. vnde 368, 44. propriè & verè, ad cerebri principatum pertinet 241, 8. duplex 394, 18. 473, 50. 476, 25. eius domicilium, cerebri vis effecta, vel impedita 9, 26. ea, morbo ineunte, symptoma est oppressione; affecto autem, exolutionis 241, 12. ἡ Νωβέρτης, ἑρπύλλε, πύρεσις, καὶ ἀφύσις, synonyma 101, 45. aliquando eadem est quæ ἡ μύρωσις 386, 36. τὸ Νωβέρτης, & ἡ Νωβέρτης, non minùs de pigro corpore in mouèdo, quam de mouendi facultate effecta, dicitur 556, 58, 59. τὸ Νωβέρτης, in phrenitidem sæpe cadit 12, 34. τὸ Νωβέρτης corpus, quoddam 33, 31.

Noctis & diei, causæ sunt contrariæ 277, 63. nox præcedens paroxysmum criticum, molesta esse solet 50, 47.

Nozarum corporis, genera quinque 305, 32.

Numeris vis nulla inest 438, 10. iis non comparatur natura in fundo mulieris, sed à semine parentis virisque 438, 64. in ipsis vita fundamentum non habet 438, 61. iis vita non conficit cursum suum. ibid. iis ut non subsistit hominum vita: sic etiam non sustentatur 438, 49. numeri nullum ias & imperium in naturam corporis 438, 48. numeris non debet accepta ferri necessitas moriendi, 63. anno. 438, 10. eorum complexu nullo comprehendi potest fatalis interitus. 439, 3, &c.

Nutritio, quid 421, 18. repletio tantum est vacuationis non autem partis emortuæ restitutio 421, 19. naturalis, quomodo comparata 331, 15. 343, 23. nutritione inculpari, & respiratione libera, vita hominum sustentatur 284, 18. nutritarum fundit omni ætate natura 420, 43. nutritatus & motus præsidia cum sunt collapsa; in angustio spes est 556, 64. nutritatus & spiritus æconomia labefacta; vitam effluere est necesse 295, 3. eorum quæ Nutriunt confertim & celeriter, celeres sunt discessiones 544, 63.

OBLIVIO, quid 6, 15. ab intemperie frigida cerebri fit, quam rigor inuexit 6, 16. à rigore, mala 6, 10. 9, 25. quænam funesta 6, 20.

Occasio in medendo, cita multum & præceps 280, 50. 282, 58. medendi in suppurato, arripienda ex dierum criticorum obseruatione 280, 55. occasione arripiendæ iudicium adhibendum, ex ipsa experientia 280, 52.

Oceanus, fluuius, lacubus, & stagnis ponderosior 312, 34.

ὁ οχλός, idem qui ὁ ἀρετισμός 157, 43.

τὸ ἀχρὸν καὶ τὸ χλωρόν, eadem Galeno 398, 61.

Oculi à cerebro absunt proximè 194, 51. ut valent; sic ipsa persona 124, 1. oculorum curuatura, à cerebro 453, 41. oculorum lumen connatum, instrumentum αὐτοδιδέσις visificæ facultatis 348, 50. nitor, vnde 124, 14, 24. oculorum nitor, eorum qui antea colorem genuinum & decorem amiserant; salutaris 248, 59. 513, 53. in oculorum canthis caruncula spogiosa, prohibendis lacrymis adnata 499, 51. oculorum membrana ἐπιπεφυκίς, vnde 124, 28. oculi, natua puritate, cæteris partibus antecellunt 124, 3. 254, 54. in secunda valetudine, spiritus animalis multi participes; simulatque eo defraudari ceperint, collabuntur 278, 21. ut sunt molliores, ita faciliùs liquuntur quàm cæteræ faciei partes 127, 19. 278, 20. intenta visionis acie inspicendi, maxime in morbis acutis 123, 63. in oculis, quomodo facultatum animæ vitia repræsentantur 126, 59. oculi, omnium facillimè certissimèque cerebri afflictionem testantur 132, 6. primi omnium in sympathiam malè affecti cerebri trahuntur 90, 59. in oculis primum apparet ictus 254, 54. oculi à se mutati, quid denunciant 124, 4. de crepitorum & iamiam moribundorum senum, quales 125, 30. oculi album, è pericranio 430, 4. fir maius, laxitate 126, 64. nigrum fir minus, corrugatione 126, 64. oculo-

rum alba quò celerius pura redduntur; eò ciciorem crisi ostendunt: quò autem serius, tardior 513, 53. ἀμαύρωσις, vnde 151, 51. caligatio, qualis & vnde 125, 33. 132, 8. caligatio, vbi aspectabilis medico 125, 20. vbi conficia ægroto 125, 21. caligatio, albumve rubens, aut liuens, aut nigris oblitum venulis; indecorum 400, 20. caligo discuntur, cum muliebræ multa prodierint 482, 24. caliginis origo varia 482, 49. caliginis ut sunt causæ, foci, idèz: sic remediolorum genera 482, 51, &c. caliginis remedia, vel naturæ imperio, vel medici artificio adhibentur 482, 52. oculi Isaac, ut caligarunt 125, 31. oculorum καταλασις, quid 144, 30. oculi concaui, quales 122, 1. vnde 127, 26. oculorum concretio, vnde 127, 51. oculi crebro hac illuc indecorè coniecti, signa non solidæ mentis 172, 59. oculorum contuitus audax, phreniticus 144, 28. dolores potio meri exoluit 130, 6. oculi ἐκδιδυμίζονται, quales 137, 15, 29. oculi ferocitatis, phrenitica 132, 30. oculus hebescentis, signum malum: sic & concterus & caliginosus 125, 43. 131, 29. in oculis potissimum lucent signa insaniz 380, 32. oculi vnde liueat 249, 41. si crebro moueantur, spes est furoris 90, 63. oculorum deprauati motus, vnde 172, 60. oculi vnde nictant 127, 55. oculorum obfcuratio cum exolutione, citam conuulsionem ostendit 131, 34. ἀρετίς eadem quæ πῆξις 132, 14. peruersio, ἡ ἰλλωσις 453, 33. ἰλλωσις fugax, iudicij incipitis 194, 62. ἰλλωσις firmiter fixa, ex vitio cerebri & facultatis; mortifera 194, 61. peruersio in morbis acutis, à cerebro est, & in ipso perficitur 366, 51, 52. peruersio ex lumborum anadrome; mala 41, 13. 60, 31. 128, 1. 144, 37. 194, 21. 337, 30. 453, 36. oculi phrenitico- rum, exerti ac truces 496, 62. vnde puluerulenti 496, 62, &c. oculorum πῆξις, in ἀνωρίῳ consistit 127, 53. rubor saturatus, plurimum valet ad opinionem hæmorrhagiz 92, 49. rubor singulæ & vomitus superueniens, malus 180, 35. rubra fusfuso febris experti, signum alui liquidioris 128, 10. 27, vlt. oculi prærubri, vnde 91, 35, 41. oculorum squalentium ratio communis, tum in iis quos tenet marasmus, tum in valde phreniticis 496, 60. oculi tabidorum caui, humiles, ac demissi 496, 61. oculorum abscessus, vel enascuntur vbi apparent, ibique pullulant vel eò propagantur è capite 499, 46, &c. hæthymata, rosa & croco celeriter arque fideliter arcenda 499, 50. symptoma præcipuum cernitur in cæcitate 108, 4. ομμάτων ἰλλωδὲς ὁράσις, inter symptomata quæ ex puerperiorum anadrome veniunt 194, vlt. οἱ ὀφθαλμοὶ ὀρθιδυνοῦντο καὶ ἀσθηνέουσι, & τοῖς ὀμμασι πῶτε λατύνουσιν, & ὁ βίβας πικρὰ διαρρήϊν, & ὀφθαλμῶν κινεῖσι δέξι; eadem 380, 23, &c.

Odium, φιλοτιμωρίαν parit 381, 24.

Odor, fit per anathymiasin 311, 36, 39. odoris natura, calida 311, 46. odor, corporum est mixtorum & succidorum 311, 35. inauis stirpium & aromatum, & rerum omnium succidarum, vnde 311, 48. odoris gratiosus quænam causa 311, 47. odor suauis, vnde 311, 49. odores fædi & graueolentes, proportionem quadam saporibus amaris respondent 311, 51. putres, ægrè admodum spirando ducuntur 311, 53. odor grauis, vnde 311, 50. fædus, deiectionis est κακὸν συμπεριεῖς 545, 53. odore carent lapides & aurum 311, 48.

ἡ οδύνη, quid 18, 49, &c.

Oeconomio naturalis, digerendo, coquendo, & excernendo absoluitur 556, 50. œconomiz naturalis labefactorio; vbi potissimum cernitur 141, 2.

Oedema, omnia phymatum genera quæ constituunt in systrophe, complectitur 164, 43.

extra Oleas ferri, Græcorum prouerbium 273, 30.

τὸ ολέθριον, firmissimum est ad mortis prædictionem 16, 15. 524, 27. οἱ ὀλέθριον æγροί, cum desperati sunt 58, 43. 524, 28.

Olfactus instrumentum, vaporosum 124, 22.

τὸ ἐπ' ολίγον; quid 49, 30. 33. 156, 10. 520, 54.

Omentum, cur dictum epiploon 417, 28. nullo confictum est vinculo 417, 28. suo contentum loco, ventriculi & intestinorum fomentum 417, 27. in præpingui abdomine, si claudat os vteri, sterilitatem inducit 417, 23. quibus excidit; necessariò hinc putrescit 417, 4. putredini obnoxium præter cæteras partes 417, 34. 43. omenti prolapsus in scrotum, vnde 417, 21. omentum, cur per abdomenis vulnus excidit 417, 26.

ἡ ομόχροια καὶ τὸ δμοχρὸν, frequens apud Hippocratem, pro æquali planicie 524, 8.

τὰ ομοῖα δὲ, ad τέμνησιν, maiorem vim habent quam

in causis affurgunt, inter acutos 119, 33. 177, 8. cur dicte ostenduntur 36, 9. 92, 36. in diuturnis; paritæ 58, 1. 22, 4, 59. & surditate, non continentendæ 113, 51. parotidas quantum difficultatē cum ptyalismo oritæ 117, 51. 155, 10. 156, 51. 333, 15. parotides salutaris, quænam 91, 54. quænam vertiginosæ 58, 44. parotidas parum prodest in empyema mutari ac fistulari, quando vrinæ redduntur pepasmi expertes 509, 26. 557, 49, 50. parotis; tum peripneumonia, tum empyemati succedanea 297, 36. quænam homini necando satis 58, 27. 118, 10. parotides ἀρρότοι καὶ ὑπότοι τετρίφαι 268, 22. suppurati expertes; in acutis mortiferæ: nisi alui ferantur 116, vlt. 224, 63. 265, 30. parotidum ex morbo acuto periculum, non nisi per suppuratum & expuratum potest effugi 117, 18. 537, 49. dolorificum quænam causæ Galeno 265, 20. in parotide dolorifica, periculo locus 114, 24. 265, 21. duo naturæ perfugia, hæmorrhagia & suppuratum 119, 49. parotidum dolorificum crisis & signa, quænam 116, vlt. 117, 1, &c. in parotidibus refrigeratio citò & paulisper, pessima 118, 12. parotides prauæ paraplecticis 36, 30. 116, 12. 193, 44. 219, 33. 243, 22. 366, 47. 381, 16. purulentæ, nec albo exacte pure, minimum olentes; interimunt 265, 29. graueolētis voluuli confectionariæ; cum febre acuta & hypochondrij meteorismo diuturno, interimunt 178, 8. rubræ & dolorificæ; omni ex parte pestiferæ 114, 48. 264, 62. prærubræ, quales 58, 22. rubræ, exacti iam morbi superstitēs; signa erysipelatis in facie nascituri 153, 6. prærubræ, vertiginosæ, & alienæ spontis; pestiferæ 58, 1. in parotidibus vrinæ citò & paulisper mitificatæ, pestiferæ 118, 11. 294, 30.

Paroxyfmi morborum, vnde 404, 60. meliores dierum imparium, quam parium 50, 43. 205, 36. parium dierum, non cadunt in criticas periodos septenarias; nisi malè 439, 44. in paroxyfmo omni non est iactatio nauseabunda 439, 55. extra paroxyfsum nihil bene ac criticè mouetur, in morbis imparium paroxyfsmorum, vel qui diebus imparibus exacerbantur 505, 60, 61. paroxyfsmorum typi expertum ἀρράγια, vnde 530, 46. ἀρράγια, omnino typi contra naturam febris acutæ 45, 17. paroxyfmi erratici, qui 15, 33. ex paroxyfms incertis, febres erraticæ 533, 46. incertis febrium erraticarum, certæ nascuntur quartanæ 533, 46.

Par vnaquæque dum valet bene, spiritu abundat: dum malè, ichoribus 328, 43. in secunda valetudine, inde suaue rubet, vnde capit τὸ δισχέλιον 460, 1. in aduersa, inde pallescit, vnde contrahit τὸ χροχέλιον 460, 2. quæ in secunda valetudine laborat; in eam se morbus adueniens obfirmat 576, 3. quæ ab insultu morbi doluerit, in eam sæpe intrat abscessus 576, 3, 4. partes abditæ omnes, contractæ & qualitate aëris offenduntur & corrumpuntur 417, 32. communes & propinquæ, primum & maximè affici solent 10, 30. duæ in corpore vniuerso, raro pariter similitæque infirmæ sunt 272, 12. extimæ, quænam 391, 63. partium extimarum constitutio, qualis esse debet 328, 11. cita in vtrumque mutatio; pessimè habet ægrotum 367, 27. 391, 55. 415, 19. 471, 45. liuor & refrigeratio, mortifera 109, 23. ab exhausto conuulsarum, redintegratio nulla sperabilis 421, 80. partes, facultatum ministræ, morus, procreationis & sensus; duabus expletæ partibus 274, 18. nutritiæ aliæ coquendò, aliæ digerendò, aliæ excernendò, suam dicantur operam 417, 63. omnes officiales, maiore contentione excitantur ad exclusionem rei molestæ, quam ad comparationem necessariæ 151, 44. 381, 1. in partibus occupatis, quarum officii vitam carere non potis est; periculo locus 537, 26. partium plurius labefactatio, peiorem morbum ostendit 53, 40. 164, 54. partes solidæ, natura albæ 511, 65. 58, 60, 63. naturaliter funduntur extremæ, colore similia subiectæ substantiæ 511, 56. partium solidarum virtus, per eas diffusa; natura 146, 51. 439, 39. 507, 37. 511, 61. 543, 38. 546, 39. 441, 46. spermaticarum nulla coitio, cum semel diuixæ fuerint 418, 15. pars spermatice, semel amissa, nunquam reponitur 419, 17. partium vmbilico circumpositarum dolores, exclusio sanguine discendunt: non exclusio, interimunt 565, 33, 36.

Pariendi ratio, omnium optima, fortu sua sponte in eam progressu 445, 35. partium labores, certis quibusdam periodis absoluntur 445, 43. partui cum est propinqua, spiritum crebro ducit 451, vlt. partum in propinquo esse cur denunciet cordis dolor qui antè non fuit 476, 63, &c. in propinquo, accelerat rigor 475, 59. ante partum crebro rigere, & indolenter partu leuari; periculum subesse testantur 470, 11. partu indolenter leuari, miraculo appo-

nendum; si non est falsò credita indolentia, & insidiosa lenatio 470, 50. partus iamiam futuri prænunciæ aquæ puerperiales 441, 11, 23. partui viam mununt, cum in propinquo est, aquæ vterinæ effusæ 441, 23. ante partum perfectum, à foeta nihil editur vitale 446, 10. partus facili excurrit crebra rigorum concussione, cum incipit esse grauis grauiditas 470, 18. felix, vbi sperabilis & citò venturus à graui enixu 476, 58, &c. felix & perfectus, suscipitur pari contentione vteri atque foetus 441, 47. 445, 31. 459, 23. 29. perfectus absoluitur duplici tantum periodo grauiditatis 445, 51. perfectus est, mense septimo vel nono 446, 11. perfectus, septimo mense nascitur 445, 44. in partu perfecto puerperia prima sunt, aquæ vterinæ; mox puer, dein secundæ, tum purgamenta reliquiarum sanguinis 443, 27. partus perfecti occasio vnde præcipitur 442, 20. partus octimestris calamitas quò referenda 446, 23.

Paucum nihil in crisi, criticum 201, 42.

Paulus, Galeni simia 66, 63.

ἡ παύσις ἢ λύσις, semper veræ crisi 182, 10.

in Pectore hominum priscorum, septem ossa viscerantur, quæ nunc tria 275, 13.

Pedes, quibus particulis expletur 278, 54, 55. natura frigidi & siccì 278, 54. natura & sim, omnium frigidissimæ 334, 35. longissimè absunt à partibus calidissimis 331, 11. 332, 34. 334, 35. 335, 14. primi omnium totius compaginis, intumescunt 332, 40. primi omnium refrigerantur in paupertate & interceptione vitalis caloris 332, 40. primi omnium turgidi in hydropo 335, 13. pedum tumor hydropticus, in quibusdam κατὰ φύσιν; in aliis ἀνὰ φύσιν 334, 47.

ὁ πεπασμὸς & ἡ πέψις, materia tantum differunt 239, 28. pepasmi & pepseus eadem causa effectrix, naturæ vis 239, 27. 511, 60. ἡ πέψις, coctio τῷ ἐκείνῳ 239, 24. ductus est eius quod coquitur, in substantiam eius quod coquitur 239, 30. perficitur assimilando 239, 31. πεπασμὸς, quid 9, 63. 239, 23, 29. vnde 393, 10. opus naturæ, per solidas partes diffusæ 439, 37. 39. 489, 2. 514, 3, 4. 546, 40, 41. nullus, febris dono fit 299, 9. est crisis, & abscessus simul 512, 32. alterando perficitur 239, 31. non perficitur nisi cum tempore 282, 53. 514, 62. 520, 46. pepasmi ad tempus; signa apparent diebus indicibus 508, 19. pepasmo significatur naturæ integritas, humoris æqualitas, & virtus caloris natui 243, 15. fidendum semper 81, 20. spes certa salutis adfertur 239, 33. 243, 14. pepasmi quænam commoda 250, 34. bonitas & erethismus naturæ, quoties ex æquo certant inter se; dimissio est morbi 514, 26. pepasmus, celeritatem & securitatem crisis denunciatur 29, 36. 98, 7. 239, 14. 512, 29. pepasmo vno, morbi acuti, duce natura, inueniunt viam ad crisin, per criticam excretionem 555, 64. critica spes affulgere non potest ante 4. diem 294, 60. sine pepasmo febris non exoluitur, nisi fit δυσχέλιον 521, 40. pepasmo nihil laudabilius in omnibus acutis febribus 239, 13. pepasmus in peracutis nisi breui appareat, breui vitam finiunt ægri 239, 18. omni febris tempore, semper feliciter apparet 81, 27. pepasum ostendit leuius & alba hypostasis in colorata belle vrina 512, 48. in pepasmo certi gradus; inchoati primum, mox manifesti, tum perfecti 520, 46, 47. pepasmi perfectio, celeritatem crisis ostendit 335, 44. perfectionis, nota certissima, crassitudo humoris quæ in mediocritate consistit 135, 44. in pepasmo constanti, vis est naturæ, libertas meatuum, & causæ morbi sic mitificatio 512, 33. vitæ salus sperabilis 207, 8. à pepasmo falsa, & amara mitificata, dulcescunt 285, 85. pepasmi aut foras, aut intrò cursum inflectunt; aut aliter, quò & quò oportet 169, 54. 508, 39. abeuntium, opportuni & critici omnes 169, 53. 268, 30. 512, 58. non sunt quorumlibet morborum 512, 59. pepasmus cruditatis eximie, non citò editur 520, 45. pro cruditate & corruptione 243, 16. pepasmi & cruditatis vicissitudo, pessima 295, 34. difficultas, in quibus consistit 78, 41. 214, 9. pepasmus, frustra fit in morbis partium spirabilia, nisi expurgatio consequatur 239, 40. frustra ad empyema quò foras non exit 285, 64. vbi non sperabilis, desperata salus 517, 12.

Plepium & veratrum simul mixta, ad pleuritim inferam præstantissima 388, 29.

Perfrigeratio duplex; vna corporis vniuersi; altera partium extimarum 154, 18. 371, 43. vniuersi habitus, periculiosior quam partium extimarum 216, 46. 371, 44. quænam, caloris insinui arguit imbecillitatem aut morticinium 202, 44. crebra, febrium acutatum symptoma & signum maximè mortiferum 40, 40. perfrigerationis & ardoris

vicissitudo, mala 2, 36. perfrigeratio à febrili ardore, pessima 6, 5. lethalis, quæ 2, 30. à perfrigeratione qui subroscidi sunt; malè habent 202, 35. perfrigerari caput, & manus, ac pedes; ventre costisque incalescentibus; malum 40, 46. de perfrigeratione, vide plura sub litera F, ad nomen *Frigorù*.

Pericranij eadem conditio, quæ membranæ cerebrum inuoluentis 415, 17. pericranium, vocatum caro 415, 23, &c. putre, à caluaria abscedit 415, 19.

Periodus prima, quatuor diebus absoluitur 133, 45, 134, 11, 294, 51. 514, 27. periodis primis cita mutatio esse solet ad interitum vel ad salutem 414, 54. periodus secunda, dies septimus 514, 28, 31.

Peripneumonia, quid 259, 3. 265, 10. 294, 37. 433, 26. 525, 43. vnde 274, 10. peripneumoniz descriptio 258, 50, 280, 22, &c. 403, 41, &c. idca multiplex 273, 36. peripneumoniam quàmnam agnoscit Hippocrates 273, 56. quàmnam indicent 273, 32. peripneumoniz consecraria, quàmnam 265, 11. sicut & pleuritidis, proprium *επιφανόμενον*, anacatharsis 258, 58. peripneumonia epiphænomena, in lingua lucent, sicut in spuro 273, 60. peripneumoniz signa quàmnam *περιγύμνα* 280, 21, &c. crisis, non semper per anacatharsin 273, 37. dies critici, quàmnam 269, 59. symptomata quàmnam 269, 48, 435, 27, 525, 44. peripneumonia omnis, *μεταπίπτει* abscessus partium superarum vel inferarum non habet 265, penult. peripneumoniz non omnis symptoma, iuguli grauitas & oppressio 274, 46. in peripneumonia, dolor iuguli, dolorificum malum ibi subesse testatur 274, 45. malæ rubentes, vnde 278, 30. rufis, vnde 282, 21. residendi cupiditas inuita 403, 21. nihil oprabilius spuro flauo, paucò permixto sanguine 259, 20. in utroque brachio vena secanda, & quando 274, 11. præstat citò adesse liberam & liberalem anacatharsin, quàm empyema serò venire 484, 11. peripneumoniz exoluendæ opportunitas magna in expiratione corporis perspirabilis atque meabilis 274, 32. quàmnam spura discessionem adferunt 263, 55. peripneumonia quàmnam, sperabilem facit abscessum 266, 2. peripneumoniz sanabilis, migraturæ in abscessus, signa 266, 4, &c. abscessus quomodo exoriuntur 267, 7. abscessus crurales, nisi fistulentur, palindromen sæpe inflectunt ad ipsos pulmones 443, 51. frequens mutatio in empyema 273, 38. peripneumonia purulenta fit nisi intra 14. diem cœperit expurgari 281, 4. vbi mutatur in suppuratum 277, 30. peripneumoniz in qua sputum falsum dulcescere cœperit, empyema succedit 285, 49. in peripneumonia empyema non expectandum, nisi cum desperatio est anacatharsicos in spe angusta salutis 484, 10. peripneumonia si in empyema vertatur, thoracis parte vtraque vltio adhibenda 274, 15. pleuritidi superueniens, mala 270, 29. pleuritidis succedanea; grauior primigenia 270, 41. peripneumoniz in pleuritidem, rara vel nulla mutatio 270, 42. peripneumonia ab angina, quibus significetur 237, 32. ex angina, mortem infert intra septimum diem, aut intra 20. purulentum facit ægrum 233, 60. 240, 17. quibus naturis fatalis ad interitum 271, 19. in peripneumonia, quibus virinæ continuò crassæ, mox ante 4. diem tenues fiunt; mortiferum 294, 21. mortifera omnia quæ dolorificum malum foras non edunt 256, 7. 295, 26. in peripneumonia quæ cadunt prærubra multum stillicidia; mali ominis 292, 5. à peripneumonia celerius intereunt exercitata & coacta corpora, quàm quæ in otio consistantur 270, 52. peripneumonia cur dicta sicca 243, 40. 295, 18. 474, 7. de peripneumonia sicca iis videntur qui pauca expuunt, & cocta paulisper 295, 9. peripneumonici, quàmnam 525, 43. quàmnam syderati veteribus 273, 20. quomodo respirant 145, 19. peripneumonici sputum flauum, paucò permixtum sanguine, ineunte morbo editum; salutare 252, 5. 273, 54. peripneumonici quando redduntur purulentum 264, 2. peripneumonici vrina perniciofa est, quæ principio cocta, post quaternarium tenuatur 525, 31. in peripneumonici dum viget morbus, iacentem residendi cupidum esse; pessimum 403, 10. peripneumonici lethale, pus secedere 223, 41. *περιπνευμονία*, quid 31, 35. *περιπνευμονία* in corporis habitum, non sunt eorū qui febre non carent 554, 14. *περιπνευμονία* simpliciter, quid ostendat 202, 29. duplex 202, 36. caloris moderationem & partium temperiem, atque frigus extremum significat 376, 61. pro vacuitate ardoris, & moderatione caloris 376, 57. *ἀντι τῆς κατὰ φύσιν* 376, 56. *τῆς κατὰ φύσιν* nomine temperies expressa; insidiosa 376,

64. *ἡ περὶ φύσιν κακὴ*, quid significet 202, 28. *ἡ περὶ φύσιν*, vbi idem quod *ἡ φύσιν* 205, 47.

Peritritica, in quam vrina cernitur 228, 51. materiam & occasionem præcipit abscessum in articulis futurorum 228, 52. abscessus in articulis obortos sanare 228, 53. quæ sanat conuulsionem, humore illo cietur qui *μεταπίπτει* habet è neruis ad venas 467, 22.

ἡ περιτρίτης omnis quæ vertitur in *ἀρτίασμένον*, calamitosum 100, 40.

Peritonæos tunica, valde densa 342, 1.

Perniciosum est, quodcunque à conditione morbi, naturæ & ætatis est alienum 570, 31. perniciofa, quæ apparere & sunt contra naturam morbi & ægri 45, 14. sunt supra modum, quæ cum natura supra modum pugnant 519, 13. quorum sine sigis leuatio est; mortem subesse ostendunt 339, vlt. 499, 34. 524, 30. quæ merito ingrauescunt, & sigis comitata funestissimè mortifera 340, 11.

Perturbatio nulla animi, febrium initii, bonam crisin promittit 50, 18.

Pertusio omnis non insanabilis, euadit mortifera, vel osse corrupto, vel inflammata meninge 406, 57.

Pestilentia parës vnicus, *ὁ θερμὸν σηπιδνῶδες* 550, 9. regnum *ὁ τῶ θερμῷ πολέμιος*, *καὶ κτάνοντι σηπιδνῶδες* 442, 43. pestilientia, syncope crebra, vnde 33, 37.

Phantasia, acrior fit in doloris cruciatu 405, 44. phantasiæ stupidæ mutatio repentina, in quibus potissimum cernitur 367, 20.

in Pharisæis hypocritica demissio. 374, 26.

Pharmacum vbi debet esse *μοχλικόν* 375, 19. pharmacorum mordacium appulsu perhorrescunt exulceratæ partes 470, 29. pharmaciz purgatio irrita, in falsò credita purgatio necessitate 187, 20. locus in alui torminibus quæ sursum mouentur 187, 21.

ἡ φάρυγξ, quid 153, 50. *ἡ φάρυγξ ἰσχυρή*, quid 238, 22.

φῆρον & *φερῶδὲν*, quid 53, & 439, 31, 32. *τὰ φήρα*, alio nomine parotides, vnde sic dicta 115, 51.

ὁ φλαύρος & *φάυλος*, quo pacto differunt 448, 45.

ὁ φλέγμα, bilis flaua & æstus humor; Prodicò, Hippocratis magistro 363, 56. *ἀντι τῆς φλογώσεως* 240, 63, 63, 7, 8.

phlegmata falsilaginosà, colore griso, à crudis, quæ sunt albidiora, separantur 575, 47.

αἱ φλυκταίνιδες, vnde *πυρίπνευσι* dictæ 278, 62.

τὰ φλυγάνια, quid 65, 35.

ἡ φωνή, veteribus dicta *αὐδή* 182, 54. *αἱ φωναὶ κατὰ κλίμα*

μῶρα, eadem quæ *αἱ κατὰ κλίμας φωναὶ* 144, 25, 43. *κατὰ*

λῆσαι in tabidis 144, 45.

ἡ φύσις αἰὲν φύεται μέχρις γένεως 439, 1. *ὁ φύς*, ἡ φύσις, idem quod *γένεσις* 188, 26.

ὁ φύμα, quàm late pateat 65, 40. 362, 14. idem quod

tuberculum 362, 18. phymata, vnde 65, 42. phyma & truma, vt differant 398, 33. phymatis, quàmnam ætas potissimum foeta 359, 16. phymata cruda, quò latius diffusa, eò meliora 170, 21. 283, 3. dura & dolorifica, quæ *ἡ μύρροπος*

καὶ ἀναρρόπος affurgunt, mala 395, 37. *μαλακά*, sunt ferè anodyna 252, 62. phymatum *μαλακῶν πόνοι*, *μαλακοί* 252,

vlt. phymata purulenta viscerum hypochondriacorum, ter-

rifica, quæ introrsum funduntur 170, 38. phymatis purulenti in abdito stabulantis, signa certissima 171, 26, &c.

phyma pulmonis, pro systrophica eius phlegmone 286, 28.

Phrenitis, quid 43, 50. 52, 49. 476, 36. 531, 47, &c. bilis in cerebro symptoma proprium 54, 45. 185, 9. 423, 20.

496, 39. 497, 3. facillè infertur ab anathymia si tetra- & effera 405, 52. phrenitidem facillè concipit cerebrum sic-

cum & calidum 405, 51. ad phrenitidem facilis transitus

perturbati animi 405, 51. phrenitis ipsos manet qui, cum

perturbatione, vrinas meiunt claras & albas, vel enæore-

mate nigro præditas 291, 32. à diaphragmate inflamma-

to 32, 15. super peripneumonia, vnde 269, 22. phreniti-

dem peripneumonia succedere; malo est 270, 30. in

phrenitide successio triplex, priuationis & rei; intensio-

nis & remissionis; tum peragrationis omnium cerebri

mansionum 57, 24. quæ memorantur insomnia; boni

sunt omnis 52, 8. 82, 37. 377, 47. phrenitidi vnde super-

uenit vomitus æruginosus 410, 39, 41. 496, 39. à phreni-

tide quam excepit lethargus, effæta vis languet cerebri,

omniūque neruorum & membranarum 542, 24. à

fruiore, ad maniam facilis egressio 378, 14. phreniti-

des vehementes, in tremore desinunt 48, 33. 49, 47-

55, 21. 202, 32. 207, 24. à phrenitide, per quos gradus itur

in requiem sempiternam 54, 14. phrenitidis mortifera

signa 156,

signa 356, 37. phrenitici, vnde 40, 57. euadunt, quibus, alio faciente, vigilibus, vrinae sunt nigro enzoremate praeditae 357, 49. phrenitici caput primario afficiunt 48, 62. phreniticorum dementia garrula 374, 57. phrenitici nihil conuenienter faciunt 54, 16. multi carochi 224, 16. phreniticorum propria facies, quae 181, 62. oculi externi ac truces 496, 62. phrenitici alba deiectione, mala 9, 34, 52, 38. 156, 22. 348, 7. phreniticum qui cum deiectione alba euaserit, Hippocrates vidit neminem 545, 43, 44. in phrenitici causa sitifera, eximia 356, 3, 4. phrenitici multi, ad 31, 32. *πραχρόν*, atque vnde 32, 6, 33, 37. 149, 56. parum & raro bibentes, idque cum strepitu; contremiscunt aut conuelluntur 496, 55. quando contremiscunt 350, 6. phrenitici conuulsiones: quin etiam vomunt ægriofosa; vnde nonnulli eorum celeriter moriuntur 496, 41. phreniticorum-pyelismus est quidam 501, 4. pyelismus cum frigore aut rigore, vomitum nigrum mox adfuturum denunciat 56, 50. 501, 12. 504, 10. 537, 48. phrenitici, sputatores, fanatici, etiamne tremuli 37, 34, 1. 378, 13. 501, 8, 9. furiosi euadunt, quibus excussa infania, febris acuta superuenit 54, 21. 97, 55. 377, 31. phreniticorum relapsus, quibus accepti feruntur 54, 26. ex phrenitici, qui sunt lethargici, plane immemores 542, 20. phrenitici in pestilencia quales 38, 35. *περιττωδὲς*, per idiopathiam cerebri 160, 56. phreniticum, contremiscere simul ac stulte palpare manibus 43, 42. phrenitica plane sunt, moderati hominis dicta proterua 323, 32.

περιττωδὲς, multam differt à *περιττωδὲς* *μακρομυδ* 133, 54. phthoe, pulmonis vlcus 255, 54. 459, 49, 59. in phthoe, tres emaciandi cause 459, 56.

Phthisis, quid 310, 44. communi appellatione, quid significet 310, 33. per antonomasiam, quid 310, 34. in quibus consistit 323, 62. à phthoe, i. pulmonum vlcere 453, 41, 48. 141, 64. 255, 54. 278, 43. phthiseos causa atque signum, quodnam 278, 49. epiphænomenon vnicum & proprium, sputum 311, 24. phthisis, in quam potissimum ætatem cadit 309, 17. 311, 1, 316, 11. phthiseos & torminum alui, fons idem 346, 10. prænuncia vel confectaria raucitas cum tussi coniuncta 293, 7. ab hæmorrhagia & hæmoptysi pulmonis, ætates quænam capaces 436, 22. in phthisi macie, tres emaciandi cause 317, 14. 459, 62, 63. certæ periculum maius atque certius, vnde 309, 14. phthisis, vel primigenia, vel empyematis confectaria 309, 9. primigenia, sanabilis 310, 30. ab empyemate, insanabilis 310, 26. 315, 22. primigenia, vnde 309, 9, 51, &c. 310, 25, 55. 57. 311, 9. 315, 13. 316, 17. primigeniæ, cause tantum duæ 310, 52. 464, 36. phthises in metu sunt maximo; tum à rptione crassarum venarum; tum à catarrho è capite 315, 32. 464, 37. phthisis à venæ crassioris rptione, sputum foedi odoris non edit, nisi mox affutura morte 311, 56. à catarrho pituitæ salis & putris, sputum foedi odoris proprium 311, 57. primigenia, periculosior efficiente causa, quam morbi natura 315, 43. inde nascitur, vnde aphthæ in ventriculo excitantur 294, 5. confectaria, quænam 320, 51. phthisin confectam ostendunt, pustulata corpora, vel ut ambusta 320, 33. phthisis habitus, vel in complexione partium aspectabilem, vel in earum structura 320, 55. non incidit per lienteriam *μακρομυδ* 354, 13. phthiseos & lienteriae differentia una, ab eodem fonte 353, penult. consecutio per translationem ab hepate ad pulmones 219, 40. phthisis ab hepate generatur 323, 46. phthisis & hepaticis incommoda paria 321, 58. mura conspiratio in ægroti perniciem 323, 45. in phthisi, hepaticum est, alium ferri liquidis & saniosis excrementis 323, 64. ad phthisin si accedat hypochondrij tumor; celeritius incidit moriendi 319, 18. phthisis symptomata à phthoe narum, non minus ferui quam fœtæ calamitosum 459, 46. in phthisi diarrhoea, vnde 313, 21, 43. ipsum *περιττωδὲς* 312, 8. 313, 51. 314, 10. 316, 58. 323, 31. 357, 63. phthisis quænam, *τὴν περιττωδὲς* propria 311, 11. *varias*, vnde 310, 31. eius descriptio 453, 12, &c. phthisis *varias*, propria *φιλολάγων* *καὶ νεογόνων* 315, 26. quænam iuuenum propria, hæmorrhagiæ commoda non habentium 311, 10. quænam mortifera 313, 17. phthisis dominatu qui tenetur, facile propagatorem eius experitur in partes nutritias 314, 3. *οὐ περιττωδὲς*, quænam 310, 46. æquæ phthisis capaces atque participes 459, 58. qui capite sunt turbinato; angusto pectore, & dorso alato 435, 6. *οὐ περιττωδὲς καὶ οὐ περιττωδὲς*, quænam 310, 46. phthisici vnguibz sunt, more cuiusdam feræ,

vincinati 278, 50. in phthisicis malæ cur rubent 460, 5. phthisicorum *επιρροα*, ubi percipitur 313, 28. pus naturaliter constitutum, est *καρπὸν* 312, 39. sputa omnia in ignem imposita, non mali odoris 311, 33. in ignem imposita, mali odoris; pestifera 311, 33. sputa, muriam conspuentium, subeunt fundum atheni, cum in propinquo mors est 520, 8. in phthisicis alui suppressio quam diarrhoea tenebat, mouet pruriginem tota compagine corporis 499, 21, 22. phthisicorum tussis *ἀσθμῶς*, & sputa salia *ἀκρίτως* quiescentia; toto fundunt corpore exanthemata 499, 20, 21. in phthisico salus nulla sperabilis, collapsis œconomiz vtriusque præsidii 320, 9. è phthisicis, quibus ad ignem sputum olet graniter, ac tum capilli fluunt è capite; moriuntur 310, 20. phthisici quibus diarrhoea superuenit moriuntur 313, 12. 316, 57. 317, 21. 323, 33. 354, 11. è phthisicis quibus defluunt capilli è capite; percuti à diarrhoea 313, 11, 55. 354, 10. in phthisicis pruriginosa corpora post alui suppressionem; graue malum 316, 51. 461, 27. 499, 20. phthisici, quænam ad vltima venerunt 311, 16. in phthisicis *ἡνέκρωσις* toto diffusa corpore, in pedibus primum apparet 331, 33. phthisiformis habitus, quænam 317, 46, &c. *εὐπικροχολῆς*, quænam 317, 44. picrocholi *ἄνω*, inedia impatiens 487, 44. in picrocholis *ἄνω*, oris amaritudo, cardiognus, alysmus; vnde 487, 45. *τὸς πικροχολῆς ἄνω* *τῆς ἐξ*, adstrictior esse solet aluus 386, 64.

Pingue, vnica bilis materia 518, 13. pinguis nomen, quænam complectatur 490, 25. pingue illud quod in carniem est in sculis, *γῆαυς* dictum 313, 24, 32.

Piscium materia quæ transpirando ducitur, non vniusmodi 147, 27.

Pissa-calida vulgò dicta, quid & vnde 362, 3. 364, 53.

Pituita, nihil aliud est, quam semicoccus sanguinis 126, 58. pertenebras mouetur 404, 59. regnat in alio 489, 7. pituitæ hybernæ nimia abundantia natat aluus 488, 23. pituita hyeme, deorsum mouendo purganda 66, 43. per palmum fit puriformis 348, 6. 462, 53. pituitæ abundantia nimia, causam habet suffocationem caloris natui quæ in propinquo est 331, 23. pituita in cerebro liquefacta; partim ad nares abit; partim ad os; partim per venas confluit, quæ ducitur ad pudendum 510, 15. aquea, vnde 293, 5. gypsæa 293, 5. syncerior 24, 55. salia 293, 5. putris & salia, intestinis dysenterica 461, 39. puris, praua in rheumate concitata 311, 62. pituitosorum corpus, minimè perspirabile 361, 51. *περιττωδὲς*, ad vinarum prauam hypostasim pertinet 532, 42.

ἡ πῆξις, quid 123, 51. Plethora duplex, ad vasa, & ad vires; vnde 455, 64. 476, 31.

Pleuritis, quid 244, 20. 256, 2. 296, 10. pleuritidis natura, in quibus consistit 247, 43. 387, 60. pleuritis, quibus arguitur 244, 14. pleuritis & pleuriticus, ab inflammatione systrophica lateris 321, 42. in pleuritide, lateris tumor non tractabilis 356, 44. pleuritidis signa pathognomonica; lateris dolor-pungens; difficilis respiratio, parua, & frequens; febris assidua; sicca tussis 526, 21, 22. in pleuritide, doloris punctiorij quænam causa 244, 16. febris assidua, quænam 244, 18. difficilis respiratio, quænam 244, 17. sicca tussis, quænam causa 244, 18. pleuritidis febris symptomatica est 311, 33. pleuritis, dolorem punctiorij & grauenter facit 41, 27. pleuritides; vnde nominatæ *δύοινα τῇ πλῆρι* 63, 1. pleuritis & lateris dolor; aliquando eadem, aliquando differunt 298, 6. ad pleuritidis *διὰ γυναικῶν καὶ νεογόνων*, argumenta ex lingua percutunt 249, 25. pleuritis *διήδης ἢ κρυφῆς* 244, 32. *δύκρως ἢ δύσκριτος* 244, 32. vnde difficilis & sinistra indicij 250, 48. quadruplex; ab inflammatione sterni, dorsi, costarum superiorum, vel inferiorum 244, 50. 291, 52. in pleuritide superiora, dolor adest claviculæ 274, 36. pleuritis superiora, quænam phlebotomiam non exigit 388, 32, &c. dorsalis, vt differt à reliquis 246, 16. vnde 158, 5. 245, 59. in pleuritide inferiora, pharmacia opus mochlica 261, 61. 388, 28. ad pleuritid inferam, peplium & veratrum simul mixta, præstantissima 388, 29. in pleuritide costarum inferiorum, si rubro succedit liuidus sanguis; non bonum 261, 57. pleuritide rarò infestantur acidum eructantes 271, 15. 354, 6. pleuritis, suo statu non manet ultra 14. diem 298, 35. non rarò *αὐτομάτως* quiescit per sputi liberam & liberam expurgationem 246, 54. 247, 17.

pleuritis *ἐπιπνευμονία*, sputum 251, 56. 482, 64. si-
gna verè *ὑπέρχοντα*, quænam 388, 3, 4. dies critici, qui-
nam 269, 59. exacerbatio fieri debet diebus imparibus
253, 13. pleuritis & hepatis inflammari diuersa doloris
proprietas 178, 50. in peripneumoniam, mutatio fre-
quens 270, 43. pleuritis quibusdam *φλεγμονώδης*, aliis
ἐρυσιπυλατώδης, nonnullis *οἰδηματώδης* 244, 30. pleuriti-
des biliosæ simul & sanguineæ, vt plurimum 9. aut 11, iu-
dicantur 251, 48. 252, 47. 269, 61. quæ circa initia mites
à septimo & octauo acutæ fiunt; ad 14. feliciter iudican-
tur 254, 3. vt pleuritis nihil opis requirit à medico, ipsa
per se facit anacatharsin libera & liberalis 388, 36. pleuri-
tis quomodo curanda 296, 24. pleuritis diæta, qualis
esse debet 262, 13, &c. exolucendæ magna opportuni-
tas; in expiratione corporis perspirabilis atque meabilis
271, 32. pleuritidi expurgandæ accommodatissimum
oxymel 254, 37. pleuritide defungendi ratio omnis, po-
sita in pepasmo & anacatharsin inflammationis pleuritice
250, 14. pleuritis, quomodo vale dicit 250, 6. in pleu-
ritide, pepasmi quænam commoda 256, 30. citæ crisis
quodnam signum 248, 36. celeritas etiam mora 250, 16.
pleuritis, cur citò expurganda 256, 41. impeditiō est
phlebotomiæ iis qui cruenta expuunt 388, 41. pleuriti-
dis dolorificum malum, quomodo foris apparet 256, 9.
discessionem, quænam sputa adferunt 263, 55. in pleu-
ritide nihil optabilius sputo fluo, paucò permixtò san-
guine 259, 20. sputum fluo accuratè permixtum, quid
denunciet 251, 27. sputum, quale, quemadmodum, &
quando apparet; futuram vitæ aut morbi discessionem, id-
que citò aut serò, ostendit 251, 56, &c. citæ expurgatio
libera & liberalis sputi boni, citam crisin infert 248, 54.
citam crisin promittunt, quæ citò humescunt: tardiores,
quæ serius 249, 6. præstat citò adesse liberam & libera-
lem anacatharsin, quàm empyema serò venire 484, 11.
empyema non expectandum, nisi cum desperatio est ana-
catharsis, in spe angusta salutis 484, 10. pleuritis de-
cimoquarto die obtingent anacatharsin, aut vertuntur in
suppuratum 254, 4. pleuritis in suppuratum mutatio,
medium quippiam sanabilem & insanabilem 255, 13. in
empyema conuersæ signum syllogisticum, grauitas suc-
cedanea doloris acuti 304, 20. pleuritis purulenta fit, nisi
intra 14. diem coeperit expurgari 281, 4. vbi mutatur in
suppuratum 277, 30. in pleuritis, principatum colla-
psorum & virium effectorum signa, vbi cernuntur 254, 61.
strepitus in pectore vnde eduntur 251, 35. 254, 32. pleuri-
tidi cui nam conuenienter præscribitur sanguinis detrac-
tio 388, 20, &c. in pleuritis quænam, à phlebotomia
periculum 388, 37. in pleuritis *πρὸ ἀποσπασμα*, vnde 252,
45. pleuritidi tantum accedit causæ morbosæ ex domi-
cilio prauæ vitæ, quantum spendo detrahatur 262, 12, 13.
in pleuritis, sputi dulcedo, mala 285, 54. noxium iter-
nutamentum 248, 19. in prægrandi, spes in angusto est,
non tamen desperatio certa 104, 56. in magna, vbi salu-
tis desperatio 256, 12. pleuritis in quibus dolorifica
fursum sunt mala; terrificæ 246, 43. pleuritis ipsa, ho-
mini necando per se sufficit 256, 61, 62. quibus naturis
fatalis ad interitum 271, 19. pleuritis senum, cur in-
sanabiles 248, 23. pleuritis cruditas, aut sputi prauitas
si ex æquo certat cum prauitate vitæ; longa non erit
vitæ permanens 256, 16, 17. in pleuritis, citò ventura
mors est, vbi colligatio est & confagratio partium nu-
tritiarum atque humorum 257, 4, 5. à pleuritis cele-
ritas intereunt exercitata corpora & coacta, quàm quæ in
otio consistantur 270, 52. in pleuritis, mortifera om-
nia quæ dolorificum malum foras non edunt 256, 7.
pleuritides auulsionum expertes, gravioribus iis quæ sunt
participes 247, 32. 301, 10. quænam, & cur siccæ 243,
40. 246, 55. 62; 65. 334, 60. 335, 54. 474, 7. siccæ &
sputi expertes; grauiissimæ 246, 43. 247, 10. 256, 17.
295, 20. siccæ, quando sperabilem vitæ salutem ostendunt
252, 44. pleuritis sicca, melior quæ coniunctum
habet spasma, quàm quæ eo caret 300, 47. ea si manet
sicca, vel malè humescit, cum prauitate sputi; nihil pro-
dest vitæ conuenienter emitti 256, 10. pleuritis, qui-
nam 262, 20. 335, 43. quibus continuò lingua bile fucata
est; septimo iudicantur: quibus autem tertio aut quarto;
ad circiter nonum 249, 11. 251, 59. 257, 44. intra quatuor-
decim dies, morbo aut vita solent defungi 270, 11. pleu-
riticorum febris, brevis 298, 34. pleuritici quicumque co-
cæ citò expuunt, sperabilem vitæ salutem, & certò & mox

futuram ostendunt 250, 9. pleuriticorum communis
conditio & status, vbi cernitur 245, 56. crisis propria, sputi
vacuatio 248, 2. sputum bonum, pauca bile permixtum
circa initia 484, 1. sputum, quodnam prauum 256, vlt.
257, 1, 2. sputum statim ab initio apparens; morbum cor-
ripit: sin autem tardius, producit 250, 30. res sunt in tu-
to, cum liberalis est atque libera citò anacatharsis 526, 5.
non est tam certa leuatio ex anacatharsin, quàm grauis of-
fensio ex vrina prærubra, caliginosa, cum varia hypostasi,
nec discreta 526, 8, 9. pleuritis prodest aluum mollesce-
re, sputum colorati, strepitus in pectore nullo edi, vitæ
placide ferri 250, 59. 526, 6, 7. pleuritici in tuto sunt, cum
liberæ ac liberali anacatharsin accedit bella vitæ coloratio
509, 24. in pleuritis vrina subrubra quæ hypostasin ha-
bet læuem; securam crisin denunciat 335, 33. pleuriticorum
leuatio insidiosa, quæ 330. accessoria mala, quænam
245, 53. pleuritici, anacatharsin libera sputi boni carentes,
grauiissimum habent malum 256, 10. redduntur empyici,
cum perhorrescere coeperint 255, 27. 264, 2. 277, 46. 298, 56.
pleuritico denegata *ἀνασπαράσσει*, intra 14. diem, ipsum
facit purulentum 237, 45. pleuritici qui facti sunt puru-
lenti; 40. diebus à rupta vomica expurgantur 255, 3. 286,
24. vnde *βλαπτοί* 249, 44. parum proficerent liberè & li-
beraliter spuedo, si multa bile saturata aut inflammata
esset vrina 509, 25. in pleuritis vitæ reddi porraceæ,
cum nigra hypostasi aut fufuracea; confestim mortife-
rum 526, 53. pleuritici vrina prærubra, caliginosa, cum va-
ria hypostasi, nec discreta; maximam partem mortifera in-
tra 14. dies 526, 1, 2. pleuritici, quibus initio variæ sunt ex-
puitiones; tertio die moriuntur, aut quinto 260, 30. pleu-
riticos, importuna prillianæ exhibitio quomodo suffocat
275, 61. pleuritici humoris prauitas & cruditas, vnde 296,
16.

ἡ πλυσμότη, alui repletio 488, 21.
πνευματίαι, qui 59, 15, 21. 149, 33. οἱ πνευματῶδεις, οἱ
μέγας καὶ πυκνοὶ ἀναπνεύοντες, Galeno 177, 10. τὸ πνεῦμα
ἀλυσθῆναι, quid 214, 35. τὸ μακρότερον, quid 120, 47. 149, 6.
τὸ μινυθῆναι, quid 151, 44.
Podagra, arthritidum omnium acerbissima, vehemen-
tissima, longissima 433, 54, 58. vnde 433, 55.
τὸ πικρὸν ὄντα, quænam 200, 46, 52. τὸ ποικίλως διαπο-
σθῆναι, ad quos proprie pertineat 194, 35.
τὰ ποδά, citam vicissitudinem ostendunt 31, 24.
πολυχρόνιον, idem quod *ἀγνοῦν*, vbi 43, 33.
ἡ πολυσταμία, mulieres vindicat ab omni molestia mu-
liebrum suppressorum 455, 42. 43. 457, 43.
Pompholyges corporum, vnde 249, 33.
τὸ πομπῶν, quid significet 471, 20. idem quod *χαλεπὸν*,
& *ζανόσιμον* 48, 24.
τὸ πομπῶδες, idem quod *τὸ ὑγρῶδες* 341, 37. 562, 52.
ἡ πομπή, dicta liquidior intestinorum subductio 562, 51.
ὁ πόνος, ad dolorem relatus 234, 23. simplex, sæpe per
sympathiam venit 88, 4. 95, 11. 110, 63. ὁ πόνος σύντονος, idem
quod ἡ ὁδὸν ἔχουσα καὶ σωεχὴς 87, 37. 191, 29. 282, 12.
450, 15.

Posteriora, anterioribus nervosiora 7, 25. aptiora ad
excipiendum frigus & ad sentiendum 7, 22.
Potionis à se nihil mutatz causa, vel coctionis prære-
pta occasio, vel impotentia coquendi 509, 63, 64. por-
tionem coquendi, vnde prætipitur occasio 509, vlt. 510, 1, &c.
Prædicendi ratio vnde comparatur 395, 38, &c.
Præputium, quid 419, 13. resectum, non coalescit 418,
44. 420, 17. cur Iudæi circimciditur 419, 15. 420, 18.
Praua omnino quæ sunt, & prauarum affectionum pri-
migenia signa, mutationem in melius habere non possunt
311, 61. prauorum maior vis quàm bonorum, in eodem
morbo 285, 18.
Principatus viuifici, non sunt diuifi 274, 19. principa-
tum trium dominarum regitur corporis vniuersitas 321, 56.
principatum & subiectarum partium, facillimè omnium
sympathia & sympathia 407, 58. principatus naturæ quò
plures in vicio sunt, eò res ægri peius eunt 324, 2. 337, 52.
363, 49. 394, 50. 522, 58, 59. 524, 37. principatum atque pro-
paginum, vitæ, quibus vitale cuiusque officium planè col-
labitur; mortifera 424, 41.

Principium, consentit nervosis partibus 183, 53, 220, 17.
principij exoluti non minor mala, quàm exhausti in mor-
bis acutis 127, 35. principiorum & propaginum, facili-
mutua inter se contagio 98, 25. 100, 19. 111, 60. laetorum
grauiores casus, quàm propaginum 116, 20. 366, 51.
à Præuione,

à Privatione, habitus denuo comparari non potest 5,
43. 288, 38. 312, 9. 331, 50. 378, 64. 395, 1. 416, 56. 421, 8.
η προεξιδαναι, quid 13, 16.
Profluvia biliosa, surditatem tollunt 368, 55. pro-
fluvium quod per naturalia prorumpit, dictum fuit γυναι-
κείος 440, 46.
οι προεξιδαναι, qui 26, 45.
Prognosticum aemo, nisi amens, negarit esse Hippo-
cratis 274, 33.
per Progressum qui morbi fiant 190, 58, &c.
Prolunent omnem toto diffusam corpore, ad urinæ
ductus confluere, ac meiendo effluere; non novum 505,
14.
Propagatio, est fixi morbi, non sede mutati 443, 45.
nunquam primigenium malum exoluit 193, 35. omnis
morbificæ materiæ intentata, calamitosa 171, 15.
η προφασις, quid 198, vlt. 199, 1. duplex 199, 2.
Proritatio omnis irrita, ventitur in malos abscessus; o-
mnis quæ secum addert incommoda diurnitatis, labo-
rum, ac sæpe interitus 467, 54, 55. morbum aliqui sana-
bilem, ex euentu reddit insanabilem, aut sinistra iudicii
212, 39. 286, 60. irrita in nulla spe crisis, nec indicata
prius, semper cietur δυσκρίσις, non raro γυναικείος 516,
24, 25.
η προφασις η πρόφασις, quale 70, 37. contrarium τῇ τῇ
προφασί, διαφέρει 181, 60. τῇ προφασί, ὁμοίως, idem
quod η προφασις ἐξέρχεται 122, 39. η προφασις κατὰ φύσιν,
quodnam 374, 39. contrarium τῇ προφασί, ὁμοίως
254, 45. η ἀπὸ προφασίς, ubi idem quod, η ἀπὸ κατὰ φύσιν
ὁμοίως 157, 29.
τὰ προφασί, eadem quæ τὰ νάρκωσις
171, 55.
τὰ προσηγορεύματα, remedia convenienter præscripta
235, 30. 238, 13.
αἱ προσηγορίαι, quid 134, 3.
Proxima & communia, omnium prima & maxime af-
ficiuntur 380, 34. 569, 15.
Pruriginis firmiter fixæ causa, cachexia 317, 10. pru-
ritum facit affluxus pituitæ putris & falsæ 368, 14.
η φαεινός, idem quod η φαεινός 312, 43. 44. 513, 60.
δ-φωτός, quid 307, 56. φωτός κατὰ φύσιν, ad quod spe-
ctat; contra Galenum 37, 27.
Pforæ fecda prurigo, vnde 316, 64.
η φαεινός καὶ νάρκωσις, aliquando idem quod η κατὰ φύσιν
προσηγορεύματα 371, 49.
οἱ πτερυγίδες, à distillatione ferina, & facilius tabem
conciunt, & difficilius sanescunt quàm cæteri 271, 55.
αἱ πτερυγίδες, ὁμοίως 292, 40. 43. 310, 47. 313, 40.
Ptilanarium est meabile, coctum facile, imbecillum, &
minimè sitiferum 262, 18.
η πτύελος, siue sputum, quid 250, 24. idem quod
expectoratum 250, 27. ἀπὸ τῇ πτύελοις 223, 5. in
πτύελοις verè dicto, non diffinit os, sed tantum humescit
223, 6.
Pyelismus, πυελίσις in morbis costarum atque pul-
monum 260, 54. pyelismus quidam phreniticorum est
501, 4.
η πύσις, sæpe ἀπὸ τῇ ἀνακαθάρισις, apud Hippocra-
tem 483, 60.
η πύσις, quid 250, 25.
Pubertatis tempus, intra adolescentiam 433, 24.
Pudendi descriptio 396, 43, &c. pudendum, ut con-
trahitur 396, 50. pudendi reuulsio, laboris grauissimi ar-
gumentum 363, 57, 59. reuulsio, & sphincteris musculi re-
solutio; ἀδύναμις 363, 60.
Puellæ, crescenti celeritate mares præcedunt 479,
17.
Pueris consuetum, iacere in ventrem 401, 61. pue-
ri, cur de nocte excitandi ad meiendum 359, 63. pueru-
li, lumbricis scatent 353, 25. puer non tentatur podagra,
priusquam agnouerit vel exercuerit venerem 433, 63.
pueri, faciliè conuulsionibus exercentur 138, 22. 228, vlt.
puerorum morbi, quomodo iudicantur 213, 61.
pueritia, ætatem mitissima 433, 52. pueritia, septem annis
finitur 439, 17. pueritiæ sui sunt morbi 436, 35. pueri-
tiæ τὰ ἀδύναμις multa, quibus ipsius morbi succrescunt &
pullulant 433, 44.
Puerperia purgamenta, quid 444, 63. 445, 26. 446, 52.
cohibita, maleficio menstrua præcedunt 450, 13. eorum
corruptio, sæpe ex abortu 452, 34. puerperiorum albo-
rum duplex ratio & causa: vna mucorisi altera puris 474,

57. alba sursum transmissa, nihil habent securitatis 475;
2. ex iis tam intus cohibitis, quàm exuentibus, vis magna
locis infertur 475, 1. de puerperis, supra ad litteram M, sub
nomine Mulieris.

Pulmo à Deo efformatus, ut respiratori & exsuffla-
tioni commodè morem gerat 274, 50. instrumentum spi-
rabile & vocale 274, 50. pulmonis substantia, ex quibus
confurgit 275, 28. conditio atque natura, multum spumi-
fera 309, 32. descriptio 428, 17, &c. pulmo, quibus parti-
culis expletur 274, 33, &c. à iugulo ad diaphragma produ-
citur 274, 56. costis nobilior 270, 33. cordi consocialis
276, 29. pulmonis & cordis sympathia & syntimoria ma-
gna 276, 28. pulmonum & capitis, faciliè οὐρτυμια 313,
37. officio, vitam carere non potis est 276, 30. pulmo,
quomodo respiratori morem gerit 274, 51. per pulmo-
nem, ærem excipere, cōmune omnium vocalium animan-
tum 148, 7. pulmones, lateribus adiacent 295, 48. pulmo-
nis, non vna tantum regio 273, 35. pulmo, cur in tres lo-
bos à Deo diuisus 274, 57. pulmonis lobi vocati alæ, quia
more alarum dilatantur 274, 58. alæ tres, dum vixerunt
Hippocrates & Galenus 274, 48. 275, 10. alæ superæ &
mediz, mammis, thoraci, & dorso adiacent 302, 13. alæ bi-
næ tantum, hoc sæculo, parte vtraque apparent 275, 11.
bronchia, quid 275, 18, 27. quibus nominibus appellata
275, 17, 24. sunt ipsius interna spatia 301, 51. 303, 47. pul-
moni toti vena arteriosa ramose distributa 274, vlt.
in pulmone, spumæ generatio 289, 50. pulmo, ἀεραρός 311,
59. 332, 45. 553, 63. mollis & spongiosus 311, 23. 275, 19. 292,
45. crochonis capacissimus 315, 58. per pulmones, ab hy-
pochondrio, ad caput est iter 576, 6. pulmonis, faciliè ad
mammæ μετακίνησις 477, 63. pulmonem efficit, & sup-
puratum accersit, fotus 281, 53. pulmonum hæmorrhagia,
vnde 301, 55, &c. in pulmone sanguinis copia, vnde & quæ
309, 26. de pulmone iis sit eductio, qui sanguinem spu-
mantem expuunt 283, 64. 289, 4. 309, 49. 487, 31, 32. in
pulmonis vitio manet sæpe integritas naturalis econo-
miæ 525, 52, 53. pulmo quoties oppletur, tussis habet, &
orthopnea, & asthma 300, 24. 477, 56. simulatque ca-
tarrhum ferinum complexus est, οὐρίσµα concipit 311, 20.
pulmonum morbi, quinam 272, 18. sæpe exoluntur vrin-
arum crassarum peritritica, & multa hypostasi prædita-
rum 266, 30. in pulmonum morbis præcessisse aut conse-
qui coryzas & sternutamenta; calamitosum 271, 42. pul-
monum rheumata, anagogen non habentia, intra 20. dies
in pus mutantur 237, 40. mala quænam suppurant 136, 26.
mala, quibus suppurant, malè res eunt 136, 26. phyma, pro
phlegmone eius systrophica 286, 28. pulmo, inflammatio-
nem systrophica correptus, humiditatem quandam effundit
in spatia sua interna 252, 7. 258, 63. pulmonis inflammati
summa omnia, ubi cernuntur 276, 61. totius phlegmone,
intolerabilis 276, 24. totius inflammati, quæ signa 276,
24. alterutrius phlegmone, tolerabilis 276, 23. quæ-
nam partes inflammentur, ut dignoscitur 273, 3, &c. vl-
cus, nomen phthisis sibi vendicat 319, 60. vlcus, socias
& vicinas partes in sui contagione adducit 313, 61. ὁυ-
ρίσµα, spiritus & caloris paupertatem inuehit 314, 6. vl-
cera, valde edacia 278, 50. vlcus, emaciandi faculta-
te & vitabifica, cæteros omnes morbos præcedit 310,
40. 354, 37. in pulmonis vlcere, vis triplex emaciandi
310, 41. 312, 29. 315, 28. 319, 60. pulmones vlcantur,
à puris diu stabulantis acrimonia erosi 255, 53. pulmo-
nis & intestini vlcera, eadem causa 346, 7. pulmonis
vulneratio alta, cur mortiferam infert calamitatem 428,
20, &c.

Pulsus, quid 172, 24. pulsus significatio, duplex 172,
26, &c. ægroto permolestus ac dolorificus; signum inse-
parabile eximie inflammationis 173, 35. temporalium ar-
teriarum, medico aspectabilis, ægro dolorificus 183, 31. ma-
gni, veloces, & crebri, vnde 69, 52. desperatis, fallax
343.

Puniceus color, flammei est & rubri coloris in nigro
385, 38. puniceo colori proximus liuidus 385, 38.

Pupilla, nigrum oculi 327, 3.

Purgatio, cacoehymiz debetur 213, 51. purgationis
triplex inclinatio 66, 40. purgandi primordia vnde esse
solent, ibi vis ipsa quiescit bene morata 501, 51. qui pur-
gantur, finem faciunt sui purgandi, postquam finierint
501, 51. purgare quando consilium est, corpora debent
effici meabilia 179, 64. ætate superiorem aluum; hyme-
ni, inferiorem 488, 18. supra graciles & faciliè vomere
Fff iij

tes, præterquam hyeme 488, 19. purgatio difficilis in contumaci obstructione, ubi corpus non est meabile 458, 8. purgandum per os suadent, cardiogmus & oris amaritudo 502, 11. deorsum, alui tormina cum dolore lumborum 381, 60. 502, 12. purgatio quænam bene suscipitur, & commodò ægrotantis 371, 20. in purgationum excessu quem inferunt pharmaciz, mortiferè habet singultus 500, 10. purgationi cuius redundanti, si frigus adueniat cum sudore; funestum 501, 31. purgationes nigre, quænam 502, 44. pestifera 502, 46.

Puris causa, *πυρροσ* 511, 59. pus est *πῦρ ἀκρίτων* 511, 60. inter pus, semen, & hypostasin albam nihil interest efficiendi virtute, sed tantum materiæ capacitate 511, 57. pus aut sanguinem qui misit, vesicæ aut renum exulcerationem ostendit 522, 1, 2. pus laudabile, quale 119, 9. puris laudabilis generatio, cui tribuenda 200, 44. pus album, æquale, & læue; unde & quid significat 167, 44. 262, 52. æquale in substantia, quodnam 284, 11. æquale in colore, quod 284, 12. æquale, quid significat 284, 10. album, quid arguit 284, 4. læue, quid denunciat 284, 8. nihil olens, quid arguit 284, 5. dum conficitur, grauiora omnia doloris & febris 282, 61. 287, 25. puris inchoati seuos dolores, confecto mitescere; quomodo intelligendum 282, 13. in pure conficiendo celeritas, ubi posita 281, 19. tarditas, ubi sita 281, 20. puris cita confectio, citam habet rupturam 280, 13. pus in qua parte thoracis abditum lateat, ut innotescit 308, 46. ab empyemate inferarum pulmonis alarum, quomodo explorandum 308, 3. sæpe funditur, suppurato intra venas humore, & sine vlcere partis quàm ipsæ circumfluunt 324, 29. è vomica antè non erupitur, quàm exorta fuerit noua quædam species doloris, tussis, dyspnœa, cum pyelismo 281, 40. dum erumpit, membranz distentio maior, & proritatio molestior 282, 15. puris boni & laudabilis exitus omnis, vndeque sit; salutaris 558, 28. in puris exitu cautio non minor, quàm in suppuratiõe ipsa 304, 44. puris expurgatio sursum, sit spuendo 282, 28. puris acrimonia mordens vicina corpora, eodem modo horrorem ciet, quo acria medicamenta 280, 8. puris vellicantis molestia & importunitas, noctu maior quàm interdiu 277, 56. pus circa cor putrescens, in prunam effusum foetet 313, 51. pure in thoracis sinu stagnante, quicquid eò confluit, in pus vertitur 306, 3. puris in thorace copia & abundantia, vnde innotescit 308, 40. puris in thoracem effusi signum præcipuum, grauitatis & febris lenitio fugax 280, 14, 18. pus effusum, quod prius erat in pulmone diffusum, horrorem ciet 284, 33. pus in thoracem effusum, citò vacuari debet 281, 1. puri vacuando è thorace antequam opera detur, caput resiccandum 279, 57. puris spurum malum à sanguinis sputo 290, 6. pus amurcosum, cœnosum, foras effusum; lethale 165, 38. pus glutinosum, difficultas spirandi, & excreandi; multas operas tradunt in ægri perniciem 288, 27. pus spumans & feruidum, vnde 284, 51. pus malum, quacunque foras exeat, desperationem adfert 304, 45. pus quibus concutiendo editur cœnosum, & foedi odoris; ut plurimum moriuntur 290, 13. 431, 14. à pure quibus coloratur specillum, velut ab igne; omnes intereunt 431, 13. purulenti, quinam propriè 277, 33. purulenti ex pleuride aut peripneumonia, ut dignoscuntur 277, 20; &c.

Pustulæ, quot nominibus dictæ 385, 19. omnes, collectione ichoris maligni exoriuntur 385, 17. cuius rei argumenta 63, 50. serpentes supra bubonem, ad pubem & ilia; ventrem accusant virij 569, 3. toro corpore, vnde 141, 60. ambustis similes, vnde 320, 42, 62. 385, 25, 26. pestilentis morbi propriæ 385, 25. quænam pestiferæ 63, 28. virulentæ luis venereæ, non enascuntur *καὶ ἐπὶ οὐλῶ*, sed *κατὰ τὸν σπλῆν* 499, 14. in censu hecchymatum non continentur 499, 13. morbi sunt potius quàm abscessus 499, 14.

Pyretica nostra, ex quibus conficiuntur 326, 45. pyreticum, quomodo adhiberi debet ad puris vacationem, in thoracem effusi 303, 49.

QUALITAS corporis, triplex 60, 46. in quibus certitur 391, 43.

de Quartana, vide ad nomen *Febris*, sub litera F. quartanarij, magno morbo non corripiuntur 271, 54.

quaternarij sunt, qui septimum, vndecimum, decimum, quartum dicuntur 206, 38. quaternarij ante vigesimum, critici 506, 29.

Quietis diurnæ atque nocturnæ ratio, non par 404, 38. quiete naturali nihil melius, nihil amicus naturæ 47, 60. molesta, nihil magis pestiferum 47, 61.

R

RAUCEDINES & coryzæ, decrepitis non mature scunt 437, 1.

Raucitatis author catarrhus 378, 36. raucitas, arteriz inæqualitatem ostendit, catarrho imbutæ 292, 58. 293, 37. 323, 57, 63. cum raucitate tussis, quid indicet 323, 63. raucitas cum tussi coniuncta, phthisicæ prænuucia vel confirmatoria 293, 7. cum tussi oborta; praua *μυρρινος* 378, 6. cum tussi, & aluo liquida; pus edit 293, 32. 378, 6.

Recidinarum tres causæ 504, 5. recidiuæ, ab iis veniunt quæ crisi subeunt ante diem, si cruda sit crisis 347, 24. Recidiuæ amica, qualia 221, 38. recidiua, vnde prior morbo 348, 52.

Recurfus omnis, quomodo fit 79, 42.

Redintegratio corporis vel humorum è natura egressorum, quomodo comparanda 370, 33.

Refectioni ubi studendum 83, 36.

Refluxus omnis, grauiissimus 236, 63.

Refrigeratio naturæ præcalidæ, aqua pota & quies 330, 7. refrigerationis eximiaz, quænam causa 202, 37. refrigeratio mortifera, quæ 32, 46. de refrigeratione, vide plura sub litera F, ad nomen *Frigoris*; & *Perfrigerationis*, sub litera P.

in Renibus, venulæ nudæ atque suspensæ 492, 58. renum virtute, liquor è venis attrahitur *κατὰ φύσιν*: vel contrà, eò cietur; aut sua sponte iniussus & concitatus, aut aliunde transmissus 509, 47. renes in diabete, auiditate sitis explendæ, summa vi, vrinæ materiam ad se rapiunt 537, 20, 21. in renibus, nondum *ἐκπορῶς* 434, 18. calculi coagmentatio fit de improviso 539, 23. renum lapidis coagmentatio, *καὶ οὐκ ἐκ φύσεως*, vesicæ, *κατὰ τὸν σπλῆν* 427, 25. 539, 37. renis occupati calculo & inflammari, cessat officium 539, 32. in renis alterius sympathia, vrinæ parcè & crebrò emittitur 539, 31, 32. renem empyema, in lumbos expressum, ipsos intumere facit 384, 4. renum aut vesicæ exulceratio est, si quis sanguinem aut pus meiat 364, 51. renum & lumborum dolores, vicissim se mutuo excipiunt 383, vlt. 384, 1, &c. renum dolor repente obortus, cum vrina suppressa; lapillos, aut crassam vrinam meiendo reddendam ostendit 539, 3, 4. 542, 59, 60. in renibus dolor acutus, motu calculi 539, 18, 19. grauis, mansio calculi 539, 18. in renibus, doloris grauis in peracutum, & peracuti in grauem, transitus esse solet 539, 21. renum epiphænomena nulla, quàm de vrinis, aut per vrinas 509, 18. renum incendium vehemens, ad se rapit quicquid serosi est humoris 522, 52. in renibus, quatuor morbi 383, 57. renibus sua est sitis 264, 21. renum sitis inexplibilis, portionem auidè rapiendo, ipsam in aluo & venis mitigari non sinit 510, 46. ren quibus socius languet effectus & marcidus, iis in sæua nephritide vrina supprimitur 539, 32, 33.

Repletio omnis, propria vacatione exoluitur 91, 49. repletioni debetur phlebotomia 213, 51. repletio nulla, cum maligna coniuncta cacochymia, alui profusio exoluitur 39, 27. capitis, ab excursu, quænam paraphorica 190, 28. à repletionem qui nascuntur morbi; vacatione sanescunt 482, 31.

Repellentibus interdicendum, ad inflammationem frontis arcendam à trãmare 212, 20.

Relapsus & interitus, vnde 44, 38.

Reliquiæ superstities, relapsus adferunt 68, 40. in hypochondrio superstities febris exinctæ; malæ 101, 39.

Resolutio quælibet, vbiam in propinquo 367, 51. parælectica, conuulsione sanescit 193, vlt. parælecticæ propinqua, an conuulsione sanescit 207, 26. vnius loci, conuulsionem facit alterius 84, 50. partis absoluta, conuulsam habet sensus & motus priuationem 193, 40. resolutionis in conuulsione transitus, melior quàm contrà 332, 21. resolutio vniuersalis, respirationem adimit, & propterea vitam tollit 276, 48, 56.

Respiratio, quid 147, 19, 48. vitæ focia indiuidua 427, 57. communis omnium vocalium animantium 147, 20. naturæ

20. naturaliter constituta, in quibus consistit 148,30. spiritus economiam bene aut male moratam esse testatur in usu, voluntate, & actionibus partium spirabilium 397, 18. respirationis usu & motu sublato, vita produci nequit in longum tempus 44,43. causæ finales, quænam 147, 44. instrumenta, duplicia 147, 61. respirationi prima laus debetur vitæ hominum conservandæ 148, 40. per respirationem est vita 372, 2. respiratione vita, vel ad punctum temporis, carere non potest 146, 37. in respiratione quatuor consideranda 148, 33. in aëre, certi gradus 147, 34. respirationis symmetria simplex & unica; defectiones multæ 148, 42. in respiratione, voluntas ab electione 147, 55. respirationis *πρωτεύει*, vbi cernitur 147, 49. species duæ; una libera, altera coacta & vim experta 147, 62. respiratio libera, vbi cernitur 147, 63. libera, quæ cordis voto respondet, vim eius vivificam multum augeat 451, 49. respiratio libera, & inculcata nutritione, vita hominum sustentatur 184, 18. libera suscipitur atque absolvitur *κατὰ πρῶταίρεσιν* 428, 24. liberæ, ad inspirandum, inseruit diaphragma 148, 3. liberæ, ad expirandum, seruiunt abdominis muscoli 148, 3. respirationis facilis & liberalis, mirifici fructus 146, 43. respirationis libertas, præclare ad salutem apparet & facit in omnibus morbis acutis 399, 34. libertas, gaudis potissimum & sibi, & foris, expetenda 458, 11. *ὁρμή*, vbi 147, 50. respiratio violenta, vbi cernitur 148, 1. respirationis violentæ inspirando, inseruiunt quaterni abdominis muscoli: expirando, bini abdominis muscoli 148, 5. respiratio, quando in vicio esse dicitur 148, 54. cum tollitur, vitalis officij vacatio est 372, 2. quomodo tollitur 372, 3, &c. respirationem, quænam omnino adimunt 233, 20. adimit vera cynanche, ductu spiritus intercluso 372, 13. adimit syncope, sublato spirandi usu 372, 13. adimit intercepto motu thoracis, apoplexia fortis 372, 12. tollit, pulmonis inflammatione, & thoracis oppressio 302, 28. ad respirationis angustiam, plurimum facit aucta in corde spirandi necessitas 425, 64. respiratio vnde planè asthmatica 428, 36. respirandi difficultas, vnde 180, 12. respiratio difficilis, frustra sufficiens, augeat 293, 11. in respiratione difficili, parua & crebra: graviora multo incommoda, quàm in difficultate spirandi crebra & magna 403, 44, &c. respiratio difficilis, periculosior à phlegmonæ partium spirabilium, quàm à crescente usu 403, 47. respirationis difficulter susceptræ, quatuor differentiæ 151, 5. respiratio in faucibus elisa, & intercisa vox, ut differant 144, 56. nuncia convulsionis 144, 55. respirationis frequentia, quid 149, 19. respiratio frequens, quid denunciet 149, 14. frequens & parua, vel ab inflammatione partium spirabilium, vel ab earum oppressione 233, 49. 267, 38. 282, 18. 321, 20. 354, 23. respirationem magnam edit partium spirabilium obedientia 380, 56, 59. respiratio magna & frequens, solius cordis incendio conflagratis, inseparabilis 177, 13. magna & rara, opposita parvæ & frequentis 149, 39. delirij proprium signum 149, 48. 150, 22. 380, 58. 470, 57. foras magna, intro parua; periculosa: sic intro magna, foras parua, 151, 17. *μικρὸς*, eadem quæ *πρόχειρος* 145, 21. minutula, cum in propinquo mors est 38, 1. moderata, quænam 148, 39. obscura, ad quid referenda 151, 50. mortis proxima 379, 7. respirationis obscuræ exempli, in verè hysterici 151, 54. parvitas, quid 149, 18. respiratio parua & crebra; partium spirabilium laborem, vel inflammationem denunciat 177, 12. 192, 38. parua & frequens materna, peius habet foris quàm matrem; & quare 451, 51. parua & rara, cōsecraria spiritus frigidi 150, 32. 428, 35. respiratione raram, & magnam edit dementia 380, 56. respirationis suspiriosæ difficultas posita in necessitate spirandi, & contumacia partium spirabilium 451, 43. respirationem tardam inspirando, edit cerebri & facultatis infirmitas 380, 57. respiratio tarda, quæ cernitur in lenta inspiratione, & properata in expirando; sui officij vacationem breui futuram denunciat 380, 61. tarda & velox, quænam 214, 40. tarda & properata, periculosissima 151, 38. respirationem velocem expirando, edit vaporis fumidi abundantia 380, 57. respirandi necessitatem febris adducit, dum æstu cor incandescit 451, 44.

Responsa paulisper protèrue, melancholica 41, 32. effera 31, 60. 41, 31. protèrue moderati hominis; mali sunt omnis 31, 39. 49, 24. 398, 3

Retractionis causa, partis empyreuma superstes 269, 5 qui Reuomunt subinde, sitibundi; malo sunt loco

501, 43

Rhachis, ex 24. vertebis constituta 192, 33. naturaliter constituta, est *ἰσχυρότης, ἰσχυρότης, καὶ ἰσχυρὸς* 293, 21. pro lumbis 330, 28

Rheuma omne vel concitatum, vel consistens 139, 63. rheumatis concitati anadrome quæ peripneumoniam fouet & augeat; periculosa 295, 13. concitati triplex causa 244, 41. consistentis contumacia in coquendo & expurgando, periculosa 295, 14

Rigor, quid 133, 6, 55. 73, 33. 221, 44. vnde 73, 41. 84, 57. quomodo fit 134, 6, 54. omnis, motu cietur 446, vlt. quomodo mouetur 1, 27. rigoris materia, intus foras protèrit, foris quæ suam excitat concussione 486, 2. vnus idemque index, qui & illius causa 529, 64. rigor omnis, cum frigore manifesto cietur 7, 22. nomine frigoris significatus 24, 6. rigoriferæ omnis causæ sensio, vbi primum apparet 7, 21. in rigore caloris vivifici afflictio vnde 136. rigoris concussio per afflictionem caloris natini, febrem accendit in corde 486, 2. rigor, febrium penè omnium comes 1, 25. sine febre nunquam cietur 277, 47. 486, 4. in febre tertiana, vnde 230, 56. quibus adest, supprimunt vrina 16, 30. 505, 15. 560, 3. rigoris significatio certissima, cum vrinæ suppressio incidit *κατὰ πρῶταίρεσιν* 535, 21, 22. rigor ut est vrinæ suppressæ symptoma: ita rigoris, vrinæ suppressio 534, 25. moderatus, vbi ciet liberalem hæmorrhagiam 22, 8. in dorso & ex dorso, quomodo differunt 190, 50. in dorso, ex appulsu cacochymia *κατὰ πρῶταίρεσιν* 190, 51. ex dorso, initium ducit ex proprio dorsi vicio 190, 52. in dorso, febris denunciat focum, non vbi fit, sed vnde cietur 190, 51. ex dorso, ipsam partem vnde venit, laborare ex causa dolorifica illic concepta, ostendit 190, 53. rigores qui sine villa parte afflicta sunt; è lumbis & dorso causas & principia ducunt 2, 16. rigorum ex dorso vis, quàm aliorum, grauior 8, 31. 129, 28. rigor dorsi ab empyemate, pestiferus 8, 39. rigoris occasio & origo, duplex 2, 11. 158, 40, &c. rigor omnis, aut à vasis, aut ab vlcerebus 171, 30. 186, 25. 255, 35. 280, 5. 320, 19. 369, 12. 447, 5. 470, 27. 530, 1. in rigore à vasis, distinctio est causæ ipsam cientis; naturæ merito, vel ut symptoma 470, 30. rigor à vasis, naturæ merito excitatur, criticus & periodicus 470, 31. vasis est symptomaticus, cum frustra cietur, nec vlla est vacuatio materiæ rigoriferæ 470, 39. rigoris crebra concussio in empyemate velut ergastulo 474, 62, 63. 529, vlt. 530, 1, 11. rigor, grauis cum crisi 198, 41. triplex, criticus, periodicus, symptomaticus 1, 27. criticus, vnde & quomodo excitatur 9, 60. 205, 41. criticus; sudoris & hæmorrhagiæ prænuncius; aliumque ciet deorsum & sursum 14, 17. 93, 3. 204, 55. 217, 48. rigores critici & periodici, ut terminantur 25, 10. rigores quibus sunt tum critici, tum periodici, abcessus raro iis sunt 528, 12. rigoris sudoriferi critici, ferè prænuncia vrinæ suppressio 523, 16. rigor criticus, semel tantum in febre acuta cietur ad crisin: nec recipit *κατὰ πρῶταίρεσιν* 475, 55, 56. 529, 59. criticus in febre ardenti, non, nisi cohibita sponte vrina, cietur 529, 60. causi proprium *κρίσιμον* 6, 47. sudor denūciat, quo quiescit causus 6, 50. in febre ardente, si loco apparet, cam oxoluit 2, 2. 6, 47. 60. in febre ardente, quomodo sanctus 6, 38. 61. 198, 42. rigoris periodici nulla prænuncia, nisi de specie ac periodo atque typo febris rigoriferæ 529, 62. rigor omnis qui bene fit, ac duce natura suscipitur; aut febris acutæ in totum, aut paroxyfimi diurni discessionem prænunciat 535, 27, 28. periodicus febris tertianæ, quomodo excitatur 535, 24. periodicus febrium intermittentium, nihil aliud nisi paroxyfimum denunciat 475, 53. symptomaticus, pessimus 130. quomodo excitatur 133, 2, 11. 13, 12. mortis præcursor 1, 10, 30, 31. non solum ab vlcerebus, sed & ab apostematibus in pus mutatis 255, 37. in rigore symptomatico, aphonia quomodo fit 2, 63. rigor symptomaticus empyematis, ab ichore stagnante frustra exortus, nouam adducit *πύκνωσιν* atque phlegmonem vbi cietur 416, 37. rigores ab empyemate, crebro cietur, semper symptomaticus 470, 27. rigor symptomaticus ab empyemate tromatis & capitis lauciati, mortem subesse testatur 369, 7, 14. ante diē septimum, malus 10, 2. rigores 6. diei, iudicii sunt planè sinistri 9, 51. 10, 5205, 40. diei 17. & 24. contumacia morbi denūciat 8, 33. rigoris & sudatiunculæ crebra vicissitudo, pestifera 8, 5. à rigore, in tremorem mutatio, mala 16, 4. rigores æstiuos, non nihil mortiferi 299, 48. ad rigoris inimicam vim pertinet rigendi frequentia 7, 56. ri-

gores crebrò superuenientes aphoniz, tremore oborto
quiescunt 15,52. crebrò cietur omnes *ἀκρίτως* 470,17.
qui crebrò cietur, *μετάσσει* faciunt materiæ rigoriferæ,
ad cor, diaphragma, & caput 2,45,7,5-117,37-190,57-277-
49-320,21,369,8,459,34-470,17. sæpe in morbis acutis
frustra cietur 212,45. qui crebrò cietur in acutis; pes-
tiferi 12,43. veterosi qui crebrò cietur, funesti 9,14.
rigor frequens in febris assiduitate, fractis iam viribus; pes-
tiferus 7,2,42,44,17-284,35,320,23-470,44. à rigore,
cum cephalalgia, vires prosterni; funestum 12, vlt. 16,11.
rigor, hæmorrhagiæ succedaneus; pestiferus 217,44.
mulieribus exortus à lumbis, inde prorepat per dorsum ad
caput 15,8,40-447,4. cicri non debet, cum in granditate
suppressio est menstruorum 458,35. omnis, cur grauidas
malè habet 458,34. in grauidis obortus periodicè aut cri-
ticè; sævus incòmodo cietur 458,36. obortus symptoma-
ticè, ab empyemate; securitatem vitæ adimit puerulo &
matri 458,37. partum in propinquo, accelerat 475,59.
puerperis exortus, febrium est symptomaticus non autem
criticus nec periodicus 447,6. rigoris lochia cohibentis,
in tremorem mutatio, mala 475,15. rigor *ἀνιδροτικός*, qui
13,43. cum opisthorono, necat 13,41,46-24,62,153,17,232,
14. cum opisthorono vnde mortiferus 332,19. rigores
tritaphyarum febrium, inordinati atque erratici 8,54.
15,38. incerti tritaphyarum, qui medio febris cursu ex-
acerbantur; valde maligni 15,22. rigor phreniticus acce-
dens, malus 9,34. à rigore qui perfrigerit, caputque &
collum doluerit; hi voce capiti, oborta sudatiuncula, vt se
collegerint, moriuntur 1,9. 507,55. cum rigore quæ si-
stuntur vrinæ, sunt prauæ & conuulsivæ 14,41. *τὰ νύκτα*
ῥυγίται, quænam: & quomodo explicanda 12,50,56. ri-
gentes crebrò, tremor superueniens necat 220,50
Rima, simillima saturæ 411,12. *ἡ ἐκ πύων*, quid 216,24
ἡ πύων idem, quod *ἡ ἀσπίς* 247,50
Rubor, sanguinis abundantiam designat 61,17.
phlegmones pathomonicum signum 115,8,334,33-265,17.
rubor & macies, planè *ἀσθενία* 278,25. 459, vlt. rubores
narium, signa liquidioris alui 136,12. ruboris ab vtero ad
sinum pudoris propagatio, illac futuri exitus materiæ pu-
rulentæ, signum ostendit 465,21

S

SALIVA, quænam secuta 223,14. salivæ albæ signi-
ficatio, vnde comparatur 135,35. multæ putris, & sal-
ix periculum, quomodo fit 311,27. quæ prorepat in omni
fastidio cardiacico, sursum *τὸν ὀπίω* denunciati vitiosi hu-
moris 502,8,14
Salsi & amari, affines sapores 293,6
Salutis non minora sunt argumenta in qualitate cor-
poris, quam in actionibus & excrementis 392,33.
salus dubia, certa desperatione potior 361,11. de-
sperata, vbi non sperabilis pepsimus 517,12. salutis despe-
rationem adfert quidquid morbum auget fouetque, &
vnà corpus facit infirmum 338,5. salutis ac vitæ ibi certa
desperatio, vbi vitalis officij proxima vacatio atque priua-
tio 374,1,42
Sanatio, quid 506,45
Sanguis, omnium succus naturæ charissimus 574,52,53.
humorum omnium utilissimus 514,61. est nectar viuifi-
cum quo partium omnium viuacitas recreatur & reficitur
83,20-205,13. in sanguine, vitæ focus 302,24. sanguinis
copia, vnde 211,35. sanguis vere augetur, vnde 344,41.
in motu est prima dici parte 404,61. sanguinis domina-
tu, homines tenentur manè 404,59. appulsu *καὶ ἔλθιν*,
gaudent carnes, vt eius fruuantur assimilatione 455,62.
non *κατ' ὅσον* 455,61. frigida humida portio; *ἡ ψύξις* 563,9.
sanguis serosior, aut natura, aut diæta 480,13. natura, in
quibusnam 480,14, &c. diæta vitio, quibusnam serosior
480,19, &c. maternus, per ymbilicum, purus ad fœtum
transmittitur 441,25. in infantia & pueritia, ad incremē-
tum simul & nutritionem absumitur 433,32. sanguinis
nulla redundancia in infantia & pueritia ibid. sanguis,
quibusnam ætatibus naturaliter fluit è naribus 344,39.
sanguinis profusum, in quibus cernitur 434,30, &c.
profusum nulla causa in ætate constanter 437,54. sanguis in
venis tantum, & corde, stabiliatur 203,49. sanguinis è cor-
dis sinu exclusio, viuifici nectaris paupertatè infert 290,3.
sanguis *φυλάκω* non habet nisi vbi habet *ἀσπερὺς* natu-
raliter institutam & consuetam 492,50. non alibi quàm

intra venas, incorruptus conseruatur 417,40. extra venas,
φυλάκω non habet 188,51,553,30. in venis aliquantisper
sub dio expositis, corrumpitur 417,41. è venis expressus cor-
rumpitur atque grumescit 188,50-417,40. sanguinis proprii,
grumescere 557,57. sanguis grumosus, non floridus est
nec lucens 569,13. grumosus, multum obscurus, nigricat
570,14. in amplitudine alui citò concrefcit atque grum-
escit 455,36. 492,48, &c. sanguinem, vt grumescat in
intestinis; commorari est necesse 557,62. sanguinei grum-
mi si nigrescunt; deterimi 557,60. sanguinis in vtero
grumescens, grauissima incommoda 455,38. sanguinem
multum grumosum fundere; lethale 557,52. sanguinis
profusio, varia 218,27. sanguinem profuere plus quàm
debet; malum 205,14-558,7. sanguis quibus sæpe & mul-
tum profluit, malefcit sunt alui: modò coctæ non sint
vrinæ 341,37. sanguinis nullius vacuatio in bonis du-
cenda; nisi eius qui tantum cietur è venis per nares,
aut per hæmorrhoidas 491,33. pepsimus, omnium
humorum mixtissimus 350,54. sanguis putus, si sero natu-
rali careret, in vitio esset 441,30. syncerus, sui seri expers
508,55. merus, est niger 492,40. merus, aliquando alie-
næ mixtionis expers 303,24. sanguinis perturbatio intra
venas, duplex; vna symptomatica; altera critica 533,5.
sanguine perfrigerato, corpus vt variè coloretur 385,44.
sanguis natura rubens, dum ardore nigrescit, colorem ex-
hibet puniceum 385,39. cuiusmodi tandem in fuerit,
qui sursum i. per os redditur, nihil habet securitatis
210,9. 218,28. 219,8. 289,56. 302,55. 303,28. 482,
22. 491,28. 558,14. sanguinis per os excretio nulla bona,
nisi fortasse, cohibitis mensuris, eius vomitio est per vasa
pulmonum 491,30. sanguinem per os effundendi con-
suetudo, pessima 303,26. sanguinis vomitio, vel è ventre,
vel è pulmone; apud Hippocratem 482,6. sanguis ex aluo
ruber aut niger, cum vomitu 289,30. ruber & liquidus,
de aluo exprimitur 492,47. sanguinis rubri vomitus
nihil à se mutari, opinionem facit aperta vel erosa venæ
in fundo ventriculi, vel in ore ipsius 492,53. copia in pul-
mone, vnde & quæ 309,26. sanguis qui è pulmone erum-
pit; floridus & spumans cum rufi 289,29. 302,60. 309,32,
45. sanguinis à pulmone manantis, quænam *τεκμήρια*
309,48. sanguis è thorace, parum bullatus, cum rufi at-
que dolore 289,30. narium, in cerebrum repulsus, con-
uulsionem & epilepsiam adducit 212,18. à sanguinis bile
perfusi transitu ad caput, hæmorrhagia vel delirium 110,
54. sanguinis biliosi ad caput anadrome, quando ibi sub-
sistit, nec foras emittitur per hæmorrhagiam; tum in pa-
rotidas mutatio est 520,14,15. sanguinem statis periodicis,
quinam profundunt 218,24, &c. qui statis temporibus
fundunt, si non profundunt, epileptici sunt, 212,19. 337,33.
456,16. aut symptomatis cerebri grauissimis exercentur
289,17. 314,38. sanguis qui è gingiuis exudar, insuper aluo
liquida; lethalis 577. meiendo redditur de improbitu,
rupta in renibus venula 492,54,55. sanguinem aut pus
qui meit, vesicæ aut renem exulcerationem ostendit 522,
1,2. sanguis liquidus, si confertim exit, tum in ipso pur-
gationis fluxu, tum postea ab assumpto medicamento;
malum 574,33. quomodo nigrescit 385,40. peior ni-
gro, non est 557,60. sanguinis purgamentum nigrum,
duplex; melancholicus succus, & atrabilis 558, vlt. 559,1.
sanguis niger, per hæmorrhoidas ductus; laude còspicuis
289,57. 491,32. sanguinem nigrum hæmorrhoidicis à me-
dicamento commoueri; promptum 574,41. sanguis ater
hæmorrhoidicis, multis commodis beat ægrotum; idem
deiectus, multis auget damnis 553,22,23. niger *ἡρόωδης*,
per alium transmittitur 492,48. niger sursum, specie
ipsa pessimus 289,57. ater, de vitio suæ stationis, mesaræ
vim adfert; & è venis egressus, intestina pererrat 553,29.
sanguinis atri iniussa deiectio, hepatis *ἀσπίς* denunciatur
553,26. sanguinis qualitate malè affecti, idcæ variæ 436,
61. vitiorem emendatio, posita in caloris natui virtute
548,19. sanguis vbi in vitio non est, *μήτε κατὰ τὸ πλῆθος*,
μήτε κατὰ τὸ πένος; nullum phyma enascitur *φλεγμονώ-
δης* peripneumonicum 433,36. sanguinem maxi-
mè corruptump, dolor & somni vacuitas 228,10. 369,4.
à sanguinis spurto, puris spatum, malum 290,6. 310,61.
sanguinem è diuerso fluere; malum 202,51. 565,40. incisa
effluentem vena, inhiemus, cum volumus 574,56,57.
sanguinis deiectionis capiendò delectu, ad quænam atten-
dendum 306, vlt. à sanguinis deiectione incipiendum,
vbiunque purgationis & phlebotomiæ necessariæ vfas
incidit

incidit 179, 49, 262, 7. sanguinis detractio, animi deliquiū attingens in febribus ardentissimis, totum repente habitum refrigerat, febremque extinguit 569, 36, 37. Sanguis non detrahendus ad omnem partium gravitatem 382, 43. sanguinis detractio ē propinqua, propria plethoræ vacuatio 212, 24, 213, 51. in sanguine detrahendo, vena secanda *κέρ* 179, 202, 60. sanguinis detractio, quibus in malis vnicum curationis *ἡγεμονικόν* 179, 45. sanguinis detractio, curationis *ἡγεμονικόν* ad retractionem rheumatis concitatur, & ad detractiōnem consistentis 181, 18. sanguinis detractio *κέρ* 179, *ἡγεμονικόν* curationis phlegmonarum systrophycarum 203, 46, 262, 5. tremorem sanat obortum initis febrium 76, 52. exoluit mala quæ ex dorso ad cubitum veniunt 157, 26. non confert, ubi nulla phlegmone 458, 7. quos offendit 387, 22, &c. sanguinis largæ detractiōnis, quænam incommoda 230, 64. à sanguine exhausto perit animalitas 426, 34. sanguinis detractio, cui refrigeratio prodest 216, 63. in torpida perfrigeratione, mala 216, 50, 371, 46, 389, 19, 474, 1. sanguine effuso, quibus est sudariuncula cum *trōmate*; gravissimum habent malum: vitamque finiunt voce capti, nec opinantes 465, 48, 49. sanguinis excretio solita, si iure & loco non fiat; aliò cursum inflectit, ut exitum habeat 323, 19. sanguinis per ventriculum excretio, semper mala, 491, 31. sanguinis quænam expulsiō; tabis consecrationem adfert 290, 6, 310, 60. expulsiō maligna tantum, pus edit 310, 62. sanguinis stillicidij causam adfert, quidquid vapore sursum effert, nec dissipat 317, 61. substillum quid denotat 215, 26. stillicidium nullum, in bonis ducendum 22, 15, 34, 65, 35, 1, 6, 81, 13, 15, 100, 34, 37, 132, 46. 206, 19. 210, 56. 211, 14, 215, 25, 292, 14, 544, 27. substillum quoddam in bonis ducendum 286, 54. 4. die, sperabilem crisin ostendit per hæmorrhagiam 7. die venturam 467, 51. stillicidia peiora, critico die expressa 206, 20. stillicidia nigra, critico die expressa: mortifera 206, 21. stillicidium ē naribus, die quarto; malum ē malis ortum 395, 36. stillicidia vndecimo die, difficilia 35, 9. 100, 41, 287, 4. substillum quò sæpius redit, eò peius res eunt 215, 11. substillum narium cum exiguò sudore frigidò, peiorem in modum exortum; pestiferum 372, 60. stillicidium cum torpore & sordiditate; mortiferum 211, 16. sanguificandi actio, ope & ministerio 4. facultatum inspicitur; attractricis, retentricis, coëctricis, & expultricis 321, 62. virtute & integritate hepatis perficitur 321, 62. sanguificatio, vnde naturæ votis responderet 322, 2. sanguificationis vnde labefactantur auxilia ibid. sanguificæ operationis frustratæ, & longæ, diarrhœæ quæ ventrem non adæquat in hydropo, causâ eadem 333, 24. sanguificæ operatio frustratur, sanguinis materia intercepta 333, 25. sanguificandi frustratio, duobus fit modis 328, 50. sanguificæ virtutis alienatæ duæ causæ; exolutio hepatis, & exhaustum frictu 329, 36, 37. sanguificandi operis alienatio, similiter non fit; ab impedimento, & depredatione functionis hepaticæ 322, 13. sanguificandi opere frustrato; seri, piruitæ, & flatuum perennis generatio est 328, 48. sanguificæ operationis frustratio, hydropum omnium veluti matrix 333, 28, 61. sanguifica vis, ab exhausto perit 329, 52.

Sapientiz vel desipientiz, quænam causa 28, 30.

Sapores amari, amarè denotantur 311, 52. saporibus amaris, proportione quadam respondent odores fœdi & graueolentes 311, 51.

ἡ δὲ ζανθὴ, idem quod *κακὸς δὲς*, *καὶ νοδὸς*, *δυσωδὲς*, *δομωδὲς* 311, 53.

Saryri, priscorum lingua, nominati *σι φαρῶς* 115, 52.

ἡ ζυμωδὲς, idem quod *ἡ ζυμωδὲς* 526, 30, 31, 33.

Scirrhus, per se, vel ex euentu 463, 24. ex euentu, quænam 463, 25. cur non dolet 463, 23.

ὁ σκαλυστικός, quid 56, 9.

Scopus omnium quæ sunt in medendo, qualis 162, 59.

συνωδὸς, quid 46, 55.

Scythæ facie fulvi atque capillis, vnde 545, 38, &c.

Sectio lapidis est in vesica, non in rene 437, 33. non faciendi in musculis temporalibus à chirurgo, in capitis pertusione 407, 31.

Sede quæcunque pelluntur, illa vel intestinum, vel hæmorrhoids capit 558, 60. sedis suppuraciones dolorificæ; alius perturbant 569, 41.

Segnicies omnis, vnde 9, 35. ex rigore, hominem apud se non esse ostendit 9, 47. à segnicie vèternosa & febre, periclitatur animus 401, 17.

ἐξαφύς, quid 91, 18.

Seminis essentia; esse quod est, ut aliud fit 420, 55.

causa, *πύξ* 511, 59. semen, est *ἡ ἐκείνου* ibid. inter semen, pus, & hypostasim albam nihil interest efficiendi virtute: sed tantum materiz capacitate 511, 57. semen, est animatum 420, 41. in seminis animati igne & aqua, fatalis portio corporis effingendi & procreandi 420, 41.

semen, sanguine non eget antè quàm absoluta fuerit fortis descriptio 479, 11. actu fit animal, perficiendo, non per corruptionem 420, 53. ex semine factum animal, est ens quod erat: sed non quomodo erat 420, 54. seminis ad animal, nobilior promotio, quàm panis ad sanguinem 440, 27. ex semine imperfecto, quod inchoatum est, idem manet 420, 56. quorum semen & spermaticus humor, temperamento & complexione non sunt naturaliter constituta; eorum sars in vitio est 480, 11. Seminis effluvia, recto cursu in vteri sinum illapsi, nec ad generandum concepti, æquè viri accidunt malo fatu, atque mulieris vitioso conceptu 480, 9, 32, &c. Semen non mutatur in partem spermaticam, sicut sanguis in carnem; sed à testibus pellicitur, procreandi causa 419, 26. seminis & partium inde natarum conditio, planè eadem 420, 57. ex semine quod perfectum est, si aliquid sui perdidit, expes est redintegrandi 420, 56. semen virile & muliebre, in viro & in muliere 445, 12, 479, 13. viri foemineum, si vincit virile mulieris, inde nascuntur viragines 445, 15. si vincit foemineum mulieris, inde mulier boni habitus, solida; & succi plena 445, 16, 17. mulieris foemineum, si ius habet in viri foemineum, indomata mulier, erit molliissima 445, 18. muliebre virilis complexu fruarur oportet ad generandum 479, 38. muliebre, ipsum per se, nihil gignit, præter parthema hystericum 479, 38. virile excipiendi, duplex impeditio 479, 42, 64. Seminis excepti, sed non concepti, signa 480, 5, &c. ibi non est conceptio, ubi vis eius prolifica non fouetur, nec excitatur ad *τὴν αἰσιν* 480, 55. concepti, nec dum descripti excretio; vera est *ἐκπορῆς* 446, 7. semen *ἡ ζωογονία* facillè corrumpitur, si aliò effundatur quam in matricem foemine consocialis 417, 38. quomodo corrumpitur 480, 56, &c. corruptum, è locis expirat ad cerebrum, auram venenatam 485, 38.

Senectutis initium aliquando 60. anno, aliquando 63, 437, 34, 438, 24. senectus ipsa per se morbus 175, 16, 306, 55. in senectute, neque excretio, neque abscessus sperabilis 79, 9. senes inedia patientissimi: mor homines constantis ætatis 436, 60. Seniorum natura, in excernendo pigra 540, 2. senibus, deorsum esse solet *μετακίνησις* 516, 63. senioribus bilis inclinatio ad icterum, vel ad dysenteriam 517, 1. senes facilius sanescunt à *trōmate* & ab empyematē 307, 20.

Sensus, à cerebro 393, 15. reapse semper in bonis 34, 52. communis, nunquam quiescit 52, 13. sensus quò plures labefactantur, eò deterius est ægro 42, 31. sensus hebetudo, quando apparet 367, 56. hebetudo qua sensus frangitur ipsorum sensilium, propria *ἡ αἰσθητικὴ* 367, 11. amissio, vnde 409, 7. sensu ipsa, propria *ἡ φαντασία* 367, 19. sensionis priuatio à delirio, insidias struit 470, 60. sensorium, vicinitate & societate affigitur 180, 34. Sentiendi vis amissa, reuocari non potest 571, 11.

Septenarij dies, quoniam 214, 1. septenarius primus, duobus absoluitur quaternariis 166, 11. septenarij, quaternarius prior indicat, posterior indicat 166, 12. septenarij post vigesimum, critici 506, 30. septenorum quartus index 214, 3.

Serum, vrinæ materia 532, 62. quod ad vesicam transmittitur, nondum vrinæ nomen habet, priusquam fuerit eò transmissum 434, 19. sanguineum, mire 514, 54, 55. minificatur ex facili 514, 56. mouetur *συνήθως* 514, 56. nihil facit *ἄνεως* 514, 56. virtuti naturæ primis periodicis facillè morem gerit 514, 57. serum, quia humidius & tenuius, pepasmi est difficilis 514, 61, 62. ab omni inflammatione exudare solet 181, 1. exudans in phrenitide, pye-lisum facit 181, 2. in pleuritide, siccam ruffim excitat 181, 1. serosi humoris, cum eius nimia est abundantia, triplex vacuatio, vna per aluum, altera per vrinam, tertia per sudores 505, 24.

Sexus vtriusque distinctio triplex, ab utroque semine parentis vtriusque 445, 13.

Signorum syllogisticorum ea insita & instituta conditio, ut ea semper subesse ostendant quæ indicantur ab illis 492, 3. signorum, confans & firma debet esse prognosifis

in sputi expurgatione, non est locus pharmacie cathartice 262, 8. expurgationes quæ conuenienter ducuntur; salubres 261, 10. in febre liuida, nigra, biliosa; omnes omnino male 261, 9. sputum sanguinis spumosi, vnde venit, & quæ ferunt 288, vlt. omne quod dolorem sanat, beneficium 260, 33. quod non sanat dolorem; prauum 141, 22. 260, 32. 289, 55. quoddam prauum 256, vlt. 257, 1, 2. in pectore strepitum edens, mortiferum 295, 54. mixtionis expert, album est 256, 49. sputi albi, rotundi, & glutinosi prauitas, ubi cernitur 257, 33. sputum biliosum, prauæ affectionis verum *ἐπιφαινόμενον* 262, 49. Sputa flaua, pauco permixta sanguine, in eunte morbo edita; valde salutaria 259, 60. prouectiore morbo minus habent securitatis 259, 61. sputum merè flauum, prauum, & signum affectionis prauæ 262, 61. 491, 1. glutinosum, signum perusti humoris ab incendio, & ardore quo pars incanduit 293, 12. in sputo glutinoso; tussis & doloris molestia, & irrita thoracis concussio 256, 29. Sputa glutinosa, praua; & cur 257, 28. glutinosa & salislaginosa cū raucitate; mala 292, 23. sputum glutinosum; difficili excreatione plus adfert detrimenti, quàm adimenti 293, 10. contumacia & partium laceratione, nocet 293, 13. sputum inhibitum & spiritus creber; mutuas tradunt operas 149, 37. laudabile & spei plenum, cui flauum exacte permixtum est 256, 49. liuidum, quid significet 260, 1. sputo in illo prauitatis summa sunt omnia, quod est quomodo maximè merum 257, 62. sputum ita meracum, vt nigrum appareat; deterrimū 141, 25. 490, 65. merum, nunquam conuenienter expurgatur 257, 15. in sputi meri expurgatione, nulla salubritas 257, 15. mucosi & fuliginosi, facili exitus 260, 20. Sputa mucosa & fuliginosa, pepasmi capacia 260, 15. sputum mucosum, pepasmo fit crassiusculum & meabile 260, 21. cum sputo nigro qui putulentum expurgant; desperati 288, 44. Sputa praua, nunquam in bonis ducenda 261, 7. sputi putulenti periculum, quomodo fit 311, 27. Sputa putria vulgò dicta, quænam 292, 62. sputi rotundi causa materialis & efficiens, quænam 257, 38. 312, 44. sputi rotundū, glutinosum, album, nihil habet vitilitatis 491, 1. Rotundum demeritis prænuncium 257, 37. 312, 43. salislaginosum, erosione nocet 293, 14. sputi salis quod ante, tussiendo expurgabatur, fatalis ad mortem suppressio 461, 28. sputumantis æqualitas, caloris vi contra naturam perficitur 512, 4, 5. Sputa syncera, praua 24, 40. in sputo renui, nulla expurgatio critica 256, 28. sputum valde viride atque spumans, periculosum 491, 2. Sputatores, qui 54, 7. Spyrathi caprarum deiectiones 560, 39. Squaloris nomen, ad cutim transumptum, à terra indurecente situm 568, 10. Squamulæ in cute assurgentes, vnde 568, 16. Stercora, in crassiore intestino stabulantur 355, 45. Sterilitatis quot idæa causarum; tot etiam remedium genera 478, 54. notitia ei tenenda vnde profecta sit, qui suis præfidiis vult pro ea fecunditatem inducere 480, 36. præfidia, in medici manu non sunt, nisi permissu auxilioque Dei 480, 38. Sterilitatis notæ sunt illis, quibus adempta vis est subeundi, vel irrigadi fundum hystricum 480, 22. quænam causæ 473, 9, &c. causæ multæ à viris profectæ, quæ non nisi à peritis medicis animaduerti possunt 480, 29. ab impotentia continendi & concipiendi semen virile; causa & ratio quænam 480, 49, &c. Sterilitas ab omento quod, in abdomine præpingui, claudit os vteri 417, 23. ad sterilitatis causam omnem, non prodesset sanguinis vomitio 482, 20. Sturnamentum, quid 272, 16. vnde 272, 17. vlt. fit 81, 30. ad cerebri concussionem pertinet 408, 38. exteros omnes morus concussiuos, concutiendo præcedit 272, 40. sturnamenti fortis commoda 272, 42, &c. sturnatio, laboriosè & indefinenter singultienti superueniens; morbum exoluit 27, 49. sctum excurit, cum piger est in exeundo 468, 62. noxia in pleuritide 248, 19. sturnamenti fortissima concussionem, pulmones lacerantur & inflammanur 272, 26. sturnamenti & catarrhi vis, pestifera omnibus qui ex pulmone laborant 272, 30. sturnando, non rarò defungimur magnis periculis quæ à rigore frustra citato inferuntur 459, 25. in Sternore, dyspnœæ summa omnia 370, 45. *ἡ ἀπὸ τοῦ σπύρεος* propriè, thoracis pars anterior 25, 63. per synecdochè, ea sterni pars quæ *ἡ σπυρεὶς* nominatur; & per metonymiam, orificium ventriculi 263, 4. Stomachus, præter cæteras partes, nervosissimus 232,

10. sensus accerrimi 196, 58. 198, 16. 299, 43. 324, 45. 356, 386, 63. 388, 56. 407, 47. 410, 34. 422, 26. 444, 7. 453, 49. 477, 1. 478, 30. 500, 35. 501, 21. cerebro, *συνταχόμενος*, quia *ὁ ἰσχυρὸς* 338, 2. 478, 36. 496, 40. Stomachi cum corde societas 175, 18. Stomachus, vulgò cor dictus 34, 23. Stomachi bene habita natura, tantum appetit quantum ipse potest coquere 214, 46. Stomachi dolore, cordis vitalem vim dissipari; non nouum 567, 38. in stomachi dolore febriculoso, aluus cum morsu priuorpta; deiectiones nigras prænunciat 381, 40. Stomachus quando lipopsychiæ est obnoxius 232, 11. mordicatus & laceffitus vehementer, concutit rigore corpus totum 573, 42. Stomachi quænam propria symptomata 410, 36. Strangulati, specie ipsa mortiferum 237, 59. qui strangulantur & exoluntur, necdū tamen animam exhalant; non restituntur ore spumante 372, 11. Strangulatio, febribus dominari, in faucium æqualitate, functa 36, 39. canina, vnde dicta 153, 44. Strangulus dolorifici, qui cum æqualitate faucium; à dolore capitis concitantur; mortiferi 387, 57. Strangulantium causarum, tria genera 153, 36. Stranguria, quid 335, 61. 364, 23. 384, 7. 385, 5. 540, 25. 26. in stranguria, vesicæ sphincter, similiter laborat, atque ani in tenesmo 364, 28. Stranguria, cui licenter proportionem, respondet 364, 23. omnis, vel in morbo, vel in symptomate ipsius vesicæ 335, 64. 364, 25. 384, 9. morbus; est exulceratio, vel coagmentatio lapidosa 364, 25, 49. Symptoma, est proratio quam facit triplex vniuersa materia quæ in vesicam confluit 364, 26. quæ accidit morbo vesicæ ab hydropse; terrifica 336, 7. quæ accidit symptomate ipso vesicæ, sæpe finem adfert grauissimorum morborum 336, 11. quænam non rarò critica & salutaria 364, 33. Critica profuit Thasis ad febrem tritæophyam 336, 27. crudelis in calculo 336, 2. Stranguriz & ilei, frequens adinuicem transfus 540, 48. Stranguriz ileus superueniens, 7. die perimit; nisi oborta febre, vrinæ fluxerit cumulare 364, 9. Stranguriosi homines inde non rarò fiunt, vnde sunt ileosi 336, 15. Streptus omnis, cuiusnam rei opinionem facit 413, 64. creber sonis minutulis 397, 36. Streptus intus, in quibus eduntur 307, 57. Streptus, intus foras ubi edūtur 307, 61. in Streptu pectoris, curationis desperatio 254, 60. *ἡ στρεπιδία*, idem quod *ἡ πύγνυδις*, Dioscoridi & Capironi 550, 23, 24. *ἡ στρεπιδία*, non tam cogendo, quàm circummagendo, videtur efficere *ἡ στροφέσις* 519, 56, 57. *ἡ στρεφίς*, vnde dicti 187, 26. à voluulo proximè absunt 187, 26. *ἡ στρεφίς* pro tormine, in vrinam non cadit 550, 26. *ἡ στρεφύλλος*, contrariam *τῶ διασπασμένῳ*, quod ad figuram attinet, non ad materiam 519, 60, 61. Strumæ, quid 437, 17, &c. strumarum, quænam origo 437, 24. quænam præfidia 437, 22. præfidia, quando in manu Regis Christianissimi 437, 30. Stuporis natura, quænam 34, 33. stupor modicus, dolorem lenit 34, 34. manuum, vnde 90, 4. Stuporis vtrouque cita mutatio; mala 34, 32. 35, 51. 367, 17. stupidi dolor, opinionem facit dimiauti pariter sensus & motus 367, 6. Subeundi impotentia, vnde 480, 25, 26. Suctio, causa digestionis 546, 3. suctionis causa, vacuatio 546, 3. sensus, causa ingestionis 546, 4. Sudatiuncula, quid 19, 57. 51, 52. 173, 43. nunquam naturæ desiderio responderi excernendo 117, 34. nulla videri potest critica 507, 60. est *ἡ κρισιὰ δὲ σπύρεος*, 22, 11. toto genere est symptomatica 507, 61. omni ex parte pessima 507, 48. duplex est; vel vniuersi corporis; vel capitis aut thoracis 3, 10. 19, 57. 22, 9. 25, 39. 101, 21. 204, 42. 297, 5. 505, 5, &c. vel vniuersi corporis, vel aliquarum partium, leui aut graui nascitur periculo; vt aliquate, copia, tempore, & exudadi modo apparet 505, 7. in toto cernitur corpore, cum pauco sudore tota compago est roseida 505, 6. in quadâ parte corporis apparet, ubi vis morbi firmiter fixa hæret ibid. capitis, *ἡ δὲ κεφαλὴ καὶ γὰρ ὁρᾷ* 30, 21. quomodo multa 453, 52. vtræque recidiunt non tantum capax, sed etiam mortis 221, 37. ubi, ibi morbus 297, 6. 507, 59. vel ab oppressione, vel ab exolutione 173, 13. 216, 34. 223, 2. incunte morbo, ab oppressione 278, 6. 325, 19. quam edit expressio, virium oppressione nara; longi est morbi 451, 7. in mitioribus morbis, per initia, ad diurnitatem apparet 210, 32. in acutis, ad mortem apparet 210, 33. febrium initia, ad diurnitatem apparet 230, 44.

morbo affecto, ab exolutione partium solidarum 278, 6. 37, 18. ab exolutione partium solidarum, mortem subesse testatur 204, 61, 45, 6, 8. quænam, signum empyematis, & cuius 7, 37. quæ terribilis 7, 8. sudatiuncula & horrois vicissitudo crebrâ; pessima 8, 5, 255, 41. 297, 3. 325, 10. sudatiuncula vitio, nihil posse adici videretur 507, 49. à sudatiuncula nemo vnquam febre defunctus absoluit 74, 10. sudatiuncula frigidior, mortem in propinquo esse denunciat 210, 30. cum sudatiuncula & somni vacuitate, crebrò exardescentes; malo sunt loco 25, 20. Epidemice, qui 3, 9, 19, 49

Sudor, quid 230, 40, 505, 11, 533, 19. in exultatione consistit 73, 34. inter morborum communia epiphænomena, & propria febrium acuturarum; omnium insit 504, 42. excluditur vel expressione, vel excretionem, vel exolutione partium solidarum 230, 41, 278, 13. bonus, aut malus, excretionis loco & modo 507, 61, 62. sudoris excretionis imperio, non alia materia quam vrina 504, 54. sudor, est *κρίσιμος κρίσις* 22, 11. sudoris optimi quænam *τὰ ὑπάρχοντα* 505, 37, &c. sudor optimus, qui ex toto morbum tollit 112, 29, 170, 48. qui die critico febre exoluit 504, 32, 506, 4, 55, 59. bonus, qui toto effusus corpore, planè ostendit ægrum alacrius ferre morbum 170, 48, 506, 62. sudores qui cum stillis vaporant; boni 507, 64. sudor vitilis, quinquam 506, 56. qui leuat 504, 33, 506, 59. qui bonus 506, 57. quomodo distinguitur ab optimo ibid. is multum habet vitilitatis ac securitatis, qui paroxysmum finit 505, 57. qui natura duce, conuenienter cietur; præclare ad salutem suscipitur 504, 44. multus & calidus, qui totam compaginem occupat die critico, & iam sperabili ante crisi; solus est omnium qui febre exoluit 506, 24. multus & calidus, mulierem grauidam fœtus trimestris, 14. die reddidit febris expertem 506, 25. à sudore multo & calido, ad 27. diem oborto, Abderita virgo vacationem habuit febris & furditatis 506, 26, 27. sudoris *ὑπάρχοντα κρίσις*; tum ea quæ faciunt vacuitatem febris, tum quæ ad ipsam apparent 506, 18. sudor is erit criticus, qui adferet finem febris, cum eius ratio critica omnis erit, in qualitate, copia, tempore, & excernendi modo 506, 34. criticus in febre ardente, à rigore, naturæ impulsu, per excretionem prorumpit 372, 35. est criticus, paroxysmis dierum imparium 506, 37. sudore crisin suscepam iri, cum in propinquo est, testatur vrina suppressio rigorifera, non nephritica 504, 52, &c. à sudore critico sanatio comparatur, postquam sunt edita signa pepasmi, & nuper coepit redintegrari naturæ 506, 44. sudor à febre prorupit, qui restituit cerebrum somnum conciliat suauissimum; bona crisis 378, 4. *δύσκριτος*, qui fuit in nulla sperabili discessionem morbi 56, 22. periodicus à rigore in tertiana, naturæ impulsu, per excretionem, prorumpit 230, 55. 372, 35. sudoris expertis lactatio cum frigore, diebus criticis, mala 23, 53. sudor ubi, ibi morbus 3, 10, 7, 9, 8, 4, 2, 105, 48, 278, 11. 299, 49, 569, 15. qui effluit symptomaticus, non est mouentis naturæ 504, 59, 60. isque vel virtute corporum exoluta exit, vel ardoris vi 230, 62. 504, 63. symptomaticus, vel per oppressionem naturæ exoritur, quem ciet expressio: vel opprem partium exolutio, velut roscidulum & miliarem, fundit 372, 36. aut nimiam abundantiam, aut recenteris potentia infirmitatem ostendit 505, 3. velut symptoma nimia abundantie prauorum in corpore humorum 504, vlt. sudore, quando exoluitur neruorum contractio 232, 15. sudore sistuntur vrina 505, 13. sudor frigidus, numeros omnes absoluit sudatiuncula 507, 48. pessimis ægri rebus apparet 507, 51, 82. duplex, vnus in febre acuta apparet, alter in febre remissionis participat 507, 3, 29, 46. in acuta febre, lethalis: in repida, morbi est diuturni 507, 20, 32, 33, 36. 508, 9. si exitu pigro velut miliaris exudet, prauus 507, 45. ac circa caput & collum solum exudans, prauus 504, 33, 507, 45. iam qualitate prauus, multum adiecit prauitati ac maleficio, excretionis modo & loco 507, 44. gelidus, caloris natui extinctionem denunciat 25, 14. paruus, non est criticus 25, 13. furdorem in opisthotono esse mortiferum, nulla æquitas 232, 14. sudor frustra cietur, cum manet egressio visceris in sua phlogosi, aut venenata qualitas crudi humoris morbifici 506, 45. qui non effluit, sed exudet, sudatiuncula nomen habet 505, 5. sudores in omni resolutione qui sensim exudant, conferunt 372, 50. confertim verò prorupti, nocent 372, 50. sudor si cui effluit multus post diuturnum alui profluuii, biliosa vomiturienti & cibos a-

uersant; repente interimit 574, 13, 14. qui vnâ cum febre incidit, si est acuta; pestiferus 508, 13. exortus incunte febre acuta, signo & causa pestiferus 508, 52. sudore exiguos qui madent cum febre, in metu sunt mortis 25, 34. sudor febrienti superueniens, si febris non quiescit; malus 19, 52. miliaris, quid significet 40, 51. sudores miliares ac solum circa collum; pestiferi 507, 64. sudor omnis qui tantum occupat caput & collum, tamen si non frigidus, semper in malis ducitur 507, 53. qui tantum occupat caput & collum, ad syncopen mox adfuturam apparet 507, 54. quinquam enascitur partium exoluta virtute & emortuo calore natus 507, 50. sudore diffuentes sæpe & multum, in febre horrida, miserandi 9, 2. sudor cruentus, vnde 141, 4. in sudore, sanguis non detrahendus 216, 47. sine sudore qui iniudicatò perfrixerint; malè vexantur 23, 54. Super, ad methodum pertinet examinandæ rei quæ in quæstionem vocatur 291, 39

Supercilium, quid 430, 12, &c. supercilio vulnerato cicatrice obducta, visu hebescent, vel etiam occætantur, vnde 430, 2

Superficies cuiusque corporis aspectabilis, vnde 126, 14. cuiusque corporis, veteribus Pythagoreis, *ἡ ποῖα* 411, 32, 454, 27, 524, 7

Superrigere, vel rigorem indicat superuenientem; vel crebrò rigorem repeti 563, 53, 54. Supinum iacere quid 399, 60, 64

Suppuratum, quid 60, 47, 236, 8. medium inter crisin salutarem, & desperationem 261, 38, 262, 43, 270, 15, 279, 41, 462, 30. crisis tumorum contra naturam, secundum *διαφύσιν* experenda 167, 39. suppuratio; virtute tantum fit caloris natui 298, 41. suppuratum, nunquam à phlogosi 175, vlt. Suppurati omnis ratio incunda, tum ex humore morbifico, tum ex parte obfessa 281, 50. in suppurato, medendi occasio arripienda, ex dierum criticorum obseruatione 280, 55. suppurati non tanta renso, quam phlegmones crudæ 280, 10. in suppuratū phlegmones mutatur signum sylogisticum, grauitas acerbis doloris succedanea 280, 9. in suppurato, cur grauitas percipitur 280, 11. suppuratum non omne in bonis ducendum 140, 12. quodnam, laudabile 265, 28. laudabile, nihil aliud quam ipse pepasmi 200, 45. non tam citò fit, vt sit & appareat incunte morbo 245, 1. omni ex parte debet esse purulentum 245, 3. candore, leuitate, æqualitate, quid denoret 117, 25. suppurati prima laus, quibus abscessibus deberetur 264, 61. quænam bona conditio 283, 2. suppuratio bona non sperabilis, quæ ex mera bile conficitur 262, 54. suppurati primus modus, qualis 255, 32. qualis secundus 255, 42. suppuratio aspectabilis, omnem auertit suspicionem palindromes 237, 12. suppuratum quod in occulto latet, non nisi à sciente animaduerti 171, 20. suppurati à mentuorum suppressione, signa quænam 200, 31, &c. suppurati ex pleuritide, signa 63, 8. suppuratorum quæ sursum sunt; alia in tunica stibularum collecta, alia in visceribus diffusa 283, 44. in suppurato, quando periculo locus 255, 22. quod suppurat omne, metuit reuerti 512, 32

Surarum sympathia cum partibus nobilissimis 17, 57. Surditas, quid 108, 55, 61, 495, 8. vnde 94, 40, 208, 25. symptoma est cerebri 57, 30. duplex; auditus interceptio, vel priuatio 210, 62, 297, 20, 355, 54, 495, 20. eaque firma, & leuiter pertulit aut fugax 108, 8. firmæ fixæ; duplex; vel in facultate audiendi, cum febre acuta; vel in vitio instrumenti, & febris expertis 108, 8, &c. fugax, duplex; in quibusdam critica; in aliis symptomatica 108, 14. à calidis & frigidis humoribus 36, 14, 90, 31, 448, 61. cephalalgici crudoris secunda soboles 92, 34. signum salutis sperabilis aut desperatæ 208, 9. de non percepto impulsu *τὸ ἀνεύσιν*, signum citò venturæ mortis 495, 17, 20. in febre, aluum sistit 108, 49, 114, 4. 208, 45, 297, 24, 460, 45, 495, 28, 562, 41. surditatis causa in febre, quæ 109, 5. surditatis & alui suppressæ, successio mutua 109, 9. surditatem à febre naram exoluit alui profluuium 109, 7, 114, 4. 208, 50. surditas, biliosa profluuium sistit 568, 55. per translationem biliosi humoris; & tincta bile vrina, *ἀσπύρις* 112, 36. deiectionis cruentæ non est *τελευτή* 297, 30. quæ cadit in empyicos, cruentam excretionem denunciat 297, 11. in empyicos, vnde 297, 26. cum comare, parotidis prænuncia 297, 37. quænam hæmorrhagia 111, 49. quænam phrenitidi sternit viam, atque insaniam 495, 11. insaniam ab exhausto *ἐκπνοῆς* 478, 27. quænam furiosa 115, 50. quænam

quænam sancta 208, 33. morbi acuti & turbulentæ con-
fectaria 42, 32, 110, 48, 208, 34, 478, 26, 495, 18, 19.
surdastri, vnde 98, 19

Sursum sunt nares & oculi 169, 20

Suspensorum causæ omnes, ad pulmonum contuma-
ciam referuntur 59, 14. suspensio homines, vnde 149, 30
Summa omnis, rimosa & aspera 406, 48, 411, 12. futuræ,
speciem gerunt fissurarum 411, 13, 44, 412, 14, 413, 7. fu-
turæ omnium, eodem non sunt loco 407, 12. futurarum
tumata, specie & idea, alia quàm exterorū capitis ossium
406, 23. futuræ scilicet fissura, in pari casu ponenda quo ce-
rebrī concussio & vulnus 411, 50. futuræ impressa fissura,
nō nisi à sciente animaduerti potest 412, 9. futura telo in-
cisa, quantumvis acuto, fissuram habet cōiunctam, & con-
tusionem 406, 28, 410, 1, 412, 26. futuræ, modiolus non
admodum 406, 53. in futura qui secantur, non raro
humī procumbunt apoplectici 406, 56

τὰ πρὸς, priscis medicis, epiphytes palpebrarum, foris
& intus pullulantes, visioi maximè officientes 128, 54, 55.
Galeno, allurgentes verrucæ 128, 56, 499, 59

Sympathia facilis & mutua τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν περικύκλῳ
126, 48, 224, 43, 285, 2, 475, 18. per sympathiam afficiun-
tur vicina, & quæ generis eiusdē 7, 40. sympathia triplex:
quia congener, vicinū, & socium 57, 8, 172, 21, 430, 15.
sympathia, in societate officij, magna vis 539, 31. sym-
pathia nulla, causam deducit morbosam 386, 6. à sym-
pathia, in idiopathiam transiit 172, 44, 270, 7. sympa-
thia nulla mala, priora exolunt 191, 36, 289, 46, 335, 37.
422, 16, 499, 40, 551, 26. sympathia omnis per ἐπὶ τοῦ σώματος,
sursum deorsumque mouetur κατ' ἕξιν, non ἀνάπαλιν; nisi
cūm est orgasmus 416, 40. magna cerebri & diaphrag-
gmatis 172, 20. maxima cerebri cū ventriculi ore 172, 21

Symphysis vera, quænam 418, 14, 19

Symptomata omnia, partium obsessarum & humoris
morbifici propria 26, 14, 423, 22. quæ bona 558. bona,
quomodo significata ibid. omnia, tam quæ intrinsecus
enascuntur, admittunt adolescentia & iuuentus 436, 45,
52. symptomata & signa mala dierum criticorum, firmio-
ra quàm aliorum 45, 52. omnia ἐπὶ τοῦ σώματος, magnarum
affectionum & auctarum consecraria 27, 53, 180, 16. nul-
la quæ per sympathiam incidunt, leuationem adferunt pri-
migenitorum malorum 331, 57. per translationem sym-
ptomaticam orta, indigenis longè peiora 129, 36. sym-
ptomatum subinde nascentium ibi vacatio esse solet,
vbi cessat eorum solita generatio 482, 11. eorum frustra
tentatur leuatio, quorum inexhausta manet perennitas
342, 33. in symptomaticis magnis quæ à pessimis ortum
habent, redintegratio nulla esse potest 350, 37. sympto-
mata quæ nec vale dicunt, & continenter accrescunt; ter-
rificata 341, 60. quænam per anadromen, à rigore frustra
oborto nascuntur 12, 6. è symptomaticis, crebra sæpe na-
scitur opinionum varietas 254, 22. symptomata multa ex
eodem fonte oriri, nouum non est 337, 1. symptomaticis
eiusdem, morbi multi 361, 61. symptomata capitis reple-
ti; cephalalgia, paraphorica, catarrhoica, cataphorica
166, 36, 189, 53, 228, 37. καμπτὸς δὲ, raro in febres acutas
incidunt 363. symptoma omne cataphoricum, vbi con-
sistit 90, 33. symptomata paraphorica, in cerebro facillè
excitantur 291, vlt. quænam citæ mortis & iamiam ven-
turæ argumenta sunt & causæ 337, 55

τὸ συνάγωμα, coagmentatio calcinosa 383, 54

Synciput & bregma; eadem 411, 41. synciput, omniū
cephalicarum partium acerrimi sensus 93, 64. synciput,
omniū capitis partium, capacissimum 94, 1. syncipitis
petrui motus, celerior atque mutatio, quàm cæterarum
capitis partium 414, 57. synciput lauciarum, periculosius
habet ægrotum, quàm occiput 406, 33. syncipitis fractura
pari specie & idea quæ in occipite curationem recipit, fa-
talis ad interitum 406, 37. syncipite laeso mortiferè, vitam
finiet lauciarus die septimo 406, 39

Syncope, quid 33, 34. cordis propria 131, 49. in qui-
bus consistit 131, 50. respirationem admittit, sublato spi-
randi vsu 233, 22, 372, 13. absque syncope moritur nemo
424, 56

τὸ συνεχές, propriè quid 12, 52. τὸ συνεχές, idem quod,
τὸ συνεχές; quidque significet 44, 16

Syntimorix maleficæ causa ipsa, epigenesis 337, 48.

σύντονον nihil, quod adiunctum non habeat τὸ ἀλλοτρίον
107, 18. τὸ σύντονον ἀλλοτρίον, quid significet 191, 27
σύντονον, propriè nectar viuificum 146, 57, 186, 53. syr-

rhoë viuifica, in sanguine & spiritu continetur 147, 8.
syrhoë vitæ cōseruatrix, nutritrix & respiratione perfici-
tur 147, 16
αὐτοσφραγίς; quales 140, 2. fystropharum omniaum
curatio vnde incipienda 140, 4

T

TABES, quibus ætatibus maximè familiaris 89, 14.
290, 5. tabis signa, labores horiferi cum suspitioso
anhelitu 186, 31. tabes, tum à ruptione venarum crassa-
rum, tum à catarrho è capite 293, 52. tabis differentia du-
plex: vna in pulmonis vicere; altera in vasis ruptione 293,
48. tabes ab vlcere pulmonum, τὸ ἐπὶ τοῦ πνεύματος familiaris
271, 55, 293, 49. à vasis ruptione, in quibus hæmorrhagiæ
commotis carentibus, familiaris 293, 49. tabis conse-
cutionem, quæ à sanguinis exputio adfert 290, 6. tabes
empyemati succedanea, non tam citæ mortis quàm or-
thopneæ 299, 63. particularis, quid 79, vlt. tabidorm
oculi caui, humiles, ac demissi 496, 61

τὸ ταχὺ καὶ ταχέως; brevis est internalli 496, 49. τὸ τα-
χέως, idem quod τὸ αὐτίκιν 124, 62, 256, 37

Tactus instrumentum, terrestre 124, 23

Tæniæ, fasciæ similes 174, 54, 218, 5. Tæniarum ge-
neratio, vbi 218, 4. tæniæ, toto ambitu sunt intestino-
rum 547, 18. bulimo potius indicantur, quàm tormini-
bus 174, 55

τὴ ταραχὴ; absolute dicta, mentis perturbatio 82, 43.
172, 38, 292, 1, 453, 43, 478, 22, 531, 46. τὴς ταράξεως descri-
ptio 338, 42. τὴ ταράχην, certissimum argumentum iamiam
futuræ dementiae 172, 39, 478, 24. τὴ ταράχην τὴς κοιλίης,
deiectionum est nimiarum 159, 60, 246, 19. τὸ παράπλη-
verbum apud Galenum, aliquando non modicam indicat
deiectionem, sed nimiam eius abundantiam 438, 45
τὴ τὰς, sæpenumero per sympathiam 95, 11. τὴ τὰς
καὶ ἡ λύσις, ἀσύστατα 144, 10

ταυρόματον, vnde 131, 9. ταυρόματον, αὐτομάτως, ἀπὸ ταυ-
τομάτης, synonyma 131, 10, 11. oppositum τὴς προαιρέσεως
131, 11

ad τεκμήριον plus conferunt τὰ τεκμήρια, quàm τὰ ἀκόσμη-
285, 8. & τὰ ὁμοῦ, quàm τὰ ἐτεροῦ 285, 9. τὴ τεκμήριον
ad vitæ prælagium, quomodo certa comparatur 285, 12.
ad interitus præfensionem certa quomodo comparatur
285, 14

τὰ τεκμήρια, nunquam à se mutantur siue ad malum, si
bona sint; siue ad bonum, si praua 260, 53, 57. quænam
bona in causis 260, 59. quænam in signis 260, 58

Temperamenti ius est & imperium in complexionem
322, 30. temperamenti & complexionis mutatio, quam
senectus inuexit, irreparabilis 175, 13

Temperici cōseruatio, à icore 571, 21. Temperies;
nomine τὴς πλεονείας expressa; insidiosa 376, 64

Tempestas pestifera, qualis 36, 1

Tempora; quænam ὁράται ὁρατοί 23, 12. tempora
cur malis grauissimis obiecta, tam intrā, quàm extrinse-
cus 407, 21, &c. collapsa, vnde 122, 4. in temporibus,
facillima omnium cerebri sympathia 407, 24. crudelis-
sima cephalalgia 407, 23. mitiori icui nō, tam resistitur,
quàm alibi telo ingenti quod valide vires contorquent
407, 24. quæ à tromate inferuntur mala; grauissima
407, 26. tromata insanabile, cuius alibi sperabilis foret sa-
natio 407, 25. tempora quibuscunque præciduntur, con-
uulsio incidit è diuerso partis præcisæ 406, 12. in tempo-
ralibus musculis à chirurgo sectio non facienda, in capitis
perfusionem 407, 31

Tendo, quid 418, 64

in Tenesmo, ani sphincter similiter laborat, atque vesti-
cz in stranguria 264, 28

Terra qualis arboribus, talis venter hominibus 121,
28. pinguis, vnde hinc 134, 29. sicut indurefcens, ri-
mis multis finditur, & hinc redditur 568, 11

de Tertiana, vide ad nomen Febre, sub litera F.

Testium descriptio 396, 39, &c. per testes, caloris na-
tūi amplificatio, vox plenior 396, 41, 42. testes quomo-
do contrahuntur 396, 47. testes & pudenda contracta;
seuos dolores denunciant, & conuulsione mortiferam
396, 29. testis cūm intumescit à ruffi, memoriam reno-
uat societatis, pectoris, mammarum, genituræ, & vocis
396, 37

Tetanus, contractio est qua ceruix obrigit, restaque
& intensa manet immobilis 231, 18, 30. in dorso & lumbis

etiam exoritur 231, 21. Celso rigor velur necrum quoddam emprosthoni & opisthotoni 231, 28. non raro cadit in febrem acutam 401, 5. in tetano, symptomata quodam funestissimum 231, 53. tetanus, cito vires effectas reddit, & acerbissimam inferit mortem 232, 23. *θεῖον*, principatum obtrahit causarum omnium, tam efficientium, quam expicientium 454, 28. numeris non absolutum, sed verbo Dei 438, 64. *τὸ θεῖον* potentia, in natura potissimum elucescit 454, 29. *θεῖον*, coloris arque naturæ summam ins habet 454, 28. in quibusque morbis accuratè discendum & prævendum 244, 37. *θερμότης*, & *ἡ θερμότης*, secundum naturam dicuntur 278, 36. aliquando idem quod *πυρεθρὶς* 278, 35. *ἡ θερμότης*, pro calore narium 278, 37. aliquando idem quod *πυρεθρὶς* 278, 35. *θερμότητα* foris admodum, tetanorum, rigorum, consulsionum; *πυρεθρὶς* 467, 14. *θερμότης* idem quod *θερμότητα* 227, 46. *θερμότης*, *Φίλον καὶ κρῖνον* 227, 53. *τὰ θερμά*, pro vermibus 174, 58. *τὰ θερμά*, vlce-
ra depalcencia 148, 27. *ἡ ὁδὸς*, quid 21, 40. 125, 26. Thoracis pars anterior, ossibus septem contexta 195, 26. hominum priscorum amplitudo maior, quàm huius sæculi 275, 12. angustia, vnde 292, 37. à phymate luxatio crebra in partem posticam 425, 53. vulnere cur gra-
uia 417, 15. *τὴν*, coniunctum cum nominibus deriuatiuis, vel af-
fectionem perexiguam, vel rarò incidentem denotat 198, 34. 211, 10. *ἡ ῥῆσις*, aliquando *ἀντιπρὶς ἰχνην* 451, 58. *ὁ τόπος*, partus perfectus 442, 18. 445, 31. 54. 452, 40. pro abortione, *καταχρηστικῶς* 452, 39. 468, 60. *ὁ τόπος*, nerui medullares, pro ligamentis 192, 43. Tormina propriè sunt intestini sursum reuulsi 344, 5. vnde 187, 29. 353, 41. 397, 52. torminum alui & phthicos fons idem 346, 10. in torminibus dolorificum malum foras non exit, vt in dysenteria 344, 6. tormina sæua à flatibus aluinis subsistentibus, in hydropem siccum abeunt 197, 35. 329, 30. 397, 53. Torpor per *νέκρωσιν* facultatis animalis; lethalis 9, 43. in torpore graui & frigido, sanguis non detrahendus 389, 26. Torquetur per id, per quod quis peccat 374, 55. Transitus *κατὰ λόγον*, ἢ *διαδοχῇ* 191, 23. *παρὰ λόγον*, ἢ *μπαρὰ* 191, 24. naturæ magisterio susceptus, & ad op-
eratum finem perductus; morborum tutissimum medicus 191, 22. intus foras, melior quàm contrà 194, 6. per transitum qui morbi fiant 190, 55, &c. Translatio & excursus omnis qui exitum non habet; terrificus 41, 16, 17. symptomata, quænam mortifera 60, 6. *τὸ τραῦμα*, vulnus tantum significat 225, 46. Tremor, quid 72, 20. 76, 45. 95, 22. vnde 48, 58. neruorum principij læsio 57, 30. 408, 49. tremoris omnis natura in virium imbecillitate 33, 21. tremor, pro rigo-
re qui concutendo dicitur 539, 57, 58. totius corporis, vnde 56, 4. tremoris malum tolerabilius quàm consulsio-
nis 224, 35. tres causæ; oppressio, spirituum collectio, & virium exolutio 95, 24, 25. tremor ab exhausto, sympto-
ma cerebri alienati 51, 21. 380, 40. qui ab oppressione fit, quomodo delirium adfert 17, 3. leuis, in subsultu & ge-
stificatione manuum, lingua tremula, & dentium colli-
sione à delirio 37, 12. symptoma cerebri post alteratio-
nem magnam alienati 37, 6. tremor leuis, & vomitio æ-
ruginosa, desperatis; mortem prope esse denunciat 36, 54. tremor vbi incidit per initia febris, sanguinis detractio ne-
cessaria 15, 64. 33, 20. 95, 30. 190, 8. perit ad cadit in febres
ardentes 72, 22. tremores, ardentium febrium sympto-
mata propagata 72, 10. in febribus, deliriorum prænun-
cia, vnde 228, 55. tremor, delirio qui superuenit 43, 54. de-
lirio superueniens, planè funestus 72, 18. extenuato pri-
dem, sponte nunc natus, exolutionem facultatis anima-
lis confirmat 572, 42. fanaticorum præsentem mortem
interrat 95, 6. egregie phreniticorum, citam mortem
denunciat 55, 19. à siccitate natus, immedicabilis 380, 45
de Tristophya, vide ad nomen *Febris*, sub litera F.
τὸ τραῦμα, quid 225, 39. 48, 368, 36. quodammodo ge-
nus omniū rerum violentarum 368, 29. *τὸ τραῦμα* &
phyma, vt differant 398, 33. pro vulnere 305, 52. à

tramate conulso exorta; mortifera 305, 51. 421, 19. in tramate febris exorta, post 7. diem æstare; post 14.
hyeme; ad interitum, fatalis 369, 19. in tramate qui
prorupit sanguine perhorrescunt; granissimum habent
malum 319, 40. tramatia mortifera signa 369, 20, &c.
τὸ τραῦμα capitis, qualia 105, 59. alia temporum, alia fron-
tis, alia syncipitis, alia occipitis 406, 24. tramatium ca-
pitis terebrando, curatio cito incunda 279, 51. tramatia
capitis symptomata per epigenesin propagantur quædam,
per metaptesin alia 368, 39. cephalici grauiora *τὸ τραῦμα*
capitis, quàm cæterarum partium percussura 422, 58. à
tramate si cui bilis vomitio est, malè est: idque potissi-
mum à cephalico 422, 3. 425, 7. trama capitis quod-
nam & cur mortiferum 369, 13. tramatia futurarum,
specie & idea, alia quàm cæterorum capitis ossium 406,
23. trama quoties iure sectionem requirit, ei tamen
vbiuis partium non est locus 407, 16. Tuberculum, quid 262, 21. tuberculi lumboslu-
xantis causa, sanguis 350, 51. tuberculum lumborum, sanat
dysenteria diuturna 343, 35. tuberculis si corpus obitum
est, cum excretionem biliosa, intus ægrotat 392, 23. Tumor, quid 164, 35. tumores omnes exoluntur
diaphoresi aut suppurato, aut gangrena & scirrho 139,
51, 52, 54. quicunque, fluente alio, dolenter affurgunt,
mali 566, 51. quinam optimi 170, 60. hoc ipso quòd
duri & dolorifici, phlegmonici 566, 58. 575, 13. duri ac
dolorifici, facilius in suppurationem vertuntur, quàm
molles 167, 61. dolorifici cum signis & causis flacce-
scentes, salutare 117, 54. dolorifici qui iniudicatio flacce-
sunt, mali 117, 15, 54. 479, 22. tumorum mollium
& doloris expertum, tardi morus 167, 25. tumores
ventris, vbi idem quod *τὸ ἀλγύματι μετώρῳ* 168, 12. in
visceribus celerius suppurant, quàm in epigastrio 167, 62.
168, 31. Tunica inflammata propria punctoria acerbitas 587,
vlt. tunica costis interta, difficilis coalescit quàm caro
305, 54. linguæ, asperæ arteriæ communis 56, 3. inte-
rior ventriculi, communis linguæ, palato, ori 56, 53.
223, 10. 469, 20. 500, 63. Tussis, vnde 180, 9. ad thoracis arque pulmonum
concussionem pertinet 408, 28. perennitatem catar-
rhi, in fauces & arteriam prolabentis, offendit 193, 38.
378, 30. tussis, sitis, linguæ asperitas, à somno solent
exacerbari & irritari 328, 12. comes hepatici vicij quod
hydropem facit, vnde 334, 13. tussis hydropi aduenien-
tes, mortem subesse breui restantur 334, 11. tussis in pe-
ripneumonia, vnde 282, 21. tussis cum ptyelismo, pa-
toridas adæquant 36, 23. 117, 51. 335, 15. tussis cum raucita-
te, quid significet 323, 63. tussis ferinæ author catarrhus
378, 36. tussicula, signum syllogisticum catarrhi è fauci-
bus in laryngem 323, 60. à tussicula leui ac leuiter prori-
tante, sitiendi causa, vel in ipso causo infringitur 474, 27.
tussiendo crebro & frustra cupiditas, materiam expectora-
bilem ed trudit & sistit, vbi est focus morbi 278, 8.
de Tympania hydrope, vide ad nomen *Hydropis*, sub
litera H. Τυφωμαρία, veteribus quid 100, 7. *ἡ τυφωμαρία*, mon-
strum biceps, vnde 224, 14. 285, 23.

V

VACUATIO, causa suctionis 546, 3. ex vacua-
tione qui gignuntur morbi, repletionem sanescunt
482, 31. vacuatione propria repletionis, conuenienter
exoluitur omnis affectio ex repletionem 202, 6. vacuatio,
propriū remedium oppressionis à suppressione natæ 33,
22. vacuationum inclinationes sunt, vt natura & hu-
mores cursum inflectunt 31, 34. vacuationes sic moliri
oportet, vt est inclinatio rerum molestarum 382, 62.
vacuationum sæpe tot genera, quot repletionis foci 230,
49. vacuatio omnis lege naturæ, sursum deorsumve
commota, multum & raro debet cieri 191, 60. vacua-
tionis, naturæ imperio susceptæ, signa 39, 34. vacua-
tiones edi *κατ' ἔξιν*, in nulla meatuum euentia, bene:
ἀνάπαιον verò malè 341, 23. vacuationis iniussa, duplex
omnis consideratio 363, 40. vacuatio iniussa, vnde
145, 51. humorum qui merè sunt flauis, æruginosi, aut ni-
gri; ope catarrhici, in bonis ducenda 502, 43. mala au-
τομάτως 502, 42. vacuationes malæ, malarum affectio-
num signa 141, 31. malæ, excrementorum meracorum
141, 31. vacuatio inchoata ex alio, ibi postremum defi-
nit suctione

ait suctione, quæ excitatur suctionis sensus in alio 501, 55.
vacuationes præter apparentem de præter affectionibus, quarum illæ certa sunt signa 491, 56. vacuatio omnis, symptomatice esse solet in triumphata natura, multum afflicta 372, 48. nulla, doloris aut morbi lenationem est allatura, cum ea cietur *κατὰ τὴν ἐκκρίσιν* 551, 24, 25. vacuationum omnium nulla est quæ tam faciat corpus infirmum, quam liberalis hæmorrhagia 205, 12. vacuatio nulla, quantumvis critica, potest esse salutaris, ubi vires efflorescunt 7, 211, 22. 549, 14, 51. non prodest, superfluitate offensione firmiter fixa 44, 36. immerita, ab infirmitate orta naturæ, ipsam denuo infirmiores facit 548, 60. omnis frequens & plurima, periculosa 554, 61. per spuat, expurgatio humorum pleuritidem facientium, Hippocrati 256, 46.

Vapor fuliginosus, materia vocalis 572, 38. vaporis fumidi efflatio, laryngi præbet materiam vocalem 428, 31. ex vaporis fumidi nimia abundantia, maior necessitas expirationis, quam inspirationis 214, 38. vapor fumidus, noctu non tam liberum habet exitum, quam interdiu 277, 56.

Varix, quid 40, 8. vnde 191, 18. 434, 28. varices, non raro, morborum crises 204, 55. sanantes tuberculum, sine ipsius pepasmo, oriuntur 200, 40. varices aut hæmorrhoides infanientibus exortæ, sanant insaniam 378, 24. furibundis, propè iam alienato cerebro, nihil profunt 381, 44.
ἡ δάρος, quid 93, 58. nunquam per sympathiam existit 95, 11.

Vasorum impuritas, rerum alui malè gestarum consuetudine 213, 54.

Venarum omnium origo, hepar 203, 50. venæ hepatis propages 72, 12. 553, 37. vena nulla à liene in partes sinistras producit 203, 50. venarum color qualis, talis & ipse sanguis 125, 51. euacuatio, per liberalem sudorem 14, 34. è venis multæ hæmorrhoides, ipsaque imprimis menstruorum 464, 45. venæ quæ sunt in alio, affixæ sunt, non suspensæ 492, 60. venarum obstructarum libertas, sanguinis detractione comparatur 366, 35. venæ quædam communes vteri & mammarum 452, 72. attrahendi potentia, carnes ipsas præcedunt 247, 58. 269, 6. 271, 5. 298, 21. 341, 13. 421, 54. 498, 30. 500, 35. in venis sunt febres 509, 15. à venis, ad nervos non raro fit *μεταστάσις* 336, 52. venæ, pro arteriis usurpantur 77, 18. 139, 9. micantes, arteriæ 46, 58. micantes in capite, symptoma magni ardoris 46, 59. temporum instabiles 70, 35. cui vena in cubito micat, iracundus & phreneticus 46, 62. vena arteriosa, totipulmoni ramosè distributa 474, 11. vena arteriosa truncus, ad basin cordis 309, 56. venæ *πικρῆς, αἰμώδους καὶ μερόλαι*, eadem 423, 38. venæ iuvenibus velpuntur omnium facillimè 311, 316, 43. vena tumpitur vel sua sponte, vel incidente aliqua causa, tum intus, tum foris 309, 59. 315, 48. venæ ruptio sua sponte, quomodo fit 309, 60. ruptæ *νεφραῖς*, vel intra, vel extra 309, 62, &c. magnæ ruptio, difficulter sanabilis 310, 43, 59. in vena magna, fieri solet *σπῆν* & varix 310, 9. venarum crassarum vulnus, functum 424, 32. 427, 34. venularum coitio, facilis 310, 11. venulæ arefactæ, ad se trahunt acres & biliosos ichores 424, 32. 427, 34. 428, 493, 30. ἡ βέλαισις, signo & causa salutaris 392, 20. ἡ βέλαισις, ἡσυχὴν ἀλέσθων 170, 51.

Venter, talis hominibus, qualis terra arboribus 121, 28. ventrem, naturaliter esse decet in mediocriter positum tensionis & contractionis 331, 12. ventres hyeme, natura calidissimi 168, 7. 404, 48. ventres quibus nimium calenti iis fortia vina & cibi, perturbationem adferunt 345, 40. ventris inflationis, duplex causa 264, 47. ventris feræ, quænam 174, 52. prorumpunt à cordialgia cum torminibus 174, 30. ventris palpitatio in febre, facit insaniam 402, 9. vulnera, cur gravis 417, 15. de ventre, vide plura sub nomine *Alui*, ad litteram A.

Ventriculi interior tansæ, communis linguæ, palatò, ori 336, 13. concussio, in vomitu 487, 29. in singultu, molesta & irrita 487, 31. concussio ab exhausto insanabilis 500, 32. ventriculi est molestia, dum ægrè vomit. 489, 61. prostrationis irritæ, quænam causa 34, 19. prostratio atque stomachi omnes idæ, vnde 487, 47. &c. irrita prostratio, cum febre acuta; mala 34, 61. prostratio à bile concussio omnis irrita; prava 500, 28. vomiturientis, ac vomitoris ab oppressione, causa est vel indigena; vel

aduena 487, 58, &c. ventriculi & oris ipsius pathemata sunt, ἡ ἀστία, ἐρεπτία, καρδιαγῶν, ἀλυσμός, ἐμπίδιος 487, 36. ventriculum dissecari; mortiferum 418, 7.

Verratum nigrum & peplium, non inopia remedium ab Hippocrate præscripta aduersus pleuritidem coctum inferarum 261, 64. verratum nigrum & peplium, simul mixta; consociata sunt ad bene & conuenienter purgandum 261, 62.

Verc, somni longi 404, 57. fortura pathematum mania & melancholia 378, 42.

Verecundia cerebrum inferuit 374, 61. in Veris nihil ducendum, quod verbo Dei, & naturæ, dissentaneum sit 439, 27.

Vermes vnde gignuntur 174, 47. in tenuibus intestinis & stomacho tantum stabulantur 174, 44. in coloviuere non possunt 174, 49. rotundi & lati, feræ alui 352, 26. lati; vnde 435, 44.

Vertebrarum qualis connexio 192, 35. vertebræ cervicis, septem 192, 34. Vertebrarum cervicalium duo semicirculi, constituunt vnum foramen rotundum 116, 29. 425, 44. vertebra dentiformis, quo pacto cum prima connectitur 425, 35, 36. Vertebræ magnæ cervicis inflammationo, orthopnoicam facit anginam 425, 60. luxatio, celerius hominem, quam apoplexia fortis, interimit 425, 34. secundæ cervicis luxatio, mortifera 425, 34, &c. vertebræ dorsæ, duodecim 192, 34. vertebrarum dorsæ luxatio, nata ex phymate pulmonis, spirationem auget difficilè frequentia & paruitate 425, 61. vertebræ lumborum quinque, in homine tantum 188, 6. 192, 34. vertebra vnius ex inferioribus luxatio, arctius medullam constringit, quam plurium simul & eodem loco 425, 41.

Vertex, quid Hippocrati 105, 62.

Verrigo, quid 46, 54. ubi versetur, & vnde 46, 56. 58, 55. 215, 60, 61. 219, 24. *δύστροχία* dicta 46, 54. cum aspectabili temporum pulsu coniuncta, capitis repletionem ostendit 47, 4. in morbis acutis, principatum obrinet inter *κρίσις*, loco non apparentia 215, 44. vertigines quæ ab initio cietur; hæmorrhagia exoluntur 215, 47. 219, 47. verrigo in sperabili febris dissectione, bona 215, 58. in febris continuatione, pestifera 215, 59. tenebrosa, qualis 89, 62.

Vesica, pars acerrimi sensus 356, 51. partium omnium frigidissima *ἀνυμός καὶ ἀσπερος* 564, 427, 28. 538, 35. vesicæ & alui munus idem in excernendo 356, 29. vesica dicata vrinæ excipiente atque reddende 358, 4. recto intestino insidet 357, 30. loco mutabilis 362, 47. vesicæ conatus periodicus, quando 364, 21. in vesica venulæ non sunt nudæ atque suspensæ, similiter vt in renibus: sed illi parti affixæ 492, 58. perfecta est *ἡσυχία* 434, 18. vesicæ epiphænomena nulla, quàm de vrinis, aut per vrinas 509, 18. vesica iis est scabiola, qui cum vrina crassa, meunt furfuracea 294, 48. in vesica refrigeratio eximia tum fit, cum quicquid in ipsa est caloris natui, ab eo qui contra naturam est, fuerit disparum 538, 37. vesicam negligentem & sui officij oblitam reddit sensus amissio 363, 19. vesicæ vim expultricem labefactat exoluitio 363, 18. vesica, vnde intercipitur 538, 29, &c. intercepta præsertim cum cephalalgia; habet aliquid conuulsificum 95, 59. 449, 2. vesicæ opilationis quænam causæ 362, 4. in vesica non semper est *ἡσυχία* *περί* lapidis: sicut in renibus 539, 36. vesicæ lapidis coagmentatio, *κατ' ἑσθον*, renum, *πρὸ τῆς ὀφθαλμοῦ* 427, 25. 539, 37. vesicæ quænam pericula à calculo inferuntur 361, 23. vesicæ aut renum exulceratio est, si quis sanguinem aut pus micat 364, 51. tumor, tractabilis in aqualiculo 356, 45. vesica ab empyemate, mollior 358, 36. vesicæ inflammatio, pueros potissimum inuadit 358, 60. 359, 10, 18. vesica inflammata, vnde sanguis detrahendus 357, 60. in vesica inflammata, *διαφύσις* non expectanda, & cur 357, 55. vesicæ, phlegmone occupatæ, quænam crisis 358, 8. vesica inflammata, homini necando ipsa per se satis 356, vlt. 357, 21. in vesica, doloris à phlegmone quænam causa 356, 52. vesicæ propriæ actionis læsio consideratur, in stranguria dysuria, & ischuria 356, 36. afflicta symptomata non minora, nec minus læua & mortifera, quam ipsius alui 356, 15. duræ quas dolor prægrandis occupat; graues omnino atque pestifera 356, 18. colli dissectio, non mortifera 427, 30. dissectio; mortifera: & quare 409, 55. 418, 7. 424, 3. 427, 27. vesicæ gangræna; mortifera 357, 24. Veterni subanxij, vnde 450, 49.

Vicenarij post quadragesimum, critici 506, 31
 Vicina quæ sunt atque socia, primum & maxime vi-
 tiantur 304, 3
 Victoria nihil fructuosus 297, 17
 Vigilandum interdictum, noctu dormiendum 403, 59
 404, 10, 33. vigilandum in cruditate peccatur grauius, quam
 dormiendo interdictum 405, 5. vigiliarium quæ causa 12, 21.
 vigilia fortis, cruditatem parit potioni & cibi 405, 3. 555,
 6, 7. vigiliæ vt gignunt bilem: sic illæ rursum à bile gi-
 guntur 494, 53. vigiliarium & bilis quædam *συμμε-
 τρία* in ægri perniciem 494, 50. vigiliarium aut som-
 ni vacuitas pessimè, si quid aliud, habet ægrotum 405, 31
 vigilandi assiduitas, medicum exterrere metu 405, 33
 Violenti nomine, quænam continentur 368, 26
δύσος, vita animalis 426, 2
 Vinum, complexionem liquida, sicco est temperamen-
 to 406, 61. vlcerebus valde propiciam 406, 60. vino-
 rum *οὐλοσφῶν* duo genera 535, 10, 11
 Vires firmæ, naturæ præsentis testes; vt lucis lumen
 572, 33. virium conseruatio in maxima medici cura esse
 debet 572, 33. virtute opus in morbi vigore 403, 35.
 vires imbecillæ, vbi cernuntur 33, 27: vbi sunt infirmæ,
 non est in tuto æger 507, 35. infirmæ, sicut multis de causis
 33, 16. viribus infirmis morbo inesse, quid agendum 33,
 13. quid validis. viribus labantibus, vacuatio omnis pe-
 riculosa 572, 34. virium infirmitas, quoties ad morbum
 inestantem & symptoma se adiungit, vitæ salus nulla videri
 potest sperabilis 8, 2, 56, 15. virium *ἐκείνων* crebra, syncope
 vulgo 33, 34
 Virginis Larissæ historia 14, 25, & C.
 Virginum orthopnoea, quam sera peperit muliebritas
 menstruum, iisdem post grauidis, mammas adducit in
 empyema 477, 41
 in Viro semen virile & muliebre 445, 12
 Virtus, in substantia 400, 45
 Viscerum esse somnus; cibus carniū; exercitatio ar-
 tuum 404, 42, 43. viscera incandescunt æstia caloris, in
 somno diurno, in cibi vacuitate 404, 41. incendio non
 conflagrant, sine febre 40, 49. viscerum incendio con-
 flagrantium, tanta è natura egressio, vt vir redintegratio
 esse possit 392, 9. in viscerum inflammatione systro-
 phica, mortifera vis, nisi dolorifica mala exitum habeant
 citò liberalem & liberum 508, 29. viscerum tumor omnis
 non percipitur, hypochondriorum duritate & meteoris-
 mo 164, 39
 Visio, quomodo perficitur 223, 43. visionis instru-
 mentum, quale 124, 17, 21. radiosum, cætera vincit *ἀ-
 σπῆκτα* 124, 21. visus sensoria, humores 482, 47. hebe-
 tudo, vnde 71, 57. obscuritas, à lauciatas partibus oculo-
 rum vicinis 429, 64. visa fallacia, cur occurrunt 21, 41
 Vitæ fundamentum, in semine animato vtriusque pa-
 rentis 439, 5. vitæ in vitali principio partium solidarum
 subsistit, & in viuifico necesse 438, 50. vitæ principium
 ac finis, à calore natiuo in humido primigenio 439, 2.
 focus in sanguine 211, vlt. 212, 1, 302, 24. hominum custos
 & conseruatix natura, quæ sustentatur & reficitur spiritu
 & diætâ 438, 52. vitæ, per spirationem est 372, 2. com-
 modis sustentatur diætâ & nutritas 284, 18. 290, 61.
 438, 51. 526, 18, 19. ad vitam tuendam, motu & sensu opus
 393, 16. vitæ & animalitatis principia tria, cerebrum, cor,
 iecur 146, vlt. commoda sunt, partium solidarum viuaci-
 tas, & nectar à corde viuificum 438, 14. commoda,
 corporis fabricatio intra se habet à semine vtriusque pa-
 rentis 438, 13. vitam, spirabilem partium officio, vel ad
 punctum temporis, carere non potest est 290, 45. non po-
 test esse carere viscerum vitali officio 392, 10. vitæ & ani-
 malitatis ratio & conseruatio, vbi cernitur 147, 2. vita
 in numeris fundamentum suum non habet 438, 61. vitæ
 commodorum iactura perennis, quo pacto 438, 12. in-
 commoda maiora ex paupertate calorisi natiui & virium
 infirmitate, quam à febrili ardore 389, 29. vita hominum,
 natura & necessitate fatalis 146, 53, 54. 438, 53, 54. vitam
 tollit quicquid respirationem omnino adimit, præter hy-
 stericam affectionem 233, 19-372, 12. 428, 16. vitæ offen-
 sa magna esse solet, quando vigilarium & somni vicissi-
 tudo nulla est in morbis acutis 405, 29. citâ diçessio est,
 vbi collabitur, vel impedita cessat œconomia, tum spiri-
 tu, tum nutritas 526, 18. salus inde sperabilis esse de-
 bet, vnde vitæ naturæ apparet, & morbi remissio 250, 39.
 256, 33. salus nulla sperabilis in vicio nobilium partium

insanabili 174, 26. non tam citâ amissio ab aulso corde
 quam à cerebro conuulso, aut capite obtuncato 427, 9.
 obitus ante diem, recto cursu inoffensa naturæ, non est;
 nisi Deus ipse suo numine fatum præuerterit 439, 9.
 vitale principium, vnde conseruatur 146, 57. vitale
 erit quicquid omnes pepererint, quibus nihil accidit in-
 tra præscriptum pariendi tempus 445, 53. 446, 36.
 viuacitas ostenditur coloratione decora 214, 24. vi-
 uacitatis mansio, vbi 146, 50. in viuere forma vna,
 qua ynum est 421, 6. viuens omne consortis mor-
 tui impatiens 105, 32. 139, 5. 312, 51. 396, 19. quæ
 viuunt & quæ mouentur, ex iis aluntur, ex quibus con-
 stant 174, 52. quæ viuunt & quæ mouentur omnia,
 in suo quæque loco seruantur 174, 50. viuendi spes,
 nulla, viuendi facultate omni collapsa & perditâ 572,
 43
 Vicerum vbertas, vnde 96, 27. vlcera, vt dicta
 phymata 2, 13. agitata perenni motu, insuper dis-
 rampuntur 306, 13. 310, 6. 428, 46. vlcere non be-
 ne mundati & repurgati coitio, suspecta 306, 16. vlc-
 era *ἐμμορτα*, qualia 170, vlt. vlcus cauum, non antè
 coalescet, quam fundum repleuerit 419, 49. vlcere
 cauorum curatio atque sanatio, τῇ *σπερματικῇ* sola com-
 paratur 419, 22. sanie diffidentium, *ὀρεγοειδὲς* esse
 solet 432, 21. vetustorum, cauas necesse est cicatri-
 ces obduci 420, 24. in vlcerebus, à forti pulsu hæ-
 morrhagia cietur 189, 20, 30. liuor & siccitas, vnde 398,
 53, & C.
 Vlcus depascens, *τὸ ἐπιπολεῖν*, *τὸ ἢ νόσην* 353, 34. vlcus-
 cula pueris exorta, quænam critica 384, 29. 385, 30. ro-
 zunda & profunda, pueris mortifera 384, 30
 Umbilicus, empyematum terminus 186, 57. vmbi-
 lici dolores cum pulsu coniuncti nonnihil paraphori-
 cum præ se ferunt, nec suæ mentis ægrotum esse testan-
 tur 402, 9
 Umbrosus, quid significat 526, 34
 Ungues, procul absunt à fonte calorisi 395, 5. niten-
 tes & pellucidi ibidem. liuidi, vnde 308, 33. quomo-
 do adunci sunt 278, 45
 Voluptati inferuit hepar 374, 61
 Voluiti confectionem adfert, quicquid remeare fa-
 cit, aut permeare prohibet chylum & stercus 177, 60
 Vomica pulmonum, vt sanabilis 60, 49
 vomitus, quid 487, 28, 29. vomitus natura, in con-
 cussione potenti rerum ventriculo molestatur 487, 37.
 vomitus, in excussione consistit 73, 34. è fundo ventri-
 culi 196, 1. inter excretiones criticas numeranda, vbi
 77, 42. à quibusdam cietur 488, 38. omnis vel expur-
 ganda aluo, vel vniuersi corporis purgationi: tum vi na-
 turæ aut morbi, tum artificii medici suscipitur 487, vlt.
 vomitionis *πρωτοτον*, *τὸ ἐρρηγνῆς* 215, 57. commendatio
 prima, in eorum vacuitate, quæ sunt contra naturam; &
 eorum præsentia, quæ naturæ lege apparent 488, 55. 489,
 43. vomitus quædam vniuersalis, quædam particularis
 488, 1. vniuersalis est, qua vniuersus humor toto corpore,
 vel è visceribus atque venis, sursum per os vomendo eiicitur
 488, 2. vomitu vniuersali, corporis vniuersi expur-
 gatio perficitur, sicut & deiectione 488, 15. vomitus
 vniuersalis, æstare tantum præscribens 488, 17. par-
 ticularis est, cum vel pituita hyeme, vel eorum quæ as-
 sumuntur satietas per æstare vomendo leuatur 488,
 26. vomitu particulari æstare interdixit Hippocrates: ni-
 si cum alui reiectio est 488, 21. vomitus bilis porraceæ,
 particularis est vel vniuersalis: vt ea indigenam habet cau-
 sam in aluo, vel aduenam 488, 27, 28. bilis porraceæ in
 aluo natæ: particularis: eius quæ in aluum confluit, vni-
 uersalis 488, 32. pituitæ, peritæ ad vomitum particu-
 larem 488, 21. pituitæ, hyeme ciendus 488, 20. est in
 propinquo, si bilis impulsus in aluum, cerebro inflamma-
 to, salua promoueat 501, 9. præsidio. esse solet
 diarrhææ sustinenda 495, 62. aluum substantem de-
 mittit 573, 54. vomitiones, criticæ sunt, vel sympto-
 maticæ: & vnde cietur 487, 64. vomitio critica, quæ-
 nam 488, 3. critica, quæ febrium finem adfert, vniuer-
 salis. ibidem. vomitiones, quando febrium finem fa-
 ciunt 77, 36. vomitio, quænam vtilissima 24, 53. 487, 12.
 salubritati commodissima, quam cietur elleborum eo die
 quo cibi quis perfregit calcaneum 488, 8. qui cietur
 duce natura, certum argumentum; pituitæ cum bile æ-
 curata mixtio 489, 1. quænam est, qualem esse o-
 portet

portet 489, 21, &c. libera, vnde 494, 19. ad vomitum liberum facilemque, prescribenda vātorum ciborum sarietas 488, 24. vomitus exiguus; vnde 494, 20. contra naturam, vomendo multis incommodis auger zgrorum 490, 16. in vomitione damnantur vomitiones paruz & frequentes 191, 61, 503, 36. vomitio pessima, quæ 24, 54. vomitus prauitatis multum adiicitur, cum vitiosa qualitas rei quæ vomitur parca manu, crebro & zgrè apparet 494, 12. vomitus quem ciet pruratio bilis æruginosæ in aluo, causa est aduena & indigena 488, 33, &c. vomitio bilis meræ cum actione læsa, perennitatis fontem & focum denunciat 500, 24. bilis meræ mortifera 500, 25. vomitus bilioli, quinam 495, 52. febris incremento excitatur 494, 51. vomitus bilioli & febris, cōspiratio murtia in virtutis causam & incrementum 494, 53, 54. vtriusque quædam *omniologia* in ægri pñiciem 494, 50. vomitus bilioli pauci; mali 94, 35. 422, 20. 494, 38, &c. vomitio zgra omnis, aut certe irrita vomitio; inflammationem mouet lethalem stomachi & ventriculi 493, 57. 494, 43. vomitionis zgræ quæ vomitum edit rubrum, causa, venularum erosio 492, 64. vomitio æruginosa, vnde 88, 24. vomitus æruginosi in cephalalgia, cum sorditate ac vigiliis; citò adducunt insaniam 490, 51. 494, 32. 495, 16. vomitiones æruginosæ cum sorditate & vigiliis, insaniam breui futuram ostendunt 112, 24. 257, 49. vomitus æruginosi in nephritide phlegmonica & calculo, vnde cietur 496, 7. vomitus omnium colorum, mortiferus 24, 49. 491, vlt. in vomitu, quò plures exhibentur prauis colores, eo plures denunciantur prauæ affectiones partium colores illos edentium 492, 6. vomitus crebri, vnde 496, 38. cum vomitu, crebri parti modo relapsus, nigrum ciet vomitum circa crisin 503, 52. vomitio quæ ab elleboro conuulsionem mouet lethalem; perniciofa 488, 7. vomitus fastidiosus, sunt etiam febrium malignarum, sicut ipsius phrenitidis 496, 27. in vomitu eximie flauo, nota est rubri & vitellini 492, 38, 39. vomitus, cum iactatione, synceri; mali 24, 39. vomitio ileosis, est oppressionis aduentæ 487, 61. vomitibus illis pessime agitur cum zgris, vnde nulla leuatio est 496, 30. vomitus liuidus, liuore suo, liuidam partem ostendit, vnde vel affluit, vel ubi excipitur 491, 48. liuidus & fædi odoris, putredinæ cum extinctione, & citam mortem denunciat 260, 2. 492, 12, 19. vomitu liuido humor apparet fucatus, partium corruptarum vitio vnde vomitur 490, 10. vomitus melancholici & nigræ deiectionis causa, idea, atque materia, eadem 491, 36, 45. vomitus meri, quinam 495, 53. meri qui crebro & parce bilioli sunt; malè habent zgratos; idque cum aliis; tum in multa deiectione & in prægrandi lumborum dolore 495, 38. meri, ac propterea prauis, & indices prauarum affectionum; mortiferi 500, 14. in vomitibus meris, mortiferè habent conuulsio & singultus 500, 9. vomitus niger, vnde 68, 44. quibus significatur 68, 47. in vomitu nigro, nota est arabilarij & melancholici 492, 38. vomitus niger, est atræ bilis, quam ex flaua genuit æruginosa 491, 4. cur citam mortem adfert 196, 33. in vomitu porraceo, nota est æruginosi 492, 38. Vomitus porraceus, niger, ac liuidus; pestiferus. 490, 2. ruber de sanguine dictus, tam de eo quæ pulmonibus excluditur, quam de ventriculo 492, 43, 44. ruber an sit merus, distinctione ruboris difficultas tollitur 492, 34. ruber sanguinis à se nihil mutari, quid denotet 492, 53. ruber atque niger, ipsum malè habet periculosè ubi sua sponte mouetur 502, 31. ruber lethalis; maximè quæ zgrè vomatur 492, 29. 502, 35. vomitio zgra rubra, nunquam est ruptæ venæ 492, 63. omnis spumans iniusta, in vitio est 192, 1. symptomata, quænam 488, 4, 5. vomitui symptomatice, vnde succedit insaniam 494, 30. vomitus, qui symptomata inferunt quæ citò vires exolunt; mortiferi 500, 15. vomitio crebra quam tromatis inferit propagatio, critica sine crisi 422, 13. vomitus cum varietate, mali; maxime, frequentes 94, 36. vomere prodest in diarrhoea longa; retrahendi causa id quod in ventrem conluit 503, 38. vomere ab elleboro spumantia multa in dolore lumborum prægrandi, & in larga deiectione; prodest 503, 10. aluo fluente; ferinum 567, 33. sanguineum, quid 509, 21. vomendum *νεοίμους καὶ χυλούς*, & numeri omnes vomitus ad sanitatem expleantur 489, 28. vomendum bis mense, hyeme; siccioribus 488, 22. ter mense, hyeme; iis qui sunt humidiores 488, 22. hye-

me, non ad *νεοίμους*, sed ad paucitatem hybernæ, cuius nimia abundantia natar alius 488, 23. vomendi crebra cupiditas, vnde 496, 38. quæ vomuntur meraciora; peiora 489, 32. vomituri omnes, vomitariædo salinæ 500, 60, &c. 502, 5. vomituro, labri inferioris palpitatio 577, 24. *ἰσχυρία*, quid, & vnde 214, 50. *βήλητος* & *κυστοβήλητος*, vt differant 214, 51.

Vocalis materia, quænam 220, 36. vox acuta ex graui, quam phrenitidem arguit 32, 4. clangosa, vnde 496, 49. exilis, in paupertate caloris, & thoracis infirmitate 20, 49. magna, vt editur 20, 47. voces magnæ, vnde 148, 16, 17. plenæ iis, quibus caloris abundantia. 148, 15. vox vitata & in faucibus elisa, vnde 120, 38. vocis asperitas, inæqualitatem ostendit arteriæ catarrho imbutæ 378, 30. voces & lingua, vnâ pariter exasperantur 273, 63. vocis carentia, extenuato pridem, sponte nunc nata, exolutione facultatis vitalis confirmat 572, 42. voce capti ex dolore, crudeliter moriantur 143, 49. 229, 43. vocis interceptio, offensionem neruorum principij arguit 146, 2. interruptio, in deprauatione consistit *τὸ ἐκποσθὲν* 144, 60. *ἡ βραχὺ, ἀπὸ τῆ μύτης* 208, 12. *βραχὺ πνεύμα* 54, 60. Vreterum epiphænomena nulla, quàm de vrinis, aut per vrinas.

Vrethra, suis idem semper situs 362, 46. phyma, quomodo exhibet dysuriam vel ischuriam 362, 31. &c. Vrethra phymatis atque calculi diorismis, quomodo comparatur 362, 49. in Vrethra quibus est tuberculum; iis pure factò atque prorupto, morbi dimissio, & libertas moriendi 362, 30.

τὰ βρογχα, quid 252, 8. Urina colluies est stagnans in vesica, vel potius cruda, vel feri humorum qui sunt in venis, vel humidi liquesfacti 363, 35. 509, 57. est concolor cibo & potui; tum qualis esse solet; item cum humidi colliquatio est 509, 53. urina non est, donec serum in vesicam descendit 511, 361, 19. 363, 16. 427, 14. 539, 12, 13. vera, vteribus *ἡ βρογχα* 510, 51. dicta *βρογχα* *τὸ ὄψιν* 511, 26. urinae nomen, quid significet 509, 49. urinae, excrementa venarum 509, 14. vrinarum magnum nomen, magna species, magna vis 509, 39. contemplatio omnis circa liquorem, & ea quæ continentur intra liquorem 517, 28. urinae genus vnum venit de bonis; cætera duo de malis 510, 57. vrinæ portio & cibo concolores edit efforta coquendi potentia in officina vtraque 510, 5. urina est serum eorum qui sunt in venis & arteriis humorum 112, 48. 294, 40. 510, 50. 524, 38. 532, 61. urina, certissimum argumentum humorum qui in vas continentur 112, 38. 510, 56, 61. 511, 1. vrinæ colliquamentum, partium omnium, febri ardore liquefactum colorem exhibet 510, 26. urina quæ habet velut telam araneæ; colliquamentum ostendit 530, 14. vrinæ conspurcata de partium liquamine; omnes feruntur exitio zgrorum tantum 510, 40. urina ducta de venis à renibus ad vesicam, sola omnium, naturalem retinet œconomiam 510, 11. simulatque ad pudendum illapsa est, nulla restat potentia continendi quin effluat 363, 54. vrinarum omnium commune, vt suam quæque *ἑσθον* non ante absoluant; quàm ad vesicam peruenerint 509, 45. per vrinas expurgatur corporis vniuersitas 332, 49. 364, 36. urina crebro redditur, cum incaluerit multum caput; à liquata in eo pituita 364, 42. 510, 14. affectionem ostendit hepatis, renum, vesicæ, ipsorumque vasorum sanguinem continentium; tum facultatis humorum procreatricis virtutem & infirmitatem 18, 4. 511, 4. urina semper inspicenda in omnibus ventris, thoracis, pulmonum; neruorumque morbis 509, 33. vrinæ per micatus, suscipiuntur & absoluuntur crises multorum morborum thoracis atque neruorum 509, 35. 364. vrinæ, vitia tumoris tollunt hypogastrium 336, 47. febrium propria *ἐπιφαινόμενα* 509, 14. 513, 50. 546, 59. 60. *ἐπιφαινόμενα* partium morbidarum per quas feruntur, & ubi excipiuntur 509, 15. morborum acutorum qui sunt in phlegmone viscerum, & cum febre, propria non sunt *ἐπιφαινόμενα* 525, 39. urina liberaliter moriendo emissa, quæ habet pinguem hypostasin; febrem abire denunciat 528, 53. vrinæ in febre interdum varias reddit; longi est morbi 541, vlt. in vrinis signorum quæ sunt per febres acutas, tanta vis, vt illi soli credatur 509, 41. Urina in febre quæ asperum quid habet diuulsam; recidit: nuncia est, aut sudorum 541, 1. inter vrinas pestifera est, de qua sperabilis nulla curatio est febris acuta 524, 33. urina quænam longi morbi 542, 1, &c. peripneumonia.

cis perniciofa est, quæ principio cocta, post quaternarium tenuatur 525, 31. quænam *συνήθως* venit; quænam *ἀσυνήθως* 510, 57. quænam *διήθως*, quænam *καποθέσκει* vrinæ, cur non faciles in meiendo 339, 3, &c. vrinæ laus nisi adiuncta sit, vitæ salus non sperabilis de crisi propria morbi cuiusque 512, 37. 535, 41. pepasimus, qualis 74, 6. celeritatem & securitatem crisis denuncians 110, 56. 512, 23. septimodie venturam crisis promittit 74, 9. vrinæ quando redduntur pepasini expertes, parum prodest parotidas in empyema mutari, ac fistulari 509, 26. vrinæ perturbatio critica, naturæ est morbosum succum ex sanguinea massa in sudores elicientis 333, 8. ex vrina, perturbationis critica argumentum in spuma stabili 533, 10, 11. vrinæ perturbatio symptomatice à cephalalgia, vel simplici, vel cum in signis febris ardore vehementer coniuncta 533, 6. profusio sudor compescitur 505, 13. vrina in diabete rapitur 515, 52. similis potioni funditur 510, 4. vrinæ quæ immemoribus redduntur; pestifera 6, 26. 12, 40. 470, 65. 525, 15. 542, 11. vrina quibus clam illabatur ad pudendum; exoluntur desperati 366, 3. 524, 65. 525, 23. si quandoque deficiat, ac nonnunquam sit pura, nonnunquam quid album subsidat & læue; longior erit hic morbus, minusque tutus 512, 18, 19. vrinæ cohibita feritas tanta, ut facilem habeat ad caput anadromen 449, 3, 4. interceptæ, causæ plures 338, 21. cum interceptio ileosis est, cito mors venit 540, 43. suppressio, vesicæ propria 551, 539, 11. à vicissitudine caloris & frigoris extimor 7, 35. ut rigoris est symptoma; ita rigor, vrinæ suppressæ 534, 25. non raro ex inflammatione spinalis medullæ & membranarum eius 539, 59, 60. ante rigorem; bona 555, 14, 50. 16, 32. 205, 17. 207, 42. 504, 52. 505, 15. 523, 16. 534, 27. 560, 3. vrinam listi ante rigorem criticum, quomodo pestiferum 14, 52. vrinæ suppressio à rigore; praua, & conuulsifica 14, 41, 62. 16, 31, 95, 50. 205, 17. 217, 43. 334, 24. 560, 3. ex frigore; mala 550, 63. 95, 57. 538, 40. mortem crudelissimam secum adducit 362, 58. à vesicæ *ἀναδυσία* in morbis acutis; pestifera 109, 22. à nephritide, pestifera 197, 38. vrina iis supprimitur in sæua nephritide, quibus ren socius, læquet effectus & marcidus 539, 32, 33. parce & crebro emittitur, in sympathia renis alterius 539, 31, 32. suppressa, contagione cerebri, nervos inde natos ad conuulsionem adducit, si grauis adfuerit cephalalgia 449, 16, 17. suppressa, multi moriuntur *λαορῶντες* 157, 63. vrinæ stillicidium, vel substillum, vnde dictum 364, 60. vrina praua est, quæ ante rigorem oleosa meiendo emittitur 522, vlt. cum vrinis li quid carniforme apparet, vel si fundantur carunculae; à renibus qui exoluntur 510, 28. vrina omnis quæ sine sensu ac voluntate redditur; pestifera 363, 46. praua est, quæ mox à potu effluit; maximèque pleuritici & peripneumonici 522, 33. pessimis ægri rebus ibi emittitur, vnde significatio est inualefcantis atque immitis morbi, & partium corporis quæ liquuntur 518, 8. vrinæ quænam è natura egressæ 510, 38. vrina alba de bello colore & bella hypostasi; iuuenibus ad hæmorrhagiam; senibus ad dysenteriam 521, 63. vrinæ albæ pellucidæ; prauæ 517, 5. 522, 22. in venustis morbis cum tales apparent *διὰ τὸν αἵμα*, ad vrinam veniunt crudicitatis 517, 7, 8. vrina multum alba, iis quos occupat febris ardens, aut qui cum febre sunt catochi; pessima 527, 10. vrinam fluere albumineam, prodest 336, 44. aquescere, quid 513, 16. vrina aquosa, vnde 209, 22. 537, 11. vrinam aquosam, multæ causæ 209, 25. vrina aquosa & alba, eadem cum pellucida & aquosa 516, 39, 40. ab initio morbi vetusti ad eum exactum, quid ostendit 516, 42, 43. exactum ad morbum; in venustis; difficultis est, nec secundi iudicii 516, 31. vrinæ aquosæ & pellucidæ in morbis acutis, non porioni concolores, sed biliose tincturæ expertes 510, 7. vel ob anadromen bilis in cerebrum, vel ob derivationem eius in aluum 510, 7, 8, 9. aquosæ decolores factæ ex concitata & segregata bile ad caput; signo phrenitidis apparent 531, 57. 532, 26, 28. vrina aquosa, li quidioris alui prænuncia atque comes 509, 23. aquosa & limpida, sæpe caret hypostasi, in crisi sperabili 534, 50. aquosa, vel conturbata arenida asperitate; liquidam fore aluum denunciat 332, 21. aquosa in morbis acutis quàm periculosa. 522, 26. vrinæ aquosæ, pueris deterrimæ 519, 12, 14. 524, 14. vrina aquosa in pueris, peior censenda, quàm nigra in cæteris 524, 43, 44. in vrinis aquosis & albis ponere collaquantem; non absurdum 537, 19. vrinis cum expurgarum non est biliosum, credibile est dysenterias ab eo induci 516, 60. vrina biliosa, quænam 515, 57. periculi multum habet, nihil securitatis 518, 17. & tennis, ex æquo certant pariter è natura egressæ, non tamen similiter 519, 7, 8. febrium acutarum, est de bile *ἀπὸ τῆς πύλης* 518, 24. inter vrinam biliosam febrium acutarum, & eam quæ venit ab ictero symptomatice bilis obstructæ, interest 518, 22, 23. vrina biliosa febris acutæ, nata ex pingui hepatis & hepatitis à febrili ardore, multum ostendit periculi 518, 25, 26. icteri critici, non est biliosa, sed colorata bellè 518, 23. biliosa icteri symptomatice, est de bile naturali non segregata, sed mixta cum sero futuræ vrinæ 518, 24, 25. biliosa est, ob febris indomitam feritatem 516, 7. si multa bile saturata esset aut inflammata; parum proficerent pleuritici liberè & liberaliter spendo 509, 25. bona, morborum omnium securitati adiciit 515, 40. vrinæ quicunque meint bullatæ; ostendunt nephritica, & longam fore infirmitatem 541, 11. vrina caliginosa, vnde 526, 37. coacta est, rotundo enzeomate 519, 59. cocta signum sylogisticum benè constitutæ naturalis œconomiae 209, 19. 509, 21. vrinarum cita, immerita, & fugax concoctio; non fida, sed insidiosa 510, 36. vrinæ cito & paulisper coctæ, in parotidibus, prauæ 294, 30. 512, 22. 520, 33. 537, 40. vrina quæ à coctis de improviso & immerito, est præterbra, virulenti quippiam efflorescentis continet 52, 10. in vrina belle colorata, pepasimum ostentat lætis & alba hypostasis 512, 48. 516, 4. vrinæ bella coloratio cum accedit liberæ ac liberali anacatharsi, in tuto sunt pleuritici 509, 24. coloratio supra naturam, à domino est morbi 519, 9. ex vrina confusa & perturbata similiter vt iumentorum, sperabilis esse nequit cita febris dimissio 513, 9, 10. cum vrina confusa & perturbata similiter vt iumentorum, cephalalgia adest, vel aderit 513, 13. vrina confusa & perturbata similiter vt iumentorum, in virtute virium, diuturna est morbi in infirmitate, mox adfuturæ mortis 513, 11. vrinæ, vnde *ἀγνὸς αἷμα* dicitur 531, 63, &c. vrina conturbata, vnde 532, 25. crassa, grumosa, pauca, differens à perturbata, confusa, simile iumentorum 513, 7, 9. cum mutatur in tenuem, claram & multam, bene sit 513, 15. vrinæ crassæ, quædam à pepasino 294, 46. quædam turbatæ, quæ diu depositæ non recidunt 294, 44. simplici effluvio, multi morbi depelluntur 632, 63. in vrinis crassis laminea & fursurca, vesicæ corruptionem & scabiem denunciant 510, 29, 30. vrinæ crassiores, conuulsionem liberant è crassis, frigidis humoribus natam 564, 32. valde crassæ, turbatæ, signo sunt certissimo cephalalgiae, conuulsionis, & mortis 340, 5. vrina cruda & aquosa, incurrent morbo & paroxysmo redditur 518, 1, 2. vrinæ crudæ vitio multum adiciitur, cum intra se continet excrementa; prauitate eximia 537, 8. vrina cruenta, vnde 529, 37, &c. vrinæ cruentæ quibus menstrua intus cohibita detinentur, vnde 511, 14, 15. in quibus prauæ 513, 25. vrina cruenta, quænam pessima 16, 21. vrinæ decolores, quænam 531, 19, &c. vrinæ turbulæntis vigilibus decolores, vel nigra, enzeomate præditæ, cum sudatiuncula notant insaniam 478, 23, 24. 531, 3. vrina florida, quænam 536, 37. fursuracea tenuis, à porrigine venarum 294, 49. 510, 30. 527, 3. 532, 41. 534, 3. crassa, à biliosa vesica 294, 50. 527, 3. fusca, vnde 526, 37. vrinæ genitinales, exolunt ea quæ speciem febris & opisthotoni præ se ferunt 232, 44. vrina geniturali febrius diuturnarum, pituita emittitur quæ ipas fouebat 518, 39. vrina genituralis in Perintho, nonnihil iudicatorium fecit 232, vlt. *συνεδῆς*, sæpe à tumido hypogastrio redditur, qua ille tumor exoluitur 540, 29. vrinæ grandinosæ, genitinales, continenter effusæ, laboriosa 524, 52. vrinæ grumosæ, quænam 541, 8, &c. vrinæ incontinentia, quid 363, 26. vrinæ incontinentiæ ratio duplex: vna iniussæ, altera iniuræ 363, 29. 264, 14. continentia in vesica vlcera 364, 50. incontinentia iniussa, quando 363, 30. vrina iniussæ, iure primo, præter cæteras, perniciofa 525, 18, 19. vrinæ iniussæ duplex omnino causa 525, 11, 12. 544, 18, 19. vrina iniussa, vel *ἀναδύσθης*, vel *ἀποκαίετος* 525, 10. vrinæ iniussæ, quæ tum *ἀναδύσθης*, tum *ἀποκαίετος* clam excidit, duplex omnis ratio atque causa 525, 10. incontinentia iniuræ, quando 363, 30. 364, 18. incontinentia iniuræ,

liofum, credibile est dysenterias ab eo induci 516, 60. vrina biliosa, quænam 515, 57. periculi multum habet, nihil securitatis 518, 17. & tennis, ex æquo certant pariter è natura egressæ, non tamen similiter 519, 7, 8. febrium acutarum, est de bile *ἀπὸ τῆς πύλης* 518, 24. inter vrinam biliosam febrium acutarum, & eam quæ venit ab ictero symptomatice bilis obstructæ, interest 518, 22, 23. vrina biliosa febris acutæ, nata ex pingui hepatis & hepatitis à febrili ardore, multum ostendit periculi 518, 25, 26. icteri critici, non est biliosa, sed colorata bellè 518, 23. biliosa icteri symptomatice, est de bile naturali non segregata, sed mixta cum sero futuræ vrinæ 518, 24, 25. biliosa est, ob febris indomitam feritatem 516, 7. si multa bile saturata esset aut inflammata; parum proficerent pleuritici liberè & liberaliter spendo 509, 25. bona, morborum omnium securitati adiciit 515, 40. vrinæ quicunque meint bullatæ; ostendunt nephritica, & longam fore infirmitatem 541, 11. vrina caliginosa, vnde 526, 37. coacta est, rotundo enzeomate 519, 59. cocta signum sylogisticum benè constitutæ naturalis œconomiae 209, 19. 509, 21. vrinarum cita, immerita, & fugax concoctio; non fida, sed insidiosa 510, 36. vrinæ cito & paulisper coctæ, in parotidibus, prauæ 294, 30. 512, 22. 520, 33. 537, 40. vrina quæ à coctis de improviso & immerito, est præterbra, virulenti quippiam efflorescentis continet 52, 10. in vrina belle colorata, pepasimum ostentat lætis & alba hypostasis 512, 48. 516, 4. vrinæ bella coloratio cum accedit liberæ ac liberali anacatharsi, in tuto sunt pleuritici 509, 24. coloratio supra naturam, à domino est morbi 519, 9. ex vrina confusa & perturbata similiter vt iumentorum, sperabilis esse nequit cita febris dimissio 513, 9, 10. cum vrina confusa & perturbata similiter vt iumentorum, cephalalgia adest, vel aderit 513, 13. vrina confusa & perturbata similiter vt iumentorum, in virtute virium, diuturna est morbi in infirmitate, mox adfuturæ mortis 513, 11. vrinæ, vnde *ἀγνὸς αἷμα* dicitur 531, 63, &c. vrina conturbata, vnde 532, 25. crassa, grumosa, pauca, differens à perturbata, confusa, simile iumentorum 513, 7, 9. cum mutatur in tenuem, claram & multam, bene sit 513, 15. vrinæ crassæ, quædam à pepasino 294, 46. quædam turbatæ, quæ diu depositæ non recidunt 294, 44. simplici effluvio, multi morbi depelluntur 632, 63. in vrinis crassis laminea & fursurca, vesicæ corruptionem & scabiem denunciant 510, 29, 30. vrinæ crassiores, conuulsionem liberant è crassis, frigidis humoribus natam 564, 32. valde crassæ, turbatæ, signo sunt certissimo cephalalgiae, conuulsionis, & mortis 340, 5. vrina cruda & aquosa, incurrent morbo & paroxysmo redditur 518, 1, 2. vrinæ crudæ vitio multum adiciitur, cum intra se continet excrementa; prauitate eximia 537, 8. vrina cruenta, vnde 529, 37, &c. vrinæ cruentæ quibus menstrua intus cohibita detinentur, vnde 511, 14, 15. in quibus prauæ 513, 25. vrina cruenta, quænam pessima 16, 21. vrinæ decolores, quænam 531, 19, &c. vrinæ turbulæntis vigilibus decolores, vel nigra, enzeomate præditæ, cum sudatiuncula notant insaniam 478, 23, 24. 531, 3. vrina florida, quænam 536, 37. fursuracea tenuis, à porrigine venarum 294, 49. 510, 30. 527, 3. 532, 41. 534, 3. crassa, à biliosa vesica 294, 50. 527, 3. fusca, vnde 526, 37. vrinæ genitinales, exolunt ea quæ speciem febris & opisthotoni præ se ferunt 232, 44. vrina geniturali febrius diuturnarum, pituita emittitur quæ ipas fouebat 518, 39. vrina genituralis in Perintho, nonnihil iudicatorium fecit 232, vlt. *συνεδῆς*, sæpe à tumido hypogastrio redditur, qua ille tumor exoluitur 540, 29. vrinæ grandinosæ, genitinales, continenter effusæ, laboriosa 524, 52. vrinæ grumosæ, quænam 541, 8, &c. vrinæ incontinentia, quid 363, 26. vrinæ incontinentiæ ratio duplex: vna iniussæ, altera iniuræ 363, 29. 264, 14. continentia in vesica vlcera 364, 50. incontinentia iniussa, quando 363, 30. vrina iniussæ, iure primo, præter cæteras, perniciofa 525, 18, 19. vrinæ iniussæ duplex omnino causa 525, 11, 12. 544, 18, 19. vrina iniussa, vel *ἀναδύσθης*, vel *ἀποκαίετος* 525, 10. vrinæ iniussæ, quæ tum *ἀναδύσθης*, tum *ἀποκαίετος* clam excidit, duplex omnis ratio atque causa 525, 10. incontinentia iniuræ, quando 363, 30. 364, 18. incontinentia iniuræ,

vix innit, causæ multæ 364, 20. vrinæ iumentorum semper *θολαρά*, nec vnquam residunt 336, 38. iumentorum similes, perturbato sero in venis à spiritu flatulento 76, 2. 332, 1, 2. in vrinis iumentorum similibus, cernitur confusio rerum omnium, & valorum impuritas 332, 3. vrina laudabilis, tempus crisis prænunciat 50, 34. vrinæ lixiuæ, eadem cum similibus iumentorum 331, vlt. lixiuæ, cum dyspnœa, hydropificæ 331, 52. 332, 27, 27. ex euentu 331, 58. vrina mala, morborum omnium periculo adiciit 335, 40. vrinarum meliorum factarum liberalitas, non modò febris dimissionem adfert: sed etiam vendicat ab abscessu partium inferarum 543, 20, 21. vrinæ membranaceæ, quænam 333, 61. vnde 333, 61, &c. membranaceæ, & quæ cum horrore subdunt conuulsionis prænunciat 333, 35. in vrinis membranaceis, colliquatio partium solidarum, maior quàm in spumantibus 334, 16. vrinæ membranaceæ, magis conuulsificæ, quàm spumantes 334, 14, 15. vrina multa, crassa, & alba; abscessus omnis futuri spem adimit 266, 33. vrina nigræ, vnde 30, 38. ad vrinam nigram, de viridi transit esse solet 324, 19. vrina nigræ, nigro humore perfusa & saturata, de mensuris melancholicis; minùs habet periculi quàm tenuis & biliosa quæ illi succedet 319, 6, 7. vrinæ nigræ & ençoremata nigra non malefica, si mulier ægrotare cœperit à menstruum suppressione 317, 50, 51. vrina nigra quàm facit ardor febris, perurendo serum & sanguinem; omnium deterrima 319, 2, 3. 324, 41. vrinæ nigræ, viris deterrimæ 319, 12. pessimæ, mulieribus pariter atque viris 324, 27. in vrinis nigræ quæ sunt, lienis liquefacti sunt argumenta 310, 32. vrinæ oleosæ genus duplex 323, 23, 27. vrina optima, quænam 305, 36. cum vrinis, si quid orobæum, aut aliquid simile crassioris farinæ redditur: id acceptum ferendum iccori translescenti 310, 27. vrinæ pauca in febre ardente, vnde 30, 39. vrina, si cui aquoso cum febre sit pauca & turbida; perniciosum 332, 15. periculosa est, quæ transit de nigra in tenuem biliosam 318, 53. permolestia, quænam 101, 31. vrinarum perturbatarum mendiando redditurum, perturbatio duplex 335, 12, 15. de vrina perturbata, simili iumentorum; vitæ discessio formidabilis, aut grauiorem malorum accessio 329, 47. in vrina perturbationem, superstitem esse oportet illius quæ in venis antecessit 333, 1, 2. vrinæ pingues, sunt adipis colliquari 310, 31. vrinam reddi porraceam, cum nigra hypostasi aut fursuracea, in pleuriticis; confestim mortiferum 326, 53. vrina prurpura, partium superarum affectiones ostendit 311, 11. vrinæ purulente pituitosæ & albuminæ; non raro criticæ 310, 39. quæ continenter ac diu tales redduntur, vesicæ sunt exulceratæ, aut renum 318, 10. vrina rubens, vnde 112, 37. rubra admodum, quænam 336, 35. vrinæ rubræ, iumentorum similes; vnde 88, 35. vrina si ex rubra nuper, mox aquosa decolor euadit; mali est ominis 368, 44. prærubra, renes malè suo officio fungentes arguit 13, 33. vrinæ prærubræ, differentia 326, 25, &c. prærubra, multa bile saturata, vel rutila inflammatione serosi liquoris; brevis morbi est potius quàm longi 329, 40, 41. prærubra; caliginosa, cum variâ hypostasi, nec discretæ; pleuriticis maximam partem mortifera intra 14. dies 316, 3, 4. prærubra & subrubra, quomodo differant 321, 35. subrubra, quænam 313, 59, &c. nec signo, nec causa, in malis ducenda 112, 40. vrinæ subrubræ post septimum diem *ἀνδρομύκρον*, ducitur de sero sanguinis crudioris 314, 59, 60. in vrina subrubra, cum hypostasi alba & læui, multum est securitatis 313, 48. subrubræ cum subrubra hypostasi, sufficit ad criticam excretionem, vbi est fortis naturæ contentio 314, 30. quæ subrubram habet hypostasin, exacti non est pepasmi 314, 29. 316, 3, 4. in pleuriticis quæ hypostasin habet læuem; securam crisin denunciat 335, 33. vrinæ spumantes, quænam 48, 48. vel à spiritu flatulento turbatæ, vel à colliquamento 334, 8. bullatæ à flatulento spiritu, ex crassiore materia; sunt recidiuis crebræ 341, 13, 14. cum vrina spumante bullatæ, crisis perfectio sperari nequit 341, 14. vrinæ spumantes, vndeque gignantur; conuulsionis mouent suspicionem 334, 8, 9, 15. stranguriolæ materia, toto prorupta corpore ad vesicam, multis restituit appetentiam pridem collapsam 310, 18. vrinæ stranguriolæ, quænam prima materia 364, 30, &c. quænam secunda 364, 33. vrina tenuis est vacuitate pepasmi 316, 6, 7. vrinæ tenuis,

infra naturam est, quæ languet effusa in officio coctionis 319, 8, 9. in vrina tenui & biliosa, quæ glutinosam vix habet hypostasin; cruditaris minime obfcura significatio 316, 5, 6. vrina tenuis consistentia, & fulua colore; vnde 315, 60, 61. vrinæ tennes, criticum nihil & velle præ se ferunt 294, vlt. vrina tenuis, cruditatem arguit morbi 47, 4. quibusdā ad phrenitidem & insaniam; aliis ad hæmorrhagiam 47, 6. vrinæ tennes, decolores, non resistentes, nec vlla hypostasi præditæ; crudæ 341, 31. tennes lienosis, tum per se, tum ex euentu 341, 51, 52. tennes meiando emissæ in longis febribus, exiguis, & erraticis; lienosæ 341, 22. tenuis senibus, ad dysenteriam 47, 7. vrinæ quibus diu tennes & crudæ fluunt, vnâque ad sunt cætera salutis signa; abscessus expectare decet in partes diaphragmate inferiores 364, 37, 38. vrina *ερεμώδης*, à flatulento spiritu, & summa infirmitate caloris natiui 326, 41, 42. turbida, vnde 332, 64. vrinæ turbatæ, vt iumentorum, *θραολαρά* 323, 5, 339, 60. vrinarum varias, vnde 82, 3. vrina, colore & hypostasi variegata, multarum soboles affectionum 318, 41. toto liquore virescens, atque etiam nigra; icterum obstructorum bilis meatus symptomaticum exoluit 323, 64, 65. viridis toto liquore, bilis est in hepate & aorta incendio conflagrantis 323, 51. 336, 8, 9. vrinarum viridium toto liquore coloratio, ab æruginosa bile per venas diffusa 327, 1. vrina quæ toto liquore virescit, febris est acuta ipsam periculosè habentis quem semel inuasit 323, 39, 40. in vrina viridi toto liquore, maiori periculo locus est, quàm superficie tantum tenus 323, 54. vrina subviridis, quænam 336, 12. subviridis & florida, cui alba est hypostasis; ipsam crisin citam ostendit 335, 54. vmbrosa, vnde 326, 37. vrinæ *ὀκλῶδης*, plurimum valent ad exoluendam conuulsionem 330, 4. in vrina hominum qui bene valent, nihil cernitur quod vim naturæ effugerit 311, 42. vrina vacua hypostaseos etiam glutinosæ; quia de chylo nihil aut parum apponitur *πρὸς τὴν αἵμασιν* 316, 7, 8. in vrinis aspectabilia quæ sunt, *ὀφθαλμοειδῆ* dicta 311, 20. vrinarum *πρὸ ὀφθαλμοειδῆ*, sæpe alia pro aliis usurpata 317, 29, 30. vrinæ intra liquorem continentur; sublimes nubeculæ, mediæ ençoremata, & imæ hypostases 317, 28. 324, 21. intra vrinam aspectabilia sunt; vel ab iis orta quæ vim naturæ in confectioe sanguinis effugerunt; vel excrementa corporum quæ liquuntur, sanguinis perusti 311, 43, 44. intra vrinam aspectabilium quæ vim naturæ effugerunt, distinctio varia; colore, substantia, quantitate, loco, situ 311, 43. eadem à corporibus aut humoribus quæ liquuntur aut peruruntur; toto genere praua 311, 46, 47. in vrinis, nebularum quænam materia 317, 36. nubecula volitat leuibùs ventis 311, vlt. 312, 1. 315, 23. 314, 19. vrinæ nubecula, indicandi potentia, cedit hypostasi 315, 22. in vrinis nebula, pro omnibus *ὀφθαλμοειδῆ* 317, 32. vrinarum nebulae albæ, vnde 317, 39. nebulae albæ & fundum verius; viles: rubræ autem, nigræ, liuidæ; difficiles 317, 19. nebulae liuidæ; soboles partium emortuarum 317, 58. nebulae nigræ, vnde 317, 47. vrinæ nubecula nigra & ençorema *πορρωδῆς*, peioribus est ægri rebus, quàm rerum earum hypostasis quæ in fundo residat 311, 47, 48. in vrinis cum velut nubeculae nigræ sunt per tertianas horrificas; incertum horrorem denunciant 333, 23. vrinæ nubeculae nigræ quæ sunt in erraticis febribus; quartanas denunciant 330, 29. nebulae rubræ, vnde 317, 45. in vrina nubecula fuit rubra sub quartum, quibus septimo die crisis venit 312, 35. 315, 3, 4. in vrinæ superficie pingue quod enatat; proprium pinguis liquefacti 329, 12. in vrina quod pingue est, discessionem non ostendit febris, sed vitæ ipsius 313, 19. vrinæ ençorema, vnde 112, 52. non raro pro hypostasi 112, 54. ençoremata genitura, in febre acuta, mortiferè apparent: in verusta, pituitæ ostendunt purgationem 336, 49. in vrina si quid sit pendulum, vanescente cruris dolore, Idementiam præfigit 475, 14. in vrinæ ençoremate diuulso, pariter vis morbi lucet, atque natiui caloris imbecillitas 319, 18. vrinæ quibus sunt nigro ençoremate præditæ, aluo fluente, vigilibus; phrenitici euadunt 317, 49. vrinæ hypostasis, quid 311, 37, 38. 315, 65. 316, 1. vrinæ hypostaseos & nubeculæ, materia equalis 315, 24. vrinæ hypostasis in fundum deponitur, virtute caloris natiui 358, 12. 314, 19. 315, 23. vrinæ hypostaseos generario, puri analoga 311, 36. vrinæ hypostasis, posita inter pus atque humores naturæ dicatos nutriendi causa 313, 37. loco melior & fida magis ad expectandam crisin cito &

certo venturam, quam ipsa nubecula 514, 17, 18, 515, 22. duplex una naturalis, altera contra naturam 515, vlt. 516, 1. quæ ad crisin apparet febrium acutarum, qualis 336, 35. quænam omnium præstantissima 512, 7, &c. illa demum fidæ est salutis, quæ numeros omnes explet bonæ materiæ loci, & situs 511, 53. vrina quibus citò hypostasin habet; celeriter illi iudicantur 543, 31. vrinæ hypostasis laudata, qualis 155, 35. vrinæ hypostasis laudabilis, notæ; leuitas, æqualitas, albedo 543, 35. notæ, vim caloris natui, materiæ bonitatem cum robore cõiunctam partium solidarum referunt 543, 37, 38. vrinæ hypostasis naturalis, est de reliquiis materiæ sanguificandæ, cum inchoata est redintegratio, & febris mitescit 515, vlt. 516, 1. naturalis, subrubra vel alba est 516, 2. albas bona 81, 35. vrinæ hypostasis alba causa, πικρὸς 517, 59. vrinæ hypostasis, vnde albescit 511, 63. alba, est τὴν ἀπὸ τῶν 511, 60. integritatem partium solidarum denunciat 511, 55, bonitatem succi ostendit qui vim effugit naturæ, in sanguinis confectione 511, 54. materiæ bonitatem, pepasmi capacitatem denunciat 511, 61, 62. loci opportunitate quem occupat; caloris natui certum argumentum 511, 63, &c. alba & læuis, parem ostentat salubritatem loco ubi residit, & sicut arque materia 511, 51, 52. 536, 15. vrina quæ albam & læuem habet hypostasin, exacti est pepasmi 514, 29. inter vrinæ hypostasin albam, semen & pus, nihil interest efficiendi virtute, sed tantum materiæ capacitatem 511, 57. vrina in febre quæ albam & læuem habet hypostasin atque constantem; citam illius dimissionem ostendit 509, 4. hypostasis sputiformis, non nisi de vitii tenui aut vesicæ apparet 530, 7, 8. vrina quæ sputiformes habet hypostases, aut limosas, rigorem denunciat 529, 33. hypostasis subrubra atque læuis, vnde 514, 1, &c. vrina quæ vtilem habet hypostasin, & mox non habet; laborem & mutationem ostendit 534, 33. hypostasis prauæ, notæ; nigredo, asperitas, dissipatio, cõcretioque 543, 35, 36. hypostasis contra naturam; de corporibus est quæ liquuntur 516, 1. ad vrinarum prauam hypostasin pertinet πικρὸς 532, 41. hypostasis cænoxa, subliuida, ex concretis; mala 551, 45. subliuida; signum edit partis emortuæ, vnde liquefacta excernitur 520, 1. hypostasis prauæ notæ, violentiam ardoris febrilis, morbifici succi corruptionem, naturæ imbecillitatem referunt 543, 36. hypostases pingues, suspensas, araneosas improbare decet, vt colliquationis signa 530, 23. hypostasis nigra, aut nebulosi enzeorematismateria, languis perustus incendio 527, 2. hypostasis rufa, argumento est viscerum quæ a febre liquuntur 537, 30. varia, variarum affectionum præ se fert argumenta 526, 39. viridis, venit ex bile quæ de flaua migravit in viridē à febrili ardore 536, 42, 43. vrina periculosa est, quæ ex hypostasi sua diuelliur 518, 54. & quæ ex glomerata, hypostasin habet subliuidam 550, 25. inter vrinæ periculosa est, colore & hypostasi variata 519, 38. pestifera est, quæ & hypostasin habet nigram, & ipsa quoque est nigra 524, 13. vrinæ naturalibus maxime contrariæ; pessimæ 524, 45, 46. vrinaria fistula, longa, angusta, sinuosa 361, 40. primum ab Hippocrate dicta ἡ ὑπορρέα 361, 42. vnde incipit 361, 41. vrinariæ fistulæ ὑπορρέα 361, 42. vnde incipit 361, 41. vrinariæ partes præcipuæ, vesica & renes 538, 17.

Vterus, corporis pars nobilissima 455, 30. 465, 23. capacitas est ampla 455, 37. sensus acerrimi 463, 19. in vtero, linea mediana 135, 33. summus opifex ingenerauit amorem gignendi 454, 34. vterus, fundamentum naturæ muliebri ac muliebrium purgamentorum 454, 31, 32. à Platone dictus, ὡς ἐπιθυμητικόν 440, 22. omnium quæ in aluo cõtinentur, nobilissimus 440, 21. vteri concupiscentia, maius bonum affectat, quàm heparis 440, 22. cõcupiscentia, & rei venereæ indulgentia, sufficit ipsa per se proliciendo sanguini, & ciendo ad exitum celerius menstrua purgatione 454, 48, 49. virtute, semen animatum promouetur, atque perficitur ab eo quod erat, ad id quod actum esse debebat 440, 25. opus, dignitate præcedit opus hepatis 440, 23. idque est generatio atque perfectio animalis 440, 24. oblectamento, vicina genitalia sunt in proptu 454, 35. vtero genitalia vicina, de suo impertiunt semen muliebri, dum coit 454, 36. in vtero, caloris & siccitatis, quomodo mediocritas ad concipiendum idonea comparatur 481, 41, &c. vtero naturaliter instituta nõ est cõnuendi consuetudo, nisi cum semen concepit, fouetque fuo cõplexu 479, 61. vteri cum iecore affinitatem, quid declarat 454, 43. vtero morem gerit hepar, affinitate quadam cõcupiscentiæ & amoris voluptuarij 454, 41. subsidio sit hepar, illuc transmissio sanguine quo irrigatur fun-

das matricis 454, 41. respõdet omnino corporis vniuersitas, similiter constituta vt ille 454, 32. vterus, menstruum affluxu ad se rapit, cupiditate nimia incitatus 456, 6. vt fouendus ager, fructu materno restituibilis esse debet 482, 3. vteri euacuatio, per menstruale profluuium 14, 35. vterus, principatui corporis omni, societate & affinitate coniunctus 465, 23. vteri cum cerebro, quænam sympathia 462, 61. vterus & mamma, mutuo se efficiunt 483, 33, 37. vteri & mammæ societas, multa argumenta 483, 32. vtero & mammis societas intercedit per vasa communia 483, 58. sua est sitis 264, 21. vteri vacuati ac sitientis symptomata, quomodo nascuntur 485, 5, &c. defraudatio quæ apnoeam inducit, penè miraculo apponi debet 485, 14. egressio qualis: talis erit neoterismus, fouendo & alterando 481, 20. os quibuscunque est durum; iis necesse est vt conuiuat 463, 19, 479, 60. conuiuentia in vacuis, quomodo commune symptoma inflammationis & scirrhi 463, 25, &c. conuiuentia quæ fit à scirrhi; difficulter admodum curatur 479, 63. in vtero, grumescens sanguinis grauissima incommoda 455, 38. vteri impuritas qualis: talis erit purgatio 481, 20. in vtero, humoris superuacanei, semen virile exstinguens, quænam signa 481, 45. humidioris ac multa prolucis diffuētis redintegratio, procurantia cathartica 481, 44. intemperies eximie frigida, fouedo intrus & foris calidis rebus hystericis, ad iustam temperiem redintegranda 481, 21, &c. vtero cum male est, & male ab vtero; linguæ mutatio esse solet 474, 9. vterus, quomodo inflammatur 463, 15, &c. quoties inflammatur, non necessariò, nec semper apparet lingua arida 474, 16. inflammatus, sæpe transmittit ad linguam fuliginosum ardorem 474, 20. ab vtero ad sinum pudoris, ruboris propagatio; illac futuri exitus materiæ purulentæ signum ostendit 465, 21. ab eo inflàmato, alui duritas, per oppressionem partium circumiacentium 463, 41, 42. vteri inflammatio, calidissimam secum habet febrim coniunctam 474, 13. 485, 32. inter magnas afflictiones eximia 463, 36. inflammationis sytrophica signum, hystericæ duritas in aluo admodum dolorifica 463, 10. inflàmato signum συνεχῶς, rubor naturalia occupans 465, 15. inflammatio, conuulsionem secum adducit 485, 31. doloris ac febris vi pernicioxa, erysipelas ipsum præcedit 463, 51, 52. vterus si in ischium decumbat & suppuret; vlcus necesse est ἐμυσσῶν fieri 200, vlt. 465, 34. vteri pathemata multa: sed partium cæterarum communia 484, 45. proprium pathema, cum muliebribus & genitura; hystericæ passio 484, 46. non minùs verè dici debet hystericæ conuulsio, quàm apnoxa hystericæ 484, 48.

Vulnerum medicina omnis, quò spectat 417, 59. vulnus omne, non est trama 225, 47. magnum, est trama 225, 47. vulnera magna artum, quæque nervos dissecant exactè à quibus reguntur; palam est quòd claudos efficiunt 423, 34, 63. circum vulnus magnum & vehemens si tumor non asurgit, ingens malum 424, 11. vulnus, quando in vlcus mutatur 430, 21. vulnera, quænam sauciatibus absument 427, 55. vulnus in thorace si non rectè curetur, empyematis mortiferi causam infert 305, 40. vulnus si foris sanum sit, intrus verò non sanum; purulens sit saucius 305, 62. vulnera quænam, mortifera 424, 31, &c. partium efficientium, celerius ad mortem fatalia 424, 62.

Vulruosi homines, leui de causa fortiter irascuntur 374, 49.

in Vaulæ laxitate, crebro deglutiendi studiū irritū 334, 25. **Y** T I A I N O N T E Z, qui 10, 18. ὁ ὑγιανὼν ἔχειται, qui 10, 21. ὁ ὑγιανὼν, quale requiri debeat 147, 9. ὁ ὑγιανὼν, quid 83, 44. ὁ ὑγιανὼν ἔχειται, vnde 451, 10. ὁ ὑγιανὼν, vnde 212, 7, 213, 15. αἱ ὑγιανὼν, vnde 238, 50. ὁ ὑγιανὼν, vnde 415, 15. ὁ ὑγιανὼν, qui, & quamobrem 416, 30, 19, 393, 29. ὁ ὑγιανὼν, vnde 451, 10. ὁ ὑγιανὼν, soli aluo transmissæ semper tribuitur 181, 10. 545, 2. τὰ ὑποχρηµατὰ μέλας ἵστα, quænam Hippocrati 209, 60. ὁ ὑγιανὼν τῆς κοιλίας, idem quod, ὡς ἡσθερὴν ἢ διαχρησά 61, 10.

ὁ ὑγιανὼν, quid 68, 34, 503, 60, 451, 17. ὁ ὑγιανὼν, idem quod ὁ ὑγιανὼν 555, 40. τὰ ὑποχρηµατὰ omnia, mala in omni naturæ & morbi certamine 217, 39.

Z O P Y A Y S, physiognomus 31, 54.

Cæsareæ Majestatis priuilegium.

VDOLPHVS Secundus, diuina fauente clementia Electus Romanorum Imperator, semper Augustus, ac Germania, Hungaria, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Sclauonia, &c. Rex, Archidux Austria, Dux Burgundia, Stiria, Carinthia, Carniola, & Wirtembergæ, &c. Comes Tirolis, &c. Notum facimus tenore presentium vniuersis. Quod cum nobis humiliter exponendum curauerit Baptista Dupuis, ciuis & bibliopola Parisiensis, se pro bono publico Ludouici Dureti Medici commentaria in Hippocrateis & alia eius opera, typis adere decreuisse. Vereri autem, ne amuli forte, qui plerunque falcem in alienam messem mittere solent ipsum, vel vitiosa imitatione, vel aliis sinistris artibus, sperato laborum suorum fractu & emolumento priuaturi sint: demisse proinde supplicando, ut sua hoc loci indemnitati priuilegio nostro Casareo consulere clementer dignaremur. Nos sanè non ignari, quatum lucis rei medicæ ex eiusmodi editionibus accedere soleat, humilibus eiusdem precibus deesse nolimus. Ideoque omnibus & singulis Typographis, Bibliopolis, ac aliis quacunque librariam negotiationem exercentibus, firmiter inhibemus atque vetamus, ne quis memoratos libros per decem annorum spatium, à prima die editionis computandum, intra sacri Romani Imperij, regnorumque & dominiorum nostrorum hereditariorum fines, simili aut alio quopiam charactere vel forma, siue in toto, siue in parte recudere, aut aliò recudendos dare, vel alibi etiam impressos adducere, vendere, distrahere uel clam vel occultè, citra voluntatem & consensum præfati Baptiste Dupuis, suorumue heredum præsumat. Si quis vero secus faciendo, priuilegium & interdictum hoc nostrum Casareum spernere, negligere, aut transgredi conatus fuerit, eum non solum omnibus libris illis perperam quippe recusis & adductis (quos quidem supradictus Baptista Dupuis, aut heredes illius, eorumue mandatarij, ubicunque deprehensos, vel propria autoritate, vel Magistratus loci illius auxilio, sibi vendicare poterunt) de facto priuandum, sed & pœna in super decem marcharum auri puri, fisco nostro Casareo fraudis vindici, & sæpefati Baptiste Dupuis, suorumue heredum vsibus ex aequo pendenda, decernimus irremissibiliter plectendum: Dummodo tamen huiusmodi libri nihil in se scandalosum, aut orthodoxæ religioni Catholice, sacræque Romani Imperij constitutionibus, aduersum, siue in præfatione, siue in textu, aut alias quoquo modo contineant: idemque Baptista Dupuis, terna ad minus exemplaria propriis suis sumptibus quamprimum ad Cancellariam nostram imperialem transmittere teneatur, quatenus priuilegio hoc nostro uti voluerit. Quod si neglexerit, eo ipso priuatus & exutus planè censeatur. Mandamus ergo vniuersis nostris, & sacri Romani Imperij regnorumque & Dominiorum nostrorum hereditariorum subditis, cuiuscunque status, gradus, ordinis, conditionis, dignitatis aut præeminentiæ existant, tam ecclesiasticis, quàm secularibus, præsertim vero iis, qui in magistratu constituti, vel proprio, vel superiorum suorum nomine & loco iuris ac iustitiæ administrationem exercent, ne quemquam priuilegium hoc nostrum Casareum temerè & impunè transgredi aut violare patiantur, quin potius contumaces, si quos compererint, præscripta pœna plecti, aliisque idoneis modis coerceri curent: quatenus & ipsi eandem mulctam evitare maluerint. Harum testimonio literarum, manu nostra subscriptarum, ac sigilli nostri Casarei impressione munitarum. Datum in Arce nostra regia, Pragæ, die duodecimo mensis Octobris. Anno Domini millesimo quingentesimo octuagesimo septimo. Regnorum nostrorum, Romani, decimo tertio; Hungarici, decimo sexto; Boëmici verò, duodecimo.

RYDOLPHVS

Iacobus Curtius, à Tensstenau.

Ad mandatum Sacræ Cæsareæ Majestatis proprium.

A. Benck.

Extraict du privilege du Roy.



AR lettres patentes du Roy nostre Sire, donnees à Paris le vingtiesme. Iuillet, mil cinq cens quatre vingts & sept, il est permis à M. Iean Duret, Medecin de sa Majesté, & son Lecteur ordinaire en medecine, de faire imprimer & mettre en lumiere par tel Imprimeur ou Libraire qu'il voudra choisir, tous & vns chacuns les liures, commentaires & compositions que feu M. Loys Duret son pere, aussi Medecin & professeur de sa Majesté auroit composez, escrits, ou dictez : avec inhibitions & defences à tous marchands Libraires ou Imprimeurs de non imprimer, vendre ou distribuer lesdits liures, commentaires, & compositions en cestuy nostre Royaume, durant le terme de six ans, à commencer du iour & datte que le premier liure qu'il aura choisi pour mettre sous la presse, sera acheué d'imprimer : sur peine de confiscation desdits liures qui seront trouvez d'autre impression que celle ausquels ledit Duret aura donné permission, & d'amende arbitraire, comme plus amplement est contenu & déclaré esdites lettres : Veut aussi sa Majesté qu'apposant l'extraict dudit priuilege à la fin ou au commencement du liure, il soit tenu pour deuëment signifié, car tel est son bon plaisir, ainsi signé,

Par le Roy,

Viole maistre des Requestes ordinaire de l'hostel, present.

FONDEBELEIN.

Parisiis excudebat Dionysius
Duvallius, mense Iulio, 1588.